Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
BV 1837			Trondheim	
Kommer fra ..arkiv	**Ekstern rapport nr**	**Oversendt fra**	**Fortrolig pga**	**Fortrolig fra dato:**

Tittel

Diaborlog Skorovatn fra nr. 851 - 1000
1965 - 1982

Forfatter	Dato	Bedrift
	19	Elektrokemisk A/S, Skorovas

Kommune	Fylke	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Naamsskogan	Nord-Trøndelag	Trondheimske		

Fagområde	Dokument type	Forekomster
Boring		Skorovatn
Råstofftype	**Emneord**	
Malm/metall		

Sammendrag

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 14.6.65 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 851

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
5,60			Grov - fine matt		0-3,0	
		10,50	Gr. fk. m/ bånd av impt			
					3,0-5,60	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

952

Dato: 7-1-65 Sign: GH Retn.: Sted: Hull nr.: ~~522~~

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Midd. ogsaa.			
10,-			Siste 2 meter fine.		0-3,0	✓
13,50					3,0-6,0	✓
		14,60			6,0-9,0	✓
14,90					9,0-13,50	✓
		15,55			14,6-14,9	
15,75					+	✓
		16,65			15,55-15,75	
17,60						
		20,-	Div. impr		16,65-17,60	✓
	21.10		Fra 20,50-20,60			
					19,0-20,50	
21,60						✓
		22,60	Slutt		20,50-21,1	
					21,1-21,6	✓

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 14.6.65 Sign: GJ- Retn.: Sted: Hull nr.: 853

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
4.55			Grønk. Gr.f 1.50 : 1,80		0 - 2,00	
		5.00	2,90 - 3.00		2,0 - 4,55	
5.10						
		5,90			5.0 - 5.10	
10,00			Delv. fink tett m/ Samer av			
			mere grønk kis.		5.90 - 9.00	
11.20						
		16,65			9.03 - 11,20	
	17.10					
		17,50			16,65 - 17.10	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 4.6.65 Sign: GH. Retn.: Sted: Hull nr.: 854

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	1.80		Fra Grovkvartsit		0 – 1.80	
4.55			Grovkvartsit Cu-fj. 2,25-2,35			
		7.35			1.80-4.55	
10.00			Fiste m. grønk. med			
			svarg. tie fjeld		7.35-10.00	
14.05						
		14.65			10.0 -14.05	
14.80						
		1850			14.65-14,80	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 14.6.65 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 855

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
2,55			Båret - dels fint. lett. Gr.h. 5 cm"/1,75 Siste del lave Pyrrhotin.		0 - 2,55	
		10,-	Grafitt - Mr/bånd av linjer.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 11-6-65 Sign: GH. Retn.: Sted: Hull nr.: 856

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
10,-			Tett, fink. Gr. h. bånd 2,40		0.0-3.0	✓
14.90					3.0-6.0	✓
		15.90			6.0-9.0	✓
18.10			Tett, fink.		9.0-12.00	✓
		20.00	Gr. pk. Bimodt		12.0-14.90	✓
		26.40	— " — skift 1 pr b.h.			
					15.9-18.10	✓

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 11-6-68 Sign: GJ- Retn.: Sted: Huli nr.: 857

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
10,00			Tett - fink. Striper av Cu.		0.0 - 3.0	✓
14.30					3.0 - 6.0	✓
		14,55	Kvarts		6.0 - 9.0	✓
15.15					9.0 - 12.0	✓
		15,35	— " —		12.0 - 14.30	✓
15,55						
		15,65	— " —		14.55 - 15.15	
17,50			Fink Matt - Grunale bänd av/blå		+	✓
		19,95			15.35 - 15,55	
20,00						
21.00			Mied grovk Bånd		15.65 - 17.50	✓
		22.30	Grovkrystallinsk Sulfitt			
					19,95 - 21,00	✓

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 11-6-65 Sign: G. Retn.: Sted: Hull nr.: 856

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,00	Stripes av impr. Cpl. Bk.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 11-6-65 Sign: G. Retn.: Sted: Hull nr.: 859

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
10,-			Tett, fink - Cu.	10,8	0.0-3.00	✓
			Gr + 3,55 - 3,60 Skive M/		3.0-6.00	✓
11,80			i analysen.		6.0-9.00	✓
		15,80			9.00-11,80	✓
17,30			Tett-fink. Grank. mot kant.			
	17,70				15.80-17,30	✓
		19,10				
	19,40		Cu.		17,30-17,70	✓
		20,50				
		21,40	Gr. Sk.		19.10-19,40	✓

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 11-6-65 Sign: G. Retn.: Sted: Hull nr.: 8600

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
2,00			Fink. tett		0 - 2.00	
		2.20				
3,60			— " — Cu		2.20 - 3,60	
	4,00					
10,40			— " — "		3,60 - 4.00	
		20,00	Cp. pk. kup. - enk. bånd/kis.			
					4.00 - 7.00	
					7.00 - 10.40	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 11-6-65 Sign: GH. Retn.: Sted: Hull nr.: 861

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.60	Gr. fk hyp		1.60-4.15	
4.15			Med fink. Delv. matt.			
		4,70				
7.40			— » — Tett.		4,70-7.40	
		10,-	Gr. fk m/ Sml pomer av Cirkis			
		12.60	— » — hyp.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 11.6.65 Sign: G. Retn.: Sted: Hull nr.: 862

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,60	Gr. skif m/ striper av impr.		2,60 - 5,00	
10,00			Midd fink tett		5,00 - 8,00	
14,40			— " — Mere grovkornet		8,0 - 11,00	
			Ca.		11,0 - 14,40	
		20,-	Gr. sk. bånd av impr.			
		23,00				
23,50			Båndet m/ gr. skif. fink.		23,0 - 23,50	
		24,50				
25,05			Tett fink - Matt.		24,5 - 25,05	
		29,50	Gr. sk. m/ mand skrk.			
		30,00	Kg. taps.			
		35,00	Gr. sk m/ bånd av impr slutt.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 18/2-66 Sign: GA. Retn.: Sted: Hull nr.: 863

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		4.10				
4,60			Mica sprek. hvit.		4.10-4,60	
		5.10				
		"	Tett, fink. Cu?		5.10-8.00	
15,80		"	Skarp overg. Vis-Gp.b.			
					8,00-11,00	
		26,30				
					11,00-14,00	
					14,00-15,80	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 18/2-66 Sign: AH Retn.: Sted: Hull nr.: 964

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,-	Lite spor			
		11,00			11,00-12,20	
	13,40	-	Lysum impr. m/ lite-striper			
14,35		-	Mørk grøn Matt			
	14,80				13,40-14,35	
15,20					+	
		15,70			14,80-15,20	
16,40						
		16,70			15,70-16,40	
18,00		-	Dels tett fink. Cu.		+	
		18,40			16,70-18,00	
18,70					+	
		28,80	Noe bun sit pr impr. pr 27,30		18,40-18,70	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 18/2-66 Sign: G. Retn.: Sted: Hull nr.: 865

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		3,20			3,20-4,00	
	4,00		Grønk. kjerne			
		7,60				
			kjerne-grønk. Matr.		7,60-11,00	
			Grønnes mere fink. lit lett			
			meget fink kis. Cu	16,50	11,00-14,00	
			Magnetitstriper 16,0-20,0			
23,00			20-23,- Kalkstriper		14,00-17,00	
			Cu og Magnetit.			
					17,0-20,00	
					20,0-23,00	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 12/2-66 Sign: GH. Retn.: Sted: Hull nr.: 866

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		3,80				
4,70			Midd grønk. Matt-båndet		3,80-4,70	
		10,50				
10,65					10,50-10,65	
		10,80			+	
			Tett-skift grønn-fink. De første m. fanere midd fink.- og matt.-Cu-grupe 19,00 Slutt 20 m fink.		10,80-13,00	
22,00					13,00-16,00	
					16,00-19,00	
					19,00-22,0	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 9/2-66 Sign: GH. Retn.: Sted: Hull nr.: 867

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		10,00	Sauer av dr. impr.			
		11,00			11,00 - 13,00	
	13,00					
		15,45				
~~15,55~~	15,55				15,45 - 15,55	
		15,70			+	
	16,60		Lysm, bånd, fuld gnavk.		15,70 - 16,60	
		25,30	Svak imp. til 21.00			

ELEKTROKEMISK A.s
Skarovas Gruber

Diaborlog

Dato: 15/2-66 Sign: GH. Retn.: Sted: Hull nr.: 868

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		Loo	Delv årak imp.			
					1,0-4.40	
	4.40		Delv årer m/dr imp.			
		10,60			10.6-10.8	
10,80					+	
		11,20			11,20-11,80	
11,80					+	
		11,85			11,85-12,35	
12,35					+	
		12.60			12.60-12,85	
12,85						
		26.95	Noe dr imp v/20,--20,30		26,95-27,55	
27,55						
		34.30			34.30-34,50	
34,50					+	
		34,70			34,70-37.10	
37.10			Tett, meget fink. Noget			
		37.30			37.30-40,55	
40,-			Noe mere grov k.			
40,55					41,50-42.10	
		41.50				
42.10			Mere finere og grov k.			
		44.30	Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 5/1-66 Sign: GH- Retn.: Sted: Hull nr.: 869

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		10,00				
		12,60			12,6 - 16,00	
20,00			Mye grønk. kvarts-kalk?			OBS!
			Noe båndet		16,00 - 20,00	
? 23.10			Jevn. - Tett Kalk			↑ Merk.
		23,65			20,00 - 23.10	på kassen
? 25,90			Båndet - Noe tjern			glassbort
		28,80			23,65 - 25,90	feil.
30,00			Jevn. lett - Ikke helt rein.			
					28,80 - 31,80	Har merk.
31,80			Båndet tjern			20cm der
		34,95				merket
						burde ha
						stått.
						Sluttt på
						kassen
						merket
						med
						30,80 M

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 5/1-66 Sign: GH. Retn.: Sted: Hull nr.: 870

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Fra ca 5,80 m i 10 cm kis			
		10,00				
		11,70				
12,75			Midd fink Båndet		11,70-12,75	
		15,20				
20,00			Midd fink Båndet Wurts		15,2-18,00	
21,45						
		31.15			18,00-21,45	
31.50						
		32,60			31.15-31,50	
33,-					+	
		33,40	Slutt		32,60-33,00	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/11-65 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 871

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2.80				
3.80			Tett - fink.		2.80-3.80	
		5.20			+	
5.30					5.20-5.30	
		9.50				
	~~9.90~~				9.50-10.40	
	10.40		U.jevn.			
		11.05				
11.15						
		11.90			11.90-15.80	
15.80			Tett fink.			
		20.10	Skifer			
		22.80	Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/11 -65 Sign: GA. Retn.: Sted: Hull nr.: 872

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprove	Anmerk.
		1.00				
1.25					1.0-1.25	
		2.80				
4.70			Tett fink - meget Cu-rik		2.80-4.70	
		6.00				
6.50					6.00-6.50	
		7.20	Sv oppsprekket etter pkt.			
8.75			Tett - fink.		7.20-8.75	
		9.50				
10.00			Tett - meg fink			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/11-65 Sign: GH. Retn.: Sted: Hull nr.: 873

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		3.40				
	3.50					
		8.90				
9.10						
		13.55				
	13.65					
		14.30			14.30-14.90	
14.90			Tett. fink - Cu			
		20.05	Samme som de øvrige.			
		26.20	Sluttet — " —			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/11-65 Sign: OA. Retn.: Sted: Hull nr.: 874

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		4.30	Skifer m/ imp.		4.30-5.30	
	5.30		kvarts.			
6.50			Tett - fin - Cu		5.30-6.50	
		16.70	Skifer m/ imp.			
20.00			Tett fin. kis m/ soner av kvartsit		16.70-20.00	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/11-65 Sign: (A) Retn.: Sted: Hull nr.: 875

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1.10			Tett - fink.		0 - 1.10	
		1,45			+	
1,70			— " —		1,45 - 1,70	
		3.50				
	3,60					
		9,90	Samer av imp.		9.90 - 10.10	
10,10						
		11,45				
	11,55					
		11,80			11,80 - 12,95	
12,95			Tett - fink.			
		17,50	Samer av imp.			
20,00			Tett - fink - Cu		17,50 - 20,00	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/11-65 Sign: G. Retn.: Sted: Hull nr.: 876

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,80					0-0,80	
		2.10				
7.50			Grf. 6.60-6.70		2.10-5,00	
		10.00	Sner av amp.			
		16.55			5,00-7.50	
16.85			Tett - fink			
		21.00	Sent		16,55-16,85	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/11-65 Sign: GH. Retn.: Sted: Hull nr.: 877

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1,70			Taste m tett fink.		0.-1,70	
			Svart båndet og mye gr.k.			
		4,00	Mergelslitt.		4,0-4,50	
	4,50					
					4.50-7.50	
10,00		✓	Mørk fink. Noe tjern. Gr.fn			
			Gr.k. 8,55-8,60		7.50-10,50	
13,30			Tett-fink. fra 10,5-11,0 Kis			
	~~20,00~~	✓	Noe mye gr.k.		10,50-13.30	
	20,10		Båndet-gr.k. delv. fin kis		13.3-17.00	
	20,50					
		22,10	Sv. impr.		17.0-20.50	
23,30						
	24,20		Kis 23,90-24,10. Gr.k.		22.10-23,30	
		25,00	Båndet. 24,1-24,2 Gr.bånd.			
					23.3-24,20	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/11-65 Sign: G. Retn.: Sted: Hull nr.: 879

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1.10			Båndet - mjelm Fink.		0-1.10	
		3.30				
7.70			Fink - Cu - Noe Kalk		3.30-7.70	
			Gr.fj 0,05 m på 7,60			
		8.00			8.0-11.00	
10.00			Grovk. fem - Virker tett			
					11.00-13,00	
13.00			Grovk med gjødsle overg.			
	14.		lie kik. imps.		13.00-17.00	
	17.00		Båndet - mjelm			
18.00			Grovk.		17.9-18.00	
	19.40		-11-			
19.80			-11-		18.0-19.40	
	20.00					
	21,70				19.4-19.8	
		22.60				
	22.70				19.8-22.7	
		23.50				
	23.80				23.5-23.8 +	
		24.20				
	24.50		Grovk.			
		24.80			24.2-24.5	
25.60			Mjelm - Fork imps. Båndet			
		30.07	Kvite Quarz m/ imps		24.8-25.6	
		30.70	Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/11-65 Sign: GH. Retn.: Sted: Hull nr.: 879

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1.20			Båndet. Noe vann-inntrengning		~~1.5~~ -	
		1.40			0 - 1,20	
1.75					+	
		12.10	Skift. 90°		1,40 - 1,75	
12,60						
		13.30			12.10 - 12,60	
13.50					+	
		9.40	Skift		13.30 - 13,50	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

A

Dato: 2/11-65 Sign: G. Retn.: Sted: Hull nr.: 390

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
1.40			Tett - fink. Skrå 90°		0 - 1,40	
		20,0	Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

881.2

B

Dato: 2/12-65 Sign: GH. Retn.: Sted: Hull nr.: 880

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		9,30			9,30-11,90	
10,-			Tett - fink. Cü			
11,90					16,30-20,3	
		16,30				
20,00			Mye grovk. - Magnetitt		20,5-23,6	
			Gn h 18,1-18,2			
			20,3-20,50			
23,60			Tett - fink.		24,0-24,8	
		24,00				
24,80						
		35,60	Dertti			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 27/1-66 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 882

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0		9,70	Fe			
9,90			Mixed ore K			
		10,00				
		20,00	Mass of stone			
		30,00				

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 27/1-66 Sign: GH. Retn.: Sted: Hull nr.: 883

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
					4,00-7.70	
	7.70					
		10,00				
		10,20			16,20-19,20	
	16,20		- Lysm Midd fink			
16,50					19,-21,40	
	19,20		17,2-17,4			
20,-			- Tett fink		24,45-25,70	
21,40						
		24,45			27,40-30,05	
	25,70					
	27,40				31,20-34,20	
30,00			- Midd fink tett	29,80		
30,05					34,20-35,80	
	31,20					
35,80			- Delv. grm kis - delv impr.		37,30-40,0	
	37,30		- Sv. impr. lysm.			
40,00			- Midd grank-grm.		40,0-41,80	
42,80			- Tett fink.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 12/6 -66 Sign: E. Retn.: Sted: Hull nr.: 884

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.25	Kompakt grønnst. massiv			
1.45			Midd. grovkornet		1.25 - 1.45	
		1.85				
3.60			— · — tett.		1.85 - 3.60	
		4.70				
4.90			— · —		4.70 - 4.90	
		4.95				
4.98						
		5.05				
5.20			— — —		5.05 - 5.20	
		12.75				
	13.65		Spor (båndet ovale grafitt. imp.)			
skrott		15.35				

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 12/5 -66 Sign: H. Retn.: Sted: Hull nr.: 885

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.60	komp. grøn.st (marin)			
1.05			finkornet			
	1.20		Meget rik imp.			
1.75					0.60 - 1.75	
		2.20	Skifrig grønst.			
8.65			Midd. grovkorn.		2.20 - 8.65	
		8.70				
9.30			fin korn.		8.70 - 9.30	
		9.45	klorittisert grønst.			
10.60					9.45 - 10.60	
		10.90	10cm kvarts resten skif. grønst			
11.95			Bland. m/kvarts (lite) bånd m/Cu		10.90 - 11.95	
		12.0				
14.30					12.0 - 14.30	
		17.70				
	17.80		Svake spor (små krystl.)			
		20.65			20.65 - 20.95	
20.95			Meget finkornig			
skift		21.50	komp. grøn.st.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 12/5 - 66 Sign: G. Retn.: Sted: Hull nr.: 886

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0.80			Båndet m/kvartsitt		0 - 0.80	
		1.20	Svakt kloritisert grønst.			
12.70			Delvis rike Cu-kiser, midd.fine.		1.20 - 17.20	
		12.75	kvartz.			
17.20			Midd. fine. m/rike Cu-kiser tett			
		17.40				
	17.45					
		17.60	Skifrig grønst.			
	17.65					
		17.80	— · —			
	17.90				17.80 - 22.60	
22.40			Tildels grovk. m/Cu-kiser			
	22.60					
		25.0				
26.70			Finkornet tett.		25.0 - 26.70	
		27.20	komp. grønst. massiv			
	27.50		Svake impr.			
29.30			Midd. fine m/bånd kvartz		27.50 - 29.30	
		30.60				
31.10			Finkorn. Cu-fat. Zn ?		30.60 - 31.10	
	31.35					
slutt		34.10	Skifr. grønst.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 6.5.66 Sign: E. Retn.: Sted: Hull nr.: 887

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.6	Skifrig grönst.			
5.9			Midd. grovkornet "/båndet Cu-malm		1.6 - 5.9	
					6.4 - 7.8	
	Skift	30				

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 6-5-66 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 888

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
3.15			finkorn (myc Zn?)		0 - 3,15'	
	4.0		Svak bånd imp.			
		4.2				
	5.1		Meget svak imp.			
		6.25				
	6.45		— · —			
		6.65				
	6.9		— · —			
		7.1				
	7.3		— · —			
		7.4				
	7.55					
		9.15	kompakt grønst.			
	10.45					
		11.1				
	11.3					
		11.4				
	12.2					
		12.7				
	13.1		Meget svak imp. bånd m/kis 2-3 m/m tykke			
		13.3				
14.25			finkornet			
		14.3				
	14.45					
Slutt	15.55		imp. ligger i kvartsitt.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 6-5-66 Sign: G. Retn.: Sted: Hull nr.: 889

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0.4			Meget rik på Cu, grovkorn.		0- 0,4	
		2.2				
	2.5		Meget svak			
		4.9				
	6,65		— " —			
	slutt.	7.7				

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 1/12-1971 Sign: S.T.S. Retn.: +90 Sted: GV/70 Hull nr.: 889

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,50			Massiv kis, middels korning, noe gangart av q. Rib bånd med cpy og noe sl			Splittet
		3,50	Gr.sl. grågrønn, noe glinsende sbf. Shf = 10-15³ Noe imp.			
		2,70	Andesitt, blålig, hard.			
		4,80	Gr.sl. grønn, svakt sbf. til noe massiv.			
	6,70		Gr.sl. grågrønn, noe lys svakt sbf. Båndet, uregelmessig imp av py			
	7,20		Gr.sl. grønn, noe sbf. Tynn, båndet imp. Shf = 20³			
		7,66	Gr.sl. grønn, svakt sbf.			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 17/6-66 Sign: E. Retn.: Sted: Hull nr.: 892

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		8.4	kompakt grønst.			
	8.6		Noe svovelkryss. (spor)		8.4 - 8.6	
		17.10	Skifr. grønst.		17,To - 17.6	
	17.6		Båndet impr.			
20.4			Dårlig svovelkis m/noe Cu		17.6 - 20,4	
		20.45				
	20.55				20.45 - 21,55	
		20.70			20.70 - 21.05	
21.05			Midi grovkorn.		21.30 - 21.80	
		21.30	Svarts og grønst.		22.0 - 22.1	
	21.80		Tett impr.		22.6 - 22.7	
		22.0			22.8 - 23.05	
22.1					24.2 - 24.45	
		22.6				
22.7			Cu-rik tett			
		22.8				
	23.05		Meget svak			
		24.2				
	24.55		Grovkorn impr.			
		30.0			30.0 - 30.2	
30.3			Midi grovkornet Cu rik		30.4 - 32.95	
		30.4				
32.95			Meget dårlig Zn og Magnetitt			Svinkt
		36.6				
	36.85		Båndet impr.		36.6 - 36.85	
		40.				
40.8			Cu rik Midi fin korn.		40 - 40.8	
	~~40.85~~	40.85			40.85 - 42,90	
	42.90		Svak båndet impr.			
	slutt	46.10				
	24.55					
		33.15	Båndet impr.			
	33.40				33.15 - 33,40	
		37.05				
39.6			Meget dårlig Zn og magnetitt		37,85 - 39.60	
		39.7			39.70 - 40.0	
40.8			Midtre korn, Cu rik		40.0 40.8	
		40.85			40.85 - 42,90	
	42.90		Båndet (svakt) impr.			
		46.0				

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 24.2.69 Sign: AF Retn.: – Sted: Hull nr.: 592 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		30,40	Grønn grønsten massiv			
		31,55	—"— noe skifrig, en del kvarts.			
		33,15	Grønn. grønsten massiv m/store kvartsklynger. Svak pyrrotip mot slutten			
	33,40		Sterk imp m/ Zn og Cpy. massiv i tynne bånd		33,15-33,40	splittet
		34,50	Grønn grønnsten, noe skifrig og klorittrik.			
		37,05	D. S. meget skifrig og ec. og klorittrik			
40,00			Massiv kis Meget Zn-rik delvis også rik på cpy. 5cm grønsten v/ca 39.60 m		37.05 - 40,00 inntil ca 39,60	splittet

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 17/6-66 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 893

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
Skift		170	Bl. av skifer. og kvarts. gr. st			
			13-17 kvartsitt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 17/6-66 Sign: EJ Retn.: Sted: Hull nr.: 894

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		17.30	skift. grønst.			
18.6			Finkornig Cu-rik. magnetitt		17.3 - 18.6	
		21.35	skift. grøn. st.		21.35 - 21.55	
	21.55		Magnetitt		27.75 - 29.75	
		27.75	Komp. grønstein med kvartsrenn.			
	27.95		Svak, båndet			
28.15			Grovkornet			
	28.20		Svak			
28.45			Cu-rik finkornet			
	29.75		Md. god impr.			
		31.9	Skift. gr. st.		31.9 - 34.5	
38.5			Delvis Cu rik til 32.8 Md. gr. kvartsrenn		34.5 - 38.5	
		38.65	Zn og Magnetitt Mindre grønnstein			
40.5			Dårlig Zn. holdig kis		38.65 - 40.5	
	slutt	43.10	kvartsitt. bl m/gr. st.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-10-66 Sign: E. Retn.: Sted: Hull nr.: 895

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		0.30	enkl. små spor		0.30 - 0.60	
	0.45'		Svak		0.70 - 3.75	
0.60						
		0.70				
3.65'			Mid. fink. m/enk. Ciefsånd) rille			
	3.71'					
		5.15	kopm. grsk.		5.15 - 5.75'	
5.75'			Mid. fink		10.35 - 10.50	
		10.35'	Små spor fra 8.80 fra kmp. grd.		11.60 - 11.70	
	10.50				11.85 - 12.20	
		11.65			12.30 - 12.45	
	11.70		Svak imp.		14.00 - 14.60	
		11.85			14.70 - 14.75'	
	11.95		"		14.95 - 15.10	
12.20					16.55 - 16.60	
		12.30				
	12.45		"			
		14.00				
	14.30		"			
		14.40				
	14.60		"		0.30 - 3.75'	
		14.70			5.05 - 5.75	
	14.75'		"			
		14.95			10.35 - 12.45	
	15.10		Meget svak			
		16.55			14.00 - 14.25	
	16.60		"			
		16.75	slutt.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-10-66 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 296

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.60	Komp. grst			
1.40			S-kis m/dslv. fine Cu-klyser		0.60 - 1.40	
		1.45			1.45 - 1.95	
1.95			— . —		2.10 - 2.30	
		2.10			2.35 - 3.30	
2.30			Mid. fink. kis.		3.35 - 3.45	
		2.35				
3.30			— . —			
		3.35				
	3.45		qadimp.		3.45 - 4.95	
4.60			fink kis		5.85 - 6.60	
	4.90				7.50 - 7.60	
		5.85	Skiftig grst kl. m/klorit.		7.65 - 7.80	
6.60					8.25 - 10.-	
		7.50	ibl. noen svake striper m/imp. (2-3 m tykke strip)			
	7.60		dårlig imp.			
		7.65				
	7.80		Bedre imp.			
		8.25	Spor			
	10.-		svak.		10.15 - 10.25	
		10.15			10.35 - 10.60	
10.25			Cu-rik		10.75 - 10.80	
		10.35			11.00 - 11.05	
	10.60				11.20 - 11.45	
		10.75			12.15 - 12.60	
	10.80					
		11.00				
	11.05					
		11.20				
	11.45					
		12.15				
	12.60		god imp.			
		14.00	(el. 13.30?) skift. enk. spor.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-10-66 Sign: S. Retn.: Sted: Hull nr.: 897

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		7.50	Noen svake spor fra 4,60-			
			4.90.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-10-66 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 898

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		123				
	130		Svak. imp.		(1.20 - 1.30)?	
		10	(hjørnedag fra 5.50 - 5.80, 6.00 - 6.90, 7.00 - 7.20, 7.40 - 7.70, 8.00 - 8.80 og 9.00 - 9.60)		5 - 4	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-10-66 Sign: E. Retn.: Sted: Hull nr.: 899

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		7.40	Blandet kompakt st. og kvartsitt.		7.40 - 10.10	
10.10					11.55 - 12.50	
		11.55				
27.85			Meget Gr-mte fra 18.30 - 19.40			
		28.20	— — 20.05 - 21.50		12.50 - 16.00	
29.10						
		29.20			16.00 - 19.50	
	29.30					
		29.55			19.50 - 23.00	
29.95						
	30.30				23.00 - 26.50	
		30.40				
31.25					26.50 - 27.85	
		32.10	Stott.		28.30 - 29.10	
					29.30 - 29.30	
					29.55 - 3.30	
					30.40 - 31.25	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-10-66 Sign: E. Retn.: Sted: Hull nr.: 900

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		14.65	Bl.a. kamp. og skift grøt Mønk kvartsitt		14.65 - 15-15	
15.10					15.25 - 18.50	
		15.25				
	15.15					
		15.80			18.55 - 18.65	
18.50			fink. Cærik.		18.75 - 19.40	
		18.55			1940 - 22.00	
	18.65					
		18.75				
19.40			— —		22.00 - 24.00	
	19.80		— —		24.15 - 25.80	
19.90					26.20 - 26.60	
	20.80		Meget god imp.			
24.00						
		24.75				
25.80						
		26.20				
26.60			Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-10-66 Sign: E. Retn.: Sted: Hull nr.: 901

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		5,20	kvartsitth. og comp. grit.			
8.45					5.20 - 8.45	
		15.20	— " —			
	15.30					
		15.35				
15.70					15.20 - 15.30	
		15.90			15.35 - 15.70	
16.10					15.90 - 16.10	
		17.25			17.25 - 20.20	
	17.60					
20.20			Cu rik. kis med. grovk.			
	20.70				2020 - 2.70	
		20.75			20.75 - 23.80	
23.80			Noe grovk.			
		24.00				
24.35					24.00 - 24.35	
		24.65			24.65 - 24.95	
24.95					25.00 - 26.20	
		25.00				
26.20						
		29.90	Skift			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-10-66 Sign: [illegible], Retn.: Sted: Hull nr.: 902.

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		5.35'			5.35' - 5.85'	
9.60						
		9.65'				
12.65'			Fra 11.00 og ut meget Cuvrite Elatt.			
					2.85 - 9.65	
					9.65' - 12.65'	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

blad 1

Dato: 21-11-66 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 903

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	16		Som spor enkl svovelkyst. og			
		3.30	stripen opptil 2 m/m tykkelse			
	4.0		Som ovenfor		~~33-4~~	
		16.10				
	16.65		Grovkornet båndet imp. fattig?		16.60 - 16.65	
		1685			16.85 - 16.95	
	16.95		Som ovenfor		17,05 - 17,30	
		17.05			17,40 - 18.80	
	17.30		— —		18.90 - 19.60	
		1740			19.65 - 20.00	
	18.80		Grovle. noe bedre imp? noe Cu?			
		1890				
	19.60		Grovle. fattig imp.			
		19.65			20.25 - 20.40	
	20.00		Grovle		20.75 - 21.40	
		20.25	Noen spor		21.50 - 22.50	
	20.70		Grovle.		22.55 - 22.70	
		20.75	Spor		22.85 - 23.85	
	21.40		Grovle		24.50 - 24.70	
		2150	Spor			
	22.50		Noe fink. imp - el. midgrovk.			
		22.55				
	22.70					
		22.85	Spor.		25.35 - 25.50	
	23.85				26.20 - 27.30	
		24.50	Spor		27.40 - 30.40	
	24.70		〃			
		25.35	〃			
	25.50					
		26.20	Spor		30.40 - 31.40	
	27.30		Grovle. fattig imp		32.85 - 32.95	
		27.40	Klor. grsk.		33.05 - 33.20	
	31.40		Noe meget fink. rikere imp?		33.65 - 33.75	
		32.85	fattig ifm 30m.		33.95 - 34.20	
	32.95				34.60 - 34.80	
		33.05	Spor		34.80 - 36.80	
	33.21					
		33.65	Spor			
	33.75					
		33.95				
34,20			Forsatt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 21-11-66 Sign: E. Retn.: Sted: Hull nr.: 903

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		34.60	Sleifs. kl.sk.			
34.80						
	36.80					
		36.90			36.90 - 37.35	
	37.35				37.35 - 39.05	
37.60			M.d. grovk.		42.20 - 42.50	
	37.70				43.70 - 43.85	
38.90					44.05 - 44.20	
	39.05				45.75 - 45.95	
		42.20			46.15 - 46.60	
	42.50				49.30 - 49.35	
		43.70	Svake spor som krysst. og 2-3 mm tykke renner			
	43.85					
		44.05				
	44.20		Meget svake			
		45.75	Svake spor			
	45.95					
		46.15	Spor			
	46.60		Svake imp.			
		49.30	Noen bånd m/imp. 2-5 mm tykke			
	49.25					
		49.60	Slutt.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 21-11-66 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 904

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		17.00				
17.20			Grovk.		17.00 - 17.20	
		17.40			17.40 - 17.60	
	17.60				18.40 - 18.90	
		18.40	Svake spor		1890 - 20.50	
18.90						
	19.00					
23.00					20.50 - 23.00	
		24.00	Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 21-11-66 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 905

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
5,45'			Delvis Gurite		0,0 - 3,00	
		5.65				
	6.75'					
		11,00	Stuff lit spm fra 10,50-10,55'		3,00 - 5,45	
					5,55' - 5,75'	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 21-11-66 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 906

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		3.15				
	3.20		Svak		3.15 - 3.20	
		5.80			5.80 - 5.90	
	5.90		Meget svak		8.05 - 8.20	
		8.05	Med noen spor			
	8.20					
		11.00	Slutt. Svake spor hvyst.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 21-11-66 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 907

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
3.40			fink. Cu-rik?		0.0 - 3.00	
		4.65				
	4.70					
		4.95	Spor		3.00 - 3.40	
5.05					4.65 - 4.70	
		5.10			4.95 - 5.05	
	5.40				5.10 - 5.40	
		5.80	spor		5.80 - 5.85	
	5.85					
		35.0	Spor til 6.40 Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 21-11-66 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 908

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
2.05					0.0 – 2.05	
		3.00			3.00 - 3.05	
	3.05		Svake imp		3.35 - 3.40	
		3.35			3.50 - 3.55	
	3.40		Svake imp		6.80 - 6.95	
		3.50			8.00 - 8.15	
	3.55				11.00 - 11.90	
		6.80	Med noen svake spor		12.80 - 12.95	
	6.95		Svake imp		13.50 - 14.15	
		8.00	noen svake spor 2-3 mm bykv/rom.			
	8.15					
		~~13.50 SLUTT~~				
		11.00	Spor fra 10.60 - 11.00			
	11.90		Meget svake			
		12.80				
	12.95					
		13.50	Spor			
	14.15					
		15.50	Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 21-11-66 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 909

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		5.60	Glett Spor fra 0.70 -			
			0.90, - 1.60 - 1.65, 2.70.			
			2.80			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 21-11-66 Sign: E. Retn.: Sted: Hull nr.: 910

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
2.40			fink.		0.0 - 2.40	
		2.50	leirstein (rik) kloritig		2.50 - 2.90	
2.90						
		3.15	— · —			
	3.20				3.15 - 3.20	
		3.50				
5.15					3.50 - 5.15	
		5.45			5.45 - 6.10	
	5.85					
6.10						
		7.90				
	7.95				7.90 - 7.95	
		8.10			8.10 - 8.30	
	8.30				8.55 - 8.75	
		8.55			8.80 - 8.90	
	8.75				11.70 - 11.75	
		8.80	spor		12.40 - 12.45	
	8.90				12.65 - 12.70	
		11.70	Spor fra 9.10 - 9.40		13.20 - 13.35	
	11.75				15.90 - 16.05	
		12.40	Spor		16.40 - 16.55	
	12.45				16.65 - 17.90	
		12.65	spor		18.45 - 18.80	
	12.70				19.45 - 19.70	
		13.20	spor			
	13.35					
		15.90	spor			
	16.05					
		16.40	spor			
	16.55					
		16.65				
	17.00				21.20 - 22.20	
17.20						
	17.90					
		18.45	Gode spor 2-5 mm tykke rennen.			
18.80						
		19.45				
	19.70					
		21.20				
22.20						
		27.85	Stått m/bløtels noen svake spor.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-11-66 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 911

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	17.55					
		17.60				
	18.40		Meget Cu-rik imp.			
18.90					18.40 - 18.90	6
	19.25		Tildels med fine Cu-glimmere			
		19.60				
	19.80					
		19.90			18.90 - 19.25	
	20.20				19.60 - 19.80	
		20.25			19.90 - 20.20	7
	20.35				20.25 - 20.35	
21.45			Noe Zn-holdig?			
	31.65					
		21.70			20.35 - 21.45	8
	21.90		Strøk.			
		25.80	Fra 23.40 og ut er det et			
			meget høyt innhold av kvarts		21.45 - 21.65	
			med noen svake spor kun av den		21.70 - 21.90	
			mest magnetiske pi kun 1-2 mm			
			på ca 23.8 og meget svake			
			spor ca 24.40 - 50			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Blad 1

Dato: 25-11-66 Sign: E. Retn.: Sted: Hull nr.: 911

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	0.10				0.00 - 0.30	
0.30					1.40 - 4.10	1. prøve
		1.40	Meget mørk (kulflign) grönsk.			
2.95			Curilk mid finkr.			
	3.05					
4.00			Cu-rik mid finkr			
	4.10					
		4.65				
	4.75					
5.70			Curik mid finkr		4.65 - 5.70	2. prøve
		5.85			5.85 - 7.45	
7.45					7.70 - 7.95	
		7.20			8.20 - 8.40	3.
	7.95		god imp.		8.75 - 8.90	
		8.20	Meget kvartsholdig. grönst		9.00 - 9.95	
	8.40				10.10 - 10.80	
		8.75			11.80 - 11.95	
	8.90				12.10 - 12.15	
		9.00			12.45 - 13.00	
	9.95					
		10.10			13.10 - 13.70	4.
	10.80				13.70 - 14.20	
		11.80				
	11.95					
		12.10				
	12.15					
		12.45				
	13.00				14.90 - 15.00	
		13.10			15.40 - 15.50	
	13.70				15.60 - 16.50	
14.00					16.60 - 16.90	5
	14.70				16.90 - 16.95	
		14.90	Svake spor		16.95 - 17.55	
	15.00				17.60 - 18.40	
		15.40				
	15.50					
		15.60				
	16.50					
		16.60				
	16.90					
16.95			Meget Curik			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2-2-67 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 912

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove fra til	Anmerk.
	0.55				0.0 - 0.55	
		0.65			0.65 - 1.05	
	1.05		Svake.		1.30 - 1.55	1. prøve
		1.30			2.45 - 3.45	
	1.55		"		3.60 - 4.05	
		2.45	Svake spor igjen.		4.15 - 5.05	
	3.45		Svake			
		3.60	Noen spor her også			
	4.05		Meget grovk.			
		4.15				
	5.05		Meget tjern			
		5.25			5.25 - 5.50	
	5.50				5.80 - 7.25	2. prøve
		5.80			7.35 - 7.35	
	7.25		Tildels noe svake			
7.35			Meget grovk.			
	10.45					
		10.55			7.35 - 10.45	3. prøve
	11.25					
		11.40	Noen spor som svarelkryst.		10.55 - 11.25	
	12.20				11.40 - 12.20	
		12.45			12.45 - 12.50	4 prøve
	12.50				12.70 - 12.80	
		12.70	Noen 2-3 m/m impr.-bånd		12.85 - 12.95	
	12.80				13.15 - 15.30	
		12.85				
	12.95					
		13.15				
	15.10					
15.30						
		15.40			15.40 - 15.75	
	15.75				15.85 - 16.05	
		15.85			16.10 - 16.20	5. prøve
	16.05				16.25 - 16.55	
		16.10				
	16.20					
		16.25			16.55 - 17.75	6. prøve
	16.55					
17.75			Grovk.			
	18.55					
		18.65				

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Blad 2

Dato: 2-2-67 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 912

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve fra til	Anmerk.
	18.75				17.75 - 18.55	7. prøve
		18.85			18.65 - 18.75	
	20.40				18.85 - 20.40	
20.95			Meget grovk.			
		21.00			20.40 - 20.95	8 prøve
	21.35				21.35 - 21.45	
21.45			4		21.00 - 21.35	9. prøve
		21.75			21.75 - 21.95	
	21.95				22.00 - 22.15	
		22.00			22.40 - 23.20	
	22.15				23.40 - 24.20	
		22.40			24.55 - 25.10	10 prøve
	23.20				25.20 - 25.90	
		23.40			26.20 - 26.85	
	24.20					
		24.55				
	25.10				25.90 - 26.10	11. prøve
		25.20			26.85 - 28.10	
	25.90					
26.10			Grovk.			
		26.20			28.10 - 31.00	12. prøve
	26.85					
28.10			4 Noe Cu		31.00 - 33.20	13. prøve
	33.20		God imp.			
33.95			Grovk. Cu		33.20 - 33.95	14. prøve
	34.40					
37.35			Mid. fink.		33.95 - 34.40	15. prøve
	39.45		Meget god			
		39.80			34.40 - 37.35	16. prøve
	40.05					
48.90			Tildels Cu rik mid. grovk. noe Kvartsitt		37.35 - 39.45	17. prøve
		49.00			39.80 - 40.05	
	49.05					
		49.10	Slutt		40.05 - 42.95	18. prøve
					42.95 - 45.85	19. prøve
					45.85 - 48.90	20. prøve
					49.00 - 49.05	21. prøve

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2-2-67 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 913

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0.50			grovk.		0.0 - 0.50	
	1.20				1.20 - 1.65	1. prøve
1.65					2.10 - 2.90	
	2.10					
2.90					0.50 - 1.20	
	4.45				1.65 - 2.10	2. prøve
		15.00	Skift		2.90 - 4.45	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2-2-67 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 914

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve fra - til	Anmerk.
	9.80		Tildels meget svak		0.0 - 3.00	1. prøve
		10.10				
	11.55				3.00 - 6.40	2. prøve
		11.65				
	12.70				6.40 - 9.80	3 prøve
14.60			Grovk.			
		14.90	kvartsitt		10.10 - 11.55	4. prøve
	18.40		Bra imp.		11.65 - 12.70	
19.00			Mid. fink.			
	19.50		Mye kvartsitt		12.70 - 14.60	5. prøve
		20.00				
	20.45				14.90 - 18.40	6. prøve
		21.20	Enkelte spor			
	23.05				18.40 - 19.00	7. prøve
		23.30				
	24.30		Ligger som bånd 2-3 m/m		19.00 - 19.50	8. prøve
		24.75			20.00 - 20.45	
	25.45				21.20 - 23.05	
		26.50				
	27.45				23.30 - 24.30	9. prøve
		28.10			24.75 - 25.45	
	29.80				26.50 - 27.45	
		30.25				
	30.95		Svak		28.10 - 29.80	10. prøve
		31.15			30.25 - 30.95	
	31.80		Meget svak		31.15 - 31.80	
		32.80	Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2-2-67 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 915

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
	2.20				2.0 - 2.20	1. prøve
		2.50				
	3.05				2.50 - 3.05	2. prøve
		6.65			6.65 - 8.60	
	8.60		Svak			
9.30					8.60 - 9,30	3. prøve
	9.90		Slutt			
					9.30 - 9.90	4. prøve

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2-2-67 Sign: E. Retn.: Sted: Hull nr.: 916

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	2.20				0.0 - 2.20	1. prøve
2.75			Grovk.			
	3.50				2.20 - 2.75	2. prøve
3.65			Grovk.		3.50 - 3.65	
	4.25				2.75 - 3.50	
		4.60	Spor		3.65 - 4.25	3. prøve
	5.45				4.60 - 5.45	
5.85			Noe kvartsitt			
	6.40				5.75 - 5.85	4. prøve
		6.90				
	8.45				5.85 - 6.40	
		8.55			6.90 - 8.45	5. prøve
	9.25				8.55 - 9.25	
		9.35				
	12.60		Svak		9.35 - 12.60	6. prøve
		13.60				
	14.20		Svak		13.60 - 14.20	7. prøve
		18.20			18.20 - 18.40	
	18.40					
		18.80			18.80 - 19.80	8. prøve
19.80			Mid. fink Cu-rik?			
		21.20			21.20 - 21.35	
	21.35		Båndet		21.70 - 21.95	
		21.70			22.70 - 22.75	9. prøve
	21.95		"		26.00 - 26.80	
		22.70			27.40 - 27.80	
	22.75				28.30 - 28.90	
		26.00				
	≈		2640 kjerneb tap.			
	26.30					
		27.40				
	27.80		svak imp			
		28.30	Svake spor			
	28.90		Svak imp			
		30.00	Slutt Svake spor			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-5-67 Sign: Retn.: +90° Sted: 14V/22 Hull nr.: 917

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Spor og bånd impr (svake) 2-3%			
		↓	Svake } fra 0.75 - 3.50			
			Sand fra 12.10 - 15.70 (sporadisk)			
			el lit avgrøt og lit kvarts			
		15.70				
	15.95		grov lt. impr. svake.		15.70 - 15.95	1. prøve
		16.05			16.05 - 16.40	
	16.40		Meget svake impr.			
	17.30	↓	Grovt bånd (delvis) svake ? impr.		16.40 - 17.30	2. "
		17.70	Svake spor			
	18.05		Bånd impr.		17.70 - 18.05	3. "
		18.35	Svake spor			
	20.75		Bedre impr.?		18.35 - 20.75	4. "
		20.85	Spor			
	21.50				20.85 - 21.50	5. "
		21.65	Spor (svake)			
	22.45		Mere fink. impr. noe rikere?		21.65 - 22.45	6. "
		22.60				
	23.45		Helt svak		22.60 - 23.45	7. "
		24.95				
	26.30		"		24.95 - 26.30	8. "
		26.60	Spor			
	27.10		Bånd. fink. impr. bedre sisted.		26.60 - 27.10	9. "
		28.60	27.5 - 27.6 spor			
	28.85		Mid. grovt.		28.60 - 28.85	10. "
		28.95				
	33.10		Noe Cu kor?		28.95 - 33.10	11. "
		33.80				
	33.95		Svake impr. nermest spor		33.80 - 33.95	12. "
		34.10				
	37.35				34.10 - 37.35	13. "
		39.35	Med spor 37.45 - 37.85			
	39.90		Noe Cu		39.35 - 39.90	14. "
		40.10				
	40.50		"		40.10 - 40.50	15. "
		41.50	Spor helt til slutt mest i			
			bånd 2-3% - 5-6 m/m tykke			
			Fra 41.0 går grøt. nermere over			
			til klorit.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8/5-67 Sign: Ø. Retn.: Sted: Hull nr.: 918

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.75	grst. skift. svakt klorittisert			
	0.90		god imp.?		0.75 - 0.90	1. prøve
2.10			M.d. grønk.		0.90 - 2.10	2. — · —
	2.40				2.10 - 2.40	3. — · —
		2.65				
4.40			dårlig kis el. god imp.		2.65 - 4.40	4. — · —
	4.45				4.40 - 4.45	5. — · —
5.00					4.45 - 5.00	6. — · —
	5.15				5.00 - 5.15	7. — · —
		5.25	Talk og klorit			
	5.80		imp. iklor. og talk?		5.25 - 5.80	8. — · —
6.25					5.80 - 6.25	9. — · —
	6.45				6.25 - 6.45	10. — · —
8.15			Her er mere Cu? i kisen			
	~~8.20~~	8.20	klor. grst.		6.45 - 8.15	11. prøve
	8.40				8.20 - 8.40	12. — · —
9.50			iblandet bånd m/kvarts		8.40 - 9.50	13. — · —
	9.75		kan iakta kyser med Cu som			
10.10			ligger i talk-grst.		9.50 - 9.75	14. — · —
	11.20				9.75 - 10.10	15. — · —
		12.15	Slutt gr.berg. god del kjerne		10.10 - 11.20	16. — · —
			tap m.ll. 15-16m - noe tap m.ll.			
			16-17m og 17-18m.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8-8-67 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 919

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0.95					0.0 - 0.95	1. prøve
		2.60	Talkrik kloritt med spor ca 1.2-1.8		2.60-2.95	2. "
	2.95				3.40 - 4.45	3. "
		3.40				
	4.45		Noe svak båndet		4.45 - 7.05	4. prøve
7.05					7.05 - 7.35	5. "
	7.35				7.35 - 7.40	6. "
7.40					7.40 - 7.45	7. "
	7.45					
		7.60			7.60 - 7.80	8. "
	7.80				9.20 - 9.75	9. "
		9.20	Svake spor 9 - 9.2 Mot tykk bånd		9.85 - 9.95	10. "
	9.75		Svak imp.			
		9.85				
	9.95		— · —		10.40 - 11.30	11. "
		10.40	Svake spor		11.40 - 12.10	12. "
	11.30		— · — imp. båndet			
		11.40				
	12.10		— — — — — · —			
		12.30			12.30 - 13.20	13. prøve
	13.20		Meget svak båndet imp.			
		13.35				
	14.15		Spor.			
		15.00	Slutt gr.berg.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8-8-67 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 920

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
7.80			Gärrik? Fink, finstekorn		0.0 - 3.00	1. prøve
		7.90			3.00 - 6.00	2. "
	8.15		Svak		6.00 - 7.90	3. "
		8.40				
	8.70		Svak båndet imp.		7.90 - 8.15	4. "
		9.00			8.40 - 8.70	5. "
	9.25				9.00 - 9.25	6. "
		9.30				
	9.40		NB! kun ca 35 cm kjernetap m/l. Spor. 5 og 10 m opp til enstyltke bånd		9.30 - 9.40	7. prøve
		11.05			11.05 - 11.25	8. "
	11.25				11.70 - 11.80	9. "
		11.70	Svake spor som „stjerner"			
	11.80				13.50 - 13.60	10. "
		13.50	Sporadiske bånd m/m tykkelse			
	13.60					
		15	slutt —— " ——			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 6.-8.-67 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 921

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1.40			Midd. fink.		0.0 - 1.40	1. prøve
	2.00		Grå.		1.40 - 2.00	2. — · —
2.15					2.00 - 2.15	3 — · —
		2.20				
3.00	~~3.00~~				2.20 - 3.00	4. — ~ —
	3.25		m/fine Cu-klyser.		3.25 - 5.70	5. — · —
5.70					5.70 - 6.00	6. — · —
	6.00		Mindre god imp.		6.00 - 6.05	7. — · —
6.05						
	6.65				6.05 - 6.65	8. prøve
7.45					665 - 7.45	9. — · —
		7.60			7.60 - 7.70	10 — · —
	7.70					
		15.00	Stuff Spor fra 11.7 - 12.0, 12.5 - 12.9, 13.2 - 13.6, 13.7 - 15, ellers noe kvarts og kvartsitt i bl. massiv grst.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8-8-67 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 922

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
8.50			God del kjerne tap 0,5m		0.0 - 3.00	1. prøve
	8.65		på 1.m - 15 cm på 2.m og		3.00 - 6.00	2. --
		9.00	15 cm på 4.m.		6.00 - 8.50	3. --
	9.65					
		10.40			8.50 - 8.65	4. --
	10.60		Snak.		9.00 - 9.65	5. --
		11.20			10.40 - 10.60	6. --
	11.75					
		12.00			11.20 - 11.75	7. prøve
	12.10				12.00 - 12.10	8. "
		12.40			12.40 - 12.90	9. "
	12.90		Siste 20 cm meget snak			
		13.00				
	13.10		Meget snak		13.00 - 13.10	10. prøve
		14.90	Slutt med spor 14.50 og ut.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8-8-67 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 923

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
3.65			Fink.		0.0 - 3.65	1. prøve
	3.75		grovk. imp.		3.65 - 3.75	2. "
		7.50			7.50 - 7.75	3. "
	7.75					
		8.15	Sprr.		8.15 - 8.60	4. prøve
8.60	"				8.90 - 9.60	5. "
		8.90			9.60 - 10.95	6. "
	9.60					
10.95					11.05 - 12.25	7. "
		11.05			14.00 - 14.25	8. "
12.25					14.25 - 14.45	9. "
		14.00	Spor fra 13.0 - 13.1			
14.25						
	14.45		Meget svak imp			
		15.50	Slutt noen svake spor fra			
			14.80 og ut hullet			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8-8-67 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 924

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		19.00	Slutt gr.berg			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8-8-67 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 925

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		4.65	Massiv grst.		4.65 - 6.10	1. prøve
6.10			Fink.		8.55 - 10.50	2. "
		8.55			10.50 - 12.50	3. "
14.50					12.50 - 14.50	4. "
		15.70				
	16.10		Svak imp.		15.70 - 16.10	5. prøve
19.00			Meget fink.		16.10 - 19.00	6. "
		36.00	Slutt Mye kvartsitt - fra 34,0 og ut hullet noen spor som smale bånd 1-2 m/m og "stjerner" (Sporadiske)			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8-8-67 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 926

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	6.80		grov kv.		0.0 - 2.30	1. prøve
7.30			" "		2.30 - 4.60	2. "
	10.45		"		4.60 - 6.80	3. "
10.80			" m.d. grovk.			
	11.15		meget link.		6.80 - 7.30	4. "
13.45			"		7.30 - 10.45	5. "
	14.30		"		10.45 - 10.80	6. "
14.95						
		16.45			10.80 - 11.15	7. prøve
	16.75		Sicke 5 cm av jaspis		11.15 - 13.45	8. prøve
19.30			Noe kvartsitt		13.45 - 14.30	9. "
		19.85				
20.30					14.30 - 14.95	10. "
		20.60	Spor		16.45 - 16.75	11. "
21.80					16.75 - 19.30	12. "
		22.95	"			
23.55					19.85 - 20.30	13. "
		23.60			20.60 - 21.80	14. "
23.75					22.95 - 23.55	15. "
		23.85				
28.35					23.65 - 23.75	16. prøve
		29.35			23.85 - 26.85	17. "
	30.05		Noe svake.		26.85 - 28.35	18. "
		36.45	Spor som m/m bånd jevnt over hele			
	38.10		Svake		29.35 - 30.05	19. "
		44.30			36.45 - 38.10	20. "
	45.35		Svake		44.30 - 45.35	21. "
		47.00	Slutt siste del kjerneløp siste meter også forvitret imp. meget svake. (grovk.)			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-8-67 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 927

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.46			1.40 - 1.60	1. prøve
	1.60		Meget svak			
12.10					1.60 - 4.00	2. "
		17.10	Slutt			
					4.00 - 7.00	3. "
					7.00 - 10.00	4 "
					10.00 - 12.10	5. "

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-8-67 Sign: B. Retn.: Sted: Hull nr.: 928

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		13.30			13.30 - 13.95	1. prøve
13.95			Cu-rik ?			
		14.15			14.15 - 16.65	2. "
16.65			"			
		17.40	Slutt.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-8-87 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 929

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	0.20				0.0 - 0.20	1. prøve
7.75						
		10.00	Slutt		0.20 - 2.70	2. "
					2.70 - 5.20	3. "
					5.20 - 7.75	4. "

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-8-67 Sign: E. Retn.: Sted: Hull nr.: 930

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,70		9.20	Sluft		0.0 - 0.70	1. prøve

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-8-67 Sign: [signature] Retn.: Sted: Hull nr.: 931

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1,00					0,0-1,00	1. prøve
		13,30	Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-8-67 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 932

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.05	Myc kvarts			
1.55					1.05-1.55	1 prøve
		15.40	Slutt.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-8-67 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 933

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.10				
	0.20				0.10 - 0.20	1 prøve
		0.35				
0.45					0.35 - 0.45	2. "
	0.55					
0.65					0.45 - 0.55	3. "
		0.90				
	1.35				0.55 - 0.65	4. "
		2.40				
2.85					0.90 - 1.35	5 "
		3.25				
	3.60				2.40 - 2.85	6 "
		4.20	Spor			*
	4.40		Svale		3.25 - 3.60	7 "
		5.00	Slutt			
					4.20 - 4.40	8 "

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog Forlengelse av hull

Dato: 20-11-67 Sign: E. Retn.: Sted: Hull nr.: 933

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		9.10	Slutt i Ad noen m/mørk. bånd imp. 5.80 - 5.90 og fra 6 - 7 m bare sporadisk. 8.50 - 9.00 vist en blærealtig struktur på grsk. eller noen små lyse bånd her og der			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-8-67 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 934

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		5.0	gr. berg. best. av mye kvartsitt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25-8-67 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 935

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		~~0.85~~	kvarts.		0.15-0,90	1 prøve
90						
	105	~~to~~	Svale imp.		0.90-105	2 "
1.25						
		16.20	Slutt Svale spor som		102-1.25	3 "
			klyser 1-2cm² 11.5-12.2			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 20-11-67 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 936

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	6.50		Svake for det meste grafale.		0,0 - 1.50	1. prøve
		6.90			1.50 - 3,10	2. "
	7.95		Bedre imp. mye kvarts i it		3,10 - 3.95	3. "
		9.75	Spor fra 8.80 - 9.35		3.95 - 5,00	4. "
10.75			Meget grafit. kis m/ noe kvarts		5.00 - 6,50	5. "
		12.35	" masiv grafit.			
	19.20		Noe kjerne m/ en god del.		6.40 - 7.95	6. "
		20.15			9.75 - 10,75	7. "
	20.35				13.35 - 15.60	8. "
		21.25			15.60 - 17.20	9. "
	21.45				17.20 - 19,20	10. "
		22.65				
	23.30				20.15 - 20.35	11. "
		23,45			21.25 - 21.45	12. "
	24.00		Svake imp. mest som spor		22.65 - 23.30	13. prøve
		24.35				
	25.00				23.45 - 24.00	14. "
		25.45			24.35 - 25,00	15. "
	25.70				25,75 - 25,70	16. "
		28,00				
	28,50				28,00 - 28,50	17. "
		28,85			28,85 - 29,20	18. "
	29.20				44.10 - 45.00	19. "
		44,10	Noen svake spor fra 30.0 - 35,5 og 43,40 - 43.50			
	45,00				43.40 - 43.50	20. "
		47.50				

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 20-11-67 Sign: [signature] Retn.: Sted: Hull nr.: 937

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,15	Spor særlig 1.30-1.50		1.30 - 1.50	1. prøve
	2.45		god imp.		2.15 - 2.45	2. "
		3.60			3.60 - 3.65	3. "
	3.65					
		4.45			4.45 - 4.70	4. "
	4.70		Mest som spr		12.0 - 12.35	5. "
		12,0			12.35 - 13.80	6. "
	17.05		Noe kjevn svake, mest i bånd		13.80 - 13.85	7. "
		17.55			13.85 - 15.60	8. "
20.30			Fine.		15.50 - 17.05	9. "
		20.50	kvartsitt			
20.65			Noe mere grov k.		17.55 - 19.00	10. "
		20,70	kvartsitt		19.00 - 20.30	11. "
23.15					20.50 - 20.65	12. "
		28.05	Skiftegneist. 23.5 - 25.10 for-øvrig kompakt			
	28.20				20.70 - 23.15	13. "
		39.70	Slutt			
		(40,00)	iflg. borogg.		28.05 - 28.20	14 "

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 20-11-67 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 938

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		4.50	Spor - som tern. og smale bånd 2-3 mm tykk.			
4.70					4.50 - 4.70	1. prøve
		5.80	2 cm leis på 5.50 gl			
	6.15		grovk. med grb.		5.80 - 6.15	2. "
		13.60	Svake spor på 12.50 komp. grst. m/ kantet grovk. m/ Cu?			
	18.05		Partier som er tildels meget god.		13.60 - 15.80	3. "
		20.00			15.80 - 18.05	4. "
21.40			Mid. fink. Cu?			
		21.50			20.00 - 21.40	5. prøve
21.65						
		21.80	Noe kvartsit		21.50 - 21.65	6. "
	21.85					
		22.15	"		21.80 - 21.85	7. "
	22.25					
		22.30			22.15 - 22.25	8. "
23.40			Fink. Cu-rik sikt 40 cm?			
					22.30 - 23.40	9. "
		28.10	Slutt Spor som bånd mm tykke			
			på 23.55 - 23.65 og 24.30			
			- 24.40 På slutten noe			
			~~prøvete~~ grst. m epidot			
			her og der.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 3-1-68 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 939

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
40					0.0 - 0.4	1. prøve
		1.30				
18.20			god kis m/Cu		1,3 - 4,3	2. "
		13,40			4,3 - 7,3	3. "
13.45					7,3 - 10,3	4. "
		13,55			10.3 - 13.2	5. "
14.20						
	14.50				13.40 - 13.45	6. "
14.70					13.55 - 14.20	7. "
		16.60	enkelte svake spor		14.20 - 14.50	8 "
	17.65				14.50 - 14.70	9. "
		17.95				
19.70					16.60 - 17.65	10. "
		19.85			17.95 - 19.70	11. "
20.10					19.85 - 20.10	12. "
		27.20	Slutt grst. m/kvartsstriper			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 3-1-67 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 940

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1.05					0.0 - 1.05	1. prøve
		2.10				
13.10		~	god kis m/3cm kalkst. ca 2.50		2.10 - 5.10	2. "
	13.85		svak. imp i bånd		5.10 - 8.10	3. "
		14.25			8.10 - 11.10	4. "
15.60					11.10 - 13.10	5 "
		16.50				
	16.80				13.10 - 13.85	6. "
		17.60			14.25 - 15.60	7. "
	18.00				16.50 - 16.80	8. "
		18.60				
	18.90				17.60 - 18.00	9. "
		20.45	Mye kalk kvarts i stripen		18.60 - 18.90	10. "
21.80						
		22.45			20.45 - 21.80	11. "
23.50					22.45 - 23.50	12. "
	23.75	~	Mest som spr		23.50 - 23.75	13. "
		27.00	Slutt. noe kvarts itt på slutten			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 3-1-67 Sign: E. Retn.: Sted: Hull nr.: 941

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
6.30					0.00 - 3.15	1. prøve
		6.70			3.15 - 6.30	2. "
	8.0		Tildels god imp.			
		9.70			6.7 - 8.0	3. "
	15.35		Svak. mest i bånd		9.70 - 12.70	4. "
	15.95		Mest Zn.		12.70 - 15.35	5. "
		18.55			15.35 - 15.95	6. "
	18.65		mye kvarts			
		20.00	Sluft. } igrb. på sluften		18.55 - 18.65	7 "

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 16-1-68 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 942

Kis	Imp	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
6.95			Noe grovk.		0,0 - 3.50	1. prøve
		7.85	Noe skifrig grst.		3,50 - 6.95	2. "
9.10						
		9.30	Mid. fink.		7.85 - 9.10	3. "
13.40						
		14.15			9,30 - 11.30	4. "
	14.20		Svak imp.		11.30 - 13,40	5. "
		14,40				
	15,70		Svak, mest som spor sidst 3 cm		14.15 - 14,20	6. "
		20.20	Slutt. Med noen svake 3-4 m/m bånd spor som bånd 17 - 17,3 16.7 - 16.9		14.40 - 15.70	7. "

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 5-2-63 Sign: [illegible] Retn.: 45° Sted: 28#-63 Hull nr.: 943

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		4.80	Noe kvartsitt			
5.35			Cu-hold. fink. middelbånd 27.		4.80 - 5.35	1. prøve
		5.90	Iron svake spor 5.60			
9.60			fink. Noe mindre Cu?		5.90 - 7.90	2. "
		10.75'			7.90 - 9.60	3. "
10.85'						
		11.00			10.75 - 10.85	4. "
11.30					11.00 - 11.30	5. "
			Spor. 16.40 2-3cm tykk impr. går mere over i kvartsitt ca. 1/2 del av kvartsen (til 20) en ugjennom			
		24.80	hellespatt krystallin			
25.15'			fink. mod. god leir		24.80 - 25.15	6. prøve
		27.40	slutt. stiftet for kort?			
			Sterkt kloritisert grest.			
			på siste meteren.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 5-2-68 Sign: Retn.: +90° Sted: 25 6/63 Hull nr.: 944

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2.20	grsk.			
	2.80		Som spor og spredte m/m tykke bånd		2.20-2.80	1. prøve
		4.40				
	4.60		Som spor		4.40-4.60	2. "
		7.95	Spor og m/m tykke bånd 5.20-5.25; 6.50-6.53 og 6.70-7.20 analyse		6.70-7.20	3.
~~9.40~~					7.95-9.40	4. "
9.40		9.90	Meget god kis Cu		9.90-10.30	5. "
10.30						
		10.55			10.55-13.40	6. "
13.40			Cu holdig fink.			
		13.80			13.80-17.00	7. "
17.00			Noe mindre Cu ellers som før		17.00-17.25	8. "
	17.25					
		21.50	Slutt. 17-19m omtrent-lignende grsk. blærestruk. fra 19m og ut mest kvartsitt (mørke (vått?)) på slutten nesten ren kvarts m/epidot åren			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 29-2-68 Sign: E. Retn.: +90° Sted: 190/63 Hull nr.: 945

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		13,40	m/1cm tykk imp på 14 og 2cm imp. forøvrig massivgrønt.	nå 13,2	13,40 - 14,15	1. prøve
14,15			Fink. kis		15,45 - 15,75	2. "
		15,45			15,85 - 15,90	3. "
15,75			Mid. brakis			
		15,85			18,85 - 21,85	4. prøve
15,90			Cuprite ?		21,85 - 23,85	5. "
		18,85			23,85 - 25,50	6. "
25,50			Noegrønt. i.m. Mid. grønt.			
		26,80			26,80 - 27,15	7. prøve
27,15					27,20 - 29,80	8. "
		27,20			29,80 - 30,10	9. "
27,80			Mere Cuprite			
	30,10				30,35 - 30,90	10. prøve
		30,35			31,65 - 31,70	11. prøve
30,90			Mere fink. noe Cu		32,40 - 33,20	12. "
		31,65				
	31,70				33,20 - 34,40	13. prøve
		32,40			34,40 - 35,50	14. "
	33,20		Båndet impr.		36,00 - 36,20	15. "
34,40						
	35,50		Noe svakt m/bedre pi ca 35		36,35 - 36,45	16. prøve
		36,00			36,60 - 39,90	17. "
	36,20		God impr.		40,00 - 40,75	18. "
		36,35				
	36,45				40,75 - 41,40	19. prøve
		36,60			41,40 - 43,90	20. "
39,90			Fink.		43,90 - 46,90	21. "
		40,00				
	40,75		Meget svakt i bånd 2-3mm/4yds		46,90 - 49,90	22. prøve
41,40					50,00 - 50,40	23. "
	49,90		Svakt. mest i bånd 2-5mm tykke		50,75 - 51,40	24. "
		50,00				
	50,40		— " —		51,55 - 51,60	25. prøve
		50,25			51,75 - 51,85	26. "
	51,40		— " —		52,10 - 52,25	27. "
		51,55				
	51,60		— " —			
		51,75				
	51,85		— " —			
		52,10				
	52,25		Slutt meget svakt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 29-4-68 Sign: [illegible] Retn.: -90° Sted: 14/93 Hull nr.: 946

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			550 ca 5 cm magnetit			
			Spr. mindt 5 b m skift.			
			25° på 3 - 3.6 spr meget			
			grube, kvartsit 11,70 - 12,05			
			15°-90 - 16,60 skift. 1960			
			35° skift. 15° på 37,60			
			skift. 20° på 40,40			
		43	Slutt.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 29/4-63 Sign: AH Retn.: +90° Sted: 4V/93 Hull nr.: 947

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Gr. kvartsitt. 7.05 - 8.80			
			9.10 sparr. kvartsitt med			
			grader Gll magnetkis			
			18.- 19.50 FeS_2 på 10.20			
			Skift. 55°			
		2370	Slutt. slutter i kvartsitt			
			skift. 55°.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 28-3-68 Sign: EJ. Retn.: +90° Sted: 16B/63 Hull nr.: 948

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		18.25	Mye ep.dol ~~over 1. tom skarn~~ mere kvarts sam.m/qz.st. som en matrix		18,25-18.60	1. prøve
	18,60		Båndet impr. men god		21.20-21.70	2. "
		21.20			22.10-22.80	3. "
	21,70		Svak båndet 2-3 m/m T. perm. spor			
		22.10			22,80-23.90	4. "
	22.80		" " 1-2 m/m T "		24.15-24.60	5. "
	23.90		" " optil 3-4 m/m T noe bedre		25.50-25.65	6. "
		24.15				
	24.60		" Mest som spor i bånd.		25.85-27.20	7. prøve
		25.50			27.20-27.80	8. "
	25.65		Svak i bånd		27.80-27.90	9. "
		25.85				
	27.20		Bedre impr. Noe Cu rundt 26 m men rundt i bånd		27.90-28.45	10. "
27.80			Fink (1% Cu?)		28.45-29.70	11. "
	27.90		Svak mest som spor.		29.70-31.40	12. "
28.45			Noe grovere kis (middels)			
	29.70		Svak. ikke bånd		32.90-33.05	13. prøve
31.40			Fink. Noe Cu rundt 29.5, mere Zn?		33.20-35.00	14. "
		32.90	Komp. grst. m/noe kvarts.		35.10-37.35	15. "
33.05			Fink.			
		33.20			37.35-40.70	16. "
35.00			Fink Cu fat.?		40,70-43,70	17. "
		35.10			43,70-44.70	18. "
	37.35		Mid. impr. noe grov-			
43.70			Fink, noe mere Zn		44.70-46.60	19. prøve
	44.70		Brukbar impr. grovk.		46.60-48.60	20. "
	48.60		Svakere		48.60-49.65	21. "
	49.65		Bedre impr.			
		49.80			49.80-51.40	22. "
	51.40		Svak, mest som spor		51.40-52.60	23. "
	52.60		Noe bedre enn fram		53.10-53.20	24. "
		53.10				
	53.20		Svak			
		53.25	Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 29-4-68 Sign: [illegible] Retn.: +90° Sted: 13#/63 Hull nr.: 949

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Et svakt spor ca 15°, 5,30			
			sktr. 35° / 650 (30° sktr.)			
		15.40			15.40 - 18.10	1. prøve
	18.10		Meget mask. i m/hyppige årer av spritt.			
		22.80	m/spor på 22.10		22.80 - 24.45	2. "
	24.45		meget svake mask. m/hyppige årer i skiferdelen		27.45 - 29.80	3. "
		27.45	grb. m/enkelte spor			
	29.80		Fattig imp. men rikere enn foran		30.00 - 31.40	4. prøve
		30.-	Noen svake spor		32.90 - 33.70	5. "
	31.40		Fremdeles svake mask i m/hyppige bånd		36.00 - 36.65	6. "
		32.90	Svake spor i m/tynne bånd spredt			
	33.70		Meget svake			
		36.00				
	36.65		Svake imp. sktr. 20° 39			
		40.90			40.90 - 41.25	7. prøve
	41.25				41.25 - 41.45	8. "
	41.45				41.45 - 41.90	9. "
41.90			Bråkvarts kis. Litt Zn?			
		42.15	Spor svake		42.15 - 42.90	10. "
	42.90		Svake		43.40 - 43.55	11. "
		43.40	42.5° sktr. 15°			
	43.55				43.55 - 44.00	12. prøve
44.0					44.00 - 44.20	13. "
	44.20		Meget bedre bedre imp.		44.20 - 47.40	14. "
47.40			Noe Cu? Zn mye			
		49.05	Noe spor		49.05 - 50.00	15. "
	50.0		Svake båndet imp. slutt.			
			sktr. 25° på 47.80			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 18-6-68 Sign: E. Retn.: Sted: Hull nr.: 950

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2.20			2.20 - 3.30	1. prøve
3.30			Noe fattig?		3.85 - 3.90	2. "
		3.85			4.00 - 5.30	3. "
	3.90					
		4.00			7.40 - 7.50	4. prøve
	5.30		Svake imp. båndet 2-3 m/m		10.0 - 10.1	5. "
		7.40			10.4 - 11.0	6. "
	7.50					
		10.0			11.8 - 11.95	7. "
	10.1				13.85 - 14.75	8. "
		10.40			15.75 - 15.95	9. "
11.0						
		11.8				
	11.95					
		13.85				
14.75						
		15.75				
15.95			Slutt Noe grovk.-kis			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 18/6 -68 Sign: Lg. Retn.: Sted: Hull nr.: 951

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2.60				
	2.70				2.60 - 2.70	1. prøve
3.45					2.70 - 3.45	2. "
		3.60			3.60 - 3.95	3. "
3.95						
		17.40	Lg. fra. 14.2 - 15.0, fra 13.5 - 14.2 kloritt ellers grst. m noen epidot-åer. Noe kalkspatt siste 3-4 m.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 18-6-68 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 952

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		14.05			14,05-14.70	1. prøve
14,70					15,05-15.15	2. "
		15,05	Spor paca 14.50			
15,15						
		29.80	Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 5/12-68 Sign: AH. Retn.: + 90° Sted: 238 - 69 Hull nr.: 953

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,20	Gr.sten m/ tette årer og klynger av kvarts, enkelte py-korn.			
	0,40		Middels imp. i tett kvartsrik grammitte.			
		1,25	Massiv gr.sten (skf. 45g) Enkelte grove py-bånd ved 0,80-90 m			
4,40	~~4,80~~		Oppknust mot ligg, tett og finkornet py til 3,50. derefter gjennom py med sl og cpy i bånd.		1,25 - 3,50	1. prøve
					3,50 - 4,40	2. prøve
		4,65	Massiv gr.sten m/ smale pybånd skf. 46g		4,65-6,15	3. prøve
6,15			Tin kis noe mer kopperrik, enkelte sl-bånd. Skarpe kontakter til grsl.			
	6,30		Forkvartset gr.sten med cpy-klynger.			
		7,65	Massiv grønnsten, med årer av kvarts og kalk-spat, enkelte pykorn			
	8,45		Delvis sterk og svak imp av grove py-bånd i forkvartset gr.sten		8,00 - 8,30	4. prøve
		9,55	Gr.sten skifrig m/ klorittskikk, svak imp her og der, fo mot heng skf 47g			
	10,95		Rik imp av grov py i klorittisk grønnsten. Enkelte gr.stens bånd. Cpy med heng. Kjernetap? skf. 55g		9,55 - 10,25	5. prøve
					10,80 - 10,95	6. —"—
		14,70	Gr.sten, rikt bånd v 12,50			
	14,90		Fattig imp i gr.sten			
15,50			Kis m/ kvarts cpy i enkelte deler		14,90 - 15,50	7. prøve
		19,20	Massiv gr.sten, enkelte imp striper			
	20,00		Svak imp i gr.sten m/ kvarts og kalkspat striper.			
		22,35	Gr.sten med mandelsone 21,10 - 21,50 enkelte imp striper. Skf. 20g			
22,50			Cu-rik kis, noe Zn		22,35 - 22,50	8. prøve
		23,20	Gr.st.			
23,40			Tett kis		23,20 - 23,40	9 —"—
		26,40	Gr.sten forkvartset og impregnert med kalkspat enkelte fattige impbånd			
	27,15		Imp i forkvartset gr.sten		26,40 - 27,15	10 —"—
		28,75	Gr.sten, slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 5.12.68 Sign: AH Retn.: ÷90° Sted: 230 - 69 Hull nr.: 9524

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprøve	Anmerk.
2,20			Tett, fin kis, ikke så Cu-rik		0,0 - 2,20	1. prøve
		2,40	Massiv gr.sten m/magnetitt.			
4,15			Fin kis, først kvartsrik noe grov så finkornet med cpy Gr.sten med magnetitt- og magnetkis korn fra 3,05- 3,10		2,40 - 3,05	2. prøve
					3,10 - 4,15	3. —"—
	4,30		Rik imp		4,15 - 4,30	4. prøve
	5,20		Svak imp i gr.sten ikke bånd ved 4,80-4,90.			
		8,45	Gr.sten. delv massiv delv forkvartset Mandelstruk ved 6,0 og 7,0 m. Skj. 30° Enkelte imp bånd. Sterkt foldet.			
9,25			Cu-kis, delvis, bånd et enkelte klorittbånd skj 30°, magnetisk		8,45 - 9,25	5. prøve
	1	15,20	Gr.sten kalkspatt og kvartsårer og -spetter. Enkelte kis-spor. Ved 10,10 cpy-striper Slutt.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Nrk-1

Dato: 10.1.-69 Sign: AA Retn.: +90 Sted: 236/67 Hull nr.: 955

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Fin Cu-kis, massiv, enkelte			
1,40			kvartsbånd		0,0 - 1,40	1 prøve
	1,65		Fin imp mest py-xx, også cpy		1,40 - 1,65	2. —11—
	2,10		Imp. som bånd i kvartsrik b.art,		1,65 - 2,10	3. —11—
			Noe cpy			
	2,35		Fin imp gjennom hele bergarten		2,10 - 2,35	4. —11—
			som er grønnaktig			
4,30			Massiv, fin kis, tett noe cpy		2,35 - 4,30	5. —11—
			ujevnt fordelt, enkelte, kvartsrike partier			
		4,55	Grønsten, noe skifrig, m/kvartsbånd			
			spor av imp her også Skf. 22°			
5,30			Fin kis, oppsprukket, imp. kjerner, noe cpy		4,55 - 5,30	6. —11—
	5,55		Svake spor av py. i massiv grønsten			
		6,45	Massiv grønst. noen cc-årer og enkelte			
			1mm-tykke imp bånd. Skfr. 35°			
6,75			Båndet, fors kis m/cpy. py og noe kp.		6,45 - 6,75	7. —11—
			Skarpe grenser mot heng og ligg			
		7,40	Massiv grønst. svake spor av cc og kl.			
	7,60		Grønsten oppbåndet, delvis fin imp		7,40 - 7,60	8. —11—
8,00			Fin kis godt cpy-innhold. Finkornet		7,60 - 8,00	9. —11—
			med kvartsstriper			
	8,25		Båndet, noe cpy, kvarts 1cc skfr 25°		8,00 - 8,25	10 —11—
		8,50	Grønsten og kvartsåre			
9,05			Cu-rik kis, tett		8,50 - 9,05	11. —11—
	10,00		Godt imp. med cc-bånd enkelte		9,05 - 10,00	12. —11—
			tynne kloritt-stikk ved 9,20 skf 45°			
			Noe py i ren grønsten			
	10,25		Rik cu-imp, noe cal - i striper		10,00 - 10,25	13 —11—
	11,00		Svake spor i cc-rik grønsten		10,80 - 11,00	14 —11—
11,15			Grov, cu-rik kis		11,00 - 11,15	15 —11—
		11,80	Talkrik mørk grønn b.art.			
	14,00		Middels i striper og bånd enkelte		11,60 - 14,00	16. —11—
			rikere partier ved 12,10 og 13,60 Mye cpy			
14,30			Fin, noe grov cu-kis		14,00 - 14,30	17. —11—
	15,35		Fin cu-rik imp, mye kvarts		14,30 - 15,35	18. —11—
	17,60		Svakere, men i bånd av cm hl		15,35 - 17,60	19. —11—
			Accent rik, skf ved 17,30 18°			
	18,35		Svak i massiv kvartsrik grønsten		17,60 - 18,35	20. —11—
		21,75	Lys grågrønn massiv grønsten			
			med enkelte kvartsrike partier			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 10.1.-69 Sign: [illegible] Retn.: +90 Sted: 23E/67 Hull nr.: 955

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		22,80	Grønn grønnsten m/mandel egne av og til svake spor av py			
	25,00		Skiftende imp, like Bg i gr sten m/mandelegne litt høyere kjerd ved 24,80		22,80 - 25,00	21. prøve
	26,05		Svak imp som tynne bånd i noe skifrig gr.st.		25,00 - 26,05	22. -"-
		29,15	Grønske massiv gr.sten, noe skifrig av og til enkelte ganger spor av imp skf. ved 28,30 → 15° slutt		27,25 - 27,50	23. prøve

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 10.1.-69 Sign: [illegible] Retn.: -90 Sted: 23K/67 Hull nr.: 956

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,45			Cu-rik, middels kornet matrix		0,40 - 0,45	1. prøve
		0,60	Tett dioritt, oppknust grein			
		1,75	Kjernetap			
		2,20	Massiv grein, mørk m/cc-striper			
	2,35		Delvis svake imp, også cu-imp i gr.st.		2,20 - 2,35	2. prøve
		5,50	Massiv grein rik på kvartsittiske bånd			
			Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

ark 1.

Diaborlog

Dato: 23.1.69 Sign: AH Retn.: +90 Sted: 238/66 Hull nr.: 957

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1,05			Massiv, finkornet kis, mye cu. 2cm gr.st ved 0,45m		0,00 - 1,05	1. prøve
		1,22	Skifrig, kloritthrik gr.st. dekf 22°			
1,50			massiv kis, mindre cu		1,22 - 1,50	2. —"—
	1,70		Båndet kvartsrik gr.sten m/ cpy		1,50 - 1,70	3. —"—
2,70			massiv kis, dels meget cu-rik,		1,70 - 2,70	4. —"—
			langs gående kvartsårer og klyfter			
	3,00		svakere imp i klorittisk		2,70 - 3,00	5. —"—
		3,05	Skifrig gr.st. massiv dekf 30°			
3,70			Massiv og noe kvartsbåndet kis		3,05 - 3,70	6. —"—
		3,90	Skifr. gr.st			
	4,35		Svak imp i skf gr.sten.			
		4,80	Kjemetape.			
	5,10		Svak imp i bånd i gr.st.		3,90 - 5,10	7. —"—
		5,30	Massiv gr.sten			
	6,00		Svak imp. i lys gr.sten, skif		5,30 - 6,00	8. —"—
		6,45	Kalkrik gr.st. lys grønn, enkelte cpy-bånd.			
	7,05		meget svak, noen bånd rikere, kun cpy		6,45 - 7,05	9. —"—
7,50			Brå kisa noe kvartsbåndet, litt Cu		7,05 - 7,50	10. —"—
			Skarp hengvegg, konkordant			
		8,30	Massiv, lys grønn gr.sten med			
			kvart +cc. Enkelte kis bånd			
	8,45		svak imp i klorittisk gr.st		8,30 - 8,45	11. —"—
9,00			Kis med noe kvarts, skarp hengvegg		8,45 - 9,00	12. —"—
	9,35		Svak i gr.sten, cpy		9,00 - 9,35	13. —"—
12,55			Cu-rik, dels. middelskornet med cpy		9,35 - 12,55	14. —"—
			Blir rikere mot heng. Helt i heng			
			er det grsten. som er rikt impr av cpy			
	12,00		middels, med rike cpy-partier i		11,55 - 12,00	15. —"—
			mørk gr.st. m/kvarts og cc-årer			
	12,75		Svært rikt med enkelte kompakte bånd		12,00 - 12,75	16. —"—
15,50			Meget rik kis. Et par gr.st bånd		12,75 - 15,50	17. —"—
			og kvartsstriper hvor det finnes cpy			
			Sl e smale bånd ved, 13,60, 13,70, 15,15			
	17,65		Svak men enkelte smale og rike		15,50 - 17,65	18. —"—
			partier ved 16,85 rikt cpy-bånd			
		20,50	lys gr.sten, med klorittiske partier			
			Enkelte svake imp bånd skf ved 19,70-75			
			Mot slutten, kvartsårer og med talk?			
		21,65	Noe mørkere men vekslet med lys			
			bånding. Enkelte feltspat forekomst.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2.

Dato: 23.1.69 Sign: AH Retn.: +90° Sted: 2385/65 Hull nr.: 957

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	23,65		Skifr. grønnsten m/svak py-imp		21,65 - 23,65	19. prøve
			Noen partier med mandel struktur.			
	24,75		Muddels m/ rikere partier av m/epy		23,65 - 24,75	20. — " —
		25,15	Mørk massiv gr.sten.			
		25,95	Mere skifrig av karakter.			
	26,20		i noe massiv gr.sten som		25,95 - 26,20	21. — " —
			tidligere bånd, py lite epy			
			Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 10.1 - 69 Sign: AH Retn.: ÷ 90° Sted: 23K/65 Hull nr.: 958

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,30			Fin kis, Hidels ren cpy me kvarts		0,00 - 0,30	1. prøve
	0,65		Svak, men cu-imp i kvartsrik grønnmasse		0,30 - 0,65	2. prøve
		3,10	Mørk, massiv gr.sten m/mandelbygn			
	3,30		Bundet imp i lysere gr.sten		3,10 - 3,20	3. -"-
		6,60	Bundet gr.sten med spor mot slutten; ved 6,35 storre kvartsbygn			
			Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

ark 1

Dato: 23.1.69 Sign: H Retn.: +90° Sted: 165/31 Hull nr.: 959

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	2,00		Middels imp. Py i bånd i lysere grøst, Der der er kvartsrike er py-båndene bredere. Skj 0,90m = 119		0,00 - 2,00	1. prøve
	5,00		Rikere, men stedv mye cpy. Enkelte mandelformer i rennende grønnsk partier. Grensen mellom 4,45° og 5,00m		2,00 - 5,00	2. -"-
5,25			Mere massiv og noe cpy, kvartsrik		5,00 - 5,25°	3. -"-
	5,55		Sterke, i grøst skifer grov py		5,25 - 5,55	4. -"-
7,50			Dels massiv, men grov rikere på cpy Enkelte grønstbånd 6,20 og 6,85° m.	cpy	5,55 - 7,50	5. -"-
	8,10		Rik, i kvarts-klorittskifer. Rikt på kvarts i linser og uregelmessige strenger		7,50 - 8,10	6. -"-
11,25			Massiv middelskornet. Cpy-rik i spredte partier. Kvartsbåndet, mellom, mest massiv mot hengen Som er skarp og konkordant		8.10 - 11,25°	7. -"-
		14.00	Lys grønn grøst skifer ved ligg og massiv oppover. Enkelte py-korn og diskordante kvarts-bånd. Ved 14, skj 229.			
	14,40		Middels til rik imp som bånd i kvartsbåndet grønsten, kis konsentrert i kvartsrike partier		14.00 - 14.40	8. prøve
	15,10		Mørk grønsten, svak imp. massiv med mandelstrukturer		14.40 - 15,10	9. -"-
16,75			Massiv, men grov, kvartsrikere partier, svært like cpy		15,10 - 16,75	10. -"-
		17,25	Lys grønn, massiv grøst.			
	17,70		Rik, bandet imp. mye kvarts like cpy		17,25 - 17,70	11. -"-
18,55			Massiv, grov py-kis		17,70 - 18,55	12. -"-
		19.20.	Uten imp, massiv grøst.			
19,40			Massiv py.-kis		19.20 - 19.40	13. -"-
		20,25	Grønn grøst med klorit-skikk og skjønder-kvarts			
21,20			Båndet py-malm, massiv		20,25 - 21,20	14. -"-
		21,25	klorittrik grøst.			
27,50			Massiv og tett, finkornet malm		21,25 - 25,00	15. -"-

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 23.1.69 Sign: AH Retn.: +90° Sted: 765/31 Hull nr.: 959

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Lange kjerner. Enkelte sekundær diskordante cpy-bånd sammen med kvarts. Ved 28,10, tette kvartsbånd		25,00 - 27,95	16. prøve.
		27,95	Massiv lys grønn rik på feltspat korn. Noen smale cpy-bånd			
	28,65		Middels imp i lys massiv grønn. SLUTT.		27,95 - 28,65	17. — " —

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1

Dato: 24.2.69 Sign: AH Retn.: + 90° Sted: 345/48 Hull nr.: 960

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,75			Massiv kis, meget oppsprukket og delt langs kjernene. Stikk belagt med cc. Malmen kvartsrik, blandet grov og middelskornet. Bundet med cpy-rike bånd, kanskje også Zn		0,00 - 0,75	1. prøve
	1,30		Mørk klorittisk gr.sten svak imp i flekker og tynne bånd Py og også cpy-flekker		0,75 — 1,30	2. prøve
		1,85	mørk klorittisk gr.st svært skifrig og oppknust, glinsende, meg svak imp.			
2,30			Massiv, ganske tett kis m/kvarts noe cpy		1,85 - 2,30	3. prøve
		2,50	Oppknust kloritt skifer			
2,60			Tett kis som over.		2,50 - 2,60	4. — " —
		4,85	Meget skifrig klorit skifer. I tynt bånd av mer massiv bergart rik på kvarts og klorit. Vekslende rik og svak imp			
	5,10		Rik py-impr med store kvarts klyser		4,85 - 5,10	5. — " —
	6,15		Meget rik imp, resten kis. Massiv i enkelte tynne bånd. Rik på kvarts og bergart i tynne bånd som også er imp. Lite cpy.		5,10 - 6,15	6. — " —
7,60			Massiv til dels meget tett kis, neppe storlig cpy. Mye kvarts.		6,15 - 7,60	7 — " —
		8,20	Kloritt skifer, tynnskifret meget svak py-imp			
	8,80		samme kloritt skifer, ikke så tynnskifret, svak imp		8,20 - 8,80	8. — " —
	10,20		Mørk gr.sten, svak skifrighet ca 10°, med små lyse spetter og større kvarts klyser Meget svak imp			
	12,40		mørk grønnsten, dels skifrig dels noe mer massiv. Vekslende klorit mengde. Imp veksler fra meget svak til svak.		10,20 - 10,80	9. — " —
					11,00 - 11,40	10 — " —
					11,80 - 12,40	11. — " —
		15,65	Grønn gr.sten i svak skifrig =10° Enkelte tynne py-bånd Enkelte kvartsårer			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 24.2.69 Sign: AT Retn.: +90° Sted: 31Ø/45 Hull nr.: 960

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	16,30		Svak py-imp i gr.sten, skiferig		15,65 - 16,30	12. prøve
	17,00		Noe sterkere py-imp — " —		16,30 - 17,00	13. — " —
	17,65		Svak imp — " — — " —		17,00 - 17,65	14. — " —
		18,40	mørk grønn gr.sten skiferig med kvartsspeiler og noen linser			
	18,90		Et ganske sikt bånd, i grønn gr.sten, skiferig ellers svake imp		18,40 - 18,90	15. — " —
		20,00	Svakt skiferig grønn gr.sten, enkelte kvartsspeiler, og meget lys og svak py-imp			
	24,00		Skiferig mørk gr.sten, normalt klorittskifer Imp bånd med grønn mellomsom		23,65 - 24,00	16. — " —
	28,00		Klorittis grønnsten, mørk imp også noe spy. Sterkt kloritisert Skifer i imp noe sterk		24,45 - 25,60 26,00 - 28,00	17. — " — 18. — " —
			Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1

Dato: 21.5.69 Sign: AT Retn.: +85°V Sted: 2356/46 Hull nr.: 961

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1,15			Grov, massiv og tett kis mulig rik i Cu. Virker knadd og har tynne stripper med kloritt		0,00 – 1,15	1. prøve
		1,65	Lys, grønn meget skifrig gr.st. Lijse min er markert			
2,10			Grov kis som ovenfor. Har to bergarts bånd ved 1,70 og 1,85 m begg ca 3 cm	NB	1,65 – 2,10	2. prøve
	~~2,95~~	2,90	Grønn meget skifrig gr.st. I kontakt med kis. Har den en meg svak imp av cpy.			
	3,15		samme bergart som over men imp har økt noe		2,95 - 3,15	3. — " —
		7,60	Svakt skifrig gr.st grønn, enkelte regrette kalkspatstriper			
	8,00		Samme bergart, men med ganske svak imp		7,60 - 8,00	4. — " —
		12,75	Svakt skifrig grønn, gr.sten Lange kjerner Skj V/10,30 - 16°			
	13,00		I samme bergart, noen kvarts-bånd. svak imp noe cpy		12,75 - 13,00	5. — " —
		15,45	Svakt skifrig gr.sten. noen kvartsblærer.			
	15,65		Svak imp i samme bergart		15,45 - 15,65	6. — " —
		15,80	Skifrig gr.st.			
	15,95		Ganske rik imp		15,80 - 15,95	7. — " —
		16,85	Skifrig grønn. gr.st			
	17,05		Svak cpy-imp		16,85 - 17,05	8 — " —
		17,35	Samme skifrige gr.sten.			
	~~21,05~~ 20,10		Imp, middels, i enkelte partier ganske cpy rik. Som bånding med noe kvarts		17,35 - ~~21,15~~ 20,00 / 20,00 - 21,15	9. — " — / 10. — " —
22,40			Dels helt massiv kis, middels kornet Partivis noe cpy.		21,15 - 22,40	11. — " —
		22,70	Skifrig gr.st			
25,60			Massiv, litt grov, en del kvartsbånding fattig på cpy		22,70 - 25,60	12. — " —
		25,80	Svakt skifrig gr.sten.			
	26,30		Svak imp		25,80 - 26,30	13. — " —

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 21.5.69 Sign: ~~at~~ Retn.: +85°V Sted: 2350/46 Hull nr.: 961

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		26,60	Svakt, skifrig gr st.			
	26,85		Noe rik imp		26.60 - 26,85	14. prøve
		27,85	Skifrig, grønn gr st. Uten forurensninger av noe slag.			
	35,15		Varierende imp, men oftest gjennom svak.		27.85 - 30,70	15 — " —
					30,70 - 31,35	16 — " —
					31,35 - 31,70	17 — " —
	37,00	~~37,00~~	Noe lysen grønn gr.st svakt skifrig. Uregelmessig spredte små cpy-klynger. Meget fattig		31,70 - 34,00	18 — " —
					34,00 - 35,15	19 — " —
		37,15	lys grønn gr st. SLUTT.		35,15 - 37,00	20 — " —

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 21.5 61 Sign: AH Retn.: +90° Sted: 9V/25 Hull nr.: 962

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,60	Noe skifrig, grønn grst, noe oppsprukket			
	0.95		Rik imp i en kvartsrik grunnmasse meget tett, stripet, ripper meget Cu.		0,60 - 0,95	1 prøve
		~~1,15~~	Tynne kloritt-lag helt i heng			
		1,15	Grønn, grønnsten, noe skifrig Spaltet py-berget. mere kloritt-rik mot heng			
4.90			meget tett, ikke helt massiv, kvartsrik grunnmasse, tydelig båndet. Enkelte deler rike på mt og lyse kvarts bånd forekommer. Cpy ikke i stor mengde kornetje noe zn - 10 cm kjernetap mellom 1 og 2 m Ved 1,80 m : skj - 22°		1,10 - 3,00 3,00 - 4,90	2 prøve 3. — " —
		6,70	Grønn. grsten. Noe mer skifrig ca 20° Enkelte kvartsbrever Noe oppsprukket i partier. Enkelte smale imp striper Grønn grst stedvis meget kloritisk.			
		8,10	Gjennomskjæres av mektige kvarts, epidot og kloritt bånd.			
	9.10		Grønn massiv grst med meget svake imp hele veien			
		10,00	Mørk grå/blå kvarts/epidot-berget. svært tett Nesten hornfels aktig. Kjernetap ca 50 cm mellom 9 og 10 m SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 21.5 65 Sign: AH Retn.: ÷ 90° Sted: 98/25 Hull nr.: 963

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		1,75	Mørk grønn, gr st svakt skifrig, stedvis smale kvartsbånd. Enkelte kalkfyll og tynne lysp bånd Cpy. Partivis har gr.st mandelegrus. Kjernetap ca 70cm,			
3,40			Massiv, ganske hett kis, noe Cpy. Utpreget båndlag med kvartsrike lag. Meget magnetisk i det mellerste parti hvor man finner en hett kluse med mb Skarp overgang i liggl. Cpy-rik hvilt i liggl.		1,25 – 3,40	1. prøve
		4,00	Mørk, meget skifrig gr.st.			
		5,45	Massiv, nesten grovkornet lys grønn gr st større kvartskluser. Tynne skifrige bånd med klorit.			
		6,25	Grønn, marmo gr st.			
		5.00	Grønn. skifrig gr.st. Enkelte kalkfyll lysp bånd			
		900	Grønn skifrig gr.st. SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8.10-69 Sign: At Retn.: +90° Sted: 10V/30 Hull nr.: 964

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	3.0		Fremm. mørkegrå glimmerskifer. Enkelte større kr. klynger. Hele veien en meget svak py-imp, men også enkelte cpy-nåler		2.0 - 3.0	1. prøve
		4.55	Grøt. med vekslende mørkere og lysere lam. diskordante varian.			
	5.85		Samme bergart, men svak imp av py, enkelte cpy		4,55 - 5,85	2 — " —
6.00			Mørkere py-rikere, mid. kornet		5.85 - 6,00	3 — " —
	6,35		Bergarten grønn grøt. noe skifrig med beinett py-imp		6,00 - 6,35	4. — " —
		7,23	Vekslende lys/mørkelag skifrig skj. ved 6.00 - 20°			
	7,33		Sterk imp i magnetisk og diamagnetisk lamell. py		7,23 - 7,33	5 — " —
		12.40	Svakt skifrig grøt. bergart fører i andesittisk type og opoptr over lit grønn sandig grøt. Noen g-bånd her og der. Meget svak imp i partier.		12,40 - 13,00	6. — " —
	13.00		Imp. svak og båndet i en meget skifrig og kloritrik bergart			
	13,50		Her ikke bergarten talkholdig, er meget glatt og fører svak py-imp	NB		
		15,90	Vandig grønn grøt. Enkelte fylte blærerom og noen lys/mørk vekslinger, men ikke vesentlig Py-bånd her og der i mm-skala			
16.00			Samme svake py-malm men py synes også å ligge på skj-plan av kloritt		15,90 - 16,00	7 — " —
	16.60		Meget sterk imp hvor kloritt (også talk) forekommer mot bergen		16.00 - 16.60	8 — " —
		20,75	Grøt. noe skj. vekslende lys/mørk men mest kloritt-rik. Enkelte små mandler spredt hele veien. Lit kis-imp nå og da som også py		19.00 - 19,65	9. — " —
21.20			Mørkere noe finkornet kis med noe cpy mye kvarts i den		20,75 - 21,20	10. — " —

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 8.10-69 Sign: A Retn.: +90° Sted: 10V/30 Hull nr.: 964

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	21,45		Middels pyrimp i bånn og klyser i en klorittisk skf lengsrt.		21,20 - 21,45	11 prøver
23,63			massiv finkornet py-kis, mye oppsprukket, med langsgående sprekker fylt med klorit, mye magn. mot sidegg. Finkornet og stripet mot heng. Gry finere kone. rundt q-felt.		21,45 - 23,63	12 — " —
		28,55	Hovedsk grønn massiv grst. Enkelte mørellom sprekk hele veien Noe skifring ved malmen mgt. soak py-imp over alt. SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 8.10 -69 Sign: A.H. Retn.: +90 Sted: 315/40 Hull nr.: 965

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		22.60	Skf. klorittisk gnt. gneisbergart homogen hele veien.			
		24.00	Grønn gnt. mer massiv. En meget svak py imp begynner i sprekk.			
	25,35		Samme bergart, men imp har økt på. Likevel svak		24.00 - 25,35	12. prøve
		26.00	kjernetap			
	28,25		Samme type imp som ovenfor men bergarten er her mere talkrik		26.00 - 27,70	13. prøve.
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1

Dato: 8.10 - 69 Sign: H Retn.: +90° Sted: 318/40 Hull nr.: ~~2[illegible]~~ 965

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprøve	Anmerk.
		1,85	Noe skf. svart kloritisk gr.sten.			
		2,45	Andesitt med q-porfyroblaster			
	3,62		Grønn gr.st. meget massiv og kompakt. Enkelte store q-flekker			
	3,70		Py-imp med fine q		3,62 - 3,70	1. prøve
		7,20	Massiv grønn grønnst. Noe skjf. Enkelte striper vekslende lys/mørk mot bunn noe mer skifrig			
		12,00	Meget skf. og kloritrike gr.sten. Enkelte striper noe rike i imp. Tett med mørkere. Ved 9,50 og nedover blir det større q- og cc-årer.		8,05 - 8,50	2. -"-
			Enkelte partier rike på imp også med cpy		10,60 - 10,75	3. -"-
					11,75 - 11,80	4 -"-
12,35			Massiv, men oppknust py-kis, men også endel cpy, cc-sprekker		12,00 - 12,35	5. -"-
		13,45	Kjernetap.			
14,00			Massiv kis, samme type som ovenfor		13,45 - 14,00	6. -"-
		15,25	Ren meget kloritrike og skf. gr.sten med mange q-cc-årer. Noe, men meget svakt imp.			
16,25			Massiv fin py-kis med noe cpy, endel q-knusing i kis oppknust.		15,75 - 16,25	7. -"-
		16,55	Mørk grønn talkskifer meget skifrig.	NB		
16,98			Bandet kis med rike zn-bånd store cpy-klynger og q-årer		16,55 - 16,98	8. -"-
		17,25	Gr.grønt skifrig skf ved 17,0 = 32°			
17,40			Massiv kis samme type som over		17,25 - 17,40	9. -"-
		18,38	Grønn gr.sten, noe skf, men ellers kompakt, enkelte py-kuber			
19,85			Bandet fin kis m/ del cpy. Mørkere og mektig mt banding spesielt fylt med kvartsrike bånd		18,38 - 19,85	10. -"-
	20,10		Varierende imp, hvor deler py utgjør mye og mi- en god del		19,85 - 20,10	11. -"-

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8·10 - 69 Sign: A H Retn.: +90 Sted: 2825/40 Hull nr.: 966

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,85	Grønn. skf. grønnsten, gitmet fattig imp.			
	3,50		I samme bergart en fattig py imp. spredt utover		2,85 - 3,50	1. prøve.
7,00			Massiv finkis med god cpy. Lite gangmineraler bortsett fra kvarts. Cpy samler seg ofte i store klynger		3,50 - 5,50	2. — " —
					5,50 - 7,00	3 — " —
9,65			Herfra blir kis cpy-fattigere men er fremdeles meget mass. noe mer tett nå.		7,00 - 9,65	4. — " —
		10,00	Kjernetap			
11,05			Tettet cpy-fattig kis		10,00 - 11,05	5. — " —
		12,00	Kjernetap			
12,55			Noe grovere Cu-fattig oppkn.		12,00 - 12,55	6. — " —
		13,00	Kjernetap.			
17,45			Tett massiv Cu-fattig oppkn.		13,00 - 15,00	7. — " —
		18,25	Kjernetap		15,00 - 17,45	8. — " —
23,00			massiv, tett enkelte grovere korn, Cu-fattig, meget oppknust, men blir fastere rund 22 m. Kanskje noe mere cpy mot heng.		18,20 - 20,50	9. — " —
					20,50 - 23,00	10. — " —
		24,30	Granitt massiv grønn. gr.st. med noen g- og ce årer			
25,20			Granitt tett finkis med enkel cpy. Ved stor kvarts klynge er mye cpy samlet. Enkelte grove py-krystaller Hullet slutter i kis			
			SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25.11-69 Sign: AH- Retn.: +90° Sted: RK/25 Hull nr.: 967

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		3,85	Grønn grøt svakt skifrig m/ krusninger på skf plan, meget homogen. Kvarts-blyser nå og da Til mikro fra 1,25 m. Grønske klorittrik	NB		
		6,35	Grønn grøt massiv og meget homogen rekn innesluttn. Til slip fra 4,30 – Svak antydning til vekslinq lysere/mørkere mat.	NB.		
		7,40	Igjen mere skf og klorittrik skf lite definert. Mere kaotisk holdig. Men mest mot hittil slip 6,55 m	NB		
			Meget svake py-imp			
	9,70		Middels svak imp av py- i bånd og spredte korn i bergart. Mere q og cc. Enkelte steder mere konsentrert.		7.40 - 9,70 ✓	1. prøve
	10,55		Svakere py-imp i skf grøt.		9,70 - 10,55 ✓	2. –"–
	12,30		Ujevn imp av fandet py- i skf grøt. Tett i tett med mørkere		10,55 - 12,30 ✓	3. –"–
	12,60		Riken imp i samme bergart		12,30 - 12,60.	4. –"–
	15,50		Ujevn men stadig mikre py-imp av ontil kaotisk py-båndet		1260 - 15,50 ✓	5 –"–
	17,30		Samme som over		15,50 - 17,30 ✓	6. –"–
18,00			Grovkornet py-kis		17,30 - 18,00 ✓	7 –"–
	19,30		Igjen vekslende py-imp med lo an bånd som kan være massive		18,00 - 19,30 ✓	8. –"–
19,70			massiv grov py-kis		19,30 - 19,70 ✓	9 –"–
	20,45		Imp med vekslende fattige grøt bånd og riken kis bånd massiv eller rik imp av grov py.		19,70 - 20,45	10. –"–
20,90					20,45 - 20,90	11. –"–
	24,00		Ujevn imp med fattige og rike bånd		20,90 - 24,00	12. –"–
	27,00		Det samme		24,00 - 27,00	13. –"–
	28,80		Det samme		27,00 - 28,80	14 –"–
29,40			Massiv py-malm		28,80 - 29,40	15 –"–

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 25.11.-69 Sign: A Retn.: +90° Sted: 128/25 Hull nr.: 967

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	29,80		Svake imp i kvartsrik gr.st		29,40 - 29,80	16 prøve
30,35			Massiv grov py-malm med noe kvarts		29,80 - 30,35	17 —"—
	31,00		Svakere py-imp i skj kvartsrik gr.st		30,35 - 31,00	18. —"—
	32,85		Ganske rik imp		31,30 - 32,85	19 —"—
33,55			Massiv py-kis ikke så grov lenger Endel kv mot heng		32,85 - 33,55	20. —"—
	36,45		Gr.sten grønn skj med fattig py-båndning Skj 4/34m = 14%		33,55 - 36,45	21. —"—
38,00			Massiv, middels grov Cu-fattig py-kis Fører en god del kvarts i klyster.		36,45 - 38,00	22 —"—
40,40			Det samme, enda mere massiv og mer homogen		38,00 - 40,40	23 —"—
	42,00		Meget svak py-imp i gr.st. skj		40,40 - 42,00	24. —"—
	42,45		Svak py-imp med rikt qzy-bånd i svært kvartsrik bergart		42,00 - 42,45	25. —"—
			SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 12.11.-69 Sign: AL Retn.: ÷90 Sted: 258/67 Hull nr.: 968

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	0,20		Svak imp av båndet py i noe skifrig gr.st grønn i farge		0,00 - 0,20	1. prøve.
		0,77	Grønn gr.st. ganske massiv med noen kvartsårer og cc-aure			
1,72			Meget massiv og fin kis brekkert med cpy noe mere i kvarts (innhl 1,36). Gangart er enkelte kvartsflekker glassaktig Ganske finkornet. Skarp grense mot kvarts skf.: 5° med et tynt klorittisk skikt. Skarp mot ligg uten kloritt skf. 20°.		0,77 - 1,72	2. —»—
		2,00	Gr.st noe mørkere grønn noe skifring og uregelm aure med cc			
		6,40	Grønn massiv gr.st. med store mandler av qz cc			
		7,00	Andesitt, massiv. blågrønn, mye mindre mandler. typelig mere kvarts			
		7,40	Gr.st som over			
		7,50	Andesitt, som over.			
		8,30	Gr.sten, massiv med enkelte mindre mandler			
			SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 12.11.-69 Sign: AT Retn.: 258/67 Sted: T90 Hull nr.: 969

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,43			Massiv finkornet kis, dog med lite cpy. Skarp klorittisk grense mot berg		0,00 - 0,43 ✓	1. prøve
		1,75	Kalkrik grønsten, lys grønn med cc-årer. T.l mikro v/0,80	NB.		
		1,85	Kvartsrikt parti med kloritt og tegn til py-imp			
	4,70		Svake imp av py i bånd opptoning hvor det er mye kvarts. Bergart er grønnsten skifrig svakt m/små mandler.		1,85 - 4,70	2. prøve
6,25			Massiv finkornet kis lite cpy enkelte strenger. Noe kvartsbånd		4,70 - 6,25	3. —"—
	6,50		Svak imp i tynne py-bånd i grønsten med skf = 25g		6,25 - 6,50	4. —"—
	6,78.		Kalkrik sterk imp men er 8 massive malmbånd sammen		6,50 - 6,78	5. —"—
		7,90	Massiv grst. Etter 7m blir den mer oppknust.			
	~~9,00~~ 7,90		Meget svake py imp		7,90 - 9,00	6. —"—
		9,55	Kjerne tapt			
		9,63.	Grst oppknust			
10,83			Massiv, finkornet malm med noe grover bånd iblen eller lite cpy		9,63 - 10,83 ✓	7. —"—
		12,00	Kalkrik grst massiv			
12,60			Massiv finkornet malm, her med mere kopper		12,00 - 12,60	8. —"—
	14,00		Noe skifrig grønsten med svak imp.		12,60 - 14,00 ✓	9. —"—
	15,00		Grst skf meget svak imp		14,00 - 15,00 ✓	10. —"—
		15,80	Grst skifr			
			SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25.11.69 Sign: AH Retn.: +90 Sted: 230/163 Hull nr.: 970

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,80			Tett, homogen og noe finkornet kis, med noe cpy. Hengen skarp med noe q.		0,100 - 0,180 ✓	1. prøve.
		0,97	Meget skf. gr st. skf. 129			
1,80			Meget massiv py-malm med noe cpy. En del kvarts spredt i ligg		0,97 - 1,80 ✓	2. -"-
	2,20		Svak py-imp i gr st		1,80 - 2,20 ✓	3. -"-
3,10			Massiv malm som før		2,20 - 3,10 ✓	4. -"-
	3,60		Gr st skf med svak imp av py i tynne årer		3,10 - 3,60 ✓	5. -"-
	5,15		Enda svakere imp		3,60 - 5,15 ✓	6. -"-
	5,35		Iter stiger imp igjen med noe bredere py-striper.		5,15, 5,35 ✓	7. -"-
	6,35		Ukyre svak imp			
	7,60		Noe rikere, men svak py-imp		6,35 - 7,60 ✓	8. -"-
		9,75	Grøn gr st, ganske homogen og noe skf.			
	10,10		Noe imp som tidligere		9,75 - 10,10 ✓	9. -"-
		10,70	Gr st grønn massiv q-fleklet.			
	11,25		Varierende py-imp i gr st.		10,70 - 11,25 ✓	10. -"-
11,80			Noe grov malm med en del cpy kvartsholdig i ligge		11,25 - 11,80 ✓	11. -"-
	15,00		Gradvis overgang til fattig imp med enkelte rike bånd En del q-mandler.		11,80 - 15,00 ✓	12. -"-
15,50			Massiv god cpy-malm m/py		15,00 - 15,50 ✓	13. -"-
	17,30		Middels imp av py-bånd og også noe cpy.		15,50 - 17,30 ✓ ~~17,30~~	14. -"-
	17,95		Rik imp med mye q og py		17,30 - 17,95 ✓	15. -"-
19,15			Massiv malm, grønske finkornet lite cpy, mye kvarts.		17,95 - 19,15 ✓	16. -"-
		21,40	Gr st skf. Utholdig. Noe q-blyer Skf v/19,50 = 89 SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25.11.-69 Sign: AL Retn.: 6 ÷ 90° Sted: 6V/79 Hull nr.: 971

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,25	Meget kvartsrik bergart m/ noe gr.st materiale imellom synes brekziert.			
		0,85	Gr.st. grønn med mye q og cc-flekker. Er noe svære en vanlig, men ikke andesittisk.			
	2,75		Den samme bergart, men med meget svake py imp i meget tynne bånd. Skifter i bergarten fra lyst/mørkere materiale		0,85 - 2,75	1 prøve
2,84			Massiv malm finkornet, med rik cpy i ligg, ellers meget sl.		2,75 - 2,84	2. — " —
3,10			Zn-malm, meget rik og Fe holdig sl. m = mørk.		2,84 - 3,10	3. — " —
3,90			Massiv malm, finkornet og mye sl. i partier Slaver synes skjære den øvrige bergarten Meget lite cpy		3.10 - 3,90	4. — " —
		4,25	Gr.st. skf. med mye kvarts.			
	4,85		Samme bergart, men med svake py-imp og q		4,25 - 4,85	5. — " —
7,10			Massiv malm, med q som gangmin og ribber i cpy mot heng		4,85 - 7,10	6 — " —
	8,25		Svake imp av py også noe cpy i bånd		7,10 - 8,25	7. — " —
	9,00		Lyst sterker båndet imp av cpy og noe py		8,25 - 9,00	8. — " —
		9,75	Vekslende gr.st /andesittisk materiale. SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 26.11.-69 Sign: A Retn.: ~~6V/79~~ +90° Sted: 6V/79 Hull nr.: 972

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.70	Gr st skifrig, lys grønn og			
			klebrig på brudd flate. Mulig			
			med talk De første 20 cm			
			meget oppknust. En del q-årer			
	1.85		Svak py-imp sammen med		1,70 - 1,85 ✓	1. prøve.
			q-utskillinger.			
		3.00	Samme bergart som over			
3,10			Svak py-rik malm		3.00 - 3,10 ✓	2. prøve.
		3.80	Samme bergart med kraftige			
			q-kluser			
3,88			Smalt py-bånd		3,80 - 3,88 ✓	3. -"-
		5.00	Gr sten mere massiv, men			
			fremdeles med markert skf.			
5,65			Massiv malm, meget cpy og		5.00 - 5,65 ✓	4. -"-
			noe sl tydelig båndet med			
			q-rike bånd Skf 1/5,20 = 42°.			
			Enkelte mm-tykke kloritt bånd. mot			
			heng liten i cpy			
		6.00	Lys grønn sikk gr st som over.			
9.00			Massiv kis finkornet og		6.00 - 9.00 ✓	5. -"-
			meget homogen, meget cu-rik.			
			Med kloritt som gang min. Svake			
			antydning til båndig. Enkelte lynne			
			meget sl-rike bånd			
12,00			Dette samme kis.		9.00 - 12,00 ✓	6. -"-
13,43			Den samme kis, men mere		12,00 - 13,43 ✓	7. -"-
			kvartsholdig mot heng.			
	13,75		Lys grønn, gr st skifrig, med		13,43 - 13,75 ✓	8. -"-
			tynne imp-bånd av py og cpy.			
			Cpy spesielt rundt cc- og q kluser			
	14.75		Kvartsrik andesitisk bergart		13,75 - 14,75 ✓	9. -"-
			Svak py-båndning og kluser.			
		16.00	Vekslende gr st/sand - materiale med			
			grovere q-kluser			
	16.15		Samme bergart, men svake		16.00 - 16.15 ✓	10. -"-
			imp av tynne py-bånd			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 26.11.-69 Sign: ~~AH~~ Retn.: ÷90° Sted: GV/76 Hull nr.: 973

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	0,55		Meget oppknust, vesentlig fra kvartsåre med imp av cpy langs q-kantene. Noe grønt materiale også. Øverst et tynnt sl-rik kis		0,00 - 0,55 ✓	1. prøve.
		1,05	Samme vesentlig kvartsmateriale			
		3,55	Grønn gr.st. noe skifrig og blandet. Holder mye cc og grønne hornagen			
		3,80	Gr.st grønn uten cc og noe kvartsåre			
		6,90	Gr.st, grønn skf. med jevnt fordelt cc.			
	7,10		Meget skf. gr.st uten cc. To små kvartsårer			
	7,65		Rik imp, synes som hullet har truffet i kant av malm. Gr.st rester i kompakt kis.	NB	7,10 - 7,65 ✓	2. prøve
9,95			Massiv kis, meget tett og finkornet, homogen og vesentlig py-mm noe fint fordelt cpy		7,65 - 9,95 ✓	3 -"-
~~9,95~~			Mot liggvegg blir den mer kvartsrik Også cpy-rikere			
	12,75		Kvartsrik bergart. Jevn overgang fra kis. Litt svakere py-imp. Andesittisk.		9,95 - 12,75 ✓	4 -"-
12,86			Massiv kis, middelskornet, vesentlig py-kis		12,75 - 12,86 ✓	5 -"-
	13,68		Gansker rik py-imp også noe cpy i andesittisk bergart		12,86 - 13,68 ✓	6 -"-
		13,85	Gr.st skf. grønn			
14,65			Massiv kis finkornet, vesentlig py. Q-rik i kant og liggvegg		15,55 - 15,75 ✓	7 -"-
		16,30	Vekslende andes/gr.st. mat i partier noen py imp			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 26.11.-69 Sign: AH Retn.: +5455 Sted: IV/79 Hull nr.: 976

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,30	Gr.st grønn, skif. meget fint skj. fornt fordelt cc. EH kis bånd 3 cm bredt. Noen q-årer.			
	2,30		Rik py-imp i q-grunnmasse		2,30 - 2,30	1. prøve.
4,15			Massiv kis, finkornet, med py, noe cpy. Sl definerer svake båndinq		2,70 - 4,15	2. -11-
	4,37		Kvartsfyr med svak imp		4,15 - 4,37.	3. prøve.
6,70			massiv, lik den over, mere cpy		4,37 - 6,70	4. -11-
		6,95	Gr.st. grøn skif.			
	7,10		Imp i kvarts grunnmasse		6,95 - 7,10	5. -11-
		7,28	Gr.st meget skif.			
	7,45		Rik imp av cpy, sl og feldspat i kvq. Bånded	NB	7,28 - 7,45	6. -11-
	10,00		Gr.st. skif. men homogen, svak imp her og der.		9,60 - 10,00	7. -11-
	16.85		Varierende and/gr.st-mat.		10,40 - 13,20	8. -11-
			Noe skif i gr.st-leddet. And mere massiv. Enkelte skifer vil and eller gr.st. dominere Svake imp av py i bånd. Skifere her og der.		13,50 - 13,85	9. -11-
					16,00 - 16,85	10. -11-
		19.90	Samme bergart uten imp			
			SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 20.1.70 Sign: AL Retn.: 14/79 Sted: +90 Hull nr.: 977

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,40	Kjernetap			
		1.00	Gr st. skiferig kalkrik			
		1.35	Kjernetap			
		2.33	Gr st. skf., kalkrik i bunn			
			Skf v/1.75 m = 30°, kalk ekst			
			mot heng.			
2.90			Massiv kis, kvarts bånd i liggen.		2.33 - 2.90	1. prøve
			Tydelig bånding med cpy-rike og			
			sl-rike bånd. Finkornet. Skf. v/2.65 - 30°			
			Mere py- i heng			
		3,05	Gr st. skf noe kalk.			
3.72.			massiv kis som over. Meget skarp		3.05 - 3,72	2. -"-
			heng og liggrense uten emper.			
		4.25	Gr st. skf mindre kalk og			
			mere kvarts på skf-plan			
5.10			Massiv kis, som over, men mindre		4,25 - 5.10	3. -"-
			kvarts og sl mulig også noe mindre			
			cpy Kvartsbeng liggrense skf. 35°			
5.45			Samme massiv, men grovere og		5.10 - 5,45	4 -"-
			mest py. enkelte gråfjells bånd			
		5,83	Vekslning gr st/andesitt Helt			
			homogen			
7.00			Massiv finkornet kis. Mye kvarts-		5,83 - 7.00	5 -"-
			bånd og kelyser (sukker q). En god del			
			cpy			
8,35.			Massiv, men mer brunlet og mindre		7.00, - 8.35	6 -"-
			cpy, mere q			
		8.63	Gr.st. meget skf.			
~~8.95~~	8.95		~~Rik~~ kis, men q-rik, mest py		8.63 - 8,95	7 -"-
		9.80	Gr.st. massiv og homogen			
		11.00	Gr.st mye mer skf. klorittrik			
			krysset på skf. plan. Mye q-kelyser			
		12.00	Skf v/10,70 m = 34° Meget faltinge			
			sone som py-stringer fra 11.00 m			
		2900	Vekslende gr st/and og noe massiv		16,80 - 17,45	8. -"-
			kis men tilstede. Ab og til		18,65 - 19,45	9. -"-
			blokker det noe.			
	23.00	~~23.00~~	Samme vekslende berg men mere kvartsb		20,00 - 21.00	10 -"-
			Impregnasjonene er meget storre			
			og som py-bånd		22,00 - 23,00	11. -"-
			SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 26.11-69 Sign: AH Retn.: + 746 Sted: IV/78 Hull nr.: 975

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	1,35		Gr.st. gr. skf homogen med meget svak py-imp		0,00 - 1,35	1. prøve
	2,70		Samme bergart men imp samler seg i bånd		1,35 - 2,70	2. -"-
	3,30		Samme bergart. rikere imp		2,70 - 3,30	3. -"-
4,48			Massiv kis, finkornet, noe båndet med q-korn. Enkelte rikere sl-bånd. Mye cpy		3,30 - 4,48	4. -"-
	4,76		Rik imp i kvartsrik bergart		4,48 - 4,76	5. -"-
7,15			Massiv kis. Cm-rik tett homogen, noen kvarts bånd		4,76 - 7,15	6. -"-
8,90			massiv kis, båndet, q-bånd og mot heng meget rik i sl.		7,15 - 8,90	7. -"-
		9,15	Vekslende and/gr st-mal. men meget svak imp.			
10,50			Kvartsbåndet kis, nesten massiv noe grovere og mindre sl og cpy. Mot heng meget rikere i sl.		9,15 - 10,50	8. prøve.
		11,60	Gr.st. skf.			
	12,50		Gr.st skf. med meget svak py-imp i tynne bånd			
	13,20		Samme bergart, imp har økt.		12,50 - 13,20	9. -"-
	19,50		Vekslende and/gr.st. med vekslende imp her og der vesentlig svak.		14,00 - 14,50	10. -"-
					16,00 - 16,60	11. -"-
					17,50 - 18,20	12. -"-
		19,85	Anderitt, homogen og massiv SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 26.1.70 Sign: AH Retn.: ~~Ek/71~~ 2608 Sted: + 90 Hull nr.: 979

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,03	Gr. sten			
0,40			Meget massiv, finkornet kvs Hoc		0,03 – 0,40	1. prøve
			Grey skift v/0,40 m 55°			
		0,77	Andesitt, meget oppknust.			
2,70			Meget massiv medium, vesentlig		0,77 – 2,70	2. — " —
			grey og homogen. Blir mot bunnen			
			mere grey-hvite og grønne klorittbånd			
			v/2 cm.			
		3.40	Grønt skifrig og meget oppknust			
		3,50	Andesitt, kvartsførende			
		3,70	Grønn, middels skifret med			
			kalkholdig			
		4,35	Andesitt, grågrønn, massiv, finere			
			typelig mere kvartsig			
		5.60	Veksellende grønt/and.			
	5,80		——— " ———, mere hvit		5,60 – 5,80	3. — " —
			med en svake innsp av grey			
			i båndet.			
6,22			Massiv medium, svakt båndet med		5,80 – 6,22	4. — " —
			en god del grey			
	6,30		Svake innsp grey-bånd		6,22 – 6,33	5. — " —
		6,50	Vekslende grønt/and. mye cc.			
	6,75		Sterke innsp vesentlig grey		6,50 – 6,75	6 — " —
		6,90	Andesitt			
	7,50		Meget svake innsp i båndet		6,90 – 7,50	7. — " —
			bergart			
		14,80	Grønn gansk massiv og homogen			
	15,95		Enkelte tynne innslag av and.			
			Samme bergart men med			
			svake innsp i bånd.			
	16,25		Innsp øker noe		15,95 – 16,25	8 — " —
		16,50	Vekslende grønt/and i lyse			
			mørke bånd, avtagende til innsp			
	17,00		Sterke innsp		16,50 – 17,00	9 — " —
		23,165	Grønt meget svake innsp som			
			kun tykke bånd her og der			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 9.2.-70 Sign: ++ Retn.: +90 Sted: 266/71 Hull nr.: 972

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1,00	Kjernetap? OKKE Noe i kassen, kanskje kluss med første forsøkshull som ble boret 2m i grafitt?)			
		1.70	Grst noe skifrig, rik på cc-stripen og noen q-linjer.			
		3.85	Andesitt. mørkere i farge tett homogen, noe grønnskifrig.			
		8.80	Noe skj lys grønn. Rik på finfordelt cc. Enkelte q-striper.			
		12,40	Vekslende grst/andesitt mer overveiende homogent og lite skj. Vesentlig grst.			
	12,60		Svak imp i samme bergart		12.40-12,60	1. prøve
		16,35	Vekslende grst/andesitt men her er det en tett andesitt som er i overvekt. Meget massiv mot slutten SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 9.2.-70 Sign: [illegible] Retn.: ÷ 90° Sted: 258/69 Hull nr.: 980

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
3,00		~~2~~	Meget massiv, finkornet kis, med stringer og klynger av cpy- som gjør den garnske rik		0,00 - 3,00	1. prøve.
4,37			Det samme, men med noe q-båndig		3.00 - 4,37	2. -"-
6,00			Massiv, kis men meget magnetisk, dessuten noe Zn-banding		4.37 - 6,00	3. -"-
6.40			Massiv kis tett og cpy-rik svakt magn.		6,00 - 6,40	4 -"-
7,15			Igjen sterkere magn. Her og der kan magnetitt båndet sees. Ellers samme opptreden med kvartsbånding		6,40 - 7,15	5. -"-
		7,24	Skf. Grst			
7.40			Meget Cu-rik malm		7,24 - 7,40	6. -"-
		9,50	Grst noe skf meget tett med cc-årer og kvarts			
		12,37	Vekslende grst/cmst Granske massiv.			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 9.2.-70 Sign: AH Retn.: + 90 Sted: 25K/69 Hull nr.: 981

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,70	Anderitt, massiv med gr-årer.			
3,05			Massiv og tett grønske fin-kornet kis. Svake bandering Cpy-anrikem med cc- og kvarts 7cm gr.st. v/2,40.		0,70 - 3,05 V	1. prøve
		3,32	Grønske massiv og homogen gr.st.			
4,45			Samme massive kis som tidligere.		3,32 - 4,45 V	2. —"—
		5,00	Cc-rik gr.sten med resten et gabbroid utseende	NB		
		8,50	Anderitt, dog med vekslende partier av gr.st. Meget tett og massiv. Enkelte cpy-årer.			
9,97			Massiv middels. kis. Homogen Grønske cpy-rik 2cm gr.st ved 9,00 m		8,50 - 9,97 V	3. —"—
	18,30	~~18,00~~	Vekslende anderitt/gr. med imp. årer her og der.		9,97 - 10,90 V	4 —"—
					11,50 - 12,00 V	5. —"—
		20,00	Gr.st grønske massiv og homogen		12,75 - 13,00 V	6. —"—
		22,30	Vekslende and/gr. Anderitt har et blålig skjær. Gr.st er grønn - Godt kon. for vekslinger	NB	14,35 - 14,95 V	7. —"—
					16,75 - 17,40 V	8. —"—
	22,50		Grønske rik imp. i gr.st Helst som tidligere.		22,30 - 22,50 V	9. —"—
		25,60	Vekslende and/gr.st. SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 9.2-70 Sign: AH Retn.: -90 Sted: 25E/70 Hull nr.: 982

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
3,00			Massiv kis, finkornet og homogen. Kun få stedet med noe grovere striper. Vesentlig py - men også noe cpy i form av tynne årer		0,00 - 3,00	1 prøve.
6.00			Det samme, men her noe mere kvarts som svake bånding		3,00 - 6.00	2 — " —
6,73.			Det samme, men vesentlig mere cpy i enkelte 10-cm lag ligg-grensen bestemt med en kontakt-vinkel 42°		6.00 - 6,73	3. — " —
	6,90		Imp i massiv mørk gr.st. Klyser og striper av py + cpy		6.73 - 6,90	4 — " —
7,05			Massiv kis, m q-striper. Finkornet og cpy-rik		6.90 - 7,05	5. — " —
	7,60		Massiv gr-sten noe kalk holdig og med svake bånd av cpy i veier og py - i bånd.		7,20 - 7,55	6. — " —
	~~7,62~~					
		12,20	Massiv mørk gr-sten noen cc-årer og kvartsklyser SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/6-7c Sign: Af Retn.: ÷ 90 Sted: 256/65 Hull nr.: 983

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,40	Gr st, svakt skf grønn cc- og q- åres.			
		1,17	Kjerneløp	NB		
	1,40		Kis, kvartsnk i bånd. Begynner etter kjerneløpet. Foldet konglomerat og tynne cpy-lag mot heng. Ellers også gangbnk i cpy. Tynne gråkvartslag imellom.		1,17 - 1,40	1. prøve
2,10			Massiv malm, meget finkornet nye årsaken her og der. Gangbnk cpy-rik, spesielt ifølge med kvarts over. Kvartsrikere mot ligg.		1,40 - 2,10	2. -»- —
		2,35	Gr st/and i vekssel, vesentlig gr st. Skf V/2,25 = 32$			
2,48			Massiv malm, som over, men noe grovere.		2,35 - 2,48	3. -»- —
		5,60	Gr.st vesentlig massiv, smågspikket av cc. dessuten små cc-årer			
10,69			Massiv malm. Gangbnk finkornet ikke så cpy-rik, men cpy anrikes i diffuse bånd. Noe vekslende kvartsinnhold. Zn-synlige i meget få bånd med skf V/3,20 = 34$		5,60 - 8,60	4. -»- —
					8,60 - 10,69	5. -»- —
11,37			massiv kis, delvis, men her med vekslende innhold av magnetitt og kvarts, mest ved heng		10,69 - 11,37	6. -»- —
12,92			Massiv malm, som tidligere kvartsrik noe mere cpy-rik mot ligg kloritrikt bånd og tynne rike cpy-striper		11,37 - 12,92	7 -»- —
		16,05	Gr st meget massiv, noe mere homogen. Tynne ing-bånd Gar gradvis over i en andesittisk variant			
		16,85	Svake vekssel and/gr st. Ank. mot gangen, svake innsp av fly og cpy i et bånd. SLUTT.		16,47 - 16,68	8. -»-

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/6-70 Sign: AH Retn.: +90 Sted: 25K/65 Hull nr.: 954

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,70			Massiv malm, middelskornet homogen. Ikke så rik i cpy		0.00 - 0,70	1. prøve
1,58			Samme som over, men her rikere i cpy og noe mer kvarts/feltspat.		0,70 - 1,58	2 -"-
		2.00	Kjerne tap pga dårlig kasse	NB.		
	2,60		Grst, massiv med svak py-imp i bånd		2.00 - 2,60	3 -"-
		3.00	Kjernetap, som over			
		3,30	Andesitt, massiv og homogen			
		3,45	Grst massiv			
		4.00	Kjernetap som over			
		4,35	Andesitt massiv blåaktig			
		6.60	Grstein, med gartyger (mørkere) svak veksling med and.			
		7.00	Kjernetap			
		11.55	Veksling and/grst mm kvartskiser. Meget svak py-imp her og der.			
	12,20		Grst med mye kvarts bånding og noe imp av py		11.55 - 12,20	4. -"-
		12.30	Grst			
13,15			Massiv kis. Middelskornet, ganske q-rik, ikke mye cpy. Bånding v/12,70 = 38°		12,30 - 13,15	5 -"-
		14.05	Grst skj v/13.30 = 30°. Noe veksel med and. Svak imp av py			
14,20			Massiv malm som over		14.05 - 14.20	6 -"-
	14.90		Veksling grst/and med noe py-imp i bånd			
	16,10		Det samme men imp øker merkbart		14.90 - 16.10	7 -"-
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1

Dato: 2/6-70 Sign: AH Retn.: +90 Sted: 12V/77 Hull nr.: 985

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	1,43		Meget kvartsblyger med noen klorittiske bånd. Py - noen cmp i bånd her og der.		0,83 - 1,30	1. prøve
1,59			Massiv kis, med kvarts og klorit bånd. Rik på Zn og cpy		1,43 - 1,59	2 — " —
		2,00	andesitt massiv			
		3,00	Grønn mass. fem lagre gabbro finkornet			
			Mikroprøve fra 2,10 m			
		9,00	Vekst /and/grønst. meget massivt	NB		
			Kan være bånd av fin-gabbro her			
	9,27		Samme bergart, men mer kvartsåre med cmp av py og cpy		9,00 - 9,27	3. " —
	12,95		Samme bergart, men her cmp bare av py i bånd		9,27 - 12,95	4. " —
	13,90		Vekst and/grønst. Imp økn pr. na også noe cpy. Tynne bånd av mer massiv cpy-rik kis		12,95 - 13,90	5. " —
		14,20	Vekslende skf. and/grønst. skf v/13,95 = 189			
14,75			Massiv kis, meget grov og båndet av cpy-rik bånd		14,20 - 14,75	6. " —
			Bånding v/14,30 m = 44°			
17,00			Mer finkornet massiv kis		14,75 - 15,50	7. " —
			Py-grov, svart cpy-rik		15,50 - 16,65	8. " —
			Zn bånd skiftes, med lang noe kvartsbånding		16,65 - 17,00	9. " —
		18,00	Grønst, lys grønn, og cc-spettet meget massiv.			
		18,80	Gabbro?	NB		
			Mikro prøve v/18,20 m			
		19,30	Grønst skf. skf v/19,20 = 209			
		19,55	Kjernetap.			
		20,50	Grønst skf som over.			
		21,05	Gabbro?			
		22,80	Grønskf v/21,30 = 193 meget hemcpy!			
		23,65	Gabbro?			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/6-70 Sign: AH Retn.: +90 Sted: 12V/77 Hull nr.: 985

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		26,50	Gr sk skf. og meget homogen.			
		29,50	Gr.sk. meget massiv og homogen Granska mørk			
		30,00	Gr sk meget massiv, noe lysere grønn i fargen. (SZUTT)?			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 23/6-70 Sign: -A Retn.: -90 Sted: 15V/77 Hull nr.: 98

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,75	Andesitt, massiv, homogen			
		4,00	Det samme, med store q-amygdaler og cc-striper. Grønne mineraler danner striper. (?)			
		8,20	Grønnsten, granske mørke og meget skiftig.			
	8,40		Meget rik kisp i grst. Granske grov også med noe cpy		8,20 - 8,40	1 prøve
		8,55	Grønnst typeskiftet med svak py-kisp.			
9,20			Massiv py-malm. Til å begynne med noe grøt men etterhvert middelskornet cpy dannet striper		8,55 - 9,20	2 - " -
10,00			Malm mere massiv og homogen og rikere i cpy.		9,20 - 10,00	3 - " -
12,55			Den samme massive kis, men her meget Zn-blendet i enkelte partier, rik på cpy i mellom		10,00 - 12,55	4 - " -
		19,20	Andesitt, meget finkornet og lett en fyllelig kvartsholdig og må være meget hard. Svak veksling med grøt her og der.	NB.		
		19,75	Grøt noe skj og homogen			
		22,50	Andesitt, meget hard og finkornet. Mikrogr v/ 19,85	NB		
		24,00	Veksl and/gr mere kvartsrik. Fremdeles meget hard			
		30,00	Grøt meget fett i noe lys og homogen. Enkelte partier hvor det veksler med and. SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/6 -70 Sign: AJ Rein.: ISV/77 Sted: + 90 Hull nr.: 987

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		4.00	Vekslng and/gr st. And. i overvekt, Gansko mye kvarts-årer Meget tynne py-årer her og der			
		7.70	Massiv og homogen andesitt			
		16.40	Vekst and/gr st, meget massiv hele veien And utgjør de massivste og lengste partiene En del q-årer			
	16,80		Kvartsitt, magnetisk og mere imp av py i større felter og bånd	NB	16.40 - 16,80	1. prøve
		17,70	Gr. st noe stf. mye cc og q-årer			
	17,87		Samme bergart, men her ganske sterk py-imp		17,70 - 17,87	2 -"-
		18,17	Massiv gr st.			
	18,30		Sterk py-imp		18,17 - 18,30	3. -"-
		19,60	Gr. st stkt, meget q.			
	20,00		Vekst and/gr st, Tynne imp-bånd av py.		19,60 - 20,00	4. -"-
		21,35	Vekst and/gr st.			
21,75			Massiv, blandet ganske kvartsrik. Meget rik på Zn		21.35 - 21,75	5. -"-
		22,10	Grønnstein, massiv med q-årer.			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 28.4.70 Sign: AJ Retn.: ÷ 45° Sted: 15V/77 Hull nr.: 985

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1,75	Ganske lys grønn grst nok bandet med lysere bånd Syres fore endel kalk?			
		2,00	Anderstt med kvarts-årer			
		5,35	Mørk, meget massiv og homogen grst. Enkelte kv-årer.			
		6,10	Noe stkf. mørk og glinsende grst.			
	6,40		Svak imp av py og Zn i stkf. grst		6,10 - 6,40	1. prøve
		6,65	Lysen stkf mørk grstein.			
7,00			Malm grønn massiv og homogen middels kornet, fåren tynn Zn bånd ogsaa utover.		6.65 - 7,00	2 — " —
		7,96	Meget oppknust grst.			
8 94			Massiv py-malm, enkelte anrikninger av Zn.		7,96 - 8.94	3. — " —
		9.30	Grst oppknust.			
9.55			Massiv py-malm med noe Zn		9.30 - 9,55	4. — " —
	9,90		Imp i kvartsrik bergart		9.55 - 9,90	5 — " —
10.60			Bandet py-malm, middels kornet. Endel Zn-stripet		9.90 - 10,60	6 — " —
		10.80	Grst massiv			
	10,90		middels py-imp		10,80 - 10,90	7 — " —
		11,45	Massiv grønn, grst.			
	12,25		lys grønn, stkf grst med cc-årer og en del cpy-imp		11.45 - 12,25	8 — " —
~~12,75~~			Enkelte partier uten imp.			
12,75			Massiv cpy-malm, svært rik, endel kvarts.		12,25 - 12,75	9. — " —
	13,08		Kv rik bergart, klyaet, med spetter av py og cpy		12,75 - 13,08	10. — " —
		18,20	Grst. tett og ganske homogen. Mørk grønn, nesten blåaktig			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1

Dato: 28/4-70 Sign: A Retn.: ± 90 Sted: KV/77 Hull nr.: 989

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		8,70	Massiv gr st. Ganske homogen og mørk. Fra 0,00 - 0,50 m Enkelte meget spredte py-impr fra 3,50 og videre blir gr st særlig homogen og mørk og noe grønnaktig på innerste flaten p.g.a. amfibol?			
		9,00	Nærmest massiv amfibolitt Blåsort og grønnaktig			
		10,37	Massiv og homogen, noe kalk førende mørk grønn gr st.		10,37 - 12,00	1 prøve
17,45			Massiv meget grov malm lite oppsprukket og ganske grov Cu. 10 cm i hengvegg noe Zn og kvarts. Finkornet og tett Ved 17 m en del Zn striper. Ved 17,20 m noe oppknust og noe Zn. Gjennom hele lengden ganske likedan kis. Mot hengen mer oppknust For massiv til å ha skf.		12,00 - 15,00	2. — " —
		19,55	Mørk, tett massiv homogen gr st. Meget uregelmessig kontakt til kis. Svak kloritisk sone		15,00 - 17,45	3. — " —
21.30			Massiv, meget finkornet py-kis med enkelte grover cpy-rike partier Skarp kontakt mot hengbergart Skf 15° Blir noe grovere og cpy-rik mot 21,30 m		19,55 - 21,30	4. — " —
22.45			Massiv kis, lyskilig mere Zn-rik og kvartsholdig. Dessuten noe grovere		21,30 - 22,45	5. — " —
	22,75 ~~23,95~~		Ganske rike py-impr, meget skifring Skf ved 22,80 = 25°		22,45 - 22,75	6. — " —
23,00			Massiv ganske finkornet py-rik		22,75 - 23,00	7. — " —
26,00			Massiv malm, meget Zn-kvartsholdig og ganske finkornet Endel cpy		23,00 - 26,00	8 — " —
27,00			Meget grovkornet men rik på mye Zn		26,00 - 27,00	9 — " —

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

A-k2

Dato: 25/4-70 Sign: A Retn.: ÷ 90 Sted: 12V/77 Hull nr.: 989

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
27,35			Massiv finkornet homogen malm. Good opy		27,00 - 27,35	10. prøve
29,20			Igjen massiv og meget ett godt innhold av In i vekslende mengde. Skarp grense mot berget.		27,35 - 29,20	11. -"-
		31,40	Grafitt meget massiv og grovkornet. Lite oppsprukket.			
		34,50	Veksler gr/d/and, vesentlig gr.			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1

Dato: 28.4.-70 Sign: AH Retn.: ÷90 Sted: 10V/77 Hull nr.: 990

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprøve	Anmerk.
	1,45		Svake py-imp i en grønlig homogen grøst, som er lite ekf.		0,00 - 1,45	1. prøve
	2,70		Massiv grøst med kvartsrik lag (hymne) og meget tynne py stringer.			
		3,50	Vekselende grøst/sand			
		3,65	Massiv grøst			
	3,80		Grønlig rik imp		3,65 - 3,80	2. -"-
		6,60	Massiv grøst med ~~for~~ fortsatt med q-årer Noe kalk holdig			
		8,00	Massiv mørk grøst.			
		12,10	Kvartsrik undersitt mørk meget gjennomsatt av q-årer og enkelte klynger med py			
		14,65	Veksl. sand/grøst.			
		15,25	Meget massiv og homogen grønn grøst.			
	15,55		Kvartsklynger med grov py-imp		15,25 - 15,55	3. -"-
		17,58	Massiv grøst. enkelte meget tynne undersitt lag og veksling sand/grøst Skj. 12,50 m ~ 40° Ujevn kontakt mot underliggende			
	17,80		I tynne grøst grønlig rik py-imp i bånd		17,58 - 17,80	4 -"-
	18,43		Meget svake py-imp i striper og enkelte cpy-korn i grønlig massiv grøst			
	19,75		Meget rik imp av blandet py og Zn. Mye Zn		18,43 - 19,75	5. -"-
		20,90	Massiv, homogen, lys grønn grøst.			
	21,00		I kvartsklynger, klynger av py		20,90 - 21,00	6. -"-
		21,85	Massiv grøst som over.			
22,30			Massiv, men med tynne kvartsbånd her og der. Meget rik på Zn		21,85 - 22,30	7. -"-
		23,20	Undersitt, gjennomsatt av q og q-årer			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 28.4.70 Sign: AH Retn.: ÷90 Sted: 10V/77 Hull nr.: 990

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		25,92	Meget tett og mørk grst neste amfibolitisk med svrt amf.-nåler. Enkelte runde cc-aner. Et og annet cpy-korn.			
26,70			Massiv, noe blandet py-malm. Lit av cpy og Zn		25,92 - 26,70	8. prøve.
22,55			meget massiv finkornet Cu-rik malm. Bør noe grovere mot lag.		26,70 - 22,55	9. -"-
	28,35		Vekslende imp av py		27,55 - 28,35	10. -"-
29,50			Massiv malm meget finkornet og rik kopper. Tynne grafittlag midler		28,35 - 29,50	11. -"-
		29,95	Massiv grst			
31,20			Tett leis, meget Zn rik		29,95 - 31,20	12. -"-
~~30,00~~			Videre tett py-leis med underordnet cpy			
	33,00		Stripet imp, vesentlig av Zn og py. Lite cpy. Bergarten en tett noe ekt grst.		31,20 - 33,00	13. -"-
		33,80	Grst meget oppknust, med leir materiale, kan kanskje gått gjennom sleppe.			
		35,45	Massiv mørk grst med meget store q-utskillinger. SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 23/6-70 Sign: AH Retn.: +90 Sted: 10V/77 Hull nr.: 991

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1.63		⇌	Massiv py-malm, middelskornet med enkelte sprøyteårer. Granitt lite opptil den første meteren, men ellers ingen sprekker		0.00 - 1.63	1 prøve
		1.66	Granitt.		~~1.63~~	
10.70			Massiv malm, samme homogen som før men nå meget		1.66 - 4.00	2 — " —
			rikere i opx. Svake q-bånding		4.00 - 7.00	3 — " —
			her og der. Små runde korn		7.00 - 10.00	4 — " —
			av kvarts ofte i malmen		10.00 - 10.70	5 — " —
		10.85	Gr.st m/q- og cc-årer.			
11.00			Massiv py-malm som over med noe qz		10.85 - 11.00	6 — " —
		11.60	Gr.st m/q- og cc-årer. Granitt massiv			
13.78			Massiv malm. Granitt homogen. Skarp liggrense til bergart. Kik på opx- i ligg. vegg. py-kis mot heng.		11.60 - 13.78	7 — " —
		20.00	Gr.st. meget cc-holdig vekslet svakt med granitt her og der. Mot 20,0m meget sprekk med cc.			
		23.00	Gr.st granitt massiv en del rikere q og cc-flekker.			
		25.85	Gr.sten med markerte mørkdiker			
		27.90	Vekseling and/gr.st med en god del kvartsårer. SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 26/6-70 Sign: A Retn.: ÷60V Sted: 11V/73 Hull nr.: 992

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,60			Granitt massiv py-kis, stort kvartsholdig lite cpy.		0,00 - 0,60	1 prøve
		1,00	Kjernetap			
		1,35	Gr st skf med svake py-bånd		#	
	2,30		Andesitt, lys, med tynne py-striper i vekslende mengde, opp til sterk. Noen gr st lag imellom.		1,35 - 2,30	2 -"-
	3,20		Andesitt, finkornet seig, med svakere py-imp. Enkelte blyser av chlorit på sprekker		2,30 - 3,20	3 -"-
		5,00	Vekst, and/gr st meget rik på kvartsårer, tydelig sterkt oppsprukket			
		8,45	Gr st, grønn homogen og meget lys i farge. Endel kvartsårer. Veksler med noe mørkere type skf V/6 cm = 8°.			
		11,95	Gr sten, homogen, meget massiv og mørk p.g.a. noe biotitt. Lange kjernesprekker. Enkelte partier kvarts-blyser og nettverk av tynne gr årer. Mot slutten, mandler.			
		17,70	Meget tett vekslng and/gr st. Til å begynne med over vekslende andesittisk men gjennom resten etter kvarts.			
		19,00	Grønn noe skf, med kvartsårer.			
20,17			Massiv kis. I kvarts lite parti med gr-ite py kis. Ellers rik i cpy. Sterk Zn-bånd her og der Zn-kvarts V/19,5 = 42°. Anrikket cpy mot slutt.		19,00 - 20,17	4 -"-
		20,40	Gr st			
21,30			Massiv, middelkornet cpy-rik noen Zn-bånd. Ved 21,00 10 cm med imp. Diffus kryssende med gr-holdig kis. Veksl gr st/and, meget grøt med gr-		20,40 - 21,30	5 -"-
	21,00	~~21,80~~	Grønt med svake imp, lyse mot slutt SLUTT		21,35 - 22,55	6 -"-

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25/6-70 Sign: A Retn.: +90 Sted: 11 V/73 Hull nr.: 993

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
2,17			Massiv kis, meget rik, middels kornet og enkelte Zn-lamel Meg cpy. Svært oppknust til å begynne med. Enkelte partier rik på g- Mot heng Meget cpy- og Zn-rik. Tynne grafittårer ved 0,8m og 1,50 m.		0,00 - 1,53	1 prøve.
		2,55.	Gr st lys meget spaltet av grønne min.		1,55 - 2,17	2 -"-
		5,15	Veks/amf/gr. Andesitt i overvekt endel kvarts og noen mørkere mot hengen.			
		10,00	Gr st. lys type noe spaltet meget massiv og homogen. SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 26.11.-69 Sign: AL Retn.: +90° Sted: 64/76 Hull nr.: 974

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1,10	Vesentlig kvartsåre materiale med noe kloritt-stikk Oppknust.			
		3,90	Grønn. gr-korn, svært skiftrig og knudet pga brudeldtate. Langs kjerneopptak. Fornt fordelt cc.			
		4.25	Vesentlig kvartsmateriale som over			
	4,85		Kvartsmateriale med meget svake py og cpy-imp		4,25 - 4,55	1. prøve
	5,75		Sterk og jevn imp. i gr.st.		4,85 - 5,75	2. -"-
	~~5,75~~		Vesentlig py men også cpy- i bånd og klynger.			
		7,15	Gr.st skift med jevnt fordelt cc store kvartsutsonderinger			
7,45			Massiv malm svært sinkrik		7,15 - 7,45	3. -"-
	7,75		Grønske tikk py-imp i kvartsrike bergart.		7,45 - 7,75	4. -"-
		9,35	Vekslende and/gr.st. mat.			
	9,90		kvartsrike bergart med rike py-og sl bånd		9,35 - 9,90	5. -"-
		12,30	Veksl. and/gr.st - materiale			
			Imellomm svakt imp. partier SLUTT		10,55 - 10,85	6. -"-

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 26/6-70 Sign: A Retn.: +54V Sted: IV/73. Hull nr.: 994

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,75	Gr.st. massiv homogen, Cu-ute lys, noe and. utsende.			
	5,50		Samme bergart, men noe imp av qy-årer		0,80 - 1,20	1 prøve.
					3,15 - 5,25	2 -"-
		8,00	Gr.st. lys, homogen massiv			
		16,37	Vekslig gr.st/anal. Noe skifring og blir mere skif mot heng Skif 1/16,90 - 45°			
21,40			Massiv kis, noe grov til å begynne med og ikke så rik		16,37 - 17,00	3 -"-
					17,00 - 20,00	4 -"-
			Blir tettere og mere qy-rik		20,00 - 21,00	5 -"-
			Svak Zn-forvitring her og der.		21,00 21,40	6 -"-
			Meget kompakt og lange kjerner. Mot heng mere Zn.			
	26,30	~~7,30~~	Vekslende and/gr.st. Spredt		21,40 - 22,00	7 -"-
			imp som kan bli qanske		22,00 - 23,00	8 -"-
			rik her og der. Q-årer		25,00 - 26,00	9 -"-
			opptrer ofte			
			SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 26/6 -70 Sign: AT Retn.: ÷90 Sted: 8V/80 Hull nr.: 995

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprøve	Anmerk.
		1,35	Gr. st. uten variasjoner. Noen mandler i begynnelsen av hullet.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1

Dato: 2/11-70 Sign: AH Retn.: +90° Sted: 10V/79 Hull nr.: 996

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
0,25			Massiv malm meget tett og homogen. Vesentlig py og noe cpy		0.00 - 0,25	1. prøve
		0,35	Gristen innesluttning meget finskifrig og homogen Skj v/0.3 m = 13°			
3.20			Massiv malm, som over, men med noe grovere py-partier. Q er gangmin. Blir vesentlig rikere på cpy etter hvert. Mot heng er sone mere q-båndet med noe rike lag av cpy her og der.		0.35 - 1.00	2. -11 -
					1,00 - 2,35	3. -11 -
					2.35 - 3,20	4. -11 -
	3,70		Bergart rik på talk, svært kraklet med klyfter og blærer av q og cc. Imp og py og noe cpy forekommer, Zn-båndering opptrer også	NB	3,20 - 3,70	5. -11 -
	5,65		Grist aflang skj bergart som fører mye talk og er meget varierende imp vesentlig py, men også tynner utenom av cpy og Zn		4.00 - 5,65	6. -11 -
	6,65		Samme bergart, men talk mindre og nye mere kvartz Imp har blitt mye sterkere.		5,65 - 6.65	7. -11 -
9,30			Massiv malm, meget varierende i sammen setning. Generelt tett og fink homogen bl i begynnelsen men py blir etter hvert grovere i partier. Cpy finnes i godt mindre enkelte steder anriket i klyfter.		6.65 - 8.00	8. -11 -
					8.00 - 9.35	9. -11 -
		9,95	Veksling and/grist. Grist impes svare i overvekt. Enkelte q-årer			
12.25			Massiv malm. Generelt homogen med noe grov py og q-holdig skj på deler av sonen v/9.95 = 22° Cpy-varierende i bånd-tynner partier er rik imp		9.95 - 11,35	10. -11-
					11,35 - 11,70	11 -11-
					11,70 12,25	12. -11-
	13,50		Vekslene rik/fattig imp i en skj grist. Zn bandering opptre		12,25 - 12,85	13 -11-
			Båndene v/12,50 m = 33°		12,85 - 13,50	14 -11-

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

4+k 2

Dato: 2/11-70 Sign: ++ Retn.: +90° Sted: 10V/79 Hull nr.: 996

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		16,95	Gr.st. gan~~k~~ lys grønn og massiv med cc og g-bånd			
		17,45	Svært feltspatrik bergart med grønn bånding, skj.			
		18,50	Veksling and/gr.st.			
		20,65	Gr.st svakt og udefinert skj Fører noe kalk.			
		21,65	Gabbro? med et grønnfarget skjær. Ellers en meget homogen bergart a grønnaktig			
22,40			Massiv malm, meget kopparrik delvis også Zn-rik Enkelt q-klaser		21,65-22,40	15 prøve
		24,00	Tett veksling and/gr.st. Skj. Skj v/23,50 = 5°			
	24,20		Samme bergart her med tynne imp-striper med fallig fg-imp SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 29/9-70 Sign: AJ Retn.: ÷90 Sted: 10V/79 Hull nr.: 997

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
24,38	~~24,38~~		Malm, massiv tett el-rik i bånd, Bånding = 24°		24,20 - 24,38	10 prosent
		24.60	Gr. st.			
25.15			Massiv malm, båndet og el-rik. Meget oppknust.		24.60 - 25.15	11. — " —
	25.63		Amfibolitt, meget tett grønnblå og med vekslende lysp av epy+py		25.15 - 25,63	12 — " —
		26.00	Amfibolitt, skikk med magnetitt			
	26.30		Samme, men svak lysp		26.00 - 26.30	13 — " —
		27.10	Amfibolitt, meget tett			
	27.50		Samme med svak lysp		27.10 - 27.50	14. — " —
		28,55	Amf. med nål på q-årer			
28,75			Sukrik, båndet malm		28.55 - 28.75	15. — " —
		30,20	Vekslende amf/qu.sk.			
33,35			Massiv malm, meget tett og båndet med el-i sveregelen.		30.20 - 31,00	16. — " —
					31.00 - 31,80	17 — " —
			Bånd. Endel epy. i partier meget rik		31.80 - 33.35	15. — " —
		37,75	Amfibolitt, lite nåler på kvarts- eller kvart. Endel store avlange mandler av q. Mot slutten en del vekslig med lysme qu.st-lag.			
		38.00	Breksje, kvarts/feltsp/kalkspat i en amfibolittisk grunnmasse Skarpe kontakter			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 29/9-70 Sign: A Rein.: ÷90 Sted: 10V/7a Hull nr.: 997

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			en hele tiden i overvekt Porfyroblastisk (runde) kvit av cpy og Mot dige bare andesitt			
✓	13,28		Cpy-imp i andesitt, først som strenger og i forbindelse med gåre, senere nærmest massiv og meget rik Kanskje også her fattlerts og endel sink	NB	13,16 - 13,38	3. prøve
14,51			Overgang fra over til en båndet massiv kis. Meget sinkblende i smale tette bånd og ellers middelskornet. Tildels meget cpy-rik. Båndning 13,5 - 14,3 Sl-bånd kiser seg meget mesig og båndinger varierer fra skill til flak. Innesluttet i sl finnes brungrå fragmenter.		13,38 - 13,68 13,68 - 14,05 14,05 - 14,51	4. —11— 5. —11— 6. —11—
		15,00	Andesitt meget oppsprukket og tett, blågrønn. En og annen liten cpy-flekk			
		15,40	Kjerneslap			
		15,74	Grå-blågrønn, mørk grønnsvart skift.			
	15,84		Samme bergart mot strengen av cpy-imp		15,74 - 15,84	7. —11—
		19,20	Vekslende sed/grøst gangart mørk med rem g-bånd her og der.			
		20,00	Breksje, lyse fragmenter i en mørk hvertsittisk grunnmasse.			
✓	20,23		Kvartsåre med skifer og flekker av cpy		20,00 - 20,23	8. —11—
	✓	21,00	Vekslende sed/grøst svakt skf.			
	✓	21,70	Grøst svakt skf			
		23,78	Andesitt, tett massiv med endel g-årer. Ved 23,20 nærmest breksje hvor kloritt i grunnmassen mellom sed.korn.			
23,90			Malm, båndet rik på sl.		23,78 - 23,90	9 —11—
		24,20	Svakt skf grøst mot slutten mere andesittisk.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

1. ARK

Dato: 29/9-70 Sign: AH Retn.: ÷90 Sted: 10V/79 Hull nr.: 997

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.80	Grst noe mørk med svake,			
			mørkest skift. V 1.20m skift = 8°			
			Enkelte spredte gåver			
	✓	2.20	Grst massiv grønn syenit			
			noe mer kvartsrik. Enkelt q-åre			
			med spor av cpy.			
	✓ 2.32		Samme bergart som over		2.20 - 2.32	1 prøve
			men imp av ganske grov py			
	✓	4.65	Grønnsten, mørk grønn glimmerrik			
			dels noe skifr men blir lysere			
			og mer homogen etter hvert.			
			Tett gj.satt av tynne q-striper			
		5.40	Kjernetap			
	✓	7.25	Andesitt, meget q-rik kan	NB		
			neppe betegnes som kvartsit.			
			Blågrå i fargen. Enkelte tynne grå			
			striper som gir opp i 2cm bredde			
			Meget tett og hard. Enkelte			
			spredte cpy-korn. Gj.satt av enkelte			
			q-årer som blir hyppigere mot			
			digg samtidig med ei-åre og over-			
			portyrer (meget små			
	✓	7.65	Breksje, eller (lapilli eller vulk-			
			anbe) En klorittisk grønn masse			
			med bruddstykker av andesitt, kantet			
			men også avrundet i egen skarpe			
			kanter.			
	✓	9.65	Andesitt. Blågrå, hard og tett som			
			over			
	✓	9.72	Men skj. gr. der.			
✓ 10.00			Massiv kis helt i hang som		9.72 - 10.00	2. prøve
			smp over 3-4 cm, men etter hvert			
			blir kis massiv, spredte grove			
			med tynne cpy-bånd som avsnitt.			
	✓	10.50	Grst mørk grønn, glimmer			
			svakt skj. Sterk smp her			
			og der synes å føre et høyt			
			q-innhold.			
	✓	13.16	Vekslende and/grst. med noe			
			tett q-fylte sprekk.			
			Ved 11.50 noe oppknust andesitt.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/11-70 Sign: AJ Retn.: +90° Sted: 10V/75 Hull nr.: 998

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,35	Kassen var sprukket i bunnen slik at noen stabbing av kjernen finnes. Malm og berg ligger likevel på riktig plass. Tror jeg			
3,15			Massiv malm, meget opp-sprukket her og der. Fin kornet og svart cpy-rik		0,00 - 2,00 2,00 - 3,15	1 prøve 2. " "
		3,27	Grst. innesluttning			
6,25			Massiv kis av samme type som over, kanskje ikke helt så mye cpy.		3,27 - 5,00 5,00 - 6,25	3. " " 4. " "
		7,00	Vekslende and/grst. Mørk grønnlig and dominerer			
		12,60	Grst noe skj sone kjerne-diter. I partier rik på feltspat			
		15,50	Underkant, noe spettet til å begynne med. Blågrå og meget fett og hard. Kvartsh. Fører i partier også glass-klar kvarts SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 10/11-70 Sign: AA Retn.: +90 Sted: 13V/75 Hull nr.: 999

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.00	Gr ct. meget massiv med mye q-klyser og åser. Også svært oppknust.			
	2.60	2.	mere skif gr st med rikelig q-åser, samt varierende rik py-imp. Meget finkornet		1.00 - 1.80	1. prøve
					2.00 - 2.60	2. " "
		↑	Noe som ligner et agglomerat-			
		2,70	lag. Små avrundede q-og cc-boller i en klastisk grunnmasse	NB		
	3,50		Skif gr st. som ovenfor men meget finkornet, resten vasskiskelig py. Dessuten mye mer q-		2.70 - 3,20	3. " "
		3,65	Agglomerat?			
		8.00	Gr st noe skif. med meget svake imp av og til. Gr st. synes svært skivet og synes også ha fragmenter inne i seg av og til. Er svært vanskelig og skifte fort skif. V/460 = 20°	NB vulkansk		
			Kvartsårer opptrer nyppigere etter hvert. Dessuten synes en andesittisk del bli mer vanlig etter hvert.			
		8.75	Veksling and/gr st.			
		12,55	Andesitt. Grønnblå farge meget tett og finkornet og er tydelig gangart sur. Enkel tynnere bånd med gr st. Av og til opptrer rene q-porfyrer			
		17,95	veksling andesitt/gr st. I partier noe oppknust og enkelte meget tynne bånd med py-imp forekr. Gabbro?			
		19,55	Meget massivt med vanlig korn. Vanskelig å se om mnf er tilstede. Antyder ikke at dette er meget grov gr sten. Gamske lys farge			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 10/11-70 Sign: AT Retn.: +90 Sted: BV/75 Hull nr.: 999

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		19,90	Gr.st. noe skf lys grønn med meget stort innhold av ce i tynne tette bånd			
		26,00	Gr.st. massiv ganske tett grønn. Enkelte svarte bånd			
		27,25	Gr.sten har blitt noe mere skf.			
			skf V/26 mm = 11°			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1

Dato: 10/11-70 Sign: -A- Retn.: ÷90 Sted: 3V/75 Hull nr.: 1000

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,85	Grsten ganske homogen og bare svakt skf. Noe mørke grønn i fargen. Enkelte q-årer og klyser. Et tynt py-bånd har skf V/2.60 - 223			
3,25			massiv malm. Vesentlig en meget tett og finkornet py-malm. Partier med noe grovere py. Cpy-strenger på grensen inn i hengen. Blir noe cpy-rikere mot ligg.		2,85 - 3,25	1. prøve
		4,60	Grsten svært lik underlaget med unntak for q-klyser.			
5,00			Massiv malm, samme meget tette type som ovenfor. Men her vesentlig mere cpy. Også st. Kanje på ². Mot ligg noen cc-årer.		4,60 - 5,00	2. " "
		5,45.	Grst. Grønn meget tett og homogen. Finkornet			
	5167		samme bergart som over men med en ganske rik imp i bånd av cpy og py. Kanskje opptrer sammen med sulfidene.		5,45 - 5,67	3. " "
		15.30	Grønnsten. Mørk grønn ganske tett og meget homogen. Svakt skifrig i enkelte tynne bånd men forandrer seg svært lite. Mot slutten av sonen svart mye q-klyser.			
		15.90	Vekst. and /grst.			
		~~15,10~~	Grsten i overvekt meget svake py-imp her og der.			
		17.00	Andesitt. Blåtlig i fargen tett og meget finkornet. Blir stedvis brecsiert og kjittet gjennomtrukket med kloritiske materiale.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 10/11-70 Sign: AF Retn.: ÷90 Sted: 13V/75 Hull nr.: 1000

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		21.90	Gr.st. svart merk. grønn, synes være rik på hornbl. Er ganske homogen og massiv. Bare tynne kvartsårer skjærer den. Mot lag noen soner med meget tynn imp.			
		22.95	Gr.st. mer lysere type, og synes mer ått på overflaten.			
	23.20		Samme bergart med og ganske rik py-imp samt med g.		22.95-23.20	4.-11-
24.20			Ganske massiv st-malm og også en del gråer		23.20-24.20	5.-11-
		26.65	Andesitt, tett og meget homogen			
	26.93		Samme bergart, men noen svakt mineralisert og med en veldig py-imp.		26.65-26.93	6.-11-
27.50			Massiv malm. Meget tett py, slk og noe cpy i tynne bånd. Svart bergart		26.93-27.50	7.-11-
		27.60	Gr.st. mineralisering			
	28.85		Andesitt, med veldig imp, hovedsakelig av py i bånd. Båndig ⊥/28.10 = 22°		27.60-28.30 28.60-28.85	8.-11- 9.-11-
		29.50	Andesitt. svart sur. tett og finkornet.			
		29.95	Gr.st. Grønn og en del flekkig med små spetter av g.			
		34.00	Veksling and/gr.st. Vekslingen svart grønn.			
		38.00	Gr.st. meget homogen og tett.			
		40.00	Mere andesittisk med utskillinger av epidot bergart svart finkornet.			
		41.05	Gr.st. Grønn meget oppsprukket mot slutten			
			SLUTT			

Diab. kull. Gruben

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 16.9 -69 Sign: A Retn.: 490° Sted: 1665/75½ Hull nr.: 10.001

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
Veltet	–	2,45	Gr.st. noe skifrig, grønn, vekslende lagring med klorittrike lag			
	✓	7,05	Gr.st. mørk grønn massiv, kvartsflekket, noen årer - Enkelte meget svake impregnasjoner.			
	✓	11,50	Gr.st. grønn, massiv, Kalkrik kalkfylte skifre.			
	✓	21,05	Gr.st massiv, noe mørkere meget homogen. Enkelte py.kryst. Få kvarts/kalkspat åre			
[redacted]	–	43 70	Gr.st. noe skif vekslende lagring lyse kvartsrike bånd og grønne klorittrike bånd større kvarts/kalkspat. Klynger med noe svovelkis. Etter 30m. varierende lag (thynne) av mørk Gr.st. Gr.st dels kalkfolding			
	–	46.70	Gr.st grønn massiv, homogen, få årer og flekker av kv/kalkspat			
	– 47,50		Gr.st. brekkasert, sterkt oppsprukket med kvarts- klorittklynger og		46.70 - 47,50	1. prøve
	~~47,5~~		folding py-imp. Enkelte cpy-årer			
	–	50,05	Gr.st samme som over ikke brekkasert. har noen grønnere bånd, er kanskje av andesittisk sammensetning. Noe kvartsfylte klovercom			
	✓	73,60	Gr.st. noe skifri, vekslende lagring lyse og grønne bånd. De lyse bånd er egentlig en mørkere gr.st. Svake kis-impr. sammen med kvarts-utsondringer. Mot 70m dominerer den mørke blå-grønngr.st. (kvartsførende) er vanskelig å se andesitt. Mikro-	NB		
anvil gr.			prøve tatt ved 69,70m Fra 71,50 overalende massiv andesitt	NB		
	–	7390	kvartsittlag med 5mm mt-striper noe kalkspat også. Ren kvarts med mot malmen.			
74,35		7	Massiv malm, tett, finkornig kvarts utgjør lyse striper, også		7390 - 74,35	2. prøve

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 16.9 - 69 Sign: [redacted] Retn.: ÷ 90° Sted: 16K / 75 1/2 Hull nr.: 10001

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Idioritt. Fortrinnsvis py, noe			
			men like cpy, Zn endel 2cm			
			grst i malmen opp mot heng.			
75,45			Massiv malm, Zn-gehalt kan økel.		74,35 - 75,45	3. prøve
			også, mere cpy rik cpy			
76,25		76,35	Massiv, nært ren Zn-blende		75,45 - 76,25	4 —"—
			Båndet med kalk bånding (skif.)			
			ved 76,20 28°			
	76,95	76,95	Sterk imp. Zn-bånd i kvartsrik		76,25 - 76,95	5. —"—
			grunnmasse og med litt jevnfis			
			også endel py i Sinkblende lysere.			
		77,35	Gr.st noe skifrig grunn.			
	79,30		Middels imp i grunn. gr.st. Båndrende		77,35 - 79,30	6. —"—
			bånd st og py.			
	80,40		Gr.st grunn m/ fattig imp		79,30 - 80,40	7 —"—
			Bånd av py og st, mest st			
			Noe kalkspatfylt ekket gr.st.			
	83,80		Meget svake imp i gr.st. litt.		80,40 - 83,80	8. —"—
			mest py			
	83,95		Rik Zn-imp i kvartsbånd		83,80 - 83,95	9. —"—
	84,15		Meget svake imp i gr.st.			
	84,45		Sterk imp av py, noe st i bånd		84,15 - 84,45	10. —"—
	86,00		Svake imp i gr.st. py i bånd		84,45 - 86,00	11. —"—
		87,45	Gr.st. gr noe skif og kc/kalk			
			fylt ekket.			
	89,20		Gr.st med svak imp		87,45 - 89,20	12. —"—
	91,00		Ulyer svake py-imp i gr.st kjerne-			
			tap 25 cm.			
	91,45		Fattig imp, i kvartsrik grunnmasse		91,00 - 91,45	13. —"—
			mellig noe cpy			
		94,60	Gr.st. grunn skifrig, mye kalksp			
			og noe kvarts.			
	95,25		Svake imp i gr.st.		94,60 - 95,25	14. —"—
		97,00	Gr.st. grunn skif. uten kvarts/			
			kalksp ulyer.			
	98,00		Gr.st m/ svake py-imp			
		99,00	Gr.st mye kalksp. enkelte py-			
			korn. Bergkvart 99 - 100			
		100,00	SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 16.9.-69 Sign: AF. Retn.: ÷ 90° Sted: 168/79 Hull nr.: 10002 ✓

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	5,35.	Gr-st. gr. inntrakket ugrodt med kvarts + kalkspat. Enkelt tynne mm klorittrike bånd massiv.			
Vekst	✓	9,50.	Gr.st noe skift. mer grovt materiale i vekselbevirkning med lysere grønn gr.st. Fylte åpninger mid kvarts og kalkspat, ofte også uregelmessige årer			
	✓	11,95	Gr.st. massiv, mørke grønn-blå, kvartsårer i skjevt overgang, enkelt kalkspat, enkelt pyr-korn. Enkelte tynne (1-5 mm) skiftrige soner mer tynne pyr-bånd. Også rett-linjet uregelmessig og tynn.			
	✓	15,90	Gr st. noe skiftrig, m/ blandede flekker av kvarts/kalkspat. Enkelte klynger av klorit sett strukturert med kvarts og meget tynne impr-soner.			
	✓	22,10	Gr st grønn, massiv enkelt regelmessige kvartsårer og kalkspat-årer klorittstrikk langs kjernen.			
Vekst	✓	35,05	Gr-st, noe skiftrig, med skiftende klorittrike bånding, flekker med kvarts/kalkspat.			
	✓	37,10	Gr st massiv grønn kvartsårer			
Vekst	✓	41,50	Gr st bandet noe uregelmessig skiftrig med kv/kalkspat.			
	✓	44,50	Gr-st. massiv grønn, kvarts klynger og årer			
	✓	70,45	Gr st, enkeltvis lys og grønlig bånding. Enkelte mørke bånd med grønt, mm-tynne pg stikker. Lyse bånd er også kvartsrike og har enkelt pg-korn spredt. Mot slutten av lengden overgang mot gr.st.			
	✓	77,97	Gr st grønn noe skiftrig, svake grønnere bånding og rik på kv/kalkspat-flekker. Enkelte årer hvor kvartsen er tydelig rød.			
	✓	78.05	Kvartsrik lys breccie med tynne rt-bånd (1-3 mm)	NB		

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 16.9-69 Sign: AT Retn.: ÷ 90° Sted: 16K/79 Hull nr.: 10.602

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		78,08	Gr.sten, skifrig klorittisk for			
			Lenq av kis			
	78,72		Rik imp, meaen massiv malm		78,08 - 78,72	1. prøve
			Kvartsbånding lig gir ingen ut			
			varierende prog. Noppa mye cpy			
			mellomkornet, endel klorit.			
		78,90	Båndet bergart, klorit og kvartsrik			
			noe magnetisk			
	79,96	~~78,96~~	Imp av cpy, nik på kvarts		78,90 - 79,96	2. —"—
		79,15	Gr.st. noe skifrig, grenn 79,10-79,15			
			mt og kvarts inn mot malm			
79,40		~~79,40~~	Malm, sink-rik noe cpy-flekker		79,15 - 79,40	3. —"—
			meget rik. Endel kvarts bånding. Tatt			
79,95			mikroprøve ved 79,20.	NB	79,40 - 79,95	4. —"—
			Massiv malm, mest py., noe			
			kvarts			
80,45			Massiv malm meget sinkrik. Ved		79,95 - 80,45	5. —"—
			80,13 - 80,18 kvartslag			
		82,60	Kvartsitt, med bånd av mt; innslutt	NB.		
			rik massiv 5cm bånd med mt.			
			kvarts delvis rødspettet med jarpris. Enkelt			
			grønne lag også forekr. ml. 81 tynn			
			Zn-skifer også.			
		83,32	Gr st. skifrig, grønn tynne			
			kvartsårer. Skj 50° v/ 82,65			
	83,62		Gr st. skifrig Zn-imp		83,32 - 83,62	6. —"—
84,55			Malm, massiv, Zn-rik. Tatt mt	NB	83,62 - 84,55	7. —"—
			mikroprøve v/ 84m			
	86,15		Imp, gr. skj, grøt. mest py noe		84,55 - 86,15	8. —"—
			cpy i hjemestriper, Zn			
	86,60		Fattig py-imp, kvartsåre noe cpy		86,15 - 86,60	9. —"—
		89,75	Gr st grønn noe skifrig, vanlig			
			kalkspat årer og flekker (mandler)			
	90,15		Middels imp, dels kvartsrik bergart		89,75 - 90,15	10. —"—
			delvis i grønnsten			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1

Dato: 30.10.-69 Sign: [illegible] Retn.: ÷90° Sted: 2361/79 Hull nr.: 10.003

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		6,10	Gr.st. massiv grønn, meget homogen med enkelte cc-fyllinger			
		6,30	Kjernetap			
		7,60	Samme bergart med langsgående kalk-strimler			
		7,75	Kjernetap			
		9,00	Gr.sten, mer mørk skifrig og glatt og svart oppknust			
		9,35	Kjernetap			
		9,65	Kvartsrik meget brekkasiert bergart Svak pyrimp.			
		10,10	Kjernetap			
		16,70	Vekselvarding gr.st/andesitt, men er meget massiv. Opp-knust nå og da.			
		29,00	Gr.sten massiv, men oppknust over store partier. q-fyllinger også med epidot. Svak impr. med py nå og da.			
		34,10	Andesitt, blågrønn og tydelig med kvarts, finstrøkling på bruddflater. Mange q-årer. Ellers som meget oppknust.			
		38,45	Vekseling gr.st/and. meget massiv med større kvarts-årer			
		41,35	Meget massiv mørk grønn grønnsten.			
		54,50	Vekslel gr.st/and ikke skifrig men lagn synes være >40° Oppknust i partier. Man kan henkanskje se en intens små folding. Enkelte mm.-tynn py-kvarts			
		58,00	Gr.st massiv grønn. Fint gjennomsved av cc-årer tynne.			
	58,50	~~55,50~~	Samme bergart, med ytterst svake py-impr.			
		61,35	Andesitt. nesten svart men meget massiv.			
		63,00	Vekslang gr.st./and.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 30.10-64 Sign: AH Retn.: ÷90 Sted: 230/79 Hull nr.: 10.003

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	~	64.60	Noe skifring mørk grønn grønnsten. skf V 63,70 ~ 25°			
~	65.60		Andesitt meget svakt impæn			
	~	68,50	py Veksel and./gr.st.			
	~	74,10	Massiv mørk grønn grst. tett gjennomvevet av cc-årer			
	~	74,25	Kvartsbreksje, kantete kvartskorn.			
	~	78,10	Veksel grstn/andes. meget oppknust.			
	~	78,50	Skappe materiale.			
	~	80,00	andesitt oppknust.			
	~80,15		Svak py-impæ i grst		80,00 - 80,15	i prøve.
	~	98,50	Gr.st. meget massiv med enkelte kvartsblærer svake veksling her og der.			
	~	100,00	andesitt mørk og meget massiv			
	~	113,00	Veksel and/gr.st. noe skifring i enkelte partier dominerer and i andre gr.st.			
	~	117,80	Gr.st grønn, noe skifring og i partier tett med cc-flekker sammt en svak impæ			
		120,20	Veksel and/gr.st. hvor and dominerer.			
		120,52	Gr.st. skifring skf. 30°			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1

Dato: 20.10-69 Sign: A Retn.: ~ 90° Sted: 278/79 Hull nr.: 10.004

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		9.50	Mørk blågrønn gr.st. meget massiv mot oppkant i toppen. Homogen med enkelte mandler m/kv. Rikt med tynne kvarts-kalk-spatårer. Mot 10m. enkelte spredte mere grønne bånd. Større py-xx finnes her og der.			
✓		10.20.	Samme bergart som er beskrevet og sammenskiftet m/q og cc.			
✓		36.20	Mørk blågrønn g.st. som før, mot 20 m blir det flere med mandler og de minker i størrelse. Det er den andesitiske type. Ved 25 m og videre er den lyseling karakterisk, men også gjennomsatt av q og cc-årer, slik at den ser at den klassifiseres som porfyrbergart. Ved 32.0 m har den også et brekciert preg.			
✓		40.50	Gr.st. med meget lite veksling av mørke grønne og lyse grønne bånd, men i-gen markert skifrighet.			
✓		46.10	Veksling blir mer grov med 5cm mellom båndene.			
✓		47.25	Et parti som her meget kloritt og er svært oppsprukket og gjennfylt med kvarts.			
✓		51.00	massiv blågrønn gr.st. Enkelte spredte med py-fylling (typisk)			
✓		53.20	lysere den lette veksel lagring mellom lyse og mørke bånd. Brudene også meget svakt foldet.			
✓		57.30	Blågrønn d.v.s andesitt, men meget oppsprukket. Ved 56.50 en brekjesone, som nærmest er en kvartsitt med inneslutninger som er veksel ockse	NB		
✓		59.00	Vanlig grønn gr.st. homogen og massiv mot slutten av mandler			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Art 2

Dato: 20.10-69 Sign: AT Retn.: -90° Sted: 2745/79 Hull nr.: 10.004

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	-	62,40	Dun tett veksellagring, dessuten meget oppknust.			
	✓	71,40	Vekslinq fremdeles men mer grovkornet, større partier med grafitt og asbest. Enkelte kvartsfylte mandler og større q-blyser og årer. Ved 69,- m blir bergarten svakt mer skifrig.			
	-	71,70	middels til finkornet gabbro?	NB.		
	✓	72,40	Vekslende bergart som over			
	✓	72,50	Samme gabbro, meget skarpe grenser til grafitt. Prøve ved 71,40	NB.		
	✓	77,80	Vekslinq som over			
	✓	84,00	Grafitt grafitt massiv meget homogen.			
	✓	89,20	Her opptrer en svakt markert vekslinq, hvor det mest basiske leddet er fremtredende.			
	✓	104,70	Iqfjell, massiv grønn grafitt. En meget svak fyllinq. Enkelte mindre partier kan vekslinqen forekomme			
	✓	120,-	Vekslinq er her dominerende og av samme som nesten forfyrrick p.g.a tett med mandler. Fra 115 og utover blir det mere kvartsholdig V 119,70 mak inn svak q-årel.			
		140,-	Vekslagring, men grønn grafitt dominerer. Den er massiv og homogen. Enkelte fyllinqer. Mot 140 er kanskje noe mer kvartsaktig. SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 1.

Dato: 10/6-71 Sign: BBS Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10005

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		7,20	Gr. st grønn, nesten massiv litt cc og noen epidot årer. De første 0,90m mangler på grunn av større dimensjon på kjernen.			
		8,20	Gr st grønn, litt skj Små linser og årer med cc. Skj: 36°			
		11,00	Gr. st grønn, nesten massiv Mandelstøyne og noe uregelmessig epidot Noen korn med kis			
		13,00	Gr. st grønn, nesten massiv. Uregelmessige blumper med epidot, årer og bånd med cc kon m/kis			
		13,80	Gr. st grønn, svakt skj			
Vekst		19,60	Svært uregelmessig gr. st. Bånd og blumper med epidot, Noe båndring med varierende blomstinnhold av gr. st mellom disse			
		21,10	Gr. st. grønn, svakt skj til nesten massiv. Noen korn med kis. Ser ut som pg.			
Vekst		24,00	Gr. st grønn, nesten massiv Noen linser med andesitt Uregelmessige bånd og årer med epidot Noen korn med py			
Mørkgrå		26,10	Gr st grågrønn, nesten massiv Noe cc og et parti med epidot årer.			
		26,40	Gr st. grågrønn, massiv. Tett med små mandelstøyne			
		27,30	Gr. st grønn massiv Uregelmessige blankstrikk bånd sammen med cc. Båndene ligger mellom gr st og cc Noen korn med py			
Vekst		33,00	Gr. st grønn, massiv. Noe cc og klorit Flekker og uregelmessige bånd med epidot Enkelte korn med py			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 2

Dato: 10/6-71 Sign: S.B.S. Retn.: ÷ 90° Sted: Hull nr.: 10005

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	32,05		Liten uregelmessig blump av massiv py med noe jaspis. Rundt den ligger et noe uregelmessig lag med magnetitt	NB!		
			Bergarten er gr.sk.			
		33,30	To uregelmessige blumper av magnetitt, epidot og cc i gr.sk. Magnetitten er svart, men ikke helt ren. Noen mandelstyne i gr.sk	NB!		
		33,90	Gr.sk. grønn med noen mandelstyne. Rik på epidot			
		34,90	Gr.sk. grønn, nesten massiv.			
	35,20		Uregelmessige mike bånd av middelskornig py. Bergarten er mørke grønn gr.sk, noe skf.			
			I en av bergbåndene er det en linse med klosvart magnetitt. Linsen har meget skarp grense Skf = 35°	NB!		
		36,30	Gr.sk. grønn, svakt skf. Klorittrike bånd med noe imp. Mot slutten noen mandelstyne og epidotbånd.			
		38,30	Gr.sk. grønn til grågrønn. Tette med tynne bånd og linser med klorit. Noe svak imp. V/38,30 et to cm tykt vrent bånd med magnetitt	NB!		
		39,50	Epidotrik gr.sk med noe cc.			
		45,50	Gr.sk. grønn, noe skifrig Skf ≈ 30°			
		47,40	Gr.sk. grønn, noe varierende klorittinnhold. Svakt skf. Langs og tverrgående cc-bånd.			
		50,10	Gr.sk. grønn, noe skf. Skf = 30-35°			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 3

Dato: 10/6-71 Sign: ØR Retn.: ÷ 90 Sted: Hull nr.: 10005

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
Vbv		51,70	Gr.st. grønn, noe skf. Varierende kloritt-innhold. Noen mandelstein og bånd med feltspat og g (nærmest andesitt) Skf ~ 30°			
		56,30	Gr. st. grønn, noe skf. Noen få flekker med cc Skf = 25-30°			
		59,80	Gr. st. grønn, svakt skf. En del tynne åren og flekker med cc. Noen mandelstein Skf = 25°			
		67,00	Gr.st grønn, noe skf. Noen åren med cc Skf = 25-40°			
		71,00	Gr.st grønn, nesten massiv Noe spredt imp. av py.			
		77,60	Gr.st grønn, svakt skf Skf = 25° V/7560 noen små flekker med py (båndet) Enkelte born andre steder også			
Vbst.		85,50	Gr. st. grønn, svakt skf. Noen klorittrike bånd og linser, En del epidot			
		92,50	Gabbroid bergart. Grovkornet Rik på epidot Svart homogen			
		99,10	Overveiende andesitt, blågrå Bånd med gr.st., tildels uregelmessige Skarpe grenser			
Vbst.		105,20	Gr. st grønn, svakt skf. Noen steder rik på cc. Bånd og små dyne. Enkelte biter med andesitt. Skf: 30-35°			
		112,20	Gr.st. grønn, massiv Noen biter med andesitt Uregelmessige klorittrike bånd, som også har noe epidot Lit cc			
		119,50	Gr.st grønn, massiv Biter med andesitt. Uregelmessige bånd og blumper med epidot Her er gr.st mere klorittrik			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 4

Dato: 22/6 - 71 Sign: E D.E Retn.: ÷ 90° Sted: Hull nr.: 10005

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprøve	Anmerk.
Vkbr		120,90	Gr st grønn. Massiv som går over til nøe skf. Glinsende på skf plan. Nøe cc som først opptrer nøe uregelmessige, senere i bånd og linser etter skf. Her er det noen tynne bånd med imp. av py. Skf = 16°			
		129,20	Først nøe andesitt, og senere vekslinger mellom gr.st og andesitt. Gr.st er grønn og nøe skf glinsende skf flater og nøe cc rib. Nøe av andesitten er også cc rib. Ganske skarpe grenser mellom de to. Skf varierer ganske mye			
		129,70	Andesitt med noen liter med gr. st			
		140,60	Gr. st grønn, massiv og hard. Enkelte klorittrike uregelmessige partier. Her er det nøe cc. V/13320 er det litt rev q.			
Vkbl		145,20	Gr. st. grønn, svakt skf. Rik på finfordelt cc og enkelte bånd.			
		151,30	Andesitt som gradvis går over til gr.st. Helt fra begynnelsen er det små horn av gr.st, som blir mere og mere dominerende. Gr.st er hard og massiv. Noen bølgete langsgående bånd med cc.			
Vkbl		154,30	Gr. st. grønn, nøe båndet på grunn av varierende klorittinnhold. Svakt skf., og nøe glinsende flater. Ganske rik på bånd og årer av cc.			
		162,00	Gr. st. grønn, nesten massiv. Klorittrike bånd og liter. Nøe skf. glinsende flater, mørk grønn			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Avk 5

Dato: 29/6 - 71 Sign: S.B.S Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10005

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
Vkbl		167,70	Gr.st. grønn, båndet, svakt sbf. Meget rib på linser og linfordelt cc. Noe tynn imp. av pyhrott. Sbf = 15°			
		171,50	Gr.st. grønn, nesten massiv. Noen tynne, uregelmessige årer med cc. Noen få flekker og tynn imp av py.			
Vkbl		175,10	Gr.st grønn, svakt sbf. Rib på cc Finfordelt, linser og uregelmessige bånd. Bergarten er båndet på grunn av varierende cc og kloritt. Mot slutten grønne jevn imp. av py.			
-11-		177,20	Gr.st. grønn, massiv. Noen uregelmessige bånd med cc			
		181,80	Gr.st. grønn, massiv. Noen klorittrikere partier til å begynne med. Mot slutten noe breksjert. Uregelmessige årer med cc. Noe tynn imp.			
		182,60	Hvit kvarts, med noen biter med gr.st.			
		187,80	Gr.st. grønn, massiv. Tynne årer med cc. Rundt 184,50 et breksjert parti, rikere på klor.itt. Her er det noe cc og q.			
Vkbl		194,00	Gr.st. grønn til mørk grønn. Svakt sbf. Bånd med cc hvor det er biter med gr.st. Breksjerte bånd. Et par q.bånd Sbf = 20°			
-11-		199,50	Sterk variasjon mellom kloritt og epidotrik gr.st og andesitt. ish gr.st. Båndning. En del cc i den andesittiske			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 6

Dato: 28/6-71 Sign: RBR Retn.: +90 Sted: Hull nr.: 10005

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		205,40	Gr. st, grønn til mørk grønn svakt skf. Noe uregelmessig epidot og åårer med cc.	Tynn imp.		
		210,30	Gr. st, grønn, massiv. Rik på å-ganger. Gr.st er her noe breksjert.			
		212,80	Gr. st grønn massiv til svakt skf. Noen tynne cc åårer			
	218,30		Gr. st. grønn, båndet, svakt skf. Bånd, linser og flekker med cc, mandelstyne. I forbindelse med disse er det tynn båndet imp av py			
		221,80	Gr. st, grønn, massiv. Noen tynne åårer med cc. Noen cc-rike bånd med imp av py			
vikst	224,50		Gr. st. grønn, båndet. Andesittiske bånd med imp av py, noe svak. Et bånd på 1 cm med flekker av cpy i gr.st.			
	225,22		Rik, noe båndet imp av py i gr.st. Grovkorning. Båndinger ligger vinkelt 20°		224,50-225,22	1. prøve
		226,05	Gr. st grønn, mesten massiv. Noe grønne skf.plan på 30° med forskjellig vinkel på hverandre			
	230,20		Noe varierende type gr.st med sterkt varierende imp av py. For det meste er den tynn. Gr.st er noe båndet, enkelte andesittiske med imp. Noen mandelstyne. Noe skf med mørke grønne, glinsende skf.plan 30°		229,30-229,74	2. prøve
230,33			Mesten massiv malm, grovkornig. Litt cpy.		230,20-230,33	3. prøve
vikst	233,55		Gr. st. grønn. Noen mandelstyne, og andesittiske bånd. Noe båndet og ujevn imp av py med noe cpy. Grovkornig		231,22-233,00 233,28-234,33	4. prøve 5. -"-

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 7

Dato: 30/6-71 Sign: L.B.S Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10005

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	234,33		Andesitt, hvarts og noe gr.st med rike bånd av py imp Noe flekker med cpy			
Vekst	237,00		Gr.st. grønn med bånd og flekker med andesittisk bergart Ganske jevn, noe båndet imp av py. Den er tynn og grovkornet			
andesitt	238,02		Andesittisk bergart med rike bånd med py imp., rik på flekker med cpy 10 cm med massiv kis som er meget rik på finfordelt cpy. Middelskornig. Pyrimpen er også rester middelskornig		237,00-238,02	6. prøve
Vekst	244,00		Gr.st grønn, rik på mandelstein og flekker med andesitt Ganske jevn, noe båndet imp av py. Mot slutten er den skarpt båndet. Et par steder er det noe cpy.			
		245,41	Gr.st. lys grågrønn. Spalten i flere retninger etter mørkegrønne glinsende plan. Meget tynn jevn imp av py. Grovkornig			
	245,80		Andesittisk, lysegrå bergart med rik jevn imp av grov-kornig py.		245,41-245,80	7. prøve
		246,35	Gr.st. grønn med noen ec åren Noe svake py imp.			
	246,77		Båndet imp av py i gr.st. og andesitt. Grovkornig		246,35-246,77	8 prøve
		247,03	Gr.st grønn med ec åren.			
	248,00		Båndet rjevn imp av py i gr.st. Grovkornig og ganske rik. En del flekker med cpy.		247,03-248,00	9. prøve
		249,73	Gr.st. grønn, noe varierende. Noen klorittstrøk. Noe cc.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arkiv: 8

Dato: 30/6-71 Sign: L B S Retn.: - 90 Sted: Hull nr.: 10005

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	250,75		Imp av py og cpy i noe		249,23-250,75	10 prøve
			uren gr. st. Imp. er båndet			
			og noe kjevet, men ganske			
			rik.			
	253,30		Gr. st. grønn. Mandelstyre og		250,75-252,70	11. prøve
			bånd av q-feltspat (uregelmessig)			
			Noen rike bånd med imp av			
			py med noe cpy			
Wn	256,70		Først variasjon mellom gr. st		252,70-254,90	12. prøve
			og lysgrå andesitt og så		254,90-256,70	13. —"—
			brun andesitt. Den virker			
			nesten kvartsittisk. Ganske			
			jevn og noe båndet imp av			
			py. Noen partier med rike			
			på flekker med cpy (porfyrisk)			
Wlat	259,16		Gr.st. grønn, båndet Mandel-		256,70-259,16	14 prøve
			styre og andesittiske bånd.			
			Båndet imp av py meget rik			
			på cpy. Båndene er tynne			
			og enkelte helt massiv.			
		285,60	Gr. st. grønn. Meget rik på			
			cc som for det meste opp-			
			trer i parallelle bånd med			
			skf. Enkelte uregelmessige			
			tverrgående bånd. Skf.			
			varierer fra 15 til 35°.			
		288,60	Aglomerat. Hovedmest gelfitoid			
			grunnmasse. Tett med runde			
			og noen skarpkantet biter			
			med andesitt (q-feltspat)			
			Det er litt cc. Det er en			
			~~tunn~~ svak lagdeling, muligen			
			strømming			
			SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 1.

Dato: 21/2-72 Sign: S.D.S. Retn.: ≈90° Sted: Hull nr.: 10006

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,35	Kjerneløp			
		1,30	Veksling mellom gr.st og andesittisk gr.st. Gr.st er grågrønn, massiv.			
		6,40	Gr.st. gragrønn, massiv. Noe cc.			
	6,80		Andesitt og massiv gr.st. Den første har noen bånd med py			
		10,90	Andesittisk gr.st. Varierer fra grønn til noe mørk blågrønn, massiv. Noe klorittrike stikk.			
		13,80	Gr.st. grønn, massiv.			
		15,60	Noe urein gr.st, resten middels-kornig, svak båndig. Den første og siste biten er noe andesittisk.			
		16,80	Veksling andesitt-gr.st. Båndig. Noe breksjert og agglomeratisk			
		24,00	Gr.st og andesittisk gr.st grønn til blågrønn, massiv. Bånd med klorittrikere gr.st. Noe skf., varierende vinkel 20-40°. De mest andesittiske partiene har små lyse øyne			
		25,20	Andesittisk gr.st. blågrønn, massiv. Ganske tett med lyse øyne.			
		27,30	Samme type bergart, men her med klorittrike gr.st. bånd. Ikke så mange øyne.			
		28,60	Andesitt. Den første delen har uregelmessige stikk med klorit.			
		30,90	Gr.st, gragrønn, resten middels-kornig, noe skf. Glinsende spalteplan, noe varierende vinkel 20-30°			
		32,50	Andesittisk gr.st. noe breksjert og agglomeratisk. Flere partier har et meget tett klorittrikt nettverk.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Avh 2

Dato: 21/2 - 72 Sign: B.B.B. Retn.: -90° Sted: Hull nr.: 10006

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		33,40	Gr.st grågrønn, nesten middels-korning, noe massiv. Sprekker noe opp etter klorittstikk			
		35,20	Vekslinq mellom andesitt - gr.st. Den siste er noe båndet og agglomeratisk 15-20° Den siste biter er breksjert.			
		41,50	Gr.st. grønn (noe mørk), massiv. Tett med meget små lyse øyne (0,3mm) Noen bånd og blærer med q (hvit og lilla) og andesitt Skarpe grenser (breksjert?)			
		45,00	Gr.st. grønn, noe massiv Bånd og flekker med andesitt og lyst materiale (q-cc. pilliped)			
		50,30	Gr.st. grønn (noe mørk), massiv Meget tett med små lyse øyne (0,5mm)			
		51,80	Gr.st. grønn (noe mørk) massiv			
anl. og		54,70	Breksjert gr.st, q og andesitt Skarkt oppknust			
		68,60	Gr.st grønn, massiv. Noen andesittiske bånd. V/62,20 er det noe skf og her små klorittrike linser. Skf=25°			
		75,00	Vekslinq mellom gr.st og andesittisk gr.st. Gr.st er massiv, men lit mot slutten noe båndet Noe epidot			
		77,80	Gr.st-grågrønn, svakt skf, noe båndet Noen andesittiske biter Båndinq - 40° Skf = 40 og 20°?			
		80,80	Båndet gr.st, svakt skf Tett med andesittiske linser. Skf avtar fra 25 til 15°			
		82,00	Gr.st grågrønn, skf. Noe båndet, jmfordelt cc Skf = 25°			
		87,10	Vekslinq mellom gr.st og andesittisk gr.st. Noen klorittrike stikk og bånd. Gr.st er grønn, massiv			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 3

Dato: 22/2-72 Sign: S.B.S. Retn.: ÷90° Sted: Hull nr.: 10006

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	Gr	89,20	Breksjert gr.st og q (kvit) Noe epidot			
		90,00	Gr.st. grågrønn, massiv. Noe fin fordelt cc.			
		94,20	Veksling mellom gr.st og andes. sittisk gr.st. Den første er noe mørk grønn og svakt skf. Den siste er blågrønn og massiv			
		95,80	Gr.st. grønn, noe massiv. Det siste skyldes er noe gullig på grunn av epidot. Oppsprukket etter glinsende blonittskive.			
		102,30	Andesitt, blå, massiv. Enkelte partier med et grønnskjær (sterkt andesittisk gr.st) Noe uregelmessig epidot. Sprekk rød på			
		104,00	Veksling mellom gr.st og andesitt Gr.st er noe mørk og svakt skf. Skf ~ 20°			
		106,10	Andesittisk gr.st, blågrønn, massiv. Noen flekker med q-epidot			
		106,80	Gr.st grønn. Går fra svakt skf. over til massiv. Noe epidot og blonitt.			
		108,10	Andesitt med åren av blonitt og epidot			
		109,80	Agglomeratisk gr.st. Tett med små mørke og lyse linser, med et nettverk av lyst materiale imellom			
		111,00	Gr.st. grågrønn, noe glinsende. Svakt skf.			
		114,00	Sterkt andesittisk gr.st. Blå-grønn, massiv. Åren og linser med blonitt.			
		116,00	Veksling mellom andesittisk gst og gr.st. Gr.st er noe mørk og svakt skf. Åren med blonitt.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arh 4

Dato: 24/2-72 Sign: SDS Retn.: -90° Sted: Hull nr.: 10006

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		124,50	Andesittisch gr.st. blågrønn, massiv. Noe epidot			
		129,10	Bånd og linser av andesitt og gr.st. Noe epidot (båndet) Varierende vinkler			
		130,10	Middelsboring (rent grovt), gabbroid bergart, grågrønn Svakt skf. og tennders til båndning 10-20°			
		134,50	Gr.st. grønn, massiv med andesittiske linser 20°			
		136,30	Andesittisk gr.st blågrønn, massiv I hver ende en liten bit med andesitt, lyse åren Gr.st. her noe epidot			
		139,40	Gr.st. grønn, massiv. Noe mer Noen bånd med cc og q. Uregelmessig epidot			
		141,10	Gabbro, grovkornig Den er noe presset og svakt skf. Særlig den første 1½ meteren virker båndet			
		144,50	Mer gr.st., grågrønn, massiv til svakt skf. Noen steder er den middelskornig En del uregelmessig cc Det kan være en omdannet gabbro.			
		146,10	Gabbro, grågrønn, noe grovkornig Sterkt pressed og båndet Den går meget jevnt over til gr.st (overgangssonen er 1 m)			
		147,00	Gr.st grønn, massiv. En del epidot.			
		156,80	Gabbro, grågrønn, grovkornig For det meste massiv Den er ganske mørk. Åren og flekker med cc og q. Noe epidot Ganske tett med små uregelmessige sprekker			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

A-h 5

Dato: 25/2-72 Sign: RØ Retn.: = 90 Sted: Hull nr.: 10006

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		169,20	Veksling mellom gr.st og andesitt. Det er også noe andesittisk gr.st. Gr.st er grønn og varierer mellom massiv og båndet, skf. Det er noe cc og q. Lyse åren og epidot i andesitten. Skf = 25°			
		179,30	Gr.st. grønn (noe mørk) skf. Noe cc-q. Skf = 20°			
		186,00	Gr.st. grønn (noe varierende), svakt skf. Noen andesittiske linser. Langsgående sprekkefyllinger med cc, 85°. Skf = 20°			
		191,00	Gr.st. grønn, svakt skf. Andesittiske linser med nettverk av cc. Skf = 10°			
		191,50	Gr.st. grønn, skf. Svært mye uregelmessig cc og q.			
		193,60	Gr.st. grønn, svakt skf. Skf = 20°			
	195,40		Gr.st. grønn, svakt skf. og båndet. Noen flekker og øyne med andesitt. Båndet tynn imp av py. Gr.st virker blærestrukne rund imp. båndene.			
		196,50	Gr.st. grønn, svakt skf. Skf = 5°			
		201,10	Gr.st grønn, noe massiv. Flekker og tett med øyne av andesitt og lyst materiale. Noe svak imp. av py.			
		203,90	Gr.st grønn, svakt skf til noe massiv. Skf = 15°			
	210,00		Gr.st grønn, svakt skf. og båndet. Linser og flekker av andesittiske materiale. Tynne sprekk bånd med imp av py, middelskornig. V/205,60 grovkornige py xx			

Venter på kart over de sydligste felter! Avtalt med Grøt om det! 27/1

Elkem-Spigerverket a/s
Skorovas Gruber

7893 Skorovatn Telefon: (077) 34 000 / 4700
Vareadr.: Grong st.

T.S. Jnr. 77/86
Mottatt 27/1
Sett
Besvart

Bergmester Ole Vadsteinen

Trondheim

Oversendelse

- [x] I følge avtale
- [ ] Til orientering
- [ ] Til behandling
- [ ] Til godkjennelse
- [ ] For kommentar
- [x] Kan beholdes
- [ ] Ønskes i retur
- [ ] Takk for lånet
- [ ] Kontakt avsender
- [ ] Til arkivering

Herved ~~kopien~~ fotostat av diabas-kart «Grubefjellet 1:2000» som Dir assistent spurte etter. Jeg fant ikke originalen og de sydligste kvadrene mangler. Skal få en original i 1:5000 også, og der er de sydligste kvadrene i 10000 serien inntegnet. Dere får kopi når jeg har funnet den. Godt nytt år

23. jan 86 Gjermund Johansen

Dato Underskrift

DAGHULL DIAMANTBORING 1980, SKOROVAS GRUBER.

GRUBEFJELLET.

HULL NR.	10077	KOORDINAT	35Ø/42	RETN.:	÷90°
"	10078	"	40Ø/42	"	"
"	10079	"	12Ø/83		
"	10080	"	18Ø/83	"	"
"	10081	"	21V/79		
"	10082	"	16V/73	"	"
"	10083	"	10V/63	"	"
"	10084	"	36Ø/38	"	"

	LENGDE:
HULL NR.	50 M.
"	50 "
"	118 "
"	129 "
"	130 "
"	133 "
"	89 "
"	44 "

DAGHULL DIAMANTBORING 1982.

STORE SKOROVATN

HULL NR.	11.001	STED,	6306V/1400N	RETN.:	÷70°
"	11.002	"	5900V/1500N	"	÷100°
"	11.003	"	6000V/1400N	"	÷70°

	LENGDE:
HULL NR.	58,65 M.
"	134,90 "
"	140,— "

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 6

Dato: 5/7-1971 Sign: L.D.L. Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10006

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	212,21		Gr. st. grønn, båndet. Noen mandel styne. Båndingen er andesittisk. Til disse er det knyttet bånd med py imp, generelt svak.		211,00-212,21	1 prøve
215,67			Bånd og større stykker med massiv kis. Mellom disse er det gr. st med rik imp. 2 stk på 10 cm med gr. st med svak imp. Den massive kisen er middelskorning og rik på finfordelt cpy, noen steder meget rik. Imp er overveiende py. Kisen har tynne årer med ren cpy.		212,21-213,90 213,90-215,67	2. prøve 3. -"-
	216,80		Gr. st og andesitt, nærmest breksjert. Grovkorning imp av overveiende py.		215,67-217,50	4. prøve
	227,42		Gr. st grønn-gragrønn. Noe båndet og breksjert noen steder. Varierende oppsprekking etter blom. stikk, store partier er sterkt oppknust. Sterkt varierende for det meste bånd imp av py. Enkelte steder litt cpy.		217,50-219,10 221,10-221,20 221,90-222,47 222,91-223,10	5. prøve 6. -"- 7. -"- 8. -"-
227,70			Massiv kis, middelskorning. En del finfordelt cpy. Noen åren med ren cpy.		227,42-227,70	9. -"-
	229,44		Gr. st. grønn, noe båndet Andesitt og svak imp.		227,70-228,00	10. -"-
	229,82		Andesitt med bånd av gr. st. og py imp. Noen flekker med ren cpy (porfyrisk)		229,44-229,82	11. -"-
		232,24	Gr. st. grågrønn, nesten massiv. Enkelte stikk med blom. itt, hvor det har vært bevegelse.			
	232,52		Gr. st. grønn, med bånd av imp. Rik på cpy.		232,24-232,52	12. prøve
		232,88	Gr. st. grønn, noen mandelstyne			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaporlog

Ark 7

Dato: 5/7-1971 Sign: S.B.S. Retn.: ~ 90° Sted: Hull nr.: 10006

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	233,22		Andesitt med bånd av gr.st og py imp.		232,88-233,22	13. prøve
		234,28	Gr.st. grønn, svakt skf skf=15°			
234,50			Nesten massiv malm av grov-kornet py. Krystaller		234,28-234,50	14. prøve
		234,94	Gr.st. grønn, noe skf.			
235,09			Nesten massiv kis av middels kornig py		234,94-235,09	15. prøve
	235,69		Gr.st grønn med noen bånd med andesitt og svak py imp.			
236,06			Massiv, middelskornig kis som går over i rik grovkornig imp. Den første har noe cpy. Glidespeil, 15°.		235,69-236,06	16. prøve
		238,93	Gr.st grønn, massiv. Spalter noen steder etter blevitt plan. Partier med q og andesitt hvor den virker brekssjert.			
239,07			Nesten massiv kis av grov-kornig py.		238,93-239,07	17. prøve
		240,70	Gr.st noe glinsende grønn Svakt skf. Hvit skjøtemateriale (Wolff) Lite cc i det.			
241,44			Middelskornig, massiv kis av overveiende py. Glidespeil.		240,70-241,44	18. prøve
		242,27	Gr.st. grønn, svakt skf.			
242,40			To bånd med massiv kis, rik på flekker med cc Overveiende py. Grenser 25°		242,27-242,40	19. prøve
		242,61	Gr.st grønn, svakt skf.			
242,82			Nesten massiv kis av middels kornig py. Rik på flekker av cc.		242,61-242,82	20. prøve
		243,09	Gr.st. grønn, svakt skf. Et par tynne bånd med kis			
243,45			Massiv kis av middelskornig py. Litt gr.st. Dårlig glide-speil.		243,09-243,45	21. prøve

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arh 8

Dato: 25/2-72 Sign: ÅBB Retn.: -90° Sted: Hull nr.: 10006

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		244,30	Gr. st. grønn, svakt skf. Noe båndet. Finfordelt cc. Skf = 15°			
	245,40		Gr. st. grønn, noe skf. Båndet fasn imp av py, noen bånd Tett med øyne av lyst materiale. Skf = 15°			
		273,70	Gr. st., grønn, skf., noe glinsende Tett med bånd, linser og finfordelt cc. Bånding og skf. varierer noe, men ligger rundt 30°.			
		284,10	Gr. st., grønn, noe massiv Noen bånd og finfordelt cc. Virker noe middelskornig på grunn av tett med små korn av kloritt.			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Avh 1

Dato: 27/1- 72 Sign: ØB Retn.: -90° Sted: Hull nr.: 10007

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,70	Kjerneløp			
		4,40	Gr.st grønn, massiv. Noen åren med cc.			
		4,70	Blåkvarts Noen spredte bisbom.			
		9,30	Gr.st. grønn, massiv V/9,10 større brekssjert flekk med q og cc. Noe gr.st			
Vikt		13,80	Gr.st. grønn, noe massiv. Uregelmessige bånd av klor.tilvikene gr.st Den massive er noen steder litt andesittisk, med små flyte av cc-q.			
	V					
		15,10	Gr.st. grønn, noe massiv. En del små korn med klorit			
Vikt		16,90	Vekseling mellom andesittisk gr.st og noe båndet klorittrik gr.st			
~~Andgr~~		17,80	Gr.st. grågrønn, noe skf. korn med klorit. Skf = 32°			
		19,70	Vekseling mellom andesittisk gr.st og noe båndet klorittrik gr.st			
Andgr		23,40	Gr.st grønn, massiv med noen andesittiske partier.			
		25,00	Andesittisk gr.st blågrønn, massiv.			
Vikt	26,70		Gr.st grønn, noe uren Litt andesitt. Småfoldet og svært uregelmessige bånd og flekker med py-kis Middelskornig, kompakt			
		30,90	Vekseling mellom andesittisk gr.st, gr.st og andesitt 35°			
		33,80	Gr.st. grønn, massiv. De siste metrene er noe uren			
		42,00	Båndning og sterk variasjon mellom gr.st, andesittisk gr.st og andesitt. Gr.st har et meget uregelmessig klorittinnhold. Skf = 35°			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Avh 2

Dato: 27/1 - 72 Sign: S B S Retn.: ~ 90° Sted: Hull nr.: 10007

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
And gr		44,10	Gr.st. grønn, massiv og andesittiske gr.st med uregelmessige tynne blorittrike åren.			
Vekx.		46,20	Brekssjert andesitt og gr.st med noe epidot.			
		47,40	Andesittisk gr.st med linser og åren av blorittrik gr.st.			
		48,10	Andesitt, noe uren			
And gr st.		51,10	Sterkt andesittisk gr.st og andesitt med uregelmessige blorittrike åren			
		51,80	Gabbrovand, middelskornig bergart Noe skf. Mørke, skinnende spalte flater. Skf = 35°	x/3		
Vekx.		70,10	Sterk vekxling mellom gr.st., andesittisk gr.st og andesitt. Gr.st er båndet med et meget uregelmessig blorittinnhold. Andesitten opptrer i bånd, linser og blærepen. De første metrene er den noe steder brekssjert. Bånding = 25-50°			
		74,40	Gr.st. grønn, noe massiv. Noen blorittrike bånd.			
		74,70	Agglomerat. Andesittiske bolle i gr.st.			
Vekx.		80,20	Noe varierende gr.st med enkelte bånd av andesitt. Gr.st er noen steder båndet.			
		82,30	Gr.st. grønn, svakt skf. Noen middelskornig. Noe båndet. cc-bånd.			
		84,80	Gr.st. grønn, massiv.			
Gr.st		85,20	Brekssjert gr.st blorittrikere gr.st mellom brudd stykkene.			
		88,90	Gr.st. grønn, massiv. Noe oppbrust.			
Vekx.		100,20	Vekxling mellom gr.st og andesitt Gr.st er uren og varierer en del.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 27/1-72 Sign: S.D.S. Retn.: ÷90° Sted: Hull nr.: 10007

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
And gr		107,60	Gr.st. grønn, massiv. Enkelte andesittiske partier			
Veks		109,50	Båndet, urein gr.st. Noe epidot			
		110,20	Veksling mellom andesittisk gr.st og gr.st. massiv. Den andesittiske har tett med små skyv av cc-g.			
		112,00	Gr.st. gulgrønn, massiv. Epidot-rik.			
And gr		120,00	Gr.st. grønn, massiv. Noe andesittisk Noe uregelmessige flekker med g. epidot.			
		122,30	Sterkt andesittisk gr.st. blå-grønn, massiv. Et par breksjert partier			
		124,70	Gr.st. grønn, massiv. Langsgående klorittåren. Brunt med langsgående g-feltspat åren. Rød feltspat.			
		127,50	Andesittisk gr.st. blågrønn, åren med klorit. Langsgående sprekke med cc, g og feltspat(rød)			
		130,00	Veksling mellom gr.st og andesittisk gr.st. De opptrer svart rotet			
		131,20	Andesittisk gr.st. blågrønn, massiv. Klorit-epidot åren.			
Im/g-s		131,70	Meget finkornig, blåsvart bergart. Noe spr.ø.			
		139,60	Veksling mellom gr.st, andesittisk gr.st og andesitt. Til å begynne med er det mest andesitt, senere overtar gr.st. Den siste er noe båndet			
		141,30	Andesittisk gr.st. blågrønn, massiv.			
Veks		144,70	Gr.st. grønn, noe skf., båndet Noen bånd med andesitt og cc. Skf = 25°			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 4

Dato: 27/1 - 72 Sign: LBL Retn.: ÷90° Sted: Hull nr.: 10007

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		159,00	Gabbro, grovkornig. Noen langsgående brekssjerte partier			
		159,10	Gabbro, grovkornig, massiv			
		162,50	Gr.st. grønn, svakt skf. Noen andesittiske linser. Noe cc.			
		165,40	Veksling mellom andesitt og gr.st. Andesitten har en del cc.			
		167,30	Båndet gr.st. Skf. Båndene er nærmest tynn blandrike linser. Noe cc. Skf = 20°			
		181,10	Veksling mellom andesittiske gr.st, gr.st og andesitt. Andesitten har en del cc. Grensen ~ 20°.			
		184,10	Gr.st grønn, massiv. Den siste delen begynner å bli noe andesittisk.			
		184,40	To større uregelmessige bånd med blåkvarts. Noe brekssjert gr.st. mørk grønn.			
		186,60	Gr.st mørk grønn, noe skf. Flere spalteretn. Noe båndning og linser med cc. 25-40°			
		190,20	Gr.st grønn, massiv. De siste 20cm er noe oppbrutt.			
		199,75	Veksling andesitt - gr.st V/199,75 noe tynne bånd med py-imp.			
	199,80		Bånd med rike imp av py.			
		193,10	Gr.st grønn, noe skf. Glinsende, uregelmessige spalteplan i flere retninger.			
		198,70	Gr.st. grønn, glinsende spalteplan. Til å begynne med noen linser med andesitt, senere tett med svære andesittiske linser. Virker noe båndet. Meget tynn imp av py(jern), med noen få tynne bånd. Skf = 20°			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 5

Dato: 16/7 - 1971 Sign: S.B.S. Retn.: ÷ 90° Sted: Hull nr.: 10007

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	201,70		Bånd av gr.st, mørk grønn, glinsende mellom liter av andesitt. Meget tynn imp av py.			
	203,20		Gr.st grønn. Skj.plan med glinsende kloritt. Skj.= 24° Meget tynn imp av py			
	204,45		Båndet gr.st med noen andesittiske striper Mot slutten en del mandelløyne. Båndet imp av py, tynn.			
	205,80		Gr.st. grønn med noen liter som er grå, noen mandelløyne. Ganske rik. Båndet imp av py Grovkornet Noen flekker med cpy.		204,45-205,80	1. prøve
	209,52		Gr.st grønn, noe båndet. Klorittplan i forskjellige retninger. Andesittiske bånd og løyne Partier med grå, noe glinsende gr.st Svært tjern båndet imp av py, noen flekker med cpy		207,60-207,80 208,50-209,10	2. prøve 3. prøve
209,62			Massiv bis, middelskorning Rik på finfordelt cpy.		209,52-209,62	4. prøve
	210,00		Båndlag av gr.st og andesitt. Imp bånd av py.		209,62-210,00	5. prøve
216,00			Massiv bis, middels til grovkorning. Noe oppbrust. Litt cpy som opptrer noe flekkvis, finfordelt og rent.		210,00-212,00 212,00-214,00 214,00-216,00	6. " " 7. " " 8. " "
	216,20		Rik jern imp av py (kvarts.) i grå bergart.		216,00-216,20	9. prøve
217,70			Massiv malm, finkorning Noen flekker med cpy Lite cpy.		216,20-217,70	10. prøve
	219,90		Bånding med grønn og grå gr.st og andesitt. Tjern noe båndet imp av py. Noen bånd og flekker med cpy		217,70-219,90	11 prøve

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Avh 6

Dato: 27/7 - 71 Sign: S.B.S. Retn.: ÷ 90° Sted: Hull nr.: 10007

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
220,26			Massiv kis og rik imp av py med noen tynn bånd gr.st Grovkornig		219,90-220,26	12. prøve
	221,20		Herdet skifrig grågrønn gr.st noe glinsende. Tynn, noe båndet imp av py. 20°			
	224,00		Gr.st grønn Kvarts - feltspat - bånd med imp av py. Enkelte øyne.			
		224,90	Gr.st. lys grønn, nesten massiv			
		225,40	Gr.st, grønn Rik på finfordelt ce og noen åren.			
	226,10		Varierende gr.st grønn og grå. Noe oppknust Imp av grov-kornig py		225,40-226,10	13. prøve
	227,30		Gr.st grønn med uregelmessige andesittiske bånd. Tynn imp i noen partier			
	228,05		Gr.st. grønn, noen bånd og flekker med kvarts - feltspat Imp av py ved disse. Uregel-messige bånd med cpy.		227,30-228,05	14. prøve
228,95			Massiv kis, finkornig En god del bånd og flekker med q Tendens til glideplan. 28°		228,05-228,95	15. prøve
	229,20		Avtagende imp av py i gr.st grovkornig. Mot slutten en del kvit q.			
	229,28		Meget rik grovkornig imp av py i gr.st		228,95-229,28	16. prøve
		229,60	Overveiende q med noe gr.st			
	231,90		Svak imp i varierende gr.st Den går over til andesittisk og grå (kvartsittisk) I den siste er imp noe rikere. I gr.st grønn er skif og båndig 50°			
	233,40		Grå, q-rik bergart med py krystaller og noe kompakt kis. Imp er båndet, rundt 30°		231,90-233,40	17. prøve

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 7

Dato: 9/8-71 Sign: S.B.S Retn.: ÷90° Sted: Hull nr.: 10007

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
Ytkis	234,20		Gr. st. grønn med svak imp			
			Noen linser med qvz, hvorfor			
			med rikere bånd med py-imp			
		238,00	Gr. st grønn, meget rik på			
			bånd og linser med ec			
			Bånding på 25°.			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 1.

Dato: 10/2 - 1972 Sign: ?.?.? Retn.: ÷ 90° Sted: Hull nr.: 10008

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,80	Kjernetap			
		4,00	Svært uren gr.st. Noe brekket og agglomeratisk Lyse flekker og cc. Uregelmessige parallell-oppsprekning			
		6,20	Noe båndet, uren gr.st. Skf. Noen andesittiske biter, og agglomeratiske bånd Skf = 40°			
		7,00	Gr.st. grønn, massiv.			
		9,40	Båndet, agglomeratisk gr.st Lysere boller			
		13,30	Gr.st. grønn, massiv. Noe steder svakt andesittisk. Tett med tynne kloritthrike årer, som gjør at det ser ut som gr.st består av boller Noen kloritt-rike bånd			
		19,00	Gr.st. grønn, massiv. Noe svakt andesittiske partier			
		20,80	Veksling mellom gr.st og andesittisk gr.st Grensen 25°			
		25,00	Veksling mellom uren gr.st og andesittisk gr.st Gr.st er noe mørk grønn, båndet, noe agglomeratisk og sterkt varierende klorittinnhold.			
		26,00	Gr.st. grågrønn, svakt skf. Tett med meget små kloritthrike linser (parallellorientert) Skf = 25°			
		38,20	Samme vekslende bergart som tidligere. Her er det en del uregelmessige lyse flekker og cc. Skf = 25-35°			
		39,20	Gr.st. grønn, noe massiv. En del små lyse årer			
		40,00	Andesittisk gr.st. blågrønn, massiv. Noen flekker med q og cc.			
		48,30	Gr.st grønn, massiv. Enkelte andesitt og andesittiske biter. Noe oppbrutt den første meteren			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 10/2 - 1972 Sign: SOS Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10008

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	48,45		Bånd med py i andesitt			
		49,60	Andesittisk gr.st og gr.st, massiv			
	49,85		Uregelmessige bånd av py i andesitt 10 cm med andesittisk gr.st.			
		59,80	Gr.st. grønn, massiv. Noen grålilaere andesittiske partier			
		60,00	Andesittisk gr.st, noe mørk blågrønn.			
		61,40	Gr.st. grønn, massiv			
		62,20	Gr.st. grønn, uren. Virker noe agglomeratisk			
		62,70	Gr.st. grågrønn, noe skf. Skf = 30°			
		68,00	Andesitt og sterkt andesittisk gr.st. Noen bånd av q og cc Irreddstykker av gr.st			
		70,20	Veksling mellom gr.st og andesittisk gr.st. Begge er noe uren. Lyse flekker og varierende kloritinnhold			
		82,10	Andesittisk gr.st. Oppsprukket etter uregelmessige kloritstikk. Bergarten er noe spred, og den er noen steder mere andesittisk enn andre. Noe q og cc. V/80,20 et 1cm bånd med agglomerat. Cc på begge grenseflatene. 86°			
		85,50	Gr.st, svært uren. Varierende kloritinnhold Lyse årer og flekker Kloritstikk. Noe breksjert og agglomeratisk.			
		92,00	Andesittisk gr.st massiv, blågrønn. V/89 en del gr.st men det er ingen skarpe overgang. Noe cc og q. Også noen klor.t-stikk.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 10/2 - 1972 Sign: ÅB Retn.: ÷ 90 Sted: Hull nr.: 10008

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		100,00	Båndet, uren gr.st med større og mindre partier med andesitt Gr.st har lyse flekker, varierende blorittinnhold og er noe agglomeratisk. Svarte årer og boller. V/99,20 er gr.st sterkt skf. Skf. 32°			
		107,00	Andesitt og andesittisk gr.st. Større partier har et lett nett av blorittåren, så det ser ut som bergarten består av boller. V/103,40 - 103,70 er bergarten sterkt oppsprukket V/104,50 -105,00 er det svært mye g			
		108,30	Gr.st. grønn, massiv. V/107,80 er det tett med små lyse årer			
		109,40	Svakt andesittisk gr.st, grå-grønn, massiv. Langgående brekspente ganger med lyst materiale og gr.st			
		112,00	Gr.st. grønn, massiv. Noe uren Lyse bånd og flekker			
		116,00	Andesittisk gr.st blågrønn, massiv. Noe epidot			
		118,25	Agglomerat. Overveiende gr.st med noen svarte boller. Noe py-imp			
	Vibs.	127,20	Andesittisk gr.st som har tett med bånd og åre med gr.st Disse er noe uregelmessig 35-40°.			
		130,10	Andesitt. Noen åre med gr.st og epidot Noen steder er det nettverk av de samme			
		131,10	Gr.st. grågrønn, glinsende, noe skf. Tett med små linser av blor.tt. 30-35°			
		135,20	Andesitt, blå til blågrønn, massiv Noe uregelmessig epidot og brunaktige flekker av gr.st.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

A-h 4

Dato: 14/2 - 1972 Sign: S.T.S. Retn.: ÷ 90° Sted: Hull nr.: 10008

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		137,00	Veksling mellom gr.st. og andesittisk gr.st Gr.st er noe uren og båndet			
		140,50	Andesitt og sterkt andesittisk gr.st blågrønn, massiv. V/139,60 noen bruddstykker med gr.st. Disse blir skåret av en sprekkefylling med q, cc og rød feltspat. Det er noe epidot.			
		147,50	Veksling mellom andesitt, andesittisk gr.st og gr.st Gr.st er noe uren og båndet.			
		149,65	Andesittisk gr.st som går over til andesitt, blågrønn, massiv.			
		152,40	Gr.st. grønn, massiv Noen små flekker med cc Et par linser med andesitt			
		153,80	Andesitt med noe cc og q			
		160,40	Gr.st. grønn, massiv. Svakt andesittisk noen partier Noen få bånd med andesitt.			
		164,60	Gr.st. grønn, noe skf og båndet Båndingen kommer av andesittiske linser og noe varierende kloritt innhold Skf = 10 - 20^3			
		171,30	Gr.st. grønn, massiv. Noen andesittiske linser.			
		172,10	Gr.st. gulgrønn, massiv. Epidotrik q-bånd og klorittårer.			
		173,10	Gr.st. grønn, massiv. Noe epidot. V/172,45 en oppknust, brekasjert sone. cc.xx.			
		180,50	Veksling mellom gr.st, andesitt og andesittisk gr.st. Gr.st er svakt skf. Andesitten har et tett nettverk av cc.åre.			
		186,90	Gr.st grågrønn, varier mellom svakt skf og skf Noen lyse flekker og andesittiske linser Skf = 10^3			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 5.

Dato: 12/5-1971 Sign: E.B.E. Retn.: ÷ 90° Sted: Hull nr.: 10008

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		192,90	Gr st grønn med andesittiske bånd og linser Gr st er noe båndet og skf Skf = 10°			
		197,10	Gr. st. mørkegrønn som går over til grønn, nesten massiv til massiv Små uregelmessige linser og tynne årer med cc. V/194,50 epidot			
		199,10	Gr st grønn, massiv. Den er noe grovere kornig			
		202,20	Gr st. grønn, massiv Noen cc årer			
	206,61		Uren, noe varierende gr.st med tynne imp av py, noe båndet. Liten bit med noe cpy. V/202,15 er det 1cm med komp. kis.			
207,23			Nesten massiv malm, middels - kornig. Noen biter har mye gangart Finfordelt cpy som opptrer flekkvis og båndet.		206.61-207,23	1. prøve
	207,50		Avtagende imp av py i uren gr. st			
		209.70	Gr. st grønn med mørke grønne sprekker og skf plan. Uregelmessige flekker med q og cc. Skf = 20-25°			
209,86			Nesten massiv kis, noe båndet Overveiende py. Bånding = 20°		209,70-209,86	2. prøve
	216,90		Gr. st. grønn, svakt skf Noe opptreden enkelte steder. Linser og åyre med q og noe cc. Tynn imp av py med noen rikere bånd. Skf = 25°			
	218,82		Grå kvartsrik bergart med jevn noe båndet imp av py Noen biter med gr. st. grønn hvor det er litt cpy		216,90-218,82	3 prøve
219,20			Massiv kis, finkornig. En del finfordelt cpy. Et par tynne bånd med bergart		218,82-219,20	4. prøve

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark. 6

Dato: 12/8-71 Sign: S.O.S. Retn.: ÷ 90° Sted: Hull nr.: 10008

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprove	Anmerk.
	220,93		Grå kvartsrik bergart, med noen linser med gr.st Jevn imp med grov korng pg. Den siste delen har en del cpy, og mot slutten er det bånd med meget rik pg-imp.		219,20-220,00 220,00-220,93	5 prøve 6 prøve
		222,20	Gr.st, noe matt grønn. Nesten massiv med noen blandt plan			
	226,50		Gr.st. grønn, noe urein Linser og øyne med q og cc. Tynn ujevn imp av py. Bergarten er noe oppknust.			
	228,70		Gr. st. grønn til mørk grønn, noe skf. Tynn båndet imp. Skf = 25-30°			
		229,15	Jaspis, rødlig med noe gr.st			
		230,70	Gr. st, grønn, noe skf. Klorit-plan. Noe q og andesittiske flekker. Skf = 20-25°			
		233,76	Gr.st grønn, svakt skf. Meget rik på linser og bånd med cc. Skf = 20°			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arch 1

Dato: 11/1 - 1972 Sign: L.B.S. Retn.: ÷ 90 Sted: Hull nr.: 10009

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1,10	Gr. st grønn, svakt skf. Noe rust på skf flatene. To skf flater på 30° 30° mellom dem.			
V.Vest		14,00	Gr.st grønn, svakt skf. til noe massiv. Enkelte bånd og linser med svakt synsere ledd			
		14,90	Gr.st grønn, noe massiv. Svakt porfyrisk			
		16,80	Gr.st. grønn, noe massiv			
And. Gest		17,70	Uren andesitt, som går over til andesittisk grønnstein den siste halvdelen. Flekker med cc og q. Noe epidot.			
		20,00	Gr.st grønn, massiv. Noen andesittiske linser			
		20,60	Gr.st. grønn, noe skf. skf - 35°			
		25,50	Andesittisk gr.st. og noe epidotrik gr.st. Enkelte flekker med epidot. Bergarten er noen steder nesten middelskornig			
		26,10	Gabbroid bergart som de sier, en går over i en breksje.			
Rødgrå		28,00	Gr.st grønn som går over til blågrønn, massiv			
		29,00	Andesitt og andesittisk gr.st. Linser og årer med cc og q.			
		29,70	Gr.st grønn, massiv			
		30,00	Andesittisk gr.st med noe epidot. Noen py xx.			
Vest		33,20	Gr.st. grønn, massiv. Noen andesittiske linser			
		33,60	Sterkt brudret og små-foldet gr.st, epidot, magnetitt, jaspis, cc, q og py. Tatt ut som prøve.	NB!		
Vest		37,40	Gr.st. grønn, massiv. Noen andesittiske partier. Tynne årer og åyne med cc - q. Noe epidot.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 2

Dato: 14/1 - 72 Sign: BB Retn.: ~ 90° Sted: Hull nr.: 10009

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
and gr.st		39,20	Andesitt og andesittisk gr.st. Tett med åren og dyne med cc-g		•	
Sv.gr.		41,10	Gr.st. grønn, massiv. Noen andesittiske bånd			
		41,30	Sterkt andesittisk gr.st. Blågrønn, massiv, hard			
		41,50	Magnetitt, svartgrønn. Jevn overgang til mørke grønn gr.st på begge sider Noen små pyx	NB!		
		42,20	Gr.st grønn, massiv			
		42,55	Båndning med magnetitt i gr.st og andesitt Noe py og epidot. Båndning = 44°	NB!		
		45,40	Gr.st grønn, massiv. Uregelmessige langsgående cc-bånd			
		45,60	Brekasjert andesitt med noe magnetitt	NB!		
		46,30	Gr.st. grønn, massiv			
		46,75	Bolter med magnetitt i ande. sitt. cc rundt magnetitter. Virker noe brekasjert	NB!		
Hv.gr.		53,00	Gr.st grønn, massiv. Noen partier er svakt andesittisk Tynne åren med cc			
		53,70	Gr.st grønn, glinsende, skf Skf = 25 Foldete plater			
		55,30	Gr.st. grønn, noe massiv. Tett med cc-linser (alle retninger)			
		55,90	Agglomerat Gr.st med noe større bolter			
		57,50	Gr.st. grønn, noe skf. Skf = 25°			
		6600	Gr.st. grønn, massiv til svakt skf En del dyne med cc Noen flekker med epidot			
		67,80	Gr.st. grønn (mørk) skf., båndet. Skf = 25°			
		69,95	Veksling mellom gr.st og sterkt andesittisk gr.st Den siste er svart uren. Epidot og lyse åren			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arkiv 3

Dato: 14/1-72 Sign: L.D.S Retn.: +90° Sted: Hull nr.: 10009

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		70,50	Bånd med magnetitt og finfordelt magnetitt i andesitt Foldet bånd med py Mektighet 5m	NB!		
V.bev.		73,20	Gr.st. grønn, massiv. Flere linser med andesittisk gr.st.			
		73,90	Gr.st. grønn, massiv.			
		75,90	Gr.st, lys, frisk grønn. Svakt skf. Nesten middelskornig.			
V.bånd		81,70	Gr.st. grønn, svakt skf. Andesittiske partier. Skf = 24°			
		81,50	Noen bånd med magnetitt i gr.st.	NB!		
		82,60	Gr.st. grønn, svakt skf. Svakt båndet.			
		82,70	Bånd med magnetitt i gr.st.	NB!		
		84,30	Gr.st. grønn, svakt skf. De første cm noe uren			
V.bånd		88,10	Gr.st. grønn, med linser og biter av andesitt. Den siste er uren			
		88,90	Gr.st. grønn, skf. Mørk på flekker. Linser med ca følger skf. Skf = 44°			
V.bev.		94,60	Gr.st grønn, svakt skf til noe massiv. Enkelte biter med andesitt små flekker med cc.			
		94,95	Bleikvarts, noe lys			
		98,20	Samme bergart som tidligere Skf = 20°			
		99,10	Overveiende andesitt, noe uren			
V.bånd		101,20	Gr.st. grønn med andesittiske bånd			
		101,80	Andesitt.			
		108,85	Gr.st. grønn, noe massiv.			
		113,60	Boller og stykker av andesitt som ligger i et tett nettverk av gr.st. Den første meteren er det imp av py i gr.st.			
		114,60	Gr.st. grønn, svakt skf.			
		128,10	Gabbro, grovkornig. Grense heng 30° Opptrer flere steder. V/123,20 smuldrer den opp. V/128,0-128,10 noen finkornig			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb.4

Dato: 20/-72 Sign: SØ. Retn.: ÷90° Sted: Hull nr.: 10009

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
Gr.st		129,20	Vekslinq mellom uren gr.st og gabbro (middels til grovkornig)			
		132,60	Gr.st grønn, noe shf. Det første skiftet er noe uren. V/130,20 er det andesittisk			
			Shf = 0-5°			
		133,70	Andesitt med (horn og tynne) bånd med gr.st)			
Vekst		150,05	Andesittisk gr.st. med bånd av gr.st og andesitt. Båndingen varierer noe rundt 30°			
		153,20	Gr.st grønn, noe massiv. Andesittiske partier. Noen bånd med andesitt			
		155,60	Sterkt vekslende båndinq av gr.st, andesitt og andesittisk gst. 20°			
		157,50	Uren gr.st med flekker og bånd av epidot og andesitt			
		161,60	Veksling mellom gr.st og andesittisk gr.st. Båndinq. Noe andesitt			
		161,95	Agglomerat. Gr.st med svarte kuler.			
Vekst		168,20	Gr.st. grønn, noe shf. Noen biter med andesitt Shf. 0-10°			
		172,90	Andesittisk gr.st med andesitt partier. Grønnblå. Den siste meteren er sterkt oppsprukket			
Gr.st shf.		191,10	Gr.st. grønn, svakt shf. Noen andesittiske bånd Shf. 10-15°			
		192,50	Gr.st. grågrønn, noe massiv Tett med noe parallellorientert blorstt-flak			
		198,80	Gr.st. grønn, svakt shf. Noen mørkgrønne, glinsende shf-plan.			
		200,90	Gr.st. mørk grønn, båndet og noe agglomeratisk Noe cc. Shf=25°			
		205,00	Gr.st. grønn, svakt shf. Noen partier med mørk grønn, noe glinsende.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 5.

Dato: 24/1-72 Sign: E.B.E Retn.: -90° Sted: Hull nr.: 10009

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		207,40	Andesittisk gr.st, blågrønn, massiv. Noe uregelmessig q.			
And. grst		208,70	Svakt andesittisk gr.st. med linser av andesitt Korn og bånd og tversgående nåler med q-cc			
		217,90	Gr.st grønn, noe skf Mørk grønn på skf plan og langs stilik Skjærende retninger Bånd, horn og finfordelt cc, ikke mye Skf: 25-35°			
Vikv	219,30		Gr.st. grønn, med uregelmessige linser og biter med andesitt svak, båndet imp av py, grov boring			
		219,30	Gr.st. grønn, svakt skf Mørk grønn på spalteflater			
And grst	221,05		Gr st grønn, grå sandig bergart andesitt og q i veksling. Noe båndet synes imp av py. I den grå er den noe ribbene og her er det enkelte flekker med cpy.		220,30-221,05	1. prøve
221,50			Vesten massiv malm, grovboring Mye gangart av den grå bergarten. De siste 5cm er imp. Overveiende py, men noen få flekker med cpy.		221,05-221,50	2. prøve
And grst		225,70	Gr.st. grønn til grågrønn Svakt skf Noen stilik og uregelmessige bånd med cc.			
Vikv	242,40		Noe varierende gr.st grønn til grågrønn. Mørkere på spalteplan Hele veien er det tynne bruddstykker og bånd med andesitt Banske steder tynn imp av py, med noen ribbene bånd (et større ved 22990) Noe cc. Skf. vendt 20°			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Avb 6

Dato: 18/11 - 71 Sign: BOB Retn.: ÷ 90° Sted: Hull nr.: 10009

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
Vibs	247,00		Uren gr.st, grønn, med mørkere spalteflater. Uregelmessige linser, bånd og knudelstyfter med andesitt. Noen 10cm biter med brekasjert q. Disse har en del uregelmessige klumper med cpy. Noe båndet imp av py. grovborret		245,05-245,12	3. prøve
248,05			Massiv kis, middelskorning. Noe jevnt fordelt cpy		247,00-248,05	4. prøve
		265,81	Gr.st grønn. Meget rik på bånd med cc. Skifrig. Den første meteren er båndingen uregelmessig og 40° Videre er den ganske jevn og rundt 25° Noen uregelmessige klumper. Mot slutten øker båndingen til 40° Her er det også noen bånd med andesitt (samme vinkel)			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1.

Dato: 3/1 - 1972 Sign: S.B.S. Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10010

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,90	Kjerneteip			
	-	3,00	Gr.st. grønn, svakt skf. Noen andesittiske liter.			
	✓	8,15	Veksling mellom andesitt og gr.st. Til a begynne med svært tett Andesitten er noe uren, tett med små øyne.			
	✓	11,40	Gr.st. grønn, massiv.			
	✓	13,50	Veksling mellom andesitt og gr.st.			
	✓	14,50	Gr.st. grønn, svakt skf og noe oppknust. Enkelte partier virker noe agglometratisk.			
	-	17,00	Veksling mellom andesitt og gr.st Andesitten er noe uren av cc og q. Flere steder e det små liter og linser av mørkere gr.st.			
	-	20,00	Gr.st. grønn, massiv. Tett med små q-feltspat øyne. En del små linser og årer med mørkere gr.st.			
	✓	22,60	Veksling mellom andesitt og gr.st. Andesitten har noe q og cc.			
	✓	23,60	Gr.st. grønn, oppknust. Agglomeratisk (bare gr.st)			
	-	25,30	Gr.st. grønn, noe massiv.			
	✓	26,40	Gr.st. grønn (gulskjær - epidot) middelskornig, noe gabbroid. Massiv.			
	-	27,50	Andesitt med bånd av gr.st. Varierende vinkel.			
Veksl.	-	28,70	Gr.st. grønn. Meget varierende kloritt innhold, virker mesten finbrekkjert			
	✓	30,10	Gr.st. grønn, massiv.			
	✓	30,80	Agglomerat. Sure boller i en basisk grunnmasse.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Avh 2

Dato: 3/1-1972 Sign: L.O.L Retn.: ~90 Sted: Hull nr.: 10010

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		33,75	Uren gr.st grønn (mørk) svakt shf En del uregelmessige åren. Svakt brekssjert og agglomeratish Noe andesitt Shf = 15°			
		33,90	Gr st. grønn, glinsende Shf Shf = 15°			
		40,00	Gr.st grønn til blågrønn, massiv Andesittiske partier Noe bånd med mørkere gr.st Noe cc.			
		47,30	Andesittisk gr.st blågrønn, massiv. Noen bånd og små linser med cc Den første meteren er noe oppsprukket.			
		51,90	Andesittisk gr.st. blågrønn, massiv Enkelte tynne bånd med gr.st og noe partier med blåg			
		62,15	Overveiende andesittisk gr.st Noen biter med gr.st shf. Partier og ganger med brekssjert q og gr.st Flere steder åren og små biter med mørkere gr.st.			
		62,35	Oppknust gr.st med cc-xx			
		71,60	Overveiende andesittisk gr.st. Bånd med gr.st Disse er noe oppsprukket Varierende vinkler			
		76,50	Andesittisk gr.st blågrønn			
		78,50	Middelskornig, noe gabbroid bergart Grønn, noe gulgrønn på grunn av epidot.			
		80,10	Veksling mellom andesittisk gr.st og gr.st. Begge massiv. Noe cc og q.			
		80,50	Nærmest brekssjert gr.st med q og epidot.			
		87,50	Andesittisk grønnstein. Noen bånd med gr.st. Bånd med q- epidot.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Hvh 3

Dato: 3/1-1972 Sign: E.B.S. Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10010

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
Vekst	~	92,20	Andesittisk gr.st med noen partier med gr.st., massiv.			
	✓	94,00	Andesitt, blå massiv og hard			
	✓	100,00	Vekseling mellom andesitt og andesittisk gr.st. Enkelte bånd med gr.st. 25°.			
	✓	106,00	Vekseling mellom gr.st og andesittisk gr.st. Noe cc.			
	✓	109,60	Gr.st grønn (noe mørk), svakt skf Noen andesittiske bånd. Skf = 10°			
	~	110,20	Vekseling mellom gr.st og andesittisk gr.st.			
	✓	111,10	Gr.st. grønn (noe mørk), svakt skf.			
	✓	121,60	Gr.st grønn (noe mørk) Massiv. Varierende vekseling med et noe surere ledd (svakt andesittisk)			
	~	122,50	Andesitt, blå, massiv. Noe cc.			
Vekst	~	125,40	Gr.st. grønn, massiv Noen andesittiske linser			
klor.		126,20	Gr.st. grønn, skf. Varierende klorittinnhold (linser) Skf = 8°			
	~	127,50	Gr.st grønn (noe mørk), massiv. Klorittrikere bånd			
	~	131,50	Gr.st. grønn (noe mørk) Noen steder svakt andesittisk (blåskjær) Enkelte klorittrikere bånd Noe cc og surere flekker. Begge er svært uregelmessige.			
	✓	139,70	Gr.st grønn (noe mørk), massiv Ganske tett med små dype av cc. Noe få klorittrikere bånd, og noen surere partier			
	✓	144,80	Gr.st. grønn, massiv. Grønnfargen blir jevnt lysere. Noen steder er den svakt skf. Linser tynket			
	~	145,80	Gr.st. grønn, noe massiv Den har et noe gullig skjær på grunn av epidot (finfordelt)			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 4.

Dato: 4/1-1972 Sign: S.D.S. Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10010

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	~	164,50	Gabbro, grovkornig, epidotrik. Noen steder virker den presset, svak båndning.			
	~	167,60	Gr.st, grønn, noe massiv. Tett med tynne epidotrike årer.			
	~	169,65	Gabbro, grovkornig.			
	~	170,00	Gr.st. grønn			
	~	170,40	Gabbro, grovkornig.			
	~	179,60	Veksling mellom gr.st. grønn, skf. glinsende plan og gr.st grønn, massiv (noe andesittisk) Skf = 10-15°			
	~	179,90	Andesitt, blågrønn. Noen uregelmessige årer med q og epidot			
	~	181,10	Gr.st. grønn, noe skf. Båndet variasjon i klorittinnholdet			
	~	181,40	Andesittisk gr.st blågrønn, svakt skf.			
	~	189,50	Gr.st. grønn (mørk), Noen andesittiske partier. De første metrene er det sterk båndet variasjon i klorittinnholdet Båndene er svakt bølget. Gr.st er svakt skf. Skf. 12°			
Vekst						
	~	197,00	Gr.st. grønn, massiv. Noen partier er svakt skf. Noen partier er noe andesittisk, disse har noe cc og q.			
	~	197,50	Andesitt, blågrå, massiv.			
	~	197,95	Gr.st. grønn			
	~	198,30	Gr.st. mørk grønn, svakt skf. nesten middelskorning Årer med q - cc.			
	~	200,60	Gr.st. grønn, noe skf. svakt båndet Skf = 0-5°			
	~	207,40	Gr.st. grønn, noe skf. Noe varierende grønnfarge, og svak båndning enkelte steder. Skf = 5°.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 5

Dato: 4/1-1972 Sign: S.D.S. Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10010

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	~	208,00	Andesitt, blågrå, massiv			
	~	209,20	Gr.st. graagrønn, massiv.			
	~	212,30	Gr.st. grønn, noe shf., svak			
Vekst			bånding shf = 5°			
	~	215,10	Gr.st. grønn, noe shf. Båndning			
			Noen svarere bånd og flekker			
	~	218,90	Gr.st. grønn, svakt shf.			
			shf = 0-5°			
	~	219,90	Gr.st. grønn, noe shf. glinsende			
			flater. Varierende shf.			
	~	220,70	Andesitt, blå, massiv. Svak			
			imp av py			
	~	226,50	Gr.st. grønn, svakt shf. Noe			
			oppknust, særlig de siste			
			meterene. Fem meget tynne			
			imp av py			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

~~Ark 9~~
Ark 6

Dato: 4/11-72 Sign: AJ Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.010

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
229,50 -		230	Grafitt inneh grønn noe skj. Fører en del py-xx			
	✓	232,75	Grst. med meget svake veksling med noe sterk Kloritt bånd V/231,40 = 45° Det hele en god del oppknust.			
		233,33	Gr.st. sandet lys-grønn Middelskornet og homogen Enkelte py-xx lysrødt utover det hele Cpy- i små mengder observert på q-åren (tynne			
	234,87		Andesitt, grønnlig, gjennom satt av q-årer, tynne og grove. Py-xx opptre overalt som en tynn imp			
	2,35,91		Gr.st. uregelmessig og skj. sandet mørk grønn meget oppsprukket og med noe kjernetap Py- finnes som en tynn impregnasjon. Cpy finnes i ørsmå mengder utspredd på skj.-plan			
	✓	239,90	Keratofyr grå grønn, meget finkornet, med cc-striper Ikke så en gul grønn epidot anriket i striper			
	✓	240,40	Keratofyr, men her mere skj og med en del klorit/musk på skj.-planene skj V/239,5 = 32°			
	✓	241,53	Andesitt, kanskje over mot keratofyr. Er grågrønnlig m/ meget fin tekstur. Er meget svakt båndet av epidot Enkelte cc-åren. Andesitt mere typisk grå/blå og ganske homogen			

Syres en del (rør-lengde)
Alle 3m feil (fratrukket 3 m.)
3m ikke korrigert

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 13/11-72 Sign: AH Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10-0/0

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			På spalt flaten opptrer glimmer mineraler.			
	✓	244,18	Keratofyr lettkornet med forekomst av epidot / kl			
	✓	247,15	Andesitt fint homogen grå/blålig, blir mørkere etter hvert Mikro	NB		
	✓	253,16	~~Andesittis grønn~~ keratofyrisk m/ lyse mineraler i overvekt Epidot som er gul grønnlig. Markert svak skj V/248,60 - 16° Tynne magmatitt ~~bånd~~ striper opptrer. Er meget heterogen og skifte i sammensetning ganske ofte På skj-planet et fyllt kl/qt m lag. Mikro	NB		
	✓	253,86	Andesittisk i felt fint men er meget epidotrik i lag og tynne bånd Meget uhomogen			
	✓	258,38	Andesittisk gr st med mye epidot og derved ganske lys er meget fint og tror dette er noe sur men kan ikke se det lys grønngul. Tynne cc-striper langs lagn begynner å opptre			
	✓	258,80	Keratofyr lag med mye kvarts og delvis epiklastisk materiale Er agglomeratisk mot slutten			
	✓	258,93	Gr st. skj med gli-vende spalte plan og meget cc-holdig			
	✓	259,38	Keratofyr som 258,38 - 258,80			
	✓	260,63	Gr st skj, svak ~~gr~~ grønn (virker "tørret" og porøs) Fører en god del cc - som striper, har også q-bånd			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 13/11 - 72 Sign: ~~At~~ Retn.: ± 90 Sted: Hull nr.: 10.010

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	264,10	Grst. som over grønn svakt skj og bändet av et stort innhold av cc. Dette er den typiske kryptbergart for minsomr. Er skj med Skj v/260,50 = 14° Cc-bänd en kanskje ikke så markert som tidligere.			
	✓	267,06	Grst. meget fin til meget svakt skj, er bandet med anrikning av epidot og cc. Også epidot-kalk grønnsten Er skj v/266,20 = 16°			
	✓	268,30	Kvartskeratofyr, meget fin og finkornet. Lys grå/blå Fører rikelig med epidot. Mikroprøve v/267,20 Blir mindre kvartsrik mot slutten	NB.		
	✓	270,89	Epidot-cc grst bändet som over kanskje mindre epidot i denne variantten, men cc meget prominent.			
	✓	271,43	Keratofyr, som over, meget rik på epidot bånd			
	✓	272,52	Uregelmessig agglomeratisk breksje? med mye epidot			
	✓	274,95	Epidot-cc grstein hvor innholdet av epidot varierer meget, mens tynn bånd av cc- ~~x~~ opptrer jevnt Tynne mt-førende soner synes også være tilstede.			
	✓	278,92	Grst meget epidotrik og uregelmessig, evt delvis breksiert. Fører bånd av magn/og jevnes			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 9

Dato: 13/11-74 Sign: AH Retn.: +90 Sted: Hull nr.: 10.010

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		250.00	Gr.st. som er meget oppdelt forandr. vekslende forekomst gangbre grov			
			Til 279,05	NB		
			SLUTT			
			Egentlig slutt på 277,00 –			
			opptegnet →			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 1

Dato: 15/12 - 1971 Sign: SBS Retn.: ÷ 90° Sted: Hull nr.: 1001/

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		1,45	Kjerneta p			
		7,00	Vekslinq mellom gr. st grønn, massiv og gr. st. mørk grønn, noe skf. Den siste delen er det bare bånd av den siste Noen linser med andesitt. Skf = 25°			
		12,20	Gr. st. grønn, massiv Noen klorittrike bånd			
V		21,50	Skiftet varierende gr. st. Blå-grønn, massiv, noen striper tett med små mandelstyne. Klorittrik, skf. Brekssjert, med noe epidot Noe andesitt. Uregelmessige lyse bånd og flekker.			
		29,50	Gr. st. blågrønn, massiv. Noen linser med andesitt Gänger og flekker med q. Virker noe brekssjert og har noe epidot			
	31,00		Gr. st agglomeratisk og brekssjert Biter med andesitt, skarpe grenser Tynn imp av py, noe båndet			
		34,10	Gr. st grønn, svakt skf. skf = 32° Virker hele veien noe agglo-meratisk			
		35,50	Gr. st. blågrønn, massiv, andesittisk Det mørke partiet er noe agglomeratisk			
		36,40	Gr. st. mørk grønn, noe skf. Det første skiftet har meget fin båndinq med cc. Båndinq - skf. = 30°.			
		39,80	Andesitt, blå Noe gr. st			
		42,00	Gr. st blågrønn, svakt skf. Virker noe agglomeratisk			
		44,00	Gr. st mørk grønn til blågrønn Båndet og skf. 20°			
		45,50	Gr. st og andesitt Båndet			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb. 2

Dato: 15/12 - 1971 Sign: S B S Retn.: ÷ 90 Sted: Hull nr.: 10011

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprove	Anmerk.
		46,60	Andesitt			
		48,90	Agglomerat, svare bolder i basish grunnmasse.			
		48,70	Andesitt og gr. st			
		48,90	Gabbro, middelskornig			
		56,50	Sterkt andesittisk gr. st, lite til blågrønn, massiv. De to første metrene noe q med py og cpy			
		58,00	Gr. st grønn, uren. Mørke partier noe andesittisk.			
		59,50	Andesitt med mye q. Uregelmessige årer og flekker			
		70,10	Gr. st blågrønn, andesittisk. 69 til 70 har en del porfyrer.			
		74,00	Gr. st. grønn, svakt skf. Noen porfyrer og lyse flekker, også noen klumper med andesitt			
		76,30	Gr. st. blågrønn, noe massiv			
		79,20	Gr. st. grønn, svakt skf. Bånd med andesitt. Klorittinnholdet varierer noe i gr. st			
		82,00	Gr. st. blågrønn, noe massiv. Ganske tett med små hvite årer, også noen uregelmessige årer.			
		93,10	Båndet av gr. st og andesitt. Gr. st noe skf. Sterkt andesitten har et tett nettverk av cc-årer. Skf - 15°.			
		94,30	Båndet gr. st, noe gulgrønn, glinsende, skf. Noen bånd med andesitt. Skf 20-30°			
	96,10		Grå svakt skf. bergart. Se neste ut som beskrevet før. Noe andesittiske partier. Tett med bånd og linser med py-imp.		94,30 - 96,10	1. prøve
96,45			Massiv malm, med et fint bånd med berg. Middelskornig. Rik på cpy, mulighet noe mørk sl.		96,10 - 96,45	2. prøve

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 3.

Dato: 16/12- 1971 Sign: S.B.B. Retn.: = 90 Sted: Hull nr.: 10011

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	99,20		Grå bergart med andesitt partier nær gr.st. Tett med uregel-messige bånd med py. Noen er vrk på cpy		96,45- 98,00 99,00 - 99,20	3. prøve 4. —"—
	100,05		Breksjert gr.st, kvarts og andesitt med uregelmessige blyser med py. Litt cpy		99,20- 100,05	5. prøve
		100,40	Gr.st grønn foldestrukturer			
	100,80		Breksjert andesitt - kvarts. Flekker med cpy og noe cpy		100,40-101,20	6. prøve
	102,40		Gr.st grønn, noe massiv. Noe kvarts og andesitt Båndet imp av py til 101,20, senere svakt sprekt og tynn			
	10780		Breksjert andesitt og kvarts, 20cm med gr.st på midten Flekker og bånd med py, noe cpy. Foldestrukturer		102,40-103,80	7. prøve
Vekst	10500		Gr.st grønn, noe massiv Diffuse bånd med kvarts og noe andesitt med tynn imp av py			
		106,60	Gr.st grønn noe massiv Enkelte årer med andesitt			
Rutil		111,30	Gr.st. Ugrønn, noe massiv Noe andesittisk En del årer, kvarts og flekker med cc.			
	112,20		Båndet gr.st. agglomeratisk, noe andesitt. Båndet, tynn imp av py. Båndvinkel = 15°			
		113,80	Gr.st. mørk grønn, noe skf skf: 18°			
Vekst		122,00	Vekstling mellom gr.st og andesitt. Gr.st er grønn og svakt skf til noe massiv.			
		123,60	Gr.st. grønn, noe massiv			
		124,10	Breksjert andesitt, kvarts og gr.st			
Vekst		125,00	Gr.st og andesitt			
		130,30	Gr.st, mørk grønn de første metrene, senere grønn Svakt skf til noe massiv. Nesten hele veien rik på finfordelt cc Skf = 17°			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 4.

Dato: 17/12 - 71 Sign: S.B.S Retn.: - 90 Sted: Hull nr.: 10011

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		132,90	Gr. sl. grønn, noe massiv. Andesittiske partier			
		133,80	Gr. sl. mørk grønn, noe glinsende Shf Banding med cc Shf = Banding = 185			
Vibr.		146,80	Noe uren og båndet grøst med andesitt og andesittiske biter En del partier virker noe brekssjert. Noen cc-åren.			
		150,10	Gr. sl. grønn, noe massiv. Noen andesittiske biter			
		152,00	Brekssjert hvarst. grøst og noe andesitt			
Vibr		156,70	Gr. sl. og andesitt			
		157,50	Gabbroid bergart, middelskornig			
1.		163,00	Grøst og andesitt			
		163,50	Gr. sl frisk grønn, noe shf Mørk grønn, glinsende plan Flere retninger.			
		168,80	Gr. sl. grønn, noe massiv. Partier med perfyrer av cc, og en del åren av samme.			
		168,90	Gabbro, grovkornig.			
Vibr		170,00	Gr. sl grønn, massiv. Noen klorittholdige bånd.			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arkiv 1.

Dato: 22/11-1971 Sign: I B B Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10012

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,70	Kjerne tap.			
		15,00	Gr st matt grågrønn, nesten massiv. Litt uregelmessig cc og epidot. Den sist nevnte av det en parallelltgående brekssjert g-gang			
Veks		16,80	Gr st blågrønn, noe urein og brekssjert. Båndning på 22°. Noe andesitt			
	19,44		Samme bergart med svart tynn imp og noen bånd med kompakt kis (tynne) Middelskornig pg. Båndinga ned 20°			
19,50			Tykkere bånd med kompakt kis. Middelskornig pg. Grensen 25° Muligens noe cpy		19,44-19,50	1. prøve
	20,65		Samme imp. bergart			
		24,20	Andesitt, blå, hard, massiv Noe gr st			
		29,40	Gr st. blågrønn, nesten massiv Enkelte kloritthrike bånd 30-35°.			
		31,70	Gr st grønn agglomeratisk struktur.			
		34,20	Gr st. blågrønn, noe massiv sterkt oppsprukket med cc på sprekkene 31° og parallelt.			
Veks		37,40	Gr st. varierer fra grønn til blå grønn. Noen kvartsstykker av lys g-andesitt med skarpe grenser. Noe brekssjert, og mot slutten oppsprukket			
		39,20	Gr st mørk grønn, middelskornig			
Veks		40,10	Gr st grønn, uregelmessige kloritthrike bånd.			
-"-		47,30	Gr st grønn, noe massiv. Biter med andesitt. Noen kloritthrike partier			
-"-		52,70	Gr st grønn, bånd og linser med lys g-andesitt Agglomeratiske og brekssjerte partier			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 7/12-1971 Sign: R.B.S. Retn.: ÷90° Sted: Hull nr.: 10012

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		54,50	Andesitt, massiv, blå (grønn).			
		54,90	Gr.st grønn, noe shf. middels-kornige hornblende.			
Vikr		64,00	Overveiende andesitt, blå. Rikt med gr.st. noe agglomeratisk. q-bånd noe breksjert svart mange striper og linser med gr.st.			
		67,70	Gr.st grønn, massiv. Det første skjellet noe shf.			
		69,40	Noe gabbroidbergart, middels-kornig. Ganger med breksjert q og gr.st			
		74,00	Veksling mellom andesitt og gr.st. Gr.st er noe agglo-meratisk. Den siste liten av gr.st. er noe shf. Shf = 32°			
Rind		74,50	Andesittisk, blågrønn bergart med et tett uregelmessig mønster av rust bergart (q-feltspat)			
Vikr		76,50	Andesitt og gr.st			
		77,50	Gr.st grønn, middelskornig. Små horn med cc.			
Vikr		79,40	Andesitt og gr.st			
Rind gr.		81,80	Gr.st grønn til blågrønn, noe opphmmet. Massiv.			
		90,30	Veksling mellom andesitt og gr.st. Begge (særlig gr.st.) er noe uren med linser og flekker av lysere bergart og cc. Gr.st er noe opphmmet. Spor av epidot. V/89,40 noen bånd med py-imp.			
		90,60	Agglomeratisk gr.st.			
Rind gr.		93,00	Gr.st varierer mellom grønn og blågrønn, noe massiv. Nesten middelskornig. V/91,50 lit med breksjert q og gr.st.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 3.

Dato: 7/12 – 1971 Sign: E.B.E. Retn.: ÷ 90 Sted: Hull nr.: 10012

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
Veksl		100,30	Vekslinq mellom gr.st og noe andesitt. Gr.st er svært uren, båndet, agglomeratisk og breksjert.			
		102,30	Gr.st blågrønn med noe andesitt. Noe breksjert.			
		104,10	Breksjert andesitt og q Noe skf gr.st. skf = 10°			
Anlegg		105,35	Gr.st. blågrønn, massiv.			
		107,70	Breksjert andesitt og q. Noe epidot og klorritt.			
		113,10	Andesittisk gr.st blågrønn, massiv, hard. Uregelmessige bånd med epidot.			
		114,00	Sterkt breksjert andesitt, med noe q og epidot. Hulrom med cc xx.			
Veksl		119,00	Grønt blågrønn og noe andesitt. Oppknust og noe breksjert. Litt epidot og klorittskifer. V/117,45 litt jaspis.			
		120,30	Gr.st. grågrønn, noe skf. glinsende. Skf = 19°			De 7 første metrene er helt til-griset med olje.
Veksl		127,30	Gr.st. blågrønn, noe massiv. Biter med andesitt. Noe oppknust			
		129,70	Gr.st. noe lys grønn, resten massiv. Noen bånd med epidot			
		141,60	Gabbro, grovkornig. Amfibol og feltspat, noe epidot			Kassen var helt omsmidd så det er ikke sikkert det er lagt med riktig.
Veksl		145,30	Gr.st grønn, massiv og noe andesitt, lys blågrå. Breksjerte partier. En del epidot			
		146,00	Skf. gabbro, grovkornig, båndet Noe cc og epidot Skf = 40°.			
		147,90	Gabbro, grovkornig. V/147,90 en 2cm gang med noe som ser ut som ren amfibolitt, noe feltspat 76°			
		149,15	Gabbro, middels til grovkornig			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Avh 4

Dato: 13/12 - 71 Sign: R.B.S. Retn.: - 90 Sted: Hull nr.: 10012

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		149,90	Middels borrig gabbro med noe gr. st. Noen gangen med amfibolitt			
		151,65	Gabbro, grovborrig			
		157,00	Veksling mellom gr.st og ande. sitt			
veksl		155,90	Gr. st. grønn (mørk), massiv Noen biter med andesitt			
		158,75	Gr.st. grønn, noe skf., båndet Mørk glinsende spaltet flate. Noen bånd med andesitt. Noe cc og g.			
		161,60	Andesitt, blågrå (grønn) hard, massiv.			
		176,20	Sterk veksling mellom gr.st og andesitt. Gr.st er noe skf Skf = 15° Noe av andesitten har g-åren på kryss og tvers Noe epidot			
		176,00	Andes.tt, blå(grønn), hard, massiv v/177,70 noe gr.st			
		181,40	Veksling mellom gr.st og andes.tt. Gr.st noe skf og båndet. Skf = 12°			
		189,30	Gr.st. grønn, noen steder grågrønn, Varierer mellom skf og noe massiv Varierende skf., glinsende flater. Noe båndet			
		190,75	Gr.st grågrønn, svakt skf. Skf = 14°.			
		191,90	Gr.st. grønn, båndet, noe skf Skf = 16°			
		192,40	Gabbroid bergart, nesten grovkornig			
	192,50		Gr.st mørk grønn, jevn svak imp av py. Svakt skf.			
		196,00	Gr.st. grønn, noe vann Svakt skf til noe massiv			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 5

Dato: 13/12 - 71 Sign: J.B.S Retn.: + 90 Sted: Hull nr.: 10012

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
Andesit		200,40	Gr.st. blågrønn, andesittisk. Hard, massiv. Noe q. Det første skyfket			
Veks.		201,80	Gr.st grønn, uren. Tett med lyse linser og flekker.			
		203,20	Gr.st. blågrønn, noe massiv.			
	205,20		Gr.st. grønn (mørk) glinsende imp av py (tynn), noe båndet.			
	205,62		R.h. jevn imp av py i gr.st.		205,20-205,62	2. prøve
Veks	207,00		Tynn imp i uren gr.st. Lyse linser og flekker			
	207,57		Gr.st mørk grønn, noe glinsende. Noe båndet imp, en del cpy. Cpy utgnidd på shf. plan.		207,00-207,57	3. prøve
208,37			Massiv kis, med partier med mye gangart (finfordelt q.) Middels til finkorning. En del finfordelt cpy.		207,57-208,37	4. prøve
	209,60		Gr.st. blågrønn, noe massiv. Meget finkorning. Svært tynn imp, et noe ribbet parti			
Hv ?	213,00		Sandig, grå bergart jevn imp av py xx. Sporette flekker med cpy.		209,60-211,00 211,00-213,00	5. prøve 6. prøve
Veks	222,20		Gr.st noe uren, båndet. Noe shf., mørk grønn glinsende flater. Varierende shf. Tynn svært uregelmessig båndet imp av py, noe cpy.		218,63-218,77	7. prøve
	223,70		Andesitt, blågrønn, massiv. Noe gr.st. bånd. Tynn imp av py xx			
Veks.	224,60		Gr.st med andesitt linser. Til disse er det knyttet py-imp. Shf ~ 165.			
Veks		227,46	Gr.st grågrønn, noe massiv. Noe andesitt. Svært mye uregelmessig q.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 6.

Dato: 13/12 - 71 Sign: R.B.F. Retn.: ÷ 90 Sted: Hull nr.: 10012

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
kv.!	228,46		Sandig, grå bergart, fern imp av py		227,46-228,46	8. prøve
Anh	229,00		Gr. st. grågrønn, glinsende. Noe skf.			
kv	230,10		Sandig, grå bergart. Noe skf fern imp av py. Skf = 12°		229,00-230,10	9. prøve
		231,86	Gr. st. grønn, noe skf glinsende plater. Meget rik på kand av cc. Skf = banding = 15°			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1.

Dato: 8/9-72 Sign: A Retn.: -90 Sted: 3750/795 Hull nr.: 10.013

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		4,50	Jordboring			
		7,90	Gr.st fint massiv mork grønn, svakt glimrende med enkelte pg.k. q/cc-åre veksler i tykkelse. Mot bunn et fint vekslende mønster av klorritt over et parti			
		14,50	Gr.st tett massiv finkornet Her grønnfarge litt mork men ikke glimrende som over også her partier med q og cc/åre Senere også tynne skifre av klorritt slik at den på brudd flate er glimrende I virkeligheten den samme bergart som over			
		17,00	Samme som over men her med spor av amygdule fylt med q og cc De synes større mot bunn 1 - 3 mm			
		19,45	Gr.st fint massiv og grå grønn, men blir etterhvert mere klorittrik og får en morkere grønnfarge Samtidig økes q-åre og mere oppknusing. V/18,25 - brekkert i lange tynne fragmenter. V/19,20 - agglomeratlag			
		21,56	Andesittisk gr.st. Mere brunt materiale i vage bånd, men gr.st materiale dominerer. Bergarter er stadig massiv grågrønn De mørke bånd er finere aktig og synes i mengde etter hvert. Er også gjennomsatt av q-åre.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8/9-72 Sign: AT Retn.: -90 Sted: 3750/79.5 Hull nr.: 10.013

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		3307	Vekslende andesitt og gr-st. Gr-st bånd er grønne skifrete kloritiske og ganske skj. V/21,75 · 325			
			De svarte bånd er meget fine og har en blålig grønntone. Det er en gradvis overgang mellom de to typene.			
			De svarte bånd er mere massive.			
			Etter 2 cm blir skillet mellom dem mer markert med lag ca 10 cm av hver vekslende etter hverandre.			
			I de kloritiske partier kan finnes bolle av svart materiale. Andesitt er brekkje eller agglomerat ikke.			
		~~3345~~	Hvit spettet bergart ~~m/~~ m/spetter av feldspat Har massivt preg med noe flatelig preg. Er lysgrønn sammensatt av mørkegrønne	NB.		
		~~3347~~	Andesitt, fin, blågrønn massiv. Enkelte kloritt-fylte sprekk			
		3341	Gr-st. svakt skj grønn gangske kloritrik			
		3361	Andesitt, fin blågrønn, massiv. Enkelte klorit-fylte sprekk.			
		3517	Hvit spettet berga. m/spetter av feldspat i hengen. Bruddflater har noe flatelig preg. Er lysgrønn, mot ligg er den gjennsatt av grønne årer. Dessuten finnes her noe fint fordelt cc.	NB		

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8/9-72 Sign: AI Retn.: ÷90 Sted: 37,50/79,5 Hull nr.: 10.013

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Bær i et parti meget gj.satt av klorittisk skifer. Er antakelig metagabbro.	Mikro prøve		
	-	35.30	Vekst and/gr.st. som tidligere.			
	✓	36,57	Metagabbro, med lite cc. Har her et noe skj preg. Er stadig hvitflekket.			
	✓	39.05	Gr.st. massiv fink. Mork grønn, bare sjelden med mr klorittisk mat og svart mat. Enkelt cc-fylte amygd.	Mikro prøve		
	✓	42,13	Gr.st. noe skj grønn med en del svart materiale i visse deler. Cc-flekket mot bigg.			
	✓	45,30	Som over 36,57 - 39.05 Kanskje noe grovere, men samme farge. Q-årer med foldinger. Amygdaler av q/cc med en 0,1 mm tynn rand av epidot rundt.			
	✓	52,00	Vekst /and/gr.st. Båndig lydelig mot gr. klorittisk skifer og andesitt bånd med vanlende svakhet V/48,53 = 39°, dvs. grense mellom svart og lysere lag. Tar prøve av svart lag hvor det blir lysere etter hvert. Også py. korn i de svarte lag	Mikro prøve		
	✓	56,09	Vekst and/gr.st. Den basiske del i overvekt her og med tette, vagere båndinger enkelte epidotrike lag.			
	✓	59,23	Vekst and/gr.st med			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 4

Dato: 9/9-72 Sign: [illegible] Retn.: ÷90° Sted: 3750/79.5 Hull nr.: 10.013

Kis	imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Stor overvekt av svart mat. De basiske bånd grovere og m/ noen py XX De lyse er lite grå av farge og meget tette.			
	-	60.12	Andesittisk gr.st. meget fint grågrønn massiv, homogen.			
	✓	60.97	Grst lys gr.st. m/ striper av klorit og også større flekker av svart amd. materiale.			
	✓	64.22	Vekst amd/grst m/ g-cc årer og en del amygdaler av cc og g ofte cc Lys grønn, meget svakspaltet med lite innhold av cc.			
	✓	65.80	Sv. skf. Er antagelig en cc-gr.st men mulig også lyst gabbro-aktig. Pa brudd flate mere synlig lyse min.			
	-	69.14	Andesittisk gr.st massiv fine. grågrønn med amygdaler utfyllt i ellipseform lister av cc og ive kvarts er ellers svært homogen Enkelte py XX			
	✓	70.00	Vekst amd/gr.st vesentlig andesitt En oppsprukket men gjennomsatt av cc og g. en blålig grønn og finkornet.			
		71.30	Det samme, men mer gr.st			
		86.90	I Gen skarp vekst. amd/gr.st. Massiv og kompakt. De klorittrike grønne bånd kan gradvis gå over i en grågrønn gr.st			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8/9-72 Sign: H Retn.: - 90 Sted: Hull nr.: 10013

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			som igjen har gradvis overgang i Anderitt De mer klorittiske partier er økt og med noe epidot Også noen py-xx Meget sma cc.-anydule opptrer ofte, Q-anygd. Også tilstede men noen veksling blir mindre hyppig mot Sutten.			
	~	88,40	Andesittiske gr.st.	Mikro prøve		
			Meget tett ~~st~~ finkorn. er blålig grønn, med grønt skjær på bruddflate. Det er ønskelig bedømme SiO_2 gehalt. Har en noget rar og spredt bånding av mere klorittisk mat.			
	~	91.53	Det samme som over men med hyppig mere grønnt materiale. Grenseflate V/ 88,40 = 36°			
	~	92.80	Gr st fint homogen med grågrønn farge som noen få py-xx			
	~	93,25	Gr st lysgrønn middelskornet homogen. også her noen py-xx Har tekstur som en metagabbro.			
	~	93,52	Veksl and/ gr.st			
		95,20	Gr st grønn finkornet og homogen, her og der gjennomsatt av tynne carbonat årer. Enkelte py-xx			
		95.68	Q-åre			
	~	96.09	Gr st tett, fint grønn som over med et enkelt mer storre bånd			
	~	97,66	Gr.st lys grønn middelk.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 6

Dato: 6/9-72 Sign: AJ Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10.013

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			som over men spottet mer og der med enkelte stor g-flekker			
	✓	103,00	Vekst. and/gr st. med tydelige bindinger av sort og klorittiske materiale. De to typer opptrer sammenlinsen i hverandre. Noen flekker av cc lite cc - i bindemm. Klorit fyller ofte sprekk			
		108,35	Lagen vekslende and/gr st. mer er mer markert en nom sjiktet i urgalmessig bånd og "klumper" Kan misstenkes for å være et meget grovt agglomerert lag Synes som det vesentligste er meget sort finkornet materiale m/ skarpekantet bruddflate. blågrønn i farge. Det basiske med variasjon i farge fra grønn til brun grønn også tegn på foldning (små foldinger) nikkelig m/ g - og cc - årer og kløfter En del pyx>	NB		
		~~111,31~~	Bånding V/108,22 - 44°			
	~	114,31	Veksl and/gr. av — normal type m / mest sort mat.			
	~	115,67	Gr. st. fink. mørk grønn homogen, med en del g-fylte amygdaler i størrelse 1mm - 10mm.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8/9-72 Sign: [illegible] Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.013

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	~	122,22	Vekst. and/gr.st med varierende kvart/kvarsich Er også her ganske ekstremt nesten som et grovt agl. Mye blandt.			
	~	124,25	Gr.st homogen grønn middelskk. Lit fin. men spaltet med mye feltspat. En del q-ån			
	~	124,42	meget kvart material med klorittstikk			
	~	124,85	Gr.st mørkgrønn, antagelig mere kvarts og derfor andesittisk			
	~	127,73	Gr.st. med en del veksling av kvart mat. men dett er minimalt. Mørkstille ører lett kvarts delen mm q- cc -stikk			
	~	132,08	Andesitt fink. og med bare få brune med mere klorittisk material, Er andesittisk gr.st Noen amygdaler av q			
	~	133,75	Vekst amat/gr.st med svage vekstinger og med hovedvekt på basisk mat			
	~	134,26	Gr.st lys grønn, skt m skt v/133,85 = 17° Meget klorittrik og med noe cc. Spaltet hvitt utseende			
	~	135,73	Gr.st massiv, finkornet grønn (noe mørk) En del q-cc åren			
	~	136,72	Som med skt gr.st Er litt lysgrønne litt hvit-striper men fin etter hvert utseende av agglomerat			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8/9-72 Sign: AI Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10.013

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			med runde korn i en grønn matrix. Korn fra Q og cc og er lyse. Mot lagg avtar storrelsen og de blir mer og mer diffuse			
	✓	139,10	Gr.st. midd.k til fink gr. av og til meget tynne - gg - striper. Mot lagg kommer mer mørk materiale inn. Også noe oppknust.			
	✓	146,50	Vekslende and/gr.st. med vesentlig gr.st. materiale med en del amygdaler og noe gg-xx			
	✓	150,23	Gr.st grønn. fine og meget homogen og massiv. Enkelte tynne og diffuse band av en mere klorittisk type her og der Q og cc-årer og flekker i ingen sjeldenhet. Mindre amygdaler finnes. De siste 20 cm meget oppknust			
		151,23	Kjernetap.			
	✓	152,78	Vekst and/gr.st Meget oppknust. Q-årer			
	✓	154,13	Gr.st synes nå mer midd.k er lysgrønn svakt spettet.			
	✓	156,75	Metagabbro, lys grønn og hvit/grønnspettet, er middels-kornet og tydelig tektonisk påvirket i hele er det vanskelig finne grense gr.st./gabbro men Gabbro har en svak striping her med en utstrekning av plagioklorne. Det finnes også små mengder cc.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 9

Dato: 8/9-72 Sign: ✓ Retn.: ~90 Sted: Hull nr.: 10.013

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Den er her fuk. men blir ikke ettersøkt grovere og i sentrum nesten upåvirket			
			Mikroprøve ved 155.10	Mikroprøver		
			Det samme skjer andre veier. Bergart blir finere og ved kiag er en god del epidot utskilt. Også spor av skif og oppknusing.			
	✓	161.85	Vekst and/gr.st. synes vesentlig agglomeratisk eller breksjert. En del cm-store pyr-ansamlinger finnes. Like så typiske py-xx.			
	✓	163.80	Gr.st. fuk. grønn men er uhomogen og meget oppsprukket i store partier. Enkelte tynne svarte bånd opptrer			
	✓	163.90	Sleppemateriale (kleine)			
	✓	168,46	Gr.st. som over. Begynner å få mere homogent preg men er fortsatt tydelig tektonisert med tynne tynne Ce-g.åre. Også flekket av små cc-rosetter			
	✓	171.15	Andesittisk gr.st Fuk. Mørk grønn med grønne skjær på lenddflat. Finkornet, er en god del oppsprukket mot blottet			
	✓	172,59	Vekst and/gr.st. Ofte oppknust og med kraftige g.åre.			
	✓	172,97	Andesitt.			
	✓	174.69	Gr.st. fuk. og svak skif. Rik på kloritt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 10

Dato: 8/9-72 Sign: A Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10 013

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			og sortgrønn glinsende på lagflatene. Her er meget fin cc-spetting i pegmatitten samt tråder og årer av q/cc Noe oppknust de siste 10 cm.			
	-	175.02	Vekst and/gr.st. mest basisk mat			
	-	177.10	Anderittisk gr.st finkornet mørk med lyst typiske grønnskjær. Mot lag er det rikelig med årer og klyser av epidot			
	-	179.53	Vekst. and/gr.st mm vekslinger av vagg og bare på steder er det lyslig stort materiale. Er særdeles sterk oppknust i 178,80 og 178,60 Går jevnt over i neste bergart som er: Gr.st massiv finkornet homogen og gansko mørk grønn.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 13/7-72 Sign: A H Retn.: ÷ 90° Sted: ~37½/79÷15 Hull nr.: 10.013

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		180.80	Gr.st. skf med mye uregelmessige årer av cc.			
		181.70	Gr.st svakt skf. grønn med homogen tekstur skf. 22°			
		183.50	Gr.st noe skf med mange cc-bånd, dels med mere massive lag av gr.st.			
		188,65	Noe mere massiv grønnst. uten tydelig skf. med enkelte mere angl.s. bånd Er en god del oppsprukket. Gjennomskåret av kv/cc-åårer nå og da og enkelte spetter m/cc.			
		191.40	Vekslende and/gr.sten Er også homogen stjeners og enkelt kvartsåre Blir mere cc-årer mot ligg samt noe oppknust. gr.st. bandene fører noe cc.			
		193.65	Gr.st. grønn, skf med tynne cc-rike bånd som følger lagning Skf v/19180 : 30° Cc opptrer mer eller mindre			
		197.-	Massiv, gammel homogen gr.st			
		198.40	Vekslende and/gr.st. Ved ligg. 10 cm med agglom.	ND.		
		200,75	Noe skf gr.sten fører noe cc som spetter og som tynne lag. Kan føre begrensede partier m/ vekst and/gr.st			
		201.40	Gr.sten massiv og homogen enkelte spetter av cc og enkelt bånd noe mer kloritthik			
		204.80	Vekslende and/gr. Er meget finbåndet og svært diffus. Homogen.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 13/7-72 Sign: AH Retn.: ÷90 Sted: ~371/2/79-15,5m Hull nr.: 10.013

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		206,30	Grønsten massiv, ikke helt homogen. Føren en del cc som spalter og uregelmessige årer. Ved 205,60 10 cm med svake py-imp.			
		206,60	Grønsten massiv kalkrik og tett.			
		212,30	Grønnst. massiv og homogen. Med noen få cc-rike partier i heng. Senere gangske ofte åre av kv. Blir helt massiv og tett mot ligg og føren her enkelte py-korn.			
	213,-		Grønsten skj. med enkelte tynne and. bånd. Skj v/213,40 = 30°			
	~~215,~~-		Meget svake py imp som i ligg en meter. Her ser det forvitring ut til å opptre agglomerat.			
	213,50		Meget rik imp av py. Innimellom tynne kvarts-bånd og kloritt bånd. Grønsten grove py.		213,0 – 213,50	1. prøve
	214,20		Vekslende and/grønst med mm-tynne bånd av py. Som sum er meget svake imp			
	214.45		Samme bergart men her noen rikere imp også opp knyttet til kv/cc-bånd		214,20-214.45	2. prøve.
	215,65		Vekst. and/grønst. med meget svake py-imp vekslende med smale men noe rikere py-imp partier.			
		217,65	Svakt skj grønst. med ofte cc-bånd			
		221,40	Grønst. andesittisk massiv og meget			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 13/7-72 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: ~37½ø/79÷15,5m Hull nr.: 10.013.

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			homogen. Er grønnblå og svak glassaktig på bruddflate. Fører py-korn nå og da			
	222,80	2	Massiv gr.st. ikke homogen men og med cc. spetter og bånd Også en svak py-imp i enkelte partier			
	224,75		Gr st massiv og mindre kloritis grønnblå og glassaktig med imp av grove py-korn. Sum imp en fattig. Også gode kv-årer			
	226,85		Gr.st men grønn med mer klorit i bånd. Meget svak py-imp. Er i liggpartiet sterkt oppknust med tydelig sleppet fylt av leirmateriale Blir mere homogen het mot slutt.			
	228,20		Gr st homogen men oppsprukket Her ca 5cm m/imp hvor cpy opptre tydelig Senere en jevn py-imp men cpy opptre som ugredte korn i bergarten Det opptre også et parti med meget grov py- nesten massiv.		227,15 - 227,75	3 prøve
228,70			Massiv malm noe oppknust. Ganske grov py synes fri for cpy		228,20 - 228,70	4 —"—
	228,92		Gr st skj med mye cc-korn spetter og med py i tynne striper			
229.50			Massiv malm. ganske grov Py synes være lite cpy Enkelte kv-bånd, Noe klorit mot ligg. Ganske cpy.		228.92 - 229,50	5 —"—

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 13/7-72 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: ~37/8/79÷15 Hull nr.: 10.013

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	229,85		Grst svakt skf m/cc og ganske mye py-imp			
	230.05		Ganske rik imp og grov py i kvartsrik grunnmasse Det opptrer også noe cpy		229,85 - 230,05	6 prøve.
	230,90		Gr sten massiv grønnlig og glassaktig på brudd Fører spredt py-korn enkelt korn, en noe oppknust.			
	231,40		Py-imp i kv-grunn-masse ganske rik, uten cpy		230.90 - 231.40	7 — " —
	232,00		Meget rik imp av py også mye oppknust.		231.40 - 232,00	8 — " —
235,55	~~235,55~~		Massiv malm Til å begynne med ganske grov og med noe grafitt Vesentlig py. Blir tettere etterhvert og kan antagelig holde noe cpy		232,00 - 233.00	9 — " —
					233.0 - 234,0	10 — " —
					234,0 - 235,0	11 — " —
					235,0 - 235,55	12 — " —
	235,75		Grsten massiv med q-åre og py-imp			
236.40			Massiv malm, er tett og homogen og bør føre noe cpy		235,75 - 236,40	13 — " —
	237.04		Meget rik imp i en noe skf. grst. Kan ikke si om noe cpy Noen kv-rik bånd her og der		236,40 - 237,04	14 — " —
		237,63	Grsten skf og kalkrik i tynne striper langs sagene Skf v/237,40 = 163°			
237,76			Massiv py-malm, homogen noe cpy		237,63 - 237,76	15 — " —
	240,20		Grst skf med tynne mm-bånd av ~~cpy~~ py og spredt kalkrik			
		241,60	Vekslende grst/grst m/ kv og cc-bånd			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 13/7.72 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: ~37½ ø/79÷15,5m Hull nr.: 10 013

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		245,50	Kalkgr.st meget rik på kalk Skf og skf v/246,30 : 245			
		248,42	Vekslende /and /gr.st som er svak og dels hårdt sterkt kalkrikt og kan være kalkgr.st SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/10-72 Sign: A Retn.: ~90 Sted: Hull nr.: 10.014

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		~~3~~,57	Vitrøst and/gr.st. Synes svakt epidot-rik. Oppknust.			
		5,10	Andesittisk gr.st. lys grønn grå farge, på bruddflate finkornet og homogen. m/py-xx			
		7,51	Lagen veksler, men med svakt vag båndig. De lyse bånd er gjennomsatt av epidotnettverk og det hele ser i partier hydrotermisk ut			
		10,86	Gr.st grønngrå litt mørke fine ganske homogen og tett. svært lik q-arc. Finner bånd av mer andesittiske materiale.			
		11,18	Agglomerat m/ små baller i lys grønn matrix			
		12,56	Gr.st kanskje noe andesittisk i partier. Grønn og fin. Fører en del utstrekte og q-fylte amygdaler.			
		13,11	Agglomerat og med store utstrekte baller? av samt materiale			
		13,90	Gr.st. meget tett og fin mørk grønn og med q-amygdaler.			
		15,31	Gr.sten grønn tett, fin, homogen og med py-xx ganske ofte. Blir meget svakt skj. etter hvert.			
		16,75	Aglomerat båndig m/ lyse store brudd stykker mendelte av q og noe cc i en lysere klorittisk grunnmasse			
		18,55	Vitrøst and/gr.st. hvor gr.sten er homogen og fin og dominerende. Oppsprukket			
		19,95	Gr.st ganske mørk grønn tett og middelskornet. En			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/10-72 Sign: AJ Retn.: ± 90 Sted: Hull nr.: 10 014

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			del anrygduler. Er svært oppsprukket.			
		20,34	Andesitt, blågrå uten spesielle kjennetegn.			
		21,10	Gr.st middelskornet, noe svak foliering og foren ce. Er lys grønn			
		25,17	Gr.st grønn felt finkornet m/py-xx. En del q-årer rustne. Veksler litt med tynne svarte lag. Er svært oppsprukket.			
		26,25	Gr.st noe skj og svart kloritthold. Sort glinsende flater Skj v/26.05 = 19.8 Er helvegis oppsprukket.			
		29,85	Gr.st gr.grønn felt finkornet veksler med noe mere innslag, men ikke ofte			
		30,77	Aglomerert? Det hele kan være breksje.			
		35,12	Veksl. and/gr.st til først diffust men mer og mer markert. En del q-årer			
		35,41	And av mørk lys type nærmest kvartsfyr.			
		36,20	Gr.st svakt skj og grønn holde mye cc Skj. v/35,50 = 27°			
		47,83	Veksl and/gr.st vesentlig and. grønn veksler m/ små bånd av klorit. I forbindelse m/ rumbåndet v/37,80 og 39 opptrer fine py-årer regelm. båndet. Ellers hvert leie berg mere grønn i farge p.g.a mere klorit og mer markert båndings, det hele virker aglomeratisk Py. ofte i tynne bånd			
		49,53	Andesittiske gr.st. blågrønn			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 2/10-72 Sign: [illegible] Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.014

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
			tett og fink. inhomogen og mye oppsprukket, m/ q amygdaler.			
		58.90	Gr.st grønn og meget homogen men oppsprukket Noen små amygdaler fylt m/ cc- og q.			
		58.94	Gr st grønn, middk. noe flekkig og hvit-sjekket p.g.a. litt cc.			
		60.00	Gr-st grønn. noe mørk tett fink homogen sjelden py-xx.			
		62,15	Gr st grønn lysere enn ovr- og antagelig vanlig av samme type py-x v			
		63.90	Gr.st. andesitisk meget homogen Grønn.			
		68.42	Gr st. tett noe mørk grønn homogen.			
		69.89	Gr st lysere grønn, fin- til middelsk. Homogen			
		70.80	~~andesitisk~~ gr.st. tett grønn og fink homog.			
		72.42	Veksl and/gr.st hvor veksling ikke er tydelig			
		78.62	Gr st litt mørk grønn tett. og fink. homog. Blir litt skj i partier.			
		79.15	Aglomeratisk men diffust. Gr.st litt mørk tett homogen m/ cc amygdaler			
		85.85	Enkelte brede q-striper ofte med grov py. Q-amygdaler mot slutten Middels til finkornet Blir finere-kornet mot slutten.			
		86.00	Kvarts keratofyr. hvit grov med noe grønt materiale ofte klorit-fylling i brekkje sprekker. Noe grov py			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 18/10-72 Sign: AT Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.014

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		89.63	Pyroklastisk, vesentlig med grønt materiale, men legn til q-rike boller etc. Blir etter hvert svært oppknust og uregelmessig			
		92.~~17~~	Vekst and/gr.st. Vekst ikke markert. Inni 1-mm q-amygdaler. Kan etter hvert inneholde middelkorn gr.st. Amygd øker i størrelse etter hvert.			
		92.40	Andesitt blågrå finkorning med markert liggrense Bånd V/92,40 = 55°			
		94,43	Gr.st. grønn tett fink med aglomeratlag og ganske store amygdaler.			
		95.04	Vekst and/gr.st homogen.			
		96.26	Gr.st. grønn, midd-fink homogen og tett.			
		99.28	Gr.st grønn over mot med jevnmellom rom finner 15 cm mektige aglomeratlag			
		102.62 ~~99.28~~	Gr.st svakt andesittiske ~~til~~ middelskornet og svakt homogen.			
		103.46	Gr.st grønn og meget fink. Fører en del kloritiske partier Samt 1,5 cm med fink py i svakt bånd			
		108.32	Vekslende mellom samme gr.st. som over og pyrokl lag. Man finner også 5 cm keratofyrlag V/104,15 m: Et svakt lag med py og kanskje noe nk. skarp bunngrense Båndlag V/103.46 = 46°			
		108.85	Gr.st ganske fink men mørk grønn.			
		109.75	Gr.st meget lys grønn og meget cc-rik			

Ark 5

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 18/10-72 Sign: AI Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 1004

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		110.99	Gr.st grønn tett fink og meget homog.			
		110,62	Gr.st noe svakt fink og vekslende med diffuse svarte lag			
		115.57	Brekspert agglomerat? Meget uregelmessig med liter av svart mat og klorit som grunnmasse. Synes samtidig ha en lagning, dom 4/111.80 = 22° Disse går gradvis over i en oppsprukket bergart hvor mest av alt er tufft på sprekkene Innimellom finnes også partier med en fink svakt skif grønn gr st. Er også svært oppsprukket.			
		116,85	Gr.st andesitisk ganske svakt fink. men ganske homogen			
		120,73	Samme som 111.62 - 115,57 men her mye mere ruskent og oppsprukket Det hele ser ut til i vær en del og en skjæresone som har konsolidert. Er meget stiff og klorittisk (Kanskje talk?)	NB		
		121,66	Agglomerat som veksler noe med bolden størrelse og skarphet			
		126,86	Vekslende and/gr st og her synes det som hele tiden være i overvekt. Er delvis ganske oppknust			
		128,50	Gr.st mørk gr. glisende sort på spalte flate også i denne noe svarte lag. Fører en meget spredt pyr-imp Oppknust			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 13/10-72 Sign: AI Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10-014

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		129.73	Andesitt, blågrønn fin-k. og med glassaktig på bruddflat. Ellers homogen.			
		130,48	Agglomeratisk breksje, meget kalkrik. Stikk m/keramalitt-belegg.			
		137,40	Andesittisk gr.st. er meget oppknust og kjerne mangler i partier. Kjernetap = 70 cm fra 131 - 138	NB.		
		142.25	Vekslende amf/gr.st som er sterkt oppknust og finnes i små biter. Kanskje riktigst å kalle dette for en tuff. Det synes ledd dominere og derfor rhyolitt-tuff ??	NB.		
		143,00	Kjernetap			
		144,00	Vekslende som over rhyolitt-tuff. Med typiske gjennomsiktige glimmer aktige mineraler.			
		145.00	Kjernetapp			
		145,51	Breksjert sur bergart med mye klorit-materiale imellom			
		155.04	Vekslende grønnsten og andesitt Gjerne kalt andesitt-tuff Ikke så svart ide basiske ledd er gr.st mørk grønn ofte med glinsende skj. plan Men ingen markert skj. Bergart er massiv, men noe oppknust Har vesentlig karakter av å være mest basisk			
		155,53	Gr.st mørk grønn massiv og finkornet. Enkelte plan er gjerne svart glinsende			
		155,70	Andesitt, blågrå lett og finkornet, homogen Lagt V/155,70 = 229			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 7

Dato: 2/11-72 Sign: AH Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10014

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		156.87	Vekst gr.st/and. med hovedvekt på basisk materiale			
		158.50	Andesittisk gr.st. meget oppknust og uregelmessig, er ved en blandingssone, men g-innhold har økt sterkt. Den siste ½m. med tynne agglomeratlag.			
		160.08	Keratofyr, meget uren men med 15-20 cm bånd av typisk grå keratofyr Men som regel i blandet grønt materiale og med agglomeratiske bånd. De rene keratofyr viser av og til tynne sonar parallelt av g.			
		161.00	Andesittisk gr.st, meget oppknust.			
		161.98	Andesitt (ledet kanske keratofyr) gråsvart, lys vre flate og massiv.			
		167.34	Andesitt blågrønn meget finkornig og massiv men en del uren med feldspat i striper og bånd. Blir renere etter hvert men kommer samtidig opp på sprekkene er det ofte et hvitt-pulver som ikke svelle.			
		167.48	Gr.st. lys grønn og litt skj.			
		168.62	Andesitt eller mot and/gr.st. Er mørk blågrønn tett fink og homogen.			
		171.02	Vekst and/gr.st. Rom kanskje inneholde agglomeratlag med store boller. Vesentlig ant materiale Blir basisk mot slutten.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 8

Dato: 2/11-72 Sign: AT Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10 014

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		173,00	Andesitisk grst en fink meget massiv og homogen får en gradvis overgang til andesitt.			
		173,97	Andesitt lilalig grønn felt og noe oppknust			
		175.00	Keratofyr grågrønn meget fin-kornet og felt. Også noe oppknust, sjelden gjennomsatt av kloritt-stikk.			
		176,48	Andesitisk grst noe mørk grønn Fin-kornet og homogen til å begynne med Py-xx nå og da			
		178,63	Andesitt og igjen meget oppknust.			
		179,05	Grst. tykk lys grønn og meget oppknust Fører mye cc.			
		179,15	Keratofyr - bånd			
		192,42	Vekslende/grst felt lagvis meget oppknust Det svake ledd dominerer. Vekslingen er meget storgrønn med 4-5 cm basisk og 6-7 cm surere materiale.			
		192,67	Grst mørk grønn, kvartset og magnetkisimpregnert med glinsende sorte spalteplan (skjærplan).			
		194,43	Vekslende/grst. på samme måte som 179,15 - 192,42. Blir sterkt oppknust på slutten.			
		196,00	Grst grønn, noe mørk fink ~~meget~~ ikke helt homogen. Svak skj nå og da, men ikke målbar. Også denne oppknust.			
		198,00	Andesitisk grst. mer sterkt oppknust. Noe py-xx			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 13/7-72 Sign: AH Retn.: -90° Sted: 40a/70 (71½) Hull nr.: 10.014

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		200,40	Massiv grst. homogen noe oppsprukket m/ enkelte py-korn.			
		201,60	Grst svakt skj og hyppige cc-sjetter			
	201,82		Sterk py-imp i en hvit kvarts/cc-rik grmasse.		201,60 - 201,82	1. prøve
		201,95	Skj Grst svakt gjennom avtagende på bruddflate			
	202,05		Cpy-rikt bånd sammen med py somen nyere feltet		201,95 - 202,05	2. —11—
	203,30		Grst svakt skj og varierende sterkt/svakt impregnert vesentlig av py, men cpy er anriket i enkelte lag.		202,38 - 203,25	3. —11—
203,70			Massiv cpy-rik malm foran en del kvarts som gang-min		203,30 - 203,70	4. —11—
	204,36		Grst. noe skj. med ofte cc-sjetter og bånd en uregelmessig imp finnes. Her og der kan cpy-korn sees.		203,70 - 204,36	5. —11—
		205,80	Grst. gjennom massiv og homogen			
	208,80	?	Vekslende and./grst og ujevnt homogen. Bare enkelte py-korn til å begynne med men blir mere ofte hyppig. Også en del cc etter hvert.			
	209,80		Massiv gjennomhomogen grst med sporvis imp hvor imp er sterkest en bergart andesittisk.			
	213,05		Vekslende and/grst og med kv-rikere lag. Disse er mere impregnert enn andre		209,80 - 210,80	6. —11—
					210,80 - 213,05	7. —11—

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

10.

Dato: 13/7-72 Sign: A Retn.: ÷ 90 Sted: 40φ/70(71½). Hull nr.: 10 014

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Enkelte lag kan sees å være agglomeratiske. Det er mulig det finnes en del cpy. som enkelt-korn			
	216,60		Stenket imp bergart, bs-rik og fører cpy. i enkelte tynne bånd. Imp er ellers ganske grov cpy.		213.00 - 214.60	8. grove
					214.60 - 216,60	9 — " —
	218,40		Grei mer mye sort materiale og med mindre cpy-imp mindre cpy også		216,60 - 218,40	10. — " —
218.74			Massiv kis, blir cpy rik i den nedre halv-del. Enkelte finkornet		218,40 - 218.74	11 — " —
		221,40	Massiv homogen grei med ingen imp. Har kraftig utsondring av kvarts.			
	221,99	½	Samme grei-sten men nå med en spredt imp av cpy. Svake			
222,20			Massiv, tett og homogen kis, kan være cpy-førende		221.99 - 222.20	12. — " —
			Massiv homogen grei.			
	224.10		meget tett og med meget svake cpy-imp. Delvis også andesittisk.			
	224,30		Imp i kvartsrik grunn-masse. Py		224.10 - 224,30	13. — " —
227,51			Massiv kis. tett og finkornet. Skulle tro at det finnes noe cpy		224.30 - 226,-	14. — " —
					226,- - 227,51	15 — " —
		227,65	Grei. massiv og homogen			
228,15			Massiv malm, mere grov og uhomogen Er Cu-fattig		227,65 - 228,15	16 — " —

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 13/7-72 Sign: at Retn.: ÷90° Sted: 406 / Skorovas (71/72) Hull nr.: 10.04

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	230.30		Andesitt med svak py-imp i enkelt korn q-årer og årer med kloritt En del oppsprukket.			
	231,10		Massiv grøn med svak py-imp			
		234,55	Massiv og homogen finkornet grøn. Er Grønn Cruppe andesit.			
	235,-		Sterk imp av py i en ko-rik grunn-masse		234.55 - 235,-	17 prøve
235,90			Massiv kis, tett, kan ikke se cpy Er i midt-partiet oppknust.		235,- - 235,90	18 -"-
	236,31		Kvartsrik (sand) med enkelt imp-bånd		235.90 - 236,31	19 -"-
		237,50	Kalk grøn meget cc-rik og skf Skf v/236,55 - 237			
		238,55	Massiv og homogen grøn, grønn blå enkelte py-korn			
		239.80	Grønn svakt skf og mere kloritrik			
		240,30	Svakt skf grøn, med kalk-årer og spette-. Også rikt m/ko-årer.			
		240,41	Kalk-epidot bergart også med varierende mengde kvarts. På vår skive er den grønne glassaktig SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25 aug Sign: R S V.H. A.H Retn.: ÷90° Sted: ca. 34K/700 (71½) Hull nr.: 10.015

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		4.20	Jordboring			
		10.74	Massiv, grågrønn klorittisk grøst m/q-åre. q er lukket langs åre kanten Spor av py mot endn			
		13.42	Massiv, klorittisk grøst blir mere epidotisk mot endn Spor av py			
		15.77	Massiv epidotisk grøst, lysgrå			
		16.09	Fin kornet porfyrisk grøst, massiv			
		20.38	Grøst grågrønn, lokalt svakt skf, med fine gjennomsettende q-strenger som forgrener seg			
Veks		23.00	Svakt skf grågrønn mellom kornet grøst som holder linseformede klorittstriper Ingen py			
		25.88	Svakt skf grøst m/tilfeldige py-linser (mm) og fine q-strenger			
		27.07	Som over uten py			
Veks		27.80	2 bånd som følger: Topp med klorittisk teksturer og uregelmessige striper gir nedover over i massiv grågrønn grøst			
		29.55	Svakt skf grågrønn grøst m/fine q-strenger parallelt m/skf Py-mineraler ved 29.10 Lokalt 23- ov - 25.80			
	29.10					
		31.08	Finkornet massiv grågrønn grøst Spor av py v/30.85 Epidotiske ved bunn			
		31.29	Massiv, mørk grå grøst m/ utsvettet q-åre			
		34.70	Som over 29.55 - 31.08			
sv		36.36	Massiv, klorittisk grøst, m/q-py striper v/35.17			
	35.17					
		36.48	Massiv, middels kornet lysgrå porfyrisk grøst m/overflod av uregelmessige q-åre			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: aug - 72 Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10 015

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		37.45	Som over 39.70 - 36.36			
		38.50	Som over 36.36 - 36.45			
			massiv flekket klorittisk gr.st, m/ store sure - amygdulen fra 38.82			
		39.50	Porfyrisk gr.st.			
		40.43	Grågrønn epidotisk gr.st m/ finkornet amfibol-nåler som forsvinner siste 10cm			
		42.17	Fin til middels kornet, svakt porfyrisk gr.st lysgrå (andesitt) m/ middels kornet feltspat, utstrukket klorit-phenokryst Rikelig med q-årer uregelmessig.			
		42.32	Som over (40.00 - 40.43) men med spor av py			
		48.14	Som over, 40.43 - 42.17			
		48.88	—"— 40,43 - 42,17 men med sjelden q-åren			
	49.02	~~49.02~~	Jaspis		48,88-49,02 ~~1. prøve~~	1. prøve
	49,34	4	Py + Zn? båndet		49.02 - 49.34	2 —"—
		49,45	Gr.st			
	49,79	~~49.79~~	Pyritisk felsitt, med noen bånd med py-fri felsittisk gr.st Py danner en båndet tekstur med mye Zn	NB	49.45 - 49.79	3 —"—
		50.44	Som laveste part av 42,32 - 48 88, Laveste grense er en epidot fyll skjærsprekk			
Veks Black Alt!		51.00	Mellom - til grovkornet amfibol - feltspat tuff - bånd Den er noen q-årer som er laksefarget Py - utsettinga opptrer ved kanten.			
Veks		5422	Sur, flytdrektje svakt utflatterte fragmenter, 1 - 3cm oftest ved kanten			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10.015

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Flyting ved topp kan indikeres ved den utgrinsing som en skjed med kloritt-utrenging.			
		54.61	Fasgr's, kontakt med hengen er 30° til kjerne-akse.			
		59,57	Lys graigrønn, finkornet kloritisk gr.st, med sjelden q-flekker. Noen q-årer mot bunnen. Går nedover over i en kalkrik sprekkefylling v/59.57.			
		60 48	Kalkrik sprekkesone.			
		64 75	Finkornet, grå amygdaloid bergart, m/små q-amygdaler og q-årer.			
		65.76	Finkornet graigrønn kloritisk gr.st.			
		68 67	Blanding av 2 ovenfor litologiene, grenser vanligvis skarpe og uregelmessig. Amygdaloide komponent synes „flyte" i resten av matrix.			
		71/66	Fink. gr.st flytebreksje store kantete fragm. Øfte sure			
		72.38	Fin-til mid-kornet kloritisk feltspat tuff, godt sortert.			
		72.93	Mørk grå-flekket grønn kloritt-flytebreksje, m/q-årer og små flate breksje-fragm.			
		74 85	Som over, mere kloritisk			
		75.10	Som over, ingen breksjetekstur			
		76 93	Epidot-rik grønn-flekket grå breksje m/ 3 cm kantete fragm.			
		77.77	Fin-til mid. kornet klor. gr.st. ingen breksje tekstur, q-årer			
		78.30	0.5-1 cm brandet fink kloritisk gr.st. Nå og da lyse pg-flekker. Mulig tuff.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10.015

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		79.00	Fink grå - flekket grønn gr.st klorittiske striper, ~~sone~~ flytbreksje V/78.77			
		81.10	Fink lysgrå massiv gr.st i cm lys/mørk båndling ⊥ til kjerneakse Q-årer Båndet → 5 cm bergart antydet luft med bånd av brekssjert grå massiv bergart.			
		83.52	Middels korn massiv kl. gr.st m/ tynne q-årer, noe epidot. Tidligere q-årer har orange-brunn farge. klorit-striper V/82.60			
		84.00	Båndet bergart, 5 cm bånd mørk grå breksje frag + matrix Blek grønn klorit fragm, mørk grå matrix			
		84.14	Q/felsisk breksje i mørk grønn matrix 8 mm store fragmenter			
		84.50	Mørk grå fink gr.st nå og da q.			
		84.63	Sprekke fylling (leir)			
		85.17	Lys grågrønn spekk gr.st m/ q-strenger. Middels sur Brekssiert start V/84.84.			
		90.53	Fink massiv lys grågrønn gr.st m/lag strekk båndig ca vinkelrett kjernakse, med tilfeldige mer sure brekssierte deler med 45° på kjernakse.			
		91.00	Som over, men med 10 cm bånd av grovt kornet blek grønn breksje.			
		91.28	Som 85,17 - 90.53			
		97.30	Fin kornet, utpreget grå-grønn massiv gr.st. med linse av brekssiert q i mørk grønn klorittisk matrix Fjellen q-årer			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 5

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10.015

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		97.63	Klorittisk skjærsone			
		98,30	Fin-k lys grågrønn massiv gr.st, med brekside q-årer i klorittisk matrix som ser ut som amygdaler av q jf 98.27			
		100.10	Fin-middels k lys grå-grønn gr.st. Epidotisk de 25 cm øverste del, q-åren til 98.98			
		101.32	Grå fragm med matrix inntil 5cm i lengde, i mellom-kornet epidotisk matrix uten topper. Båndinn 60° til kjerneaksen	NB		
		101.17	Fin-k grå, cm-stor mørk biotit i en fin-mellom-k lys grågrønn, lokalt epidotisk grunnmasse.	NB		
		102.82	Fin, lokalt grov kornet grå gr.st lokalt svake bånd med breksje			
		104.22	Mellomk grå gr.st med overflod av q-strenger og flekker			
		104.45	Skjærsone med 20° til kjerneaksen			
		106.00	Som 102,82 - 104.22, men med store uregelmessige grålig og orangebrune flekker (q-rik)			
		106.46	Fin-k flekket grå gr.st			
		107.40	Fin-k. lys grå gr.st med klorittiske skiver, nå og da q-stringers, noen orangebrune			
		107,78	Mellomk grå gr.st. med brecciert textur			
		107.98	Skjærsone			
		108,78	HS 107.40 - 107.78			
		110.11	Fin-k lys grå gr.st men q-årer nå og da			
		111.46	Fin-k grågrønn spettet gr.st med vage og lokale brekside texturer.			
		112.40	~~As~~ Som over, men med tilfeldige 1 cm store samlinger av amygdaler. Mest amygdaler ved kontakten			
		112.50	Ovet epidotisk materiale			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 6.

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10-015

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		115.69	Sur lyst breksja, fragm. er lan og utstrukket. Bunnen 80° med kjerne-aksen			
		116.35	Fink grågrønn gr.st med linser av tilfeldig breksje			
Vklas.		117.45	Som over, men uten breksje sjelden q-amygdaler		Prøve ingen fragmenter.	
		118.70	Som 115,90 - 116,85, med q-amygdaler.			
		119.00	Kjernetap			
Vklas.		119.88	Fink. grå gr.st med klorittiske striper. linsen med sur breksje mot skiften.			
		120.77	Fink. grå grønn gr.st, q-amygd. v/120,45°			
		123.30	Bardet men fink grågrønn gr.st, klorittisk. 12cm med middelsk. til grov sur breksje. Sure bånd blir mindre brekssert og tykkes mot dypet tykkes q-åren opptrer.			
And.		125.47	Lys grå massiv, sur felsiske gr.st. med små klorittiske linser. Sleppesone v/124.65°			
		126.45	Grov breksje av det ovenfor			
Kv.		126.88	Lys grå felsitt med små irregulær klorittiske linser.			
And.		127.85	Som 123.30 - 125.47			
Kv.		128.40	Sur breksje med 0,5-1 cm fragm. grenser 80° m/kjernax			
And gr.st.		129.60	Lys grå massiv gr.st. sur			
		129.90	Som over brekssjert			
Vklas k.		131.45	Som 128.40-129.60, med lokale breksje-bånd			
		134.06	Middels k. moderat sur q-amygdal lava med klorittiske innslutninger. Brekssiert tekstur kommer inn v/132.10 hvor kloritten gradvis forsvinner. Amygd. ca 9% av			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10.015

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		134.95	Middelsk. moderat sur breksje med klor. matrix. Lik ovenfor, uten amygdaler			
		136.00	Fin-til mid k. lys grågrønn gr.st m/q-amygd. fra 135.65			
		138.60	Blandete grå og sur matrix, ofte brekssiert, og fin-til mid k grå-grønn klorittisk gr.st.			
		139.53	Sannsynlig AGLOMERAT, dårlig sortert, grå, sure fragm i en fink. klorittiske grønn matrix. Konsentrasjon av surt materiale ved liggen			
		140.38	Utstrekte 1-3 cm fragm. av grå og surt materiale i grønn klor.-matrix			
		140.78	Lys grå, fink sur bergart m/ med fine klorittiske inneslutn.			
Overgang		142.13	Som over, men uten klorittiske inneslutninger.			
		143.07	Lys grå fin-til mid k bergart med brekssiert textur som har sprekker fylt med klorittisk materiale.			
		144.10	Som over, men med tynne brekssje bånd v/143.50			
		144.86	Breksje m/klorittiske striper.			
		146.51	Lys grå, sur fink bergart med parallelle striper av med surt materiale med 70° til kjerneakse			
		148.92	Som over, men brekssiert med sterkt klorittisk matrix. Nå og da båndig vinkelrett til kjernen, og blir mer tydelig fra 147.50 og med opptreden av uregelmessige q-utsvettinger. Båndene er vekslende meget sure q-bånd og mer basiske bånd begge med 0,5 cm i tykkelse			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 8

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10.015

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
Amf gr s		150 11	Fink lysgrå „mellom sur berga massiv, Nå og da spikket som har kloritisk infylling. Kjernen er sterkt oppsprukket			
Vekst		150,62	Som over, men med en flekket breksjert opptreden. breksjebåndene irregulære ca 30° til kjernelengden			
		153 94	Veg finkornet grågrønn basisk bergart, massiv tekstur. med tilfeldige q-utsvettinger, tilfeldige bånd (vage) fa cm tykkelse med kloritisk utseende Tynt breksjebånd v/153.10			
		158 76	Fink grågrønn gr.st ganske sterkt båndet vinkelrett kjernen. sure bånd noen cm tykke Nå og da tynne bånd med q-utsvettinger og tilfeldige linse-formete flekker med mer kloritthisk matrix			
		159 80	Sjeldent er det q-anrygelu- Fink grå gr.st med sjeldent lag av overfor kloritt matrix og breksje Nå og da q-åre			
		160 24	Mellomk. grå gr.st som har en finbåndet (vagt) utseende ⊥ til kjernen noen bånd fører mange små pleonbrygd av q. Q-utsondringen som fører			
Amf gr.st.		160.70	Fink lys grågrønn sur bergart m/ noen få gråver			
		161.35	Fink basisk berga med få kalkiske innesluttninger			
		162 57	Som over. men med breksjert tekstur og kloritisk strip- og noen få q-utsvettinger.			
		164 88	Fink lys grå middelskorn bergar med noen få q-fenokryst og åre			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 9

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10.015

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		164.99	Fink til mid.k inkomediar bergart.	N13.		
		165.83	Som over, men med 2-3mm q-amygdaler.			
		168.71	Som over 164.88-164.99. meget markert båndering, blir mer kloritthisk når liggen mot bånd som blir mer grove mulig tuff			
		171.90	Som over, men tydelig finere kornet. Tynne bånd med q-rikt materiale mot ligg			
		176.44	Som over, mere epidotisk med breksje bånd v/172.63 q-årer blir vanlig mot liggen Breksje bånd blir færre. Mer basisk mot ligg.			
		176.66	Lys grågrønn fink. gr.st.			
		175.21	Som over 171.90-176.44 med q-utsvetninger og tilfeldig feltspat (mid.k) phenokrysst			
		180.30	Som over 171.90-176.44 mindre epidot med tynne q-rike bånd parallell lagning som er ⊥ til kjernaxe.			
		183.75	Som over 173,21-180.30. uten q. Båndning i mm-skala			
	181.63		Meget fine py-bånd v/181.63 nå og da tynne bånd med feldspx av feltspat alternativ bånd er med epidotisk			
		185.72	Lys grågrønn fink. massiv gr st meget svag båndning. Bånd blir tynnere ved ligg			
		186.46	Grågrønn fink. gr.st.			
		188.47	Som over, tydelig båndet i mm-skala ⊥ til kjernaxe. Bånde er epidotisk.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 10

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10.015

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
Vekst	~	190.42	~~Som over~~ mer med tynne bånd nå og da av fint feltspat - fenokrysst			
	~	191.55	Massiv fint grå gr.st m/tynne bånd av feltsp fenokrysst v/190.65			
Gr.st	~	191.95	Fint båndet epidotisk gr.st, bånd med 70° med kjerneakse			
	~	192.88	Grågrønn fint lava av a, til m / utstrekte q-amygdaler og små linseformete q-fragm.			
	~	193.32	lys grågrønn, fint båndet gr.st mye fint feltsp. krystalls mot liggen			
Vekst	~	195.60	Grågrønn fint gr.st. nå og da båndet ~~tv~~ kjerne			
	~	197,00	Mer epidotisk og sterkt båndet gr.st.			
	~	198.10	Mørkegrågrønn gr.st med q-svetting nå og da og feltsp fenokrysst			
Gr.st		198.90	Grågrønn, båndet gr.st m/ nå og da q-svetting, spesielt på toppen Py-impregnasjon			
	198.58		v/198.58 Py med vanlig v/liggen			
	199.74		Mørk grågrønn fint gr.st m/ imp av py i lag nå og da			
		200,15	Grågrønn båndet gr.st med			
	199.85		moderate py-lag v/199.85 ingen Py mellom for 199.90			
Vekst	~	201.78	Båndet lysgrønn/ mørk grønn fin til medium k gr.st. med lokale konsentrasjoner av små utstrakte q-amygd. og q-åer			
	~	202.98	Grå bergart m/ fine hvite phenokrysst, sjeldent q-linser og tynne klorittiske bånd som blir mer vanlig			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 11

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10 015

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			med mot liggen			
		205,86	Fin - midd k lysgrønn gr.st m/ hi/feldig q-åren og flekker (consentrasjon av sure materiale ~/zc 3.65)			
		205 95	Flekkete mørk/lys grønn klorittisk gr st Mulig tuff			
		206 17	Som 202.93 - 205.86			
		207 23	Mid k. lys grågrønn lava med 2-5 mm epidot - amygd. Tynne q - og epidot linser er vanlige N/ligger			
		207.29	Som under 207.42 - 207.98			
		207,42	Massiv fink lys grå bergart.			
		207.98	Middk til grov feltspatrik klorittisk gr st. m/hi/feldige grovkornet amfibol phenokryst i parallell orientering meget tynne q-strenger	NB		
		209.10	Som 201,78 - 202.98			
		209.83	Fink - midd.k båndet grågrønn bergart med noe q - sprekking men ingen			
210.18			massiv malm fink og båndet py med noen sure bånd og noe mt		209.83 - 211.61	4 prøve.
211 75			Massiv malm. noe båndning av py med tynne q - bånd Spor av cpy		211.73 - 212.51	5 — " —
212.53			Massiv malm. båndet py med moderat cpy i distinkte bånd. Py er middels til grovk delvis.		212.51 - 214,15	6 — " —
212.98			Massiv malm av båndet py med q/py - lag ingen synlig cpy			
21395			Som over med noen bånd av grovk py i matrix av fink py Ingen cpy			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 12

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10 015

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprøve	Anmerk.
	214,15		Py-imp som bånd i grågrønn gr.st			
214,97			Fink massiv py			
	215,02		Imp. av py i fink. gr.st		214,15 - 215,40	7 prøve
216,56			Massiv fink båndet py, ingen synlig opy. Noe grove py-xx		216,00 - 216,56	8 " "
	219,05		Lys grågrønn fink. til middk. bergart m/ py-imp og q-amygdaler. Tynne bånd av massiv py opptrer ca ⊥ kjerneakse		216,56 - 218,42	9. " "
	220,29		Som over, meget lite py ingen amygdaler. Tynt svart bånd v/ 219,94. Py mere vanlig nær ved liggen.			
And.	223,50		Lys grå, fink massiv rock med feltsp fenokryst lik eller lignet py			
	224,42		Fink. grågrønn gr.st med meget fink. imp py + små q-amygd. Q-årer mot liggen.			
Skj.	227,10		Lys grågrønn. båndet gr.st m/ fink py-imp og 2-5 mm q-amygd. Moderat q-innh. " " py-innhold		224,70 - 227,18	10. " "
And. gr?	228,56		Lys grågrønn bergg m/grovk. py i sprekker, de første 20 cm. Under forekommer py og blir lysgrå fink			
	230,14		Som over, med en liten mengde impr. py.			
230,40			Massiv. fink. py.		230,05 - 230,40	11 " "
Kvar.	230,76		Hvit grovk q-årer. som kutter gjennom py-imp kvartsittiske materiale.			
Bas?	233,72		Lys grønn, sur bergart med lav mengde impregn. py, som flekker og tynne bånd den første meter. Ellers bare		233,72 - 234,60	12. " "

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 13

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10.015

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			spor av py			
			Brecsiert de siste 40 cm			
234,60			Massiv fink. py, med lokale spor av fink. spy.		234,60–237,44	13 prøver
	237,44		Overgang til imp av py i q-rikt materiale Moderat med py, lokalt massiv			
		237,54	Grågrønn fink gr.st m/spor av impr. py.			
	237,80		Fink py-imp i q-rikt svart materiale. Py blir flekkvis samlet mot liggen			
		239,16	Finkornet lys olivengrønn gr.st m/q-utvetting v/238,20 Gr.st blir mørk etter 60cm lokal q-flekken. Vag båndig i cm-skala			
	239,60		Fink. py-i q-rik matrix Py i fink. bånd		239,16–240,52	14 prøver
		239,72	Gr.st. som 237,80–239,16			
240,00			Massiv fink. py.			
	240,52		Py-imp i q-rikt materiale			
		241,43	Gr.st mørk mørk kornet mot slutten rikt bånd av mt			
		241,85	Gr.st grønn grov og epidot rik			
		245,30	Kalk gr.st. meget båndet av lyse bånd i partier foldete magnetittlag også enkelte py-bånd			
		245,53	Magnetitt + epidot, noe cc			
		246,73	Noe kalkbåndet gr.st. fink. og tydelig epidotrikhet SLUTT.			

2450

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25/9-72 Sign: Lt Retn.: ÷90 Sted: 21V/85 Hull nr.: 10 0/6

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		1,55	Jordbering			
		3,23	Gr st svak skef og ganske mørk. Endel kloritiske striper og bånd mot slutt. cc-stripen i samme partiet. Skef 1/2.40 • 329			
	✓	4.60	Gr st. mid.kornet lys-grønn med cc- og q ansamlinger. Den q-fyllen i stem — " — Noe q/q-arer			
		5,90	Synes ganske svak aglomeratisk med mye mørke kloritt og lyser blålige flekker. Noe epidot.			
		7,60	Vekslende and/gr st. noe skef og med grov veksel av 10 cm and 10 cm gr st. Vekslingen blir etter hvert diffus			
		8.45	Gr st. fin. massiv ganske mørk blågrønn. Meget homogen.			
		11.30	Breksje noe avrundet og meget diffust. Starter med sterk oppsprekking			
	✓	12,92	And/gr st i vekst Vag overgang fra det før. Her endel kloritt som dominerer. Det hele synes ganske kraftig oppsprekking			
	✓	13.55	Gr st. lysgrønn og flakig på knekkflater. Svak skef. meget lite cc			
	✓	18,40	Gr st meget mørk basaltisk fin. gjennom av meget tynne cc-strenger. Her rundt avrundete opp til 2mm fullt rei q. Innimellom endel epidot strenger. Blir meget tett og finkornet mot slutten. og avrundelene avtar.			
	✓	23,87	Breksje av ganske mørk blågrønn andesitt. En gjennomsatt m/q- og cc årer er nu oppkuttet. Det ikke			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 25/9-72 Sign: AH Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10 016

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			ette- fuset med q-åren og brekkjerin.			
		25.92	Andesittisk gr.st. fink mørk blågrønn g.m/ vage overgang til rev and. litt gr. diffust over i			
		29.97	Andesittisk gr.st er blåtlig og finkornet Inn ette- noen en del små q-fylte amygdaler og langsgående kloritstrikk.			
		31.00	Gr.st mørk fink. og virker «skitten» er godt oppknust med mange q-strikk.			
		31.50	Gr.st felt fink grønn med noe amygdaler.			
		31.87	Som 29.97 - 31.00			
		32.45	Gr.st lysgrønn meget skf og med fyllbanding av c. skf 4/32.05 = 25-9 Også oppknust mot sluttn.			
		3392	And. sl. gr.st. massiv og mot hovedgangen kan være over mot and.			
		35.50	Andesitt med vag overgang Grønn hovedgang.			
		~~36.00~~	~~And. litt gr.st~~			
		3605	Basaltisk gr.st.			
		37.10	Gr.st. lysgrønn ganske fink og meget svakt skf. i litt kloritstrikk.			
		39/48	Gr.st meget mørk og finkornet glitrende på spaltefl. Er ofte gjennomvevet av c. årer kan kanskje kalles Basaltisk Midtre prøve	NB		
			Meget oppknust mot sluttn og iblandet noe lysere gr.st. materiale			
		40.88	Aglomeratisk og meget oppknust. Tegn av forsø.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25/9-72 Sign: ~~A~~ Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.016

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		52,12	Andesittisk grøst i alle variasjoner. Er heldigvis meget finkornet og blåliggrøn med glassaktig skjær på flatene. Her en del mere rene varianter. Py er knyttet til de røreste leddene som enkeltkorn.			
		53,40	Grøst finkornet massiv og homogen. Grønn. Lite kloritt/amf.?			
		61,55	Andesittisk grøst. Meget fink og mørk blågrønn. Glassaktig på bruddflate. Gjennomsatt åpne av cc-stikk som spalter. En del variasjon			
		62,82	Grøst meget tett og finkornet mørk grønn. Er homogen			
		66,00	Andesittisk grøst blågrønn fink. Kontakt vipper mer over mot Andesitt. Er homogen over lange partier og svært massiv og hård. Har en del q-stikk			
		66,43	Vekst/and/grøst. med vag båndring			
		67,83	Andesittisk grøst som overfor.			
		68,48	Grøst. grønn endel flakig og med grove py- på sprukkeplan. Homogen og fink.			
		69,50	Vekst. andesitt/grøst. hvor grøsten utgjør bånd 5-6 cm mens andel 10-15 cm. En god del q-stikk og små flekker av cc. Synes etterhvert å gå over i agglomerat			
		71,43	Agglomerat eller pyroklastisk sediment kalk/q-klast. Er lyspirge og det hele har en klastisk natur.			

Ark 4

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25/9-72 Sign: -sl Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10.0/6

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		73,55	Meget vag vekst / and/grst og med enkelte g-åre-			
		74.38	Grst grønn finkornet tett og homogen-			
		74,92	Aglomerat med brede tynne og utstrakte linser av et lysere mat i en mørk grønn grunnmasse.			
		77,93	Vekst and/grst. hvor and dominerer Vekslingen er til å begynne med svært tøff, men blir etter hvert meget markert Mankan tenke seg at det her dreier seg om et mer grov aglomeratisk lag.			
		81,40	Grst mørk grønn noe glassaktig på brudd flater, er fin til middelkornet homogen Enkelte kloritt fyllinger, Enkelte særdeles gy-xx V/80,90 har man en cc-sprekkefylling med grov py på sprekkene			
		84,76	Vekslende and/grst Varierer noe i type men er som regel ganske diffuse og ensartet i vekslingen. Grst materialet dominerer stort.			
		89.01	Som over men her blir vekslingen mer markert anderitt opptrer mere.			
		890,-	Grst grønn kornige svakt skj og med en ytterst diffus veksling av mer kloritrike bånd			
		91,13	Vekslende and/grst.			
		9300	Grst grønn massiv og finkornet. Enkelte mer kloritiske bånd her og der			
		97,98	Vekslende and/grst. men mest grst. med sprekking og stripping av cc Mye q mot slutten			

Ark 5

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25/9-72 Sign: [illegible] Retn.: +90 Sted: 21V/85 Hull nr.: 10.016

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		100,15	Vekslende grad/g-st med like deler av begge meget mørk klorittisk grønt materiale.			
		100,35	Gr st aglomeratisk og pyroklastisk m/ gansker mørk og svakt skj			
		101,35	Gr st lys. skj og mørk grønn. Har også svak båndings-, som v/101,35 = 21°			
		103,14	Gr st lys grønn, gansker skj også gansker lys og glinsende på skj-plan. Har en tynn bånding av cc. Enkelt q-åre m/ py-xx Meget skarp overgang til nedenforliggende bergart, skilt bare med 1-2mm klorittisk bergart. Lagring v/103,14 = 75			
	104,74		Keratofyr, er meget tett og finkornet Grågrønn og lys har en meget vekslende impregnasjon av py som flekker og som tynne bånd. Mineralisering finnes også i langs q/cc-åren. Det er vesentlig py som finnes, men det er mulig at cpy kan finnes meget fåfordelt Imp er meget uren Tynne striper av klorittisk materiale er ofte blandet inn. Mikroprøve v/103,20	NB.	103,72 - 104,74	1. prøve
	105,05		Gr st m/ vekslende klorittisk bånd og tynne imp-striper.		104,74 - 105,72	— " —
	105,32		Keratofyr som over med en gansker sterk py-imp			
	106,15		Gr stein som 104,74 - 105,05 men har aglomeratisk preg og imp blir ekstremt dårlig			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arkiv 6

Dato: 26/9-72 Sign: AH Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 100/6

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		106,83	Grst grønn, finkornet og svakt flatig. Fører mye cc			
	✓	107,18	Vekslende grst med vekslig grst m/mye cc Aglomeratisk mot slutten.			
	✓	107,50	Grst meget lett finkornet og helt sort. Med små cc-amygdaler. Ender med 1 cm py-kis med båndig ~107,50 225 mikroprøve	N12		
	✓	108,16	Sterkt ayroklastisk (?) små avrundete korn. Dette blir etterhvert mer utviskt			
	✓	110,80	Vekslende and/grst. Hvordet er en meget vag veksel og med vesentlig klorittisk materiale			
	✓ 111,73		Keratofyr. som over og med py-impr i millimetersize striper og bånd		110,80 - 111,73	3 prøver
	✓	112,48	Grst. gammelt mørk grønn fin og noe skj. Sort glinsende på skj flate.			
	✓	112,88	Aglomerat med noen py-bånd rundt de største lag			
	✓	114,64	Grst meget mørk og fin noe skj. Cc-flekket langs lagene			
	✓	117,05	Vekst and/grst. Er meget diffus i veksling og lite tydelig. I partier synes det å være aglomeratisk. Ved grove sure bolle finnes fine py.			
	✓	118,40	Andesitt. fin klorittig og glassaktig på bruddflate. Enkelte tynne partier m/andesitt grst. som over py-kv			
	✓	122,28	Vekslende, men gradvis sink av Andesitt og grst.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 7

Dato: 26/9-72 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.016

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		123,05	acid silitisk grst. homogen og fint-grønlig. Enkelte cc-striper m/py.			
		124,53	Gr.st. mørk grønn fint noe flatelig men homogen. Fører meget finfordelt cc.			
		126,42	Vekslende and/gr.st Ganske mye av andesitt klorittisk rundt større avrundede korn av surt „bombe-aglomerat.			
		127,56	Gr.st. lysegrønn fint. og noe flatelig. Fører litt cc er homogen.			
		129,20	Aglomerat, eller pyroklastisk sediment.			
		129,91	Andesitt, antagelig — er svært oppsprukket.			
		130,02	Den sorte type gr.st, Synes kore noe bistitt?			
		130,27	Pyroklastiske materiale			
		131,90	Gr.st. lysgrønn, noe skf. og fører mye cc ~~fint~~ konformt-lagning. Blir en lysegrønn gr.st. av middelk. mot slutten			
		134,08	Aglomerat, langt mellom bollene og py-fint i forbindelse m surt bolle. Ser mest ut som vekl. and/gr.st mot slutten.			
		136,16	Gr.st. grønn fint. med en del cc-åre			
		137,02	Vekl. and/gr.st med over vekt surt.			
		137,80	Gr.st grønn massiv og ganske homogen. Fører grov py-her og der.			
		139,50	Veksler and/gr.st. Vag veksling men med økende mengde epidot åre etter hvert			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 8

Dato: 28/9-72 Sign: AI Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10 016

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	141,80	Grst. fg - fg middelkornet bandig andesittisk. Gjennomvevet av epidot årer			
	✓	142,10	Andesitt med mye epidot.			
	✓	143,60	Vekslende and/grst finnere nye kis-korn. Etters typiske meget foldede epidot bånd og klyse.			
	✓	145,50	Vekslende and/grst uten epidot. ~~og kvitter~~			
	✓	147,20	Grsten massiv tett fin-kornet noen spredte mer klorittiske bånd			
	✓	148,13	Vekst and/grst uten av vare av den typiske sort.			
	✓	151,32	Grst. massiv meget finkornet grønn, homogen, men oppsprukket til å begynne med. En del kloritt, q - og cc stikk.			
	✓	152,25	Vekslende and/grst av meget vag type			
	✓	153,50	Grst hyaloklastisk middelk og gansk homog blåaktig etter kvart. Fin cc-banding Skift v/153,50 · 52°			
	✓	160,27	Grst fink. og meget homogen ~~Grønn~~ svak Grønn. blir svakt mørkere etter kvart. En hyppig cc-stikk opptrer siste meter			
	✓	162,63	Vekst and/grst. hvor vekslinger til å begynne med er markant men blir etter kvart vagere med en gradvis overgang til:			
	✓	166,63	Grst, noe andesittisk gansker „grov" en meget homogen			
	✓	166,95	Q-cc-mkt åre med grov py			
	✓	169,60	Grst som 162,63 - 166,63			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 9

Dato: 26/9-72 Sign: AJ Retn.: ÷10 Sted: Hull nr.: 10.016

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Det blir etterhvert en del epidot-åre			
	~	171,71	Vekslende and/gr.st og gjennomsatt av epidotåren			
	~	173,43	Gr.st lysgrønn finkornet noe flakig, med finfordelt cc - homogen lagn.			
	~	173,88	Agglomeratisk, sannsynligvis lag med meg klorit i grunnmassen.			
	~	175,71	Gr.st. lysgrønn flakig som over er noe mer grov så det ut.			
	~	175,85	Gr.st. mørk grønnaktig lysgrønn som tidligere. Mulig med biotitt?			
	~	176,07	Gr.st lysgrønn som over.			
	~	177,75	Gr.st grønn, noe mørk homogen og svakt massiv.			
	~	178,20	Gr.st grønn finkornet og svakt skif., og med klorit-lag Disse går gradvis over i ~~Vekslende andesitt/gr.st~~			
	~	178,85	Andesittisk gr.st. som går videre over i			
	~	182,18	Vekslende and/gr.st der det er veg vekslinn andesittisk agnes oftest			
	~	183,63	Andesitt, blålig her og der enkelte py-xx			
	~	194,14	Andesittisk gr.st. Varierer sterkt og det finnes sikkert andesittiske lag Av farge blålig grønn og glassaktig på brudd flater. Blir etterhvert sterkt oppknust og omdannet av klorittiske bergart			

Pk 10

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 26/9-2c Sign: [illegible] Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10.016

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	196,99	Gr.st. mørk grønn fisk. og meget hornsø.			
	/	200,00	Andesittisk gr.st. Fin-til middelk. grønnlig blå. Meget massiv og meget hornsø. En meget svak py-imp i hver. Blir mot slutten mere grønn. SLUTT.			

Ark 7

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 19/9-72 Sign: AL Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.017

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		126,-	Veks and/gr.st. noe Ce-innhold.			
		127,29	Gr st fin og massiv og kompakt			
		128,27	Samme gr st nun m felt med kloritstikk og grønne			
Veks		129,75	Samme som over men med uregelmessige årer av kloritt og endel kvarts i mellom breksjering			
		130,-	Gr.st. skj nesten sort og glinsende fra flaten. Også her noen kloritt-bånd			
			SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 6

Dato: 19/9-72 Sign: AH Retn.: -90° Sted: Hull nr.: 10.017

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			noe mer basisk lag e-		100,15 - 100,90	3 prøver
			fyldelig Binding V/100,50 = 21°		101,31 - 102,25	4 " "
					102,25 - 103,10	5 " "
		105,40	Gr.st. massiv, lit. glimrig og meget svakt skj. fint og grønn. Endel amygduler som er vesentlig f. meget fin spetting av cc her og der.			
		106,20	Vekslende and/gr.st. men hvor gr.st. er dominerende.			
		107,37	Andesitt grøn og tilblandet noe grønt mat.			
		112,89	Gr.st. fin til mid. kornet grønn homogen og med meget fin cc-spetting. Særdeles homogen.			
		114,48	Vekslende and/gr.st. men med stor mektighet på de enkelte bånd 10-20 m.			
		117,23	Veksl. and/gr.st hvor man har en meget tynn vekslig. Enkelt bredere andesitt bånd med epidotårer			
		124,26	Gr.st. kanskje noe and grønn fin-mid. kornet er svært homogen men blir sammensatt av en del epidotårer. Mikrobrecce ved 118 m. NG Blir etter hvert svakt spettet med cc. samtidig som flere og flere gr.årer opptrer.			
		125,33	Andesitt blåaktig men med ett sammenvevd mønster av årer kvarts og store plyser av py- her og der.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 5

Dato: 19/9-72 Sign: A Retn.: 190 Sted: Hull nr.: 10017

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			fram til 84.50 m Enkelte tydelige pyroklastiske lag kan sees. Mot slutten blir båndingen diffus og lite markert med en gradvis overgang til			
		92.00	andesittiske gr-st med en del kloritt bånd.			
	✓	92.70	Andesitt, blålig gjennomsatt av 2 mm tynne q åren ofte			
	✓	93.50	Vekslende and/gr st. samhidig noe skef SBF v/ 93.00 : 13° Meget svak py-imp finnes			
	✓	94.89	Andesitt, men med en svakt tilsmitt av grønt materiale, men med tynn py-stripe			
	✓	95.46	Andesitt, ~~no~~ blålig med tynne strenger av py-imp Gullig sprekkefylling av q og feltspat? m/noe cc.			
	✓	96.20	Sig. gr st. bandet av gullige bånd av antagelig q/feltspat. Enkelte ~~t~~ cm brede keratofyriske lag.			
	✓	103.10 ~~to~~	Keratofyr (eller and) Grålilla nærmest mest tynne, men tett med py-striper. Meget fint Enkelte grønnere lag innimellom.			
			Fra 96.85 - 97,00 er det massive bånd av		96.80 - 97,00	1. prøve
			Imp er stort sett meget tynn. og bare py- er sett. Enkelte steder noe mer imp			
			Bånd både av py- og		98,60 - 99,53	2 prøver.

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 19/9-72 Sign: [illegible] Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.017

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	-	55,65	Pyroklastisk eller breksje, en del strenger av klorit med lysere fragmenter rundt om. Noe oppknust			
	-	60.50	Andesitisk gr.st., meget tett meget blågrønn mørk, med q-fylte amygdaler Mikroprøve 1/57 m			
	-	68.10	Andesitt, meget tett mørk blågrønn homogen Er ikke av typisk eksempel Enkelte q-bånd Er kanskje mer mot and gr.st.			
	-	70.06	Gr.st. meget tett og fint. homogen gansk mørk i farge. En del py opptrer ved enkelte partier Spesielt 68,45-68,55			
	-	71.28	Gr.st. som over, men med pyroklastisk materiale			
	-	75,14	Gr.st grønn, tett og fin-til middelskornet. Homogen bare gjennomsatt av enkelte cc/q-årer (tynne) Enkelte py-kuber er synlige. Likeså noen nesten rektangulære amygdaler med cc/q-fylling Mot slutten begynner en meget diffus veksling av noe eller mindre blå-grå.			
	-	91.14	Veksl. and/gr.st., meget markert, mellom mørk grønn og grålig blågrå bånd Er kanskje et agglomerat i partier en den grønne ser ut på cake. Ellers 82 bare de mørke bånd dominerende			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 19/9-72 Sign: A Retn.: ÷ 90 Sted: Hull nr.: 10.017

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		34.22	Gr.st grønn finkornet homogen og massiv.			
		35,16	Gr.st svakt bdd. med enkelte grovkornet lag. Er ellers kalkrik i strip. også knust som v/34.70 m.			
		35,32	Surt aglomerat?? med mye magnetitt i mellom kvarts-rike bruddstykker.			
		35.89.	Gr.st meget svakt bendet og fin.			
		39.40	Vekst. and/gr.st. De svarelag synes gjennom vevd av cc-stikk Båndinga e markert til å begynne med men blir etter hvert mer utydelig med bredere lag av de to komp.			
		41,72	Gr.st Grågrønn finner stadig men skiftevis veksling mellom grønt og mindre grønt mater			
		48,64	Veksling and/gr.st. hvor klorittkomp e mest fremtredende. Etter hvert blir den grålige surere del mere typisk og man finner tynne aglomeratiske soner. Tynne py-strip opptrer. Flere andesittiske lag opptrer: 46,33 - 46,73, 47,70 - 48,36.			
		52,53	Andesitt, mørk blålig og med meget felt tekstur gjennomhomogen. Mikroprøve v/51.00 m	NB		
		54,63	Andesittisk gr.st. Litt forskjellig fra over, men med mye mere amygdaller			

Ark 2

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 19/9-72 Sign: H Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10 017

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		18,17	Vekslende and/gr.st. Veksling er uregelmessig og båndinng er tydelig. Båndinng V/14,95 = 28°			
		18.47	Breksje, også her antagelig pyroklastisk, mye kvarts er blandet inn, sammen med en del grønt materiale			–
		21.00	Vekst. and/gr.st som 14,91 – 18,17			
		23,94	Vekst. and/gr.st. men ihvertfall av gr.st. er tydelig i overvekt. Dessuten opptrer fyllitten gjerne og en del oppknusing.			
		25,61	Agglomerat kvartsrike avrundete liter i en grunnmasse av mørkegrønt materiale, enkelte ev-korn. Flere av listene er gjennomvevet av sprekker som er fyllt med grunnmasse			
		27,83	Gr.st. andesittisk aflit m/ kloritt-sprekk, mye q-fyllte amygdaler. Fargen er mørk grønn. På grunn til undersiggende her man mye kloritt over 1cm.			
		28,42	Andesitt, meget tett og fint. blålig grå.			
		31,30	andesittisk gr.st. meget tett mørk blålig grønn. Der finnes mere andesittiske partier. V/29,42 = 5mm magnetit. Blir oppknust etter hvert.			
		33,42	Gr.st. som i tynne striper er mye kalkrik dessuten også aktg			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 19/9-72 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: 11V/85 Hull nr.: 10.017

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2.20	~~Jordboring~~			
		2,92	Gr st. grønn masse og			
		~~2,14~~ 2,12	lite oppsprukket. Finkornet aggl.merat? Veksler mellom tynne grønne lag og av-rundete blålig grønne sure lag			
		5,23	Veksling and/gr st Er mest masse og veksling er diffus. Enkelte tynne cc.-bånd			
		9,43	Gr st er karakterisert en meget svak banding uten betydning. Mest normagn og sjeldent spredt med clorit nå og da. Lange gjennomsiktige Enkelte epidot-aggr nå og da Py.-korn finnes mot slutten			
		9,60	Andesitt gjennomsatt av klorit-strikk, m/noe py			
		10,09	Andesittiske gr st. Blågrønnlig tett og fin banding av mer klorittiske lag			
		11,24	Gr st som 5,23 - 9,43 bar her med amygdaler av q og lit cc. og epidot			
		14,91	Agglomerat, Tyl a begynne med todeling med avrundede biter av mørkt materiale i en grønnlig grunnmasse. Nedover blir det mere diffust med avlange korn som kan sees å ha en halo av mere klorittisk materiale rundt seg. Små kvartsfylte blærer opptrer Er helt sikkert et pyroklastisk produkt.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1

Dato: 9/8 -73 Sign: AL Retn.: ÷90 Sted: 1025 S/ Hull nr.: 10.018

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,80	Gr st med lydelige vekslinger etter overflatebearbeiding			
		1,30	And. oppsprukket og med epidot sprik			
		5,45	Gr st massiv grønn fink en del oppsprukket. Q-br, cc fylte sprekker, ofte noe epidot sprik fra 4,50 enkelt små uregelmessige cc-amygdaler.			
		6.00	Gr st meget sprk med enkel feltspat i bagdelthus Skj 5/5,60 : 25°			
		13.65	Gr st massiv hornogn og noe fink, med enkel uregelm epidot-årer Berga virker noe i utseende og i krystallstørrelse, som en helstein gr st av vanlig type			
		14.10	Tuff, båndet i 2mm tykke bånd av mørkt og lyst materiale, samt noe grovere bånd av mere lyst grønt mat Noe py-korn i tynne bånd			
		18,47	Gr st massiv og hornogn som den over.			
		19.90	Tuff, lys grønn fink og meget vage vekslinger mellom basiske typer materiale.			
		25,75	Gr st meget hornogn grønn fink			
		29.50	Gr st. epidot-rik med epidot årer uregelmessig gjennom hele bergarten.			
		32,80	Gr st. noe grovere enn ellers og lysere i noe sprekkmost			
		37,40	Tuff, fin i bergarten med mørkere, men ofte meget mer skifrete En god del uregelmessige			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 9/8-23 Sign: AH Retn.: ÷90 Sted: 10755/ Hull nr.: 10 018

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Hovedstikk samt epidot Nt-lag 1cm ved 37,35.			
		44,50	Gr.st. med rik på epidot uregelmessig fordelt i bergarten.			
		45,40	Tuff, mørkere grønn i farge mer striper og fragmenter av mørkt mat. med noe grov pyr-kryss. Ellers en beryndre uregelmessig			
		46,15	Gr.st grønnaktig og massiv.			
		47,10	Tuff ligner som over			
		50,10	Gr.st. mørk grønn, finkornet og massiv homogen. Enkelte saltepeter synes svart-glinsende.			
		51,05	Tuff vekslende hvor basisk og surt i like deler			
		51,75	Gr.st. grønske lys grønn og noe grovere en vanlig antagelig bare et nebbiere bånd en vanlig i tuff sonen			
		54,40	Tuff som vi hadde i sted, resten agglomeratisk hvor sure biter ligger i en mer basisk masse.			
		56,15	Gr.st. tett hard og massiv grønn			
		60,70	Tuff som over og deler gang av typiske type. Er en god del kvarts og absolutt agglomeratisk i partier. Sure runde biter i basisk grunn-masse.			
		81,70	Tuff, stadig men den er nå mer diffus og grov. Del er ikke			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 9/8-73 Sign: AH Retn.: -90 Sted: 10755/ Hull nr.: 10.018

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			mulig å delinere enkelte fragmenter. Sent og basisk likt, men fra 69 - 75 m synes sent materiale vare dominerende.			
		82,30	And. gr.st. meget tett nes fraktig og mørk grønn.			
		84,60	Gr.st. meget svakt skj grønn. Fraktig på planen. Blir etter hvert mer rugete og uregelmessig			
	84,95	~~84,95~~	Som over men er impregnert av 2 mm til 1mm store py kuber og aggregater.			
		88,90	Gabbro. ganske lys og noe grov farge en god del epidot som grønt mineral. Er tydelig skifret og prikket og til og begynne med, men ved 87 m er den mer homogen. En del kloritiske stikk gjennomsetter den.			
		89,70	And. sittisk gr.st. uregelm. og oppsprukket.			
		124,27	Gabbro igjen, som over. er ganske homogen men man kan skjelne på mer fink. partier. klorit-stikk og tellingen finnes ofte. Spesielt fra 106 m og til 111,50 m er gabbroen mye mer fink (ellen heller middelkornet) Fra 117m og utover blir det mer rikelig med epidot utskilt på sprekker og ikke så mye i			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 4

Dato: 9/8 -73 Sign: ++ Retn.: ÷90 Sted: 10755/ Hull nr.: 10.018

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			grunnmassen.			
			En svak sprøting med			
			py finnes her og der.		118.63 - 120.00	1. prøve
			Et uregelmessig parti i			
			oppboren hvorfor skiften			
			mellom grove og fine leder	NB		
			er det en imp av			
			Cpy, som tildels opptrer			
			i grove korn, samt i			
			flak utgidd på flatene			
		127.13	Tuff, med forholdsvis			
			markert båndning 11th. bånd			
		130,80	Tuff her meget diffus			
			men tydelig, svart materiale			
			synes dominere. Men man			
			har tydelige klorittiske bånd			
			Mikroprøve 129,50	NB		
		131.63	Tuff, ingen med meget			
			tydelig båndi-g og en			
			mistenker det for å være			
			Aglomerat. Fragmenter vise	nt		
			sprekker med epidot som			
			ikke går ut i omgivende			
			bergart.			
		132.10	Grst. meget homogen			
			og uten sprekker			
		147,35	Tuff, velbevarte bånd-i-type			
			ofte men diffus men altså			
			god båndtydeling. Det vesentligste			
			av materialet er svart			
			Ofte sprekk med epidot.			
		148,15	Grst. massiv grønnbrå			
			enkelte tynne sprekk-fyllinger			
			av epidot Enkelte sprekk			
			fy-korn.			
		158.66	Tuff, som over, det			
			synes som om epidot-			
			fyllinger blir vanligere			
		162.70	Andesitt (dacitt?) Bråtig			
			meget tett og homogen			
			med tynne q og cc-årer.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

A-k5.

Dato: 9/10 -73 Sign: A Retn.: +90 Sted: /0253/ Hull nr.: 10.018

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		164,60	Gr.st. skif grønn og noe klorittisk. Skif v/163,40 = 38°			
			Enkelt svart bånd			
		166,15	Gr.st grønn lysgrønn svakt skif og med spetter av klorit som muligens har vært amf.			
		167,83	Tuff meget grønn med mørkere bånd, og er oldlemeatisk. Cc - spetter.			
		168,70	Gr.st lignes mye grovere enn vanlig og mørk blålig grønn. Også her små 0.5 mm cc - spetter.			
		173,46 ~~168,70~~	Igjen tuff, men meg mead mørk bånding og med tydelig basiske over-vekt.			
		175,10	Gr.st. mye grønn, i lignes som mye grov enn ellers			
		176,10	Gr.st. med klorit - spetter etter hornbl. Disse lignes mere orientert enkeltvis			
		179,70	Gr.st. meget massiv grønn med av og til lysere mye svarte partier			
		182,90	Tuff vekslende sur/basiske lag i samme forhold til hverandre.			
		184,34	Gr.st grønn fin med gradvis overgang til neste bergart som er			
		189,70	Gr.st spettet med klorit som over, meget mørket på slutten			
		191,25	Tuff, noe oppknust. Tydelige bånd mot slutten av jevntykt mørt basisk.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 6

Dato: 1/10-73 Sign: AH Retn.: +70 Sted: 1075/ Hull nr.: 10.018

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		193.20	Grøn massiv grøn.			
			og grønkhvit.			
		196.00	Treff igjen. Denne type			
			har vesentlig lysere			
			materiale, men med tydelige			
			skiller mot de grønne			
			svarte lag. En ser meget			
			små ee-krystaller i de			
			svarte lag.			
		199.90	Treff i denne delen er			
			det likt mellom svart			
			og lyst materiale.			
			Mot slutten opptrer små			
			partier som godt kan			
			være and.			
		200.65	And grøt. meget fint.			
			og kan lav svart			
			en grøt. Noe usikkert.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/7-73 Sign: AL Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.018

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		200,65	Gnd. gr st hard massiv bergart med noen mer idioblastiske bånd			
		201,80	Tuff meget massiv og svak lodd i detaljer ujevnt.			
		203,00	Tuff eller gnd. gr st. men boret har gått langs q-og cc fylte sprekk Det hele meget oppsprukket.			
		203,22	Gnd. gr st. meget massiv fin og hard			
		206,00	Tuff mye grønn basisk materiale og med små cc-prikker. Disse varierer i størrelse fra 1 mm - 5 mm. Enkelt meget tynne py-striper.			
	206,50		Tuff som over men en del q-mat og ukjente imp		206,00 - 206,50	1 prøve
		208,73	Gr st meget svakt lodd og bergart tuffaktig, lys grønn fjellig sprø cc Er mye oppknust p.g.a sleppen			
	209,18		Tuff gansko massiv med mye basisk materiale. Også med svake imp		208,73 - 209,18	2 — " —
			Tuff. svart grønn og relativt rik på små runde q-korn. Kanskje agrobolast. Ganske sterke bånd. imp, samt noe cpy i tynne striper		209,18 - 210,00	3 — " —

A-L 7

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

8
Hi K-Ta

Dato: 29/6-73 Sign: ~~At~~ Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.018

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	214,75		Tuff, meget vekslende av type. Til og begynne med meget vekslende med uregelmessige klaster og rennser av q-granulat i en relativt kloritthik grunnmasse. Synes også finnes enkelte store karbonatholdige boller. I grunnmassen finnes striper og ~~boller~~ kjerner med kis pg. Senere blir vekslingen mindre markert før i gjen å ta seg opp som før. Overalt vekslende py-imp. der hvor bergart er brecciert.		210,00-210,85	4 prøver
					212,25-214,00	5 -"-
		215,60	Grønnst massiv homogen og grønn. En del gjennomsatt av tynne q-cc striper			
		216,90	Gr.st. igjen over mot med brun ~~py~~ q-porfyr og 3 tynne py-rennser			
	217,50		Tuff nå veg vekslende grønne massiv med meget tynn imp			
	217,98		Tuff igjen meget vekslende med uregelmessige q-holdige boller og indel py kjerner enkelt xx og mm-tynne bånd.			
		219,70	Grst nesten massiv og ~~ikke~~ svakt porfyrisk. Det er mulig det er endel tuff mat.			
	219,92		Gr.st. noe mandelholdig Over 10 cm klynger av svært mye cpy og py, mengder ikke kjent utbredelse		219,70-219,92	6 -"-
		220,10	Rund gr.st med et par porfyr.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/7-73 Sign: [illegible] Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.018

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		221,12	Gr.st. gamske homogen, men mel parti 220,20 - 221 - meget kalkrikt og brekkert, blir mere gamsle massiv mg svak skf. Tendens til tuffaktig av og til Skf V/220,23 = 10%			
	223,31		Tuff, meget diffus for lavrik bdd dominerer. Men tydelige g-rike linser og i sammi forbindelse en del varierende svelfid-imp		221,12 - 223,31	7 prøve
		223,77	Amf. gr.st. meget massiv og fink. Homogen, men med et par tynne py-drager.			
	229,90		Tuff til a begynne med vesentlig grønnaktig men etter hvert spredte klaster av g materiale. Varierende bandet py-imp		223,77 - 224,8	8 —"—
		225,25	Tuff som tidligere, vesentlig lavrik uten svelfid.			
	228,88		Tuff som før, men nærmest med porfyr av g. Meget svak imp til a begynne med, blir etter hvert bedre, samtidig som svart materiale opptrer i større mengder. Grsd meget homogen og svart finkorning. Virker nærmest flaket på bruddflate.		225,25 - 226,05 9 —"— 226,05 - 226,86 10. —"—	
	230,-		Her helt klar en imp av py.		229,00 - 230,00 11 —"—	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 20

Dato: 30/7-23 Sign: AL Retn.: 90 Sted: Hull nr.: 10.018

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Enkelte skifer (233,25 - 233,41)		230,00 - 233,00	12 prøve
			er cpy imp meget sterke.		233,00 - 234,48	13 -"-
			Mikroprøve √ 233,20	A/B		
			av bergart			
		235,18	Gr.st. grov, massiv og			
			fint ikke homogen. Litt			
			imp de første 5cm ellers			
			ikke noe imp. Har en			
			del meget tynne cc-bånd			
			og noen kleritt bånd inntil			
			at det kan sies være			
			tuff.			
	237,14		Gr.st. nye mørk grønn		235,68 - 236,00	14. prøve
			fint. men homogen og			
			med glinsende spaltje -			
			flater uten noen skj plan.			
			Skyen av cpy og enkelte			
			små cpy-grisker, men			
			meget variabelt.			
	239,71		Tuff, eller delvis		237,14 - 238,28	15. -"-
			pyroklastisk. Det synes		238,28 - 239,71	16 -"-
			som ved finnes avrundede			
			store fragmenter, små (1mm)			
			store (3cm) dessuten			
			striper med cpy-imp			
			i denne forbindelse.			
			Imp er cpy-rik mnat 238m.			
			Derfra blir den en del			
			oppknust og synes mindre			
			imp men ved 239 økes			
			imp med cpy igjen			
			Massiv kis, skarp grense		239,71 - 241,15	17 -"-
			mot overliggende bergart.			
241.15			Kis er middelskornet og			
			synes fore svake cpy-			
			g-årer tynne skjærer			
			gjennom her og der			
			men ellers er malmen			
			meget massiv og homogen			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 30/7-73 Sign: AL Retn.: +90 Sted: Hull nr.: 10.018

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Ligg av malm er meget uregelmessig og synes stå med vinkel ca 70°			
		241,44	Uregelmessig meget q-førende åre.			
	242,52		Tuff. meget uregelmessig og mye oppknust. En del partier med glisende qr.st. Hele veien fin imp av py men også cpy-utskurt på uregelmessige plan.		241,44 - 242,52	18 prøver
244,60			Massiv malm. meget homogen og fører kornete cpy. Cpy er middels kornet. Mot slutten oppknust og oppsprukket og synes enda gjøne (mindre cpy) 10 cm q-holdig leirgang 243,90 - 244.00.		242,52 - 243,50	19 -"-
					243,50 - 244,60	20 -"-
		250,00	Andesitt, meget utkomagn og gjennoms av q-årer Synes til å begynne med være keratofyrisk og får ikke hårdt vanlig utseende. Meget lite eller ingen imp Mikroprøve 4/248,50			
250,48			Massiv malm. homogen relativt fi-kornet og synes føre en del cpy. En tynn leirgangsslire		250.00 - 250,48	21. -"-
	250,64		Tuff med tynn imp av py.			
		251,36	Andesitt, som til å begynne med har py-korn spredt men deler vekt blandet like før			
252,68			Massiv malm En del oppsprukket og slepet, men		251,36 - 252,18	22 -"-

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 30/7-73 Sign: AH Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.018

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			er tydelig gyldenere enn tidligere og bør ha			
			noe mer gull			»
	252,81		Gr st spettet med cc og		252,18 - 252,81	23. prøve
			litt mer imp.			
		255,10	Kalkgr st. meget typisk,			
			skj med cc-bånd oppfil			
			samm skj v/253 • 19°			
			Er endel oppknust.			
		256,15	stedig lysgr. skj cc-			
			holdig bergart med cc-å			
			striper, men er her bredt			
			av enkelte 10 cm mektig			
			kvartsfyr.-bånd (med epidot			
		260,-	Gr.st skj og båndet			
			av epidot og cc) Svært			
			varierende i mektighet.			
			skj v/258,10 • 22°			
			Mikro prøve v/258,50			
			Skal TT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arki

Dato: 30/1-74 Sign: Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10. 019

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2,17	Gr.st. mørk grønn massiv og noe middels. En enkelt oppknust til å begynne med			
		3,90	Gr.st grønn massiv tett og fin-k. Homogen, noe mel tynn åren og stikk med ± ag epidot.			
		5,37	Gr.st. igjen de mørkere noe grovere type.			
		6,35	Gr.st grønn homogen og fin-k type			
		7,25	Breksje aktig, oppknust Synes være tuffittisk og noe py-førende.			
		11,40	Gr.st. massiv fin-k tett grønn og homogen. Lange kjerner			
		12,83	and gr.st. lysegrønn, lys middels homogen og med glassaktig finkornet flate.			
		14,50	Gr.st massiv grønn og homogen kan vær noe andesittisk.			
		17,00	and gr.st. massiv grønn og middels til fin-k			
		20,25	Gr.st. mørkere grønn og meget fin-k med en del epidot-årer og			
		26,57	Gr.st. grønn massiv og fin-kornet noe oppknust og noe kpaltet. En del bruk stand av aggiomerat som består av runde korn av forskjellig storrelse i en mer grå grunnmasse. Enkelte kjerne py-strøk her. Disse finnes: 20,25-20,34, 20,44-20,61 20,92-21,06, 21,14-21,25 23,08-23,20			
		32,30	Gr.st. grønn, meget massiv og homogen. En kornskjø litt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 31/1-74 Sign: AL Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10.019

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Sveve mm vanlig grøst			
			Føre fram til 29,00 m med			
			cc/g-amygdaler. Mt-bånd v/39,90			
		34,45	Amf. grøst. blålig grønn			
			meget massiv og tett.			
			homogen og noe mm			
			grov mm vanlig.			
		34,90	Gr.st. lys grønn i topp del			
			av ~~kjerne~~ grt og ~~mørk~~ flakig			
			mulig presset gabbro			
		35,95	Gr.st. grønn, tett fin-k			
			og homogen. Noen fg-xx spredt			
		39,70	Amf gr.st. blågrønn, massiv			
			meget ~~tett~~ tett. middelskje. Noen			
			g-årer.			
		42,85	Gr.st. grønn. meget massiv			
			tett fin-k og homogen. oppknust			
			41,80-42,20.			
		45,20	Amf gr.st. grågrønn tett			
			massiv og homogen. Noen			
			tynne g/cc-skifer langs lagmm			
		53,50	Gr.st. tett, grønn, fin-k. og			
			meget homogen, men en			
			finnes tynne klorittskiferbånd			
			Det hele homogent mm			
			oppknust første meter. Tynne			
			tynne magnetittbånd v/45,50			
			og noe mt og kis 46,10-46,30			
			videre massiv og grønn			
			~~grønn~~ noe knudret på brudd-			
			flate og her en del			
			epidotårer 49-50			
		57,25	Det samme, men nå med			
			mest g/cc-amygdaler.			
		59,75	Amf grøst. grønn, massiv			
			tettet, homogen, med g/cc-			
			amygdaler. Det er noe			
			meget tynne vekslinger			
			mot grøst.			
		60,12	Amfibolitt/diabas, meget gjen-			
			av grønn. Og epidotårer			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 31/1-74 Sign: nt Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10 019

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
			Dessuten en stripen og bånd av leis og nt. Skarp grense mot overliggende gnd. gr Grense 34°			
		64,32	Gnd. gr st. grønn massiv og meget homogen, fin-k Enkelte hjem brekssert sone med mer foliasjon sammen med epidot.			
		70,30	Gr st. grønn massiv meget homogen, finkornet og lett. Oppknust. 64,60 - 66. av			
		71,10	Gr st. mer uregelmessig mørk grønn. svakt skf og litt mer kloritisk på skf plan. Brekssert tynt bånd ved 70,75 Skf γ/70,90 = 27°			
		71,90	Gr st grønn massiv fin-k og homogen.			
		73,90	Gnd. gr st. lysgrønn lett og meget homogen. Middelskk. Gjesatt av årer som inneholder kv/q mm tykkelse mot omgivelsene epidot.			
		75,60	Gr st grønn meget lett og fin-k. homogen			
		77,45	luft. skf mer uregelmessig og kloritisk i stor overvekt Skf γ/75,90 = 38°			
		82,30	Gr st. mørke grønn. meget lett og fin-k Enkelte skrotter gjennom vevd av meget tynne kloritt-stikk.			
		83,12	Gnd.skift, mørk lysgrå, kornet og lett, delvis brekssert.			
		84,13	Gr-st. mørk grønn og meget svakt skf og glimmer på skf plan.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 4

Dato: 31/1-74 Sign: AT Retn.: -90 Sted: 1075/1508 Hull nr.: 10 C/9

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Skf V/83,55 = 29°			
		85,83	Grst mørk grønn, massiv tett, og fink. Homoge og med små ca - årer amygdaler			
		87,20	Grst. grønn, massiv tett og fink. homoge-			
		86,47	Tuff, meget massiv og med lyse grov og vag lagdeling			
		89,80	Tuff. meget distinkt skifting mellom grove og finkorna lamell. Det basiske i overvekt. Skf.			
		97,65	Tuff. lamellene mere varierende men gjennom tydelig i st. Det er omtrent likt forhold mellom basisk og surt. Det hele er her ellers mindre skf. Skf V/90,20 = 34° — " V/97,50 = 18°			
		99,77	Grst grønn, tett og middelkk. amf. står fram som spetting.			
		103,70	Tuff meget tydelig lamellert i partier ser det ut som elongerte fragmenter ligger i en klorittisk grunnmasse.			
		107,10	Tuff, men lagdelinga er mye mer vag og det ser ut som det grove leddet er dominerende.			
		114,63	Igjen sterk lagdeling i tuffen. den virker noe porøs. og surt er i overvekt. Igjen partier der mere ber fragmenter i en klorittisk grunnmasse. Delvis skf Skf V/113,40 = 33°			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 5

Dato: 31/4-74 Sign: A Retn.: -90 Sted: 1075/150E Hull nr.: 10.019

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		117,80	Tuff, massiv med diffus bånding og med andesitisk materiale i overvekt.			
		119,08	Grst. blågrønn massiv tett forekomst antagelig et meg breccie bånd i tuffen. Noe oppknust.			
		121,80	Tuff. Til å begynne med sterk bånding men litt mer vage i båndinger etter hvert.			
		130,22	Tuff hele veien veksler i sterk og diffus bånding men hele tiden en båndingsretning. Er varierende skif. Skif V 127,90 = 29°			
		134,58	Tuff, stadig men nå er båndinger blitt meget vag og det synes som om det hele er mer massivt. Enkelte steder synes agglomerat bind tydelig og boller synes oppknust og så bollet igjen med q-			
		134,85	Meget sur breccie, bygd igjen med q og grunnmasse grønn.			
		135,07	Grst eller helst tuff som har en tydelig intrusiv kontakt med bergart under som er.			
		142,90	Gabbro er til å begynne med skivet og fint flakig blågrønn på bruddflate og ønske mye oppknust. Blir ofte hvit når massiv men har et tydelig grønt bånd med forholdsvis skarpe grenser ved			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 6

Dato: 31/1-74 Sign: AL Retn.: ÷90 Sted: 1075/1500 Hull nr.: 10019

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			ca 137,20 - 137,35. Blir			
			ette dette mer grovkornet			
			En del lyse og hen			
			imm store anhxx, stadig			
			mer mørkgrønn og flakete			
			pga brudd flate.			
			Ved 142,60 og ut			
			har man en jump av			
			meget grove px-xx og			
			ansamlinger. Disse er fra			
			5mm til 15mm og går			
			videre ned i borgrut unde-			
		143,32	Brst. som en finkg			
			og grønn med opiolotaire			
		143,70	andesitt, meget blåsort med			
			grove px-xx og med en			
			del magnetitt			
		144,18	Grst. som over men			
			bare med gradvis			
			overgang til			
		154,90	Gabbro, samme type			
			som over. Er fint			
			til å begynne med men			
			blir fort meget grov med			
			gulgrønne feltspatter opp			
			i 2mm store. Relativt			
			ofte opptrer oppknuste			
			partier. På slutten blir			
			den igjen finere og en			
			oppknust og skifring med			
			overgang til tuff under			
			Stø på grense 149			
		160,20	Tuff massiv og med			
			meget varig bånding. Det			
			ser ut som det store			
			hullet er i overvekt			
			Dit er hele veien meget			
			oppknust.			
		160,80	Ord mørk grålig meget	7/2-24		
			tett og fint, hemogen			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 4/2-74 Sign: A Retn.: -90 Sted: 10755/1505 Huli nr.: 10 019

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		163,63	Tuff, meget diffus bånding ikke-hvast og svært utydelig mot sluttn.			
		165,18	And grøt. mørk blågrønn meget finkornet og tett			
		165,40	Tuff. svært opptemmet og tildels regenerert/omdannet i partier.			
		173,60	Tuff. noe mer massiv bar svak bånding. Basalt mot. synes dominere.			
		176,25	Tuff. Lik og tydelig båndet også med cc-bånd. Klorittmateriale er i stor overvekt. Stf V/17,4,65. 18° Det finnes en del meget sprøtte og meget tynne py-bånd som imp.			
		178,90	Tuff. som nå en massiv med meget svag bånding			
		180,50	And grøt. massiv grønnblå meget tett. forholdsvis fink med glassaktig grønne bruddflater Et par steder sees mer svart materiale			
	193,05		Tuff, ikke typen en vesentlig klorittisk og ikke nesten direkte båndet Men den hele tiden små hvite feltspatkorn liggende i den klorittiske massen og bruddflatene er grønnlige av finkornet variant. Dessuten finnes hele tiden en grønn men meget fattig py. enn vesentlig i bånd, men også som små xx i kloritten.			
		185,53	Tuff. men nå rett imp og meget klorittisk. ellers lik den ovr. Stf V/184,70 = 22°			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

A-k8

Dato: 4/2·74 Sign: [illegible] Retn.: ÷90 Sted: 1075/1500 Hull nr.: 10.019

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		188,65	Omd grøst. mørk grønn tett fin-k. Forgrønnsatt av q/og kloritt stikke- og åren Delvis mye oppknust mot slutten.			
		189,75	Grøst massiv fin-k & mørk grønn og homogen-			
		190,55	Tuff. Grønn vekslende med lysdulige og brune bånd av sunt/basisk			
	194,08	≈	Tuff. svakt skif og lysdulig pyroklastisk med de små q-kornene, og så med noe uregelmessige q-rike lag langs skif. Derfra partier med større fragment-, agglomerat. og hele tiden meget typ-py-imp			
		195,80	Tuff. massiv type med mere brune bånd			
		197,08	Grøst. meget mørk grønn meget fin-k og massiv Form enkelte sprekk. py-xx			
		198,50	Tuff. massiv type med meget svake bånding. Basisk dominerer.			
		202,08	Tuff skif variant og er over en mer lys grønn type Skif v/199,00 - 279 Her har økt ganske kraftig q-åren			
		203,43	Grønd grøst / massiv grønnlig fin- t/middelsk Form py-xx Er sterkt oppsprukket			
		206,54	Tuff. ganske massiv type dist and-materiale dominerer men hvor det er partier på 20-30 cm med lys grønt kloritthisk materiale. Delvis oppknust.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 9

Dato: 2/8-73 Sign: A Retn.: -90 Sted: 1075S/15[illegible] Hull nr.: 10.D19

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprøve	Anmerk.
		202.05	Tuff med diffus lamdring og med en del q-årer Mt-åre v/201.40 Basisk mat. i majoritet Meget oppsprukket			
		203.50	And. gr-st. grønn noe lyst tett og finkornet hard (sprø) noe oppknust			
		205.15	Gr-sten grønn, finkornet og grønske homogen i vekslinghete overgang fra beroget over			
		205.30	Tuff, oppknust og med py-xx	N2.		
		208.20	Gr-st som over sterkt oppknust og gjennomsatt av q-årer Etter 206 m blir massiv og moderat oppsprukket			
		208.70	Gr-st. grønn, fin k og svakt skj med enkelte spredte py-xx Skj v/208,50 = 18°			
		211.-	Tuff, meget svak lamdring og med basisk som fremtredende materiale. Synes noe grov i korn-størrelse.			
		212.45	Kjernetap			
		213.02	Tuff som over, men synes her mer tett og fin k.			
214.00			Massiv malm. De første 40 cm er den sterke oppsprukne med q-årer m.m. men mot slutten er det massiv og rik cpy-malm	213.02-213.40 213.40-214.00	213,02 - 213,40 213,40 - 214,00	1. prøve 2. -"-
	216.00		Keratofyrisk beroget, grå, grønnlig i fersk pr bruddflate — fører i alle fall litt del q. Denne er impregnert med py nåle vis og cpy opptrer som grunner og kvarts. Basis i lang og	LIE 217 218	216,00 - 218,00	3. -"-

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 2/8-73 Sign: A Retn.: ~90 Sted: 10755/1508 Hull nr.: 10.019

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			ling av soren (pa grensen mot massive sulfider) har man landing av grov py Soren er meget oppsprukket			
217.01			Massiv sulfid malm, middelskornet, vesentlig py men er kontakt av cpy og med skyer av samme. Blir rikere av cpy mot slutten. oppsprukket.		218.00-217.01	4. prøve
	21825		and gr st meget tett og fink Glassaktig pa Brudel flate. Svak py-imp Oppsprukket.			
		218.93	kjernetap			
		219.85	Andesitt /+q meget oppsprukket			
	220,-		Tuff. Svakt skif meget mørk med en god del imp av py og noe cpy som er utgnidd. Skif v/220m - 19°		219,85-220,0	5" -11-
		223,60	kjernetap			
	224,-		Tuff vekslende hvor gr.st-ledd utgjør mest som massive lag med noen tynne lyse imellom. Py finnes men i liten mende			
		225,-	kjernetap			
	225,45		Tuff meget oppknust og med tynne massive sulfid bånd og ellers imp endel cpy		225,00-225,45	6 -11-
		226,63	kjernetap			
	226,70		kvartslyser med et nesten massivt py. bånd. Kraftig noe cpy som klyser			
		227,00	kjernetap			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 7

Dato: 2/5-73 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: 675/1506 Hull nr.: 10.019

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	227,6		Kisstuffer som sist med mest ster imp. Opptrukket.		227,00 - 227,6	7 prøve
		229,05	Grst-aktig mulig tuff men har gått stær som viser inge egldet. Også noe cc. Det hele er svært uregelmessig Oppsprukket			
		229,43	Kjernetap.			
		231,35	Grst. med egldet som over. Oppsprukket.			
		231,73	Kjernetap			
		234,41	Grst som over her mer skf			
			Skf v/232,70 - 9°			
			Enkelt tynne cc-årer Ideal hele er brogrøtte i dette hullet på ingen måte typisk for cc-sonen.			
		235,50	Kjernetap			
		235,70	Brogrøtt sonevis, kansstyje mer q-rik.			
		236,38	Kjernetap.			
		239,66	Tuffaktig, men har en gyldet q-pidol i striper og bånd. De q-rike bånd har også små, skarpkantede gassfis liter. og ideal hele er vel et agglomerat.			
		240,00	Kjernetap			
			SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1

Dato: 6/2-74 Sign: AH Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.70	And. grst. mørk grønnblå middels-k. tett og homogen med noen grønne og mt-bånd v/0.30 m - oppknust			
		5.95	Grst. massiv grønn, gamske fisk, men ikke av alle fi-erte. Også denne mye oppknust.			
		6.37	Mt-bånd med svake grønne i klorittisk bergart	NB.		
		10.84	And. grst. mørke blågrønne tett og fisk. Gamske homogen men kan variere om mel grst. Har noen brekkje-partier og er oppsprukket.			
		12,44	Gr.st. meget tett og fisk Meget mørk grønn, resten glimmerde på flekker. Her og der finnes ee i gabbro som e gamske store og dilvis utviklet som amygdaler.			
		15.53	And. grst. mørke blågrønne gamske fisk og tett. En helt massiv, men noe grønne bånd kan skimtes. Er meget oppknust de siste 75 cm.			
		16.00	Kjernetap			
		19.00	Brekkje? til å begynne med mørke blågrønn, men blir mer grønn etter hvert Er en sterk klorittisk bergart meeg mye ee som amygdaler og små steiner. Men også litt finnes skarpkantede små korn av grønn materiale. Det på klassifisering som pyroklastisk.			
		21.30	Overgang fra grønn mot her har det mer helle-preg og det ser ut som			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 6/2-74 Sign: AH Retn.: +90 Sted: Hull nr.: 10.020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			brelagen skjærer gjennom hellen. Mot grensen brekkja tuff har vi fine py.i-gn med mye mt.			
		22,57	And grst mørk grønn, hellen fin m/ py-xx			
		22,73	Mt-bånd i sur grønnmasse Også noe kis, brekkaiert	AP		
		26,47	And.grst meget massiv tett mørk grønn, middels-kornet og med tynne q-årer			
		29,43	Grst mørk grønn meget fin og tendens til skif, men ikke ekte. En sterkt oppknust, ikke gangligg.			
		32,29	Tuff sterkt skif. og meget markert vekslig mellom ca 5cm lyse sure og basiske bånd Skif v/ 315° - 20°			
		33,52	Grst, grønn, noe mørk og massiv brekkja men likt and grst.			
		34,23	Tuff, tynnbendet mye cc og mye oppknust			
		36,55	Grst mørk grønn tett og fin men gj.sadd og kraftige q-årer Oppknust mot slutten			
		38,48	And. grst. grønn noe mørk tett og heller fin homogen.			
		39,29	Tuff, som sist meget blandet av cc-material rester av helt brekkert.			
		40,60	Grst massiv grønn tett og fin. Dette er den typiske grst.			
		41,80	Tuff, meget massiv type som veksler mellom grst og and.grst.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 6/2-74 Sign: A Retn.: ~90 Sted: Hull nr.: 10 020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		43,50	Grøt mørk grøn, massiv fett og bank			
		48,45	Tuff som over massiv med diffuse veksling av sort/babrisk mot grønn forskjell			
		48,65	Sur- mørkt båndet materiale som kan holde mye mt.			
		50,35	Tuff. lysere massiv type som over men materialet er litt mere magnetisk og båndingen mer tydelig ofte gjennomsatt av tynne kvartsårer. Mot slutten forholdsvis oppblandet bergart og med py-imp			
		50,80	Gabbro, meget forskifret med grove hf tuff 50/35°/=37°	NB.		
		53,83	Meget lys grønn og spettet av amf Tuff. sammensatt grønne sterkt. Er stkf og tydelig båndet og rust- agglomeratisk Grov partert partier. To svake mt-holdige bånd fra 51,60 - 51,95.			
		71,65	Gabbro, som den første 1/2-m e meg stkf rem liten fort massiv lys grønn og helle grov-kornet med ca 1-2% opptil 5 mm. Partier med mye lys gabbro finnes. Det er likevel stkf til sterkt hele tiden. Men ofte finner de massive typer som har en gulbrun grønn mørk med feltsp og epidot av med store feltspat-xx og amf-xx			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 4

Dato: 6/2-74 Sign: H Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10 020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Gabbro blir ofte hurt gradert over fin.			
		86,20	Gabbro her av mer fin type og som i mørkere grønn enn tidligere. Enkelte partier er g-fylt bredsje og ofte blir det som med mer grovt materiale.			
		87,05	Some med cc-blandet grst.-materiale.			
		92,83	Gabbro, fin-kornet og noe skif til å begynne med men går gradvis over til den grove lyse svakt skif type for øvrig i hullet			
		96,65	Grst grønn, meget tett og fine homogen. Her knapt grådannelse til å begynne med, senere meget mørkt opplet over			
		99,50	Grst svak skif, mørk grønn, sortglimmer på skif plan Skif v/98,70 = 37° Det nye som det kommer inn tuff banding ellers likert.			
		103,05	Tuff. Skif meget svak banding, men likevel tydelig. Basisk mot i stor overvekt.			
		104,95	Tuff, mye mer massiv og det som materiale dominerer nå.			
		105,95	Grst massiv grønn fett fine.			
		108,23	Tuff massiv og med svart ukjent banding, materiale fordeler seg fint basisk/surt.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 5

Dato: 6/2-74 Sign: AL Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 6.020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		108.80	Sterkt omdr. og pyroklastisk lag			
		110,20	Grøtt grønn massiv og tett finkt			
		113,86	Tuff, grønn massiv og med gradvis tydelig skifting i ~~lyst~~ grått surt og grønt basisk materiale, i regelmessig 5-10cm bånd.			
		118,48	Tuff mere skifrig og lysere grønn, tildels finskifret i partier og med cc-bånd Skj 1/113,70 - 21°			
		122,60	Tuff med tydelige lyse grå 5cm bånd av keratofyrisk materiale.			
		131,23	Tuff, massiv og meget mer man kan si det e en massiv keratofyr, med mye epidot og litt til blandet uregelmessig basisk klorit-materiale. Birgarten ligner mye på keratofyr horisontalt man kan finne i vest og sydvest ingrula. Langs kjernene kan sees lyse sprekker i „horse-tail" form fylt med rødt (jaspis?) materiale. Meget hyrne.			
		134.80	Tuff, massiv stadig mer nu ikke fullt så sur lenger og mye mer klorittisk materiale Birgarten kan karakteriseres som en massiv tuff med lag bånd- og vær basisk mot er i overvekt	8/2-74		

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 6.

Dato: 8/2-74 Sign: AA Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10 020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		138,30	Andesitt, massiv mye variasjon i farger fra grønn-grå til grå. Er meget tett og finkornet. Q-åre opptrer ofte og mot sletten finnes også sprekker med epidot/q og noe rødfylltoget.			
		138,80	Tuff, svært grønn massiv og vekslende innhold av kloritt			
		139,60	Grst. massiv grønn og noe grovere enn vanlig			
		140,45	Tuff vekslig mellom grønne brede bånd av basisk bånd, noe oppknust			
		142,25	Grst slett ~~med~~ grønn med mørkere partier av kloritt			
			Sek V/141,45 - 175			
		143,90	Andesitt, grønngrå massiv tett og fin-k. Glassaktig grønn på brudd flater. Bergarten her gradvis overgang til			
		148,98	And. grst. blålig grønn meget tett og fin-k. massiv og homogen, med noen få tynne epidot-åren og q/cc-åre			
		150,65	Tuff, massiv lysgrønn men meget lavt båndelag. Her er det meget mørkt grønne og den begynner basisk men blir snart etter hvert.			
		152,55	Andesitt blålig grønn meget tett og finkornet og med et stadig varierende innhold av kloritt og epidot-åren. Derfor er denne oppknust.			
		156,30	Tuff er meget massiv med dog noe lyse blå bånd av surt og basisk i like proporsjoner.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 7.

Dato: 8/2-74 Sign: AH Retn.: 490 Sted: Hull nr.: 10 020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		175.45	Tuff, massiv og med tydelig kontrast mellom de grønne kloritiske leddene og de svært grå leddene. De grå leddene ligger som små linse-aktige legemer i en kloritiske grunnmasse. Linsene er meget avrundet og med gode grenser mot matriks-materialet enkelte tynne gjennomsettende årer. I partier synes flere små linser å ha flytt sammen til et stykke, i alle fall er det partier med den svake antydningen til kloritiske materiale mellom linsene. Det hele må karakteriseres som et tydelig agglomerat.	N B		
		178.70	Andesitt, grå/blå, finkornet massiv og tett. Homogen. Bruddflate er tydelig glassaktig med grønnstjær.			
		181.10	Dacitt mørk blågrå og meget tett og finkornet, massiv og homogen. Her er bruddflaten glassaktig hvit noe som tyder på mindre feltspat, mer q.			
		182.80	Tuff svakt rødlig med noe mer tydelig tett lagning mellom grønt/brunsk skift V/180,60 = 22°			
		187.65	Tuff mer massiv men rødlig med noe lag- og skiftplan og med kraftige lagning hvor grønt brunsk skifte 15-20 cm. Er opptatt fra 185.70 - 187.00.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8/2-74 Sign: A Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		184,10	Grst massiv med ~~stripende tynt~~ pen bredd- flate ~~tynn~~ mm spalte med cc og ~~tynn~~ q-åre			
		184,13	Tuff massiv og relativt fin type med - grønfarg bredt sure andesittiske bånd Gradvis overgang			
		187,20	Andesitt grågrønn, mørk fett og middelskornet. Er glassaktig grønn på flater			
		188,85	~~Grst~~ Grst. massiv grønn, kanskje noe flatelig			
	191,60		Tuff er svakt skf og består vesentlig av basisk materiale. En helhet- impregnert tynt av qg i tynne striper Skf v/189,90 - 60° En del qg og svart oppknust til 190 m			
		193,40	Tuff, eller klorittisk grst i alle fall meget usikker bestemmelse Skf v/192,70 = 190			
	200,-		Tuff skf usikker imp av kvarts qg. Opptrer som tynne striper langs lag- delling (skf) men også som spredte enkeltkorn. Hele veien har bergarten spredte runde q-amygdule. Imp er knyttet til de mer q-rike bånd.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 9

Dato: 31/7 73 Sign: AA Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	200,75		Tuff, mørk vekslende mengde uregelmessig rundede bom av q og noe cc. Tuff er lys grønn og noe brunlig av farge og består blant Finere enkelte striper med lysm py-imp			
		203,24	Grønt, grønnlig mørk grønn. Tuff og meget homogen Gj satt av q-årer			
		204,91	Tuff som ovenn men med mindre mengde runde fragmenter og enkelte mindre imp			
		206,62	Grønt grønn, tuff og homogen. Finere enkelte mørkfarvede av cc og ellers spredt av cc. Er svakt impregnert			
	208,00	2[illegible]	Tuff aktig, ellers homogen tuff opplagret grønnskifer. Enkelte klynger med py-imp			
		210,59	Grønt noe mørkere, homogen med meget svak py-imp Finere meget blandet og enkelt finere (1-2 mm) avrundede rø cc			
		214,10	Mørk tuff, hvor det lyseste leddet er i dårlig overvekt og det er vanskelig å kalle det samlede bergart Tuff enkelte kloritt-rike fragmenter			
		215,50	Grønt mørkegrønn og homogen.			
		219,95	Tuff massiv, det veksler mellom lysere mer bandet og mer mørk grønne bergarts bånd. Diffus veksling enkelte cc/q-rike avsnitt Impregnert med py-mindt Noe oppsprukket			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1 9

Dato: 31/7 73 Sign: AL Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	200,75		Tuff, med vekslende mengde uregelmessig rundede korn av q og noe cc. Tuff er lys grønn og noe lagdelt av svake og basiske bånd. Fører enkelte striper med tynn py-imp			
		203,24	Grst. grønn mørk grønn, fink. og meget homogen. Gj.satt av q-årer			
		204,91	Tuff som over men med mindre mengde runde fragmenter og enn mindre imp			
		206,62	Grst. grønn, fin-k og homogen. Fører små amygdaler av cc og ellers spetter av cc. Er svakt impregnert.			
	208,00	~~25~~	Tuff aktig, eller en tuffoppblandet grønnstein. Enkelte klyser med py-imp			
		210,59	Grst. noe mørkere, kanskje med meget svak py-imp Fører mye klorit og endel små (1-2 mm) amygdaler av cc			
		214,10	Massiv tuff, hvor det basiske leddet er i desidert overvekt og det er vanskelig å kalle det sure basisk tuff. Enkelte kvarts-rike fragmenter.			
		215,50	Grst massiv grønn og homogen.			
		219,95	Tuff massiv, det veksler mellom lysere sure bånd og mer mørk grønne basiske bånd. Diffus veksling Enkelte cc/q-rike amygdaler fragmenter med py-imp Noe oppsprukket			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 10

Dato: 31/7-73 Sign: A Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	220,74		Tuff som før, men		220,00-220,74	1 prøve
			bindingen her mer markert			
			og imp. bind av py			
			er bredere			
			Grst. massiv, grønn		220,95-221,30	2 -"-
	221,30		og slatet fyk. Føre			
			enkelte bånd med imp			
			og hvor endel cpy.			
		223,70	Grst. som over er			
			meget massiv og homogen.			
224,30			Massiv malm, ellers meget		223,70-224,30	3 -"-
			sterk imp av cpy. som			
			ligger med nær py blandet			
			Føre som en årring			
			mørk med et mørkt			
			mineral sammen med disse.			
			Meg klorit. Granatmalm.			
	225,-		Grd. grst. med imp		224,30-225,60	4. -"-
			av py i lag kvartsfyk rom			
			(cpy) som skyer massiv.			
		226,70	Grst massiv grønn, kvartsfyk			
			mot flatet føre noen			
			cc og g-amygdaler.			
			Noen klorittiske skyer.			
		228,70	Samme grst uten			
			amygdaler. massiv fin-k			
			og tett. Noe oppknust			
			rot stuff.			
	233,50		Grst keratofyrisk m/		228,70-231,00	5 -"-
			svake flatig, er grønske		231,00-233,50	6 -"-
			fin og lys på bruflate.			
			Er preget med imp			
			av py men også noen			
			cpy-grnister. Ofte finn			
			noen tynne cpy-bånd.			
			Litt mer spredt imp			
			mot sluften.			
	234,15		Tuff med store g-rike		233,50-234,15	7 -"-
			fragment og med en heller			
			svak imp av py og cpy			
			Bergarten er nær sitt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark. 11

Dato: 31/7-73 Sign: AJ Retn.: ~90 Sted: Hull nr.: 10.020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			og glimmerrik skorst på			
			skj. plasmma. Her er			
			cpy utgnidd i tynne			
			strøk			
			Skr. v/233.60: 193			
		234,74	Andesittisk gr-st helt			
			homogen og lysgrønn,			
			gråsvakting på kantflater.			
	237,73		Tuff, pyroklast, spaltet		234,74 - 236,50	8. grønn U
			med sprekker (1mm) stort	✓	236,00 - 237,00	9. -"- -"- U
			utkilen og spalter OFte		237,00 - 237,73	10. -"- -"- U
			meget skarpe fragmenter og			
			alltid med svake spaltet			
			og sprekker, som er Helle-			
			regelmessig			
	241,35		Gr-st som kan være		238,60 - 239,00	11. -"- -"-
			en meget kiftert kontakt		239,00 - 240,71	12. -"- -"-
			tuff og med skyger av			
			brake sprekker. Meget irregel-			
			messig innblandet mørk skifter			
			fra mm som avrundede			
			og fragmenter av 1cm			
			store			
			Mikro prøve v/239,50	NB		
	241,70		Tuff meget kontaktsk		241,55 - 241,70	13. -"- -
			og med uregelmessig			
			sprekkedannelse			
		242,15	Massiv gr-st grå og			
			brun.			
	244,40		Tuff som over meget		242,15 - 244,40	14. -"- -
			uregelmessig og pyroklastisk			
			her økt sone			
	245,90		Tuff som her regelmessig		244,40 - 246,85	15. -"- -
			lamellert, noen skarpe med		247,55 - 248,90	16. -"- -
			mye sprekker			
	251,34		Kontakt med sterkt sprekk		248,90 - 251,34	17. -"- -
			fra nesten massiv lava			
			til sterkt sprekk. Opptil			
			1 klype og spalter, helst			
			oppknust mot kontakten.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 12

Dato: 31/7-73 Sign: AJ Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10.020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
252,93			Massiv malm (eller så godt som) middels kornet og jevn endet og som gang mer. Har den i midten endet opp		251,34-252,93	18 prøv
	253,78		Gradvis overgang fra den massive malmen til en meget sterk impregnert kvartsholdig bergart, som en mindre tid oppstår. Har det en ny opp		252,93-253,78	19 -"-
	254,65		Grå meget sterk impregnert og sulfidholdig kvartsholdig bergart til og med ny opp. Mye kobberkis mot slutten.		253,78-254,65	20 -"-
	256,85		Meget sterk impregnert kvartsholdig bergart. Inneholder en del massiv malm i midten		254,65-256,85	21 -"-
	258,80		Tuff lysgrønn og noe skifrig med varierende impregnering av kis		256,85-258,60	22 -"-
	260,80		Ende grønn lysgrønn og meget oppsprukket. Noe ytterst svak impregnering			
	265,67		Tuff skifrig og en god del oppsprukket. Er gjennom hele lengden hvor det ikke er impregnert endet opp		260,08-262,00	23 -"-
					262,00-264,00	24 -"-
					264,00-265,67	25 -"-
			Skift 1/260,15 = 10m			
			Endet av opp er klart utover skiftplanene.			
	268,00		Kalkgrønnsten med kalkårer og med impregnering av kis			
			SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 31/7-73 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	220,74		Tuff som før, men båndingen nu mer markert og imp bånd av py er bredere		220,00 - 220,74	1 prøve
			Grst. massiv, grønn og relativt fink. Fører		220,95 - 221,30	2 -"-
	221,30		enkelte bånd med imp og kun indre cpy.			
		223,70	Grst. som over er meget massiv og homogen.			
224,30			Massiv malm eller meget		223,70 - 224,30	3. -"-
			sterk imp av cpy, som			
			klyser, med noe py iblandet			
			Finner som en kornig			
			masse med et mørkt			
			mineral sammen med disse.			
			Mye klorit i grunnmasse.			
			Ard. grst. med imp		224,30 - 225,00	4. -"-
			av py (og kanskje noe			
			cpy) som skyer massiv			
		226,70	Grst massiv grønn, kanskje			
			noe flakat fører noen			
			cc og q-amygdaler.			
			Noen kloritiske skyer.			
		228,70	Samme grst uten			
			amygdaler, massiv frisk			
			og tett. Noe oppknust			
			mot slutten.			
	233,50		Grst keratofyrisk og		228,70 - 231,00	5 -"-
			svakt flakig, er gangbe		231,00 - 233,50	6 -"-
			fører og lys på hverflate.			
			Er pepret med imp			
			av py men også noen			
			cpy-grenser. Ofte finner			
			man tynne cpy-bånd			
			litt mer pepret imp			
			mot sluttet.			
	234,15		Tuff med større grønne		233,50 - 234,15	7 -"-
			fragment og med en heller			
			svak imp av py og cpy			
			Bergarten er noe skif			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 31/7-73 Sign: AH Retn.: ~90 Sted: Hull nr.: 10.020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			og glimmet svart på skj-planene. Her er opp utgridd i tynn plate			
			Skj v/233,60 = 19°			
		234,74	Andesittisk grst helt homogen og lysgrønn glassaktig på brudd flater.			
	237,73		Tuff, pyroklast, spettet med små (1mm) store ukjent q-spetter. Ofte meg store fragmenter og alltid med svake spettis py-imp, som er fellen uregelmessig		234,74 - 235,50	8. prøve,
					236,00 - 237,00	9 -11-
					237,00 - 237,73	10 -11-
	241,35		Grst. som kan vær en meget diffust bundet tuff og med skyger av svake imp. Meget uregelmessig innhold mot slutten fin men imn avrundede q-fragmenter ca 1cm store		238,60 - 239,00	11. -11-
					239,00 - 240,00	12 -11-
			Mikro prøve v/239,50	NB		
	241,90		Tuff meget kvartsrik og med uregelmessig imp bånd		241,35 - 241,90	13. -11-
		242,15	Massiv grst grøn og fin-k.			
	244,40		Tuff som over meget uregelmessig og py-innhold har økt noe.		242,15 - 244,40	14. -11-
	248,90		Tuff ikke her regelmessig bundet, men stadig med mye imp.		244,40 - 246,85	15. -11-
					247,55 - 248,90	16. -11-
	251,34		Kvartsfyrisk med økende imp fra resten massive bånd til sterk imp. Cpy opptrer i årer og spetter, ikke opptrent mot slutten.		248,90 - 251,34	17 -11-

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 4

Dato: 31/7-73 Sign: A Retn.: ~10 Sted: Hull nr.: 10.020

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
252,93			Massiv malm (eller så godt som) middels~~kornet~~ og fører endel q som gangmin. Tror den inneholder endel cpy		251,34-252,93	18 prøver
	253,78		Gradvis overgang fra den massive malmen til en meget sterk imp som finnes i sur kvartsførende bergart, som en meget tett spetting. Tror det er noe cpy		252,93-253,78	19. -11-
	254,65		Grst meget gj.satt av q-årer og utfyllinger til q også noe cpy cpy blir borte mot slutten.		253,78-254,16	20. -11-
	256,85		Meget sterk imp av py og cpy i en kvartsførende bergart. Enkelte rene q-bånd imellom		254,65-256,85	21. -11-
	258,80		Tuff lysgrønn og noe skf, med varierende imp, vesentlig av py. Noe gtzv.		256,85-258,80	22 -11-
	260,08		And. grst lys gr og meget oppsprukket. ~~Fører~~ Litt sterk py-imp			
	265,67		Tuff skf og en god del oppsprukket. Er gransket tydelig bånd. fører ~~d~~ delvis rik imp også endel cpy. Skf 4/260,15 = 10° Endel av cpy er klint mot skf-planene.		260,08-262,00	23. -11-
					262,00-264,00	24 -11-
					264,00-265,67	25. -11-
	268,00		Kalkgrønnskifer meget kalkrik og med striper av epidot SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark

Dato: 25/4-74 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.021

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.70	Tuff, vekslende massiv og grønnbe oppkrust			
		2,35	Kjerretap			
		3.55	Tuff som over skadig grønnbe oppkrust.			
		5.18	Gr.st massiv, mørk grønn med enkelte større Hbl-porfyroblast. Men kan se antydninger til skakt lagning lodd.			
		8,58	Tuff meget massiv og vesentlig mørkt farvelikt, men kaotisk del med også mer massivt materiale. Det hele med gradvise overgange			
		12.59	Tuff, grov skf mer med skarpe overgange lyst/grønne Synes som det kan være lagg som i den i Dalsida. Synt kan også sees på kjerne små rundt q-korn Skf 19,30 = 34° Blir noe oppkrust 10.50 - 11.20			
		14.30	Gr st massiv grønn og fin Tuffitt. Blir svakt oppkrust. 13.80 - 14.30			
		15.37	Tuff, massiv type, grønt dominerer, oppsprukket kraftig			
		16.53	Kjerretap			
		17,63	Tuff, skf og grønne tydelig bånding, klorittisk			
		18.00	Kjerretap.			
		19.20	Tuff, av noe skf type som under over. kraftig oppkrust			
		21.50	Gr.st. meget massiv, nesten andesittisk og grønn. Kan se antydning til noe grønne bånding.			
		21.76	Tuff, noe diffus bånding og vesentlig klorisk. Kan en del ee-spetting i de basiske delene.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 25/1-74 Sign: AH Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10021

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		26.20	Gr.st. grønn, meget massiv og finkornet. Typisk type. Få lyse eglest strøk.			
		28.89	Tuff, ensartet massiv men endel oppknust. Er av en lysere type			
		29.00	Kjerntap			
		29.60	Tuff som over			
		30.20	Kjerntap.			
		31.52	Tuff, som over.			
		31.60	Gr.st massiv og meget fink grønn. Har en del strøk fylt med kloritt/q. Det finnes et par mer uregelmessige bånd gjerne klorit og andesitt.			
		36.10	And.grst. mørk grønblåtlig og meget finkornet. Viser glassaktighet på overflatebrudd			
		38.77	Tuff, ganske massiv og evnt vekslende mellom surt og basisk			
		39.85	Gr.st. massiv grønn og meget finkornet lagnes innimellom og blir noe lysere, men er stadig en grst			
		44.75	Tuff, meget jevn veksling mellom surt og basisk. Det er i stor utstrekning surt blågrått materiale.			
		47.60	Gr.st mørk grønn og fin. Meget massiv. Q-amygdaler			
		52.80	Tuff i gnr med meget massive men diffuse bånd, uskyldige overganger. Nå med dominans av det basiske leddet. Man kan se enkelte q-amygdaler i det q-rike leddet.			
		53.00	Kjerntap			
		53.63	Stativ. Tuff som over.			
		54,26	Kjerntap.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 25/1 74 Sign: [illegible] Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10.021

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		55.95	Tuff av samme type som over. En hele tiden meget stenbl opplagret.			
		57.10	Gr.st grønn finkornet og uregelmessig, noe skif. og oppknust.			
		59.00	Tuff, meget massiv type med meget lys farge. Oppknust. men stort sett i lagene styrketen 10-13 cm.			
		61.70	Tuff, likeledes men mer med tydelig skif. Skif V/59,50 er 38°			
		66.63	Gr.st. grønn, finkornet og meget massiv. Her er prominent spaltet retning.			
		67.60	Gr.st. mørkere grønn, enn over mer grovkornet, og er cc-holdig, synlig som grønne vesiner			
		69.50	Grst. igjen grønn finkornet og massiv type.			
		71.15	Tuff, massiv og vekslende i lag med andesitt. og en gangen grovk. grest.			
		72.95	Gr.st. grønn massiv og finkornet.			
		74.37	Tuff. delvis massiv og skiftevis mellom grovere grest. og noe finere ledet.			
		76.00	Kiselstagg.			
		77.71	Tuff, som over men her og der litt uregelmessig			
		81.60	Gr.st. grønn, lit lys og middelskornet type. Får litt dårlig grønske mye epidot i åre og på sprekker.			
		82.63	Tuffitisk rock, sone i denne finere partier med en mørk og lysdelt bergart som viser seg i holde-	NB		

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25/1-74 Sign: AA Retn.: +90 Sted: Hull nr.: 10.021

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
			magnetit. Båndinga skifter med svake (lyse) g-band og dessuten i det hele forholdsvis fattig lag og sulfid lag mot oppbrytning og i tens fordeling. Sulfiden (py) synes NB. også her å utgjøre som regnes avsetning fra en gel, nærmest i karakter av rytmiske utfellinger. Båndinga V/ 81,75 = 40°			
		85.00	Tuff, meget mørk og tekstur av forskjellige lekkelinger i gr.st. typer. Det er vel ikke helt riktig å betegne dette som tuff.			
		86.66.	Gr.st. lys grønn og meget grovkornet massiv Dette kan være en gabbro NB			
		87.25	Tuff, gansk mørk og noe sur type. Er svært oppknust.			
		88.00	Magnetit-horisont Mørk svart blåaktig, en finkornet og her en del tynne striper med py. Er gjennom vevd av c-stikk (aire.	NB		
		89.57	Tuff, av oppknust og meget uregelmessig karakter. Er hele tiden meget fint spettet med py. Store g-ansamlinger oppstår			
		90.80	Kjernetap			
		92.25	Tuff, som over, men her blir det hvert nu regel messig og diffus i båndinger			
		95.25	Tuff type men det er nå meget veg i båndinga i Bare her og der ser man at			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25/1-74 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.021

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			den finner en hydrotherm bindemasse. Bergarten er noe stkf V/9360 = 42°. Det er forøvrig mentelig at stkf er noe bratt i dette hullet. Det kan tenkes hullet avviker men er usannsynlig.			
		96.20	Gr.st. grønn, svært fint og massiv			
		98.63	Tuff, lysgrå med noe diffus bånding, men med gaven usannsynlig sprekking av ca.			
		100,30	Gr.st. mørk svært grønn delvis gli-smak på knuste flater. En meget fin-kornet.			
		101,15	Lys gr.st. grågrønn, massiv middels- til fin-k, har enkelt g-/cc-anrygginger.			
		105.10	Tuff, stkf variant. Er meget fin-kornet. og klorittisk ledd dominerer. En del g-bånd viser sammenfoldning eller krenulering. Stkf V/103 = 43			
		106.12	Gr.st svært grønn og av en meget fin-k type.			
		108.16	Tuff. det ser nærmest ut som man kan ha store „bomber" av svært materiale liggende i en ren klorittisk grunnmasse. „Bombene" er tett gjennomvevd av fine g-/cc-årer. Dette er forøvrig pyroklastisk			
		112,60	Gr.st. grønn fin-k og massiv. I enkelte partier finnes g- og epidot- årer			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 6

Dato: 25/1-74 Sign: AH Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10021

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		114.00	Tuff, til å begynne med ganske massiv med noen q/epidot-årer			
		117.65	Tuff blir så gradvis mer uregelmessig, båndet og brokkfritt, av ganske ofte. Og deltvis mye oppknust. Skj v/115.90 = 409			
		121,30	And. grå. Er fri, mye mørke grønn. Er ganske båndaktig og mye grovere av varing. Er deltvis ganske oppknust. Fører enkelte q-årer med noe cc. En hele tiden ganske oppsprukket etter - synes det - mikro skjæringer.			
		126.70	Tuff av varierende type. Til å begynne med ganske massiv, mer blir oppknust og båndet senere.			
		129.10	Er ganske mørk grønn massiv og fjern. men del kan være antydning til tuff-båndi-ng her og der.			
		145.10	Gabbro. De første 30 cm er den tydelig preget og lys grønn. Deretter blir den mer og mer kornet. Er lysgrønn og hvit spettet p.g.a. hornbl og lys feltspat. og noe epidot. Er ofte gjennom satt av tynne q-årer, deriblant opptil av 1/2-m mektighet partier av ren q. Imi-mellom og spesielt i forbindelse med q-årene, synes gabbroen mye mer finkornet. Vanligvis kan feltsp-korn måle 1-2mm og hbl - 0,5-1,5 mm. Gabbroen er hele veien sterkt tektonisert	NB		

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 7

Dato: 25/1-74 Sign: AI Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10-021

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			at den sprekker lett opp. Den er også mye oppsprukket. Mot slutt, synes bergarten å bli noe mer preget og skivet.			
		146.09	Pyroklastisk materiale, av- rundete q-fragmenter i en kloritisk grunnmasse. Q er gjennomsatt av stikk med epidot som AI er virs grad også gått ut i kloritten.			
		149,15	Tuff, meget stenket bånd og skif. Det basiske ledd dominerer mellom 148-149 finnes mafisk en rekke tynne (5 cm) bånd med meget finkornet magnetit NB. Skif v/147,20 = 21°			
		151,27	Tuff, men her en mørkere og mer vag i båndingen. Basisk domin.			
		154,40	Tuff mere båndet mn samtidig gantbemessig			
		155,78	Tuff, nå stenket båndet og skif, samtidig mye oppknusing. Det er vesentlig kloritisk materiale, men man ser finbånding av Svart. Dessuten tynne lag av grønn grov pyr. Skif v/155,15 = 34°			
		158,45	Tuff meget sur variant av andesittisk og i partier helt keratofyrisk, med grønn mye epidot som uregelmessige striper delvis langs lagdeling. Det er tydelig pyroklastisk			
		160,40	Tuff, men nå mere regelmessig og hele tiden med tydelig banding.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 8

Dato: 25/1-74 Sign: AA Retn.: -90 Sted: 11020S Hull nr.: 10021

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprøve	Anmerk.
			Det veksler jevnt mellom grunt og basisk. Det hele er delvis skf			
			Skf V/160,20 = 19°			
		163,22	Dacitt, grå meget massiv og homogen. Meget fink. Har grunt skjær på bruddflat en del en endel gjennomsatt av q-årer og stikk.			
		164,92	Tuff skf klorittisk			
			Skf V/163.50 = 22°			
		169,75	Tuff, mer normal skf type hvor basalt og sure skifter regelmessig Noe oppknust her og der.			
		172,37	Grst. grønnblålig meget finkornet, homogen.			
		175,25	Tuff, med regelmessig skifting mellom vage sure og basiske bånd Er oppknust			
		178,74	Tuff, hvor båndene blir mer tydelig og alternerer oftere. Er også skf			
			Skf V/177.20 = 17°			
		180,00	Tuff, med meget vag båndning, en del oppknust av cc.			
Kasse 2 stk godt	180 - 190	nr 21 som	m (nr 19) mangler, dermed finnes her prøvd å kople sammen så mulig:			
				28/1-74		
	180,80		Tuff, gansk finbandet, men uten markert skf Er oppknust av anastomoserende q-årer eller hom Fører en grønn tynn linje som ryg i tynn stripe			
		183,15	Grst meget massiv, grønn og homogen. Har kraftig q-åre			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 9

Dato: 28/1-74 Sign: AA Retn.: -90 Sted: /10205 Hull nr.: 10 021

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		183.95	Tuff, fin-båndet men ikke ut. Q-amygdaler.			
	184,92		Samme tuff, men nå med en svak py-imp i meget tynn bånd			
		186.62	Gr.st. mørk grønn, ganske lik den over, er meget massiv og homogen, form spotter eller amygdaler av usikker cc.			
		188,43	Tuff, til å begynne med meget uregelmessig, med noen fattige py-striper, senere regelmessig med cc-spotter eller amygdaler.			
		192,87	Tuff, massiv og grønn bånd men enkelte mer sporadiske bånd av grå, mer bergart			
		193,87	Gr.st. grønn, uregelmessig type som har en meget fin spetting av cc. Fom 10 imp ✓/192.90			
		195.37	Tuff. oppsprukket, pyritrik i ikke type 1c men synes å ha enkelte aglomeratiske fragmenter. Det hele er sterkt kloritisk			
		196.55	Gr.st mørk grønn, meget massiv. Det er mulig å skille ut en vag bånding men ikke mi-dre			
		198,34	Gr.st lysgrønn type som er noe oppsprukket på langs.			
	198,93		Py-imp som bånd i en sone (dacitisk) bergart, helt uten cpy.			
	200.55		Tuff, svært oppknust men med tydelig bånding og en spredt py-imp. Oppknusning skjedd etter cc-fylte sprekker på langs. Bergarten en tydelig skyf. Skyf ✓/199.15 - 26°. En del spetting av q og cc som amygdaler finnes men ergod.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 28/1-74 Sign: ÅA Retn.: ÷90. Sted: 11020S Hull nr.: 10 021

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Det er lett å se at imp ligger i forbindelse med q-utsondringene eller båndene. For man ser py-xx ligge som en kappe rundt disse q-fragmentene.			
	201,65		Grei bit, men fullstendig kan sees. Fore mer q-anhydrit og en del imp meget uregelmessig og usentlig i bånd. Det kan sees at py er i overvekt, men cpy opptrer også mer uregelmessig som striper langs lagdeling og i svært liten mengde egentlig		200,55 - 201,65	1 pixie,
202,94			Massiv malm, men med 5-en bergleg i mellom. Disse er i det vesentligste bare. malmen er meget finkornet og har et stikk-system som synes gå langs kjernen. Parallelt med disse stikk finner vi cpy. Dessuten er cpy knyttet til q-åren der som den klyse. Det er ganske mye cpy, ingen Zns. Cpy er knyttet til mere definerte bånd også.	NB	201,65 - 202,94	2 " —
	205,32		Tett, mer oppknust og dårl, men færre gjenstår sterk imp av py og cpy som striper langs lag deling. Bergarten er tydelig porfyrisk, imp er heller uregelmessig.		202,94 - 203,65	3 " —
					203,65 - 204,68	4 " —
					204,68 - 205,32	5 " —

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark II

Dato: 28/1-74 Sign: AH Retn.: ÷90 Sted: 11020 S Hull nr.: 10021

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	207,73		Gr.st eller svært keratofyr. lysgrønne typer som en følge på grønnfløte bruddflatene. Er pepret med pyxx i en lite karakteristisk imp. Med svært lite cpy.		205,32 - 206,45	6. prøve
	210,00		Tuff, tydelig båndet, meget svakt skj. Q-bånd åren sterkt fram. Dette er mere rene q-utskillelser som ligger langs lagdelingen i keratofyrbånd. Skj $^{V}/_{208,40} = 14^{\circ}$ Imp er svært uregelmessig, som oftest tynne py-striper og uregelmessige anrikninger i nærheten av uregelmessige q-"boller"		209,00 - 210,00	7. -11-
	212,57		Samme type tuff, men imp blir stenbare og det er tydelige cpy-bånd spesielt til å begynne med senere blir de mer diffuse og cpy opptrer som tynne striper.		210,00 - 211,42 211,42 - 212,57	8 -11- 9. -11-
	213,95		Tuff igjen, mere regelmessig båndet og ikke så sterk imp og heller lite med cpy.			
		215,08	Gr st. gangmassiv og grønn. Det finnes enkelte py-xx men unbetydelig			
		216,00	Andesitt. massiv mørk grågrønn. Også denne med noen py-xx			
		216,77	Grst ? hjelpet rik, lysgrønn og spettet, mer med Lit cc. Dette kan være en svært prosset gabbro			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 12

Dato: 28/1-74 Sign: Al Retn.: -90 Sted: 110205 Hull nr.: 10.021

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	218,07		Tuff, meget tydelig men uregelmessig båndlag. En del py imp. Det er en gradvis overgang til			
	220,24		Andesitt, grønngrå, glassaktig grunn på bruddflater. Er porfyritisk med en del py-xx. Ofte uregelmessig fordi den er gjennomsatt av q-åre-			
	221,79		Tuff, skf men med meget tydelig bånd- og py-imp fines i nytten bruk mengde og dip som skjer.			
	225,02		Tuff ligger nesten helt med meget bånd- og med tydelige py-bånd i bånd Imp er uregelmessig men det er lett til å gjøre opptre i enkelte partier, uten at det er i stor mengder.		222,80-223,52 223,52-225,00	10. prøve 11 " "
		227,10	Kalkgr.st. tynne striper med cc i en lysgrønn kloritisk bergart som er helle skf. cc-er mer uregelmessig enn vanlig. Skf v/226,75 = 24°			
		229,70	Kalkgr.st, men her kommer tom også tynne lag av epidot langslagdelinger			
		230,63	Kjerne tap			
		231,00	Kalkgr.st - epidot opptredd			
		231,76	Kjernetap			
		232,00	Gr.st mine massiv men enn med enkl cc.			
		232,93	Kjernetap			
		238,00	Gr.st. er skf men nu mer massiv, men har mye cc i en mindre epidot. Skf v/237,50 = 21° SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 25/2-74 Sign: A Retn.: 90 Sted: 1002/1000S Hull nr.: 10.022

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		0.45	Gr.st. massiv tett, homogen og mørk grønn.			
		1.20	And gr.st. lys grågrønn noe middelskornet og heterogen i det kornstørrelse varierer.			
		4.38	Tuff, massiv med del vesentlige and. materiale med innslag mer klorittiske partier. Enkelte karbonatiske årer/spalter m/epidot.			
		7,33	Gr.st massiv mørk grønn vekslen noe i farge. Virker ellers homogen.			
		9.60	Tuff massiv grønn mer i partier svart oppknust. Er agglomeratisk v/9.00.			
		10,13	Gr.st. skif. ganske lys grønn og meget oppsprukket. Synes vann noe bundet Skif v/9.90 = 32°			
		10.84	Tuff, massiv mørk grønn og litt svakt bundet			
		13.40	Gr.st. massiv, grønn, tett og homogen. Antydning til noen klorittiske bånd			
		16,33	Massiv tuffaktig mer i det vesentlige som ovenfor. Forskjellen er at det opptrer mer markerte bundne partier hvor de årer er med massive og nekting			
		21.45	Gr.st massiv og grønn med svakt grått stjær. Helt homogen. Kan tenke være noe mer årer en tidligere. I partier er kanskje antydning til tuff-bunding men sjeldent			
		22,23	And gr.st meget massiv og homogen, enkelte qu-åx			
		23.13	Gr.st. mørk grønn, tett og fink. Har nikelig med tynne			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

4 ark 2

Dato: 9/8-74 Sign: AL Retn.: -90 Sted: 1005/10005 Hull nr.: 10.022

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			epidot-åre — også noe tynne striper med cc.			
		24,00	Mørk grågrønn meget tett kvartsig granatførende sur tuff-bergart			
		25 00	Gr.st. grønn, tett, massiv og homogen med små cc-spetter og uregelmt. tynne ep-åver			
		25.58	Massiv tuff, med meget vag båndling			
		27,15	Gr.st grønn tett og homogen En del q-åver m/klorit			
		28.65	Ann.gr.st. grågrønn, særdeles tett og fin-k. Lit q-åver			
	28,85	~~29,85~~	Blanding av q og meget omvandlede svartfarvede sedimenter med noe mt	NB		
		32.90	Gr.st. tett, fin-k og grønn fører noen uregelmt pyr-xx og enkelte 1-2cm epidot ansamlinger (Coarse)			
		36.34	Tuff, meget vag båndings til å begynne med, men blir etter hvert mer skarp i kontakt, med tydelig markerte svarte og klorittiske bånd Små kalsitter med pyr-impr finnes. Fra 35m blir igjen båndingen meget svak			
		37.47	Ann gr.st. blågrøn tett og fin-k liter mm-store q-amygd. Kan ses kontakt til båndingen			
		38.50	Tuff, svakt skif, med meget markerte svarte og klorittiske lederl			
		39.24	Gr.st. lys grønn, fin-k med spredte meget feltsp. innhold. Skif Skif v/38,60 = 26°			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 9/8-74 Sign: A Retn.: ÷ 9 10 Sted: 1005/1005 S Hull nr.: 10022

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		44,10	Gr.st grønn og massiv fin-k. Meget hvite antydninger til båndning. Særdeles homogen.			
		45,32	Tuff hvor det vesentligste består av svært ledd, meget tette, men det finnes partier lys grønn med mye klorit Det hele er massivt.			
		46,66	Meget mørk grønn, meget tett, med brekkje bitter av samme materiale. Dette blir etterhvert sjeldnere og det har til slutt en meget stor del mt i seg Skarp grense V/46,66 - 44,9 mot	NB		
		49,10	Gr.st grønn, tett og finkornet Er spettet med cc og har mer runde q-anuygd.			
		52,00	Gr.st omtrent som over men nå ute en spetter. Har dessuten gamske mye epidot som åre			
		57,75	Gr.st. som over med epidotåre, som er nå noe grovere i kornet			
		58,90	And. gr.st. mørk blågrønn, meget tett og fin-k og hører i partier Cc-åpth. Ved 58,20 - 58,30 et bånd med mt og kis med jaspis og epidot som brudderbyttet Deler ser hele båndet ut til å være forkastet. Det er skarpe grenser mot begge sider men mere diffus mot Ligg Ved ligg her vi to ligende bånd m/ jaspis, kis og mt.			
		60,75	Gr.st grønn, massiv gamske fin-k. En del epidot og q-åre finnes			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 4

Dato: 12/8-74 Sign: AT Retn.: -90 Sted: 1000/10000S Hull nr.: 10.022

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		64.25	Tuff, massiv med brede nen tydelige bånd av varierende mineralsk. Det hele er gjennom-vevd av epidot årer også som bredde bånd. Tuff-materialet er for det meste grønnaktig.			
		65.40	Grst. Svakt skif gjenn og meget fint. Noen pyr-årer Skif V/65 - 13°			
		66.-	Tuff. massiv som over med epidot.			
		68,80	And. grst. grågrønn meget felt og fint med tydelig annet innhold enn grst. Forekommer også spredte m/cc.			
		72.40	Grst massiv grønn og fint men noen diffuse overgange til mer surt materiale. Forandrer seg en god del her epidot striper mot slutten. Også en god del spredt cc-spetter.			
		73,50	And. grst. meget fint mørk blågrønn, kompakt p.g.a. økende mt-innhold - tydelig epidot og cc-årer og spetter. Ved 73,52 m finnes et smalt bånd med epidot/hematitt (grønn) og noe kis sammen med mye mt.	NB		
		75.72	Grst gradvis overgang fra over. Er grønn men i partier tydelig forskjert. Den har et par bånd m mt/epidot.			
	75,86		Impregnert sone som først blågrønn med klorit, hematitt og magnetitt, videre blir det kis og mt, og tilslutt i bare vesentlig epidot og mt.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 5

Dato: 12/8-74 Sign: AT Retn.: 290 Sted: 1000/10000 Hull nr.: 10.022

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Hele grisa er tydelig brekstert.			
		76.63	Brekkje, meget stor kamelgj oppsmuling. Sk gneis. Er meget tett og finkornet, mørk. Tydelig forkastet. Enkelt, forkastet epidot bånd.			
		76.98	Magnetitt-sone, mørk meget massivisk, finkornet, har en markert brekking av luft (tynne lyse lag) Epidot bånd og kis-bånd ligger langs båndinger. Det hele sterkt brekstert og er antagelig en tektonisk brekkesone. Etter hvert mindre mt i sone.	NB		
		77,80	Gr st. grønn massiv og homogen, synes på ingen måte påvirket eller tektonisert.			
		78.30	Magnetitt-lag isgr- og sterkt tektonisk brekkevert.			
		79,60	Gr st. mørkgrønn tett og finkornet, og tendens til brekkesoning med mt. som er innvevd mellom båndsilikatene			
		80,00	Gr st. klorittisk, litt mt rik på ca. Er også en del oppkornet og er brekkevert.			
		85.18 ~~85.45~~	Tuff, massiv men sterkt oppkornet. Brekkevert i partier. Er i det vesentligste dunkel finkornet tynne bånd med mt grovkornet opptil, som 1/82,20, 83,90, 84,45 Det siste godt synlig med kraftig brekkesoning.			
		87,93	Ank grst. meget massiv klorittrik tett og fin. Enkelte spredte q-årer. Vanskelig å se overgangen til			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 6

Dato: 13/8-74 Sign: AT Retn.: ÷90 Sted: 1000/10005 Hull nr.: 10.022

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		92,86	Tuff, meget massiv men			
			heterogen type. Er i partier-			
			lydlig brekasjert, men			
			som oftest vage bindinger			
			(bredt bånd 5-10 cm)			
			vesentlig lett brunt materiale			
			Bergarten er mørk blågrønn			
			Brekasjer ofte gjennomfylt av cc.			
			Fra 91 til 92 også agglomeratisk			
			Tuff. stedv lys grønn og			
			mere bånd av rent q. Nærmest			
			å betegne som kalkspatt.			
			av utseende (men det er			
			meget lite cc)			
			Sk. v/94,85 = 142			
		96,76	Flow-brekasje, kloritisk			
			meget oppsprukket og små			
			klargrønne fragmenter som er			
			lagervis kittet m/kloritisk			
			materiale.			
		97,72	Tuff massiv og homogen			
			Noen enkelte q-amygdaler			
			som små runde flekker.			
		98,35	Ganske grønn, grønnskjær			
			på bredd flate uregelmessig			
			og oppsprukket			
		98,75	Andesitt, blågrå lett og			
			fin. Oppsprukket			
		100,05	Tuff, massiv men brunt			
			i regulær. Det vesentligste er			
			kloritisk materiale, som delvis			
			er gjennomvevde av cc-årer			
		103,76	Tuff massiv og homogen			
			over lange partier. Enkelte			
			små soner med mer skiftende			
			karakter.			
		108,15	Grønn massiv grønn og			
			homogen. Tett og fin. Noen			
			q-amygdaler i forskjellig størrelse.			
			Enkelte klaser med py her			
			og der.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 7

Dato: 13/8-74 Sign: -H Retn.: +90 Sted: 1005/1005 Hull nr.: 10 022

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		109,50	Tuff, lysdelig men litt bånding er meget massiv, og heller 'kloritisk			
		110,20	Gabbro. i overgangssone er den først nærmest en grovere gabbro, senere litt 110,20 en lys feltspatrik bergart			
		114,70	Gabbro, blir etter hvert grovere og noe mørkere ofte stiger i storrelse. En del epidot også			
		114,31	Gabbro. lys grønn, svakt gullig, middelskornet			
		115,35	~~Kvarts~~ kvarts - og kloritfare svært lik gabbro-materiale			
		137,00	Gabbro, i det vesentligste lys, med gullt skjær i stedet, ihomogen med særdeles finkornige partier over korte avstander. En god del quarts og kloritt-fyllte sprekker. Dessuten skivete og sterkt foret			
		140,45	Gabbro ~~som~~ tilligere men er nå mer regelmessig og lik grovere. Beholder den lysgrønne farge. Det er svært liten overgangssone på sluttet			
		145,20	Tuff, massiv og grønn. Forholdsvis homogen. Det vesentligste er kloritisk materiale.			
		148,25	Tuff, lys grønn. noe skjær, og vesentlig svakere enn tilligere. Foran en del magnetitt i tynne bånd. spesielt 147,60 - 147,80 Skj. v/147,75 = 20-21°			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 13/8-74 Sign: AJ Retn.: -90 Sted: 1005/1000S Hull nr.: 10.022

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		127,08	Tuff, massiv og homogen som ovenfor. Mot slutten enkelte tydelig brekkerte partier. Dessuten opptre tynne mt/kis-bånd ved 150,25 - 150,31 / 150,65 - 150,70			
		152,10	Tuff, meget stål. og markert båndet i bekkene og også bånd Skj. v/151,65 = 29°			
		154,05	Tuff, mere massiv og diffus i båndingen.			
		154,82	And? mørk sortgrønn. Meget tett og slik virker som den er gansker sur.			
		156,-	Brekkje, synes tidligere båndet men nå tektonisk brekkert slik helt er svært kloritisert og er en blanding av sprøt og båndet.			
		163,75	Tuff, stål med markert båndning i lyse og mørke bånd. Det er antydninger mot slik synes være primær bånd. Etter 160 oftskilling i retning av epidot i båndingen. Også gir sprekker.			
		165,94	Gr.st. tett grønn og fint. Her mange stikk med qz og epidot. Er også svakt båndet i partier.			
		168,10	Tuff, massiv grønn, diffust skille mellom de forskjellige båndene.			
		170,-	Gr.st massiv grønn og finkornet gansker homogen. Qz-årer er meget sjeldne.			
		173,46	Tuff massiv, jevnt vekslende mellom sure og basiske laget			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 9

Dato: 3/8-74 Sign: AA Retn.: ÷90 Sted: Bod/Bods Hull nr.: 16.022

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		175,56	Gnd. grågrøn, massiv tett og fink. Synes homogen. Er gjennomsatt grønn på brudd-flater. Spalte xy-xy			
		177,28	Tuff, hvor type, er i regelen massiv, men de basale klorittiske ledd gjør at bergarten her en markert skifrighet. Ville likevel kalle bergarten thyolitt tuff. Skifr V/176,80 = 16°			
		177,73	Gnd som over kornstørrelse, men gul og dagerlig.			
		181,30	Tuff, massiv. Er til å begynne med ganske uregelmessig, men blir mer regelmessig i bruddene og renger mellom bruddene			
		183,64	Tuff, massiv men uregelmessig brekkoint og agglomeratisk samt hvor mørk epidot-årer og uregulær striper			
		184,42	Tuff, massiv og regelmessig, i det vesentligste klorittisk materiale.			
		189,20	Gr.st. meget massiv og grønn, tett og fink. Gomsbu homogen. Kan se antydning til svak båndning, men dette er ubetydelig. Vr 85,50 er det en 10 cm rit.			
		192,15	Tuff, massiv med svak båndi-g, ganske kalsisk.			
		194,22	Gr.st. grønn massiv tett og fink. men m/ antydn til båndning			
		197,27	Tuff, ganske markert med en god del brekkoiering mot slutten.			
		200,-	Tuff Gr.st. eller tuff massiv og uten bergartskjennetegn.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 22/7-74 Sign: [illegible] Retn.: -90 Sted: 1000/1000 S Hull nr.: 10-022

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
Fra 200,-	203,47		Tuff – pyroklastisk, svakt båndet med små (opptil 5mm) runde kvartskorn. Man kan se skjær og korn av pyr. Det hele meget oppsprukket og svart farging. Bergarten holder en god del kloritt og cc i enkelte linser og på hjemme sprekker med g. Delvis båndet og tuffaktig men oftest ujevn, en del fragmenter Skj 1/200,- - 230			
	203,68		Parti likt det øverige, men med en del mere imp, deri en god del cpy			
		212,23	Tuff / pyroklastisk lysgrønn liten forandring det er hjem imp flekede korn skjær og mm-hjemme bånd. Kanskje noe mer q og fragmenter mot 210 m Agglomerat. Synes ellers svært ujevn i en del epidot/kloritt. Det kan tenkes være en del omvandling, kanskje også del av stringer-sone			
	213,30		Agglomeratisk – tuffitisk, veksler men i partier meget tydelige fragmenter. Kan være en „Lava-top". Imp er meget fremtredende i enkelte partier Dessuten forekommer cpy spesielt ved 213 20. Oppknust nr		212,23-213,30	1. prøve
		217,20	Tuff. Bergarten en gradvis overgang fra over. En bundet til å begynne med, blir mer massiv etter hvert. Imp svak men i noen mm skjærene. I partiet er det ganske oppknust. Noen sprekker mulig med talk.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 22/2 - 74 Sign: AL Retn.: ÷90 Sted: 10005/10003 Hull nr.: 10 022

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	218,30		Pyroklastisk, noe aglomeratisk meget vanskelig å definere Ikke lett å se fragmenter En god del linje. Py og mye q - ~~kom~~ Smq som årer. Det kan være deler av en Stringer - Sone.			
		219,60	Grå skifer grønn, gjennomkrystallisert, rik på klorit, massiv med tynne ca. sprekker. Fra 219,00 er det helt oppknust og vanskelig å ta overgangen til			
	220,47		Tuff-aktig, kanskje noe pyroklastisk. Grønn særlig med lyse, sure bånd, som er gamle helt inntil med py meget sterk og oppknust.			
	220,53		Det er vag overgang til Grå og meget klorittisk og sk. Disse fører noen sure bånd og det er ~~noen~~ en Cpy-åre py Skarp grense til			
220,78			Massiv malm, som kanskje heller må kalles sterk impr Mineralisering er helt men det er en del klorit som grunnmasse. Meget rik på cpy og med noe q i grunnmassen. Tuff, meget finkrystallisert og oppknust. Er impregnert vesentlig py men spor av Cpy kan sees.		220,53 - 220,78	2 prøve
	222,07		Stemme som over. Vesentlig klorittisk mat, men sur bånding som har litt med py men cpy finnes både som små korn og som større partier som ved 221,20 og 221,60. Fra 221,75 og ut		221,00 - 222,07	3 -"-

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 12

Dato: 24/7-74 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: 1009/10005 Hull nr.: 10.028

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			prøven er det meget mkl med kopperkis. Enkelt analyse ved 227 viste 6,3% Cu. Analysen her vil sikkert tyrnes vesentlig.			
	224,13		Tuff, vesentlig klorittisk, men og finkornet til å begynne med. Har en del runde q-korn som kan være omrygd, men tror det ikke. Blir etter hvert grovere. Dere hele tiden mer eller mindre imp av py, men i smale partier finnes også noe opy i små gvarda. Svakt ikt 1/22350 = 23°		222,07 - 224,13	4 prøver
	227,79		Kvartsfyrisk (ette kanskje svart kun tuff), er flakig og glinsende brunaktig på kndelflater og har imp av py som ogsaa kan- ogsaa som bånd kun finnes noe opy, men lite. Bergarten har grågrønn farge og føre linser av ren q her og der. Det er overgang over 10 cm til underliggende		225,00 - 226,00	5. — —
	229,35		Tuff blandet og med vesentlig klorit, men med korrige q-rike bånd Generelt mye py-imp, kan sees enkelte rene opy-korn. I et rent q-bånd (10 cm ved 228) er det klynger med opy. Blir etter hvert mer ikt. Ved 229,35 = 23°.		228,00 - 229,35	6. — —
		229,69	Gr-st lys grønn, blandet ikt med tynne cc-striper her og der og noen q-amygdaler.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 13

Dato: 24/7-74 Sign: AL Retn.: ÷ 90 Sted: 1009//10005 Hull nr.: 10.022

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	231,00		Tuff som før, klorittisk med en del q-bånd først som kan vær botte materiale. Cpy finnes i disse. Py-imp		229,69 - 231,00	7 prøve
	232,10		Tuff, som over men her nå meget lite imp. Små runde q-korn sees over alt.			
	233,25		Tuff, vesentlig klorittisk med skjønne imp av py, lite cpy å se. Ellers er tuff som tidligere		232,10 - 233,25	8 — " —
	234,97		Tuff, nå vesentlig mye sulfider og kornetige nye grovere. Den er båndet, og cpy følger de samme bånd. Py mer grovt fordelt Cpy som åpninger		233,25 - 234,97	9 — " —
	238,97		Tuff og pyroklaster vekslende. Tuffen er vesentlig klorittisk med runde q-fragmenter. De pyroklastiske lag er meget uregelmessige. Cpy og py finnes i vekslende mengde. Cpy finnes utspredd på skj-planene		234,97 - 237,00	10. — " —
					237,00 - 238,97	11. — " —
		240,00	Andesittiske grønnsten, fin- og lysegrønn. Synes også her andesittiske lag. Forer en meget spredt py-imp	NB.		
	240,77		Tuff, båndet, til å begynne med små q-korn, senere en del q-rike bredde bånd. De klorittiske partier veksler skj. Det er breksjert i karakteren. Imp består av båndet py, men små cpy-korn finnes også som utspredt på skj flate		240,00 - 240,77	12 — " —

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

E
Ark 14

Dato: 25/7 -74 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: 1005/1000S Hull nr.: 10 022

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		241,73	Andesitt, mot sluften mer grønnst akt. Massiv og tett finkornet. Grønnlig grå Gr.st meget klorittisk og			
		242,30	virker grov. noe flakig			
242,85			Massiv malm. Skarpe grenser til heng og ligg. En del 0.5 mm tynne q-fylte sprekker i en middelskornet klorittisk matrise med noe cpy		242,30 - 242,85	13 prøve
	243,23		Tuff skif og klorittisk bånd som også viser py-impr			
	244,30		Andesitt gr.st. lys grå grønn tett og fin. Er skjært av sett av arc kvarts og preget med py-xx.			
	245,18		Tuff, bandet og oppknust med uregelmessige py-bånd Massive malm-partier mellom 244,75 - 244,94 og 245,00 - 245,18.		244,50 - 245,18	14. — " —
		245,80	Tuff, lys grønn, oppknust massiv og sur. Bare små spredte py-korn.			
248,37			Massiv malm, middelskornet. Fører en del cpy da en prøve gir 1,16 % Cu. Malmen er ikke oppknuset. Den er oppdelt av korte uregelmessige klorittiske gråmineralsporer. Malmen har et par korte q-fyllinger. Analysen med 10cm snitt 247,37.		245,80 - 246,26 246,45 - 247,00 247,00 - 248,37	15. — " — 16. — " — 17 — " —
	249,45		Tuff, skjært oppknust men med en del velekspon. krp, vesentlig py men også noe ubetydelig cpy.		248,37 - 248,82	18. — " —
		252,40	Talkgrønnstein, meget rik på klorit, Skf også store mengder med spredt som dominerer. ~~Det~~ Ce opp-			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

F
Ark 15

Dato: 25/7-74 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: 1000/1005 . Hull nr.: 10.022

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
			Fra i meget tynne bånd langs skl. V/249.50 finnes 2-3 cm bånd med lit rødlig magnetit. Bergarten er på ingen måte så typisk som den pleier å være.	NB		
			Skl V/249.50 : 14^3			
			Skl V/252 - 24^3			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 26/4-73 Sign: AI Retn.: -90 Sted: 500/900S Hull nr.: 10 023

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	~	1,50	Meget [illegible] grønn opptatt med [illegible] agglomeratiske lag, ell. amygdaler i svart ekt variant av gr.s.			
	~	5.50	Tuff, massiv, noen laminerte lag, stedv. med mye [illegible] mørkere ofte med amygdaler.			
	~	7,18	Gr.st. meget mørk grønn men ganske homogen og massiv fin.			
	~	7,90	Pyroklastisk med 1-2 cm små avlange bolter som ofte har linseform og som veksler med massive lag.			
	~	9.05	And. gr.st. meget massiv og homogen.			
	~	10,90	Igjen [illegible] mørkere bånd deler en ? men pyroklastisk tuffitt.			
	~	14.20	Gr.st grønn meget massiv og homogen, en del gr.			
	~	15.35	Tuff igjen men bånd i enkelte bånd blir svart opp kvartsit.			
	~ 15.45		Py-malmstriper over 10 cm meget finkornet, massiv. men mye [illegible] kun noen her	NB		
	~	17.00	Tuff som over, igjen med tynne py-striper over men få cm v/16.20			
	~	19.10	Tuff, med meget diffus lagning			
~	19.80		Igjen tuff men med bånd av massiv fin py-malm. Ofte ikke som gjennomgående bånd			
			Tas ut til analyse nr.	NB		

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 26/11-73 Sign: ↵ Retn.: ÷90 Sted: 1500/9005 Hull nr.: 10.023

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		24,52	Tuff, noe mer massiv enn over finnes tynne pyroklastisk årer ~21,20 og 23,80 m			
		31,45	Velsortert omsatt bergart massiv pyroklastisk, enkelt tynn sone med mer massiv noe sur bergart.			
		34,00	Blir mer relikte eller lavert, mer tuff-aktig			
		35,00	Kjerne tap.			
		43,00	Tuff, en del oppknust men massiv i mellom biter			
		44,00	Kjerne tap			
		47,00	Tuff som over lysere men urolig og blandet foldet materiale, vesentlig kloritisk, men med lyse mer sure stykker. (ca 6 cm)			
		60,00	Tuff mer massiv, stiffe diffust mellom sur og kloritisk bånd			
		60,63	And gr.st. massiv grisgrønn gangsone massiv	27/4-73		
		66,75	Tuff, massiv type med enkelte amygdaler med q/cc Vesentlige av mengde er sur og basisk knyttet til spesielle bånd			
		74,35	Dacittisk, med en del brekkje aktig kloritt fyllinger og bånd, dacitt oft med q-årer. Etter hvert færre av kloritt brekkjene, oftere oppknust.			
		79,20	Gr.st, and meget massiv lys grisgrønn, enkelte lav store amygdaler			
		80,20	And grst fint og massiv grisgrønn med noe klorit striper - no sprekker.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 27/11-73 Sign: A Retn.: -90 Sted: 1502/900 ø Hull nr.: 10023

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	80.80	And grst meget brekssiert i partier samt kvarts åre med rosa-feltspat			
	✓	84.30	Gr.st massiv gramm finkorning og homogen, av og til spalte åre med epidot/quarts			
	✓	87.10	Gr.st massiv homogen, enn en noe mer grønn i stjeret enn over. Siste to typer mest typiske for gr.st.			
	✓	93.13	Gr.st meget finkornet, massiv og homogen mørk grønn			
	✓	–	And. gr.st. en noe mørgel-massig med antydning til tuff-båndig.			
	–	95.15	Gr.st. gansker grov og lys, tett gjennomsatt av epidot-åre og strenger			
	✓	97.10	Tuff, massiv og meget sur type, mesten brekssiert med meget tynne åre-veving av q.			
	✓	98.65	Gr.st. gansker grå mørk type, som er svakt brekssiert ut.			
	✓	101.60	Tuff, massiv av relativt sur typer. Det finnes lag eller bånd på 10 cm som er mer grå kvarts keratofyr. Men generelt av båndingen diffus.			
	–	103.30	And. gr.st. meget fin-k og massiv. Blir noe mer brekssiert utover hvert.			
		112.30	Tuff, brekssiert, men ganske massiv Sur type. Gjennomsatt av epidot/q-åre			
			Fra 107,50 av tuff-båndig men typisk fra det man har sett før. Enkelte steder en del q-åre og noen q/cc-amygdaler.			
			Det er bjelden mm sen			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

A-k4

Diaborlog

Dato: 27/11-23 Sign: [illegible] Retn.: ÷90 Sted: 1500/9003 Hull nr.: 10.023

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			brandi-gen er gjennomsett-			
			enke. Det hele mer vesentlig			
			en skivet. Det kan tenkes man			
			kan gjenkjenne enkelte store			
			breddelstybber, ellers en av-			
			runded, alkali conglomerat.			
	~	115.50	Tuff, massiv stedvis			
			sur men mer diffus			
			kontakt og mer regelmessig			
	~	117.00	Gr.sh. meget fin-kl, mørk			
			grønn, kantete nye			
			varierende størrelse.			
	~	118.25	Tuff, massiv (meget			
			matrix), meget diffus			
			kontakt og mer basisk			
	~	122.20	Gr.sh, grønn massiv			
			finkornet, men fy-			
			kgstaller synlig.			
	~	124.00	And gr.st av noe			
			vekslende type, se ut			
			i partier som de har			
			vært brekkasert og fyllet i igjen			
			Py-xx sprekk helt unison			
	~	124.80	Gr.sh.? lys grønn, meget			
			tett flakig lys grønn på			
			kontaktflater. Kan det være			
			prosect gabbro?	NB		
	~	126.00	Tuff meget massiv og			
			svært kompakt.			
	~	126.50	Lagen lys grønn bergart			
	~	128.90	Tuff, meget massiv og			
			typisk. Er heller kompakt			
	~	130.70	Gr.st meget massiv og			
			fin-kl. grønn			
	~	140.00	Tuff, massiv, men en god			
			del oppknust. Skyggemateriale			
			V/133.20.			
			Kontakten er vesentlig			
			mye mer klar sterkt, med			
			138 m. Den synes kort mm			
			hver cc.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 5

Dato: 27/11-73 Sign: AH Retn.: ÷90 Sted: 1500/9005 Hull nr.: 16.023

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		142,80	Amf. grst. m ganske lys grøm. Tydelige grønne flak i bruddflate.			
	✓	154,05	Gabbro. Er de første 1m meget forskjeftet. Bergart ganske lys meget grov, lys gulgrønn feltspat lik amfibol. Spalt-lft i forskjellige retninger. En god del store q-årer. Er forholdsvis homogen, men synes bli grovere ned mot ligg. Over feltspat og mørke mineraler skilles bedre fra hverandre. Helt i ligg er de noe presset. Vanskelig å si akkurat hvor grensen går	NB		
	✓	158,50	Tuff, grønne massiv, drøne... er diffuse men veksle med over vekst på basalt.			
	✓	160,00	Tuff, men her meget skjær. og noe uppbrutt type, også endel q og en lange skjæplaner, spesielt en som også finnes i lm-agglo. Skj ⊥/159,70: 7°			
		161,0	Kjernetap			
	✓	161,95	Andesitt grå meget fin og glassaktig, noe blandet av mer grønt materiale	28/11-73		
	✓	164,35	Gr.st, tuff grønn lys grønn noe skj. Sandstein... kunn kunt som eksisterer se ut som fragment En det agglomerat? Skj. ⊥/162,30 = 7°			
	✓	165,60	Tuff meget epidotrik noe smiffolket og knudrete. Endel oppbrutt.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 6

Dato: 29/11-73 Sign: AI Retn.: -90 Sted: 1505/705 Hull nr.: 10.023

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	~	170,10	Tuff av meget grov bomb typ. De lyseste leddene er meget spaltet. Forende. Mellom kom man på bånd av nærmest kvartsfattige (grå) • kvartsfattige og mest andesitt.			
	~	177,05	Tuff, denne gang mørkere finkornet og av mer vanlig type hvor svart og hvitaktig bånd skifter regelmessig. Det svarte bånd er mer mot andesitt enn vanlig.			
	~	178,80	Gr.st. grønn, massiv og homogen, fint.			
	~	182,30	Tuff, meget massiv med gansker tydelig båndning, svart synes å være i overvekt. Blir svært oppknust og med mer leir materiale etter hvert			
		183,0	Kjerneslep			
	~	186,84	Tuff av samme type som over men tydeligere mer vage båndinger oppknust i sone.			
	~	189,50	Pyroklastisk, nærmest grønnst, lys grønn finkornet svakt skf og med spredt utover det hele, for det meste konsentrert i bånd, finnes små avrundede q-korn eller amygdaler. Fører meget svake py-min her og der.			
			~~Gr.st~~ Skf ~/188,70 • 133			
	~	190,15	Gr.st. kanskje noe andesittisk grønn, fører meget fin py-x>			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 7

Dato: 29/11-72 Sign: -H- Retn.: ÷90 Sted: 150Ø/900S Hull nr.: 10023

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	194.00	~~194~~	Pyroklastisk eller tuffitisk		190,72 - 191.06	1 prøve
			Offer en klorittisk masse		191,42 - 193,68	2 -"-
			med små runde - og kvarts,			
			men også 5-cm brune			
			med svart materiale.			
			Det finnes delvis en			
			meget gamle kløftinger			
			det er mulig det i			
			denne kan forekomme			
			kvarts av epy			
	195,86		And grst. grønn svakt			
			glassaktig på bruddflater, er			
			finkornet og massiv. Den			
			fører en meget svak			
			tuff-båndig delvis.			
	198,20		Pyroklastisk materiale i tuff			
			Samsetning med en meget			
			svak py-imp her og der.			
			Her etter hvert mere			
			normal tuff			
		198,45	kjernetap			
	204.0		Tuff. svakt skif med			
			rester etter pyroklastisk			
			materiale. Det synes som			
			det som helst dominerer.			
			Det er meget svak imp			
			som knyttes til smale lineal			
			skif 199,50 - 53			
			Enkelte tynne cc - stringer			
			langs skif-plane.			
	206,26		Tuff m/pyroklast eller deformert		204,0 - 206,26	3 -"-
			aggl - lag. Her en grønn			
			skarp båndning av py-imp.			
			Kanskje noe dårlig epy.			
	206,61		Meget svak imp i noe		206,26 - 206,61	4 -"-
			kvartsholdig bergart. Det finnes			
			også et massivt malm-			
			brokk			
	207,58		Tuff vekslende i båndning		207,00 - 207,83	5 -"-
			er lys og mørk. Jevnende			
			py-imp			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 29/11-73 Sign: AL Retn.: ÷90 Sted: 1500/9003 Hull nr.: 10.023

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	208,76		Meget sur tuff, nesten kvartsfyrstk, men lbl. Fører en imp kvartsbruk i bånd. Fremer mest py men også kalyser av cpy Skj v/208,72 - 209		207,88 - 208,72	6 prøve
		209,75	Gr st meget tett og fink. massiv og grønn. Et par tynne soner med tuff m/imp			
			Svartuff som over med		209,75 - 212,00	7 — " —
			imp i bånd og hvor		212,00 - 213,55	8 — " —
			cpy kom opptil i			~~9 — " —~~
			store klyser og bånd. Gradvis			
			blir imp regnskjønn rikere			
			og det er en gradvis over-			
			gang til underliggende			
			massiv malm			
215,44			Massiv malm, lj i begynne		213,55 - 214,00	9 — " —
			med fore den nye g som		214,00 - 215,44	10 — " —
			gang mins (eller ekte imp)			
			Det er en tett py-malm			
			rik på cpy. Har en del			
			slikk			
			Tuff, meget sur? "flekkig		215,44 - 217,00	11 — " —
	220,85		på samme måte som		217,00 - 218,00	12 — " —
			under. Noe slikk Typen er		218,00 - 219,00	13 — " —
			dominert av massiv imp		219,00 - 220,00	14 — " —
			imp, hvor cpy opptrer		220,00 - 220,85	15 — " —
			i sammenhengende årer.			
			Og som klyser. Fra 218 og			
			utover finnes enkelte kraftig			
			cpy. bånd.			
			Skj v/215,50 = 99			
	222,00		Tuff, mørk, samme type		220,85 - 222,0	16 — " —
			som over, grønne lys på			
			overflate, men mere qtz			
			i materialet, spalte flatene			
			er mørk glinsende og			
			det finnes en spredt			
			py - imp			
			SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Dial — forlengelse

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10023

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		221,25	Bygger tidligere			
	234,5		Svak bånded imp i			
			overveiende klemtt tett	1	221,25-22	
			enkelte fels. bånd	2	-223	
			noe cp. -tildels grov	3	-224	
			kornet py	4	-225	
			med skutten enkelte	5	-226	
			tett imp bånd og	6	-227	
			mere ren tett (grå	7	-228	
			mere sedimentær. Tuffen	8	-229	
			blir her mer grov	9	-230	
			v diabasen med enkelte	10	-231	
			fels bånd	11	-232	
239,05			Massiv fin med enkelte	12	-233	
			tynne tett bånd, vekslende	13	-234	
			grov finkornet	14	-235	
			lite cp?	15	-236	
	241,5		Vekslende mørk fin	16	-237	
			tett 20 cm bånd	17	-238	
			finere virker mer mot	18	-239	
			mot sø cp.	19	-240	
		250,-	Vekslende klemtt tett -	20	-241,5	
			enstrøk tett enkelte			
			fels. bånd og diab.			
			fragmenter			
			~50 Skutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark!

Dato: 23/2-75 Sign: A Retn.: ±90 Sted: 2005//0005 Hull nr.: 16.024

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		6.33	Gr.st massiv, mørk grønn, noe opptrukket, fører kluster og uregelmessige årer av epidot. Ep-innhold er størst mellom 4 og 6 mdr.			
		9.80	Gr.st massiv lett, ganske fin-kl grønn og homogen. Noen lysere ep-årer her og der. Blir noe mer uregelmessig fra 9 m.			
		10.20	Gr.st. grågrønn, meget fint og lett med omgivelser av g/cc.			
		10.70	Tørst grønn og skj i kanten 1/4 cm med en årete og skinnende utrospet blanding av mt og py. Skj V/10.90 · 12³			
		11.20	Tuff, massiv og lett med lysegrå spetter av cc.			
		11.50	Koarsitt, meget mørk og sort meget vike på mt. Er ikke typisk for koarsitten.	N/B		
		13.16	Gr.st. mørk grønn, heller av de grovere typer. Er meget like homogen og det er vel et spørsmål om det ikke er en variant av tuffene			
		16.87	Tuff, meget uregelmessig grønn, dels gulgrønn p.g.a. mye ep. Er brekkert og gjennomsatt av epidotårer. En del g-aer et parti med mt-i fint bandet og foldet opptreden. Små store g-amygd. opptrer. Kun også se at fragmenten opptre et par steder. Dette er en ekte pyroklast. horisont.			
		20.20	Tuff, massiv meget mer sjelden men lysere kvandinger. Det er bestemte typer hvor det mesta består av mørk grønn gr.st			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 6/3-75 Sign: A Retn.: -90 Sted: 200ø/1000S Hull nr.: 10.021

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		22.67	Tuff, ganske massiv me-			
			mm skiftrig i partier, med			
			lyselige bandinger. 50-50			
			mørt og hardt.			
		28.82	Tuff. massiv grågrønn med			
			mere mørke overgange			
			mellom bandene, som nok			
			er lyselige. Inneholder også			
			små partier av klorit-gabbro			
			fælabig bergart			
		30.05	Tuff ligner med mørk			
			mørkegrå bånd og med			
			små brekkiøse partier, sannsyn-			
			lig "lint" av kloritisk materiale.			
			Dette er forholdsvis uvanlig			
			av mørt materiale og har			
			derfor en del grønn farge.			
		31,70	Tuff, massiv og grønn			
			grønlig allflue i bandinger			
		36.60	Tuff, ligner noenl unngå-			
			elig med kvartsene bånd			
			av hornblende ep/g. Brekkiet			
			her og der 33,05 - 33,25:			
			Mørk bånd i uglmidde struktur.			
			Noen glg-korn her og der.			
		41,55	Andesitt massiv mørk grønn			
			farge, med lysgrønne ep-årer			
			og klynger. Tendens til tuff-			
			bånding her og der. Spredte			
			q-amygd. mot slutten q-årer.			
			Meget skarp kontakt til mørk-			
			grønne med vinkel = 55°			
		44,59	Tuff. Særdeles uregelmessig			
			kloritrike bånd med breede			
			ep striper er uregelmessige mens			
			de smale er mer regelmessig. Ep.			
			også som tverrgående årer.			
			Her finnes nye som ligner	NB		
			en sfæroidisk eller konkretjon			
			er rund og har tydelig			
			konsentrisk om sentrum.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 6/3-76 Sign: AL Retn.: ÷90 Sted: 2300/1000 S Hull nr.: 10.024

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
			Det hele blir ikke brukt			
			mer snart.			
		48.63	Tuff, and. i grønn stor			
			overvekt med noen 2-3			
			cm bånd av klorittiske			
			materiale. Ett bånd			
			ultrasisk også disse.			
		50,94	Grønt mørk grønn, meget			
			lett og fin. Synes også			
			grovkornet homogen på flaten,			
			men bruddflaten viser at			
			noen partier har tendens til			
			flakighet.			
		52.02	Grønt grønt mørk grønn lett og			
			fin-k meget homogen. Ikke typisk			
		52.60	Grønt. Mørkgrønn lett og			
			fin-k grålig på brudd flate.			
			og noe uregelmessig.			
		56.34	Tuff, massiv grønngrå			
			type hvor skifting i bånd			
			er svært vanskelig å fastslå.			
		58.10	Grønt massiv grønn og			
			hellet av den fin-k norite			
		59.20	Tuff, massiv med spredte			
			men tydelige forskjeller i			
			båndings.			
		61.60	Grønt. meget lett og fin-k			
			mørk grønnlig og ikke			
			så typisk.			
		66.83	Tuff, massiv men ellers av			
			noe varierende type. Er noe			
			oppsprukket av langsgående sprekker			
		69.43	Grønt. massiv grønn og			
			middelskornet. Kan noe syn			
			i grønn farge Men er			
			heller homogen.			
		70,43	Tuff, massiv men med			
			tydelig overgang mellom			
			båndene			
		71,13	Grønt stiv og lys grønn			
			og svakt spaltet av grovere			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 4

Dato: 7/3-75 Sign: AH Retn.: -90 Sted: 2000/10005 Hull nr.: 10 024

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Kloritt-skjær. Også noe oppsprukket Skj v/70.80 = 36°			
		72,84	Tuff av massiv, noe mørk grønnblå type. Basisk med typelig tynne bånd			
		75.11	And grønnblå, massiv og tett. Til å begynne med flekker med mer kloritisk materiale			
		76.10	Gr.st. grønn, noe mørk massiv type. Typisk med tynne epidot-årer			
		76.77	Andesitt grønnblå massiv med tynne epi-			
		79.47	Gr.st. grønn massiv med noen tynne kloritiske bånd, samt et par større leder			
		81.30	Gr.st. grønn lysgrønn og spettet type. Er grovere enn ovenfor			
		82,47	And blågrå, tett og fin. En del tynne q-årer			
		90.73	Gr.st mørk blågrønn meget tett og delvis glinsende i partier på brudd flate. Er i store deler meget homogen men er nye oppskrint p.g.a. q-årer mellom 86 og 88m			
		92,65	And gr.st. grønnblå massiv og meget tett En god del q-årer			
		94,47	Gr.st. grønn meget tett og fin. Helt typisk			
		95.66	Gr.st. grønn noe varierende i kornstørrelse med tynne strip av ca. her og der, mørkest spettet. Mer kloritt enn før.			
		96.56	Tuff, meget massiv grønn og vesentlig basisk. Lenge mellom hvert bånd			
		98.80	Gr.st. grønn massiv tett og fin. Særlig homogen.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 5

Dato: 7/3-7- Sign: AL Retn.: -90 Sted: 2000/10005 Hull nr.: 10.074

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		101,18	Tuff, massiv mot lysere grønn og mørker litt skifret med sjetter av klorit i de mørk bånd			
		102,75	Grest meget mørk sterkt grønn svakt gneisaktig og med meget lite strukturer, finkr. Oppsprukket			
		104,23	Dacitt, grålig grønn lys, litt av lenk skarre og mange her og der. En del epidot Grønnsort av en del typen q-årn m/ rød karbonat,			
		108,28	Tuff, synes meget massiv men er sterkt i smale partier vekslet meget skarpt mellom tydelige bånd av lys grønn, mørkere grønn og grå En nr oppsprukket hele veg dem.			
		114,56	Tuff, men må kun massiv og meget skifrer bånding Ved 109,90 - 110 et bånd med fint varsler i Vrangbrettsig linjer Ved 114,40 - 1140 brekje sammensydd av q-masse.			
		116,18	Grest. lett mørk grønn, sprekk av fine cc-kom og i grønne like typisk Skift v/ 114,60 - 18°			
		122,-	Tuff, lett for det meste mørk grønn og kraftig Skift er varierende sterke. Skifting av bånd tydelig, men ikke alltid skarpe.			
		124,45	And-grøn massiv tett og fine Fører 2-3 mm store q-amygd. Er litt vasket av ansamlinger av klorit			
		127,71	Tuff, massiv lysgrønn med mørke små bånd. Er en del oppsprukket til å begynne med.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark. 6

Dato: 7/3-2- Sign: AH Retn.: ÷90 Sted: 2000/0005 Hull nr.: 10.024

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		130,57	Gr.st. massiv mørk lyskgrøn meget tett, og finkornet, En en god del oppsprukket. Fører her og der tynne skjær av finkr. py.			
		132,18	Tuff, grønn svakt skif og en god del oppsprukket. Er lysgrønn og bare svakt tuffittisk (nesten som skif gr.st.)			
		134,13	Gr.st. meget svakt skif, lys grønn, delv massiv men en flakeig på bruddflate.			
		136,38	Tuff, massiv grønn, meget brudstein men mindre linser av grønn svart materiale sees. Mest av lysere ep-årer			
		137,65	Gr.st. massiv grønn, ruglete på bruddflate, fører noen uregelm. årer. Rik på grønne min, elevrike flekker med py.			
		138,16	Tuff massiv lys grønn, med tydelig men uregelm. bånd av svart mat i en heller dominerende lysgrønn gr. masse. Er delv oppsprukket med smale granulerte massa med py. Grenser skarp grense til underliggende			
		140,40	Grabbro, svakt skif de første 10-15 cm dessuten meget lys og epidot rikt til å begynne med. Blir så stadig lys grønt gulgrønn p.g.a. økt innhold av ep. Blir så etterhvert mørkere igjenn men ett slår hele tiden igjennom at berg er rik på epidot. De mørkere min (amf.) opptrer delv som hårfine. Rundt 140 m blir bergart grønn mørk men også flekket av lysere partier, nye som mørkere en uregelmessig fordeling av			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

4-67

Dato: 10/3-75 Sign: A. Retn.: +90 Sted: 2000/10005 Hull nr.: 10.027

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			epidot også sprekker fylt med epidot.			
		163.20	Gabbro, grov grønn og av den typiske utvikling. Med flekker av skarn, som nå mørkere innhold av eg. Blir her og der noe oppknust, også noe mer finkornet i smale partier. I denne forbindelse virker også eg. og det finner partier som nærmest er "epidotitt" med noe q. innimellom.			
		166,55	Gabbro (smale hell) er her blitt uregelmessig, mye mørkere en tidligere men en flekkete og her tekstur som ligner vare gabbroene. En dessuten mer i partier oppknust. Skal ikke se bort fra at det kan være partier her som er hydrothermalt omdannet.			
		168.68	Gabbro? meget fin-k. Stedv. gjennomsatt av q-årer. Se dikere ut i vare i kanten av "pegmatitiske" utfyllinger.			
		173,37	Gabbro, lys grønn meget grov, men samtidig blitt og skjørt oppknust. Mot slutten blir det mer fint igjen og meget epidotisert og evt overgang til underliggende			
		177.78	Tuff, mørkt grønn noe meget mørkere mørke som bånd			
		179.90	Gr.st. Stedv meget tett og fint sortgrønn, oppknust og uregelmessig - vekslag, ryr den i sonen bitt. (Er vel kontakt tuff?)			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arle?

Dato: 10/3-7- Sign: A Retn.: -90 Sted: 2022/10005 Hull nr.: 10.024

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		184,40	Tuff, meget uregelmessig, bindt likt og massiv Grønn, En- svært oppsprukket i partier og bjørnene klyngen med store vinkel Skf V/182.70 = 31°			
			Sånt og basisk skifer mb. innl. V/180.30			
		186,08	Torst, massiv grønn grønn mørke mye oppknust En lut del årer fylt med cc, likeså cc-anngyldte.			
		186,67	Ond grst massiv, glassaktig grønn er grønn grønne Grst meget mørke grønn og normert gjennom på enkelte flater Har cc-årer og meget svake py-imp oppknust.			
	189,20					
		190,-	Ond grst. massiv grønn og fin. Oppknust i grønne med kraftige q-årer			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 9

Dato: 3/9-74 Sign: -d Retn.: -90 Sted: 2000/1000 S Hull nr.: 10.024

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	Fra 190					
	191	190,30	Andesittisk gr.st. mørk grønn massiv, noe grov med grønt skjær på avvidd flate.			
	193,10		Gr.st. grønn, fink. med		190,90 - 192,00	1. prøve
			q-årer/linser av urenset messing		192,00 - 193,10	2. -"-
			kvartsbr. og impregnert i			
			lyse bånd og bom spetter med			
			py. Finner deretter dårlig			
			cpy-kiser.			
		194,32	Tuffitt. men vesentlig gr.st.			
			mot Hor. m. del q-årer.			
			Er meget massiv og har			
			bare få impr.-bom av py.			
	195,67		Tuff, meget akt. bånd			
			med lyslige bom bom			
			mellom hovedmengde av			
			klorittisk materiale. Impr av py:			
			Skj 1/194,40 = 48°			
		197,60	Porfyrittisk vulkanisk. Kornig			
			fyknost og av «sammensydd"			
			Bergarten er grønlig grå med			
			Bånd og bunt av lyse ...			
			i hovedmassen som lyse strenger.			
			Ikke oppknust i brannelsen. Bare			
			få impr.-bom her og der.			
	198,92		Tuff. fink. grønn og vise			
			akt. lag av py-opptrer i			
			smale bånd og skjær. Men			
			kun en ett av annet cpy-bom.			
	203,94		Kvartsfyrisk, etter meget sur		198,95 - 200,00	3. -"-
			tuff. Den er grønngrønn og		200 - 201,-	4. -"-
			akt. lyses og lyse bånd av		201,00 - 203,00	5. -"-
			kvarts. Er impregnert		203,00 - 203,50	6. -"-
			helt fram. Py opptrer i bånd			
			og bom bom, men cpy opptrer			
			bare i mm-tynne lag og bom			
			klyser spredt ellers er impr.			
			meg cpy fattig.			
			→ 1/199,50 = 23°			
			Bånding av py-strøk			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

B
Ark 10

Dato: 3/9-74 Sign: AI Retn.: -90 Sted: 2006/1000 S Hull nr.: 10.024

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Enkelte bånd blir noe mer kloritiske enn andre. Cpy-kornene stekket og finere spredt utover.			
			Det er en gradvis overgang til den underliggende			
			Tuff. kloritisk og stekt			
	204,10		kornet lett grå og lite cpy			
		204,45	Andesitt, massiv og homogen grå gronn. Et og annet avrundet kvartskis-korn finnes			
	205,38		Tuff stekt. grønn, men med lyseblig grå-rike partier. Et av disse 204,52 - 204,63 er meget grå-rike og stekt imp av grå med noen små cpy-flekker. Stekt v/204,70 = 11%	NB.		
	207,00		Tuff, svært grå-rik og nesten kvartsfritt i partier. Finn en gansk stekt imp som ser ut som vare stein grå		205,38 - 205,42	4 prøve.
	207,90		Agglomeratisk tuff, som opptrer med grønne runde biter av grå-rikt materiale. Er svakt grå-impregnert			
		208,25	And massiv grønnbrun og uten imp, men med gradvis overgang til nedenforliggende			
	209,70		tuffitisk agglomerat av samme type som over. Imp-mengde er meget ujevnt men cpy-opptr i et parti-		209,30 - 209,70	8 —"—
		210,60	And. grønn lys grå grønn massiv, men nye opptrinn finner enkelte grå-korn			
	211,06		And grønn som over men nå med enkelte mer rike imp-bånd, lagde med grå og cpy. Uholdig imellom		210,60 - 211,06	9 —"—
		211,90	And ~~gt~~ typen som før men blir med hyppigere av imp			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 4/9-74 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: 2006/10005 Hull nr.: 10.024

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	212,10		And som før mest mer imp både cpy og py			
		213,40	And. ~~storkrystallinsk~~ grågrønn massiv og tett Fører noe imp av py og enkelte små cpy-flekker ute at de har betydning Er meget brekkvert og gjennomsatt av q-årer mot slutten.			
		214,18	And grønn gråaktig massiv og homogen uten imp. Har en meget svak kloritisk men er sur. Skarp grense mot underliggende V/214,18 = 20°			
	215,19	~~215,61~~	Tuff, kraftig bøndig av svart og kloritisk mat Er meget skf. De første cm er bare py-impregnert, men blir etter hvert mer cpy-førende, gjerne som lynne gjennomgående årer, men oftest som korn		214,40-214,95 214,95-215,19	10. prøve 11. — " —
		215,61	Tuff, massiv og forholdsvis sur, med flakig utseende bruddflater			
	216,58		Tuff, skf, hildels meget en vekslende til å begynne med men leir mer kloritisk etter hvert Imp opptrer som før men i partier er det hildels meget rike cpy-bånd og analyse-oppdelt, men her mer sammentegnes. Bøndig av cpy V/216,20 = 60°		215,61-216,00 216,00-216,58	12 — " — 13 — " —
		216,81	Kalkgr ch lys grønn storkt skf med lynne kalk-åre parallelt skf Skf V/216,70 = 7°			
	217,48		Tuff, skf, mørk grønn og ganske kloritisk. Er varierende		216,81-217,16	14 — " —

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 12 32

Dato: 4/9-74 Sign: [illegible] Retn.: ÷90 Sted: 200 E/1005 Hull nr.: 10.024

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			impregnert. Til å begynne med tildels meget rik på cpy i stripen og lund. Spesielt 216.97-217.08 er det nesten ren cpy. Ellers dette kommer sei en nesten cpy-fri py-imp			
		217.77	Grå tint av Mørkt stkf lysere grønn og homogen			
	219.20		Tuff, til å begynne med mørk og klorittisk, senere meer q og med noen brekcierte partier med varierende imp hele veien. Er ellers noe oppknust.		217.77-219.22	5 prøve
		219.40	Kalk grå? kalkrik lys grønn og stkf, synes knadet og brekciert.	?		
	219.60		Tuff, som over, meget brekciert, mesten agglomeratisk og store fragmenter, med noe py-imp.			
		223.70	Kalk grå grønn, stkf med bare sporete rem regelmessige 2mm. tykke cc-lag Resten er grunnmassen cc-rik Ved 220.60 et 10-cm lag med gangia-brekk q. Skj 4/222.10 = 179			
	224.87		Tuff aktig kalkholdig, mer rik med bruce av q-rikt materiale med noe mørk. Stkf som vare fra tuffen over har en del py-imp			
		225.88	Grå Mørk stkf, mesh grønn, med regelmessige epidot-bånd ikke mye cc.			
		228.15	Tuff, aktig, synes være meget brekciert og mørkere enn tuff som i hengen.			
		228.98	Kontakt over (tuff) resedimentert kalkrik Er antagelig fra kalksone.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

A-k 13 4

Dato: 4/9 Sign: AI Retn.: ÷90 Sted: 2005/1000 S Hull nr.: 1a 024

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		232,81	Kalk grst. meget sbt spalter i flere 2-dre cc-oppfyll i strøk men også som „knoller". Skj 4/229,70 - 173			
		234,30	Bergart av annen type enn før, men er antagelig ny type tuff, som er meget sbt veksler med innhold av svart materiale. Er i det basiske ledd lysgrønn og flakig. Er uten cc-innhold	NB		
		235,-	Blåkvarts, meget sur, relativt fri. men synes ha svært diffuse bredsje-strukturer — i alle fall små lite av svart, sur grunnmasse. Det finnes smale kloritthin hinner i blåkv.			
		235,70	Tuff av samme type som ovr. kontakten mot kvarts			
		236,34	Blåkvarts av ekstakig samme type som over. Overgangen til underliggende er skarp men foregår over bare 3-5 mm.			
		238,47	Tuff, lysgrønn, fore en del ep er ikke så sur men synes ha en relativ pyro-klastisk kjennetegn.			
		240,31	Sur tuff, også her med et grønn stort innhold av ep. Er grønnblå i farge og er gjennomsatt av noen kraftige klorit-strenger.			
		243,-	Tuff, lysgrønn blandet av ep og kvarts-klorit.			
		246,14	Blåkvarts, med egne smale bånd av epidot. Er antagelig stærkt kloritisk med mørke blåsort farge			
			Ep. er kjennetegnet på	NB.		

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 14

Dato: 10/3-25 Sign: A Retn.: -90 Sted: 2000/10005 Hull nr.: 10 027

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		250,35	Tuff. lysgrønn, skf. med svart vag og lysere båndinger ~~ca~~ ep. Dessuten noen smale q-årer Skf V/248, 20 - 25°			
		255,56	Kalkgrå skf lysgrønn og klorittisk. Er her helt lyddisk Har en del ep og noe kvarts slik at den kan se ut som tuff. Til og begynne med lineær bånding, men blir så mye mer finkornet.			
		259,20	Grst lysgrønnlig, er her bare svakt skf. Fin-usorterte ep. Dessuten noen spredte cc-bånd og lysere cc-striper			
			Har meget skarp overgang med vinkel 29° til underliggende	NB		
		261,50	Tuff. meget cc-rik med antydet til q- sammen med cc lys grønngul og massiv. Virker brecciert med rare striper i bitene her og der.			
		268,65	Grst. massiv lysgrønn med tydelig rik på ep Færre mindre cc her kan nå 2-3 cm lineære partier hvor det er mere skifrig og tuffittisk materiale.			
		271,34	Grst. mørkere grønn, men ikke mer skarpt skf Færre epi her er det ep. men nå også cc fint fordelt og noen bånd Mot slutten blir det mer tydelig skf. partier Skf V/270,90 - 11°			
		276,70	Grst lysgrønn, massiv middelskornet Grensen homogen Er ep.-rik og fører noe spredt fintfordelt cc. Er del sorte min som spetter.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 15.

Dato: 11/3-75 Sign: ø Retn.: -90 Sted: 2600/1000S Hull nr.: 10.024

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		277.60	Keratofyr, meget q-rik men også meget vregelmessig. Fore- en forsiktig q- som kan tydelegvis at det er mangan-førende. En vregelmessig og er absolutt pyroklastisk. Mye ep i uregelmessige årer og brekkerte partier. Dagsi nye klorittisk, kpelt Det er en gradvis overgang til			
		278.77	Kalkspat. av den typiske utvikling, med tett nett av cc-bånd hvor båin er 1-2 mm tykke. Ukl Skift 1/278.50 = 11° (årsak er klart blanding og det synes vere forskjell til skift som er flatere.)			
		285.—	Gr st. lys grønn, meget svakt skif. Noe flaking, fører ep men bare lite cc. En middelkornet variolitt som over med noen mørke kpelter. Blir etter hvert utvikling epidotrik			
		288.75	„Epidotitt" en blanding av ep og kvarts, meget tett og fin. Dessuten utvikles gjennom-ved av tynne uregelmessige bånd av mørk klorit Gir gradvis over igjen til			
		288.53	Gr st. massiv tett og middelskornet, grønnlig rik på ep som over og noen kpelter av mørke min. uten cc.			
		289.18	Keratofyr q-rik grålig brun-grønn, meget tett og fin. Epidot finnes i gamle utfyllinger men ikke som før			
		289.80	Tuff, lys grønn, meget uregelmessig med mørke ep. Er også en del skif.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 16

Dato: 11/3-75 Sign: A Retn.: +90 Sted: Zwck/1000 S Hull nr.: 10 024

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		291,81	Gr.st lysgrønn svakt tett er finkn kornet og ep tre ikke så godt fram. Ikke cc. Her et par pyroklastiske, smale bånd.			
		294,95	Tuff, veksler gansk hårt mellom klorittisk bånd med cc-striper og mer homogene svart grålig bånd. Et par lysere horisonter med mange sammen med mangan.	KB		
		297,37	Gr.st. grønn, gansk fink og svakt tett. Ep en til stede, meget liten mengde. Cc finnes som uregelmessige striper og ainer rundt om men ikke fordelt. Det samme gjelder ep. Stf. V/298,40 = 14°			
		301,25	Gr.st gansk fink lysgrønn mye flekket. Har mere ep og cc-aggregat rundt som uregelm. striper. Stf V/296,40 = 14° Også ep i grunnmassen.			
		301,50	Keratofyr / pyroklastisk fragmentær svart i lys grønn klorittisk matrise, med mye ep.			
		305,60	Gr.st. lys grønn, gansk massiv mye oppknullt, litt ep fordelt, lite cc			
		306,80	Tuff, i det vesentligste lysgrønn og klastisk, men med svarte bånd grafitpartier.			
		310,65	Gr.st som over, helle massiv med fordelt ep og bare enkelte tynne cc-striper. Et par tuffbånd kan også sees i oppbre			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 17

Dato: 14/3-75 Sign: AT Retn.: -90 Sted: 2004//5005 Hull nr.: 10 024

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		313,84	Tuff, svært svakt svovelholdig og svakt skf. Veksler med jevne millomrom mellom grønske breccie bestående hovedsakelig av lyst blekrøde mat, med små svarte klaster i. I disse sitter det delvis også en meget grov men fattig py-imp. Cc finnes som egne bånd, men også i de svarte ala men finfordelt. Skf V/312,65. 85			
		314,73	Tuff, pyroklastisk og svakt svovelholdig, meget rikt på cc.			
		317,73	Grst svakt skf gjenn, rosa spettet av kloritt, også av finfordelt cc. Er litt flakig på spalte plan, mn konturløs homogen			
		319,00	Tuffaktig, meget skf, også litt ~~skf~~ oppsmuldret. Gammelt fin cc-båndelag. Meget også fin-fordelt. Skf V/319,15 = 19°			
		320,42	Epiklast-rik, mangan-holdende tuff med q-flekker -/py, i bunndelen litt av mørkegrå bergart. Synes dårlig omarbeidet og kanskje jurassisk sediment.			
		325,35	Tuff, meget svakt skf, men med svarte bånd spredt rundt. Det ser delvis ut som omfordelte svarte (kloritoppride) soner			
		327,48	Grønt lys gjenn og spredt spettet skf. En del cc mot slutten. Over mot ep. SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1

Dato: 20/9-74 Sign: AI Retn.: -90 Sted: 1009/9005 Hull nr.: 10.025

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		3,62	Gr.st gamske fint mm varierende, lysgrønn og uhomogen, e del kloritiske bånd, mm ikke slikk at det kan kalles kuff.			
		4,38	Mørk grønn, meget tett bergart. Synes ikke være sur ka være mylonitt. Hen mot lysere klorritt-bånd.			
		9,45	Tuff delvis i helstide massiv, men likevel med noen gr.st bånd. Det hele er tydelig dagfelt, meget oppsprukket og rustent på sprekkene. Båndlinjer er gamske vanskelig å se.			
		11,51	Tuff. Til å begynne med gamske svak bånding. Noe mer markert etter hvert.			
		3,00	Synes også her tuff. Meget oppsprukket med rustne og hematitt belagte sprekker.			
		16,00	Tuff, massiv, meg bare svake spor av bånding			
		18,37	Breksje, meget mørk og er stadig i dag-sone, med lette rustne biter. Særdeles oppknust.			
		19,54	Tuff, massiv, med en god del brekssering.			
		21,70	Gr.st gamske lys grønn og noe oppsprukket. Bl.a. noe mørkere årer og m/q-åre			
		24,95	Tuff, grønn og massiv med meget oppknust. Gipsått av q-åre og klyfter. Båndinger blekker i markert og mindre markert.			
		27,10	Rend-gr.st massiv mørk klippen meget finkornet. Gamske homogen, men blir i enkelte partier mere rend. Et par steder med meget fine pyritbånd.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 5/2-75 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: 1500/9005 Hull nr.: 10-025

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		31.10	Grønst. massiv mørk klorittrom meget tett og fink. Et par spredte mer kloritthe bånd Grensta oppsprukket			
		32.11	Dårlig, klorittrom massiv og meget fink. Blir kvitgrå på kvartsflater ved de gullførende rustne kjerner. Det må være fine sprekker i den. Vanskelig p.g.a. kornstørrelsen mer sett			
		33.13	Ank. grønst. mørk grønn massiv og tett.			
		35.55	Ank massiv tett mørkegrå og fink. Mørk klorittrom med grågrønne stripeplan			
		36.88	Tuff. massiv og i det vesentlige ank men med fører lyse kloritt bånd med grønne mellomrom.			
		38.94	Ank. grønst. mørk grønn tett og fink. Veldig mye sulfider			
		40.58	Pyrokl. kvarts et svart ank materiale er gjennomsatt av kloritthe bånd striper og utskillinger. Det hele svært uregelmessig og med små brekksjoner.			
		42.20	Ank grønst. grønn massiv tett og grønsta fink. Homogen med små spredte pyritter i sprekk.			
		45.33	Tuff av den kjente massive type. Veldig lys grønn og grålig svart bånd. Noe mer diffus båndning mot slutten.			
		49.25	Ank grønst. massiv grønnlig meget tett og fink meget homogen			
	5094	~~5044~~	Tuff massiv grønn like delen bånd og svart materiale, men en i realiteten meget uregelmessig. Pyritter i små linser og bånd sammen med det svarte dødd i alminnelighet.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 6/2-25 Sign: A Retn.: -90 Sted: 1000/9005 Hull nr.: 10 025

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
			Viser seg over meget ~~[illegible]~~ foldet og alt tyder på at fig er ~~[illegible]~~ som gå og senere kvartsåret. Følgende sees i folden: Fra det kloritthole og innover mot sent, først en mørk grønn sone som gradvis blir mere lett til den er hvit. Deretter kommer igjen sonen med mørk grå sur tuff.			
		54,34	Tuff, stedvis massiv og grønn, men nå mere regelmessig og delvis mer kjølig. Dominerende bånd er også lenger.			
		56,57	Grønt massiv nesten kloritt og delvis glimmer. Her tenderer til partier med mere materiale			
		59,38	Tuff, matrix mørk grønn men med lysere kloritthole bånd. Dessuten en del q-bånd Dels også uregelmessig med dacitthole (smal) partier. Det er en gradvis overgang til underliggende			
		60,73	Grønt grønn av vanlig type, vanskelig mot andesittiske massen og homogen. Noe oppsprukket her og der.			
		63,98	And grønn massiv lett og heller finkv. Varmen mye i sammensetning mot and. grønt, men er ikke vesentlige and.			
		68,55	Tuff, massiv og vekslende mellom vel definerte mere grønn og kloritt grønn bånd. En storre del skal finnes i enkelte av kloritt bandene. Skal 1/65,45 = 13°			
		70,14	Grønt massiv, lysgrønn med de grønne mineralen gamle grove. En del ep som gjør b.a grønngrønn her og der.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 4

Dato: 6/2-75 Sign: AL Retn.: -90 Sted: Ibsje/9005 Hull nr.: 10.025

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		70.99	Tuff, massiv grønn, veksling med mye ep.			
		72.10	Grønt gangbre lys grønn massiv mye vekslende med lyse kvartsbånd			
		80.95	Tuff, massiv først med diskant lamering, senere mye mørkere. Epidot funnes i årer og fordelt. Py-korn finnes enkelte steder.			
		83.32	Annet grønt massiv mørk grønn og tett. Er en del brekkasjert her og der.			
		85.35	Tuff, massiv, mye mørk veksling. Mest annet materiale. Enkelte skarpe kontakt			
		88.60	Andesitt. massiv mørk grønnblå og tett svart finkornet. Py spres heller homogen			
	88.90		Agglomeratisk materiale hvor py-stringer som spres i oppsprekninger i årer m/finkornet py på kryssvers, mest langs lagring			
		89.85	Annet grønt mørke grønn, massiv og meget fint. Grår mot grønt			
		92.58	Tuff, massiv og gangbre vekslende med tynne lyse bånd mot slutten mye mørkere bånd			
		93.98	Beregnet er lys grønn og hvit spettet, mye fiskere, men holder ikke ca. Er enten grønt eller grønt gabbro. Tror heldst det siste. Skj v/93.85 : 14°	NB		
		95.80	Annet massiv mørk blå grønn og svarte finkornet. Et par sammenhengende brekkasjerte partier			
		97.13	Grønt grønn, mye mørk meget massivt mye av del oppsprukket pga sleppet			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 5

Dato: 6/2-25 Sign: A Retn.: -90 Sted: 1906/9003 Hull nr.: 10025

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		98.00	Tuff, massiv mørk grønn, med svake båndering. Mest basisk			
	99.20		Tuff, massiv lang i mellom båndene, men med sone hvor av lyse gy. Også som gd strukturen (Hakket) Grønne sm			
		100.45	Tuff, massiv grønn og i det vesentlige bestående av basisk materiale.			
		101.60	Grst massiv grønn meget tett og fine Tynn q-striper.			
		102.95	Tuff, svært massiv mm uregelmessig med brekkerte bånd			
		104.38	Tuff, svært sur og rhyolittisk Mye epidot, også oppsamlet epidot-partier			
		105.04	Amd massiv og grønnblå Tett fine			
		106.14	Grst massiv mørk grønn tett og fine om mot amd grst. meget skarp uregelmessig grense mot			
		109.20	Tuff meget massiv Er vag i bunden samtlatt de første 10 cm hvor den er meget mørkeit			
		111.58	Amd grst → amd. En ubestemmelig p.g.a meget tett og fine grønnblå i lange og veldefinerte i sprekk (de alltid mot mørke)			
		112.40	Tuff, massiv grønn i det vesentlige basisk mot Uregelmessig			
		113.35	~~Dacit~~ meget massiv tette og klargrå fine			
		116.03	Amd grst grønn i massiv og fine, grågrønn på brudd flate Enkelte q-anrygginger			
		117.95	Tuff, lys grønn for det meste basisk med skarpe grenser mellom bånd Noe opp-sprukket			
		119.-	Grst. massiv grønn, mørke og fine. Noe oppsp.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 6

Dato: 6/2-75 Sign: A Retn.: -90 Sted: 1000/4005 Hull nr.: 10.025

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		126,35	Tuff mørke og lys om hver andre. I det yderligste en grønn meget bøndig, men ogsåi enkle overganger Skf V/122,40 = 12°			
		131,09	Tuff, mykt skf grønn og mot mørk grønn Meget enkle og tynne bøndinger, i det vesentligste basisk materiale Skf V/129,40 = 5° Del av en overgangssone på ca 0 cm med uregelmessige forhold ved overgang til underliggende			
		141,-	Gabbro. lys grønn og skf. De harde mørke, hvorav blir de mer massive amfibolene her tydelig fram i en helle lys grønnmassen av grønn feltspat. Man finner partier som er meget mer fin-k. igjen innimellom det grove massive, men grov massiv er mest opptredene En del skifrig og skjøter finnes			
		146,40	Gabbro, som over, men den er nå mer massiv grov og mer opplukket i partier De siste 20 cm er en skf overgang mot tuff mørk. Det er dessuten en god del mer epidot mot bunnen.			
		149,57	Tuff, av akkurat samme basisk skf type som over gabbro. med diffus bøndig Skf V/147,25 - 15°			
		149,60	Tuff, grønn av skf. I dette partiet for det meste basisk mat. som har små-spetting av ce. E noe opplukket og opelitet.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 8

Dato: 6/3-75 Sign: [illegible] Retn.: -90 Sted: Boks/9005 Hull nr.: 10.025

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		154,63	Tuff, gaatte massiv til svakt skif. med fyldelige sm. av basaltisk kvarts, ellers om dioritt en del av nye mineralmassige. Mot slutten (siste 1½ m) god kvarts.			
		156,-	Andesitt, massiv grønnlig tett og gaatte mikrolitt. Feltspat som små korneller. Har vekslende innhold av ep i årer og uregelm. klynger.			
		158,85	Tuff, massiv og med små diffuse kvarts. Siste 1m kvarts.			
		162,83	Dacitt, lysgrønnlig, har mye ep. En fersk og tett. Meget epidotisert hele veien. Det som gjør den kvarts er fyllinger på sprekker av ep, samt en relativ breksjert partier. Særdeles mye epidot i enkelte partier.	NB		
		166,85	Tuff, svakt skif og med lysere vekslinger av for det meste kvarts mineraler Skif V/165, 70 - 215			
		168,70	Tuff massiv grønn, med mer svak lagning og kvarts kvarts			
		170,68	Tuff, markert mørk kvarts svakt skif. som er vesentlig kvartsfri.			
		171,73	Andesitt massiv, mørk grønn og tett fels.			
		174,57	Tuff, massiv med svært svakt synlige vekslinger mellom svart og kvarts.			
		176,40	Grønt massiv mørk grønn og svært fin, en grønn dioritt her og der.			
		177,-	Kjerneslep			
		177,80	Grønt av samme type som ovenfor kvarts av skifret. Det er svake skif og mer glissende på plassen			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 8.

Dato: 6/2-25 Sign: A. Retn.: -90 Sted: ø 1002/9005 Hull nr.: 10.025

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		180,30	Tuff., meget mørk grønn og svakt skif. Men tydelig med de røe linjen kloritiske båndene Skf V/179,80 = 8°			
	180,70	~~180,70~~	Tuff., som nå er gansk pyrrotinrik uregelmessig av utseende. Har nye lmm-store runde, klare q-amygdaler. Har dessuten begynt å føre svak imp av py.			
		183,-	Kjernetap			
	183,25	~~183,25~~	Tuff., ligner som om med små runde q-amygdaler og en tydelig py-imp, dog er den gansk svak. Det hele er l.lf skf. Tuff. svakt skif lik det man har over men litt lite py-imp Skf V/188,10 = 10°			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

9

Dato: 4/9-74 Sign: AH Retn.: ÷90 Sted: 1002/1003 Hull nr.: 10.025

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
Fra	190m					
	til	191,31	Tuff, lys grønn, ubf fint. med q- som bånd og som er omkr amygdaler. Bare spredt py-korn			
			Stf V/190,20 = 14°			
		193,88	And gr gjennom tett massiv og fr-kornet, enkelte py-korn Noe oppknust V/193 og 194. Blir etter hvert mye mer grov.			
		195,18	Tuff, svakt stf, grønn, vesentlig klastt, men med en del q- og cc bånd			
	196,00		Tuff, omtrent som over, men nå begynner en uregelmessig imp, mest av py, men cpy finnes også men det hele er meget svakt mest cpy ved 195,90-,92.			
		197,42	Tuff, som over i farge, er stadig basisk, men er blitt mer massiv. Bare meget spredte py-korn og striper.			
		198,35	And tett, fint og blågrå, med noen q-årer. Her gradvis overgang ~~til~~ over ca 10 cm til			
		200,53	Tuff, basisk, svakt stf med spredte py-strenger. En god del q-brekkfylling og oppknust mot 200,-.			
		202,45	Tuff, grønn, meget svakt stf, og lyse strøk tegn som tyder på at dette er tuff. Men bergart har tett i tett med 0,5-2mm store runde og uregelmessige q-korn. Helt ut imp til 201,70. Her blir det mer basisk og py-impregnert, også med noen få cpy-korn.	NB		
		203,85	And. gr. sl. grønn, tett, fint og lit flekkis, homogen			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

10
3

Dato: 12/9-74 Sign: A Retn.: ÷90° Sted: 1005/1005 Hull nr.: 10-025

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	206,88		Tuff, grønn og vesentlig kloritisk, massiv og meget diffust, men tydelig båndet. Tett med små runde q-korn som over. En uregelmessig imp av båndet py, mer mon få små cpy-klynger inn. Oppsprukket. ~~Cpy~~ fra 204,60			
	207,65		Breksje, lite kantet og uregelmessige meget q-rike biter i en kloritisk matriks. Vesentlig rund bit-grense fremmes en varierende imp av py og cpy. Cpy også på sprekker i q-bitene. Tilsammen en svak cpy-imp		206,88 - 207,65	1. prøve.
	208,50		Tuff, lammelignende som over med meget svak py-imp			
	213,05		Tuff, nå agglomeratisk eller brekciert, med ganske store runde biter i kloritisk grunnmasse. Imp tyle veien hvor cpy-imp er ujevnt og uregelmessig og utgnidet på enkelte skj.-flater. Også endel av de partier der q-korn finnes. Noe opphmst fra 212		208,50 - 209,00 209,40 - 210,40	2 - " - 3 - " -
		215,40	Tuff, ganske lys grønn og svakt skj m/ markert båndning men er i det alt vesentligste kloritisk og så godt som fri for imp av alle slag. Et par-tre skyger av py-finner Skj V/213,40 - 123			
	219,52		Tuff kloritisk og massiv men små runde q-korn. Meget tynn cpy-imp. Ett hvert blir q-kornene mere linseformet og større og fører mer og mer imp. Mest imp mot slutten, men lite cpy		217,00 - 219,52	4. prøve

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

11

Dato: 12/9-74 Sign: A Retn.: -90 Sted: 1000/900S Hull nr.: 10.025

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	221.11		Tuff, klorittisk, men mye mer båndet i sum og basisk bånd. Skj. Også veldig flytog, med fa og små cpy-korn.			
	221.70		Breksje, med uregelmessige bit i klorittiske grunnmasse. Bitene er grønne og store i denne forbindelse også noe imp og noe cpy.		221.11-221,70	5 prøve
	222.20		Lys grå antagelig kvartsfyrist. Pen skj og imp av bare py -xx Gangbit store xx. Opp-knust mot skifer og meste bergart begynner oppknust.			
	228,68		Tuff, vesentlig klorittisk og noe skj. Er gjennom mesteparten bandet. Føren hele veien en meget varierende imp av py som enkelte steder har noe cpy Skj v/228,35 - 185		222,55 - 224,00	6. -11-
					226,30 - 227,00	7. -11-
	~~229~~		Meget skarp overgang til underliggende			
	229,58		Meget sur tuff, lys kvit med noe grønnaktige remmer. Synes delvis å være breksjert. Føren vekslende py-imp, kun bånd med noe cpy		228,68 - 229,58	8 -11-
	233,17		Tuff, meget homogen og kvarts svakt båndet, men også svakt skj. Føren py i diffuse årer og skyer, men i det hele heller svak imp			
		235,13	Omv sitt. meget massiv lys klorit og med særdeles enkelt korn av py. Er tildels meget oppknust med epidot og kvartsbånd			
235,28			Massiv malm, gangbit fritt men partier med grove py-xx Meget lite cpy. En del cpy-korn		235,13 - 235,28	9. -11-

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 12

Dato: 17/9-74 Sign: A Retn.: -90° Sted: 1505/9005 Hull nr.: 10.025

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		236,75	And. er meget tett og ugunstig hornogen. Er likevel gjenn sluppet inn. Noen tynne g-årer Opptrukket de rikeste San			
237,08			Massiv malm, heller grov gy med en god del gang- g lite cpy.		236,75-237,08	10. prøve
		237,92	And.-grst. gjennomlig blå fra inge imp, men er oppsprukket og har cc-mel på sprekkene. Skarp grense V/237,92 = 542			
239,57			Massiv malm, meget tett og fint her en del lysere stikk med g, synes i partier å føre noe finfordelt cpy, men i det vesentlige lite cpy		237,92-239,57	11. -11-
		239,98	Gr.-st. lys grønn og svakt skif med noen g-amygdaler ~~Massiv malm~~			
240,38			Massiv malm, meget finkornet og homogen, men antagelig lite cpy. Har noen lysere stikk men holder samme		239,98-240,38	12. -11-
	240,90		Tuff, meget sterkt skif og ganske homogen, lys grønn, vesentlig klorit Py-imp Skif V/240,60 = 79			
241,09			Massiv malm, fint men med noen grovere py-korn. Kan tenkes å føre litt cpy		240,90-241,09	13. -11-
	241,27		Tuff av samme type som over kanskje noe mer markert båndet.			
241,71			Massiv malm, som over, men den har nå klart et cpy-innhold. Grense mot homogen er gradvis og klorittrik Gr.-st klorittisk mørk		241,27-241,71	14. -11-
		241,92	grønn og noe oppsprukket			
242,02			Massiv malm av den type som før		241,92-242,02	15 -11-

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 13

Dato: 20/9-74 Sign: AA Retn.: -90° Sted: 1002/9005 Hull nr.: 10.025

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	242,43		Tuff, kloritt-rik og grønn men noe oppknust og med svak imp og et 2 cm bredt py-bånd.			
243,07			Massiv malm, skakt og markert båndet. Er meget mt-rik noe som fremhever båndingen. Synes i enkelte bånd å ha noe cpy, men vesentlig py/mt Båndning V/243,70 = 16°-32° (fra heng til ligg.)	N/B		
		243,15	Tuff, som tidligere uten imp av noe slag.			
244,10			Massiv malm, er fin-k og grønnlig massiv, med tildels større cpy-mengder (Analyse av dette gir 4,38% Cu) Meget lik oppknust.		243,15 - 244,10	16 prøver
	244,44		Andesitt, kraftig mot svak overveiet til en tuff. Pepret med py-korn.			
245,30			Massiv malm, finkornet som over, men fører ikke så mye cpy.		244,44 - 245,30	17 — " —
		245,46	Grønn meget fin-k og skj			
245,56			Massivt malm-bånd, av samme type som over		245,46 - 245,56	12 — " —
	245,91		Grønn svakt skj, mørk grønn og svart-glimmende. Fører et par flekker med cpy, ellers uten imp.			
			Massiv malm av samme, fin-k type. Antagelig lik cpy.		245,91 - 246,31	19 — " —
	247,20		Kalk grønn er skj inne oppknust og ikke så typisk. Py			
		249,24	Kalk grønn, fin-k. skj og mot mørkest og typiste bånding. Skj V/247,80 = 16°.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 14

Dato: 20/9-74 Sign: [illegible] Retn.: -90 Sted: 1002/9005 Hull nr.: 12.025

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		251.26	Kalk. grøst. hen over, men cc-båndene er mer diffuse. Dessuten tydelig innslag av epidot som gjør båndinga en grøt-grønn farge			
		255.50	Kalk grøst. stående sm før mer distinkte cc-bånding. Ble ell. kvart mer lik grøst. mm tyd. tydelig cc-innhold Skj 1/255.50 • 12$ SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark!

Dato: 30/11-73 Sign: -H- Retn.: ÷90 Sted: 2001/3005 Hull nr.: 10-026

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	1.11	Andesitt, lysgrågrønn, grønn-brunflekket glassaktig, synes ha porfyr. Er ~~mid~~ fint og helt massiv og homogen	Prøve		
	✓	1.90	Dacitt/keratofyr, meget fint massiv homogen grågrønn mørk grønn. Fører tynne py-striper her og der. En del epidot-årer. Blir gradvis mindre sur. Kontakt siste 10 cm	Prøve		
	✓	2.12	And. gr.st. mørk grønn men basisk	Prøve		
	✓	4.00	Dacitt/keratofyr. Kontakt ikke fullt så sur som over ellers massiv grågrønn, mørk	Prøve		
	✓	4.55	Gr.st. fint grønn, meget massiv og homogen.	Prøve		
	✓	5.90	Gr.st, massiv og homogen. Ganske lys grønn, og heller mer grovkornet innenfor, med en viss form for spalting	Prøve		
		7.70	Andesitt, mørk blågrønn grå, meget fint. Enkelte py-korn langs tynne soner fylt med py	Prøve		
	✓	9.20	Gr.st grønn, ~~nær~~ ~~flatelig~~ kontakt noe lysere enn vanlig. En del brecciepartier av noe py-mg og enkelte åarer			
	✓	11.80	Gr.st lys grøn, finkornet massiv og relativt homogen. Varierer i kornstørrelse noe. Tydelig porfyr-bånd v/ 11.80m			
	✓	12.55	Gr.st. noe klorittisk mot tydelig tuff-preg og basisk pyroklastisk mat			
	✓	14.20	Gr.st grågrønn grønske fint og massivt, men gjennomsatt av et par breccie-bånd. Er mye py-mg			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 2/4-23 Sign: AT Retn.: ÷90 Sted: 200V/300S Hull nr.: 10.026

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			mot slutten samt endel epidot-årer.			
	✓	15.40	Gr.st. grønn tett fin-k. homogen. Noe q mot end.			
	✓	19.90	Tuff, svært uregelmessig og stedvis direkte pyroklast. Er grønn og mot slutt. Forer i de nest to siste delene lysere py-strukturer samtidig øy grønnkornet herav de. Skj. V/15.70 = 27° Tuff-bandet-gn blir etter hvert meget diffus.			
	✓	21.35	Gr.st. grønn tett og fin-k. massiv. med enkelte q-amygdaler.			
	✓	22.40	Tuff meget vag båndning og vesentlig massiv			
	✓	25.42	And.gr.st. til å begynne med noe mørk blå grønn, men blir etter hvert lysere grå grønn. Ikke helt finkornet men ganske tett. Er helt massiv og homogen. Varierer noe mellom de over nevnte typer. Blir en del oppknust etter hvert og grader's noe mer fink.			
	-	28.70	Kjernetap			
	✓	29.36	And.gr.st. noe lysere grønn med enkelte q-porfyrer. Svært oppknust			
	✓	29.80	Kjernetap			
	✓	33.80	Gr.st. meget oppknust til å begynne med men blir dt. hver meget massiv og homogen. Er grønn og middels fin-k.			
	✓	34.90	And.gr.st., mørk grønn, ganske fin, tett og massiv. Gjennomsatt av endel epidot			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 30/11-23 Sign: [illegible] Retn.: 190 Sted: 200V/300S Hull nr.: 10.026

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	42,00	And. gr-st. er her mer lys grønn og til å begynne med en del rel grønnst. Har endel epidot og 36.0 - 36.5 er normert fyldet og brekviert epidot åre. Enkelte grovere lag			
	✓	48,56	Gr-st. mørk grønn, tett meget fint og homogen. Er gjennomsatt av noen grønne enkelte meget tynne epidot årer.			
	✓	57,88	Tuff. basisk og svakt skifrig delvis grønnlig mot. Har endel epidot med lokalt rundt. Samt enkelte store runde grønnaggregater med knuste fragmenter inni. Enkelte pyr-bånd.			
	✓	53,87	And. gest som er grønn lys grønn og med uregelmessig åre av epidot			
	✓	62,50	Tuff som over. Det hele er grønn basisk og pyrotol. Enkelte „eyne" av grønn. Ellers endel brekviert somer fyllt med epidot. Det blir mer og mer pyrotol og mer epidot			
	✓	63,65	Andesitt, grå grønn grønn grønn. Massiv noe epidot			
	✓	65,45	Tuff, massiv og stedig med mye epidot åre. Første 15 cm fører endel pyr i bånd			
	✓	66,80	Gr-st. massiv grønn tett og meget homogen			
	✓	68,55	Tuff, av samme type som vi har hatt over			
	✓	69,90	And. gr-st. mørk grønnsvart grønn meget finn massiv. Tett helt homogen da det			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 4

Dato: 30/11-73 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: 2000V/3005 Hull nr.: 10.026

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			finnes et par brekkgrønne partier og noen g-årer			
		71,64	Omd. gr. st. ev. samme type som over			
	72,22		I den omd.grst som ev. opptrer meget uregelmessige striper av svart av Py-linse De er 3-2 mm bredde og er meget foldet. Sammen med disse er skredet en bleking av bergarten rund en klorittsone, dannet at dist alltid er svart i det blåne py-finnes. Det er verdig dist dann finnes et par opy-korn. Er dette en såkalt stringer-sone?	NB.		
		74,55	Omd grst. fortsetter. Er her noe mørkere og tettere mye lysere epidotaree Blir lysere grønn mot slutten.			
		79,65	Gr-st. grønn meget homogen nyttest svak skif eller spaltning? Enk spredte cc/q/epidotårer			
		81,25	Tuff aktig materiale, grønske massiv med brun farten basiske, En god del epidot	17/12		
		88,25	Grst massiv homogen og tett men ikke helt fin. En del svak g-årin, med noe py-xx altså mm tynne driftlag. Blir etter hvert noe mer fin og flakig.			
		91,60	Tuff, meget mørkfelt bandlina hvor først basiske er i stor overvekt men etterhvert blir mer 50-50. Er svakt skif Ved 89,50 finnes et 25 cm mektig bånd med typelig sein breccieskjekker agglomerat.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Rek 5

Dato: 17/12-73 Sign: H Retn.: +90 Sted: 200V/3005 Hull nr.: 10,026

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		✓	Disse er omkranset av tynne kullgid-haloer og bruddstykkene har et rosa skjær magnetitt opptrer som uregelmessig fylling mot sluttene. Skf V/90,15 = 17%			
		93,25	Grst. meget mørk grønn svakt gjennomsk pga skjæplan, meget fin-k.			
	✓	94,45	Tuff, tynnbåndet av uregelmessig med enkelte tynne striper av „grusagglomerat" pyroklast. I sure deler fremtrer tynne py-impregnasjoner			
	97,35		Tuff, mere massiv og med svak båndning. Er tydelig skjæ Skf V/94,00 = 20%			
			5mm tynn strip av py begynner å opptre men i disse hele er impregnasjonen meget tynn. Tuffen blir også meget varierende og ujevn eller hvert.			
		98,10	Grst grønn tett, massiv og homogen med noen q-åre			
✓	104,05		Tuff, forholdsvis regelmessig men ujevn meget rask variant. Tynne py-årer krysser gjennom hele bildet og enkelte steder går det opp i bånd pga sammenhetighet - kvaliteten av disse er svært vekslende. Synes ikke føre mer enn py Det ble noe skf Skf V/100,40 = 37%		100,00 - 101,00	1. prøve
					101,00 - 103,25	2. —11—
✓	105,65		Grst svakt skf. meget finkornet bort-grønn gjennomsk pga skjæplan. Tynn fordelt py imp Skf V/104,50 - 20%			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 6

Dato: 17/12-73 Sign: [illegible] Retn.: +90 Sted: 2004/3005 Hull nr.: 10.026

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Er noe oppknust og litt kjerntap oppover			
✓	106,10		Gr st. grønn massiv og fin-k med striper av tynn py-imp			
	✓	107,90	Gr st massiv og av samme type som over men her ofte imp 2mm store anrygginger spredt gjennom det hele. Svake tynne kalk-bånd kom oppover her og der			
✓	109,00		Gr st som over men litt grønn og med en meget svak py-imp som tynne striper og skyer fordelt overall			
✓	111,83		Tuff, til i bergarten med meget vag båndning men ellers lite meget markerte båndinger. Noe basisk/sur oppover noen hundre cm.			
		113,34	Tuff men meget finbåndet og vanskelig å skille de enkelte lag. Stedvis tydelig fine tynne enkelte tydelige pyroklastiske lag.			
	116,23		Gr st. meget svakt kalk mørke bortover men er i partiene sterkt preget av grønne grove py-korn.			
✓	118,63		Ang. grst. grønn lys grønn grønne flekker og dels preget med dårlig tabulære mineralkorn antagelig hornblende. Py imp som grove pepper.			
✓	119,22		Meget sterke imp av grønn grove typer py, ellers ogs. Bånnen er skarp grense til overliggende. Et imp bergartslag 4/119:05		118,63-119,22	B prøve

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 7

Dato: 17/12-73 Sign: A Retn.: ÷ 90 Sted: 200 V/300 S Hull nr.: 10.026

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	121.83		Tuff, meget uregelmessig i bånding. Py-striper lenket sammen med svre bånd. Imp vesten sterkt			
	125,86		Pyroklastiske, uregelmessig tuff bergart, i det alt vesentlige meget svr, hvor hele veien gjennom sterke imp fordelt overalt hele, men det er også oppkonsentrert i enkelte bånd. Som regel er det en gjennom grov py-imp med xx fordelt i en finere okeraktig py. I alle mer konsentrerte bånd kan man finne opx kanskje? Bergarten blir oppknust etter hvert.		121,83 - 123,00 123,00 - 124,25 124,25 - 125,86	4. prøve. 5. —"— 6 —"—
	126,60		Grå gjennomlys gjennom synes flaking av imp av py-xx i kjelfe. Tuff aktig gjennomsatt med enkelte py-striper av Skif og finere mye ca Skif V/126,75 - 165			
	129,00		Meget sterk bånded imp i andesittisk-flaking bergart Er til å begynne med svak men imp øker raskt. Tydelig bånding av opx og Zn S Det hele er nærmest massivt i partier. Bånding av Zn S V/128,50 - 165		127,80 - 129,00	7. —"—
			Samme type bergart med vesentlig sterk py imp. Det kan være noe opx her og der men neppe Zn S		129,00 - 132,00	8. —"—
	132,93		Nesten massiv py-malm gjennom grov og tydelig bånded.		132,00 - 132,93	9. —"—

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 17/12-73 Sign: [illegible] Retn.: 490 Sted: 2004/3005 Hull nr.: 10.026

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
✓	138,08		Den samme lave, lys-grønne og litt flakige bergart, nå med mer vertrende mengde py-imp. Imp har tydelig lineært preg.		132,93 - 134,57	10 prøve
					135,00 - 138,08	11. -"-
✓	139,00		Tydelig pyroklastisk klastisk bergart med avrundete og avlange q-"bolle. Det hele vertrende impregnert av py-xx. Mørkfarvelse med q-utvendinger finner man store opx-krystaller. Nærmest q-bollen er opx mye grovere enn ellers.		138,51 - 139,00	12 -"-
✓	145,44		Tuff som blir mer rolig og stadig med uregelmessig impregnasjon. Opx - spotter her og der. Det hele er svakt skif. Skif ✓/140,90 - 120 Imellom opptrer partier med gamske store (1cm) q-amygdaler.		139,00 - 140,00	13. -"-
					142,00 - 143,00	14 -"-
					143,00 - 144,00	15 -"-
✓	148,12		Tuff pyroklastisk, er lys-grønn, flakig og har mye tynne imp, da som grove py-xx spredt utover. Sone i partier svak mye q-amygdaler, eller pyroklast. Bolle 3-5 mm store. Er hele tiden svakt skif.			
✓	150,00		Tuff svakt uregelmessig og vekslende brist / basisk Bare svak py-imp			
✓	151,65		Tuff som over men nå helt uten imp. Svakt skif Skif ✓/150,20 : 198			
✓	153,95		Grønt grønn, gamske massiv og nesten spettet med enkelt xx av py.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 17/12-73 Sign: [illegible] Retn.: ÷90 Sted: 200V/300S Hull nr.: 10.026

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	-	156,55	Meget lagt båndet tuff			
			Iblen meget sma mengder			
			py-imp. En av sure typer			
		156,75	Kerne tap			
	✓	158,50	and-grst? en massiv			
			homogen og ganske mørk			
			grønn. Er ikke helt			
			fri for py-imp			
	✓	162,95	Tuff. meget lag og			
			diffus båndning En i det			
			vesentlige massiv av			
			av and-type			
	✓	165,23	Gr-st. grønn, homogen			
			massiv og meget fin-k.			
			Et par partier hvor det			
			finnes isolerte py-xx			
	✓	166,20	Tuff med meget diffus			
			båndning men med et			
			par pyroklastiske bånd			
			med finkornet py.			
	✓	168,50	Gr st. massiv og homogen			
			grønn og forholdsvis fin-k			
	-	171,00	Tuff. som hen tydeling			
			pyroklastiske innslag			
			i form av mørke q-kvister			
			som ikke synes å være			
			omvandlet. Det hele er			
			sterkt skjørt.			
			Skift V/169,40 : 72			
	-	171,85	Tuff som over med			
			med et par tynne py-			
			bånd			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1

Dato: 9/1-74 Sign: H Rein.: 150/400 Sted: -90 Hull nr.: 10027

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	-	0,45	And gr st lys blågrønn massiv, men dagoppsprukket			
	-	2,55	Gr.st lys grønn massiv m/ stadig opptreden.			
	-	5,67	And gr st grønn og svakt oljeaktig på spalte flater. Enkelt tynne py-bånd svært sjeldan Noen uregelmessige ca-årer.			
	-	8,20	Gr st massiv m/ hovedsa grønn og - del py-imp i tynne striper, også i smale bånd Synes noe lignende som „Stringer zone" i gruven Noen py-striper går på kryss og tvers med tydelig påvirkt bekking I alle fall har vi her en meget sur pyroklast	NB		
-	9,20	~~0,70~~				
-	10,53		Tuff. til og begynne med (til 10m) er det en meget uregelmessig pyroklast med en del py-imp, men etter hvert blir det tuff med meget av bånding og mindre py imp.			
	-	12,16	Tuff, meget massiv av and gr.st i størst mende men noe mer basisk og sur i partier. Vag bånding			
	-	16,08	Gr st. grønn meget fin-kornet og massiv men nr opptrukk. Den blir gradvis svak grønn og mer lys grønn.			
-	18,08		Tuff, til a begynne med bån vag uregelmessig og tynn bånding med py Men blir så meget massiv med en del py fremtredet til de bare ledelene, er vesentlig basisk, i overkant.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 8/1-74 Sign: AT Retn.: -90 Sted: 150/4005 Hull nr.: 10.027

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	~	20,18	Grst. fg-k. massiv, mørk grønn, Fører endel epidot i uregel messing partier a bergarten med.			
	~	22.00	Tuff-aktig materiale, bankert og gjennomsved av epidot åre, En del smale, mer sure partier. Uregelmessig			
	~	27,41	Tuff mere regelmessig men stadige skjæfter i kern-stenker og det hele er helt tydelig pyroklastisk eller delvis fint agglomerat. Resten delvis oppknust som ved 24,60-24,75 m.			
	~	29.70	Tuff, blir mer regelmessig og surere, Stadig hvit. Epidot i partier uten at det er mye av. alt hil er ganske agglomeratisk og pyroklastisk			
	~	31.06	Tuff nå av den meget vanlige kjendte type, med vesentlig basisk materiale.			
	~	34,25	Grst svakt lys type forholdevis fg-kk men ikke av de fineste. Meget vag bånding kan også her skjelnes			
	~	36.05	And. grst ganske lys grønn og ikke kun fg. men glassaktig på bruddflater.			
	~	38.20	Tuff som regel ganske vag bånding med vesentlig basisk mat men her og der uregelmessige partier med epidot åre			
	~	39,53	~~Tuff~~ grst lysgrønn, ganske grov massiv og homogen.			
	~	42,90	Tuff meget uregelmessig tildels bergarten med, men delvis			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 9/1-74 Sign: AL Retn.: ÷90 Sted: 150/4005 Hull nr.: 10.027

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			partier mere massiv og vag. Delvis meget oppsprukket og dels tydelig agglomeratisk.			
	~	48,10	Gr.st. i bunnmalm kanskje mer andesittisk. Er mørk grønn og fin. Meget homogen og fører noen grønne tynne kvartsårer på prøve.			
	~	49,0	Tuff av meget dårlig bandet type, basisk.			
	~	50,22	And gr.st. nesten lik gnt over men nå noe lysere grønn. og synes noe glattsaktig på bruddflater. Homogen. Også svakt grovere.			
	~	51,44	Tuff, meget vag, men dog med bedre partier.			
	~	52,21	And gr.st. lys grønn, meget massiv og homogen.			
	~	57,20	Gr.st massiv og homog, grønn fin og mørk grønn kan være andesittisk.			
	~	58,74	And gr.st. lys grønn, grovere middelk. og massiv og homogen. Grønne skarp overgang til:			
	~	60,63	Gr.st mørk grønn og homog. Som over.			
	~	67,44	Gr.st. nå grønn og finkornet, homogen, og massiv. Enkelte py-xx			
	~	68,00	Pyroklast, breksert, og arcgelmessig			
	~	69,28	Tuff, er overgang fra over men nå med vag båndet Basisk Noe pyx			
	~	70,39	Gr.st. grønn, massiv men noe flaking på bruddflater. Fører litt py. Er homog.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 4

Dato: 9/1-74 Sign: ## Retn.: ÷ 90 Sted: 150/4005 Hull nr.: 10.027

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	-	73,16	And. grst. grønn, med noe lyse min (Qtarg). Er noe gjennom vanlig massiv og homogen.			
	-	74,78	Gr st grønn. noe mørke felt og kanskje også her noe svar. Massiv og homogen.			
	-	75,94	Tuff aktig materiale, uregelmessig og oppknust, mye lyse stykker og enkelt epidot			
	-	77,52	Gr.st. lysgrønn noe flekkig massiv og har også enkelte anrygder av vekstlag cc			
	-	81,00	Tuff, i det vesentlige vag lagdeling men desidert noe større partier her og der fra 79,50 - 81 desidert pyroklastisk.			
	-	84,77	Gr st mørk grønn massiv men uregelmessig. Er i partier besatt med epidot-anrygder og epidotårer.			
	-	86,04	And gr st. lysgrønn gansken mild homogen massiv, med gradvis overgang til			
	-	92,63	Gr st. mørk grønn, massiv svakt skimmer på bruddflater (men ikke tuff) Gansken ofte finnes epidot-årer.			
	-	93,00	Tuff. med tydelig lagdeling av epidot-rike mørke bånd			
	-	94,80	Pyroklastisk først rosta vag tuff-lagdeling. Oppknust.			
	-	98,98	And. grst. grønnlig massiv og uregel homogen fin-kk.			
	-	101,79	Tuff, her det meste vag lagdeling, men enkelte 10cm brede uregelige bånd. Basisk som tidl og gradvis overgang til			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 5

Dato: 9/1-73 Sign: AL Retn.: -90 Sted: 1523/4005 Hull nr.: 10.027

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	-	105,64	Gr.sk grønn, fink massiv og meget homogen, dog finns et par små partier med en noe lysere og grovere type.			
	✓	112,27	Tuff, uregelmessig og svakt skif, svare komponenter ligger i matriks av kloritt Sk_p v/10634 = 13° Etter hvert blir båndingen svakere Man kan se, hvor av mer kvart materiale Disse linsene har ofte små runde partikler i midtlighet Mellom linsene klorittrikt materiale Ikke skarp grense mellom linsen og matriks. Enkelte større q-aminoeduler. For det meste vag båndning.	NB		
	-	115,45	Tuff, grønsk massiv med meget vag båndning Er basisk i karakter.			
	-	117.91	Tuff, godt utviklet bånd av svart og basisk stoff om hverandre. Granitt mørkt. Uregelmessig agglomerat-bånd her og der.			
	-	119,24	Gr.sk grønn massiv og fink Homogen			
	-	120,36	And-gr.sk. grov og uregelmessig grønn & gj.snitt av q-årer			
	✓	123,90	Tuff, svak men tydelig båndings linjer stadig basisk materiale er i overvekt. Et par elongert q/gahpis linjer kan sees. Amygdule-opptrer spesielt like ovi finns grove py-xx			
	✓ 124,49	~~124,90~~	Tuff, meget svar og gjennom-vevd av py-årer Fra -90 - 123,90 er det meste massivt og grovt med mye Cpy og ZnS.		123,90 - 124,49	1. prøve

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 9/1-73 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: 150/4005 Hull nr.: 10,027

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	130,33		Tuff, svak båndig, delvis lite synlig, er også noe skf Skf V/126,60 = 13° Imp av py - som enkelte tynne bånd i forbindelse med sum kis. Det hele svart tynnt.			
		131,26	Tuff, massiv og svart lite imp.			
	132,83	~~132,83~~	Tuff, mer unregelmessig og med unregelmessig svak imp av py. Fra 132 mere tydelig agglomeratisk			
		~~133,25~~				
		135,25	Tuff, grønn forelst mesk lyst basisk materiale uten imp. En del små spalter av cc.			
		136,36	Grønt massiv grønn, fink og homogen. Kanskje svak tuff-båndig her også			
		137,41	Andesitt (dacitt). ganske mørk grønn. På bruddflat lys grønn, med grove xx rhom g-åre			
	140,55		Tuff ganske massiv. Her er variasjon mer synlig. Py-imp som skyer og tynne årer, som ofte går i alle retninger.			
		143,13	Tuff, massiv med vag båndig. Meget lite imp. Materialet her kanskje mer basisk.			
	145,27		Tuff. Samme type som ovenfor. Utgjør hoveddelen. Den er lys grønn og ganske grov. Imellom tynnere mørkere basiske bånn Båndinga er svak. Imp opptrer men unregelmessig			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 7

Dato: 9/1-73 Sign: AI Retn.: ÷90 Sted: 150/4005 Hull nr.: 10827

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
✓	147,77		Tuff, lysere mer basisk med svart lite imp men man har et par korte men sterken imp bånd. Svak skf skf V/147,40 - 89			
	✓	154/66	Tuff med svart vag bånding og med mye kloritisk makrobole. Er også svakt skf. Imp opptre men i ubetydelig mengde.			
✓	156.00		Tuff, mer uregel massig mer brekserte partier og med mer imp, men svak.			
✓	157/2		Tuff, kvartsfyrisk, brekset og med grov py imp	NB		
✓	157,92		Tuff flaki og svakt skf. En del imp Tuff massiv men meget svak bånding			
✓	160,-		Lend grøt synes opptre i vesentlig mengde. Svak imp			
✓	161,-		Tuff porn over, men imp ikke noe i mengde. Py-imp er fin og grov om hverandre Ingen cpy. Tuff, massiv. Stedig meget tynn py-imp som også varierer meget i sterkt		160.- 161,-	2 prøv
✓	167.00		Tuff Bånding varierer Noe svakt og det er vesentlig bart mat (Lend grøt) SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1

Dato: 20/1.-24 Sign: [illegible] Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10 028

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,45	Tuff, meget sur variant men med tydelig lagdeling			
	-	2,47	And. gr st, meget fint lett og blågrønn, små q-amygdaler			
	-	2,95	Tuff, ~~sur~~ eller i alle fall pyroklast, med små runde q-fragment og lagdeling.			
	-	4,20	And blågrønn glassaktig hårt på Bruddflate, massiv og finkornet			
	-	12,87	Tuff med tynne lagene av mer leirholdige materialer i en ellers ganske sur masse enkelte q-amygdaler i de sure lagene. Epidot opptrer også som runde korn. Mot slutten mere rustig med mere epidot. Også glimr oppsprukket med slutten.			
	-	13,20	Gr st. Brungrønn, meget tett og finkornet. Er gjennomsatt av tynne stikke med q og er i partier sterkt brekssiert Skarp grense mot			
	-	14,53	Andesittisk lagergang blågrønn kantlige ekter så sur som over men mer dioritisk. Grensen mot grst over = 52°			
	-	21,15	Tuff, meget massiv og hård sur med et ganske klårgrått utseende. Tydelig pyroklastiske strukturer både her og der, ofte i forbindelse med stikk og årer av epidot. And-siltig gr st. utgjør det aller meste av materialet særskilt i områdene 17,20 - 18,00 og 19,00 - 19,60			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 29/1-74 Sign: AT Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10028

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		23,12	And. gr. st. blågrønn felt mørkere, ikke homogen. Noen enkelt gj.-x			
		27,65	Tuff, vandet, svært lavgradig dannelse klorit/epidot-rike. Mot skifer synes klorittisk materiale opptre noe oftere som tilliggere. Skj. V/23,30 - 18°			
		28,43	And.-gr.st. massiv blågrå, en del spetter av klorit og noen gj.-krystaller			
		29,36	Gr.st. grønn noe mørk massiv og finkornet. Kan se enkelte band som synes tuffittiske.			
		31,13	Andesitt, lys grågrønn og glassholdig grønn på bundflater. Er relativt fin og (ikke helt) og massiv. Forøvrig noe karbonater og blir mer blågrå og mer fin-k.			
		33,25	And. gr.st. mørk blågrønn fin-k og massiv. Noen epidot krystaller.			
		37,40	Gr.st. meget finkornet, mørk blålig grønn. meget tett. Endel g.-/epidot årer.			
		38,88	And. gr.st. blågrå, fin-k og homogen. Noen g./ep.-årer. Hittil synes det egentlig å ha vært gradvise overganger mellom de siste massive lavastrømmene.			
		42,37	Tuff, massiv type hvor bandingen er hele veg med dog tydelig forskj. Grønn, Finner noen amygdule i de grønne lagd, ellers en del epidot i de lyseste lagd. Brekkse-1 V/41-42. Slumpe-strukturen			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 29/1-74 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.028

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	~	44,77	Andesitt, lysgrågrønn middelfi-k grønn homogen i masse men blir mørkere i farge innimellom. En del porøse med utgnidde kloritt flak, elongerte sprekke og -mandler. Størrelse 5-8 mm			
	~	45,35	Tuff, men i det vesentligste som over unntatt en del klorittiske bånd. Er det gulgrønn, i stedet klyger.			
	~	46,44	Grst. lysgrønn og mørke tett og finkornet. Det finnes noe tuff materiale			
	~	51,47	Tuff. blir nei mere massivt, men det sees ledd av meget diffus overgang på grensen mellom disse og basiske ledd. Består grønne stenk, med glitrende klorittiske flater Strøk V/46,90 · 26° Innimellom en brunaktig helt keratofyrisk og mere finner her hydrolyse porfyrisk og aggregat-struktur.			
	~	54,15	Basaltisk grst svart, med små runde hvite oppblomster av ca og kanskje noe q. Dessuten grønn finkornet og det synes som oppblomstringene er retnings-orientert til en viss grad. Det finnes også litt mindre utbredte fyn-aggregater.			
	~	60,35	Tuff med skarp grense Grense 39° Tynne hvite (kalk) og grønne bånd (basiske) varsyn.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 4

Dato: 29/1-74 Sign: ÅH Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.028

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprøve	Anmerk.
			Kjørt regelmessig senere mer uregelmessig. Det ser ut som kloritt og rester av kjerne vingat rundt i den ellers finn (Cand. /diac) bergart og gir rundelige former. Brekserte partier er ikke vanlig, heller sjelden g-anmagdet.			
	~	60.98	Andesitt/dacitt, lysegrågrønn fine. grønnlig pr. uregelmessig Rundt g-anmagdet.			
	~	64,24	Tuff, lysgrå pr. Sammen vispete måte som ove.			
	~	66 20	And. grønt. mørke blålig finkornet. har en ny regelmessig klorittrundt anvinq slik at det delvis kan se brekssert ut			
	~	67.37	andesitt. fin-k. lett massiv, lilleliggrønn. Noe oppsmuldret.			
	~	69.00	Tuff bandning i andesitt. bergart. bandene diskret men tydelige.			
	~	71,50	Tuff. meget voldsomme omvekslinger med tynne utskillinger av epidot-belegg.			
	~	72,42	Breksje, med tydelig angulære lag som er brekssert. Det er skarpkantede stykker som er sammenkittet med epidot. I de skarpe skjellene sees små runde g-fragmenter			
	~	73.64	Andesitt lys grågrønn, fink. massiv og homogen, men noe oppsmuldret. Her er det lys grønn feltspat.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 5

Dato: 29/1-74 Sign: AA Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: / 0 028

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		75.00	And grst. mørk blågrønn, massiv og homogen, tett og finkornet. En del meget tynne epidotårer, samt a-amygdaler.			
		75.47	Rhyodacitt lysgrå, noe grønn, meget finn og tett ikke så fin. Epidotårer			
		76.20	And grst mørk blågrønn, massiv, homogen, tett, finkornet En del amygdaler av g/cc.			
		81.82	And. grågrønn. massiv tett og ganske fin homogen men gjennomsatt av tynne epidotårer. Ved 7980 - 80.60 en god del kraftige epidotårer Det synes som denne bergarten er ganske sprø			
		82.95	And grst grønn massiv fin homogen. Har noe gulgrønn på bruddflate og må holde noe epidot			
		84.30	Andesitt i massiv grågrønn homogen, men noe gap-sprukket. også med klorit-fylte "hårstikk" Gradvis overgang over 5cm til			
		85.54	Rhyodacitt grå meget tett og mye g Q-årer tynne Dessuten epidot amygdaler, som synes å en elsket halo Mot lågg er grensen skarp mot			
		90.28	And grst, massiv og fin tett, noe vertuse noe i farven fra Wacket, til grå-blå og mørkegrønn Har en del sprukne men små amygdaler av g, ellers noe andesittiske mot slutten			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 6

Dato: 29/1-24 Sign: [illegible] Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10.028

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	~	90.62	Tett, massiv men sterkt bundet av kloritt/skifer bånd. Sjiolitt av lyst grønt i toppen. Blir plutselig meget grønnt, innholdet synes av py og går gradvis over i den mer grå og dum bergart under. Etter 5cm kommer ny samme rytmiske utvikling	NB		
	~	91.35	Andesitt, grålig, forholdsvis massiv med 1-2mm anrigdelen av q.			
	~	92.00	Breksje av tykk materiale; i en q og epidot grunnmasse flyter kloritt/skifer mer avrundede korn. Har hatt skarpkantet form			
	~	94.47	Andesitt har samme farge kornstørrelse. men det kan sees at det flyter uregelmessige "skyer" av kloritt/skifer materiale i den. Like fullt er det andesitt.			
	~	94.82	Rhyodacitt, grå, mye Qrz fine, tett, med skarpe grenser opp og ned, litt grov py. på sprekker			
	~	96.36	Grst. men den er stedvis brekk. med. En mørke grønn meget tett og finkornet. Synes også homogen bortsett fra enkelte q-årer og anrigdelse.			
	~	97.45	Tuff, massiv hvor grønn farge dominerer og hvor bandingen etterhvert tre tydeligere frem. Blir også mer og mer oppknust og med leirmateriale. Noe grov py finnes.			
		98.38	Kjernetap			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 7

Dato: 29/1-74 Sign: [illegible] Retn.: 490 Sted: Hull nr.: 10.028

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
	✓	99.27	Oppknust av tydelig skj. bergart, hvor kvarts ikke hornbl. spotten synes urent langs det Dette kan vare og tros det er en forskifret gabbro Skj. V/98 60 - 44°	NB		
		99.70	Kvartsåre			
	✓	103,50	Samme bergart men nå mere massiv den er på bredd flate ganske likelig og grønnlig. Ikke. Holder stadig på at dette er en forskifret gabbro:	NB		
	✓	104,28	Tuff, ganske som til å begynne med, synes også å ha store fragmenter av gabbro, men blir så ganske kvartsrik og de klorittiske ledd overtar			
	107,50	~~107,50~~	Tuff stadig ledere lisning, omtrent likt mellom kvarts/kvartsisk, det hele er ganske grovkornet og ganske svakt skj. Skj V/105,30 - 19° Det opptrer imp, meget svak, knyttet til de kvartsrike ledd, som tynne striper av py norm gange opp i den bånd med grov py. Det er av de grovere g-bånd og fragmenter NB kes ellen på opp-kom.			
	108,78	~~109,78~~	Gr.st svakt likelig (kan minne om gabbro over) og føre tynne py-strenger på kryss og tvers.			
	✓	111,68	And. gr.st med usikkelig py imp på samme oppbrudd som gr.st over.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 29/1-74 Sign: [illegible] Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.028

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
~	112,35		And-grøt gjenn svakt flekvis av med py-fint fordelt gjennom det hele.			
~	113,60		Agglomerat hvor stem q-boller (avrundede) flyte i en klorittisk masse. Bollene har en meget tynn kalo med py, ellers synes også en svak imp.			
	~	11520	Grøt grønn, meget tett finkr og homogen. Små q-amygdaler.			
~	116,06		Tuff med vekslende bindning i en noe grov bindning av kvarts og klorsikt. Det er en del imp i forbindelse med kvarts også noe cpy, men meget mye.		115,20 - 116,06	1. prøve.
~	119,73		Tuff massiv og noe som mer på enger måte noe bändet. Finnes her bånd av lys brun Zn S cpy, tynne striper av cpy. Det er ikke store mengder det drevet seg om Zn S bundet til bånd mens cpy er mer impregnert. Biogarten kan godt være et forkvarts agglomerat. Impregnasjonen varierer en god del. Høyest innhold har prøve nr 2. Biogarten er innmellom agglomerat-lagene ond grøt. Selv om impregnasjonen er spredt gjennom hele biogarten er imp høyest i bunnfiden, dermed også i cpy og Zn S i de mere konsentrerte lag.		116,06 - 116,55 116,55 - 117,06 117,06 - 118,00 118,00 - 119,00 119,00 - 119,73	2 —"— 3 —"— 4 —"— 5 —"— 6 —"—

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 9

Dato: 29/1-74 Sign: ÅA Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10 028

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
-	122,92		Grst grønn, svakt flekkig frukt og fåren meget tynn imp i skyen gjennom hele bergarten. Men imp fremtrer også som mm tynne striper på kryss og tvers. Q-amygdaler. Imp lystrin lenne av py			
-	129,60		Tuff, med meget jag bånding og noe mer imp enn tidligere, det vesentligste knyttet til striper. Qv og til kam sees enkelte cpy-korn likesså ZnS-striper Man legger merke til at ZnS dannet det sentrale området i stripen med py på begge sider-kantene. ZnS er også Fe-fattig lysbrun. Tar enkelte prøver for å sjekke at observasjonene er korrekte.	NB	123,90 - 124,69 128,54 - 129,44	7 prøver 8 — " —
	130,73		Grst. lysgrønn, denne ligner mest på en serpentinitt, men er det ikke. En flekki-g(svakt) på bruddflate.			
	-	133,68	Pyrrhotitt er på boroverflate meget lys og generelt hvitspettet. På bruddflate gjennom Har lite q men desto mer feltspat. Små runde q-korn kan sees over alt i liten mengde, tynne klorittrike årer sees som bånd. Py er til stede men i ytterst små mengder. Vanskelig begrunnet men tror det er en gyngold og usikkert at grensen for er det samme.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 30/1-74 Sign: AL Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.028

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
	-	135.80	Grst, massiv grønn tett fin- og homogen. Har tynne striper av gul i svært liten mengde.			
	✓	136.60	Grst skal men heller grovskj krenuleringer pga skj-planer vanlig men en langt mellom dem. Skj 9/136.05 = 179			
✓	140.50	145.56	Tuff med ganske sterk imp. Dette er den største konsentrasjon av svovelkis hittil i dette hullet. Tuff er normalt agglomeratisk, spesielt siste meter, men dette kan komme av den uregelmessighet som imp. opptrer med. Det kan være små kjerner i en kloritisk grunnmasse. Imp. opptrer uregelmessig og det er vanlig pga. man ser, men tynne striper av gul kan ses og disse, kan ligge langs en lagdeling.			
	-	142.09	Grst, mørk klågrønn, meg fin-k. Har tynne gl-striper og noen korte gl-amygdaler.			
	-	142.98	And grst massiv tett mørk grønn.			
	143.84		Tuff krelasjeaktig agglomerat med en ganske sterk imp. vesentlig av gul, men man kan se tynne ZnS striper og noe større gule imp.		143.00 - 143.84	10. — " —
	✓	146.08	And grst grågrønn, massiv og homogen. Er middel-til fin-k. og med bare noen tynne gl-årer.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 11

Dato: 30/1-74 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10.028

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
✓	153.32		Tuff, delvis som elvisk. vekslinger mellom bånd av surt og basisk materiale, men også som bydelige agglomerater hvor selve kalken ligger omgitt av kis og talkskifer. Det hele er omvandlet og delvis skyf. Skyf V/153,40 = 189 Imp opptrer i store og mindre grad, ofte konsentrert i skyfet imp. bånd andre ganger langt mellom båndene og delvis også som skyver. I det vesentligste py som imp, men man kan ofte se sfa kommer også spredt gjennom impen. Videre en ZnS ofte hydrolysert blyholdig mineralet i tynne bånd. Tar ut til analyse for å finne ut hvor den skal være mot Zn-S tilsted. Zn-S er en lys brun og Fe-fattig type. Bergarten kan være og være brekkert flere steder. Så dersom pyroklastisk lag 15e- og ut.		147,00 - 148,00	11. prøve
					149,80 - 151,00	12. -11-
					151,00 - 152,00	13 -11-
					152,00 - 154,00	14. -11-
					154,00 - 155,18	15. -11-
✓	159,50		Nærmest kvartsfyrisk bergart? Her det typiske flakige brunlig grønne skjæret på flatene synes også her pyroklastisk lava er mye mer fint og tetten enn bergart over. Den kan også mangle med py-imp og kan nesten massivt bånd ved 156,50 som kvartsår ut grovk py. Skarpt skf Skf V/159,80 = 11			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 12

Dato: 30/1-74 Sign: [signature] Retn.: +90 Sted: Hull nr.: 10.028

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	161,70		En overgang fra overlagt skif. grønnst. mot flakeig grågrønn og meget fin-k Har en del q-amygdaler og meget fink. imp			
	163,73		Pyroklastisk, av samme type som over men litt mer grønn og svært fattig på opx og Zn-S. Tar en prøve for å se og tar den da det er regnelig opx		161,58 - 162,74	1/2 prøve
	165,07		Den flakeige hovedmassen pyroklastisk bergart, med imp av bare opx			
	167,08		Grønnst. skiferkonglomerat, varierer mellom fin og mye grovere, mørk grønn			
	168,60		Grønnst. grønn, meget fink og massiv. Uregelmessig impregnert av py. Enkelte q-amygdaler.			
	169,73		Pyroklastisk lys grå, noe grønnlig i partier meget tett og massiv. Foren uregelmessig og sterkt imp av fink py			
	171,30		Massiv tuff, hvor det skiftet mellom lysere og mørkere grønne bånd på ca meget diffus måte. Alt er helt vesentlig sterkt og fink. py tilstede SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

4rk 1

Dato: 29/11-73 Sign: A Retn.: ~~60~~ V Sted: ONS · 50 V Hull nr.: 10.029

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1,70	Gr.st. meget ~~skj~~ hvs grønn og med mye epidot/q-åre Bære svært lite cc. Skj V/0,6 = 57° V/1,40 = 56°			
		3,90	Gr.st. noe vekere skj. mørkere grønn og fine mer massiv og homogen Skj V/2,50 = 49° En del epidot - følger utpregelsesvis lagrekkef.			
		7,70	Tuff. Skj grønn hvor det basiske materialet dominerer. En del q- og epidotårer langs lagning og noe oppknust Forvitringssoner.			
		8,90	And. gr.st. meget massiv grønnlig på bruddflate. Funk. homogen i mer gj. snitt av q- og epidotårer.			
	~~9,10~~		Tuff. marmrt blandet grønne lys grønn med tynne py-striper som følger lagdelingen. Det hele er meget skj. Skj. V/9,80 = 42°		8,90 - 10,17	1. prøve
		~~10,70~~	and. grst. blandet grønn grå. mørk grønn massiv med tynne q- og ep.-årer			
		11,92	Tuff. grønn ~~massiv~~ med også lys lagdeling skj. Basisk materiale dominerer.			
	16,00		Imp er meget uregelmessig og tuffe veksler også noe i mer massive bånd. Synes ikke være noe opp til stede.		10,31 - 11,10	2. -"-
					11,70 - 13,00	3. -"-
					13,00 - 16,00	4. -"-
	~~15,70~~	~~15,10~~	And. gr.st. Mørk grønn massiv med og homogen.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 29/11 - 73 Sign: AT Retn.: ÷50°V Sted: ONS - 50 V Hull nr.: 10.029

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		19,30	Tuff, ganske massiv, me- lydelig likt. Basisk materiale dominer. Skf v/19,50 = 56°			
		19.90	And. grst. kom over massiv og mørk grønn, me- gjsatt av tynne ep. og gjæ-			
		20,95	Tuff massiv, ganske mørk grønn og hvor basisk ledd dominerer. Bare svakt skf.			
		22,06	Gr.st mørk grønn, meget massiv og fink. Er en del oppknust.			
		25 35	Tuff meget massiv av samme type som over. er del oppknust siste ½ m.			
		26,35	Gr.st. mørk grønn meget finkornet. og homogen.			
		28.30	Tuff, ganske markert båndet. Hvor de mye lag har mørk grå blå farge. En skf. Skf v/27,80 = 52°			
		31,65	Gr.st. grønn, massiv og homogen ganske fink. Oppknust i partier.			
		32.27	Tuff. meget messig og meget oppknust.			
		33.00	Gr.st. grønn, meget massiv og ganske fink. ~~---~~ ~~grønn~~, andesittisk nå			
		34,30	Kjerne tap			
		36,05	And gr.st. lys overflate grålig skje og meget tett. Endel grønn			
			Meget skarp grense til underliggende			
		37,30	Gr.st. grønn meget fink og massiv			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 24/10-73 Sign: AJ Retn.: +359 V Sted: ONS-50V Hull nr.: 10.029

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprøve	Anmerk.
			Man finner noen få åårer med q-årg cc. Skarp grense mot			
		38,50	Andesitt grønt meget massiv grågrønn			
		44,20	Grønt massiv porfyrisk andesitisk dommetype også. En del kraftig q-årer mot 40 m.			
		46,70	Tuff, med meget diffuse lyser. Det aller meste av basalt materiale.			
		47,00	Kjerne tap			
		49,65	Tuff som over skift. Skift V/48,60 - 58°			
		50,00	Kjerne tap SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1

Dato: 29/4-73 Sign: A Retn.: -90 Sted: ONS-SØV Hull nr.: 10.030

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.47	Grst meget skf. i 2-ører har også svake tuffitisk preg.			
		0.70	Kjernetap			
		1.60	Tuff. grønne tynde linser bundet av en del skf. Basiske dominerer. Skf V/0,95° = 118			
		2.95	Grst synes også ha et visst tuff. preg og er svakt skf. lyd grønn.			
		4.75	Tuff er svakt skf hele veien fra et par kraftige sone 5-ån bånd med py-imp Skf V/4,50 = 85			
		6.80	Tuff mere massive typer, mørkere grønn og de øvre lag en mørke grågrønne. Sterke gjennomsatt av g- og noen epidotårer			
		8.83	Lind grst. meget massiv mørk grønn med et noe lilaktig skjær.			
	10.32		Tuff med noe pyro-klastisk materiale i bånd Også en bånding av py-imp, helt uten epy. Imp er meget uregelmessig			
		11.85	Tuff i som over men her uten imp. Svart lys grønn i farven. Svakte skf Skf V/10,90 = 15°			
	14.70		Tuff igjen med meget svake py-imp i bånd. og svært oppsalt.			
		20.70	Tuff. mer som normal type med jevnt vekslende bånding. Det kom ledd like etter ingen noe mer forandringer og bergarten mer massiv			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

A-k2

Dato: 29/11-73 Sign: A Retn.: - 90 Sted: ONS - SØV Hull nr.: 10.030

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		21,25	Grsh grøn massiv og hard			
		25,95	Tuff, grønn massiv meg mørkt veg bånding			
		26,85	Amf grsh, stadig mørk massiv og homogen ~~ubo~~			
			~~Kjernetap~~			
		27,05	Tuff som over			
		27,39	Kjernetap			
		29,30	Tuff grøn med mørk veg bånding, mest basisk materiale			
		32,10	Tuff stadig, men nå med markert bånding			
		32,71	Kjerne tap			
		34,25	Tuff, men nå med mørk og nærmest en serpentinert grsh.			
		35,50	Grsh, massiv mørk grønn og homogen SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1.

Dato: 26/11-73 Sign: A Retn.: -90 Sted: 3N - 122V Hull nr.: 10.03

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.90	Grst lysgrønn skf, ofte g-are. norm. spredt årer. Fra 1,20 til skifte meget oppsprukket, fyldig stengt med kvarts.			
		3,05	Grst tynne striper av en kalk-åre langs begge.			
		3.80	Kjerne tap			
		4,85	Grønn som over er gangbergart og mer oppsprukket langs lagflate			
		~~4,85~~ 5,50				
		5,50	Grønn, noe lys eller enkelt Cc-striping enkelte tynne py-årer			
	5,79		Sterk imp av grønske grove Py i en g-rik grålig bergart		5,50-5,79	1 prøve
		6,22	Grønsten oppsprukket grønnst. som over skf.			
	13,04		Brunlet impregnation som veksler i styrke. Ofte i en klorittisk bergart med god skf. Skf 1/6.40 - 12°		6,22 - 7,00	2 -11-
					7,00 - 8,00	3 -1-
					8,00 - 9,00	4 -11-
					9,00 - 11,00	5 -11-
			Cpy-klyser opptrer spredt men er hele tiden tilstede spesielt der bergart blir mer sur. I partier tett med g-årer/nydeler. Py-xx som regel grove. I enkelte bånd neste		11,00 - 13,04	6 -11-
13,58			massiv malm. meget fin. Gjennomsatt av enkelt bånd med grønn py og cpy. Skarp grense til overliggende lys-rik båndet imp		13,04 - 13,58	7 -11-
	14,28		Gradvis overgang til sterk imp i begge, men gir over til massivt bånd før å avsluttes i klorittisk bergart med båndet py-imp		13,58 - 14,28	8 -11-
		15,00	Grst grønn gavik bergart til å begynne med noe cc-striper.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 26/11-73 Sign: AL Retn.: ÷90 Sted: 3N-127V Hull nr.: 10,081

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		23,60	Gr.st. massiv, grønn-, svart-gått hvitaktig massiv amygdaloidisk, tildels av og svakt tuffaktig preg her og der.			
		24,75	Gr.st. som over men nå med en del småfoldet epidot-åres.			
		30,10	Tuff grønn massiv, men varmest blåaktig her lag mens de lyseste er endel epidotrike. Ved 25,20 to gangs bånd hver på 5cm. Svært klorittholdig. Skj V/29,20°m = 9°			
		30,30	Andesitt (ish grønn) massiv blågrå med 2 åre Hornsp.			
		39,00	Tuff massiv type, med lite dioritt svart og hvitaktig.			
		3,9,80	Grønt massiv type, men også her noen ellipsoidisk av tuff			
		40,75	Tuff som over. SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 7

Dato: 3/2-85 Sign: -H- Retn.: -90 Sted: 50V/930 Hull nr.: 10-032

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	-	3,70	Tuff massiv med mørk matrix veksling i lyse grønne klastiske og grå-blå, sure bånd. De siste har noen amygdaler. Dessuten er det tydelig at det er snakk om fragment. Agglomerat.			
	-	4,55	Grønt mørk grønn massiv med noen sure spetter, fine.			
	-	7,40	Tuff. meget uregelmessig og kalles generelt pyroklastisk med noe q-materiale, i noen. Dessuten en del magnetisk gnask oppfred			
	-	8,35	Grønt igjen som over-			
	-	13,30	Tuff, massiv, men nå en del mer vage og brede bånd, her og der meget merkbart mer basisk bånd. Vesentlig surere.			
	-	15,-	Grønt massiv grønn fint og forholdsvis homogen. Noen lite bånd over En par vage antyder til bånd. Er antagelig en del av det tuff-lag vi har hatt.			
	✓	26,95	Tuff. meget merkant av de helt typiske. Grønne mer tynne bånd skiftes med noe brede sure bånd. Det er absolutt lagdeling, men enkelte stuff (18m) er det mer fragment materiale, noe oppsprukket			
	✓	28,53	Agglomerat som lag i tuffen meget uregelmessig brekkuert og rotete.			
	✓	35,20	Tuff av samme uregelmessige type som ovenfor. Enkelte bånd noe brekket, og noe epidotisert			
	✓	37,-	Breksje av tuff, en del magnetisk materiale i blandet			
	✓	38,21	Tuff av samme uregelmessig type som over			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

4-12

Dato: 3/2-75 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: SDV/9855 Hull nr.: 10.032

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	41,36	Tuff: Lerdeles massiv og meget sagt båndet. Det skifte mellom andesitt og grst.			
	✓	42,35	Tuff. mer båndet type med noen fragmenter.			
	✓	45.46	And. grst. grønngrå meget massiv og homogen. Finkr. Et parti med porfyrisk og spredt-fylling av q og kl.			
	✓	46,33	Tuff. med klarit utvisket og med q-årekstybelser. Porfyrisk?			
	✓	48,18	And. grst massiv og meget finkr grønngrå. Antydning til overgang med grst.			
	✓	49,45	Gr.st lys grønn svakt skif og lysgrønn-f-farbeig. Har stort innhold av cc. som ligger langs skif-planer. Skf ∨/49.30 = 225			
	✓	51,21	Tuff. grønn meget tynn båndet og skif. Er svakt magnetisk.			
	✓	53,45	Grst. lys grønn som over med skif og cc-innhold flekkis og karakteristisk. cc-innholdet veksle og spettinger skuglen ikke have cc.			
	✓	54,98	Tuff. massiv og svakt mm tydelig båndet. Normal type.			
	✓	56,86	Gr.st skif. cc-rik som over. Mot skuffen oppstrø de som kalkgrst. i ligge. Skf ∨/56.10 = 49			
	✓	63,35	Tuff, svakt skif noe oppknust og grønn. Lave svakt og sjeldent båndet parti e grønn diffuse.			
	✓	64,16	Pyroklastisk grønt materiale med diskrs q-amygdaler. Og unegelmessig og småfolded lebrit materiale.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3 av 4

Dato: 3/2-75 Sign: [illegible] Retn.: -90 Sted: 50V/905 Hull nr.: 10.032

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	~	69,95	Tuff igjen svak sbl og dårlig massiv, ganske lavde men fjelden bånd Skj V/66,40 - 169			
	~	70,70	Gr.st massiv blågrønn (svartlig) meget fin og homogen. Noen hvite striper m/cc.			
	~	72,68	And. blågrå massiv meget tett og fin. Har noen q-årer og klorit-åre. Enkelte py-xx			
	~ 73,13		Tuff meget mer (keratofyr. og evt noen av det klorit-utviskende og mer rene q-partier (er ikke av typisk and) svakt mine av py			
	~	76,70	Dacitt And mørk blå meget tett og fin. og hard. Noe oppsprukket. Særdeles massiv og homogen.			
	~	78,58	Gr.st. basaltisk glinsende svart, massiv fin. Synes å være amf-rik. En del små Cc-lin spetter. Denne fø ellers hard cc men fin fordelt og ikke konsentrert i SiO_2.			
	~	79,52	And. litt meget mørk blå, mørk svart og lignende denne overgang fra basalt over.			
	~	84,45	Dacitt (rhyolitt) meget tett og fin. homogen mørk blå. Meg vanlige fjelden lignende q-åre			
	~	86,70	Gr.st. svakt skj. svartblå og meget fin. Skj V/85,50 - 21°			
	~	87,41	Dacitt av samme fine type som over.			
	~	91,52	Gr.st meget mørk grønn, meget fin og delv svært homogen. Men har lagn til bånd her og der. Enkelte lange feltsp. kan sees. Ikke oppsprukket.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

4-k 4

Dato: 3/2-75 Sign: AH Retn.: ÷9 o Sted: SDV/9505 Hull nr.: 10.032

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
	✓	96.77	Tuff, massiv og grønt veksiende med lysgrønne bånder og noe grålig sone bånd. Noe oppknust.			
	✓	101.60	Tuff, skif. og ellers av samme type som ov. Skif ⁴/₉₈ 20° 29			
	✓	106.20	Tuff, massiv mørk blågrøn type, diffust båndet og er av en annen type tuff en vanlig men tydelig å se vekslingen.			
		108,56	Tuff massiv men mye oppsprukket og knust. Må sluttes mere agglomeratet hvor man kan se store fragmenter som er kvartsførende i klorittgrønn masse.			
	✓	109.60	Dacitt blåsort meget fint og homogen			
	✓	113.23	Rhyolitt-tuff meget stor og stor grønn masse og store svarte fragmenter. Dessuten klorittskyer innblandet. Små runde fragment eller lapilli Disse kan vare strukket ut i linse.			
	✓	114,15	Dacitt av samme mørke og fine type som ov.			
	✓	116,46	Grønt mørk grønn massiv og fin. Antyder til lysere bånd diffuse.			
			Hele serien i det siste har vært karakteristisk mørk i farge og fint.			
	✓	117,45	Tuff, sterkt båndet og finkornet svakt skif. i grønlig c.c-matrise. Skif ⁴/₁₁₇.₃₀ - 26°			

4-25

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 3/2-75 Sign: AL Retn.: ÷90 Sted: 6201/9503 Hull nr.: 10-032

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	124,00	Grst massiv grønn, ikke så mørk som det har vært lett og fin. Svak anhydritt bånding her og der			
	✓	124,35	Rhyolitt-tuff, meget sur bare med noe lysere kloritt-bånd Destruert sure fragmenter og noe grov py-xx. Oppknust			
	✓	126,35	And grst mørk grønnlig meget fin Noe oppknust, men gansk homogen.			
	✓	129,90	Grst mørk grønn (meste sort) med karakteristisk 1-2 mm store cc-flekker. Svake anhydritt-bånd mange steder. Stedvis oppsprukket- og knust.			
	✓	131,25	Andesitt tildels mørk meget lett og fin. Er noe oppsprukket.			
	✓	133,60	Grst grønn fin. men hårfleldet og holder mye cc.			
	✓	135,80	Tuff, vekslende mellom massiv sur og basisk bånd. Noe oppknust			
	✓	138,55	Grsh gansk mørk grønn fin. Og lett (men ikke så fin. som tidligere) Karakterisert av en masse 1-2 mm cc-amygd. Også tendens til svak bånding Tuffittisk og karbonat begge av samme type som over. Tydelig at partier er sammen sydet, men det hele er gansk massivt. Mot slutt blir det særdeles klart at det her er en lavastrøm.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 6

Dato: 4/2-25 Sign: Retn.: -90 Sted: 502/9005 Hull nr.: 10.031

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		141,44	Lysgrønn og hvitaktig D.a svakt skif. Kan vær en meget grovkl gabbro	NB.		
			Tover noen lyse stikk m/cc.			
	✓	145,46	Tuff, massiv med tydelige ekv. brede lys/basisk bånd. Mot slutten mer lys og brekkasert.			
	✓	147,03	Grst. massiv grønnblå og fin. Gamle homogen m/noen stikk			
	✓	148,80	Tuff gansk mørk grå blå lysere med brede lys bånd De basiske bånd er cc-spettet. Noe oppknust.			
	✓	149,48	Dacitt, grå blå meget massiv og meget fin. Homogen.			
	✓	153,33	Kalkgrst lysgrønn, cc lang skif plan. Grønn skif. Homogen og svart lite utviklinger i lyssone. Forøvrig seg mere og er i tvil om det delvis kan være gabbro i forskifret stand. Skif ⁄/149,60 • 15°			
	✓	154,70	Bergart svært lik den over men er ikke så kalkrik. Cc på sprekker. På bruddflate ligner det mer på gabbro kan være gabbro	NB.		
	✓	155,08	Ank grst, grønnblå fin og massiv men en del uregelmessig			
	✓	155,40	Blåkvarts, meget tett og fin. Mørke skiferstriper. Noen cm tykke flater med klorittbelegg			
	✓	157,15	Ank grst. massiv grønnblå og ganske fin. Litt uregelmessig og noe kvarts pr.			
	✓	162,10	Grst grønn massiv og svakt flatekis. Enkelt py-årer Svakt bøyelse til bånding mot slutten.			
	✓	163,85	Rhyolitt eller blåkvarts. Meget blågrå og fin. Homogen Store kluser m/grove py.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 4/2-75 Sign: ⁄⁄ Retn.: ÷90 Sted: 502/9005 Hull nr.: 10.032

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
	✓	165,93	And gr-st. grønn lett og massiv, fin-k. Ikke egentlig gl-sseliq på flaker men kan se enkelte feltisp-lameller.			
	✓	166,60	Tuff massiv grønn og bare basisk mat. Er pyro-klastisk i sin oppbygging			
	✓	168,34	And gr-st. av samme type som over ell. mer gr-st. dikte			
	✓	168,95	Pyroklastisk og basisk som over. Gradvis overgang til			
	✓	169,35	Blåkvarts (rhyolitt) som vist med grønt py-xx i belyst. Fargen er blåfiolett og meget fin-k. Kvartsen er egentlig et kvarts i tuffen. Her en gradvis overgang til underliggende Gr-st massiv grønn og fin-k. Antyder til brudd-s. Noe brekasjert			
	✓	174,38	Tuff massiv og skifrig mellom vekslende brudd-s og sonen med basisk pyroklastiske materiale. Er gradvis opptatt fra 171,50			
	✓	176,04	Gr-st massiv grønn og relativt fin-k. Homogen			
	✓	177,20	Tuff av type grønn, pyrokl. basisk materiale.			
	✓	178,25	Tuff, massiv mørk grønn vekslende basisk mer lyslig brudd-s			
	✓	179,05	Tuff, lys grønn og uregel-messig			
	✓	179,55	Kalkgrst eventuelt preget gabbro meget rik på cc. Ikke sikkert som den typiske type			
	✓	181,90	Tuff massiv meget diffus i bindingen Ca-rik mot slutten			
	✓	182,97	Andesitt massiv grågrønn, men noe vekslende. En del epidot opptre-			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Akt 8

Dato: 4/2-25 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: 500 / 1900 S Hull nr.: 10.03c

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	~	184,50	Grabbro, lys grønn massiv men svakt prasset. Er noen masse i midten. Foren lit Cc og større epidot-korn.	NB		
	~	189,13	Dacitt/Rhyolitt, meget massiv og homogen til å begynne med Blåfiolett i farge, men i tynn riving i kalle dette blåkvarts. Er meget fin. Bør nok ha „flaket" på bruddflate mot slutten.			
	~	192,27	Egentlig samme bergart som ovenfor, men den har nå vært til blanding av klorittisk - materiale og er i tynn rev lengre Derfor „flakingen" Kan kalles Rhyolitt - tuff. Vanskelig å si hvorfra den skal regnes opp	NB.		
	~	193,25	Tuff, massiv av normal type med skarpe og lysegrå vekslinger mellom klorittisk. Vesentlig svart.			
	~	194,05	Grå massiv men lysgrønn tendens til spaltning. Kan være prasset quartzbro	NB.		
		194,85	Pyroklastisk urygelig materiale i det vesentligste svart.			
	~	195,90	And. = mørk blågrå grønn fin og homogen.			
	~	196,70	And grå st. massiv grønn og homogen.			
	~	198,05	Dacitt, massiv blågrå homogen og tett Gansk fin. Foren noe epidot prøvehull			
	~	199,90	And-grå st. massiv mørk blågrønn meget tett og fin. Ikke epidot			
	~	200,60	Andesitt lysere blågrå massiv tett og fin. Litt oppkrem Foren enkelte store pyr-xx i blyser og uregelmessige sprekker			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 4/2-75 Sign: AI Retn.: 290 Sted: 500/9005 Hull nr.: 10.032

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
	✓	204,45	Tuff, massiv og lydelig bandet, men meget inregelmessig Epidot opptre i bånd, knoller og klynger. Ganske hurt først skrive mer basisk. Opplenved til å begynne med.			
	✓	207,00	Tuff, meget massiv og mye mer diffust båndet. En ikke lenger klarlig linse svart like å se av pyroksen. Strukturen.			
	–	209,45	Gr.st massiv grønn og fint homogen.			
	✓	209,90	Tuffe, massiv men med tydelige bånd			
	✓	214,00	Gr.st massiv og fint som over.			
	✓	215,15	Tuff, massiv grønn, og dårlig med tydelig båndet Ellers diffus Noe epidot her og der.			
	✓	223,50	Gr.st massiv mørk grønn Meget homogen og tett. En grønn fint. Kan se antydning til båndet her og der men ellers tett homogen. Et par soner pyroksenfels. Spredte epidot-korn.			
	•	225,43	Tuff, meget massiv type med lave ~~lag~~ lag og sjelden båndet			
	✓	228,50	And.gr.st. grønn meget massiv tett og homogen			
	•	233,58	Tuff, massiv grønn og vag. Det er nesten så man burde kalle den amfibolitt-st men den har noen mm felsittrik og ep bånd samt fragment av skifer			
	✓	235,15	Gr.st mørk blågrønn meget flekket men massiv Er tett og homogen			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 10

Dato: 4/2-75 Sign: A Retn.: 490 Sted: 500/900S Hull nr.: 10.032

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	-	243,65	Amf grst massiv grønn, meget svakt glassaktig opptrn på bruddflate. Er tett og heller fin. Har enkelte variasjoner til mer grove typer men er i det vesentlige ganske homogen. Her og der sprekker gy-xx			
	✓	246,58	Tuff, meget svakt skift i de basale partier. Er vag i håndstykket. Skift ⊻/244,10 - 80°			
			Noe epidot og soner som er små pyrobitthet. Er i det vesentlige ensartet sur tuff.			
	✓	249,60	Amf. grst middelskr. til fin. meget tett og massiv. Grønn til blågrønn. Varierer noe. Noe ep.			
	✓	252,35	Bergarten blir igjen meget svakt tuffittisk. Er massiv, og i sammensetning amf til amf grst			
	✓	254,80	Amf massiv grågrønn og fin			
	✓	258,54	Amf. grst massiv mørk blå grønn meget tett og fin. Noe variasjon i bruddet. Epidot er i partier ganske rikelig			
		259,00	Tuffaktig avsnitt med noe pyrobl. osv.			
		259,35	Amf grst. massiv grønn tett og homogen med noe ep i tynne årer, desuten fintfordelt i SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1

Dato: 14/3-75 Sign: AL Retn.: +90 Sted: 4506/5005 Hull nr.: 10.033

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓ ✓	0.47	Rud gest grønn, massiv rom oppbyg med en god del ep-årer			
	✓ ✓	2.53	Blandl pyrokl og rent Tuff bånd-s, meget brukket Dersk oppknust. mye epidot i knollen og åren. Tydelig dagsone forvitring			
	✓ ✓	8.67	Tuff, en aggl lys grønn flakig gr.st med spetter av kloritt, svært uregelmessig delv oppknust, og særdeles mye ep-årer. Er nok pyrokl			
	✓ ✓	9.27	Gr st meget grønn og klorittisk flakig og her små klyse av ep.			
	✓ ✓	17.67	Tuff, blir eller hvert mer "rolig" og regelmessig. Markert svart bånd med mye ep-årer Brutte bånd Stadig lys grønn og noen små brekkje-partier med mye ep Noen py-korn finnes hist og her Dl er en and tuff.			
	✓ ✓	19.63	Tuff, mørkere grønn med agglomeratisk utvikling, stadig bar type			
	✓ ✓	21.90	Tuff, mye mer uregelmessig bånding og mer basisk. Foren en del py i striper og tynne bånd, men svake som ingt			
	✓ ✓	24.40	Gr st massiv grønn lys grønn grønlig grønn kornet, mulegens noe flakig, synes ha noe ep men også en del glassklare q-amygd.			
	✓ ✓	25.68	Tuff, massiv grønn og usikkelig basisk, med tynne svarte bånd Noen py-grusker her og der			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

AK2

Dato: 14/3-75 Sign: AL Retn.: -90 Sted: 4506/5005 Hull nr.: 10033

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
	✓ ✓	27,50	Gr-st. lys grønn lit flekig og noe grov			
	✓ ✓	32,70	Tuff, massiv Sur hi a degnme med noe mer blank kvarts Det finnes noe tynne imp-soner av pyr her og der.			
	✓ ✓	33,77	Gr-st. grønn, massiv finkornet og homogen. Med tynne q-årer			
	✓ ✓	35,55	Tuff. massiv grønn-grå, av type med enkelte pyr-årer meget tynnt			
	✓ ✓	37,05	Gr st massiv grønn, finkornet og meget homogen Tynne kvarts ep-årer			
	✓ ✓	38,13	Tuff, meget forbrecciert med kantige q-korn og mulig bruddstykker av lagdelt materiale			
	✓ ✓	41,28 ~~41,30~~	And gr st, mørk grønn massiv finkornet, og svakt glassaktig på bruddflate. Tynne ep-årer 2-3 tynne klorittiske bånd imellom.			
	✓ ✓	46,20	Tuff, bergarten er i det vesentligste and, men finner nå gulgrønne ep-rike bånd som er uregelmessig og ofte tynne. Synes som en del svakt magnetiske bånd som lydelig er spaltet og skyldes av tendens til kjemisk sedimentasjon.			
	✓ ✓	47,06	Tuff, er nå noe grønnaktig og grønt, noe skifrig med tynne klorittbånd			
	✓ ✓	47,93	Lys grønn, ganske grovkornet homogen Kan være finkornet gabbro	NB.		
	✓ ✓	48,92	Tuff, brekcje grønn, tendens til and tynne bånd av klorit veiter sammen bergarten			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 17/3-75 Sign: H Retn.: ~90 Sted: 4505/5005 Hull nr.: 10.033

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	52,86	Tuff, mørk grønn med uregelmessige svart partier med agglomeratiske partier. Mot slutten her dette noe mer og mer cc-striper			
✓✓	55,32	~~55,52~~	Tuff, massiv men delvis uregelmessig med brekkje og agglomeratiske ~~brekkje~~. Sulfider opptrer i små flekker og uregelmessig linser. Tydelig fra gel-strukturer.			
	✓✓	58,60	Tuff massiv grønnblå, i det vesentlige uten, med linser svart kloritthelle bånd	—	Oppstrukturer	
	✓✓	60,07	Tuff, svart kloritthelle og bandet, meget tydelig pyritkel. Er grønn og delvis ikke Foran meget tynne py-striper her og de som gel-avleiringer Skf ✓/58,60 = 18%			
	✓	64,05	And-gest. grønn, massiv og tuller forkommet. Foran noen tynne py-årer. Her også en del tuff-bånd, noe svart tynne.			
	✓✓	65,13	Tuff, meget skarbet brandet med tuller svare dioritthelle bånd sammen med meget kloritthelle.			
	✓✓	67,10	And gest. massiv i mørk grønn, relativt middelsk og tynne py-striper. homogen			
	✓✓	68,52	Tuff, massiv grønnblå, med noen tynne bånding, men hvor det svare bånd er mest fremtredende			
	✓✓	69,40	And-gest. av samme type som over			
	✓✓	70,17	Grabbro, gamske lys grønn meget massiv og middels-kornet. Sorte mineraler i svart små	NB		

fjellovers
Cpl

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 4

Dato: 17/3-75 Sign: AT Retn.: -90 Sted: 4500/5005 Hull nr.: 10.033

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	72,83	Tuff, massiv grønngrå med noen skifring av bånd. Ideet vekslinge kont.			
	✓✓	73,73	Ånd grønnlig massiv fin-k og e- mest homogen, skiftn bandinge mye over til and grå.			
	✓✓	77,14	Tuff, massiv med lam mørk fin skarpe kloritthiske bånd.			
	✓	79,42	Gr st. massiv grønn-grå fin-k. Meget homogen.			
	✓	83,97	Tuff, massiv mørk grøn, med flekker og strimler med klorit. tydelig med bøying her og der. Grove py-xx spredt rundt. Fra 81-82 m en del store sen fragmenter i den grønne matriks.			
	✓	84,74	Gr st lysgrønn massiv med gjennom grove korn som blir grovere etter hvert.			
	✓	86,01	Tuff, meget svakt nissig og svakt mørke grønn, med soner spredte av ca og forøvrig svakt uregelmessig.			
	✓	87,75	Dacitt, lys gråbrun, meget massiv og grov med fine strukturer. Ch. par steder finnes en del spredt kloritthisk materiale og, det e mulig det ville vær riktig å kalle borgent keratofyr.			
	✓	92,93	Rhyolitt, lys blågrå, særdeles fin-k og glassholdig p.g.a riktig g. Gjennomsatt av sp-årer og noe oppknuste. Nærmest å kalle blåbærts, men ikke mag. Den varierer mye mot slutten og blir mere grålig, men er hele tiden minst fin-k grus, nærmest kerratrithiske.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arks.

Dato: 18/3-75 Sign: AA Retn.: -90 Sted: 450Ø/600S Hull nr.: 10.033

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	93,74	Dacitt, lysgrå/blå meget fin en del skiferdt i samlet sprekk- som er grønnfylt, en del lysere dels foldede og -åver. Kloritt- skifer finnes. Dessuten noe py- korn her og der.			
	✓	94,80	Rhyolitt, massiv, gråhvit, meget sur, lett og fin-kornet som en kvartsitt. Uten tvil det er mye py-a-n, også noe sfærolitt mineralt. Kan være Devonsjikt og skyld sammen Her kryssende py-årganger, meget små sfærolitt mineralt.			
	✓	95,27	Tuff, meget sur lysgrønn fin-kornet, men med kloritiske bånd og sure fragm. (Rhyolitt-tuff)			
	✓	98,24	Dacitt, lys grå/blå meget fin-kornet og kvartsittisk. Er også meget homogen. Finner bare flekker av mørk kloritt, dessuten kun små årganger av py.			
	✓	99,30	Tuff som er bombetypisk, kan se små-bollet fragment i typen bånd veksler med dårlig kloritiske bånd, er mulig også litt mer kloritt etter- hvert. Og det er en gradvis overgang til			
	✓	100,02	Pyroklastisk, alternativ av surt og mørkt grønnt kloritisk materiale. Er nok litt Skef ✓/99,50: 20°			
			Dels agglomeratisk, med felt med små bolle, dels krystall dessuten større runde bolle. Bolle er surt og også en del py-korn sammen med surt, men opptrer også sammen med kloritisk			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 6

Dato: 18/3-75 Sign: ol Retn.: -90 Sted: 4500/5003 Hull nr.: 10.033

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓✓	101.85	Tuff (dacitt-tuff), massiv grågrønn, hvor klorit er „visket" inn i det som materialet som både består av bånd, små bobler og større fragmenter. Py-korn finnes sammen med grønt materiale.			
	✓✓	103.90	Dacitt, tett massiv og homogen til å begynne med, men blir kavitetsrik mot slutten. Er grønn i farge.			
	✓✓	104.80	Tuff, som til å begynne med er lysgrå stål og betegnes som krystallrik. Denne har en del klorit langs lagdeling. Blir etter hvert mer lekvirbit og agglomeratisk med små bobler. Stål V/103,95 - 249			
	✓✓	107,00	Tuff, andesittisk som blir finere eller hvert er grå i farge. Mye sprekker som er fylt sammen med lyse stikk av mørk (svart) klorit. Til og begynne med grønne agglomeratisk med store bobler. Er typisk pyroklastisk.			
	✓✓	109.80	Dacitt, varierer mer i farge fra lilla grå til grågrønn. Er tett og massiv og lite krystallinsk. Glassaktig hvit på bruddflater. Klorit i enkelte flekker. Oppknust siste ½-meter.			
	✓	114,00	Tuff, meget finn hyp. Det er ikke sikkert det er tuff engang. Agglomeratiske bobler som er meget store og hvite liggen i en grå fin grunnmasse. Dessuten små hvite g-aggregater her og der ugjennomsprekt utover. Kan være en flow hvor det er sandet nede			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 7.

Dato: 13-7- Sign: Retn.: ↓ Sted: 4500/5005 Hull nr.: 10 033

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			noen svarte fragmenter. Dessuten gangstein rikelig med meget grove striper som er «laget» med mørke kloritt.			
	✓	115,-	Dacitt, som er grålilla, tett og fin. Er mer omdannet i begynnelsen og mot slutt.			
	✓✓	116,31	Tuff, mørk grønnaktig skifrig med uregelmessige variasjoner i klorittgehalt. Striper med rød hematitt. Dessuten små Cc-amygdaler. Skifrighet ↓ 116,27 - 24°			
	✓✓	116,80	Grønn (tuff) lys grønn og flekkvis er mye oppblandet med sand og er derfor tuff			
	✓✓	117,80	Grønn mørk blågrønn, uregelmessig rutete men massiv. Er oppknust og har mye fremmedmateriale med seg			
	✓✓	119,00	Grønn tuff meget finkornet, tett og massiv, mørk blågrønn. En del klorittflekker her og der. Bånd av endel mørkere blått med litt uregelmessig, sammen med ca på grensen. Små kvartsårer her og der.			
	✓✓	120,60	Grønn mørk blågrønn, fin tett og massiv. Må være en overgang fra ovenfor som er samme slags, men her uten fragmenter. Er litt glassaktig grønn på brudd flater.			
	✓✓	122,92	Dacitt, massiv grålilla, ganske lys, tett og fin. Delvis kvartsittiske. Hvitgrønn på brudd flater. Er nye oppknust til å begynne med. Små uregelmessig grønn-aktige med størrelse 1-3 mm			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 15/3-75 Sign: ⊣ Retn.: -90 Sted: 4500/5005 Hull nr.: 10 033

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	123,74	Gr.sl. grønske mørk grønn, finkl og svakt skif. Har et par tynne pyroklastiske bånd Skif V/123,30 = 8°		Kvartsåre. Hull.	
			Meget skarp grense til neste lys. Grense 123,74 = 33°			
	✓	125,11	Rhyolitt, lysgrå/hvit til grønn meget finkl og tett. Har epi- skrift og årer. Ved 124,82 - 124,94 er det et bånn med gr.st og tynne py-linser.	NB		
	✓	126,32	Dacitt, ~~lys~~ grønnlig hvit, meget tett og finkl. Homogen, ser ikke lagdannet. Små q-amygd finnes			
	✓	127,18	Andr. mørk grønn, massiv middelskornet, med tynne ep- årer og enkelte py-korn ikke ee i grunnmassen. Har en skarp men uregelmessig grense mot under. Dette tyder på at bergarten ligger rett vei opp	NB (fig. dagbok)		
	✓	128,18	Dacitt, mørk- lysgrå/hvit, finkl glassaktig, hvit på brudd flate. Har tynne ep-årer. Spredte 5mm store q-amygd.			
	✓	128,93	Tuff, massiv lysgrønn noe flekkig med uregelmessige mørke rosaberte q-fragmenter. Stikk med kloritt.			
	✓	132,65	Andr grønnlig, massiv grønn finkl og tett. Har grønnskjær på brudd flater. Vekslende med lbrun og mm q-amygd. Har en viss lagdeling Spaltning V/129,50 = 36° Noen q-årer. En NH veksler og det kommer inn partier hvor det er mere kloritt enn ellers.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

A-k9

Dato: 18/3-25 Sign: A Retn.: -90 Sted: 4500E/5003 Hull nr.: 10-033

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
	✓ ✓	133,23	Agglomerat, med grove sure bruller i en klorittisk grunnmasse. Bruller er svært forvitret. En meget oppsprukket mot slutten.			
	✓ ✓	136,12	Dacitt, mørkere blågrå tett og gammel fjell med noen q-amygd. Oppsprukket bl.a. begrenset med			
	✓	137,20	Breksiert (i-hyp)dacitt med tynne stikk med kloritt			
	✓ ✓	143,30	Dacitt, massiv mørk grågrønn meget tett og fast med kvartsittiske trekk. Le gamske homogen. Finner meget sm kloritt-flekker, samt lyse-aktige q-amygdaler i størrelse 1-5mm. Det er noe cc i amygd også. Generelt nivelig med amygd. Blir noe mørkere blågrønt mot slutten, samtidig som bergarten gjør mot andesittisk. Nedre grense her mange tynne årer av q og spesielt cc. Skarp grense mot.			
	✓ ✓	143,83	Tuff, stiv grønn og meget uregelmessig i de tynn bånd Skj ∨/143,55 = 18 Båndene viser seg vær en blanding av q og cc.			
	✓ ✓	144,86	Tuff, mørkt grønn og i det vesentlige gamske homogent materiale med grønn tett båndelag			
	✓ ✓	147,70	Tuff, grønnblå helle mørke med brede mørke bånd og smalere og mer utydelige lyse bånd.			
	✓ ✓	148,92	Tuff, svakt stiv i de klorittiske bånd meget tydelig båndet med vesentlig lyst grønnt materiale, med skarpe men smalere grå hvite årer bånd. Skj ∨/148,75 = 23			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arkiv

Dato: 18/3-75 Sign: H Retn.: 190 Sted: 4500/5005 Hull nr.: 10.033

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓ ✓	151,15	Tuff, massiv grønn, med uklar lagning i store trekk, men de kommer klart fram her og der. En i det vesentlige sammensatt av mer grovt grøt-materiale.			
	✓ ✓	153,23	Tuff, av samme utvikling som over, men nå mer skf			
			Skf V/151,20 = 5%			
	✓ ✓	155,12	Tuff, skf grønngrå mye mer finbundet enn tidligere, samt at breccien forsvinner mye			
	✓ ✓	155,65	Kalk gr sl. ? skf lysere grønn enn over men mye breccie og hyppigere Cc-bånd langs lagdeling. Det kan være den vanlige kalkesonen. En gansk hyppig mer sortglimmerholdig skf-plan.	?		
			Skf V/155,50 = 69			
			SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1.

Dato: 22/11-74 Sign: A Retn.: ÷45°C Sted: 11005/6005 Hull nr.: 10 034

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.15	Tuff, mer massiv blågrå type uregelmessig med grønn (tynne			
		1.69	Gr.st massiv grønn og ganske homogen, 1 stk q-åre			
		4.21	Tuff, massiv ganske grønngrå og heller sur, med spesielt sur grålilla bånd på 5-10 cm med grønne mellomrom.			
		5.66	Tuff, grønn mørk skif og med mm-tynne lyse sure lag (som også synes boblo noe cc) Men dessuten mest surt materiale i de tynne lyse stripa. Skif ⁴/4.80m = 23°			
		6.98	Kalkgr.st. lys grønn meget skif (tynnskif) og tynt båndet med cc-striper og spetter som tilsammen danner lag. Er meget lik de kalklag vi finner i liggen av sydest-malm Synes som det er en gradvis overgang fra den tuff vi har over. Skif ⁴/6.80 = 33°	NB		
		7.90	Tuff, ganske massiv og mørk grønn, er heller sur og relativt uregelmessig.			
	12.10		Tuff lys grønn og meget skif Fører q-amygdaler og definerte sure (hvite og tynne) bånd. Disse har ingen en vekslende rekk av usentlig pg (epy er ikke sett).		8.65 - 9.50 10.40 - 11.48	1 prøve 2 -"-
		12.21	Mørkelig breccie. Er lys og med spettet utseende p.g.a klorit (andre grønne min Kan være en mulighet for at det er en gressen gabbrosill.			
	13.35		Tuff igjen som over med hvite tynne og sure bånd. Dessuten de karakteristiske q-amygdaler.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arkiv

Dato: 22/11-24 Sign: AH Retn.: ÷45°E Sted: 11005/6005 Hull nr.: 10.034

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Ved 12,50 sees 10 cm med hydelig pyroklastisk avrundet små millimeter store korn Bare noen få striper m/py her og der			
		13,47	Oppknust men kan være en lit alt kalk og sk. Er i alle fall cc-holdig om ikke så rik			
	14,30		Tuff ganske massiv grønn og noe usikker er en smule oppknust Det ser ut som tuff-båndingen blir brattere eller hvert.			
		15,08	Tuff, ganske lys grønn i hele sin skj, men klart båndet og med brattere bånding Noe oppknust, dessuten uregelmessig Bånding V/14,60 = 40°			
		16.00	Tuff, grønn, svakt skj med en del q-årer, ikke imp. Skj V/15,90 = 24°			
	17,51		Tuff, som over men nå opptrer igjen en grønn fallig og uregelmessig imp av py			
	22,80		Tuff, grønn vesentlig skj dels med flere linser liggende i en grønn matrikse. Imp blir etter hvert sterkere og sterkere og opptrer tett i tuff som tynne py-striper i en lvit dolomitt omgivelse		17,57 - 18,60	3 prøver
					19,00 - 20,65	4. -"-
					21,29 - 21,80	5. -"-
	~~22,80~~				22,00 - 22,80	6. -"-
			Skj V/22,25 = 24°			
		24,00	Tuff, er nå grønn stadig skj men hvor svært lit imp, kun over 10 cm kan man se spor. Fører partier med hydelig diffus anrikning i form av små linser/bånder med feldspaten liggende i det horisontale plan gjennom			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 22/11-74 Sign: A Retn.: ÷45°Ø Sted: 1100S/600S Hull nr.: 10.034

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			kjernen og med retning 15°			
			på-slå ut fra kjernen.			
		25,03	Tuff, massiv grønn svært meget			
			med gamske brede bånd av			
			blågrønt sterk materiale, Skarp			
			overgang til nedenforliggende			
25,87			massiv malm, (som norke har		25,03 - 25,87	7 prøve
			en del grønne mineraler og er			
			kanskje kun rike imp) Fink og			
			pentyrobbestruk py skifter. Dessuk			
			mørk partier meget rik på mt.			
26,09			Massiv malm, antagelig		25,87 - 26,09	8 — " —
			en gradvis overgang fra de			
			over, men denne fører			
			nik cpy i uregelmessige			
			striper og klynger sammen med			
			fink py. Denne er kun			
			svakt magnetisk.			
	26,51		Sterk imp i tuff aktig mun		26,09 - 26,51	9. — " —
			svært sur bergart, er hvitstripet			
			kan ikke se cpy i denne sonen.			
		27,00	Tuff massiv lys grønn og			
			meget uregelmessig uten imp.			
	27,35		Sterk imp i hvit kløftet		27,00 - 27,35	10. — " —
			sur tuff, meget rike py og			
			cpy-bånd			
	28,63		Tuff, massiv grønn og		27,70 - 28,45	11. — " —
			gamske kraftig imp opptre			
			men i spredte soner, meget			
			sterkt rik, der ikke cpy.			
	29,18		Tuff vesentlig sterke og			
			med spredt opptreden imp			
			av py.			
		30,40	Tuff grønn og svakt			
			skif med dårlig kløvning.			
			Det er nokk bort for kort			
			Skj V/2980 - 223			
			SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1

Dato: 21/1-75 Sign: AA Retn.: -90 Sted: 390 V/275 S Hull nr.: 10.035

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	2,40	Grst. massiv grønn og grønn homogen, men noe oppknust. En del epidotårer			
	✓ ✓	4,00	Tuff, massiv, for det meste lysegrønn dels gaste mørt klastatt materiale med tynne bånd av mere kloritthole			
	✓ ✓	6,05	Tuff, massiv grønn grønn uregelmessig av lysere lysegrønt bandet med tynne bånd og lse cc-årer			
	✓ ✓	8,77	Tuff, massiv, grønn med mer sag lysning, er i det vesentlige grønne kloritthole. I de mer grst.-lignende partier er det en del cc-årer			
	✓ ✓	13,40	Grst massiv grønn og finkornet. Er grønne fjell men kunstige noe grønne enn vanlig. Tynne årer < 1 mm tykke av cc. En vag tuff-banding kan her og der skimtes. Sprekene fylles delvis dolomitt en banding V/12,30 = 245			
	✓ ✓	16,78	Tuff massiv grønn og meget vesentlig med kloritthole materiale Er svært uregelmessig og kraftig bandet i partier.			
	✓ ✓	18,40	Grst massiv grønn og homogen. Finkornet.			
	✓ ✓	23,75	Tuff, massiv grønn og meget svakt bandet. Det er vesentlig kloritthole materiale V/20,40 en 4 cm stort fragment av jaspis. Klorit har samlet seg rundt kanten, sammen med noen tynne gy striper- og korn. Fragmenter og noen tynne brekcierte soner kan skilles ut et par steder mot slutten.	NB.		

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 21/1-75 Sign: AJ Retn.: -90 Sted: 390V/275 S Hull nr.: 10.035

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
	✓ ✓	25.00	And. grabb. i, massiv, lyttrist fin- og glassaktig av Grudolf. Noen g-arer og foldete ep-arer			
	✓ ✓	27,05	Gr.st massiv og noe mørke gjenn i meget fin- meget hyrna g-arer gj. steg-arer,			
	✓ ✓	29,50	Tuff, meget uregelmessig med fragmenter av sort materiale i en meget kloritthrik grunn masse. Fragm. har hvite g-amygd og synes vare ametist.			
	✓ ✓	30,80	Tuff, massiv men vel re-regelmessig. Vesentlig basisk materiale med store blærer men mot slutten mer massivt bånding. Profilen epidot-arm, sees ruskt 30 m.			
	✓ ✓	33,73	Tuff, meget uregelmessig bånding, i det vesentlige samme bånd. Hyrna g-arer her og der.			
	✓ ✓	36.00	Tuff med mørk bånding og gamle massiv, en meget ~~mørk~~ kvarts			
	✓ ✓	37.00	Grovst meget fin- grønn og hornfels			
	✓ ✓	38.75	Tuff, med massiv med svak diffus bånding			
	✓ ✓	39.80	Gr.st mørk grønn fin- og mer oppsprukket.			
	✓ ✓	42,87	And. gr.st massiv blågrønn med hyrna g-stikk. Svart fin-. Er spettet med klorit her og der			
	✓ ✓	44.-	Gr.st. grønn massiv og en god del oppknust			
	✓ ✓	45.63	And. grønnblå meget massiv og fin-. Grønnaktig av Grudolfatene			
	✓ ✓	46.60	Gr.st mørk grønn meget fin- og hornfels.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 21/1-2- Sign: 4 Retn.: 490 Sted: 390V/2253 Hull nr.: 10.035

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprove	Anmerk.
	✓✓	47,95	Tuff, meget oppknust for det vesentligste av mørkt grønt fint mat og støk bånding.			
	✓✓	51,63	And grønnaktig, massiv og hård fink. men kom de feltspatlamelle her og der noen ganger. Er delvis grønn oppknust. Noen q-årer mot slutten. Sprukket Py-xx			
	✓✓	53,85	Gr st grønn, massiv og fink. Fører noen aggregater av py. Er svakt båndet noen steder			
	✓✓	55,86	Tuff. meget massiv grønn, med få men tydelige bånd av noe mer mørkt materiale idet det meste er keloritthisk.			
	✓✓	57,27	Gr.st meget massiv og grønnlig lys grønn. Hele hele fi-kornet. Er gulgrønn på bruddflater og overholder noe spredt. Amf. kommer grønne mye opp i storridde. Graderis over grønn til			
	✓✓	57,95	Gr st. grønn massiv og fink av typiske bånd.			
	✓✓	60.80	Tuff grønn og massiv med svært mørk tuff-bånding. Det hele er basisk med lite svart materiale. Py opptrer fin-kornet som tynne årer enkelte steder.			
	✓✓	62,45	Gr.st lysgrønn, meget massiv og homogen. Fink. Er litt knudret på flate.			
	✓✓	66.20	Tuff. meget massiv og noe svak bånding, Bare enkelte bånd er helt tydelig. Disse er meget tynne. Det tyder på at det			
	✓	69,18	Gr st noe mørk grønn, tett og fink. massiv meget tung. Py-xx enkelte steder spredt.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 4

Dato: 21/1 - 75 Sign: AL Retn.: ÷90 Sted: 390 V/275 S Hull nr.: 10.035

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	71,46	Tuff. av den massive grønne type. Har nettes kalkgrønnsk. Her kom jeg bestemt av mye mer kloritt mat. i grøt massiv. Skifre med mer som tegner fargeforandret på ca 4 cm.			
	✓✓	74,23	Grøt massiv grønn og fint homogen. Enkelte lyse lavgrønne ep.-årer			
Borrat	✓✓	75,55	And grøt er meget fint grønnblå og kantstyr mye tvilsom i kurket Noen py-xx			
	✓✓	76,87	Grøt typiske type, som den over			
	✓✓	79,10 ~~79,20~~	And grøt massiv og grønnblå som over.			
	✓✓	79,90	Grøt lys grøn massiv og middelskornet. Form en del epidot			
	✓✓	82,93	Tuff. delv massiv delv noe skif. delv regelmessig delv meget uregelmessig med «klumper» av bånd og feltet Mn-carbonat? sammen med feltet og brekkert epidot. Skif ✓/81.- = 283			
	✓✓	84,13	And grøt. grønnblå meget fint og fint. Delvis rekrystallisert m. q- og epidot i store partier. Delvis ingress mon å se en omvandling langs q-årer			
	✓✓	85,06	Grøt. av noe vekslende type kantstyr over til and grøt i det meste grønn og noe mer grov enn vanlig			
	✓	89,-	Tuff. svært vekslende og hele tiden meget oppknust. Synes i det vesentlige massiv men her nå noe mer svart materiale enn før.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 5

Dato: 21/1-75 Sign: [illegible] Retn.: +90 Sted: 390V/2753 Hull nr.: 10.035

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓ -	90,36	Tuff. mer massiv en ellers men også her mer oppknust Båndene litt mer vage enn ellers.			
	✓	91,75	Meget kloritthholdig grønst Spalter meget lett med sorte glinsende skjell, plan som også er mylonitt.			
	✓ ✓	94,62	Tuff. massiv med svake men godt synlige bånd Bare svake oppknusning her og der			
	✓ ✓	98,28	Grønst grønn, massiv og fin. Tynn noen spredte q/cc-amygdaler Her mer epidot-årer enn ellers Bare svake båndings-tegn Den første 1/2 m noe oppknust			
	✓ ✓	99,-	Tuff, mer grønn og med svak bånding			
	✓ ✓	101,36	Grønst massiv grønn, fin og ganske homogen, kun se enkelte tegn til tuff-bånding noen steder, men disse er slik meget sjeldent.		PP	
	✓ ✓	103,60	Grønst grønnlig, meget finkornet og tildels skifret oppknust			
	✓ ✓	106,65	Grønst massiv og grønn uten særlige kjenne-tegn			
	✓ ✓	109,10	Grønst. mørk grønn med svake antydninger til bånding Kanskje noe grovere en tidligere			
	✓ ✓	111,14	Grønst grønn av typisk type ganske fin.			
	✓ ✓	114,40	Tuff massiv med svag bånding det meste av kloritthholdig materiale Noe oppknust			
	✓ ✓	115,18	And. lys grønn meget lys av q-årer Remobilisert q.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 21/1-25 Sign: [illegible] Retn.: ÷90 Sted: 3404/2725 Hull nr.: 10.025

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓ ✓	~~116,40~~ 116,30	Tuff, sterkt skif grønn med svak bånding og med klorittisk materiale. Noen brekserte epidot-partier.			
	✓ ✓	120,20	Gr st. grønn homogen og fin av typisk type.			
	✓ ✓	122,85	Tuff, grønne massive meget mørk grønn og glinsende sort på spalte flater(?) Båndingen er i det hele utydelig men små avsmeltede korn av q kan sees i dagene en skarp lagre. Dessuten finnes gg i enkelte tynne striper neste aldri helt gj settende i grønn.			
	✓ ✓	124,35	Gr st grønn massiv, gammel homogen. Noe grovere — varslig ideet horit plag. når en størrelse på 0,5-1,—			
	✓ ✓	125,16	Gr st. grønn, noe mørk, fin med en del ep. Enkelte gg-xx. Har langsgående sort glinsende spalteplan.			
	✓ ✓	126,46	Gr st grønnhårmassiv og de noe grovere type som vi hadde over			
	✓ ✓	127,50	Gr st meget mørk grønn og særdeles mye opptrevet. Er svært fin. også.			
	✓ ✓	130,-	Gr st massiv grønn ~~grå~~, fin. Er til å begynne med mye opptrevet. Mot 130 noe ca-spalte			
	✓ ✓	130,85	Lmk gr st grågrønn massiv og heller fin-k. Homog. Noen hårtynne q-årer og en cm-bred ep-åre			
	✓ ✓	132,44	Gr st. noe mørk grønn fin-k. Har en noe usikkelig sing av rey, vr da en helt liten gammel sprekk, ofrest som enkelt kom noe lett Hgrønn bånd			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 22/1-75 Sign: AH Retn.: -90 Sted: 3904/2755 Hull nr.: 10.035

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
	✓ ✓	133,83	Andr. grst. massiv grønn, gangfyll. Noe glassaktig grønn på bruddflater. Foren mye g som uregelmessige tynne årer og som „wiff"			
	✓ ✓	136,88	Gr.st grønn meget massiv og fin. Mye impregnert py i skjør-kornstørrelse veksler mye og den kan bli noe gneisset p.g.a. foldning i glag. Den siste ½meter blir den sterke gjennom-satt av årer som er blanding av g og epi. Et del mindre bresiente partier her med mye sulfider rundt kornene.			
✓	138,20	~~139,70~~	Gr.st grønn, tett og fin. Foren nå noe py-imp i band og som oppsalt som imp er ikke så kraftig men best mot til; hullet			
✓	139,10		Gr.st massiv lys grønn fin og spettet av hvite rester. Samme imp som over			
✓	141,08		Tuff grønn gaaste lys og svakt skif. Er noe uregel-messig - selv om blanding ikke er markert. Mere i retning som grupper betegnet pyritklast. Imp av py opptre sammen med uregelmessig g-biter og fragmenta. Det ikke er til å begynne med like mørt mere enn 140 blir det årene og tuffen får en mer grønnlig tone. Skif V/139,70: 17°			
✓	141,83		Gr.st. mørk grønn fin. Delv impregnert, og brekciert med g og klorit i bindsj. Noe spredt py-imp			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

AKB

Dato: 22/1-25 Sign: A Retn.: 490 Sted: 390V/2 Z5 Hull nr.: 10 035

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	142,96	Omd. grst. grønn masse og meget homogen. Trnk med enkelte py-xx			
✓	144,33		Gr.st. mørk grønn og fin-k. med spredte stolper og skygger av	py		
	✓ ✓	145,26	Gr.st. lys grønn svake skif. rystet med klorit. Skif ✓/44,60 . 25°			
	✓	146,26	Tuff. lys grønn svakt skif og med veg mer grønsten hydrolig bånding.			
✓	149,13		Tuff mer massiv svakt skif. lys grønn med py-striper over det hele. Bare svake inn. Også hydrolige kapilli-bånd (grovt			
	✓	151,10	Gr.st. meget massiv og meget grønn. Fin-k. Dette er den mest typiske gr.st. nær gjsatt av tynn q-åre			
	✓ ✓	152,52	Gr.st. massiv blågrønn i farge. fin-k. homogen			
	✓ ✓	154,35	Tuff, temmelig massiv og grønn. Bare svake antydninger til bånd av noe mer sort materiale.			
✓	✓ 156,63		Gr.st. grønnblå, fi-kornet me massiv. Fører svake py-imp			
	✓ ✓	158,08	Gr.st massiv grønnblå og homog. med noe få py-xx & del q-årer			
✓	✓ 160,-		Tuff, massiv grønn med bare meget svak antydning til bånding. Det er i hovedsaken en carbo basisk tuff. Et par steder finnes det typiske tuff-bånd av en 2-3 cm. Py-xx og striper finnes men ikke av svake.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 17/1-75 Sign: [illegible] Retn.: -90 Sted: 390 V/275 S Hull nr.: 10035

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	Fra.	160.-				
✓	160,70	~~160,70~~	Grst mørke og meget svakt stedv., med py-korn som kuber i tynne uregelmessige striper			
✓✓	161,46		Tuff, nærmest pyroklastisk med mye svart materiale i grunnmassen. Dessuten fragmenter (lavere) Rund og i disse ligger en fin py-imp vesentlig som py-korn		160,70 - 161,46	prøve
✓	166,00		Massiv tuff med vesentlig svart materiale. Svake py-imp. Den er nr uregelmessig, denne imp. ikke helt opp eller ut.		162,60 - 164,00 164,00 - 165,40	—"— —"—
✓	167,60		Omd. grst meget massiv og grønngrå. Heller homogen, men gangart mye oppknust. Fører en meget fin imp av py som enkelt-x-x			
✓	170,35		Tuff, massiv men svært vekslende idet man har korte partier med svakt båndet og sterkt båndet om hverandre. Er også vekslende impregnert av py		169,00 - 170,35	—"—
✓	171,41		Grst. mørk grønn tett massiv og fin-k. Gjennomsatt av tynne epidot-årer.			
✓	174,37		Pyroklast og mer typisk tuff i veksling. Delvis gjennomsatt av uregelmessige kvartsfyll-årer av py		171,41 - 173,00 173,00 - 174,00	—"— —"—
✓	176,94		Tuff, massiv grønn med meget lite eller ingen båndning.			
✓	183,06		Grst. Gradvis overgang fra over. Er grønn, massiv og finkornet. Noe "knollet" her og der fordi man finner enkelte epidot-"amygdaler". Finner her			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

10

Dato: 17/1-75 Sign: Retn.: ÷90 Sted: 390V/275S Hull nr.: 10.035

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			noen spredte kis-korn som „lister"			
✓	180,52		Tuff, med uregelmessig fragmenter og med noe py-impr			
	✓ ✓	181,22	Gr.st. massiv meget mørk grønn og fin.			
	✓ ✓	182,38	Andesitt, meget massiv og grågrønn. Gjennomsatt av tynne epidot-årer			
	✓ ✓	184,35	Gr.st massiv grønn og fin. En på grensen til tuff da man kan se noen utydelige her og der. Blir noe massiv etter hvert.			
	✓ ✓	186,14	And gr.st. grønn lysgrønn, tett og massiv. En del brekkiert. Fører noe kvarts med spredt py-impr.			
	✓ ✓	190,60	Tuff, grønn massiv med varierende noe klastisk materiale, men det er ikke homogent. Fører noen cc-flekker i bergmelle.			
✓	191,37		Andesitt massiv, meget tett og fin. Blågrønn fører en svak men regelmessig py-impr			
	✓ ✓	192,30	Gr.st. massiv grønn og meget finkornet.			
	✓ ✓	193,87	And gr.st. massiv grønngrå med glassaktig brudd flate Spredte py-korn. Enkelte cp-årer			
	✓ ✓	194,70	Tuff, massiv grønn og noe uregelmessig. Noen spredte py-korn			
✓	197,26	~~197,70~~	And. lys-grågrønn, massiv og glassaktig grønn på brudd-flater. Her en del impr av py, også å grønne store korn angripes			
	✓		Tuff, svak skif. og finkornet med mye mer tydelig lagning			

Skf 198,20 - 149

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 17/1-85 Sign: AA Retn.: ÷90 Sted: ca 390V/22-S Hull nr.: 10,03-

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
1	199.11		And gest. noe oppknust og ~~~ av py-xx.			
		201,-	Kjernetap			
2	203,-		Tuff. lys grønn og svakt sbf. Spettet med py-linse små. Er mest sur.			
		204,80	And gest. massiv lys grønn, finkornet. Gj.satt av mye py-aer.			
3	206.88		Tuff. meget svakt skal. lys grønn og spettet av py som over.			
		207,83	Tuff massiv og med meget svak og diffus bandet'g, er antakelig and/tuff. Har bare spredte py-xx			
		209,25	Tuff. meget massiv og homogen med særdeles lav bandet'g. Det er vesentlig ~~~ mer sur (and.) bergart f. Et par steder sees hjørne py-aer.			
			SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog — forlengelse 12

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 1035

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		210.50	Massiv das. (eller tutt[m]/fragment)			
		211.60	Veksl. tutt med klor flekk tekstur			
		211.75	Veksl: tutt / Aglom. felsisk band med py imp. + Zn			
		214.30	Aglomerat med fels. fragmenter / Grønn massiv tutt			
		214.35	Extra litt ? Karbonatrik			
		214.95	Grønnstein (Tutt) med gabbroisk Tekstur (klor flekk)			
		224.20	Finkornig svakt bånded tutt. enkelte fels. fragm. men generelt meget homogen tutt. enk. partier med py imp [Massiv das/and. breksj			
		235.40	Agl? Pillowbrekkje enh. Py imp på Stikk (forurensoner)			
		236.85	And blå grå brekkiert massiv.			
		238.30	Mass Blå lys grå das.			
		242.-	Veksl. tutt med py mm på stikk / bånd enkelte fels og enk frag			
		244.50	Mass grovkornet das/and			
		268.70	Finn and / das tutt i veksl. med mass das bergarter brekkiert mere mass etter hvert grov av py.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog Sec II

13

Dato: Sign: Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10035

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		270.-	Tuff / Aglomerat. fels trag svak py imp i bånd kmtlet til fels. fragmenter			
		272.3	Massiv and / das			
		273.7	som over men er Gans en 'flow topp' epi'dotrik			
		284.6	Mass and / das.			
		285.50	Bandet tuff m/ svak py imp			
		287.2	Sterk grønn massiv and / das. Bergart flow. ep. Veks. ep rik Tuff m/ fels frag. en del py + Zn imp			(+/292)

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

II 14

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 6035

Kis	imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		290.30	Tuff med sure fragm. klorittrik matrix ca 289.40 spredte sone m/ tremolitt ?		Prøve	
		312.25	Aglomerat av "feltiske karakter" no noe kalk også som amygdaler aglomeratet blir mere preget etter hvert v/ 291.50 tynne stringers med epor av py. fra 300 blir aglomeratet mere tuffpreget og klorittrikere		B - 0	
		318.60	Dasittisk massiv borgart			
		323.30	Aglomerat / Breksje overg presset tuff klorittrik og epidotrik i vekslinger			
		323.-	Dasitt - Rhyodasitt med enkelte tynt bånd			
		406.25	Veksl tuff/aglom. klorittrik matrix og das.-fragm og enkelte kalkholdige bånd noe epidotrikt Vekslingen mellom epidotrikt og klorittrik matrix blir stadig mere utpreget (v/ 330) fragm. av das (og rhyodas) type. Enkelte større fragm (gangerz) v/ 324 og 1m das rhyodasT v/ 330 + klorittuff tuffen blir noe mere kalkrik og mengden svartmat. avtar noe ~~Hematitt~~ v/ 348 spor av py i felt. preget tuff			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

III 15

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10035

Kis	Imp.	Berg /	Beskriveise	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			v/365 kleritt rik og kalkrik i partier euh. fragm			
			360-370 noe mere basisk			
			370-380 anh. tuff			
			v/376.70-377.20 kv. inf			
			38-390 Okende kalk innhold. en del feld. frag. + elektomiserte			
			390-400 svart kalkrik tuff. v/399.10 30 cm kvarts			
			400-410.			
		424.40	Epidot rik og kalkrik tuff. noe veksling mellom epidotrik og kalkrik tuff veksler noe mot slutten med diffuse, mørkere, band. kan være exhalitt holdige nivåer.			
		424.75	Exhalitt Bandet m. mt. py rik + rosa materiale		Prøve	
		425,65	Brecciert, dels, tuff v/425.70 exhalitt			
		429.10	Epidot rik tuff, med enkelte tynne exhalitt band enkelte py por-fyroblaster tuffen blir rikere på på exhalitt materiale			
	X	432.25	Py rik imp		Prøve	A
		434.30	Kalkrik finbandet tuff + noe silicarikt materiale			
	X	435.30	Grov py imp. i kloritt og silicarik materiale ikke spor av sp		Prøve	B
		439.01	Bandet kalkrik tuff enkelte striper m/ grov py			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

IV 16
1035

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.:

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	x	440.65	Kalk rik tuff med en god del py imp ikke synlig og noe finkornig py og matrix er mørke farget		Prøve	C
		443.45	Kalk og epidot rik tuff med enkelte svære fragmenter			
		444.20	Ag20 preget enhalitt band. med en kalkrik tuff Gam matrix gul-gulgrønn			
		445.70	Aglomerat dvs. bæquner som tuff og går over til et aglomerat kalkrikt. og har et preg slik at en lurer på om det ikke er et konglomerat: Enn store fragmenter som er meget kalkrike			
		447.45	Jaspis preget eller et jaspis konglomerat inne mellom jaspisen opptrer kloritt og kalkrik. og epidot tuffig materiale		Prøve	
		460.60	Kalk og epidot rik tuff kan være samme som ved 446.70 „Gul-gul-grønn (kalk aglo.)		Prøve	
		468.35	Kalk tuff mørkere kloritt og epidot samt noe enhalitt materiale. tildels preget av store det. (det opptrer enkelte partier, årer med ull tuff)		B.O.10	
		468.40	Enhalitt: magnetitt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

V

17

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10035

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		470.35	Agiomerat matrik: kalkrike tuff. fragm: folsitter.			
		487.00	Kalk rik grå tuff			
		498	Mafis and.-dac. dime er i parier svart kalkrike. epidotrike bånd NB. den siste kan egentlig være en putelaven.			
			498 Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 1.

Dato: 4/12-74 Sign: AH Retn.: -90 Sted: 235V/585S Hull nr.: 10.036

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	✓	2,90	And grst. massiv, mørk grønnlig Meget fink og tett grunnmasse og med lyse små og spredte g-anuglar. Ikke oppknust i dagsone.			
	✓	5,50	Gr.st massiv og tett, grønnlig fink. grønngrå. Kan se ut i liten grad spredte små plagioklas			
	✓	9,85	Agglomerat; delvis preget av brekkierte strukturer. Til å begynne med en grønnlig mørk grunnmasse med feltspat-xx (noen få) samt spredte px-xx. Senere meget uregelmessig brekkje med biter av g-rik materiale samt rødlig aske-g. Virkninger fra dagsfall synlig Går så over til mer typelige lyse fragment i en grønn grunnmasse. Fragmenter er meget lave grønnlig og uregelmessige. Agglomerat.			
	✓	10,10	Gr.st. flakig av kloritt og lys grønn, er antagelig dim avslitt underdel av agglt.			
	✓	11,65	Andesitt, grønnlig meget tett og grønnlig fink. Er gjennomsatt av sprekker fyllt med kloritt. Ellers homogen, mot slutten oppknust med rust-fra dagsone.			
	✓	12,54	Grst grønn massiv og homogen meget fink			
	✓	14,58	Tuff, massiv for det meste grønn Har delvis meget markerte lyse fragmenter av linseform og er antagelig agglomerat.			
	✓	17,24	Dacitt, mørk grønnlig middels-k og glassholdig på knust flate. En del epidot årer og store g-anugl.			
	✓	17,90	Tuff, uregelmessig grønngrønn og Meget lys med "strimler" kloritt.			
	✓	18,80	Dacitt, blågrønn middels-k. massiv og homogen			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 4/12-74 Sign: AI Retn.: -90 Sted: 235V/535S Hull nr.: 10.036

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	~	20.70	Andesitt meget massiv grønn-grå tett og homogen. Grønne flekk. Grønngul på ~~spalt~~ bruddflater. Noe epidot i åren			
	~	22.12	Gr.sl opprinnelig lysgrønn, flekket av grønne større klorit-flekk. Kan være en godt preservert gabbro			
	~	23,60	Tuff. grønn til grå blå massiv av den vanlige type En del epoksnust og noe uregelmessig epidot.			
	~	24,90	Gr.sl mørk grønn massiv meget tett og fin-k homog.			
	~	27,00	Tuff. massiv hvor type hvor det vesentligste mineralet er andesitt og noe klorittisk bånd Kan kalles andesitt-tuff, en kan skjelne båndet			
	~	29.18	Dacitt typisk — nærmest på overgang til rhyolitt - En massiv grønn lysblågrå med hvit grønnu bruddflater. Gjennom-satt av enkelte tynne epidot-årer med dtt og annet pyrkorn. Det hele er ikke helt homogent. Med partier som er mer andesittisk, men kan ikke si det er tuff.			
	~	30.03	Tuff. massiv for det meste grønn, unntagelsesvis med klorit i bånd og bånd med noe partier imellom Også et par uregelmessig (epidot-fyll)? med pyr. gjør type.			
	~	33.37	Tuff som over massiv, men har meget dog i båndinger. Kan se et par steder hvor noen fragmenter er under erstatning av epidot og klorit			
	~	37,14	And.grst massiv grønn mørk grønn fin- til middelkk. Delvis småflekket av lel. Enkelte mer klorittiske bånd Gradvis overgang til underliggende.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 4/12-74 Sign: [illegible] Retn.: ÷90 Sted: 235V/585J Hull nr.: 10.036

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	-	38,20	Andesitt, grønnaktig massiv og fin-k meget homogen			
	-	39.20	Grønt mørk grønn, massiv og fin-k			
	-	41,05	Tuff, ~~dito~~ meget massiv med store vage lysmeldinger Er andesittisk i type. En del epidot i de små lysmeldinger og der også små pepset med cc-flekker			
	-	43,40	Tuff, meget uregelmessig med mye klastisk materiale som ligger rundt uregelmessig store fragment. Kan kalles breksje			
	-	45.75	Dacitt, meget rød type, massiv og fin-k. og noe grovere i forskjellige lysmeldinger, grove er lys-grå Den fører mye epidot som åre- og flekker.			
	-	47,50	Andesitt, massiv lett og fin-k mørk blågrønn, glassaktig på bruddflatene med noen steder en del epidotiske uregelmessige åre			
	-	48,50	Dacitt, massiv og lett blågrønn som over med tynne epidot-åre Også tp i rundeflekker 3-4mm i tvm.			
	-	51,80	Breksje eller agglomerat. Inneh- mm-tynne lysgrønne lysmeldinger av ep/kl dannet mørkere av forskjellig type man kan også se noen q-amygd. som er grønne flere			
	-	53,00	Andesitt, massiv mørk blågrønn middelskt mørkegrønt på bruddflatene Rikelig med epidot-åre, Gradvis overgang til			
	-	54,28	Tuff, andesitt - meget massiv og lyse partikl og utydelig lagdelt- synes epidotåre også gjennom hele store og største lysmeldinger Av - store q-amygdaler opptrer sjeldent.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 4/12-74 Sign: [illegible] Retn.: ÷90 Sted: 230'/535'S Hull nr.: 10.036

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	~	57,50	Dacitt, massiv grålig, med gansko mørk grotthet. Er ikke helt homogen da SiO_2 innholdet synes variere noe. Er krysset av tynne spricketorer og det sees blanding av cc/ep i en ring omkring stykke av dacit. Ganske ofte impregnert av cc/q. Prøve tatt ut	NB		
	~	59,16	Ank grå massiv meget mørk grønnlig, ganske homogen, men blir lysere mot mer basaltisk etter hvert. Et par bruksje [illegible]			
	~	60,43	Gr.st. mørk grønn massiv og ganske homogen. Fink. Er karakterisert av å føre meget mica, men helt i bett, av q-spetter. Noen bånd er mer rike enn andre. Noe gjennomsatt av sprekker med klorit. Er også delvis klorit-flekket.			
	~	61,42	Tuff. med vage båndninger av lave spredte antydninger til fragmenter. Parti som er ganske gjennomsatt av klorit			
	~	66,18	Gr.st. mørk grønn, finkornet og en smule flekkig. Er flekket av klorit og fører karakteristisk ganske mye cc i grunnmassen og i sylt tynne bånd og årer. Et par tuffittiske bånd kan sees. En del oppknust fra 64,50 til 65,80			
	~	67.00	Andesitt, svartgrå finkornet massiv og homogen			
	~	67,70	Gr.st. grønn, massiv og fin. Noe få tynne q-årer.			
	~	68.00	Andesitt av samme type som over.			
	~	68,95	Gr.st. mørk grønn, massiv homogen og finkornet.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

5

Dato: 4/12-74 Sign: AA Retn.: -90 Sted: 235V/5855 Hull nr.: 10 c 36

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	~	69.90	And gr.st. massiv grønnbla, fink og grønn, glassaktig på bruddflate. Meget homogen med årer fra q-åren.			
	~	71,14	Gr.st grønn, massiv og heller fink. Er mye sprukket på brudd-flater like q-åren.			
	~	72,43	Tuff. meget massiv lys grønn til blågrønn, meget markert av svarte og brunlige bånd som viser her bratte på 15-20 cm. En del store q/ep/cc - amygd.			
	~	73,62	Tuff, mer typisk pyroklastisk materiale, med enkelte mm store fragmenter. det hele grønnaktig.			
	~	74,65	Gr.st fink grønn og massiv, homogen med q-amygdaler, svært runde og blålige.			
	~	77,10	Tuff, massiv blågrønn, overveiende basisk materiale men med noen mer sure, Er bare diffust båndet. Det synes også som det basiske er klorit-fattigst.			
	~	80,65	Tuff, som er meget massiv grønnlig mørk grønn og stort sett med vag overgang mellom båndene. Bare sjelden får vi de markante bekkasjeprægete bånd. Grunnmassen består av meget fintfordelt cc også.			
	~	84,27	And gr.st massiv grønnblå grønn fink (men åren av de mest fine) Meget homogen			
	~	86,45	Gr.st massiv mørk blågrønn og fink. Fører litt cc, ellers homogen.			
	~	89,87	Tuff, massiv type av grønn sort med vekslinger mellom sure andesittiske og andesitt bånd som er meget bredt delvis med gradvis overgang mellom dem			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 4/12-74 Sign: [illegible] Retn.: -90 Sted: 235V/555S Hull nr.: 10 036

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	~	92,60	Tuff, meget massiv, blågrønn ubestemmelig bånding men kan se enkelte runde fragmenter. Er meget hard. Kommer inn nær cc mot slutten.			
	~	95,03	Tuff. mer av den vanlige grønne type, uregelmessig, med mye klorit og litt forvitrede biotitter som ligger i grønnmassen av og til			
	~	96,43	Andesitt, mørk blålig massiv, tett og finkornet. Blir gjennomskinnelig hvit grønn på kantflatene homogen.			
	~	98,45	Tuff, massiv blågrønn, med bare lav overgang mellom bindene. Men de kan sees. Det hele er en type.			
	~	99,52	Andesitt, massiv tett og fin. blågrønn med grønnlig kantflate og med enkelte lange finkornet lameller. Meget homogen			
			Prøve til slip (og analyse)	NB		
		100,51	Tuff. heller massiv grønn vesentlig andesitt, men tynne bånd med mer klorittisk materiale			
	~	107,50	Tuff. massiv grønt vekslende mellom hard og bløtere i regel diffuse deler av begge. Enkelte mer meget klorittiske bånd antydning av dette delvis asymm. idet man stedvis ser en holdning fragment			
	~	107,70	Grønt. stålf lysgrønn og med klorittflekker. Er glimmerrik på skjf. flater			
			Skift 4/107,60. 22°			
	~	110,20	Igjen massiv tuff som over med meget svag bånding og mørkere på andre materiale.			
	~	112,23	Andesitt grønn massiv og fin. Homogen med spredte py-xx			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 6/12-74 Sign: A Retn.: -90 Sted: -235 1/585 S Hull nr.: /0 036

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
	✓	115,-	Pyroklastisk og brekssert surt materiale i det meste finkornet rikelig med uregelmessige av- av epidot. Det hele er massivt			
	✓	116,05	And grøst. massiv grønnblå men heterogen i det det ha vært svake overgange til annet mer rosa lavan			
	✓	117,24	Tuff. massiv gangsone lys gra- grønn, vesentlig and materiale og med meget svag båndning			
	✓	119,75	Grøst. lys grønn massiv og ganske fintkornet av klorit.			
	✓	120,10	Pyroklastisk massiv med små runde kloritiske fragmenter og med en del q-årer som viser seg å ha vært fø leirmineraler.			
	✓	122,07	And grøst massiv homogen og relativt fåre Grønnsten Et par kraftige q-årer på slutten			
	✓	[illegible]	Grøst massiv grønn og ganske grovkornet med en svak men tydelig foliering av amfibolen. Synes ha en skarp og heller lineær uregelmessig grense mot nedenforliggende			
	✓	125,9-	Tuff massiv med forholdsvis tydelig båndings. Det hele er meget surt i sin helhet.			
	✓	129,61	Tuff massiv og homogen med veldig lite markerte bånd. Det opptre en tynn del epidot i tynne uregelmessige årer.			
	✓	131,82	Tuff. nå igjen mer uregelmessig og markerte bånd hvor man delvis kan se fragmenter i grønnaktige soner er sur			
			Tuff, massiv hvor båndingen igjen blir mer svag og utydelig. men det er tydelig å se at det skiftet gangvis mellom surt og basisk.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 6/12-74 Sign: ~~A~~ Retn.: -90 Sted: 235-V/5355 Hull nr.: 10.036

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		136,90	Tuff, massiv med markerte bånd på mellomhet ca 5 cm mellom surt og basisk surt materiale er gråblått av farge og er andesittiske. Dette leddet synes ekskludert å være uregelmessig q- og epidotårer. Det basiske ledd er grønt og sterkt klorittiske	8 stykker del av	Del av
	✓	141,11	Tuff, stadig like massiv, men igjen er båndinge blitt utydelig med gradisse og jage overgang mellom materialer som er ganske sure og andre som er andesitt-sure. I et par av de mer sure og mørkere ledd kan sees små mørke kantete korn. Epidot opptrer alltid ganske samlet			
	✓	143,88	Gr.sl massiv grønn og flate. En god del epidotårer og noe q. Kan se enkelte klorittiske skiv (med py-xx.) Dessuten finnes et par bånd av mer surt and mat.			
		145,-	Tuff, massiv med tydelig markerte sure/basiske bånd.			
	✓	147,92	Tuff, massiv grønnblå med svak vag båndin men en i det vesentligste av en samen type			
	✓	150,58	Tuff, massiv ganske tydelig bånding. En kan se klorittiske og også svak uregelmessig idet stel kan se ut som linser ligger i en klorittiske gr.massa.			
	✓	152,22	Andesitt, massiv grønnblå og ganske fin. Fører ganske mye epidot i grunnmasse og som årer. Dessuten ganske rikelig med q-amygd			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 6/12-74 Sign: A Retn.: -90 Sted: 235/555 S Hull nr.: 10.036

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	–	155,76	Tuff, massiv gaaske lys grågrønn av bar type med noe markerte bånd. Delvis gaaske markert „innvisjon" klorit			
	–	157,40	Andesitt massiv grønn fin og homogen med klorit gangvis samt kvarts årer m/sep			
	–	163,–	Tuff, i hovedsaken massiv, men en lit skj der hvor det er kvarts klorittrike ledd. Det er gradvise overganger mellom de svake og klorittrike ledd. Skj i klorittbånd v/158,70: 23° I enkelte av de svake leddene finnes en fint fordelt py-imp i ubetydelig mengde	NB		
	–	165,10	Grønnsten massiv grønn og gaaske fin. Bare noen kvarts g-årer			
	–	166,27	Tuff massiv med svak bånding En god del med epidot og g-makrisk i årer			
	–	167,57	Grønnst massiv, ligs grønn fin kornet men merkn mer rosaaktig vare noe grovere utviklet, kan se små „amygd" av klorit Meget homogen Enkelte meget kvarts og sporadisk kloritt med noe py-xx			
	–	169,65	Andesitt grønnst massiv middelsk og gaaske homogen. Også her opptr noe py i mikrosprekker strenger men mesten over alt Vanskelig NB likevel å kalle dette for impregnasjon			
	–	170,53	Tuff, fin og meget klorittisk er svakt skj. meget kvarts og lite med svæ bånd Py-imp synes å ha økket og er noe tydelig i se over alt. Ikke er storlig svake Skj v/170,10 = 9°			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 6/12-74 Sign: 4 Retn.: 90 Sted: 235 V/580 S Hull nr.: 10.036

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
✓	172,21		Grst lys grønn massiv og fin. med en spredt men svært tynn imp av py			
✓	173,38		And grst grønn massiv og middelskornet med også her en heller tynn imp av py i vekslende strenger. Opptelling			
✓	174,00		Tuff, massiv men med utydelig bånding og med gamle sterke py-imp Er gamle sone.			
		176,68	Grst massiv og lys grønn gamle homogen med noe q-amygd og bare noen spredte py-xx.			
	179,00		And grst massiv stedvis gamle lys grønn og middelskk. Her spredte 2-5mm store q-amygd og føre en heller svak men grov imp i form av grove py-xx			
		179,90	andesitt, massiv grågrønn og spredte fine homogen føre py-xx som spredte korn.			
		181,38	Grst massiv grønn og fin. Føre py-xx som korn og i noen spredte striper			
		182,24	Grst gamle lys grønn og svakt skif med noe ce i grunnmasse Skif V/181,80 - 75			
✓	184,20		Tuff, massiv og gamle vingel messing. Av den vere typen Noe blandet py-imp, et gamle grønt bånd ved 183,10			
✓	185,40		Tuff, massiv med bånd og bånding, det hele er andesittisk i karakter. Her en svake men spredt imp av py-xx. Dessuten NB finnes fra 184,50-184,80 et bredt parti hvor det opptrer små			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

11

Dato: 6/12-74 Sign: A Retn.: ÷90 Sted: 235V/585S Hull nr.: 10.036

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			meget kpr-årer kom av cpy og i et 1,5cm bredt bånd med py en cpy grådd ut på skj-planene.			
	187,40		Tuff, massiv med gansken kydelig bånding og tildels nær partier med fin-lamerert typiske tuff-bånding-py oppfatn svakt og spredt over det hele.			
	187,95		Keratofyrisk lysgrå blatt materiale massivt med noe py			
	190,20		Grst, som mek i partier kan synes pyroklastisk men er i det vesentligste massiv grønn og ganske homogen med en jevn og ganske sterk py-imp.			
	194,92		Tuff, meget massiv som vanlig, det vesentligste anel. materiale og i det hele ganske vag bånding med det finere sma partier med kydelige kapilli-bånd. En svak py-imp er fordelt gjennom det hele. Py er ganske grov.			
		199,82	Rød grst massiv og lys grønn ganske grønn på bruddflate. Kan vær mer basisk enn det se ut for. Har enkelte py-xx spredt rundt, og enkelte meget spredte py-striper.			
		200,65	Grst massiv grønngrå, fin-kornet nær skjær. En grovere over gang fra bergarten over.			
	203,83		Samme som over men nå med en varierende py-imp i spredte, ganske grove bånd			
	205,66		Rød-grst massiv og homogen lys grønn kornstr nær vulkanske Grov py-imp som er heller fattig.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 6/12-74 Sign: AH Retn.: ÷90 Sted: 235V/5855 Hull nr.: 10.036

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		211,00	Tuff, massiv og ganske lys grå med enkelte mer mørk gjennom og konstige mer lbf partier. Er i det hele tatt av den vanlige type tuff, i det mer tette er homogen mer heller ikke strøelamina. Det er vanskelig å se båndlag på den annen side se det nå som krystaller tilsvarer ganske fintlamina med små linser av de forskjellige typer materiale. Enkelte steder (209-210) se man tydelige pyroklastiske strukturer. Imp er hele tiden meget svak			
	212,25		Tuff, med keratofyrisk preg. Kan være en q-sericitt-skifer. Det er i denne mer py-imp			
	213,30		Tuff, med lbm vagt vekslende bånd og svake py-imp V/212,80 finnes et par cpy-korn sammen med q-strøk. Også noen q-amygd.	NC		
	216,27		Pyroklastisk med runde q-fragmenter her og der i en lbf/lbk ganske fin grunnmasse. meget svak imp			
		217,80	And grøt lys grønn og massiv. Den har båndlag men det synes forårsaket av boring.			
		219,20	Tuff, massiv grå/lbk og svake laminert materiale, enkelte steder kan det sees at man har noen avrundet q-korn. Noe strøk obj. Svært lite grønne mineraler.			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 26/11-74 Sign: AA Retn.: -65° Sted: 1060/6645 Hull nr.: 10.037

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		1,60	Gr.st massiv, fink. og grønn, synes homogen men er noe kornet. Fører endel epidot i tynne årer			
		3,55	Gr.st. lys grønn, middelskornet hvor grønn min er noe større.			
		4,75	Tuff som er særdeles massiv og med svart vag båndning Vesentlig kvartsfri. En del epidot-årer.			
		6,52	Tuff. svakt skt med meget markert båndning mellom sure og basiske ledd.			
		7,50	Gr.st mørk grønn, meget fink. noen mer mandelsteinsk. Fører noen tynne q-årer. Kan her tendens til båndning.			
		11,32	Tuff, meget diffuse bånd. Er massiv men blålig grønn			
		13,63	Gr.st. svakt skt og meget mørk sort grønn mot glimmerskt. Er nærmest en kloritskt. Kan bare se et par tuff-bånd Skt V/12,40 · 6°			
		15,95	Tuff, meget svakt, skt men kan tydelig dog svak båndning Er i det vesentligste en basisk tuff			
		18,23	Tuff. ekt grønn med meget markert veksling mellom sure og basiske Ledd. Skt V/17,40 = 9°			
		19,70	Tuff, grønn massiv og med bare tynne vekslinger. Sammensetn er mandelsteinsk og meget			
		21,30	Tuff. blågrønn, grønt massiv og er grønn felt brudt med mørkere skifter. De kloritiske partier er meget tynne.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 26/11-74 Sign: AA Retn.: ÷65° Ø Sted: 1060 E/669 S Hull nr.: 10.037

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		22,70	Tuff, grønlig skf, lys grønn med mørkere bånd brunet i mellom. Den klastiske matriks består innholdt skjønne mineraler ca			
		23,10	Keratofyr, mørk blålig grå med gamle mye SiO_2, enkelt stor fg-xx også.			
		25,96	Kalkgr st. lys grønn og meget skf. Den tett med lysne ca-bånd mm tykne, adskillig lysnere enn det som finnes i "Syd østmalmen" Skf V/24,60 = 11°			
			Sortglimmer på skf plan			
		29,70	Tuff, som regel skf og svart vekslende i berakten Finner ett par brede partier (10 cm) med svart materiale men er i det vesentlige basalt			
	31,05		Det hele er sterkt oppsmuldret Tuff, skf med mørkere lag av svart og basalt materiale Det er en del fg-inng sammen med (langs grensen) av de tynne rødd			
	31,55		Tuff, lys grønn og svakt skf med svake mm mørkere bånding Enkelt tynne fg-lag			
	32,19		Keratofyrisk lys grå-hvit med litt mørke grønne materiale. Er en q-sericit-skifer og heller sur. Fører ujevnt fordelt fg-imp, det kan også være opp Skf V/31,55 = 17°		31,55 - 32,19	1 prøve.
			Det er en gradvis overgang til			
	32,92		Tuff svakt skf grønn og bandet med gamle sterke fg imp i bånd. Impregnasjonen meget grovkornet.		32,19 - 32,92	2 — " —

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 28/11-74 Sign: A Retn.: -65°C Sted: 10600/6695 Hull nr.: 10037

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	33,47		Tuff, grønn meget svakt skif og vesikulær, ikke mye sulf materiale men g opptre som små Amygd. Imp opptre. Også opp i to meget rike bånd: 5cm ved 33m og 3cm ved 33,45m Dessuten sees små opp-linjer i mellom opp opptre her ikke mye i det basiske som det mye materiell		32.92 - 33,47	3. prøve
	34,85		Tuff, omtrent den samme bergart som over men her med større imp av opp, men også med enkelte tynne av de 1mm store g-amygd. Disse synes også konsentrert i enkelt bånd Imp blir stadig svakere på opp og mye mer py.		33.47 - 34,29	4. -"-
					34.29 - 34,85	5. -"-
	35.36		Keratofyrisk, men i lett blanding med basisk mat. Er svakt skif, som sonen i opptreden. Py imp ikke mye opp		34,85 - 35,36	6 -"-
	37,08		Tuff, skif basisk grønn og meget lett med g-amygd i alle stenciler, svært sjeldn py-imp men også mer opp-anrikningen. men i det hele fattig		35.36 - 36.60	7 -"-
					36.60 - 37,08	8 -"-
		37,72	Tuff, grønn og svakt skif med meget lag blanding			
	38.33		Keratofyrisk (a-sericitskif) lys grå, svakt skif og er delvis brecciert eller pyroklastisk tynne py-strenger langs lagning og mellom breccieblokker.			
		39.10	Tuff lys grønn svakt skif med enkelt g-rike tynne bånd.			
	41.03		Tuff som over men har nå fått en imp av py i og enkelt opp. Ellers denne er meget uregelmessig og fattig		39.10 - 40.00	10. -"-
					40.00 - 41.03	11 -"-

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 4

Dato: 28/11-74 Sign: A Retn.: ~65°S Sted: 1060E/6645 Hull nr.: 10.037

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	43,00		Svært blandet materiale, men kan se antydninger av linseformede grønne linser ligge i en rødbrun fullstein av disse linsene er nesten erstattet av py-kryst, ellers kryst i bunnen svakt skift og ikke gjennomgående. Det hele må nok være et svært agglomerat. Skift V/42,40 - 18°		41,03-43,00	12 prøver
		44,00	Grått klastisk og grønne. Gjennomsatt med riktig åre- og årer av spredt py-kryst denne bergart går gradvis over i			
		44,90	Tuff. svakt skift grønn og basisk type med mye kvarts åre- og øye-brekkelig. Til å begynne med bare meget spredt py-kryst			
	46,00		Samme tuff som over men den har nå en blandet mørk mørk py-kryst			
	46,55		Keratofyrisk. delvis grønt massiv og blågrå med en del py-kryst			
	47,74		Tuff meget basisk og grønn svakt skift men foren grønne felt med 1mm store grønne Dessuten py-kryst i varierende mengde med noe cpy her og der. Et spesielt rikt bånd fra 47,57-47,69. Ellers bare spredt.		46,55-47,74	B — " —
		52,78	Tuff, mørk grønn grønne massiv med lys grønne og lysere partier. Dessuten også skift partier. I det vesentligste basisk Skift V/49,80 = 10° Enkelte partier også felt i felt med meget små grønne. Meget sparsomt med alle typer kryst i sonen.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 5

Dato: 28/11-74 Sign: AA Retn.: ÷65°Ø Sted: 10608/6645 Hull nr.: 10.037

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	53,05		Den samme mørke grønne, delvis massive tuff, som over. Men nå har de spredte bånd hvor cpy opptrer, innimellom synes helt fritt for cpy		52,78-53,05	14 prøve
		54,10	Igjennom denne sammen kurgang, nå helt uten imp			
	56,74		Tuff, grønn, hard meget stedvis stål, og meget uregelmessig i båndingen. Generelt lett med q-årer og Dessuten spredt og uregelmessig imp av py og cpy. Cpy finnes anvikel i q-bånd og stedvis V/56,10-56,20.		54,10-55,00 55,00-56,00 56,00-56,74	15 " " 16 " " 17 " "
	57,70		Meget sterk imp, til dels massive malm-bånd. Tuffittisk grønn masse som synes vanlig av det man skjønt		56,74-57,70	18 " "
			Cpy opptrer i klynger og stripe sammen med + spredt grov py likeledes magnetisk			
	58,37		Samme slags imp som over, bare her med et par q-rike uholdige partier, samt bredere cpy-rike bånd.		57,70-58,37	19 " "
		58,58	Tuff, lys grønn, gamske massiv med q-årer og bånd.			
		59,00	Kalkgrønt lysgrønn og meget finkornet med tynne hvite bånd av cc.			
		61,25	Kalkgrønt + her ikke så markert cc-ak. Det skifter med tydelige tuff-bånd med cc og det ikke sjelden i enkelte partier petrologisk nå. Epidot som her sees i uregelmessig fordeling kan også tyde på at bergarten ellers består av mer mafisk stoff V/59,50 = 8%			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

4.26

Diaborlog

Dato: 28/11-74 Sign: AI Retn.: ÷65°Ø Sted: 1060/1643 Hull nr.: 10.037

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		63,30	Tuff, massiv grønn lys grønn med spredte svarte partier. Er i det hele mer svart. Kan synes som det kort er et agglomerat eller breksje som går over i en lysere lrindet tuff.			
		64,26	Tuff, mørkt grønn, grønstein massiv, og i det alt vesentlige kvartsfri med kun lysere q-rike lrind			
		67,37	Tuff, massiv grønn, gjennomsatt av meget fine bånd q- og epidotårer som viser mikro-foldlamina. Dessuten en del åre-q. Det hele er grønstein kvartsfri			
		68,07	Tuff, meget svakt skif og grønn, lysere q-rike lrind i en ellers homogen grønnmasse Skif ∨/67,60 = 16°			
	70,18		Tuff, lysere grønn, grønstein massiv og regelmessig lrindet med svake og kvartsfri tynne luker - 5-10 cm mektig. I forbindelse med de sure tynne nåler py-imp			
		72,66	Tuff av samme type som over her uten imp			
		76,34	Tuff, meget svakt skif grønn, likevel grønstein homogen meget tung og likevel hyalin grønn lrinding mellom puter av kvartsfri lrid. Imp opptrer over 1-2 cm som fine py i enkelte spredte partier Skif ∨/75,15 = 10° SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark. 1

Dato: 24/4-74 Sign: H Retn.: -90 Sted: ~~600~~ 1100K/600S Hull nr.: 10038

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.32	Tett, massiv, gansko mørk grønn og en del oppknust. Feier diskret men tydelige svare bånd			
		1.78	Grr-st massiv mørk blågrønn tendens også her til svak båndning.			
		4,97	Tett meget massiv grønngrå til grålig avsmitning av svare alle- kvarts bånding. Båndingtydelig men i det hele en svar type. En del epidot-rike partier.			
		6.21	Kalkgr-st. lys grønn og skjell skj. meget tynne kalk-rike bånd dessuten noen q-rik sa det kom se ut som dette kanskje en tuff-horisont Skj V/5.50 · 17°			
		7,19	Kalkgr st. lys grønn og finskj. Meje lettere med de kalkrike lag og ligger i lag som har i ligg av „Sydost" malmen når denne ikke har epidot.			
		7,65	Kvartsfyrisk Malmrik materiale, er meget forbasiert og ellers opptemdet med klorittiske materiale.			
	10.30		Tett, skj og grønn, gansko finlaminert og synes også Rose ~~fra~~ elongerte q-rike skyker i lange linjering. Er helt fri for cc men q finnes tett i tett også som q amygdaler. Har også en meget fin men tydelig imp av py- som spesielt er knyttet til de mest rike q-partier. Denne imp er gansko jevn fram til ca 10 m men den etter begynner mange i skog Skj V/9.30 · 17°			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 26/11-74 Sign: AL Retn.: -90 Sted: Houg/6005 Hull nr.: 10.038

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	10.90		Tuff, lysg grønn, stadig skf men mer tykke lameller i tydelig med hovedvekt på kloritiske materiale Stadig med py-imp men også med noe cpy i q-rike bånd.		10,30 - 10.90	1 prøve
	11,40		Tuff, grøn fin-k som over med q-anrigdeler og en svak py-imp i skt cpy sett. Analysert for a s.		10,90 - 11.40	2 — —
	12,75		Tuff, mer markert båndet og mørkere grønn, men meget oppknust hele veien med svak py-imp			
	14,85		Tuff mer massiv og grønn men med tydelig båndi-g og noen grove q-anrigd. Fink py tilstede overalt.			
	18,43		Tuff, skf og meget sur nærmest en q-serisitt skifer. meget tynnbandet og hele veien et en jevnt fordelt py-imp. Det er i denne imp ikke mulig å se cpy Bergarten skifre noe karakter i mellom og får mer klorit. Den siste ½-m er meget oppknust Skj V/15.25 - 13°.		14,85 - 18.00 12,00 - 18.00	3 — — 4 — —
			Q finnes også tydelig vis som små runde korn 1-3 mm. Det hele antagelig pyroklastisk lagt			
	19.29		Tuff av den mer massive grov-lamineare type med q-anrigdeler Det hele er nok gansle surt. Py-imp i små mengder.			
	20.18		Tuff, dyp grøn meget klorit-rik med uregelmessig q-bånd men hoved-vekt på kloritiske materiale Py tilstede i med meget sporadi kornagsi cpy skimtes men imp antas etter hvert.		19,29 - 20.00	5 — —

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 3

Dato: 26/11-74 Sign: AA Retn.: ÷90 Sted: 1100 OV/600 S Hull nr.: 10.038

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		21,07	Tuff, massiv og grønn, hyalin basalt			
		21,59	Gr.st. grønn massiv med enkelte q-årer. Dessuten gjennomsatt med nit-xx opp til 2mm store, uregelmessige i fasongen.	N3		
		22,42	Tuff av samme type som over.			
	25,81		Tuff som over delvis skif., men mye oppknust. Spredt py.-xx i kloritiske leddmer kjerner py i små korn. Del hele bare svakt impregnert med cpy			
	28,00		Kvartsfyr, eller q-serisitt skif tynn blandet grå med fin-py.-striper. Blir mot slutten noe mer kloritt-holdig.		25,81 - 28,00	6 prøver
	29,38		Tuff, grønn og svakt skif med enkelte tynne py-striper uten cpy. Tuffen varierer noe i karakter			
			Skif 7/28,50 = 24%			
	30,00		Meget sterke innslag av py og cpy i klorittisk gr.st. Til og begynne med (de første ca 30 cm) meget lite på cpy, senere synes det være mest py fram til 30 m. Del hele er meget oppknust		29,38 - 30,00	7 - -
31,00			Massiv, finkornet, svakt impregnert av grov py og grov blandet cpy. Sterk innslag av nit		30,00 - 31,00	8 - -
32,00			Massiv malm med tydelig bestående av grov py, kornstørrelse over cpy til å begynne med, men synes ikke å være like rik over det hele. Magnetittinnslag av alt. De siste 10 cm er noe q-rik. Oppknust.		31,00 - 32,00	9 - -

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 4

Dato: 20/11-74 Sign: [illegible] Retn.: ÷90 Sted: 11000/6005 Hull nr.: 10.033

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
33,75			Marsen malm av varierende kvalitet. Grønn grov py men det kan være noe cpy sammen med dette. Meget oppsprukket i partier.		32,00 - 33,75	10 prøver
		33,95	Tuff. svakt kloritt og lys grønn uten impr			
	36,45		Klorittskifer i mørk grønn og særdeles mye oppsprukket i deler massen oppfylt kvarts cpy i sprekker med py-xx. Dessuten også enkelte massive men små biter Samme grønn nå på cpy		33,95 - 34,83	11 -11-
					34,83 - 36,45	12 -11-
		36,67	Gr.sk. grønn, homogen og synes massiv.			
	37,21		Meget oppsprukket kvarts med utfyllende py-imp		36,67 - 37,21	13 -11-
		37,70	Tuff. massiv men noe oppsprukket, lv grågrønn og sur type			
		38,00	Dacit. meget fine lys grå biter men noe varierende farge. SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

3

Dato: 7/7/65. Sign: I.Y. Retn.: Sted: Hull nr.: 10,040

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		87,00	Hovedsakelig større båndet tuff med syr fragmenter og chlor-banding også fin banding av carbonat /qtz			
		88,90	Rel. Svakt-båndet, homogen med-korn gst med syr og carb-banding			
		89,15	Fin større båndet, chlor-skiffrig med pyrrhotin (magnetism gv) 89,00-89,15. lit Cu-impreg. assoc. med jaspis grensen.			
		89,55	Større-båndet (syr tuff fragmenter i klorittisk matr.			
		91,22	Gansisk massiv, svake til ubåndet grst.			
		91,60	Større båndet syr tuff			
		92,50	Gansisk massiv rel ubåndet grst som over (til 91,22)			
		96,44	Fine gansisk større båndet epidot-rike relativt gansisk skiffrig. Mer av 'flow'			
		97,60	Som til 96,44) men carb. banding overtar fra epidote. Svakt curpy fin svake imp. banding.			
		SLUTT.				

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

2

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10040

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	61.10		svak py imp i bandet			
	61.50		enkelte tynne bånd med mp			
	64.80		py og cp imp i bandet	—		
	65.40					
		65.55	Magnetittrik sur bergart			
		65.77	massiv gø			
		65.88	magnetittrik sur bergp. tildels ren magnetitt i band. En tynn stripe med cp, mp			
		66.65	Klorittisk bandet tuff. tuff. mere massiv mot enden			
		67.70	Jaspis brekciert med litt imp i gr. py og spor av cp.			
		67.90	Massiv bandet tett tuff. Serisitt. avol			
		68.50	Jaspis med spor av imp			
		68.60	Bandet (sure) tuff.			
		70,10	Veks mellom bandet tuff og agglom.			
		70,15	Mag-rik. banding.			
		71,75	Bandet tuff med svak, tin enkelt impreg. av Sv-kis			
		74,65	Mer chloritisk bandet tuff,			
		77,20	Enda mer chloritisk, sterk bandet tuff med mer chlor-flecer.			
		78,40	Veks mellom svak bandet tuff og lit mer massiv, homogen gst. Store kvarts ganger 77,80-78,05 med lit remob. kis.			
		80,00	Sterk bandet tuff (chlor med små syr fragmenter og banding.). Svak enkelt tin kis impregnation.			
		81,10	Garva massiv gst med noen finkorn. banding av rel. chlor-tuff Noen syr fragmenter			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 15040

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
	4520	45.80	Ryolittisk tett skaliq Aglomeratisk			
	4570		py imp svak Py Sterkt deformert med klorit i skiggen. Ekstrem epidot			
		47.40	Pseudo gabbroisk tekstur tett			
		48.60	Sur ryolittisk tett i veksling med epidot rikt svak py imp			
			Surere mot slutten			
		50.50	Ryolittisk lgr bånd			
		50.67	Keratofyr			
		50.72	Ryolitt sterkt bandet			
		51.15	Keratofyr			
		51.20	Ryolitt sterkt bandet med noe epidot			
		52.30	Keratofyr			
		52.60	Ryolittisk tett.			
		53.50	magnetitt			
		53.55	Kloritt skifer m/lt qv			
		54.20	Ryolittisk tuff Sterkt tektonisk omvandlet og silifisert. Spor av py i qv			
	55.91	55.95	Sur Pyrittholdig klorit skifer. På slutten py 0em magnetitt bånd	—		
	56.55	56.75	Klorittisk tuff. tildels massiv. en del Sure bånd. Homogen mot slutten lyse grønn fargetone			
		57.50	tuff Pseudo gabbroisk karbonat bånd			
		59.10	Tuff tildelsskifrig med enkelte sure lyse bånd mot slutten en del Syre blå fragmenter av veksende størrelse.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 7/7 - 73 Sign: ~~SLA~~ JF Retn.: 1000. Sted: Qnivetj Hull nr.: 10040

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0	Aglomerat ~~svart~~ med enkelte tynne bånd med gradvis overgang til ~~lutt~~ og dannet mer tilsvitt rik			
		6.80	vekslende tilsvitt-~~lutt~~			
		[illegible]	med avtagende			
			~~svart~~ fragmenter			
		8.50	mere kalkrik			
			med enkelte ~~rutt~~ lag			
			mindre. Eller hvert			
			mere sjeldent.			
		11.30	mere massiv enkelte			
			svarte fragmenter. Rundt			
			dette spor av py.			
		13.90	~~lutt~~ 1400 en liten			
			tektonisk brekkje			
		15.60	Sprekke med hvite			
			kjerneTap!			
		15,90	Dannelse ~~av lutt~~			
		16.40	Svart mere rykvellitt			
		19.70	~~Lutt~~ [illegible]			
			rykvitt.			
		20.20	Rykvitt			
	20.30		tynnstripet ~~av~~ imp			
		23.20	Rykvitt med epidot stripet			
		30.05	Tuff med vekslende			
			~~tilvitt~~ lag finkornig			
		31.30	Overgang til en mer ~~svart~~ ~~tuff~~ blåaktig tuff.			
			med enkelte epidot			
			og ~~kv~~ bånd			
		32.10	~~Epidot~~ rik finkornig			
			~~tuff~~			
		32.35	Epidotrikt lavvol med			
			hematitt			
		32,50	lysegrønn ~~klorittisk~~			
			~~luft~~ med en god del			
			~~svart~~. lag med			
			epidot, tuff og til			
			epidot ~~kluser~~			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

/

Dato: 9/7 Sign: OEH Retn.: Idd Sted: Gruben Hull nr.: 10042

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0	massiv rybolitt Dacitt magnetisk. med ϕkuler epidot			
		2.	Senisitt rik sone stigning Cofte nær malmen +			
		3.30	aglomerat med eire fragmenter (blå grå) svart magnetisk med kloritt epidot bånd. med enaltsrike åre			
		10.00	Blåkvarts			
		10.80	Dacitt lett.			
		11.20	Blåkvarts med noe kispis og bånd med mange litt. spr av Py.			
		11.70	Aglomerat. med gradvis overgang til meget sur. hvit gr.			
		14.30	Dacitt med gr. grå med enkelte lag med klor epi. bånd			
		16.20	Breccie m/ mat.			
		17.60	Dacittisk Andesitt ved vekslende tynne lag epidot medovergang til rybolitt vekslende sprekker m/ kloritt Zoemiert uregel messig. noe mt. kalk krystaller.			
		26	som ovenfor men mere massiv med noe mt.			
		30.20	med kloritt flekker → tuff.			
		31.00	tilbake til den mere Dacittisk enn ovenfor			
		34.30	Blåkvarts			
		34.70	Dacitt med vekslende med epidot knoller. tildels bundet tekstur			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

2.

Dato: 1/7 '75 Sign: OSH Retn.: lodd Sted: Trubetj. Hull nr.: 10042.

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		3890	Klorittskifer med rykkelitt skiver-linser med kalklinser veksler i skifrighet og med sure bånding og 40,00 sterkt skifrig 41,30 massiv tildels sur med klorittstriper 42,10 mere klorittstriper 42,60 10 cm kvarts m.m. 50,00 massiv 52,10 klorittrik 53,00 massiv			
		53.	agglomeratisk Tuff sur			
		65	massiv s			
		5590	kvarts			
		5603	Aglomerat			
5750			kisbånd i klorittrik Tuff 3cm			
		5853	Aglomeratisk Tuff			
		6000	mere finkornig - " -			
6240			tynn kis stripe 2mm			
		6340	finkornig massiv Tuff			
6340			tynne kisbånd			
		6343	mere båndet			
	6745		tett bånding med ~~Cp~~ Zn? ligger i klorittuff med sure fragmenter			
		6890	klorittuff med vekslende sure bånd og bergartene blir surere og mere massiv			
		7500	Slutt			
			Hullet er mulig noe for kort mht å nå kalkssonen. Usikkert om det er noe malm i mellom det vi har gått gi svar på (tvilsomt?)			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 22/3·76 Sign: OSH Retn.: ÷90 Sted: 14205 700 ø Hull nr.: 10043

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	15,70		lys telgisk tuff. enkelte gr. fragment ½ cm. svakt deformerte dgl. fragm.			
			svakt imp py	6	14,00 15,00	
			el. i ett. brent grønnere	7	15.00 - 16.00	
			og mer tuffittisk	8	16.00 - 17.00	
	1953		Vekslende tuff. med	9	17.00 - 18.00	
			lyse telgiske bånd og	10	1800 - 1900	
			fragmenter 1-½ cm.	11	1937 - 1953	
			py imp og noe cp.			
			Imp. synes å ligge i			
			klorittiske bånd, enkelte			
			ekte gr. fragm 2 mm.			
			lys grønn fine svakt bandet			1250
			tuff med enkelte ryolitt			
			fragmenter tildels gjennomsatt			
			av fine gr over. En kan			
		2076	se tydelige krystall flater			
			i enkelte av de store fragmentene			
	21,05		Klorittisk bandet tuff med			
			Imp. bånd disse er spes.			
			klorittiske py (+ Gl.?)	12	2076 - 2105	
		2940	Finnkornig tuff. lys grå med			
			enkelte 10 cm fragmenter av			
			Rhyolitt karakter tildels meget			
			deformert. Forekommer med			
			fragmentene tildels kraftig			
			epidot utvikling Mot slutten			
			10 cm bånd / fragmenter			
			av epidet			
			Bergarten virker etter			
			hvert mere massiv og			
			får et sterere preg			
		3470	Dacitisk gå. lys grå grå/hvit			
			med hyppige epidotrike			
			bånd. Enkelte bandet parti			
			ellers massiv gå. 34.70 Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Drt I

Dato: 22/8-76 Sign: OEH Retn.: 90 Sted: 1420 S / 700 Ø Hull nr.: 10043

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2.60	Grønn ug meget finkornig tett ~~sonegen~~ bandet tuff med noen få epi dot-gv bånd. Tildels ekstl. enkelte spiktige rester av fragmenter av tilsv materiale			1 ~ 5°
		3.64	Vekslende epidotrike bånd og tinn. tett. til å begynne med i loem skala mot slutten i mm skala. Bergarten får nærmest en klastitt flekk karakter på slutten			
		9.00	Tinnorn tuff med fragmenter av tilsv. materiale gv. anygd. ½ mm. Kant tynne gv langsg. ~~tvers~~ nærmest sprekker, blir etterhvert noe mere epidotrik. Noen få mørkere 10-20 cm bånd av mørkere bergart, men disse har uregelmig. og kamp. anyduler og virker på tross av farven å være samme bergart. I gv. åre noen få cm store py. enkelte fine mineral over i bånd langs gv. soner.			1 ~ 20°
	13.60	~~13.60~~	Vulkansk breccie med gv fylling + noe mineralisering py og ~~spor~~ imp Cp (sn?) Ellers veksling av klastitt og epidot rike partier. enkelte partier med aglomeratisk preg Ved 11.50 - 11.80 pen Cp og ellers Cp imp på 11 m. I det Cp rike partiet virker bergarten meget klastisk	1 2 3 4 5	9.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 14.00	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 23-3-76 Sign: OEH Retn.: ÷ 90 Sted: Hull nr.: 10044

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		44.20	Tekstonde kvartsitt gå og			
			Tett enkelt bånd med lyst			
			kvartsitt-Materiale med stutte			
			mere tonnagen av grønt			
			bandet. fra 46.2 en overgang			
			med også tett grønt			
			tragen.			
		46.45	lys grå granitisk bånder mikro			
			linjer som gir tonnasjen			
			tekstonde kvartsitt til			
		57.20	massiv gå med kvartsitt			
			og enkelte cylindriske			
			tunnel. gå er av og til			
			"grovkornet" og virker noe			
			porøs, med stutte tragt			
			mønster av epidot			
		57.30	tett bandet med enkelt			
			utvikling grønt, mye epid.			
		59.30	Meget epidot rik Tuff			
		59.60	Enkelt utvikling av			
			lyse tragen i epidot			
		61.39	Epidot rik tuff eller bånd			
			noe mere fasiose og vesentlig	1.	61.39-61.50	
	61.50		Impbånd i epi og kvartsitt			
			bergart bandet av			
		61.63	Epidotrik tuff tilhørs klorit			
			utv.			
	61.80		Imp bånd i epi og klor rik	2	61.63-61.80	
			tuff			
			Bandet tuff epidotrik			
			med bånd/tragen av			
			lyst materiale tilhørs gått			
			utvalet skarn helt			
			Mot slutten virker det som			
			om en kommer inn i			
			en massiv gå.			
			67.90 Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 23/3 76 Sign: O Ett Retn.: Sted: Hull nr.: 10044

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		4,1c	Grå gd massiv fint e. dolrik/klorit flekket			
			retem. Noe magnetit			
			utv. rgn epidoter			
		5,1c	Grm overgår mer til			
			mere dark og mørkere			
			med quartzen mere klorit			
			isk			
		6,1c	Exhalitt mt epidot			
			fintkornet med noen av			
			granat utvikling			
		6,5	Massiv/clastisk gd			
		6,85	Exhalitt mt epidot granat			
			fintkornet m/ noen av py.			
		7,5b	Massiv clast. gd.			
		7,62	Exhalitt			
		7,80	Massiv clast. gd			
		7,90	Exhalitt overveiende mt.			
		10,32	Grønn middelskornig			
			massiv litt mørk enkelte			
			grønnstein			
		10,60	Exhalitt som de ovenfor			
			men med en rosa farge			
		11,6c	Grønnstein som ovenfor.			
		27,87	Vekslende fullstendig gd,			
			gd og exhalitt med mt-p			
			granat-epidot, avtagende			
			granat-epidot utvikling mot			
			kvartsrik. Sannsynlig opptrer			
			det mere sure materiale			
			hyppigst enkelte steder som lag/linser.			
			lys-/falsisk grønnstein i			
			veksling med kvartsrik gd,			
			enkelte av de lagene av			
			den lyse bergarten virker			
			gabbroide i struktur tekstur			
			og er av samme type som			
		36,45	lys gabbroide gd. Herav			
			gen (i vekslig) lyse lag gir grønn			
			stein den gabbroide karakter			
			Massiv tett. Kornstørrelse			

Decreases in frag and increase much more well banded tuffite.
felsic + chlor fragm in felsic

Grey eye

- Bands of white feld lithic crystal
- Bands of Blue Qtz eye
Agglom. dark Dacite - lithic frags in dark green chloritic - feld x-tall tuff
- Bands of white feld lithic crystal
- Bands of Blue Qtz eye
Agglom. dark Dacite - lithic frags in dark green chloritic - feld x-tall tuff

Rock ar 1099 AR 2

SKOROVASS GRUBER. DBH 10.045

Målestokk 1:200

Meter

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 24/8 76 Sign: OSH Retn.: 90 Sted: Hull nr.: 10046

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2.30	KjerneTab 8 Fordbering			
		5.20	Eruptivt agglomerat av Rhyolitt			
			ikke fragmentær i tuff			
			kla mag rhyolitt i Stein 90			
			tuffitt enkelte 10 cm bred			
			med overveiende rhyolitt			
			materiale stående			
			Fotolava rhyolitt mørk grå 90			
			cm grønt med enkelte gr-felsiske			
			innsprengninger 2 m. Rhyolitt enkelte			
			i bunn av stein mag.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 24/3 76 Sign: OST Retn.: - 90 Sted: Hull nr.: 1004b

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2.30	Kjerneløs & Jordbering			
		5.20	Brecciert aglomerat av Dyrhaug			
			ikke fragmenter i tuff			
			d/a mag. rybbitt i store og			
			fuddelt enkelte lavere sand			
			med overveiende rybbitt			
			materiale stående			
			Bredava: relativ mørk grå grø			
			bergart med enkelte gr-følsike			
			amygdaler ½m. Enkelte svarader			
			i sonen er sterkt mag.-			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

H = ca 793

V

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10048

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	155,30		Overliende fattigkt malmlag	4	154 - 155,	0.01 0.43
			breksjert ? fy-cp imp	5	155 - 156	0.07 1.16
	156,30		fattig imp i gø fy	6	156 - 157	0.05 2.24
			Parti med fattig imp i	7	157 - 158	0.04 1.24
			gø.	8	158 - 159	0.02 0.83
	162,60		Veksl. fe-holdige lag	9	159 - 160	0.01 0.89
			fattigere og rikere	10	160 - 161	0.01 0.39
			conglomerat med imp	11	161 - 162,60	
			gø rike lag med fattig			120 g
		164	imp.			
			massiv gø med enkelte gråbergs lag			
				12	164 - 165	
	165,60		Fattig imp i fe-holdige lag	13	165 - 166	
		166,90	massiv gø	13	166,90 - 168,30	
	168,30		Veksl. gø og fe-holdige lag			
			fy imp Zn + spor av Cp			
		168,90	Granitt	14	168,90 - 170	
	170,60		Veksl. gø og fe-holdige lag	15	170 - 171	
			fy imp i gråbergslag fy + Zn	16	171 - 172,60	
			Veksl. gø og fe-holdige			
		172,30	fe-holdige og imp mangler			
	177,-		Svak imp i Granitt av den			
			svarte	17	172,30 - 172,75	
		181	Granitten med en mye mer			120 g
			massiv eller hvit			
			181,- Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 100 48

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			og fåe av og til et system			
			rent prøv			
		126.45	Lyst grå brekciert materiale			
			m epidot utskilling			
		127.05	Tuffittisk gå med smale			
			partall fragment blir etter			
			hvert mer massiv og			100 g
			dypere, mer homogen tuff			
			tuffittisk prøv			
		127.50	Finkrik brekcie - aglomerat			
			røy og dem mandla			
		130.70	Tuffittisk gå lys fine massiv			
			med enkelte epidott bånd			
			blir etter hvert mere			
			homogen for å gå over i			
			en			
		140.15	Massiv grå, gå, med enkelte			
			tuffittiske partier vekslen			
			mer mer overvinde grå gå			
		142.20	Vekslende gå og lute grå gå			
			og partier med klinkflekk			
		145.00	Vekslende tuffittisk gå og lute aql			
			lag og fragment som skaw			
			vekslingen over i frekvens			
			med slutten og bergartenfor	1	145.00 - 148.20	5m av 7m
			py imp			over all
	147.00		Tuffittisk aql. og tuff i			
			mellom veksling py imp			
		149.0	Grønnsvin tuffittisk lute tuff			100 g
			enkelte cc cm 1 mm)			
		150.00	Vekslende tuffittiske aql lag	2	149 - 150	over all
			med lute materiale gv og			
			cc dynne			
	151.55		Lebel tett - aql i bånd lam			
			m/ blågv enkelte bånd med			
			rik imp py cp mot slutten	3	150 - 151.55	over 1.9 impart
			mye gv - feltisk materiale			
			lam dynne lutt bånd			
		154.0	Fint tett hvit vekslende gå			
			i mellom cc cm 1 mm			

III

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 1004 8

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		86.10	Vekslende Rybolitt og tett finkornig tettfiltrisk gå. Enkelte partier med klastisk utvikling og ikke så sjeldent, tiglemeralisk preget			1 ?
		87.10	Rybolitt med enkelte tuff-bånd og partier med klastisk tett gå.			
		91.20	Fine tett svart tettfiltrisk i bånd gå			
		96.40	Fink. tettfiltrisk gå med partier med aglomeratisk karakter. Disse tvers mere aglomeratisk sterkt deformert			
	X	97.45	Samme som ovenfor, men her opptrer det store av py i imp tynne greier Grønnstein-lår etter hvert en del Calcsom mandler			
		97.80	Som ovenfor, men her opptrer det gv sammen med kalken i syrene			~09
		98.25	Grønt fleck (906. gå)			
		106.05	Massiv tett middelkornig gå med enkelte små enkelte partier med svak imp noen få cm fragm av Rybolitt mafisk tilsats mye cc			
		108.20	Aglomeratisk parti opptar imp endel ½ cm fragm. av Rybolitt			
		115.70	Massiv Tett middelkornig gå enkelte lysere tuffittiske gå. bånd cc opptil etter hvert lysere gå topp av imp ved 111			1009
		117.20	lys finkornig tett diab. gå. Hovedsakelig grønnstein cc kvarts (imp)			
		124.05	tuffittisk, blir etter hvert mer og mer tuffittisk samtidig som cc avtar			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

II

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10048

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		25.30	Blå grå gd tett homogen mer brekciert gd. Pyritsulfid etter hvert noe mere ikt på sprekk			
		31.40	Som ovenfor men har her en aglomeratisk prøv og i små partier-sprek tinnstein grov tinnst			
		38.20	Massiv gd homogen med noe spredt utvikling Som ovenfor men får en mere vekslende prøv mja åpen og ekstr			40 ?.
		51.40	Ar og til noen gorealte syre bånd blir etter hvert mere forskrenig og mot slutten får den et mer konglomerat prøv.			45 v/w
		53.70	Vulkansk breksje? Store grove fragment. kraftig spredt utvikling Grove fragment? m diffuse grenser fragmentene er store Pyritelet			
		56.10	Karakteristisk aglomerat, hydrdige strukturer. Bemerkelsesverdig godt bevarte fragmenter			
		58.00	Vekslende meget spredt kloritt flekk i veksling med tettelest gd. Dette er noe bare et spredt lag i breksjen			59
		64.30	Aglomerat og breksje i vekslende med tett tettelest gd ukelle store kom Pyritet fragmenter			20?
		70.70	Tett homogen pyritisert med mørke bånd med tettelest gd Karakteristiske spredt imp i 5mm sonen og på sprekker lesle horisont ? Til dels kraftig brekciert			
		70.95	Aglomerat kraftig med kloritt utvikling			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark I
4 2045

Dato: 27/476 Sign: OKH Retn.: Qp Sted: Boks 200 W Hull nr.: 100 48

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		2.00	Jord løsmasse			
		2.50	Quartzitt gå til grå gå breksiert med enkelte svarte korn.			
		7.70	Epidotrik gå med vekslende breksiering tildels silisifisering på sprekker i bruddet ellers hvit farge og får store mørke korn på slikk.			
		8.40	Kraftig brekssiert lys gå (kalkrik gå?) Samme mgl. en sprekkene med mørkere rødlig gråaktig.			
		10.45	Epidotrik rik gå med enkelte store tynne fragmenter som brekssiert			304
		11.80	Samme som ovenfor men mer karakteristiske mm store spetter av kalksp. dann kryst utfelling			Tynnslip prøve
		12.60	Kraftig sprekk med breksiering og gv fylling + noe epidot			
		15.05	"Rynkeskifer" gå. brekssiert og sterk mgl. virker nesten som å ha vært smuldret etter på dette rundede fragmenter. Rynkeskifer gå brekssiert med epidot rike som bånd gir over som og noen klemt bånd dekke epidot med litt brekssiert epidot inkl gå m/ rynkelitt fragmen-bånd som ellers grense til			305
		25.20	Epidotrik svakt skifrig gå svakt kalkrik			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Djaborlog

Dr. I

8325

Dato: 4/5 '76 Sign: ast Retn.: Sted: 200 W - 16003 Hull nr.: 10049

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		3.50	Aglomerat fragmentert meget fast bund meget vekslende storrelse kalk i sur → stående epidot enkelte røde fragmenter stein			5/302
		6.30	Tett tuffitt homogen med enkelte diffuse fragment			
		6.40	Aglomerat meget vekslende mulighet for massivt i enkelte deler sterkt deformert og omvandlet med mye lys epidot fragm.			
		11.25	Tett varierende tuffitt epidot rik blir etter hvert mere homogen			
		11.35	Aglomerat med svarende grad mindre fragmenter			
		12.35	Tuff mere grønne partier i tilknytning epidot utvikling får etter hvert lys som tilsynelatende trykt. men en finner forskjell sedimentær preg så vi får en diffus overgang til			
		15.60	Grønstein middelskornig noe gneis tilsatt brekciert og får på slutten et mere lagdelt preg			
		16.80	Amf. gl mørkere homogen med svak ep. utvikling middelskornig blir mot slutten fin og lagdelt			
		20.10	Skifer grå tuffitt gl tilsatt grønn på sikker og 'amfibolitt' enkelte grupper av Vekster med tuffitt gl mot slutten mørkere amf mørkere amf mineraler			
		25.00	Vekslende agl. Med enkelte band med gl lyse fragm. grønn epidott rik ep. utv. preg partier. Får mot slutten et mere fint og mørkere preg og mindre fragm			
		?				

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 6/5 76 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 10049

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		27.9	fint. gå homogen tett			5/30
			dir mer og mer kvartsitt			
			og mot skiften mindre			
			sure lag. Tynne			
		28.05	Rytmisk ? lys dag gjå			
			tett			
		30.70	vekslende gå og kvartsitt			
			gå mot ny quarter gå			
			dir mere massiv og dominer			
			endelig mot skiften noe finere			5t/20°
			og sure fragmenter			
		40.60	Massiv diabastisk gå fint			
			tett homogen noe vekslende			
			farvetoneri enkelte mere			
			rytmisk kvartsitt lag spor av imp			
			på skikk			
		44.20	vekslende diabastisk gå			
			gå tett			
		48.20	Massiv Dias gå dk tett homo			
			gen			5/20
		45.05	Dias gå. med lo om grønn			
			mest skiegr. ? amb. ?			
		52.50	gå fint tett massiv			
			vekslende gå rytmisk lag			
			Brekcje ? noe spirdat			
			skrenda over skiften			
			amf. rytmisk og en får en			
			rar gå			
		59.20	Mellomkornig tett Dia. i			
			veksling med amf. gå o			
			enkelte ny quarter Massiv			
			borgart			
		61.50	Massiv tett amf gå			
		70.10	Tynt finkornet gå klorit			
			og spredt utskilling			
			sure bånd med enkelte py			
			kom stor dir etter			
			hvert surere dia mere			
			kvart materiale for å gå			
			over i en mer rytmisk gå			
			hard til slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dok II

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: loostg

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		73.25	Kloritt-flekk gabbroaktig gø' overkrevet kontaktsone			
		77.20	gø. vekslende tettfeltet gø blir mer og mer impregnert med sulfider enkr. grad.			
		81.00	Kvartsåre 15 cm. med overgang til dasittisk gø. finkornet med enkr. hvite mineraler			
		84.20	Rybolitt fin-k. tett blabrg i partier noe mer felsitisk (kvartsfyr) & grønn mag med tettfeltet gø.			
		88.40	Porfyrisk gabbroaktig gø. gjentatt 'salt og pepper' farge egenfarg el. litt sulf. i kvartsfyr eller fk. aglomerat enkelte cm.-5 mm frag.			
		89.80	Aglomerat Samme som overlyr men rikelig med fragment som granitt/s avtar mot slutt.			
		91.70	Rybolitt. i vekslin Samme type, salt&pepper. aglomerat som overlyr med noe veks. overg. til rybolitt-kvartsfyr hvit-blå fk			8/15
		96.60				
		97.90	Salt&Pepper uten fragm.			
		99.70	Rybolitt-kvartsfyr hard m/ dråsten rødmaut? rom. sprekk-sone.			
		101.80	Litt av SØT type som blir mere felsisk men mot			OP/15
		106.70	Aglomerat og felsisk litt i vekslinq			
		112.20	Rybolitt og sur tuff i veksling felsisk litt mot slutten			
		119.20	Aglomerat som overlyr som etter hvert går over i felsisk tuff			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dr. IV

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10049

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		125,30	Felsisk tuff som etter blir mer finkornig i mørke typer og aglomeratiske lag, ellers eir bergarten å karakterisere som en dac.			
			Siste 10 cm. SB? med ca dype 0,5 m.			
		129,90	Vekslende finkornig gd og dac gd med enkelte mylonittiske fragmenter. Feltelava ? I siste stuff ressett.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 16049

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		133,3	Vekslende dac tuff og kloritisk gø tildels aglomeratiske partier blir etter hvert mere homogen dac tuff. og med gradvis overgang til dacitt.			
		135,60	Massiv middelskornig gø som blir surere ytterst påvirkning som ogsa gir gradvis over til massiv gø. Ang. gø. mork tett homogen. denne synes også å være sterk porfyrisk			
		144,90	Dacitisk lys massiv fank. gø. noe porfyrisk Skarp overgang mot gv omvandling.			
		148,95	Aglomerat og vekslende tuff spilitt og nyhetitt inkl bånd 1mm felsittisk rundt syne mot slutten mere kloritisk karakter inkl Massiv fint tett dacitt med noen små nyhetittiske bånd (mindre enn) med overgang til			
		160,2m	Vekslende porf-tuff gø tildels klorittisk med nyhetittisk lag (2cm) noe gv sprekefyllinger siste omvandling. blir etterhvert mere homogen og tett mot slutten karakteriseres som tuffitisk gø			
		170,2	Samme som ovenfor men er her blitt aglomeratisk			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 100249

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			og vekslende mot gr ryolittbånd dominerer i bånd veksling 2-5 cm mot skiller intens gj.sammensatt av gr årer disse dominerer tjernen ved 170 hvor gr har enkelte pg grenser. I denne gr rik partier gar grensen mellom tuffen og			5/10
		171.80	Overvekt tuff vekslende med gr/hvitsk gå ??: av bredsidt og smalere med tilgang på gr.			
		172.40	tuffering gå med ½cm gr amygdaler			
		172.45	Tynne magnetitt i vekst. til slutt SB? med mr imp tynne bånder			
		176.70	Vekslende tuff med enkelte cm mg bånd og tynne bånd med mr mc gr. som mønster 5-0.1 mm. B Som bånd med blå gr. Some begynt men med imp og spor av gr			8/10
	179.30	179.20	imp i bånd felsisk	1	176.70 - 177.70	
		182.00	gr cm/ cm tuff	2	177.70 - 178.70	
		184.10	tynne tuffbånd mye gr	3	178.70 - 179.35	
			uten imp som går over til mørkt / kvartsbyr	4	182.10 - 184.-	
			med overgang til vekst	5	184 185	
			tuff med grønn tag	6	185 186	
	189.00		vekslende tuff felsisk lag	7	186 187	
			med imp cm bånd uten	8	188 189,40	
			imp tildels gjennomsatte bånd hvor disse opptrer tynn imp			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

VII

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10064

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Hildeks grov op kloser og			
			py imp			
		190,90	Tuffitisk gø med enkelt	9	190.90 - 192	
			svare lag	10	192 - 193	
	214-		Vekslende svart-grønnsk tuff	11	193 194	
			med imp forkerning mye	12	194 - 195	
			py oper av op etter hvert	13	195 - 196	
			op ikke lenng (pm!)	14	196-197	
			I ponter en del av	15	197 198	
			oppe Zinn i partier	16	198 - 199	
			kan bergarten være noe svar	17	199 200	
			ere	18	200 - 201	
				19	201 202	
				20	202 203	
				21	203 204	
				22	204 205	
				23	205 206	
				24	206 207	
			bergarten blir mer	25	207 208	
			klastisk mer klastisk	26	208 209	
			sammenlig synes nå	27	209 - 210	
			imp også å opptre	28	210 211	
			i klastiskene	29	211 212	
		216,50	Vekslende ~~klastisk~~ Massiv middels	30	212 213	
			kornig gø med gr og	31	213 214	
			felsiske amygdaler	~~33~~	~~215~~ 2	
				32	216.50 - 217	
		220,50	Vekslende felsisk og	33	217 - 218	
			klastisk tuff imp i	34	218	
			dragge	35	219 220.50	
			lys grovkornet gø hvor	36	~~220~~	
			gen a-imp gr oppe	37	222 - 223	
			diffus overgang (delvis	38	223	
			på kjernene	39	224	
		227,50	Vekslende tuff klastisk	40	225	
			- felsisk . bånd med	41	226	
			pen gr py imp	42	227	
				43	227,50	
		230,50	Vekslende klastisk tuff			
			- massive bånd trekvart			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

VIII

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: Loolog

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			fra 230 dybel på			
			kjernen og vanskelig å			
			legge.			
			Vekslende sedimentær kalk			
			~~forsteinet~~ kalk sport av			
			grønn mg inkl på sprekker			5/20
			over 1 cm.			
			236.20 kalk			
			Skifter kan(?)være			
			sollen som er gått over			
			til en sprøst			
			Generelt så består			
			hullet av sure bergarter		i forhold til Loolog	
			Opptrer de første	100	metre	
			Det synes som om bergartene			
			er silisiserte. Ryolitt bergrunnet			
			er noe vanskelig å kontrollere idag			
			med at det har tendens til å			
			spalte på en måte lignende som			
			~~opptrer~~ som massiv og som en			
			vesentlig tett bergart			
			Galt og Pepper rett ~~i~~ igjennom			
			ikke bra av. ~~Her~~ må det tjene			
			Slip til.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10050

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Hullet ble boret ~30 m i '76 og vil bli gjennomført '77			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

IV

Dato: 14/06/79 Sign: IØ/CSH Retn.: -90° Sted: S GRØFUET Hull nr.: 10050

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		218.0	MASSIV FIN TIL MIDDELS KORNIG			
			AND. STRØM			
		210.30	OVERVEIEN TIL BLÅKV - JASPIS			
			(prøve) EKSHALITT, NOEE + SIDERITT			
		221.70	DIFFUS OVERGANG (20 cm) FRA			
			TIDLIGERE AND STARM TIL FINK.			
			MASSIV STRØM NOE MALMFØ			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

IV

Dato: 14/06/77 Sign: IØ/OSH Retn.: -90° Sted: S GRØFELLET Hull nr.: 10050

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		213.0	MASSIV FIN TIL MIDDELS KORNIG			
			AND. STRØM			
		214.50	OVERGANGEN TIL BLÅNV - JASPIS (PRØVE)			
			EKSHALITT, NODER + SEDIMENT.			
		221.70	DIFFUS OVERGANG (20cm) FRA TIDLIGERE			
			AND STRØM TIL FINKORNIG MASSIV			
			STRØM. NOE KALKSPIS.			
			SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

III

Dato: 14/04/79 Sign: IF Retn.: - 90° Sted: SKOROVAS Hull nr.: 10050

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		151.25	DEFORMED CHLORITE / DARK BROWN/BLACK			
			SERICITIC EXHALITE / SPECIMEN TAKEN			
		151.40	CATACLASTIC ANDESITE WITH QTZ-CARB			
			VEINLETS			
		151.60	DEEP PURPLE JASPEROID WITH 5 cm TOP			
			OF VARIOUS BRECCIATED EPIDOTISATION			
		154.70	ANDESITE WITH A THIN (10 cm) BAND OF			
			DARK-GREEN LINDGREY QTZ/CARB			
			VEINLETS PERVASIVE.			
		157.05	FINE-MED GRAINED QTZ-CARB TUFF			
		157.30	BANDED DARK SERICITE WITH FINE			
			PY IMP BAND.			
		157.35	TUFF AS TO 157.05			
		158.50	EXHALITE AS TO 157.30			
		158.70	TUFF AS TO 157.05			
		158.10	BANDS OF SERICITE AS TO 157.30			
		162.45	FINE-MED GRAINED TUFF (AS TO 157.05)			
		163.30	ANDESIV AND-ORE MED THINN TUFF-LOG			
		165.03	SOME RUK I FINK CF. NOEN MAGNETT			
			BAND OG YO A PYR			
		170.00	AND STROM MED ERODERT OVERFL /			
			UVIKLINGER. ENKELTE DACITISKE			
			FRAGMENT. VEKSLER I SYRENET.			
			BLI HER SUR TIL SLUTTEN.			
		193.05	SVAK BANDET TUFFER RIK I FINK			
			ERODERT			
		194.20	LYSI FARVET KLOR-FCCHL. TANG TUFF			
		196.50	SVAK BANDET TUFF SOM FOR. SISTE			
			HAL M. EK MED MORKOMERATISKE			
		197.50	MAG. (SVAK) MORK SERIC. HORISONTER			
			(3) CA. 15-20 MAK. PY IMP PÅ BANDET			
			AV KLARE SONE.			
		197.85	SVAK BANDET TUFF			
		197.97	EXHALITT SOM FOR.			
		198.35	AND. STROM.			
		198.45	VEKS. AND. STROM OG SERISITTSKIFT.			
		200.50	AND. STROM MED ENK DACITISKE			
			FRAGMENT - GRONN FARVE			
		202.80	And STROM MEN BLAU FARVET, MED			
			NOK TYDELIG BLEKKER			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

II

Dato: 13/06/77 Sign: I.H Retn.: -90° Sted: S Hull nr.: 10050

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		91,07	FINE GRANULAR BASALTIC ANDESITE RICH IN GROUNDMASS EPIDOTE. WEAK IMPREGNATION IN BAND ~ 90.80.			
		91.25	QTZ VEIN.			
		94.45	CHLOR TUFFS WITH HIGH EPIDOTE CONTENT AS FRAGMENTS WITH FINE QTZ-CARB 'EYES' AND AS VEINLETS WITH QTZ. DEFORMED PYRITIC IMP IN THIN BANDS 91.25 - 91.35			
		109,60	FINE TO MEDIUM GRANULAR BASALTIC ANDESITE RICH IN GROUNDMASS EP + EP. KNOTS + VEINLETS. CONTAINS ZONES OF AMYGDALES either 1) large QTZ-FILLED or 2) 1-2 mm EPIDOTE-FILLED GRADING DOWNWARDS TO ANDESITIC COMPOSITION, WITH INCREASE IN SIZE OF EPIDOTE KNOTS (TO 30 mm)			
		109.55	DACITIC AGGLOMERATE W/CHLOR TUFF MATRIX			
		110.80	FINE GRAINED CHLOR-TUFF.			
		111.00	IP PURPLE JASPEROID - SPECIMEN TAKEN			
		111.60	DACITIC AGGLOMERATE.			
		112.40	F.GRAINED CHLOR TUFF WITH FEWER DACITIC CLASTS.			
		113.10	COARSE-GRAINED (SHEAR TEXTURE) INTERMEDIATE LITHOLOGY.			
		117.85	SHEARED ANDESITIC TO BASALTIC ANDESITES.			
		141.80	FLATTENED AGGLOMERATE + CHLOR. TUFFS WITH IMPREG. BAND 118.02 - [illegible] DACITE [illegible] F.GRAINED CHLOR-TUFF (MASSIVE) DACITIC TUFF BRECCIA NEAR TO STRONG			
		150.20	FINE GRAINED EPIDOTISED (+ VEINLETS + KNOTS) TUFF CONTAINING LARGE FRAGMENTS OF WEAKLY MAGNETITIC DACITE.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

I

Dato: 13/06/77 Sign: IM Retn.: -90° Sted: S. GRUBFJELL Hull nr.: 10050

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		30.80 to 52.90	RELATIVELY HOMOGENEOUS, MASSIVE ANDESITIC BASALT TO ANDESITE OF FINE TO GRANULAR TEXTURE, RICH IN EPIDOTE BOTH IN GROUNDMASS AND AS STRINGS. LOCAL FINE STOCKWORK VEINING, LOCAL MED-GRAINED IMP OF PY + PYRRH. INCREASING EP VEINING TO 52.0			
		53.95	FINE-GRAINED BROAD BANDED TUFFS OR ALTERED LAVAS.			
		69.80	ANDESITE OF GRANULAR TEXTURE WITH ABUNDANT EPIDOTE VEINLETS (AS TO 52.90)			
	69.90		A BAND OF DEFORMED PYRITIC IMPREG WITH EP/CHLOR			
		73.50	COARSE GRANULAR, LIGHT OLIVE-GREEN EP-POOR LITHOLOGY - PROBABLE TUFF HAVING A RELATIVELY SHARP CONTACT WITH:			
		80.20	FINE GRANULAR BASALTIC ANDESITE RICH IN GROUNDMASS EPIDOTE, WITH SPORADIC EP VEINLETS. HORIZONS WITH QTZ-EPIDOTE FILLED AMYGDALES. THIN BANDS OF PYRITIC IMPREGNATION AT 78.30 (2 cm), 78.90 (4 cm)			
		80.70	FIN TIL MID. KORNIG OVERGANG FRA AND. BAS. TIL AND-DAC. 1 CM IMP PYRITT BAND PÅ SLUTTEN.			
		87.70	FIN TIL MID. KORNIG DACITT STROM MED ENKELTE BLÆRER. RIK PÅ FINK. EPIDOT.			
		88.35	ENDA EP-RIK ANDESITT, MED V. TYNNE SEDSILIKAT-QTZ-EP BAND PÅ GRENSEN MED:			
		89.70	DACITT SOM FØR, MED DIFFUS OVERGANG TIL: (se over)			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

III

Dato: 14/06/79 Sign: IY Retn.: -90° Sted: S GRUBEFIELL Hull nr.: 10050

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		151.25	DEFORMED CHLORITE / DARK BROWN / PURPLE			
			SEDSILICATE EXHALITE / SPECIMEN TAKEN			
		151.40	BASALTIC ANDESITE WITH QTZ-CARB			
			VESICLES			
		151.60	DEEP PURPLE JASPEROID WITH 5 cm TOP			
			OF VARIOUS SEDSILICATES, EPIDOTISATION			
		154.80	ANDESITE, WITH A THIN (10 cm) BAND OF			
			CHLOR-FLECK LITHOLOGY. QTZ/CARB.			
			VESICLES ABUNDANT.			
		157.05	FINE-MED. GRAINED EP-CARB TUFF			
		157.30	BANDED DARK SEDSILICATE WITH FINE			
			PY. IMP BAND			
		157.75	TUFF AS TO 157.05			
		158.50	EXHALITE AS TO 157.30			
		158.70	TUFF AS TO 157.05			
		158.80	BANDS OF SEDSILICATE AS TO 157.30.			
		162.45	FINE-MED GRAINED TUFF (AS TO 157.05)			
		163.30	MASSIV AND-DAC MED TYNNE TUFF-LAG			
		165.03	SONE RIK I FINK EP, NOEN MAGNETI-			
			BAND OG SVÆR PY.			
		170.00	AND STRØM MED EPIDOT BOLLER /			
			UTVIKLINGER. ENKELTE DACITTISKE			
			FRAGMENT. VEKSLER I TURBIDITT,			
			BLI MER SUR TIL SLUTTEN.			
		193.05	SVAK BANDET TUFFER RIK I FINK			
			EPIDOT			
		194.20	LYST FARVET KLOR-FLECK. JANS TUFF			
		196.50	SVAK BANDET TUFF SOM FØR SISTE			
			HALM ER MER AGGLOMERATISKE			
		197.50	MAG (SVAK) MØRK SEDSIL. MORSONITER			
			(3) ca. 15-20 cm MAK PY imp PÅ BUNNEN			
			AV KVAR SONE.			
		197.85	SVAK BANDET TUFF			
		197.97	EXHALITT SOM FØR			
		198.35	AND STRØM			
		198.65	VEKS. AND STRØM OG SEDSILIKAT			
		200.50	AND. STRØM MED ENK DACITTISK			
			FRAGMENT. – GRØNN FARVE			
		202.30	And STRØM MEN BLÅ FARVET, MED			
			NOK TYDELIG BLÆRER.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

II

Dato: 13/06/77 Sign: I.H. Retn.: -90° Sted: S. Hull nr.: 10050

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		91.07	FINE GRANULAR BASALTIC ANDESITE RICH IN GROUNDMASS EPIDOTE. WEAK IMPREGNATION IN BAND - 90.80			
		91.25	QTZ VEIN.			
		98.45	CHLOR TUFFS WITH HIGH EPIDOTE CONTENT AS FRAGMENTS WITH FINE QTZ-CARB EYES AND AS VEINLETS WITH QTZ. DEFORMED PYRITIC IMP IN THIN BANDS. 91.25 - 91.35			
		107.60	FINE TO MEDIUM GRANULAR BASALTIC ANDESITE RICH IN GROUNDMASS EP + EP. KNOTS + VEINLETS. CONTAINS ZONES OF AMYGDALES either a) large QTZ-FILLED or b) 1-2mm EPIDOTE-FILLED GRADING DOWNWARDS TO ANDESITIC COMPOSITION, WITH INCREASE IN SIZE OF EPIDOTE KNOTS (TO 30 m.)			
		109.55	DACITIC AGGLOMERATE IN CHLOR TUFF MATRIX			
		110.80	FINE GRAINED CHLOR-TUFF			
		111.00	3" PURPLE JASPEROID - SPECIMEN TAKEN			
		111.60	DACITIC AGGLOMERATE.			
		112.40	F.GRAINED CHLOR TUFF WITH FEWER DACITIC CLASTS.			
		113.10	COARSE-GRAINED (SHEAR TEXTURE) INTERMEDIATE LITHOLOGY.			
		117.25	SHEARED ANDESITIC TO BASALTIC ANDESITE.			
		146.80	FLATTENED AGGLOMERATE + CHLOR TUFFS WITH IMPREG BAND 118.07. RAPID VARIATIONS BETWEEN COARSE DACITE FRAG. AGGLOMS. AND FINE GRAINED (CHLOR-FLECK TYPE INCLUSIVE) CHLORITIC TUFF. BANDING NEAR TO STRONG			
		150.20	FINE-GRAINED EPIDOTISED (+ STRINGS + KNOTS) TUFFS CONTAINING LARGE FRAGMENTS OF WEAKLY MAGNETITIC DACITE			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 12/06/77 Sign: I.F/OSH Retn.: -90° Sted: S. GRUBEFELT Hull nr.: 10050

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		~~70.80~~ to 52.90	RELATIVELY HOMOGENEOUS, MASSIVE ANDESITIC BASALT TO ANDESITE OF FINE TO GRANULAR TEXTURE, RICH IN EPIDOTE BOTH IN GROUNDMASS AND AS STRINGS. LOCAL FINE STOCKWORK VEINING LOCAL MED-GRAINED INF OF PY + KYRAN. INCREASING EP VEINING TO 52.9			
		53.95	FINE-GRAINED BROAD BANDED TUFFS OR INTERCALAMS			
		69.80	ANDESITE OF GRANULAR TEXTURE WITH ABUNDANT EPIDOTE VEINLETS (AS TO 52.90)			
	69.90		A BAND OF DEFORMED PYRITIC IMPREG WITH EP/CHLOR			
		73.50	COARSE GRANULAR, LIGHT BLUE GREEN EP-POOR LITHOLOGY - PROBABLE TUFF HAVING A RELATIVELY SHARP CONTACT WITH			
		80.20	FINE GRANULAR BASALTIC ANDESITE RICH IN GROUNDMASS EPIDOTE, WITH SPORADIC EP VEINLETS HORIZONS WITH QTZ-EPIDOTE FILLED AMYGDALES. THIN BANDS OF PYRITIC IMPREGNATION AT 78.30 (2cm), 78.90 (4 cm).			
		80.70	FIN TIL MIDDELS KORNIG OVERGANG FRA AND-BAS - AND-DAC. ET BAND (1cm) pyrit PÅ SLUTTEN.			
		87.70	FIN TIL MID. KORNIG DACITT. STRØM MED ENK. RUBÅE. RIK PÅ FINK EP			
		88.35	ENDA EP-RIK ANDESITT, MED V. TUNNE SEDSIL. BAND PÅ GRENSEN MED. (+52-EP)			
		89.70	DACITT SOM FØR MED DIFFUSE OVERGANG			
		&	~~Kisse~~ TIL.			
		~~89.70~~				

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10051

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	(192)	1	Imp avtar 191 helder tørket	19	190 - 191	
			noe av imp sport av Zn	20	191 - 192	
			forekiske lag i tuff også	21	192 - 193	
			forekiske ½ cm fragmenter	22	193 - 194	
			fra 196 196,2 av bergarten	23	194 - 195	
			svakt klorittisk og kjernen	24	195 - 196	
			oppsprukket og kvarts	25	196 - 197	
			ellers forvasst forekst tuff	26	197 - 198	
			Det synes nå som om	27	198 - 199	
			imp er knyttet til de	28	199 - 200	
			klorittiske lag erfaringen	29	200 - 201	
			tilsier da Zn. Ag i tuffe	30	201 - 202	
			og klyser	31	202 - 203	
	(204,2)	209,0	Tuffittiske med lag av	32	203 - 204.	
			forvasning (gabbrisk gå	33	204 - 205,30	
			ASP?) agglomerat			
	212,05	211	Tuffittisk gå. agl. svak			
			imp i sand ny mT	34	209 - 210	
			Vanskelig å trekke ikke gå	35	210 - 211	
			2-3 tynn imp mens 5% end.	36	211 - 212	
			avtagende imp	37	212 - 213	
				38	213 - 214	
				39	214 - 215	
				40	215 - 216	
				41	216 - 217	
				42	217 - 218	
				43	218 - 219	
				44	219 - 220,05	
		230.6	Vekslende tuff av Gamme agl.			
			Tynn imp tid som imp			
			Denne svak opptredt inn			
			Sammen med kalken			
			Kalk er ellers temmelig sterk			
			på sprekk + enkelte mm 15 cm			
			store fragmenter av agl			
			tuff med skifter			
			230.6 slutt.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 1005/

Kis	Imp.	Berg	Beskriveise	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		169.70	Klorittskifer som er over			
			blandet med felsisk bånd			
			spor av kis mye			
		163.50	Grønnstein dårlig kvartsrik			
			finkornet bånd med klorittisk			
			noget breksjert og silisifisert			
			sone av mye			
		166.70	Massiv gå fine enkeltkrystaller			
			med litt kvarts			
			Felsisk tuff med imp			
	173.73		over mye og noe gp spor av Zn	1	168.20 - 170	•
			Økende mengde svartskifer	2	170 - 171	•
			fra ca 5% - 35% noe varierende	3	171 - 172	•
			i lagt olje på sjeringene	4	172 - 173	•
		174.20	Av sterkt skyllig sterkt av	5	173 - 176.23	•
			rømte gp. dårlig gp. med			
			brekkjerte kvartsårer			
			brekkje kvartsårer noe mindre			
			gp men økende klorittisk			
			fragmenter etter hvert overgang			
			sone med mørk svak mg skifer	6	176.23 - 176.54	•
			bånd av båndet			
181.05			Massiv kis gp rik over - Middels			
			kornig med enkelte gp årer	7	176.54 - 177	•
			fragmenter klorittisk	8	177 - 178	•
			1:179.16 - 179.20 "mål" klorit	9	178 - 179	•
			rik tuff	10	179 - 180	•
	187.74		God imp spor py gp i felsisk mf	11	180 - 181	•
			klyser og Zn i bånd	12	181 - 182	•
			meget god sone 182 - 183	13	182 - 183	•
			imp veksler mot 183 synes	14	183 - 184	•
			svak men har spor av gp	15	184 - 185	•
		188.75	Lys felsisk krystall fint	16	185 - 186	•
			noe vekslende med tuffbånd	17	186 - 187.74	•
			lag	18	187.5 - 190	•
	204.30		God imp i felsisk tuff			
			gp spor av Zn			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

D. 4 III

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 1005 1

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
			med sluttin SEP			7/11 9
		94.20	Tett middlkorning dio gø Hovregen. (dikes grense ogø dikel tils)			
		102.30	Eglomeratiet tett feldisk breksjert med partier av dac gø dikert trekkes i partier før ette brent dkende klorått og epidot bånd av feldisk innhold dkende epidot fra cm til centidig som en-før fragmenter av Rymatt innhold enkelte Tinduriner til klorått fjekk fra 115 i en bånd med Rymatt og antydning til SEP.			
		125.00	Som ovenfor men her med mindre bånd med klorått fjekk			
		129.40	Rymatisk breksje med spor av epidot, tilfører konsentrasjon tiltar gø			
		131.30	Massiv grc rymatt - rymatisk gø			
		141.50	Tuffittisk gø/ Dacen tjenom vanskelig å beskrive i detalj.			
		146.20	Dac gø breksjert tilfjørt			
		146.00	Tuffittisk gø av vekslende type noe epidot			
	147.15		rymp i midtlitet gø	0.	147.0 - 147.30	
		157.30	Tuffittisk gø enkelte lure fragmenter med sluttin mere hovregen og massiv med enkelte klorått rike partier, og enkelte dreg mente av samme materiale breksjert.			
			Tett med bånd av and mat med 1 cm feldisk omvandlet lis			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 1005/

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		68.9	Vekslende dac gå med			
			elvestrøk gå enkelte			
			cyanitførende band			
			lenser sjelvmerat - brekkiert			
			lint materiale mot			
			skiftlin vanse ord. gå			
			SØ?			
		69.0	Quartz (kvartsgr.)			
			band ord. dac med skiftlin			2/2.9
			sinkblende rosina band			
			er sammenvand på skiftlin			
		70.25	Grabbro grader mot			
			lys SØ på tv. tom vare			
			Tuff dens av omv. til SØ			
		66.30	Tuffitisk gå med ogle			
			merat og tidvis massive			
			partier av gd. Lokalt			
			omvandlet Silisifiert			
			en ha. av og til mistar et			
			keratofyrisk utseende			
		69.70	Som ovenfor men dun			
			lar noe mer rustet måtrix-			
			ale av ovb. type dun			
			og kvartsåren går over i mer			
			massiv ovb. partier			
			Skiftlin er preget av			
			felsisk materiale			
		76.30	Dacittisk tuff med ogl			
			band hvert felsisk, mindre			
			pg gulstri lysme band av			
			mørkere materiale			
		78.70	tuffig vekslende dac felsisk			
			tuff og skiftlinske band			
			det siste dominerer mot			
			skiftlin og tamlidig blir			
			dunne mer massiv			
		85.25	Massiv fink dac gå lys			
			med enkelte mørke band			
			lysme			
			Vekslende grå grå tuff			
		90.75	og skiftlike sem. Lagmuler			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

H 829

Dato: 19/6 76 Sign: [illegible] Retn.: 190 Sted: Hull nr.: 10051

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1160	Epidot it gå i vekslende			
			tildels forholdsvis forekommer			
		9.30	Vekslende dm gå over			
			gå med epidot rike par			
			tier øverste, andel avt.			100° =
			avtar ny mot bunnen			Økonomisk
			deer av ny pegmatitter			
		20.60	Brekkiert agglomerat			
			epidot og ny kvarts			
			i tuffbregt i store par			
			tier mot nyholdt materiale			
			Gar over til noe som			
			kan være en spaltig rest			
			av en breccielava med			
			meste store massive			
			lag av and gå i meste			
			typene kanon med epidot			
			i karakter mot epidot			
			rett mot slutten av tuff			
		3.6 42	Vekslende gå tildels ujevnt			
			overveiende fine tett			
			kornede, massiv dac			
			type			
			Vekslende gå tuffittisk			
			med andre i partier			
			kvarts etter brudt sm			
		29.45	slutten epidotisk			
		29.40	Forholdet 90 med epidot			3: 4 av
			rike partier avtar ny			[illegible]
			gneiser på dyp			
			2 Diab på kjernene			
		39.60	kvartsfylt langsgående			
			sprekker lik omvandling			
		42.50	vekslende gå tuffittisk partier			
			med 'salt og pepper' m. mørkere			
			gå ned i ikke ujevnheter at små dioritt			
			amygdaler holt på slutten			
			en exhaust med ut ny			
			epidot dyp.			
		52.30	Vekslend keratofyr-dac			
			gå med klorittiske partier			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 24/08/96 Sign: Retn.: Sted: FINKJEERINGSHULL Hull nr.: 10052(2)

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		to 65.85	Strongly fragmental as previous			
		-69.00	Predominantly broad banded as previous			
		-70.55	ep. dd/sed strongly fragmental.			
		-71.05	Silicified fragmental.			
		-72.00	andesitic fine grained "massive"			
		-77.80	Variably epidotized strong fragmental with abundant late Mn. carbonate veinlets			
			73.85 - 75.20			
		-82.45	Predominantly broad banded with chlor fleck 81.10 - 81.25. Higher silica (to dacite 81.60 to 82.15 with weak py. impregnation 82.15.			
		-84.05	Strong fragmental			
		-86.10	Broad banded with gradation to dacite 85.50 - 85.60			
		-86.50	strong fragmental, grading to:			
		-87.05	dacite, grading to			
		-87.50	strong fragmental, grading to			
		-89.15	Relatively light grey green chlor fleck tuff, gradational over to			
		-90.05	mixed chlor-fleck AND broad banded			
		-92.85	Broad banded with local tendency towards rel strong fragmental			
		-93.90	Predominantly broad banded with sparse local but increasing fine py impregnation	1	92.90 - 99.90	
			A small chlor-fleck (tuff) horizon 97.45 to 98.05 with gradational contacts.	2	99.90 - 100.90	
	-101.80	-	Weak but persistent and evenly distributed fine py impreg. in the matrix of strong fragmental	3	100.90 - 101.80	
		-102.80	Generally f.grained broad banded with weak evenly dispersed py impregnation			
	-104.80		Weak py impreg. as to 101.80, on rims - in matrix of broad banded fragmental			
	-108.30		Stronger py impreg in dacite? pyroclastic			
	-109.15		As 102.80 to 104.80.			
	-109.60		As 104.80 to 108.30 with particularly dark band 109.50 - 109.60			
	-110.20		Predominantly as 102.80 to 104.80 but with strongly dd band 110.05 - 110.10			
	-120.05		Acid pyroclastic with rel strong py. impregnation, chloritic band 112.20 - 112.35			
	-120.45		Strongly sericitised rel. light green ? tuff with local large py (cubic, porphyroblastic) and abundant Mn carbonate i.e. deeply dipping (45°) schistosity.			
	-122.80	-	Fine to med grained tuff, the first 1.20 of which is included in the previous			
			sericitised zone with steep schistosity and abundant Mn carb. Granularity and occurrence of epidote as arrows increasing downward			
	end		Strongly epidotised moderate flow banded with common large limps of colourless to			
	(132.0)	-	pillet chert (122.60, 124.30, 124.80, 126.10 128.0, 129.0.			
			Ends with 4.20 m granular epidote rich facies cont. round chlor fleck + chloritic fragments - = tuff flow.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 24/08/76 Sign: OF Retn.: 20° W Sted: FINNJERRINGHULET Hull nr.: 10052 (1)

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0-2	ANDESITE DACITE with abundant fine veinlets of			
			qtz-carb, carb + fine meta chloritic clots			
			increasing toward 2, with evident decreasing SILICA.			
		-3.90	FRACTURE BRECCIA IN ANDESITE DACITE			
		-5.10	DACITE: with abundant qtz veins and V. weak evenly dispersed ∨ IMPREG. + thin fragmental tuffaceous band 5.10-5.20			
		-7.95	AND DACITE: Banded, commonly appears slightly brecciated, with qtz eyes.			
		-8.75	Strongly fragmental: pyroclastic AND-DACITE local development of qtz. eyes.			
		-9.08	AND DACITE. BANDED, AS 5.10-7.95			
		-14.50	Strongly fragmental, probably pyroclastic AND-			
			DACITE TO DACITE FRAGMENTS IN DARK CHLOR MATRIX. RARE WEAK PYRITIC IMPREGNATION +			
			local development of quartz eyes.			
		-15.05	AND DACITE, Broadly banded with fine mm. chlor clots as ∼ 2.			
		-15.40	DACITE RHYODACITE MASS. FINE GRAINED.			
		-17.10	AND DACITE Broad banded, AS. 14.50-15.05			
		-17.50	[redacted] Grey mag. poor chert			
		-22.08	ANDESITE, comparatively green colour, with fracture breccia AS 20.15. Abundant			
			fine-mm qtz-carb veining with remobilized Sulphides (Pyrite) Contact from dacitic horizon.			
			21.85 to 22.08 is relatively basic, chloritic with fine mm veinlets.			
		-22.80	DACITE-RHYODACITE AS. 15.05 to 15.40			
		-26.20	ANDESITE-DACITE Broad banded AS 14.50-15.05 becoming homogenous and small pipes from 25.50.			
		-27.45	Strongly fragmented AS 9.08-14.50			
		-30.45	AND-DACITE - AS. 14.50-15.05			
		-30.65	Strongly fragmental AS. 9.08-14.50. WEAK HOMG. PY. IMPREGNATION.			
		-31.20	AND-DACITE - AS. 14.50-15.05			
		-34.00	Strongly fragmental AS. 9.08-14.50 weak zonal Py impregnation.			
		-34.65	∼ XTAL TUFF + MAG. OCTAHEDRA (SMALL cg PIPPER) somewhat gradational contacts.			
		-50.85	Strongly fragmental AS 9.08-14.50 with some xtal. tuff local weak Py imp.			
		-51.85	Broad banded AS 14.50-15.05			
		-52.15	Strongly fragmental AS 9.08-14.50			
		-53.50	Strongly epidotized fragmental with dacitic clasts			
		-55.40	Broad banded AS 14.50-15.05			
		-55.85	fragmental (epidotized) followed by 23-24 cm xtal. tuff (S+P)			
		-57.00	Strongly fragmental AS 9.08-14.50 with large banded pipper (S+P), ending with 35-40 cm of mixed xtal. tuff and dacitic fragments			
		-61.45	Broad-banded AS 14.50-15.05			
		-61.85	Strongly fragmental with AS. from green ∼ xtal tuff 61.60-61.85			
		-62.30	Broad banded AS 14.50-15.05			
		-62.66	Strongly fragmental with weak but			
		-63.00	Broad banded AS 14.50-15.05			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 24/08/96 Sign: Retn.: Sted: FINKJERRINGHULLET Hull nr.: 10052(2)

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		to 65.85	Strongly fragmental as previous			
		-69.80	Predominantly broad banded as previous			
		-70.55	epidotized strongly fragmental			
		-71.05	bleached fragmental			
		-72.00	andesitic fine grained vesicular			
Mn		-77.80	Variably epidotized strong fragmental with abundant late Mn.carbonate veinlets 73.85 – 75.20			
		-83.45	Predominantly broad banded with chlor fleck 81.10 – 81.25. Higher silica (to dacite 81.60 to 82.15 with weake Py. impregnation 82.15			
		-84.05	Strong fragmental			
		-86.10	Broad banded, with gradation to dacite 85.50 – 85.60			
		-86.50	strong fragmental, grading to:			
		-87.05	dacite, grading to			
		-87.50	strong fragmental, grading to			
		-89.15	Relatively light grey green chlor fleck tuff, gradational over to			
		-90.05	mixed chlor-fleck and broad banded			
		-92.85	Broad banded with local tendency toward rel strong fragmental			
		-98.90	Predominantly broade banded with sparse local but increasing fine Py. impregnation A small chlor-fleck (tuff) horizon 97.95 to 98.25 with gradational contacts.			
	-101.80		Weake but persistent and evenly distributed fine py impreg in the matrix of strong fragmental			
		-102.80	Generally f.grained broad banded with y weake evenly dispersed Py. impregnation weake Py impreg. as to 101.80 on rims + in matrix of broad banded fragmental.			
	-104.80		Stronger Py. impreg in dacitic pyroclastic			
	-108.30		As 102.80 to 104.80.			
	-109.15		As 104.80 to 108.20 with particularly acid band 109.50 – 109.60			
	-109.60		Predominantly as 102.80 to 104.80 but with strongly acid band 110.05 – 110.10			
	-110.20		Acid pyroclastic with rel strong Py. impregnation. chlorite band 112.20 – 112.35			
	-120.05		Strongly kerosined rel light green ? tuffs with local large Py / Py pseudomorphs and abundant Mn carbonate N.E dipping (95°) SCHISTOSITY			
	-120.45					
Mn	-122.80 →		Fine to mid grained tuff, the first 1.20 of which is included in the previous kerosined zone with steep schistosity and abundant Mn carb. Brannerite and occurrence of epidote as grains increases downward.			
	end		Strongly epidotized andesitic flow material with common large lumps of colourless to			
	(132.0) →		violet chert (123.60, 124.30, 124.80, 126.10 128.0, 129.0.			
			Ends with 4.20 m grannular epidote rich facies cut around chlor fleckes + chloritic fragments – ? tuff flow.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 24/08/76 Sign: Retn.: Sted: FINNSNES NORWAY Hull nr.: 10052 (1)

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0-2	ANDESITE - DACITE with abundant fine xenolets of qtz + cark, cark + fine meta chloritic clots			
			increasing toward 2, with evident decreasing SILICA			
		-3.90	FELSITIC BRECCIA IN ANDESITE DACITE			
		-5.10	DACITE with abundant qtz veins and v veiny evenly dissem PY THROUGH + from transverse fault/fissure zone 5.10-5.20			
		-7.95	AND DACITE Gradual, commonly appears early brecciated, with qtz eyes			
		-8.75	Strongly fragmental "crumbly" AND DACITE to local development of qtz eyes			
		-9.08	AND DACITE Broad zone, NS 6.10-7.95			
		-14.50	Strongly fragmental crumbly pyroclastic AND- DACITE to coarse fragments in coarse matrix, minor FINE VEINS PYRITE DISSEMINATION + local development of qtz eyes			
		-15.05	AND DACITE, Broadly banded with fine meta clast qtz ± 2 mm fine banded			
		-15.40	DACITE FELSITE			
		-17.10	AND DACITE Broad banded, NS 14.50-15.05			
		-17.50	~~ANDESITE~~ RHYOLITE Sm, mag, poor chart. ~~NS 15.05 TO 15.40~~			
		-22.08	ANDESITE, somewhat greenish colour with, fractures healed 1450-2015. Remnant bedding (?) veins with minor leached sulphide (pyrite) content and fine elastic horizons. 21.75 to 22.08 is relatively basic, chloritic with fine ~~qtz~~ veinlets			
		-22.50	DACITE AS 15.05 to 15.40			
		-23.30	ANDESITE Broad banded NS 14.50-15.05			
		-24.45	Strongly fragmental NS 9.08-14.50			
		-30.45	AND DACITE NS 14.50-15.05			
		-30.65	Strongly fragmental NS 9.08-14.50 veins locally PY mineralization			
		-31.20	AND DACITE NS 14.50-15.05			
		-34.00	Strongly fragmental NS 9.08-14.50 minor scroll of impregnation			
		-34.65	~~ANDESITE~~ DACITE + MAS elsewhere (local appearance) broad, but gradational contacts			
		-50.85	Strongly fragmental NS 9.08-14.50 with some xtal, tuff local veins PY imp.			
		-51.85	Broad banded as 14.50-15.05			
		-52.15	Strongly fragmental as 9.08-14.50			
		-53.50	Strongly epidotized fragmental with chloritic clasts			
		-55.40	Broad banded as 14.50-15.05			
		-55.85	Fragmental (epidotized clasts) followed by 25-26 cm xtal. tuff (?+)			
		-59.00	Strongly fragmental as 9.08-14.50 with some banded pyrite (vug/scale), ending with 55-60 cm of mixed xtal. tuff and clastic fragments			
		-61.45	Broad banded as 14.50-15.05			
		-61.85	Strongly fragmental with, rel. dark green 7 xtal tuff 61.60-61.85			
		-62.30	Broad banded as 14.50-15.05			
		-62.66	Strongly fragmental with, weak but dominant, fine PY impregnation.			
		-63.50	Broad banded as 14.50-15.05			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Funnefjellet Hull nr.: 1053

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		65.40	Variert båndet brygget sone viser grønske godt skifrighet. Hv og til tydelig pyroklastiske teksturer men ikke de vanlige uregelmessig linsekjege strukturen med grå farvet fin kornet sure linser og striper (fragmenter?) med grønnaktig av chlorit - epidot mye skifrig brygget linser innholder fragmenter av calcit (HCl +). Hv og til noen massiv årer av calcit + spirlet			
			Noen bånder med impr. Py. og av og til magnetit impr.			
		Detalje	42-43.20 Bjørnarbrud ▲▲ oppbrud.			
			46.60 - 46.65 Py + calcit + spirlet			
			46.80 - 46.85 Tydelig pyroklastiske med Py impr			
			47.20 - 47.23 Py + calcit			
			48.50 - 48.55 Py imp			
			48.70 - 49.25 Py imp usikk tydelig pyroklastiske tekst av og til.			
			49.75 - 49.55 "			
			52.10 - 52.12 "			
			53.15 - 53.25 "			
		70	Tett grå sure brygget med tydelig pyroklastiske drag mellom 67.00 - 69.45 av og til calcit årer og flekker men ikke basaltisk utseende.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Tunnelbunn Hull nr.: A0053

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		65 40	Varierte bandet borgart som viser grusleg godt skeifrigmet. Av og til tydelig pyrrhotinrike tekstrer men for de meste ubestemmelig linsaktige strukturer med grå farvet fin kornet sure linser og striper (fragmenter ?) med grunnmasse av chlorit – epidot nie skeifrig borgart. linsene inneholder fieldspar ved calcit (HCl +). Av og til ren massiv årer av calcit + epidot			
			Noen bander med impr. Py. og av og til magnetis impr.			
		Detalje	42 - 43 20 kjernetap ▽△ opprød.			
			46 60 - 46 65 Py + calcit + epidot			
			46 80 - 46 85 Tydelig pyrrhotinrike med Py impr			
			47 20 - 47 23 Py + calcit			
			48 50 - 48 55 Py imp			
			48 70 - 49 25 Py imp som tydelig pyrrhotinske tekt av og til.			
			49 75 - 49 85 "			
			52 10 - 52 12 "			
			53 15 - 53 25 "			
		70	Tett grå sure borgart med tydelig pyrrhotinske drus mellom 67 00 - 69 45 av og til calcit årer og flekker men ved dårlige utseende.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 24/8 76 Sign: [illegible] Retn.: -90 Sted: Tranby. hulle Hull nr.: 10053

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		21.60	Vekslende sandige og flekkete bergarter av tuffaktig karakter, vari			
			forekommende mengder av agrist lime band m/			* 09
			Ca-flekker og noen kvarts- og gjennomtrekkende gr årer. Fremtredende stivhet			
		22.60	Uregelmessig preget pyroklastisk tekstur	4	22.00 - 23.00	
			med trogn i grønn	1		
			Matrix av og til mørk	5		
	(~~21.60~~)		Trogn gjennomsnitt			
	2503		Tydelig tolde deformasjon	1	22.60 - 23.00	
			blander med mørke grønn	2	23.00 - 24.00	
			klastt ikk skiller fy og	3	24.00 - 25.05	
			mindre mengder Cu og Sl	4	25.75 - 25.95	
			og noe mt. Rike på Ca i			
			imp. Ving mektigheten her			
			bør en være obs på forekomst			
			i som vil kunne gi en			
			ore for Stor mektighet			
		25.60	Norke gra grønn skifrig			
			tuffpreget med enkelte			
			Ca årer	5	Fron 25.60 25.90	
	2690		Kalk ikk imp fy sporer			
			Cu Sl ? noe mt			
		40.10	Vekslende basisk tuff med svak imp i partier fy	6	29.00 - 30.00	
				7	30.0 31.00	
		40.60	med en mengde Ca flekker	8	31.0 - 32.10	
			og årer av og til Tydelig			
			pyroklastisk tekstur			
		41.80	Middels kornet gul grønn			
			epidot rik bergart gul grønn			
			flekker og striper / bånd pyro-			
			klastisk			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

3

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10054

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		55.50	Bandlag med tydelig lys grå og tynn streker over gang til mørk-brun bånd og fragment av svart lava. Delvis fuk duftaktige bånd			Delvis magnetisk fukonin ut.
		60.60	Tydelig fragmentert pyroklastisk tekstur preget fragmentert opp til flere cm uregelmessig i størrelse og litt vis grønnaktig.			
		76.50	Vekslende tynding rette ~~finkornet~~ finkrystallinsk mørk grå grønn til grå farget og til lysere og bånd m TBS fine-tekstur Sliver m/ gr. alm. mengde opaker. Mr og til magnetisk (variorende mengde fine mt) Sans av pyroklastisk Curie normal til sammensetning 60.30 - 60.40 Blågrå Sterk magn. mt rik Små mengder opaker Jaspis (aktige) fragmenter sjeldne i overtredem deler av pyroklast. 71.50 - 71.55 Pyrit mm i Sand		1-2 mm klar-grå glass-korn som ligner på stivning hetten	
		[71.55 72.10	Mørk flekk ganske grov ekvrende			
			76.50 Slutt			
			Hullet kanskje opp til to store meter			
			1) massiv tuff and lava.			
			2) Magnetittrik vekslende pyroklastisk tuff.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

2

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 1005 4

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		26,10	Fint lagdelt mt og myg og Skivet ep og gv tjernm kvalt.			
		26,60	Finkornet grå til grå gn lava (lava-dae) med enkelte ep bånd svak mag mgg av fmk. mt.			
		24,90	Store gv ep utvikling Skivet			
		27,00	Tett finkornet grå-grågrønn lava ant til dae av og til magnetitt			
		27,60	Prøveg pyro klastisk materiale			
		29,95	Fmk ant til dae lava		23—28 viser utvikling av bånding parallelt til akseplan av folderett til tjernm. ~parallelt til tjernm	
		30,05	finkornet mt regelmessig delvis lagdelt mye med mt ep gv fmk tjernmskj. årer mm Ca			
		34,70	Fmk massiv-lett grå-grå tilgrå lava m/dae tilsvarende i mot skutten grå og Tett			
		46,20	Tilsvarende bandet utseende av og til med fmk tett svin fragment (bomb) av og til mag. opptil mmg. lag og fragmenter (klaster) fr. 46-45,20 delvis bandet med mørke partier ep. og lit kvarts og bånd som gv og ep			
		48,60	Bandet lett/ mørkg tilgrå grå gn til mørk grønn tydelig skivet gv fra 48,20 46,20 og til magnetitt			
		50,70	"Skivet flekk" fin/flekket bånd mørk til lys grå utseende, mulig en finkornet xtal tuff			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

D. & I

Dato: Sept 76 Sign: ash emrl. Retn.: ÷ 40 Sted: Hull nr.: 10254

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Overgang fint ned.			
			mye gi-grønge rik opp			
			mot overflaten av op			
			åren klumper med opptil			
			5 cm i Hele klumpen			
	1	2,20	fint med lava. Sluttet			
			mot paper i dm 0-2?			
		2,30	Grønn/blank op. Endrt			
			overflate = ikke Calc.			
		5,30	Finkornet lys gi/ brun			
			med rund utseende			
		7,30	Fint med en gul? m/			
			mye limonitt av op åren			
			helt rødlig			
		8,50	Lava fragmenter m/ op			
			og noe gl			
		9,10	Fint - finkornig lava m/			
			mot grå grønn mellom 11-			
			13 blank rødlig m/Ca fylling			Ukjent 10?
			noen åren med opptil			
		5 m	lag m/ lys - hvit plastisk			
			mineral mot fragment			
			opptil 1cm (åren rapp			
			brekkering)			
		18,90	Fint - finkornig lava m/ mot			
			utkrende 17,7 - 18,9 finere			
			åren og enkelte åren			
			med op			
		19,91	lag med mt med py kan			
			forekomst kol.?			
		22,95	Lavaen mellom grå grønn			
			lava m fanol prøv forskjell			
			op gradering 21,7 - 22,95			
			åren			
		23,10	Finkornet mt og åren			
			med diffus Fe-mt			
		23,40	Fint mot. lava.			
		23,50	Finkornet lagdelt mot			
			mt py gl og op			
		24.	Grå finkornet lava m/			
			overgang til åren, tamanet og finkornet mt.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 1/6·76 Sign: [illegible] Retn.: ÷80° W Sted: Hull nr.: 10034

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0,30	[illegible]			
		0,80	[illegible]			
		2,00	[illegible]			
		3,0	[illegible]			
		5,30	[illegible]			
		8,0	[illegible]			
		10,05	[illegible]			
		14,10	[illegible]			
		18,80	[illegible]			
		19,40	[illegible]			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

D.d. I

Dato: 24/8 76 Sign: [illegible] Retn.: 80 W Sted: Vammnfjæra Hull nr.: 10054

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Overvekt fint and. lys grå fenge rik på dez utvikling) qv og åren klumper medepåt hisspi Hæstklumpen			
		2,10	fint and lava. Sjeld- qv grop mest 1dm 0-20			
		2.30	Storkrystaller qv og. Godt utvikling i noe Calk.			
		5.30	finkornet lys grå lava med and utsende			
		7.50	Fint and fenget m/ uregelmessig qv og åren sett aktig			
		8.50	Smq fragmenter m/qv og noe qv	"		
		14.20	Fint finkornig lava m/ and grå grenn mellom 11-13 blank aktig m Ca fylling noen skiver med epidot			Skiver 10 9
		15.10	lag m/ fag - pyroklastisk massede and fragment oppbil lava. (flere trap kvantisering)			
		18.90	Fint finkornig lava m/and inneholdende 17.70 - 18.90 tynne blærer og enkelte skiver med qv.			
		19.91	lag med pir med qv kan jernrikt ved. ?			
		22.05	finkornet mellom grå grønn lava m/and porøs, enkelt qv årer 21.07 - 22.05 blærer			
		23.05	Innblandet mt og eksotisk noe klast Tykkelse			28 F1
		23.40	Fint and. lava.			
		23.50	Finkornet lagdet mørk med mt og qv og qv.			
		24.05	Grå finkornet lava i overgang til blåe dannet noe finkornet m/.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

2

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10054

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		24,10	Fine lagdelt mt og gry og blivet ep og gv kjerne kvalt.			
		24,50	Finkornet grå til grå lava (ana-dac) med enkelte epi band dvs mag og ev fenk. mt.			
		24,90	Sterk gv ep utvikling Skivet			
		27,20	Tett finkornet grå-gragrøn lava ana til dac av og til magnetitt			
		27,60	Prøving oplomsatt pga klastisk materiale			
		27,45	Fine ana til dac lava		23— 28 viser stenkling av tydelig sedimentær lagdeling til skiferen 20° til kjernen, 27° til 22° til kjernen	
		30,05	finkornet mt uregelmessig fordelte lagdelte soner med mt ep gv samt kjernemateriale, åpne rev			
		31,70	Fine massiv-tett grå-grå tilgrå lava m/dels vekslende i mot skiftlin grå og tett			
		45,00	Vekslende bandet utseende av og til med fine 1000 rene fragment i bandet av og til mag, i øvrigt akkige lag og fragmenter (lapilli) fra 40-45,50 delvis bandet med massive partier. El og til kvartz og band som gv og ep			
		48,60	Bandet tett akkig lagvis grå grå til mørke grønn tydelig skivet gv fra 41,50-48,50 av og til magnetitt			
		50,70	"Klorit-flekk" fin flekket bånded, mørk til lys grå utseende, muligen finkornet tuffal tuff			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

3

Dato: Sign: Re:n.: Sted: Hull nr.: 10054

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		55.50	Sandig med tydelig lys grå og klare streker over gang til mørkt litt bånd og fragment av sur lava Delvis			Delvis magnetisk
		56.60	Tydelig fragmentell pyroklastisk tekstur Store avrundede fragmenter opp til flere cm uregelmessig i mønen og ellers ikke gruppert.			
		76.20	Vekslende sandig rett ~~diskorde~~ fin-stripig mørk grå grønn til grå-rød-brun avrundet lyst og bånd m FBS grønn-rød tekstur. Sliver — / gr calm mengde epidot, ~~Dr~~ og til magnetisk (varierende mengde fine mt) Sans en pyroklastisk Serie normal til Sur sammensetning 62.20 - 62.40 Blågr Sterk magn. litt rik Små mengder epidot Tynne (sprø) ~~fragmenter~~ Sjeldnen i oppbredden Også av pyrotal. 71.50 - 71.55 Pyritt mye i Sand	1-2 mm klare deler gr Flekker som oppfører i bånd // til stripig retning		!
		71.55	76.20 Vekslende Sterk grønne grov stripende			
			76.20 Slutt			
			Hullet kan deles opp i To store soner			
			1) massiv lett grønn lava.			
			2) Magnetittrig vekslende pyroklastisk			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

2.

Dato: 3.5.77 Sign: OSH Retn.: ÷80 ϕ Sted: Terriodden Hull nr.: 10056

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	32.35		Svak imp bånd i båndet ee rik tuff	5	32.05 - 32.35	
		32.57	homogen 'tukornet' tuff svakt båndet			
	33.13 32.48		Svak imp bånd i ee rik tuff	6	32.57 - 33.13	
		35.92	Kalkrik svakt båndet tuff.			
	36.10		Felsisk tuff med imp	7	35.98 - 36.10	
35.38			Massiv middelskornig noe ep holdig kis med årer mot hengvegg. ep	8	36.10 - 35.38	
		35.56	båndet tuff med enkelte spor av imp			
	35.67		Rik imp spesielt mot	9	35.56 - 35.67	
			Zn. Py og noe ep.	10	35.67 - 37.96	
	37.96		Båndet imp i felsisk serisitt holdig tuff			
		42.10	Båndet kalkrik tuff enkelte tynne bånd med imp			
		42.30	Felsisk - klorittisk tuff som blir mere klorittisk svak imp av py - enkelte rundede gr fragmenter			
	50.30		8 mm imp avtar gradvis	11	41.70 - 42.30	
	50.35		Båndet tuff tynnbåndet massiv lys grå grø blir grønnere (mer klor og ep) etter hvert og ved 48° begynner det å opptre svre rynodas fragm/ bånd			
			v/ 43.50 gabbroisk tekstur - klor flekk			
	56.35		lys grå grø gul gr rik dasitt ? Kr? brekciert. svakt båndet med enkelte ep. årer			Inntil 20 cm. kan være en mafisk gg ?
			veksler med noe mer bas mafr. 56.35 slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

1

Dato: 3/5·77 Sign: OSH Retn.: ÷80 ϕ Sted: 'Tornioddden' Hull nr.: 10056

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		1.00	jordboring			
		7.90	Tuff og aglomerat rik på epidot åror og noe cc Fragmenter av varierende sammensettning. Overveiende basiske frem til ~7.10 Hele virker meget sterkt deformert o			6 / 9
		10.95	Som ovenfor kalkrik tuff men en mer massiv homogen utgave mindre ep			
		11.75	mt massig exhalitt preget med ca 15 cm bånd. (brekziert) ep. og kalk i tillegg til bånd(?) enkelte svære def. fragm.			
		20.40	tuff med mye fragmenter og bånd rik på ep. virker tildels brekziert. sterkt deform. ved Kbm noe mt og blir rikere på ep økende deformasjon pert. i slutten av dagende fragm.			
		21.90	Tuff nærmest massiv - svakt båndet			
		23.07	Tuff noe skifrig cc spetter elongerte ved 2205 enkelte Py x.			
	27.90		Båndet imp i klorit rik matrix enkelte 1cm store fragmenter Fra 20.30 felsisk tuff m enkelte lag med klorritt mt py på noe cp svake meget svake imp frem til 28.35	1 2 3 4	23,87 25,- 25.0 - 26,- 26.0 - 27.0 27.0 27.90	
		3205	Båndet tuff noe seriøtt enkelte felsisk mineire mot slutten. Her enkelte cc lma			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dr-k II

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10057

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
	24.35		tett tandet imp og massiv kis Py. pyt	2	24.85 - 25.35	
		25.75	Massiv sjeltemet gd 227 tekstur. i motsetning til tidligere i hullet er alime preget med sma 1m ec linjer			
	26.20		kis imp py agnes pyt			
		27.95	som tidligere overgang	3	27.95 - 29.-	
	28.50		tett imp overveiende Py i kloritt holdig tuff tuff	4	29.- 30	
		35.50	Kvartsrik omr. dan. ? (omr. fasfus) med pyt imp meget kvartsrik avtagende imp av pyt			
		40.30	Kloritt rik tuff av dan. karakter			
	42.20		Kvartsrik omr. dan? med imp av pyt. remobils. avtagende imp etter brudd	5	40.60 - 41.20	
		45.20	Klorittisk tuff med sprak imp av Py.			
			45.20 Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 9/5-77 Sign: OSH Retn.: ÷60 N Sted: 1000 W 300 S Hull nr.: 10057 Sydl for Dubbe vannet

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.95	Båndet epidotisk tuff noe brekziert og enkelte tynne bånd med jaspis? i epidot rike omgivelser			
		1.15	Epidot rik tuff med gab. tekstur klor flekk			
		0.30	Som ovenfor Båndet ep rik tuff (av clas-and. karakter) Båndet med ep. og jaspis bånd			
		5.50	2 tynne bånd tv. mot + jaspis ep. i yttre sone		gr ep gr i jasp rød tekstur ep	
		6.01	svakt båndet tuff enkelte tynne bånd tynne. noen mørke fragmenter 2mm kan være klorotte			
		10.75	Som ovenfor men nå opptrer det tynne tynne og enkelt ep jaspis bånd ved 7-8 m er bergarten sterkt foldet diverse steder			
		12.30	Veksl. lys svakt båndet tuff med epidotårer - agl. horisonter		Agl ep	
		12.00	Extremt ;		ep + jasp	
		13.00	Massiv gå med bånd og årer av svært mektighet ep. rik kan være en tuff	mø mø mø	ep ep + klorit ep	
		14.00	Noe kjemotap i retningen. 2 kjemobånd viser svak gy imp	mø	ep ep. Tuff	
		14.70	Massiv gå? Som ovenfor	mø		
	14.95	14.95	Brekziert bis - bis imp i klorittisk grunnmasse noe gr fylling. Ikke synlig Cu og Zn	1.	14.70 - 14.95	
		24.25	Massiv grovkornig tett gå Salt & Pepp.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 9/5-77 Sign: OSH Retn.: ÷60 N Sted: 1000 W 300 S Hull nr.: 10057

Syd for Drikke vannet

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.95	Båndet epidotrik tuff noe brekssiert og mikrofolda tynne bånd med jaspis? i epidotrike omgivelser			
		1.15	Ep. overt rik tuff med gab. tekstur klorittlekk			
		5.20	Som ovenfor. Båndet ep rik tuff av das-aand. karakter) Båndet med ep og jaspis bånd			
		5.50	2 tynne bånd av mørk jaspis ep. i yttre sone			
		6.01	Svakt båndet tuff mikrofolda tynne bånd tynne noen mørke fragmenter 2mm kan være kloritt			
		10.75	Som ovenfor men nå opptrer det tynne bånd eller bånd og enkelt ep jaspis bånd ved 7-8 m er bergarten sterkt foldet diskordant eller brekt med homogen			
		12.30	Veldefinert tynt svakt båndet tuff med epidotårer - agl. konsentrer		Agl ep	
		12.90	Exhalitt ;		ep-jasp	
		13.90	Massiv gø med bånd og årer av mørkt materiale ep rik kan være en tuff		ep	
		14.00	Noe kjernetap i reaksone. 2 kjerneender viser svak pyr imp		ep Tuff	
		14.70	Massiv gø som ovenfor			
	14.95	~~14.95~~	Brekssiert kis - kisimp i klorittisk grunnmasse noe qv fylling Ikke synlig Cu og Zn Massiv grovkornig tett gø	1.	14.70 - 14.95	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 1005?

Dr. II
48. 2nd. lokk!

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	26.25		tett under imp og massiv			
			kis Py. pyr	2	24.35 - 25.35	•
		25.75	Massiv gjennomsatt gj.			
			SZ? tekstur. i mørkeblom			
			tal tvilligere. Sulfid			
			er stemme noget med			
			mm 1 m av impre			
	27.50		kis imp py agron py?			
		27.95	som Langsetn avsnitt	3	27.95 - 29.-	•
	28.50		tett imp svivelsvart Py	4	29.- 30	•
			i klevitt bolding dels tett			
		36.60	~~Stenkende~~ omk. ? (omv			
			(aspis) med py? imp			
			meget kv i kz avtagende			
			imp av py?			
		40.30	Klevitt ikke tett av kas			
			karakter			
	42.30		kraftig omv. ~~omv~~? med			
			imp av py?. remobil.	5	40.60 - 41.20	•
			avtagende imp. Tilf. kvarts			
		45.20	Klevitholdig med			
			svak imp av Py.			
			45.20 Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark III

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10058

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			enkelte cm store fragm. fra 65 m.s bunnen			
	72.65	72.25	Massiv andesitt fedt. fy. inp i and. kantt tuff.	7	72.25-72.65	
		79.50	Andesitt med bånd av klastisk tuff med noe grå inj.			
		84.60	Klastisk tuff m/ enkelte cm store fragm. andel mørk. and.			

84.60 Bl.

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark II

Dato: Sign: Rein.: Sted: Hull nr.: 10058

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		24.30	epidot klorittisk vekslet			
		26.35	tuff. enkelte amf. dass.			
		26.50	partier noe agl.: grønne			
			fragmen			
		26.40	Epidot og klorittisk tuff			
			vekslet. enkelte amf.			
			dass. diverse partier			
			enkelte klor frag			
		26.60	Vekslende tuff og pyroklast.			
			lag spor av py. endel			
			epidote ørsmå			
		26.62	Dass. nyhetss. tuff m/ pyritt			
			grand ikke prøve			
		28.45	Som ovenfor			
	28.45		Grå bandet pyritt utsm.	1.	28.45 - 28.60	
			op			
		30.35	Klorittisk bandet tuff			
			med amf. karakter			
			noe cc grand og epidot			
	30.50		Svak mm av pyrpyz.	2.	30.35 - 30.50	
		33.90	Sur finkornet tuff rik			
			på kalk kalkgrand			
	34.05		tettimp av Py & Pyz +			
35.00			Massiv Py & Pyz fint py	3	33.90 - 35.-	NB.
			remob. py & pyz.			
	32.40		meget grovkornet bergart	4	35.00 - 36.-	
			m en gv i partier kan	5	36.00 37.60	
			være slike rike ccd. som			
			er omvandlet Remob	6	37.00 38.00	
			Py? og Cp + endel gitter			
			py.			
	37.50 "		Vekslende klorit og dass			
			bandet brekviert Tuff			
			med dass fragm.			
			Svak imp avtar			
		41.30	Klorit tuff/pyroklaster			
			og flere meget storkt			
			brekviert			
		71.00	Brekviert grønn og dass og			
			pyroklast-lag med sp			
			vekselvis, mere amf. fra 65'			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Del I

Dato: 6/6-77 Sign: OH Retn.: ↓ Sted: S. Dr. vann Hull nr.: 10058

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		2.50	ep. rik flow.			
		6.00	Mork bandet noe mer			
			holdig tuff med enkelte			
			agl. med lyse og mørke			
			fragm. tett presset			
			dac- ryhodas. fragmenter			
			matrix ep eller tuff			
		6.70	exhalitt ccd. silica			
			mork purple			
		10.45	Epidotrik tuff			
			+ exhalitt av eventormende			
			type ved 6.90			
			ved 9.30 exhalitt jaspis holdig			
			Tuff			
		10.50	Exhalitt etter + mt			
		10.80	Tuff epidotrik gr. og			
			hjelels mangamrik i			
		11.45	Ep. rik tuff enten gr.			
		16.60	exhalitt m mag			
		11.20	Ep. rik tuff m. gr. eyne			
		1240	Ep rik — enten —			
		1243	Exhalitt			
		12.85	finbandet epirik Tuff			
		12.98	Exhalitt bandet med silika			
			m/mag.			
		13.13	finbandet ep. rik Tuff			
		13.22	Exh. med silika + mt.			
		19.20	Tuff av noe varie. type			
			noe talk og gr. rik. Dominerte			
			epidot og klorittrik med			
			enkelte lyse bander av			
			feldtiss (kalk) rikere			
			mellomlag			
		19.30	Exhalitt mt med silika			
		20.25	tuff ep rik finbandet			
		20.20	Exhalitt med silika lite			
			mt.			
		22.30	Klor + epidotrik bandet			
			tuff.			
		22.80	Mot dac tuff.			
			Exhalitt Jaspis purple			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

II

Dato: 13/06/77 Sign: I.H. Retn.: -60° Sted: S.OVATNET Hull nr.: 10057

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	46.45		IMP BANDS OF PYRITE / PYRRHOTITE IN DARK CHLOR. TUFFS	5	46.30 - 46.45	
46.60			MASSIVE PYRITE WITH PYRRHOTITE	6	46.45 - 46.60	
	47.50		IMPREG. OF PREDOMINANTLY PYRH. WITH PYRITE AND RARE GRAINS OF CHALCOPYRITE, IN CHLOR-TUFFS. THE LOWEST 35 CM SHOWS STRONG RE-MOBILISATION OF THE PYRRH.	7	46.60 - 47.50	
		48.10	DACITIC AGGLOMERATE WITH LOCAL WEAK IMPREGNATION			
		51.40	CHLOR-FELS FINE AGGLOM. WITH CHLOR-ER AND DACITIC CLASTS, THE LATTER HAVING A WEAK PYRITIC IMPREGNATION.			
		55.50	ANDESITIC FLOW WITH GRANULAR EPIDOTE, HAVING A THIN TUFF HORIZON 53.00 - 53.30			
			END			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

I

Dato: 14/06/77 Sign: JHP Retn.: 603 Sted: S. SVATNET Hull nr.: 10059

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		3,70	GENERALLY COARSE GRAINED, EP-CHLOR-RICH ALTERED TUFFS HAVING DK. RED, HEM-RICH JASP FRAGMENTS, ISOLATED HOMOG QTZ-CARBONATE EYES. SPEC OF JASPER TAKEN.			
		18,05	A BRECCIA/AGGLOMERATE WITH INTERCALATED CHLOR-FELSIC TUFFS. FRAGMENTS ARE DARK PURPLE WITH LITTLE MAGNETITE. SOME EVIDENCE OF PRIMARY SLUMP/SLIDE ACTIVITY. THE LAST 2 M SHOWS DISPLAY A GRADATION TOWARDS FEWER FRAGMENTS OF SMALLER SIZE.			
		20,30	FINE TO MED. GRAINED CHLOR-EPIDOTE TUFFS WITH THIN INTERCALATIONS OF DP PURPLE SERICITATE AND PURPLISH JASP. STRONG DEFORMATION OF BANDING. INCREASE IN QTZ-CARB EYES TOWARDS BASE			
		42,00	FINE GRAINED EP-RICH TUFFS WITH QTZ EYES AND FINE DARK CHLORITIC FRAGMENTS. ABUNDANT REMOB. OF EPIDOTE. VERY THIN, ISOLATED BANDS OF DARK-RED SERICITATE TOWARDS TOP. STRATIFICATION ~ 30°			
		[redacted]	THIN ZONE OF COARSE PYRITIC IMP AT 33.85, ASSOC. WITH LOCAL SILICIFICATION. GENERAL COMPOSITION OF THIS LITHOLOGY IS ANDESITIC, BUT EVIDENTLY GRADES DOWNWARD INTO DACITIC COMPOS.			
	42,60	[redacted]	PYRITIC IMPREG. IN THE ABOVE TUFFS, ALSO WITH ABUNDANT FINE GRAINED FELSIC BANDS.	1	42.00 - 42.60 [redacted]	
44.50			MASSIVE EXTREMELY FINE GRAINED PYRITE, FREQUENTLY RECRYSTALLIZED WITH WELLING OF LATER SULPHIDES (PYRITE). STRONG DEFORM. EVIDENT.	2	42.60 - 44.50 [redacted]	
	44.65	[redacted]	STRONG PYRITIC IMP IN SILICIFIED CHLOR TUFFS.	3	44.50 - 44.65 [redacted]	
46.30			MASSIVE F GRAINED PYRITE AS 42.60 - 44.50	4	44.65 - 46.30	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark II

Dato: Sign: Retn.: ÷ 60 N Sted: Hull nr.: 10060

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		30.80	Fyrekl. malm med store			
			bure bånd med imf			
			i dette.			
		32.35	Pnd. das. litt mork gl			
			i rekk. med klor. ikke			
			tett.			
		33.25	Pnd. das bandet tuff preget			
		39.40	vekslende tett finkornig			
			med das. ond. bolter		Cond ~5°	
			39.40.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 6/6-77 Sign: [illegible] Retn.: ~ 60 ↗ Sted: S. Di. vann Hull nr.: 10060

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		4.65	Ånd. basalt tett epidot rik			
	5,05		Kloritt rik tuff med grov py imp	1,	4.65 - 5,05	•
	~~5,05~~	5.25	Kvarts ganger			
		5.45	Basalt-and. tett mørk grå uten epidot			
	6.05		grov py imp i klorrik gå. banding 10°	2	5.65 - 6,05	•
		6.65	And basalt tett mørk grønnaktig mørk tett uten epidot			
		10.20	Sterkt båndet grå tuff med kalkrike bånd og enkelte meget store bånd fragmenter.			
		10.60	Extralitt sånd silikat			
		10.70	tuff som ovenfor			
		10.85	Sånd silikat Fx			
		11.20	tuff som ovenfor			
		12.50	tett brun and gr. mot slutten enkelte tynne ex b			
		12.60	Extralitt sånd Si + Carbonat			
		15.15	Tuff ep. rik med komplisert banding enkelte tynne ex. lign. lag klorittisk			
		21.20	And. tuff med enkelte tynne bånd av ex. lig. matr. klorittrik utgjør av and tuff			
	21.90		med py imp svak imp	3	21.30 - 21.90	•
			som øker mot Slutten	4	25.60 - 26.25	•
		25.30	Kalkrik brunaktig mørk rik på kalk dæp tekstur	5	26.85 - 27.40	•
	25.60		Samme som ovenfor med py imp			
26.25			Mass pyrkis varierende kornst.			
	27.40		~~Pyrit~~ Py og cp imp i silisifisert			
		28.-	Magnetitt rik bånd i veksel med sur. - pyroklast			
	28.40		Imp pyr + cpr. Samme berg.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark I

Dato: 4/2-77 Sign: ØH Retn.: Sted: Hull nr.: 0061

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	187-		Kler ikke lufte med	23	184 - 185	
			Svak imp noe op		185 - 186	
			Sterk imp - maks kis		186 - 187	
			i felsisk tuff. Omvekt		187 - 189	
1925			lamering ~ 20-20°		189 - 190	
		198.3	Imp. Svak. klorittisk Tuff		190 - 191	
			noe lave fragmenter, overveiende		191 - 192	
			for ordenskyld		192 - 193	
		201	Rød-drs. flere. med enkelte		193 - 194	
			lave fragmenter		194 - 195	
			økende lekstonisering		195 - 196	
		201.50	samme vekst klorit		196 - 197	
			lektonisert dacyit		197 - 198	
			Dem over kisen.			
			miligrads en tydelig			
			lektonisering			
		208.40	Basaltisk flow meget			
			finkornig vesikul. and			
			basalt.			
			208.5 Albitisert imp.			
			?			
			208.40			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dr. IV

Dato: 6/6-77 Sign: OSH Rem.: Sted: Hull nr.: 10061

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		145.30	Tuff i veksl. med and. basalt, klar klor flux tekstur.			
		146.05	And. gå med feltspat porfyr NB mangfoldig med py.			
		159.60	feltsp. porfyrene avtar, skenal epidotutvikling og blir atter hvit basalt → das.-and.			
		160.70	Skarp def. storkrystallinsk kvartsingang m/ bånd av basalt. Gangart mørk klor rik			
	163.97		Klorittisk skrukket def. med imp py. lite cp. Fe?	1	160.7 - 162	
				2	162 - 163	
			det virker som om det ene er glide struket i	3	163 - 164	
				4	164 - 165	
				5	165 - 166	
			den kisen meget tydelig	6	166 - 167	
			fra fos konsentrering	7	167 - 168	
			Prøve 1.65 Cu 2,89 Zn.			
168.30			Massiv fint kis samlet	8	168 - 169	
			skjell? Omdelig v 60°	9	169 - 170	
			lete cp og Zn. Py			
	168.40		Svak imp			
169.75			Massiv kis som over for	10	170 - 171	
			men med noe mr	11	171 - 172	
	170.20		fattig båndet imp	12	172 - 173	
			over py. med enkelte	13	173 - 174	
			cp rike bånd tildels	14	174 - 175	
			rike imp fra 170.20	15	175 - 176	
	175.25		tildels massiv imp pen	16	176 - 177	
			cp. kisen viskos fattig	17	177 - 178	
			av Fl	18	178 - 178.85	
		181.25	Overkornet cp. rik gr.			
			flow. mot slutten svak imp	19	180 - 181	
	~~187.8~~	181.80	finkornig Tuff klor	20	181 - 182	
			imp i klorrik Tuff. tildels	21	182 - 183	
	184.25		klar imp cp. tildels	22	183 - 184	
			gr rike bånder med ren			
			cp 182.20 - 183.20			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 3/6 -77 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 1006

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		74.20	Klorittisk- grønnskifer tekstur varierer noe gar til skifrig over i en massiv gp			
		79.00	Tynnere tett lys grønn med enkelte mørke striper		tynd 20°	
		83.90	Massiv mørk middels korning gp ørsmått karbonatholdig. Mot slutten brekkjert			
		89.05	Bandet gp ikke brekkjert tett noen lengre middels grønnaktig			
		#	Tett homogen middels korning noe sericitisert gp and-bastyt? dels. gp med gp. rike en mektige partier. og brekkjering. likeså noen tuffittiske tynd. men noe sj			
			Extralitter ved 100.6 jasp + ep. i nr nr 102.- jasp m/ep Går gradvis over til mer and. -likt varierer noe i tekstur og blir mere and. fra 120 går den over i mere basaltisk dis ikke riktig			
		133.3	mot slutten sterkt dit.			
		134.25	tynd. gp			
		135.-	Extralitt jasp ant ep.			
		142	Ekskludert bas. - and. gp og enkelte tett bank fra 137 også ep ujevnt fremtil 139			
		142.30	V 142.20 avsluttet Bas - and. erupt 144 aktivitet forende			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dr. II

Dato: 3/6 '77 Sign: OSH Retn.: Sted: Hull nr.: 10061

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		42.70	Sterkt breksiert og ep.			
			retikulert fine gå			
		57.30	Tett homogen gå med			
			enkelte (2) lyse gulle rød en 4mm			
			bånd ca 2cm. mørk			
			tildels finkornig (rekker			
			noe and. karakter			
			Blir etter hvert mere			
			breksiert og får			
			enkelte meget ep.			
			rike bånd som muligens			
			har vært en talkrik ep.			
			fylling, eller et klastisk			
			bånd			
		59.20	Sterkt brekslert pyroclast.?			
			enkelte mørke fragm			
			som flyter i en fint			
			ep. rik matrix. ant.			
			til opor. banding			
		59.45	Extalitt rt og rosa	Bånd	20°	
			chert noe py imp			
		61.20	Finkornig brekslert grå gro			
			gå brekslert ep. litr.			
			tildels meget fuik. enkelte			
			tett lag			
			Extalitt rt - rosa del.	bånd	25-35°	
		65.20	Svakt bandet meget finkornig			
			sterkt brekslert. tidt			
			preget bergart and-			
			dels sammensetning			
			meget spesielt sterkt			
			gå ep. rik matrix gr og			
			lelinjer ovale 5mm store			
			fragmenter			
			finkornig tett m/ epp. tron			
			utriklinger i varierende			
			grad tidt preget men			
			ingen markant banding			
		69.45	→ grønnstein matrix			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dirk B

Dato: 2/6-77 Sign: OSH Retn.: ÷90 Sted: Hull nr.: 10061

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.00	Jordbar.			
			Mørk finkornet lys grå grå			
		1.45	noe ep. åre i dag. gå			
			homogen			
		4.00	Agmatit Tett epidotrik			
			med store fragmenter			
			i fra 1m - 5cm. kan			
			tildels virke homogen			
			fin og tett. fragmentene			
			er overveiende gr-rydmåls.			
		10.05	Mørk grønn. grå grø homo-			
			gen noe ep. sprekker			
			evt enkelt bånd med			
			fragm. ånd- [redacted]. gå.			
			Finkornet svakt båndet			
		23.10	Tett med enkelte mg x			
			opps 10x · 11m.			
			ved 16m 0 10 cm mørkere			
			mot mg. ep			
			båndet eller flekk grø.			
			grønn. opps. fremtr.			
			15 - 15.60			
			Fra 20 - 23 meter tydelig	bånd	30°	
			båndet Tett ep. rik			
			fra 21 - 23 tett 'preget'			
			med 1mm ep. åpne			
			og enkelte runde klorit			
			gr. fragmenter fortsatt			
			fine i			
		36.40	Mørk fine overveiende			
			homogen Tett grå grø			
			noe epidotisert →			
			ånd. gå.			
			Ved 25.10 er epidotrik			
			svakt mg imp bånd igen.			
			mot slutten tydelig epidot-			
			ført og brecciert			
		36.80	Alt o.g. ep i bånd	bånd	35°	
		39.45	Grov mørk grø gå med			
			gabbr. texTur epidotet			
			åpne			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

ARK II

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 6c

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprøve	Anmerk.
		212.40	MASSIV STORM DACITT, BREKSJERT		212.60 - 213.60	
			MED ENK. KLORITTISK VARIANTER.		213.60 - 214.20	
	214.20		VEKS. FELS / KLOR TUFF M. SULFID IMP.			
		214.65	VEKS. FELS/KLOR TUFF			
		215.54	FINK DAC. GRST.			
	215.73		BANDET FELS/KLOR TUFF MOD PY. IMP.			
		217.80	MASSIV BREKS. DACITT.		217.80 - 218.95	
			VEKS FELS/KLOR TUFF MED SULFIDER. MINDRE KLORITTISK TIL SLUTTEN		218.90 - 219.80	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

ARK II

Dato: 13 Sign: OSH-ILF Retn.: ÷ 909 Sted: S.Gruvefjell Hull nr.: 10062

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		166.70	Samme, men overveien HL mer homogen dacitisk-andesitisk			
		170.70	Dac. agglom + tuffer som før, i	1	170.70 - 172.0	
			klorittisk skifer. Fall omt. vanlig	2	172.0 - 173.0	
				3	173.0 - 174.0	
	174.30	174.30	Grovkorn. sp-rik tuff med	4	174.0 - 175	
			impregnasjon av fattig type (SVK)		175 - 176	
			Vekslende kloritt-rik og felsisk		176 - 177	
			tuff Grovkornig pyr. i bånd		etc →	
			noen kobber-kis		"	
	179.31		BANDET IMP. MED GROVK. PYOG		"	
			CuFeS$_2$ i klorit tuff MED SVT FRAG		"	
			FALL CA 15° ENKELTE GROV Cu		"	
			KLYSER ASS MED FELSISKE BAND.		"	
179.90			MER MASSIV 179.31 - 179.90. MED		"	
			TETT IMP. GROVKORN. MEGET CU-RIK		"	
			ENKELTE FES. BAND.		"	
	189.20		FELS TUFF MED ENKELTE CU-PY RIK		"	
			IMP BAND. ØKENDE MENGDER SULFIDER		"	
189.60			MASSIV MEGET CU-RIK KIS		"	
			TUFF AV FELS TYPE MED		"	
			(FRA 186-189 ER KJERNER OPPKNUST		"	
			DER KJØLLES MASKIN OG IKKE BERGARTEN)		"	
	193.00		TETT IMP. MOT SLUTTEN TIL MASSIV		"	
			OG CU-RIK, TILDELS GROV PYRITT.		192 - 193	
		194.44	TUFF, KLORITT-RIK, NOKSÅ BREKSJERT			
			AND-DAC, KLORITT MATRIX. CALK-HOLDIG			
	194.86		SAMME MED ENK. FELS. BAND OG		194.44 - 194.86	
			IMPREGNASJON.			
		195.70	DACITT MED SPOR PY. IMP. IN KLOR-RIK			
			TUFFER. CALK-RIK PÅ REGNVANNSLEE.			
			FALL CA 15°			
		196.64	MASSIV BREKSJ. DACITT MED SVAK		197.20 - 198.95	
			PY. IMPREG.			
	198.95		KLOR-RIK TUFF, SVAK IMP, INGEN KALK,			
			SPETTER AV FELSISK MAT. ENKELTE			
			Cu-RIK BAND.			
200.67			TETT MASSIV Cu-RIK KIS MED TYNNE		199.0 - 200.0	
			FELSISKE SPETTER.		200.0 - 200.67	
	209.80	?	VEKS KLOR/FELS. TUFF MED SVT		200.67 - 201	
			FRAGMENTER M. SVAK PY. IMP.		OG KUNN MER TIL 208.0	
			ÅRE VED 15 cm at 209.85			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

ARK III

Diaborlog

Dato: 09/06/77 Sign: IH Retn.: +90 Sted: Gr. Fjell S. Hull nr.: 10062

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
FROM 90.0		93.10	INTERMEDIATE TUFFS AND AGGLOMS.			
		95.60	REL HOMOG BAS LAVA WITH EPIDOTE KNOTS.			
		109.30	INTERMEDIATE TUFFS + AGGLOMS. HAVING DACITIC CLASTS.			
		112.20	BRECC. + QTZ VEINED DACITE WITH RARE COARSE-GRAINED PYRITIC IMP, BECOMING INCREASINGLY BRECC. TOWARDS BASE			
		114.20	INTERMEDIATE F GRAINED TUFFS. WITH DACITIC FRAGS.			
		115.30	BRECC. + QTZ-VEINED, SILICIFIED DACITE			
		116.00	INTERMED TUFFS + DACITIC CLASTS			
		117.00	BRECC + QTZ-VEINED + SIL. DACITE			
		118.50	F GRAINED AND-DACITE TUFFS.			
		121.50	INT TO DACITIC F GRAINED AGGLOM WITH DACITIC CLASTS.			
		133.50	BRECCIATED + SIL. DACITE WITH 20 cm QTZ VEIN AT 122.20.			
		126.15	EXTREMELY BRECCIATED + SIL DACITE WITH COARSE PYRITIC IMP IN COLATED AGGREGATES 125.40 - 125.70.			
		131.60	DACITE WITH VARYING BRECCIATION INTERCALATED WITH THIN AND TUFFS			
		149.50	V. F GRAINED AND-DAC. TUFFS, REL HOMOGENEOUS, COMMONLY HAVING ABUNDANT FINE CALCITIC RHOMBS., GRADING TO DACITE			
		149.80	PRIMARY SLUMP/SLIDE ZONE (AS IN 10061) STRONGLY CHLOR/HEMATISED.			
		162.80	INTERMEDIATE PYROCLASTICS DACITIC CLASTS IN CHLOR MATRIX OCCASIONAL WEAK PYRITIC IMP+PREVIANT CARBONATE IN VEINS (155.5 - 157.70) INCREASING EPIDOTE			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 09/01/77 Sign: TØ Retn.: 90 Sted: Gr. Fjell S. Hull nr.: 10062

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
FRA 90.00		93.10	INTERMEDIATE TUFFS AND AGGLOMS.			
		95.60	REL HOMOG. BAS. LAVA WITH EPIDOTE KNOTS.			
		109.30	INTERMEDIATE TUFFS + AGGLOMS. HAVING DACITIC CLASTS.			
		112.20	BRECC. + QTZ VEINED DACITE WITH RARE COARSE-GRAINED PYRITIC INP, BECOMING INCREASINGLY BRECC. TOWARDS BASE			
		114.20	INTERMEDIATE F GRAINED TUFFS WITH DACITIC FRAGS.			
		115.30	BRECC. + QTZ-VEINED, SILICIFIED DACITE			
		116.00	INTERMED TUFFS + DACITIC CLASTS			
		117.00	BRECC + QTZ-VEINED + SIL. DACITE			
		118.50	F GRAINED AND-DACITE TUFFS.			
		121.50	INT TO DACITIC F GRAINED AGGLOM WITH DACITIC CLASTS.			
		123.50	BRECCIATED, SIL. DACITE WITH 20 cm QTZ VEIN AT 122.20			
		126.15	EXTREMELY BRECCIATED + SIL. DACITE WITH COARSE PYRITIC INP IN ROUNDED AGGREGATES 125.40 - 125.70			
		131.60	DACITE WITH VARYING BRECCIATION INTERCALATED WITH THIN AND TUFFS.			
		~~147.50~~ 149.50	V. F GRAINED AND~~ESITIC~~ TUFFS. REL HOMOGENEOUS, COMMONLY HAVING ABUNDANT FINE CALCITE KNOTS, GRADING TO DACITE			
		164.80	PRIMARY SLUMP/SLIDE ZONE (AS IN 10061) STRONGLY CHLOR/HEMATITISED.			
	—	162.80	INTERMEDIATE PYROCLASTICS: DACITIC CLASTS IN CHLOR MATRIX OCCASIONAL VERY PYRITIC INTERVALS/VERY CARBONATE IN VEINS (155.5 - 157.70) INCREASING EPIDOTE			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

III

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10063

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		86.05	SAMME BERGARTEN SOM OVENFOR			
		86.10	SEDSIL. EKSALITT, MAG RIK BAND.			
		75.80	SAMME SOM OVENFOR, MASSIV. OG HOMOGEN			
		74.70	Antagelig strøm-toppen, - meget ep.rik, med tynne sedsil. eks. på toppen. N.B. Riktig veg opp. SAMME MASSIV. OG HOMOGEN			
		68.00	BERGART SOM OVENFOR. Antagelig strøm-TOPPEN / RIKTIG			
		66.50	VEG OPP.			
		61.20	MASSIV HOM SOMOVENFOR.			
		59.95	? FLOW-TOP SOM OVENFOR (RIKTIG VEG OPP			
		57.30	VEKS. EP-RIK STRØM			
		56.80	KALK RIK CHLOR-FLECK-TUFF			
		50.20	FINK. MASSIV STRØM SOM OVENFOR MED SONER RIK I FINK. EP. RIKERE SEDSIL. EXHALITT. PÅ 50.00 OG 48.			
		35.90	Same som ovenfor.			
		35.40	Strøm Toppen med exshalitt (epy-mgt)			
		34.10	Samme som ovenfor med flow top			
		29.95	Dacitt, grau-svakt nye mindre epidot, men med sericitt. Exhalitt (py-mag) på toppen. STORE KALK AMYGD. UNDER EXHALITTEN.			
		23.40	MER BASISK, EP-RIK I GANGER MED PY-MAG EXHALITT PÅ TOPPEN			
		21.10	SUR SOM OVENFOR, NOE KALK-RIK			
		20.35	Exhalitt HORISONT — BLÅGV + PY. BANDET. IKKE SÅ MYE MAGN.			
		18.30	KALK-DACITT MED EXHALITT. PÅ TOPPEN, MED GRADVIS (MER EP) OVERGANG TIL exhalitt			
		10.50	Ep-rik massiv strøm som gradvis blir mer sur på slutten.			
		2.05	KALK-BAS. GST, GRØNN.			
		000	EP-RIK MASSIV STRØM SOM OVENFOR + ANHYDRITT. MULIG EX. PÅ SLUTTEN.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

II

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10063

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			økende 15 i n calk, etter			
			store amygdaler med kalkspat.			
			På 145 : KALK-RIK ? ERUV TIL KALK			
			RENKEN.			
		129.20	GRADVIS OVERGANG TIL SUR			
			VARIASJON (DACIT-AND).			
		129.00	BLÅKV. EKSHALITT, SVAK MAG.			
		128.90	KALK-ØYNET ANDESITT.			
		122.70	MASSIV DAC - DAC. AND.			
		120.50	SVAKT KALK-RIK AND - AND. DAC.			
		119.40	AND. DACITT, EP-RIK.			
		116.60	KALK-SPETTET BAS - AND → AND.			
			MER EKSHAL. BANDER AV BLÅKV/			
			EP, MAG-RIK + EN DEN SEDSILIKAT.			
		108.00	SAMME HOVEDBERGARTEN - MASSIV,			
			EP-RIK + EN BLÅKV. BAND. MER			
			MASSIV OG HOMOGEN MOT SLUTTEN.			
		109.15	RANDET MAG-SIL EKSALITT MED FYL.			
			MOT TOPPEN.			
		105.50	SAMME HOVEDBERGARTEN SOM			
			OVENFOR, I PUTE LAVA. MED			
			BLÅKV. SEDSIL EKHALITT PÅ SLUTTEN			
			CA 10 cm.			
		100.50	MASSIV AND- AND DAC. MER KALK/			
			EP-RIK PÅ SLUTTEN.			
		99.90	RANDET BLÅKV - MAG. SEDSIL/CARB.			
			EKSHALITT (PRØVETATT)			
		96.70	STERK OPPSPR. CHLOR-RIK.			
			KARAKTERISTISK RU OVERFLATE PÅ			
			KJERNER			
		96.50	MAG SEDSIL EKSALITT			
		96.20	SAMME SOM OVENFOR			
		95.80	CHLOR FLECK TEXTURE			
		92.95	'HOVEDBERGARTEN' - MASSIV AND.			
			MED KALK ØYNE			
			KALK-RIK (N.S) AND, MED KALK-			
		92.50	RIK EKSHALITT PÅ 92.50			
		88.65	EP-RIK, MASSIV MED RU OVERFLATE			
			MER VEMIL EP. INNHOLD MOT			
			SLUTTEN			
		86.20	BLÅKV. EKSHALITT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

I

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10063

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	202.0 (SLUTT)	201.80	AND-DAS., MANGLER KALK. MOT TOPPEN (SVAKT), PY MER BANDET. ANTYDNING TIL TYNN EKSHALITT BAND. BLÅ-AKTIG BAND AV DACITT.			
		199.80	MASSIV S og P. TEKSTUR, VAR. EP-RIK. AND.			
		197.95	REL. EP-RIK ? PUTE, SVAK BANDET MED NOE S|P TEKSTUR.			
		185.80	KALK-AND. MED NITI KALK IFLG. OVNE. BLI MER BREKSIERT PÅ TOPPEN OG MER BLÅKLET.			
		185.90	FIN-BANDET TUFF EKSHALITT MED ? Zn			
		181.30	BERGART SOM TIDL. KALK-AND. STERK BLÅKET (sole).			
		180.20	CHLOR-FLECK (S|P) TEKS BERGART STERK SILIFISERT BERGART, OPPSPRUKKET, SPOR AV SULFIDER			
		179.95	(Py + ? Zn-sul) OG NOEN BLÅ-fiolett jaspis			
		176,15	SVAK CHLOR-FLECK SOM OVENFOR			
		165.70	STRØM, TØD. MØRK KALK-AND, MED SPETTER, OG ENK. BREKS. PARTIER, DUTE BOLLER OMK 170. 172 : SVAK KIS IMPREG. GRADVIS OVERGANG (BREKS. FRAG.) TIL:			
		164.65	CHLOR-FLECK TEKSTUR			
		164.45	BAND EKSHALITT, MEST BLÅKV, MED Py, EP, SEDER			
		164.10	BLÅKV. MED Py IMP.			
		159.80	MØRK KALK-RIK BERGART, SVAK BANDET, ENK. CHLOR-FLECK TEKST. EN DEL PTYGMATISKE FOLDER AV EP-KV. TYNNE BANDER AV EKSHALITT TYPE. AND-DAS STRØM			
		159.60	MAG-RIK BLÅKV. EKSHALITT + EP.			
		157.00	BANDET (SVAK) BERGART SOM OVENFOR MOT SLUTTEN DOMINERT AV KALK. BLEKE. AND-DAS STRØM.			
		134.00	SAMMEN MEN MER MASSIV, MØRK FINKORNIG. KALK-SPETTET SVR BANDET			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: 90 Sted: Hull nr.: 10064

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		233.0	Vekslende lamellert klorittisk og homogene tetter / lys felsisk tuff, enk. tynd med ~~sy~~ innsp			
		235.1	Dac breksje (sonvis) med klorittisk matrix			
		243.7	Dacitt massiv lys grå homogen.			
		247.0	Klor tuff med enkelte svake fragm. innlag Dacitt som tidligere ~~ka~~ 249.20 Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: EH/KE Retn.: -90 Sted: Hull nr.: 10064

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	20	198.20	Sandet klorittrik tuff enkelte kvarts fragmenter 2 lag ved 1965 - 70.5 tynnere svak py inn i bånd og stikk usikkert enkelte feltspatter bånd mot slutten av kjernen svarer			8 10°
		1960	Undersøkt tynn seksjon fra 198.20 - 1960	1963		
	213.80		Klorittrik tuff. med feltspatbånd og py imp. meget svak enkelte små rikere bånd Fra imp fra 210.00 - 211.10 og fra 212.15 - 212.95 meget svak imp 212.95 - 22.40	1 2 3	198.80 - 200 200 - 201 201 - 202 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 212 - 212.95 213.00 - 215	
	224.40		Imp. i feltspatisk og klorittisk bergart py og noe cp også fram til 215.70 feltspatisk rikere klorittisk svak fra 218.90 meget svak mot slutten		215 - 216 216 - 217 217 218 - 219 220 - 221 221 - 222 222 - 223.10	
		227.40	Tuff. andesittisk med enkelte fragmenter (svart mørk)			
		231	Gas breksje med tuff?) klorittisk i matrix			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10064

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			140.10 Same bergart men efter en diffus overgang noe finere fra 149.50 mere op og 2r gangen 5000 av ovd silika.			
		152.50	Dasitt fintkornig mørk blågrå			
		157.50	Dasitt grov-tekstur lys grønnaktig.			
		159.70	Dasitt fokem-som tidl.			
		170.25	Bandet tuff. klastisk + epidot. NB. Ukeskende overgang fra Dasitt til tuff. i berg. fra 170 rik på finere fragmenter diffus overgang til. Bandet klastisk tuff en-kelte finere fragmenter			0-20

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Prk III

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10064

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		63.-	Aglomerat mørke fragmenter av forige bergart dass.			
		64.41	Kalkrik tuff. SEP tekstur pga. kalk.			
		65.-	Rund-das. Mørk Silisifisert kalkrik tuff. første 50 cm kalk øyne og mere mørk mørkt banded epidotrik spor av py. fra 83.-85 Store 5-10 cm store fragmenter av das med kalk øyne og mt			
			r) 90 cm mass partier med calk blærer			
		91.50	klorittisk tuff med svart fragmenter.			
		94.	Mass rund - rund das spor av py.			
		95.70	Mørk das.			
		98.70	Calk andesitt med meye epidot og karbonat + qz. ant en flow med svarte bånder. blærer med ep. og cc.			
		103.-	Mass rund.-das.			
		105.10	Svakt banded bergart ant en flow			
		105.20	tuff. med das. fragm			
		111.50	Mass rund das. noe cc og qz øyne			
		115.50	Svakt banded mass das rund - klorit rike partier			
		150.50	Mass. kalk rund.-das med bånd av klorit og lys lilla.-jasperoid fra 125 mere tuffittisk En v 130-145 vekslende båndet variererende mengde svarte fragmenter (i flow) fra 146 svarte og mere mørk			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 31/8 · 77 Sign: DSH Retn.: ÷ 90 Sted: Hull nr.: 10064

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		3.04	Grønn tuff kloritt med enkelte kvarts fragm. og fragmenter av eruptivt materiale noe cc og sprekker.			S 20°
		8.30	Mørk grønn tett finkornet dasitt			
		8.50	Exhalitt med jasp og stiptomelan. Flow struktur ? typisk for området vertikalt			
		13.30	Das. andesitt på kalk og ep (idet det betegner kalk andesitt)	T		
		13.40	Exhalitt : jasp. med kvitka	+ mt		
		14.20	kalk andesitt)			
		14.50	Exhalitt med kvitka			
		30.42	Kalkandesitt epidotrik			
		31.	årer og flekker			
		31.30	Kalkandesitt rik på			
			ekvhalatirt materiale 'kvartsbergart' spor			
			av py.			
		46.40	Kalk andesitt rik på exhalitt materiale v/ca 4 cm i jasp-mt ep. enkelte tynne kvartsårer.			
		48.20	Dasitt mørk type mye mt. i bg. sprukket cc og granater ? noe kvartsårer			
		49.40	Kvartsrik tuff. i bg noe cc og noen tynne bånd med py imp			
		56.20	Das. and. flow med das. fragmenter			
		58.40	Aglomerat			ca 10°
		59.10	Massiv das. mt rik tynn mørk			

ARK IV

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10065

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		223.0	ANDESITT VEKS. TIL DACITTISK AND. SOM FØR.			
		223.50	AND-DACITT			
		228.70	MØRK MAG-RIK SEDSIL + DACITT EXHALITT			
		226.80	DIFFUS. BANDET AND-DACITT SOM FØR.			
	—	228.25	DACITT, MED GRADVIS OVERGANG MED SIDEBERGARTER.			
		229.50	HOMOGEN, MASSIV AND-DACITT SOM FØR MED GRADVIS OVERGANG TIL:			
		230.50	DACITT.			
		231.95	VEKS. MELLOM DACITT OG AND-DACITT			
		237.60	PYROKLAST-AGGLOMERAT: DIC. BOLLER I KLOR. GRUNNMASS MED BANDET HORISONTER RIK I KALK.			
		239.20	KLOR-KALK-RIK BERGART ? FINK TUFF. KALK V. RIK I GRUNNMASS (? DEL AV 'KALKBENKEN' (PRØVETATT)			
		239.50	EKSEPTIONALT grov, KALK RIK TUFF HORISONT (PRØVETATT)			
		239.90	SILIFISERT HORISONT MED LYS GRÅ JASPIS (DEFORMERT) OG Ka-Kv GANG PÅ BUNNET (PRØVETATT).			
		240.90	ANDESITT-DACITT.			
		SLUTT				

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

DIRK II

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10065

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Py imp tynt i bånd:			
			137.10 - 137.20, 139.05 - 60			
			139.10 - -50 139.85 - -90			
		150.50	Som tidligere Das-grad			
			flow. V/ 142.50 ekhalitt			
			Py i bunn sed. silica over			
			+ noe mt. V/146.50 tynn			
			exhalitt mt + sed silica			
		166.00	Kalkholdig flow med			
			sure emrader av dac. kar			
			ater. flow i sog ovk er			
			andesittisk. Enkelte			
			sø cm Pyroklastiske			
			bånd med Py imp spes			
			V/159.- (Dette cm tilsvarer			
			topp av pyroklastene med			
			kis som ligger østenfor)			
			V/152.10 tynn grå jaspis også			
			V/ 157.50 og 159.20			
		166.30	Exhalitt mørk fiolett jaspis			
		167.10	Flow andesittiske rik på			
			kalk blærer			
		168.90	Som ovenfor men utun			
			kalkoyne.			
	169.60		Båndet mt + mass til dett			
			py imp (Exhalitt)			
		170.01	Exhalitt : mt rik sed			
			silica			
		170.50	Rød-das flow enkelte cc			
			øyne			
		170.80	Exhalitt båndet sed silica			
			og mt			
		195.50	Rød- das flow nb oppsprukket			
			Kvarts epidot mot skiften			
		197.50	Exhalitt horisont mt rik			
			sed silica med pyritt rik			
			bånd. Synes å være mere			
			py rik på skiften			
		201.50	Rød- das. flow. Epidot rik			
		202.50	Klor-flekk.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

ARK II

Dato: 20|9|77 Sign: OSH|IF Retn.: +90 Sted: PR 1400, 216 V. Hull nr.: 10065

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			EPIDOTISERT 'FLOW TOP'			
		55.00	CHLOR-FLECK ? TUFF.			
		56.28	KLOR-EP FLOW MED KV BÆRE, MED SKARP GRENSE TIL			
		57.30	CHLOR-FLECK SOM TIDLIGERE, MEN MER MASSIV., MED SKARP GRENSE TIL			
		62.75	MASSIV BAS-AND STRØM MED MANGE EP GANGER.			
		71.05	GRØVK. CHLOR-FLECK TERS. TUFF			
		71.50	FINK STRØM-ANDES MED KLUMPER AV EP. OG HEM			
		71.80	CHLOR-FLECK TUFF			
		72.50	AND-BAS STRØM TUFF, V. SVAK BÅNDET, MED FINK KORNER AV EPIDOT OG NOEN KLUMPER AV EP.			
		73.55	BÅNDET PURPLE-PINK BROWN SEDSILIKAT EXHALITT FALL CA. 20g V TUNNE Py IMPREG. PÅ SLUTTEN.			
		73.80	'FLOW-TOP' MED MYE KALK HOLDIG BÆRE			
		74.40	AND-BAS. STRØM.			
		74.70	V EP RIK ? FLOW TOP AND-BAS			
		76.25	DIFFUS-BÅNDET, MULIGENS PYROCLAST.			
		76.50	DAC. MED MYE KV. BÆRE			
		77.20	DIFFUS-BÅNDET SOM OVENFOR			
		107.50	MASSIV AND-BAS STRØM MED GANGREST MYE EP I GANGER			
		107.80	Exhalitt: sterkt det mag. og Py imp			
		110.30	Mas. basalt - das. andesitt epidotrik			
	110.40		Imp. i bånd Py + kvarts vekx. basalt - and.			
		111.25				
	111.35		Imp i av py i svarta fik (rythedas?) bergart			
		137.15	Vekx! mas and - mass basalt nb mindre epidot nb tynne jaspis 117.50 119.20, 121,20 v/ 118.80 das.			
	1	139.90	Pyroklastisk materiale kure doller m/ imp			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

NR. I.

Dato: 10/9-77 Sign: [illegible] Retn.: [illegible] Sted: Tajf 1400 2/0 Hull nr.: 1006

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1840				
		18.05	Massiv mot-basaltisk fhv grovkornet tekstur, synlig aktinolitt, epidot nåltorer og klumper med epidot, mot slutten noe mere kloritt rik.			
		23.20	Vekslende kloritt og epidot rik. Tett, med aktinolitter			
			18.05-18.10 Sed. Silica stein dårlig			
			18.40-18.45 — " — — " —			
			18.50-18.95 grå jaspis med sluttstk. sed-silica			
			19.30-19.95 som ovnan Hz + Fz-tuffen ved 19.97. fragmentær med jaspis. f.o.m. 20.			
			Fr. 21.07 og 22.50 - tynne MAG-Ex. med spor fr. intreg.			
		48.04	VAR. GANGE. STRØMMER MED EXRLITT FR.: 32,50 (LMA); 34.20 (CAL-ISH KISS SOLM 18.50) BLI MER ANH-FACITTISK I SISTE M. (FRA CA. 42.00), SAMTIDIGE MER GRANNOKLING OG SERICITT-FLIK, NOE LYSERE			
		48.90	HOVEDSAKELIG SAMME SOLOMEN FOR MEN MER FINKORNIG OG MER TYNNE Ep. GANGER SE V. FINK. FR. IMP I BUND SISTE 25cm RIK PÅ KALKSPATÅRER (SADE-TOP FENOMEN)			
		49.95	TUNNE, FINGRAINED EXRLITT AV MAG MED SERICIL			
		49.20	MØRK CHLOR-SERI RIK TUFF MED NOEN EP OG SERICIL BAND			
		49.60	EXRLITT AV SPRUCE EP. MAG-JASP OG NOEN SERICITTER			
		50.20	RAMU-GRÅ MASSIV MINERALITT			
		50.40	SAMS. DET SAMME MEN V. SERIK			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10067

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
	220.90		Imp gir kraft med enkelte fine fragm	21	220 - 220.90	
		226.	Da 222 gir gro åpenbar mørke tjennemsatt av grå[illegible] spor av Py.			
			1/222 er som kamet med imp. Den gjenkjennet mats med enkelte cc-eyne,			
		229.15	Dag- and fint mark. Grå da fint enkelte cc-eyne			
	229.60		Rembep Py i Dag and matrix Rembep Zn Py i felsitt klastisk vekst. tuff.	22	229.15 - 230	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 6067

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		170				
		172.03	Kal. mas. carbonat og klor rik tuff, vekst. mellom das - and. Comm. tettn. enkelte dass. baller			
		172.10	som ovenfor mere karbonat og ep. rik			
		176.2	Svakt bandet klorittisk tuff. I ldels innslag av dass. tuff			
		179.0	vekst. karbonat, ep. klor rik tuff.			
		183.0	Vekst. kalkrik Tuff m/ grovkornet epidot.			
		196.-	Vekst: Steilbåndet og klorbandet med svart fragment			
		200.0	Mere mas. kom vf/170 tuff med karbonat type.			Nr 2
	215.0		vekslende klorittisk tuff med enkelte felsiske bånd (200.5)	1	200.00 201	0.10
			Noe romb. ep sammen m/d qz.	2	201 - 202	"
			Noe enkeltårer v/200-207	3	202 203	"
			Svakt vinkel romebrisset.	4	203 204	0.10
				5	204 205	0.25
				6	205 206	25
				7	206 207	0.20
				8	207 208	0.10
				9	208 209	0.20
				10	209 210	0.20
			Svakt bandet klor Tuff m/ epidot		210	"
			Som ovenfor tettere		211	"
2			" " mer ep		212	"
			30cm kalkrik tuff " "		213	"
			Svakt linsp. spor av ep		214	"
212.20			Mere mas fra 214.50 - 212.20		215	"
	216.-		en grabbig stripe ingen mineralisering, ep rik fra 217.00		216	"
			212.-		217	"
218.20			grovkornet py ingen synl. ep Zn.		218	1.0
					219 - 220	1.0
			Litt mer i bandet tuff			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

ARK II

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10068

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprøve	Anmerk.
			HORISONTER AV MASSIV BAS. AND.			
			? FLOW, MEN HOVEDSAKELIG			
			PYROKLASTISKE.			
			F.EKS: FRA 110.07 TIL 113.60			
			AND. BAS STRØM MED EP. BLÆRER, MED			
			AV OG TIL NOEN PY I BLÆRER.			
			SE NESTE ARK.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

ARK I

Dato: 21/04/77 Sign: OSH/IF Retn.: ÷ 90° Sted: Hull nr.: 10068

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		5,50	AND STROM MED EP GANGER. OPPSPRUKKET PÅ SLUTTEN			
		24.40	DACITT EKSPL BREKSJA MED Py 9,50–10.0			
		26.25	SAMME MEN MYE MER DOMINERENDE AV SURE FRAGMENTER, STERK BREKSJERT MED DAC–RHYODAC FRAGMENTER. STERK OPPSPRUKKET			
		28.85	AGGLOM/TUFF AV DAC. KARAKTER, ENK. RHYODAC FRAGMENTER OG BÅND. KALK-RIK I PARTIER			
		30.30	GRÅ-ELM ? DAC. M. KLOR-EP BÅND			
		33.70	MASSIV, TETT, FINK. DACITT. MYE KVARTSÅR			
		33.85	KLOR-FLECK ? TUFF (PRØVETATT)			
		88.10	MASSIV MØRK DACITT SOM OVENFOR, MED SILIFISERING			
		88.50	KLOR-EP RIK AGGLOM/TUFF, VEKSLENDE, DACITTISKE FRAGMENTER, NOE KALK I STYKK. BLIR MER BREKSJE MED DOMINERENDE GRUNNMASSE (KLOR. SA) 50-60 KLOR-FLECK 53.50 60–70 KLASSISKE AGGLOMERAT MEN MED TETT VEKSLING MOT SLUTTEN. 70-80 : VEKSLENDE AGG/LAP TUFF MED GRUNNMASSE AV KLORITT/EPIDOT. RIK I DAC FRAG I ALLE STØRRELSER. 3 FOR Py			
		94.60	MASSIV AND-DACITT, SYNES LITE SUR MOT SLUTTEN			
		96.70	AGGLOM/TUFF SOM OVENFOR 3 FOR Py.			
		97.20	DACITT, MED DIFFUS OVERGANG TIL			
		100.00	MASSIV AND-DAC SOM OVENFOR, M NOEN SURE FRAGMENTER			
		101.55	MASSIV BAS-ANDESITT			
		150.00	AGGLOMERAT MED ALLE FRAGMENT STØRRELSER, AV DAC AND. FRAG I EN BASISKE GRUNNMASSE. NOEN			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

ARK III

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 1662

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			150 -			
		156.15	Das fine tett grå grå gyl kvartsårer			
		158.0	Agglomerat dårl frag. veksl.			
158.25			Band av mørk tøff - middels kornig kis kise ep e.a.	1	158.05 - 158.25	•
		159.0	Agglomerat			
160			Mørk noe båndet kis mere	2	159.20 - 160.-	•
161.-			etter hvert noe båndet	3	160 - 161	•
			noe ep. ~~grus~~	4	161 - 162	•
	160.30		Mørk imp tekstur og elv.	5	162 - 163	•
			tøff noe ep	6	163 - 164	•
161.20			båndet mørk kis sterk	7	164 - 165	•
			imp pen ep v/ 160.50	8	165 - 166	•
	161.60		Sterk imp i bånd rekt/lp	9	166 - 167	•
	162.-		Båndet sterk imp			
	162.45		Klar Tøff med bånd mål noe imp			
	162.90		Sterk imp båndet noe ep			
	163.60		Klar tøff med enkelte imp bånd			
	164.25		Skrå båndet i klar / fels tøff			
	165.-		Fattig båndet imp i klar tøff			
	165.90		Sterk båndet imp m/ noe ep.			
	166.35		Svak båndet imp			
		167.5	båndet klar/hvit tøff m/ ec			
		167.25	Svak imp i klar Tøff			
		169.-	bånd klar tøff m/ ec			
	169.5		Svak båndet imp i klar og felsisk tøff	10	169.10 - 169.55	•
		170.15	TUFF M. MYEV. FINFORDELT KALK (? KALKRUKEN) - SOM FINNES OGSÅ I DBH 1006 S. UNDER HAR VI TUFF / AGGLOMERAT AV KLOR-RIKERE KARAKTER			
	173.50		BÅNDET IMP, NOEN CPY, I KLOR-TUFF	11	170.95 - 171	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

ARK IV

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10068

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		184.0	KLOR TUFF MED V. DIFFUS OG	11	171-172	
			UJEVN IMP. N.B MYE V. FINK. ÅRÅK.	12	172-173	
		189.15	SAMME MEN UMINERALISERT, KALK-FA	13	173-173.50	
		190.55	FINK TUFF M. ENKELTE KLOR-KVIT	14	179,55-180.20	
			-KALK BLEKKER MYE SPREKKER MED	15	181.05-181.40	
			KVIZ-KALK. * DACITTISK.			
		191.60	FELSISKE TUFF MED PY IMPREG.			
			(HOVEDSAKELIG KV-IDIOMORF) PRØVETAK			
		196.20	DAC KLOR TUFF M. ENK. TYNNE			
			IMP. BÅND. AV OG TIL AGGLOMERATISK			
			(fra 194-) FRA 194,50 ENK.			
			FELS. BÅND.			
		224,30	VEKS MELLOM KLOR OG FELSISKE			
			TUFF SVAK PY IMPREGN. MOT 199			
			FÅR VI BÅNDER AV FELS TUFF. ?			
			OPX HOLDIG. TETTOR VEKSLING			
			ETTER HVERT, OG KLOR TUFF BLIMOR			
			LYS-GRØNNAKTIG IMP. I BEGGE			
			KLOR OG FELSISKE.			
			VED 206-207 PRØVER MED MASSIV			
			DACITT-ANDESITT.			
			SLUTT PÅ IMPREG CA. 206.0			
		226.75	DAC-RHYODAC.			
			BÅNDET KLOR / DAC TUFF M. ENK.			
			TYNNE FELS. BÅND. EN DEL SVAK			
		230.10	PY IMP. I FELS. BÅNDER			
		231,15	MASSIV DACITTISK TUFF MED			
			ENK. KLOR-KVIT FRAGMENTER			
			OG PY KORN			
		233.65	VEKS. KLOR-DAC TUFF + ENK			
			FELS BÅND OG FRAGMENTER.			
		236.00	SAMME, MEN IKKE SÅ SVAK-			
		SLUTT.	TIL BASALTISK PÅ SLUTTEN OG			
			MER HOMOGEN.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

III

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10069

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		200.60	mas and - das gang?			
	200.85	200.85	Brekket and - das gang! med imp	25	200.60 - 200.85	
		201.35	mas and - das gang. i/m		201.35 - 202	
	202.70		Grov py og noe cp i bandet imp - feld. fragm og das fragm. i/band		- 203 - 204 - 205 - 206	
			Fin bandet py imp i veksl. felt. intermed. tett.		- 207 - 208 - 209 - 210	
			10069 Slutt ved 210 m Z			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

...orlog

II

Dato: 18/11-77 Sign: [illegible] Retn.: Sted: Hull nr.: 10069

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		142.50	Mass and tuff ? meld mye			
			cc amygdaler			
			Virker noe forskjell			
			2-3 grønn amygdaler			
		170.30	Klint tuff epidotisk			
			overlert med calcitfylling			
			Kaller 172/180 er smeltet på bakket			
			enkelte store fragmenter			
			mot slutten mint til 'Chungen'			
			og noe py imp i disse			
			disse opptrer sammen med kalk			
			så det er nok en breksje			
		176.30	Tuff av overveiende klastisk			
	180.11		materiale med noe feldspar			
			band og py imp	1	172.35-173	
			172 py imp med calcitårer/gjenn	2	173-174	
			173 brekkert med py imp	3	174-175	
			174 noe tettere imp samme py	4	175-176	
			175 py imp store runde frag	5	176-177	
			176 py m/kalkspat materiale	6	177-178	
			177 py imp svak	7	178-179	
			178 — " —	8	179 180	
			179 — " —			
			imp avtar. grønn med			
			slutten			
		183	Bandet tuff/aglomerat	9	183-184	
			med svak py imp	10	-185	
	191.4		pen grov ep ved 186	11	-186	
			5-10" mg 2-3 tynne felt.	12	-187	
			uregelmessig mineralisering	13	-188	
		192.70	mass dels flow-gang	14	-189	
				15	-190	
	200.05		Bandet imp feldspatrik m/	16	-191.4	191-191.4
			196-198 pen ep og noen	17	192.70-193	
			matrix er lite tuff med	18	194	
			felsisk lag fragmenter	19	-195	
			m/ 199 strekt oppsp.	20	-196	
				21	-197	
				22	-198	
				23	-199	
				24	200.05	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 12/10/77 Sign: PSH/IF Retn.: ÷ 90 Sted: Hull nr.: 10069

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	FRA 20.0	21.58	MASSIV AND-DACITT.			
		36.75	VEKS. BÅNDET TUFF MED AGGLOMERAT, FRAGMENTER EGGE SURE OG KLOR-RIK. ENKELTE STOR BOLLER AV DACITTISK ?			
		37.85	KALK-RIK TUFF MED MAG + PY, FORTS. MED MINDRE KALK MOT SLUTTEN.			
		38.55	TUFF SOM TIDLIGERE MED SURE FRAGMENTER.			
		38.95	KALK-RIK TUFF M. MAG. SOM FOR, SPOR AV V. FINK. PY.			
		39.70	SAMME, MEN UTEN SÅ MYE MAG.			
		45.50	AGGLOMERAT SOM FØR ETTERVERT RIK MER PRESSERT, MED GRADVIS OVERGANG TIL:			
		47.60	'ZEBRA-TUFFEN' – V. STERK, FIN TIL MIDDELS BANDED, FN STERK PRESSERT AGGLOMERAT. (KRYSTALL)			
		50.00	MASSIV DACITTISK STRØM, TIL AND. I KARAKTER			
		51.20	'ZEBRA TUFFEN', PRESSET AGGLOMERATE			
		54.30	TUFF / AGGLOMERAT, MED KALK I SYNE OG SPREKKER			
		57.80	SAMME, MEN MER MASSIV MED SURE BOLLER.			
		97.70	VEKS. AGGLOMERATER OG TUFFER VED 41 60 S = 40 g			
			overveiende klar tuff das. fragm.			
			ved 70.30 noe kalk-mt.			
			ved [illegible] overveiende massiv			
			rik på kalk.			
	109.00		Dacitt lys grå spor kalkårer ikke fenokrystallisert			
		113.20	Aglomerat / Breksje kalkrik			
		118.70	Dacitt lys grå massiv			
		120.30	And-das + lav noe tuffitt			
		122.50	SØP - klar tuffitt			
		130.00	Vekslende and-das + lav ? og tuff.			
			enkelte das fragm. i tuff.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arkiv I

Dato: 21/11-77 Sign: [illegible] Retn.: [illegible] Sted: Hull nr.: 10070

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		9.50	veksl. mass and – das og epidot ink tuff? Pitelava – dypt brekje noe diffus overgang til epidotisk			
		15.90	Epidot ink sterkt omrandet Tuff-aglomerat tildels med svak klor flekk utv.			
		19.30	vekslende tuff sterkt epidot-kalk. enkelte sure fragm. og Py &.			
		20.20	Exhalitt, bandet mt-ep. veksler til noe sed silica			
		29.00	Brekje kalk og epidot usjennomgående fragm.			
		[illegible]	Mass. and-das. Brekiert og epidetisert, bandet 30-40 veksl and/das og kvarts 40-50 —— " — med massive lag pitelava?			
		1 "	Diffus overgang til			
		64.00	Tuff agl epidot klorittisk i veksl med and-das tuff enkelte større rynodas fragm.			
		129.00	Rynodas agl i veksl. med das tuff? ved ca 60 m mere chlitt for å gå tilbake til rynodas tuff sterkt brekiert sunonymt sedrattuff. 60-70 Rynodas agl. tuff. med enkelte mere kas band ved 90-100 mere kas band ved 100-120 Overveiende kas materiale mye ep (bandet) enkelte rynodas fragm. ved 110-120 diverse i gjen Bunn 129.00			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

11

17.00 S

Dato: Sign: Retn.: -90 Sted: Sydmelmen Hull nr.: 100-70

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		161.20	Breccje (+ agl ?) + vekst. matr.		0/40-60	
			Mass dasitt and. fine-kort			
		163.20	Banded ~~fine~~ and. das tuff			
			enkelte cp. og e ritic band			
			endel større kvarts fragm		~ 0	
		156.60	Mass kort lys og lysgrå			
			dasitt årekks m/and das			
		168.20	Banded tildels kalkrik			
			~~tuff~~ kvarts og fels. fragm		~ 0	
	168.75-169.25		Banded ~~tuff~~ med			
			fels. fragm og vmp	1	168.20-168.75	
		170.20	Banded tuff med kvarts			
			fragm.			
	173.70		Banded tuff og partier med	2	173.25-175.70	
			fels. tuff. og Py vmp spor.			
			i fels tuff			
		179.45	Banded tuff			
			v/ 179.60 10cm fels tuff m/			
			Py vmp			
		180.00	Banded overveiende klar tuff	3	180-181	
			med vmp fels band Py	4	181-182	
	186.75		Overveiende fels. tuff	5	182-183	
			og agl. Py vmp + spor av cp	6	184-185	
			10 cm sammenvoksne 185	7	185-186,25	
		187.20	Mass and/das all kort tuff	8	187.20-188	
	189.25		Klint matrix med fels fragmenter	9	188-189	
			kapillær-tuff + tildels rik vmp	10	189-190	
			og noe Cp Gjennomsatt		190-191	
			vmp		191	
		192.45				
		192.60	Das tuff kvartsfragm.		192	
			Banded tuff med cp og		193	
			Py vmp.		194	
			Peu cp 199.25-199.75		195	
					196-197.05	
					197.45-199	
					199-199.75	
					199.75-201	
					201	
					202	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark II

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 1070

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			tot imp 204 - 208		203	
					209	
					205	10°
					206	
					207	
					208	
					209	
					210	
	212		på bunnen mye isolvaking		211	
			svitsjd !		212	
					213	
			ned-dras hvitt enkelte fg°		214	
			fragm.		215	
			Spor av Py. og enkelte		216 – 218	
			band med imp			
			v/ 225 magnetkis			
			tildels kavernøsleg			
			235 slutt.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

I

Dato: 13/8 78 Sign: OSH Retn.: ? Sted: 22 - 24 Hull nr.: 10071

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.8	Kjernetap / Jordboring			
	3.05		Dacitisk tuff, lys grå, tett bånda med små 1-2mm fels fragm. rødbrune, med feldspat imp. bånd uten ep	1	1.80 - 3,05	bånd 35°
	7.00		Som over, men med større dacitiske fragm. og tynna fels imp., tiltagende imp mot slutten	2 3	5 - 6 6 - 7.60	
7.60			Tett imp uten ep			
		12.05	Dac tuff med fels bånd og py imp i fels bånd mot slutten, en liten svakt rødbrun fragm. og mere klorittisk avsnitt			
		26.95	Tett finkornet parti opplost på sprekker massiv dacitt, klorittisk ca 1 m tykk			
		27.75	Klar flekk markerte brå grense til gråbrunlig gå massiv homogen			
		28.90	Dacitt tett homogen noe klorittisk			
		43.20	Aglomerat med dacitt grunnmasse og rare og fels. fragm. Bare py imp, blanda med klorittisk tuffitt.			
45.40			Tett imp / massiv kis med enkelte fels og rødbrune små fragm. noe epidot.	4 5	43.20 - 44.- 44 - 45.40	
		46.55	klorittisk tuff med enkelte små fels. fragmenter. Veks. Tuffklorittisk / tett imp med noe zn ?	6	46.55 - 48.35	
	48.55					
		49.20	Aglomerat i tuff. fels/ klorittisk			
	49.45		Rødbrun breksje med imp.			
		49.65	Aglo - / tuff.			
51.05			Tett imp i massiv py enkelte rødbrune 1 cm fragm bånd. Serisitt	7 8	49.65 - 50.00 50.0 - 51.05	∠ 35°

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10071

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		58.70	Tuff - Agl. veksl.			
			fra mass - lapilli tuff -			
			- agg. 20 cm fels fragm			
			makriks and-das.			
		70.05	Tuff - Agl. veksl.			
			dasittisk mass - mye			
			fels mat i alle størrelser			
	71.15		Tra Tuff grønnlig mag			
			i grovt agg.			
			ved 70.70 dunkelt jaspis	9	70.05 71.15	
		2185	veks. agg. mer usortert lyst			
			vl 75m En annerledes jaspis?			
			vl Store jaspis. Mye frag.			
		2	Mass Tuff - Das tuffitisk flow ?			
			Veks das flow med dun. agl.			
		117.60	spor av mag. enkelte			
			fels fragm.			
			✓ 109.5 finkornet og lyse			
			morken gl. fragm. mellom			
		118.70	Krystaller / dunkelt. Mye mid			
			gråbrune deretter			
		130.75	Dasitt mass med			
			enkelte fragmenter			
			økende mengde frag			
			av Dasittisk og fels. mat.			
			Økende mag. i spagni			
			mye i Land ved med mye			
			grått i mellom	10	121.40-123.20	
			mass dasitt til dacitisk	11	122.60 - 123.50	
	126.80	2m	Tydelig mag dreper og - en	12	126.80 = 128.50	
			i acide fels. tuff	13	130.75 - 132.	
		138.30	Breksje av dasitt	14	132 - 133	
		155.60	Agglomerat dasittisk	15	133 - 134	
			i veksl. m mass fine	16	134 - 135	
			dasitt	17	135 - 136.00	
				1		

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

III

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10 e 71

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			med enkelte py imp	18	145.20 - 145.50	
			bånd			
		166.80	Tynt tett dasitt med sutter			
			noe torekstivert			
		165.75	Vekslende das og agl. med			
			noe imp			
	171.10		Imp. py. tildels tett i			
			fels. grunnmasse noe	19	166.70 - 167	
			porøsitt. Dasagrender	20	167 - 168	
			mot sutter	21	168 - 169	
				22	169 - 170	
				23	170 - 171	
		186.90	Vekslende dasit agl	24	186 - 187	
			med enkelte py imp bånd			
			tynne til tels. bånd, noe			
			cc			
		193	Dasittisk flow massiv			
			lys lilla tett noe cp			
		193.45	Rhyodasitt rust tett svertefa			
			py imp finfordelt			
		196.8	Dens flow noen svertefor			
		201.0	rhyodas. tett imp sver			
			massiv cp. lyse py imp			
			tett?			
		202.15	Klart lilla tett			
			Dasitisk med noe cp og py			
			vekslet med tuffbånd	25	202.15 - 203.25	S v O
202.15			Massiv sink i bånding med			
			lite py og noe cp			
		209	tuff med enkelte fels. fragm			
			enkelte lynne py imp bånd			
			med stringers ?			
			blir mere massiv og mørkere			
			men fortsatt Tuff			
			fra ca 209			
		216.00	Aglomerat fels. fragm	26	212.80 - 213,80	
			svak py imp fels tuff			
			Massiv lys tett kvarts			
			dasitt brekkiert			
		232.10	noe lys spottet tuff. Kalk avsetning			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

IV

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10071

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprøve	Anmerk.
		235.80	Fels-glas aglomerat			
		239.00	Mass. glas. gj m.			
	~	245	strekkret klastbert 30°			
			Gas-and? (Tuff?)			
			tildels noe kalk			
			Fabel			
		263.40	Kalk tuff banalet		$\delta \cdot 15°$	
		325	kalkrik tuff men med epidot			
			og mere klastisk fakk			
			materiale enkelte mt stripor			
			og lys rød epidot			
			sterk deformasjon			
			ved 278 laminasjonsutvikling			
			ved 285 muligens 2 m puta			
			lava: mass bend., mm			
			tildels preget av deformasj			
			ved 290.50 exhalitt med			
			punkt enkelte flere	27	290.50 - 290.60	
			exhalitter som er def-			
			og sterkt foldet			
			ved 300. fullstendig det og			
			brekkstring og bergarten er			
			nærmest ren epidot,			
			tydelige det exhalitter			
			opp til 315.			
			Antagende det 2			
			kalkrike tuff / carbit med			
			flow 2.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

IIIII

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 100771

Kis	Imp.	Berg 330	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		337.40	Kalkrik Tuff med epidot utvikling sterk del enkelte få fragmenter ved 334. 2 m mangan ved 337,10 — 337,40 Exhalitt Rikt magnetitt i Sed åriea			
		338	Mass and-Exhalitt med enkelte kalk epidot Ukjente deformasjon fra 340-50			
		367.00	Tuff og agglomerat i Sterkt deformert epidot på stygmatiske forhold			
		397.30	Exhalitt karakteristisk utvikl med pyritt (magnetitt spor?) Helt spesiell bergart i oppblanding med tuff og epidot bånder. Ved 373 - 380 Sterk dol-bergart men exhalittene virker tilsynelatende ubrutte magnetitt inn (Det hele virker til å være en veksel mellom tuff-agl. og exhalitter uten mellomlag) mot slutten mindre dol og mere Tuff preget		(Prøve Gen.Ø Chrisfield) (379.60 — Prøve)	
		408.50	Kalkrik massiv gå med diffus granoblastisk tekstur bergarten virker homogen men kalk innholdet varierer Kalk Tuff tilsvarende kalkholdig og enkelte partier med klorittisk			Prøve
		427.20	Som ovenfor men inneholder også rytmiske og rytmiske strukturer A.s.		Rytmisk	Prøve
		428.40	Exhalitt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

VI

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 607/71

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		437.20	Kalkrik tuff / massiv brekciert enkelte enhaelitt bånd bildels brekciert magnetitt ~~ø~~kende kvarts mdrinale fra 325			
		644.20	Massiv (kalkrik?) gr lapilituff med gabbroisk bånd			
		648.40	Velsortert kurs bend 10-15 cm. (kalkrik?) lapillituff i overgang mot fyx			
		668.25	Fyroklas. bånd brekciert mot av fyx.			
		669.20	Klorittisk. gabbroisk gå. Agglomerat / tuff.			
		670.80	Fyx-klas mate. dan fragm kalk og epidotrik, noe sort av fyx inne. Avtagende fragm og å få en homogen tuff med massivt utseende fra ca 683 med klor rikt. retrikkeling forhold ellers det			S. 36°
		680.75	Tuff med klorittisk. og enkelte felsisk fragment og fuller a noe av fyx			
		681.20	Enhaelitt samm med den tuff mot a dom av fyx			
		687.70	Kalkrik tuff: lik med lyse kalkrike bend og klumper med kalk mineralet ~~øk~~ økende kalk til bandet tuff / kalk i kom retn.			925°
		725.95	Sur tuff / agglomerat kun fragmenter Tildels brekciert og trakt noe av fyx. til dels porfyr helt dominert av rhyolitt. fragm			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

VII

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 4007

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		478.00	Banded klorittisk / kalk rik tuff med diffus overgang til			
		509.90	Tuff med klorittisk / sjabbroide deler enkelte partier er av mer adskilt kloritt / kalk enkelte pyr og antydning til exh. m/mt mot slutten mere fin k og med finfordelt kalk			
		525	Massiv middelskornig klorittisk tuff? med enkelte pyrit bånd der i om. mot fin. klorittisk tekstur. Diffus overg			
		527.50	Kalkrik tuff / klorittisk tuff			
		529.20	Massiv fin k homogen mot kalkholdig og fin klor. - flekk			
		529.70	Kalk / klorit tuff (skifer)			
		540.25	Massiv homogen kalkholdig med klorittisk tekstur Økende kornst. mot. Økende anv av kalk rikt lysgrå materiale			
		540.55	Erratisk sed silica og mt sterk diff. r			530°
		541.05	Klorittisk kalkrik			
		541.35	exhaustiv mot silica og sterkt finbandet			525
		542.00	Overgang til exstrem svr mot rød rutnets - agg? eller bioturbus omvandling? med litt ex vaitt til slutt mt			
		548.80	Massiv fin lysgrå grå grå til mot. diss. rød med bånd av ex og pyr			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

III

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 1007

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		559,0	Bændet overdrevs gl — kalk. spinla gl i veksling med kalkrike gl klorfleckt			
			v/ 649 kvartsårer. og fra 550.00 kun 'klorfleckt'			
		561,5	Bændet: Klorittsk. og kalk. vis tynt med enkelte linse fragm + 1 cm vise pyritt i enkelte bånd Ved 559,70 og 559,95 pyritt imp. tildels sterk retter sig opog ned.			
			Imp 560,10 - 560,25	28	560,10 to 560,25	615°
			og sterk imp 561,10 - 561,15			
		564,5	Uregelmessig lys. grønnsket kvartsgrå grønnsten samt et agglomerat			
		569,70	Bændet kalkrike — klorfleckt med enkelte rundodes fragm / bånd med et diffust parti agglomerat 669,10 - 669,70			
		570,30	Def kapillit tynt Dannelse karakter.			
		571,00	Kalk - Klorittsone			
		571,60	Pyritt - Sphalerit - linse			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 11/1-79 Sign: OLH Retn.: +90 Sted: Dokkerommet Hull nr.: 10072

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
10m kjørt		15.0	kj. top			
		26.50	Aglomerat: Rundstein fragm med kalk i sprekker matrix klorittisert og epidotisert rik tuff Enkelte enkle epidot årer		E ~ 0° S ~ 10°	
	28.25		Aglomerat med sv imp og enkelte tette imp bånd. Sporadisk også et lyst sulfid forekomst?		Prøve tatt	
		28.75	Mafisk ens bergart, men uten et tragt/gang			
		37.-	~~Aglomerat~~ som for 26.50			
		39.30	Klorittskifer			
		39.55	~~Aglomerat~~ som ovenfor			
		39.80	Epidotrik tuff			
		41.60	~~Aglomerat~~ som ovenfor			
		52.25	Anal/ Dan. mørk bergart mellom enkelte klorittbånd og epidotbånd grå ble med enkelte kalkamygdaler v/ 44.40 ep. rikt bånd blir lysere og mere mafisk mot slutten (mere dan. i sammensetning		E ~ 10	
		55.45	Ep rik brecsiert bergart med klorittstriper			
		61.40	Mørk sterkt omf. bergart med kalk og epidot (andesitt med noe for mye kalkinnhold?)			
			61.40 Slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

III

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10073

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		173	Lagl. Tuff and.— das grunn- masse en del klorit enkelte felds. fragm.			
		175.20	Kalkrik tuff			
		177.50	Mas das grå / lys grå bergart som blir mere kalkrik mot bunn (spectr.)			
		195.50	Basalt kalkrik matter. noe banket ved 196 og går over til en mørk tuff?			
		197.20	Diffus lys del berg art hetrogen (Das preget tuff som går over til en pillow breksje.			
		198.40	Overveiende das.— Rhyodas fragm. Aglomerat			
		202.30	Diffus del berg art preget agl.? Økende andel lure fragm. grunnmasse. tuff. mot bunn. ep. innhold			
		207.20	Mas lys tett das gå, tuff.			
		211	Samme bergart som for diverse, evt. pyroklaster? Gradvis overgang			
		264	Das / And flow mørk mye epidot /			
		268	en mere dasittisk utg av denne flowen.			
			268 m slut			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 100173

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		90-100	blå og er magnetisk noe ep. Fyll			
		121.0	Vekslende tett. lite kloritt / mye epidot Svirc dass. trag. Disse virker rundere, og er kåledet dass del av noen vrenje?			
		110-120	Enkelte massive partier med gv. amygdaler. (Hem.)			
		144.0-2	Dacitisk / kloritt			
		(130-140)	breksjert ep. helelet ep. innsm og breksjer-ingen avtar noe eller bvert. og berg arten blir mere dacitisk			
		144.90	Rhyodacitt blå finkk tett.			
		170.-	Vekst. Dac - and. med enkelte ombrudte bånd eller fragmenter av Rhyodacitt. Sterk olet.			
		(150-60)	kan tolkes som en tuff sone eller at vi har en meget sterk deformasjon. og et fragment er brosset og tolket ca 160° Det opptrer relativt Store rhyodac. fragm i nærheten av disse noe pyritt.			
		(60-70)	Det er noe noe tuff materiale ut å går, men hva bergarten skal betegnes er uklart. lag eller frag av dac. Rhyodac.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arkiv I

Dato: Sign: Retn.: Sted: 1200 Hull nr.: 10073

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		8,60	ep. rik das / hnd. massiv. blir noe mer dasitisk mot Eidfjell			
		10,90	Brecsiert (flow top)			
		14,00	Mørk tett massiv + noe cc am. (hnd. flow.)			
		17,50	Sterkt omvandlet og kvartsinfiltrert bergart. kan være en flowtopp som er intrudert			
		108	Brecsiert hnd flow svært kalkrik. tett fargen mørk, fra mørk til lys og vi har en overgang til en mer dacitisk hov. avbrutt av enkelt flowtop med ep. py + noe mt			
		(40-10)	Sterkt silisifisert (stringer) i breksje.			
		(43)	Sterk brecsiert dasitt med mt. chl. bånd			
		(50-60)	Mye ega brecsiematerialer dette helle et definert prøve – sterk omvandling			
		(60-70)	Samme bergart men brecsjen består av Stenrelokaler av Dacittisk hnd.			
		70-80	mot sluttet flow top fortsatt stive def.			
		(80-90)	Overveiende dacittisk materiale, Enkelte partier og bånd med rhyodac. prøv bergarten — grå			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

II

Dato: Sign: I L F Retn.: Sted: Hull nr.: 10074

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			MED LAG AV KLOR TUFF			
		167.0	KLOR-TUFF (REL.)			
169.60			V. STERK TIL MEST MASSIV. Cu-RIK			
			167,20 — 167 PO.			
		171.90	MASSIV AND-DAC TIL DAC STRØMARTIG			
	172.50		GANSKE Cu-RIK IMP I SVAK			
			MATRIKS MED KLOR PARTIER			
174.40			MASSIV MED TYNNE STERK IMP.			
			PARTIER, Cu-RIK.			
	176.80		STERK IMP TILD. Cu-RIK			
	180.25		SVAKERE IMP i KLOR MATRIX.			
			BANDER MER STERK. TILDELS Cu			
			RIK.			
		182.50	KALK-RIK GANSKE MASSIV MED			
			NOE BAND AV IMP			
	185.60		KALK-KLOR TUFFER MED TILD.			
			Cu-RIK IMP.			
		191.00	KLOR-TUFFER MED GANSKE			
			JEVNT V. SVAK. IMP.			
		207.50	GRÅNN TIL LYSE GRØNN BANDED,			
			MEST KALK-RIK TUFFER +			
			NOE STRØM-AKTIG PARTIER			
			IMP. AV OG TIL.			
		208.20	KLOR-FLECK TEKSTUR — ? TUFF			
		220.0	VAR GRØNN FARGET SOM OVER			
			-SAMNS. TUFF MEN MED MASSIV			
			STRØM LAG F. ENS V. 210-211			
		SLUTT				

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: I.L.F Retn.: Sted: Hull nr.: 100742

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		85.50	GRÅGRØNN TIL LYSE GRØNN INJEKSJONER MED NOEN SVÆ EFFEKT. TYNNE (20 cm) MAG (v SV KIS) EKSALITT KARBO PÅ 12.50. EN STRØK.			
		89.20	VEKS. VANL MØRK GRØNN, SVAK TIL ST. BANDET AND TIL BIS.-AND MED MYE MINDRE EP, MER KALKSP I FREK. MOT SLUTTEN MER TYDELIG SVÆ BOLLER (SMÅ) OG KANSJE MER KALKSP. VANTAGELIG BANDET TUFFER MED TYNNE STRØK LAG			
		60.00	V. VREN OG ERFKSJERT KVARSITT ISK LAG MED AV OG TIL SV KIS IMP (NOE GRØT). ? EKSKALITT HORISONT			
		EP 20	VEKS BLÅLI-GRØNN TIL BLÅLI-GRÅ, GRANSKE MASSIV STRØMMARTIG MEN MED MER (SVÆR BANDET) TUFFAKTIG PARTIER.			
		110.20	MØRK GRØNN BANDED, TUFFAKTIG GRADVIS NEDOVER TIL TYNNELAG AVGLOMERAT MED STORE SVÆE BOLLER. NOEN MASSIV PARTIER SPREDT. REGELT STRØMMER VEK 89.50 – 89.60 ! SLUSEFERAT + KVARSITT – ? EKSKALITT HORISONT			
		118.00	GRÅ TIL GRØNN GRÅ MASS DACITT TIL AND-DAC			
		121.30	TUFFER OG AGGLOMER. SOM OVENFOR			
		122.80	DACITT			
		132.20	SVÆE TIL STERK BANDET AND TIL BIS-AND TUFFER OG STRØMMER			
		145.50	EP - FLR AND TIL BIS-AND STRØK MED PARTIER NOE SVÆR (GRÅ FARGET)			
		153.30	SVÆR TIL STERK BANDET TUFFER OG AGGLOMERAT LAGER			
		163.60	DOLL OVER MEN MED TYNNE IMP (SV) AF OG TIL.			
	165.80		SOM OVER MEN STERKER IMP			
166.50			V STERK TIL MEST MASSIV, Cu-FeHg			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 100.75

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			Aglomerat sure fragmenter kloritt og yrkisk tuff svak imp. Py enkelte Noe rikere trag mot slutten sterkt oppsprukket slutt 215 m.		202-203	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10075?

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			av og til kloritthsk			
			1.107.70 lys bredkiert			
			bergart som i Hovorts			
			177 omradet			
			110.40 - 113. Das. agl.e			
			matr. ep			
			Noe brekkiert			
			140- vekst. mellom			
			2 typer dasitt.			
			grense 70°			
		160	Kv.80 leire (prøve)			
		171.4	Grov myroklast Das			
			Bred / Das. fragm			
			matrix klor ep	9	5.10°	
			blir mer tett preget			
			og med mere das fragm			
			evt. store fragm melt og			
			Slutten en kloritthsk tett			
	171.65		Svak båndet imp klor	1.	171.40 - 172	
	181.30		Litt imp klor matrix	2	- 73	
			svak 173.70 noe sn	3	- 74	
			vekst pen ep.	4	- 75	
	182.30		mere grovkornet og	5	- 76	
			og mere kvartsrik ep	6	- 77	
	182.40		båndet og + ep.	7	- 78	
				8	- 79	
		85.90	Dasitt noe kloritthsk	9	- 80	
189.02			Båndet massiv ep rik	10	- 81	
			kis 5 cm bånd med ren		- 82	
			ep		- 82,20	
		191.65	Das/and. mass med		185,90 - 187	
			tilenkelt 20 cm das		188	
			fragg		189,03	
			D.		191.65 - 193,10	
	193.10		Båndet imp tildels		193.40 - 194	
			meget kobberrik		- 195	
		193.40	Båndet kloritt tett		- 196	
	198.60		Båndet imp enkelte rike		- 197	
			kobberbånd samt		- 198	
			noe kvartsbånd		- 199	
	200		Svak imp vekst klor/tals		- 200,50	

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 24/6·78 Sign: OOH Retn.: ÷90 Sted: Sydmalmen Hull nr.: 1075

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.50	Jordboring Casing			
			Vekslende klorittisk tuff/			
		29.65	Aglomerat med enkelte			
			kvartsfragmenter i			
			finkornet epidotisert			
			matrix (noe brekciert)			
			sterkere brekciert og			
			mer epidotrik mot			
			slutten			
		29.30	Ekshalitt ~~tuffitt~~ mt			
			rødaktig ? epidot			
			noe brekciert (Lettere			
			tilt at kvarts ekshä			
			litt finnes ved 22.90			
		30.50	And/das sterk grønn			
			massiv flow.			
		31.65	Ekshalitt mt og sedimentær			
		42.20	basaltisk and. flow.			
			sterk grønn			
		44.8	—"— med enkelte			
			klor. bånd (ikke Tuff!)			
		65.5	Vekslende av og til			
			noe tuff preget			
			men overveiende		10°	
			And. basaltisk flow			
			med merkelige kvarts			
			fragm. i bunn.			
		78.20	Dacitt/and. brekciert			
			enk. enkelte ep bånd			
		76.3	Ekshalitt båndet mt.			
		86.4	Tuff/aglo grønn ep. båndet			
			tuff/aglomerat			
			med enkelte basaltiske			
			lag.			
		89.70	Dacitt/And			
		92.80	mørke fragm i en epidot			
			rik grunnmasse			
		94.40	—"— uten fragm			
		95.95	aglomerat —"—			
		151.80	Dacitt/Rhyodas			
			i veksl. med kv. porfyr			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: ILF Retn.: Sted: Hull nr.: 10075

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			MOT SLUTTEN			
	178.30		VEKS SVAKE AV IMPREGN. I KVTS. OG KLOR MATRIKS. PARTIER MESTEN MASSIV, OG NOEN Cu-RIK. NOE REMOBIL AV Cu.		085	
	179.30		STERK. IMP. I KLOR / KVTS. MATRIKS PORFYRO-DASTISK SV. KIS / HI 5mm. NOEN Cu-RIK KLYSER			INNE SETT SÅ GRØNNKOL. KIS FØR I SKORDV. MALM.
	179.60		IMP. I KLOR-RIK MATRIKS NOEN Cu-RIK KLYSER	5 SVERMING ½ GRAMS.		
	181.25		V. STERK IMP + KLOR Cu RIK SMÅ PARTIER			
		185.90	MASSIV DACITE MED KVARTS ÅRER, NOE VEKS. FARVE BLAU TIL LYSER GRØNN.			
	189.00		BLANDING AV V. STERK IMP OG MASSIVE PARTIER. Cu-RIK (+ Sp) 186.30-80. MED KLOR. PARTIER OG LITE KALKSPAT. TYNN KVARTS ÅRE TIL SLUTT.			
		191.60	TETT MASSIV DACITE MED KVARTZ ÅRER			
	199.00		STERK IMP. I SANDER MED KVTS, KALKSP. I EN KLORITT- RIK MATRIKS. DELER Cu-RIK I FIN KLYSER.			
		214	VEKS KLOR / KALK TUFFER MED SVAK			
		SLUTT.	IMPREG. + NOE Cu KIS. NORMA MYE SURE ROLLER			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: Sign: J.L.F. Retn.: Sted: Hull nr.: 10075

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		1.00	MED. KORN STØRR. EP-RIK STRØK AV			
			AND. TIL BAS-AND COMP			
		1.10	MAG (+ S SVKIS) EKSHALITT BÅND.			
			V. FINKORNIG			
		4.35	EPIDOT-RIK, ANTAGELIG STRØM-			
			BERGART MED AV OG TIL V. TYNNE			
			IMP. AND. TIL BAS.-AND. COMPOS.			
		4.50	FIOL EP. + SVKIS IMP I EN TYNNE			
			BÅND			
		44.50	AND. TIL BAS. AND. STRØK BERGART.			
			MYE EPIDOT I ÅRER OG FINFORD. AV OG			
			TIL STEDER RIK I KALKSP. ÅRER.			
		49.00	SANSYNN. BLEND. AV TUFFER OG			
			STRØMMER, MINDRE EP. EN OVENFOR.			
			NOKSA MYE KALKSP I ÅRER OG FINFORD.			
		89.50	VERS. BÅNDET AND. MED VAR. KLORITT, NOEN			
			SURE DELER ? TUFFITISK - NOK FINF. KALKSP			
		92.60	AGGLOMERAT. SURE (DAC) DELER I			
			SVAK BÅNDET MATRIKS.			
		96.00	GRØNN TIL LYS GRØNN SVAK BÅNDET			
			AND-DAC BERGART ? TUFFITISK.			
		102.50	TETT GRÅ TIL LYSGRÅ DACITTISK			
			MED KV. ÅRER			
		117.00	MØRK GRØNN AND TIL BAS. AND.			
			MED DACITTISK DELER. AGGLOMERATISK			
			TIL TUFFITISK.			
		127.00	MASS. AND-DAC TIL DACITTISK	GRADVIS		
		133.60	TETT MASSIV GRÅ DACITTISK MED KVARTSÅRER	OVERGANGER		
		141.00	MASSIV AND-DAC TIL DACITTISK, NOE			
			VERS. KLORITT MANDLO.			
		151.90	TETT, V. MASSIV DACITTISK MØRK MED			
			SKYGGEN- MEGET TYNNE STRIPER SOM			
			FØLGER FALL (ca 40g). ? ALTERATION OF FLOW.			
		166.30	AGGLOMERATISK BERGART - GRÅ DELER			
			I GRØN MATRIKS. NOEN DELER DACITTISK.			
		170.60	GANGER MASSIV EP. ANDESITT / FIN			
			BÅNDET, INNEH. KLORITT-RIK.			
		174.50	KLOR. SERG., TUFF-AKTIG MED AV OG			
			TIL IMP. I BÅNDER. BLI MØRKER			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

11

Dato: Sign: Retn.: Sted: Hull nr.: 10076

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		78.-	Epidot og kalkrik tuff veksler mht ep og kalk enkelte bånd med mt?			
		81,50	Epidotrik tuff med enkelte kalkbånd			
		100	Kalkrik tuff m/ enkelte få py partier i begynnelsen blandet, Epidotrik enkelte Granats overgangstil kvarts tuff og spor av exhalitt materiale og vi får enkelte meget, meget kalkrike bånd.			
			100 m slutt			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

I

Dato: 11.79 Sign: ØH Retn.: ÷ 60 Sted: Lia Hull nr.: 10076

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		65.0	Kalk og epidotrik tuff med høyt kalk og epidot innhold enkelte få tomt med grov py			
		66.0	Avtagende kalsium-hold og tuffen går over til en lappilli tuff mye felds. mat. Økende fragmentstr-else. matriksen blir finkornet og svarte grå farve 'gule' fragmenter. I fragmentene enkelte svarte. Matrix kan tegnes for en keratofyr med enkelte das (Ryhodas) fragmenter avtagende ep. fk. silikat Ørt 20-30 epidot enkelte tynne svarte bånd med kalkrikt materiale			
		68.0	fragmentene blir mere ryhodas i samme betning.		B = 10°	
			Farven grågrå i matrix med lyse kritt pul og blå fragmenter 60-80. noe mere epidot holdig (og enkelte svarte bånd?) gradvis overgang til			
		71.25	kalkholdig tuff i og med avtagende blue frag. og silikat i matrix?			
		72.65	Epidot rik tuff			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

(2)

Dato: 25/4-30 Sign: [illegible] Retn.: ÷90° Sted: 350/42 Hull nr.: 10.077

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		30.00	GRB.	12.	30,50 - 31,00	
	31,85		BÅNDET SVAK IMP. KAN	13	31. 00 - 31.80	
			CU SEES PÅ 30.50 OG 31.70?			
		40.00	OBS! DET ER SVAK			
			IMP FRA 33,30 HVOR			
			EN KAN SE NOE CU?			
			35.00-35.50 SVAK			
			BÅNDET IMP. CU KAN			
			SEES 2 CM FRA 37,03 -			
			37.05 1.75% CU?			
			NOEN BÅND MED IMP			
			OPP TIL 37.90. HER OG			
			DER FRA 32.25 OG TIL			
			37.95 KAN EN FINNE			
			SPOR OG M/M TYKKE IMP			
			STRIPER. FRA 37.95 OG UT			
			KASSEN BLIR BERGARTEN			
			MERE LYS MED NOEN SMÅ			
			PUTER M/M STORRE MED KALK-			
			HOLDIG FJELL.			
		40.10	GRB.			
	40.20		SVAK IMP BÅNDET			
		41.00	SVAKE SPOR			
		41.35	SPOR GEST.			
	42.30		SVAK BÅNDET IMP	14.	41.85 - 42.30	
		43.30	GEST. MED SVAKE SPOR			
	46.00		UJEVN BÅNDET IMP SVAK	15	43.30 - 44.00	
				16.	44.00 - 45.00	
				17.	45.00 - 46.00	
		50.00	SLUTT.			
			DET ER EN FRTIG KJERN			
			PÅ 41.20 (KVARTS)			
			FRA 46.04 UT ER DET			
			MYE KVARTS - OG GRØNNST.			
			ER MEGET LYS. ENKELTE			
			KORN KAN IAKTAS DETTE			
			ER SANNSYNLIG FOR DET			
			MESTE S OG VASSKISKORN			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog, GROVLOGG 4

Dato: 25/4-80 Sign: [illegible] Retn.: +90° Sted: 350/42 Hull nr.: 10.077

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0—	LYS GRØNNST. M/TYNNE ÅRER			
		2.00	M EPIDOT. NUEPORFYRISK?			
	2.70		SVAK IMP SOM SPOR			
		8.05	LYS GRØNNL. M BÅND MED			
			KALK OG EPIDOT 15° BRUDD.			
			V/5.05-5.20. MOT SLUTTEN			
			SER BERGARTEN MERE			
			PORØS UT.			
	8.40		ENKELTE BÅND MED			
			FATTIG IMP. NOE ZN.?			
		9.00	GRÅBERG SOM OVER			
	10,00		NOEN SVAKE IMPSONER.			
			SPOR. NOE ZN?			
		16.75	GRABERG SOM OVER			
			MED ENKELTE BÅND FRA			
			13.0M M/ KIS. BERGARTEN			
			VIRKER MER TETT OG	1	16.75-17.00	
			HOMOGEN MOT SLUTTEN	2	17.00-18.00	
19.60			TETT MIDDELS GRØNNKORNIG	3	18.00-19.00	
			KIS. NOE CU,-ZN-SVAK?	4	19.00-19.60	
		20	EN BLÅLIG TONE MED			
			CM BREDE KALKBÅND OG			
			SMÅSPETTET			
		20.20	SOM OVER.			
	20.95		IMP NOEN BÅND MED CU?	5	20.20-20.95	
		21.00	GRST SOM OVER.			
	21.55		IMP SVAK.	6	21.00-21.55	
		22.40	GRST.			
	22.90		IMP SVAK	7	22.40-22.90	
		25.40	BERG			
	25.85		SVAK IMP (SPOR BÅND)	8	25.85-26.65	
		26.65	GRABERG M/ NOEN SPOR			
		27.10	— — ENNÅ MINDRE IMP			
	27.80		SVAK IMP.	9	27.10-27.80	
		28.20	HOMOGEN GRST MED NOEN			
			ÅRER MED KVARTS OG KALK			
			HOLDIG.	10	28.20-29.00	
	29.80		SVAK IMP?	11.	29.00-29.80	
		30.00	MERE SKIFR. OG KLORITT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

(2)

Dato: 25/4-80 Sign: Retn.: ÷90° Sted: 402/42 Hull nr.: 10078

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprove	Anmerk.
		30.50	LYS GRST M/NOE KALK.			
30.85			CU-HOLDIG KIS ELLER			
			MESSINGLIGNENDE S-KIS			
	31.80		GROV SVAK IMP.	11.	30,50 - 30,85	
		32,20	EN MEGET LYS OG TETT	12.	30.85 - 31,00	
			GRST.			
	34,50		BLANDET IMP M/KALK	13	32,20 - 33,00	
		35,75	GRST MED SVAK BÅNDET	14	33,00 - 34,00	
			IMP MOT SLUTTEN.	15	34,00 - 34,50	
	37,40		VEKSLENDE IMP.	16.	35,75 - 36,00	
		37,75	LYS GRST M/ÅRER AV IMP	17.	36,00 - 37,00	
			OG KVARTS.	18	37,00 - 37,40	
	38,70		SVAK IMP	19	37,75 - 38,70	
		39,00	SVAKE SPOR OG NOE IMP.			
	39,10		DÅRLIG IMP			
		39,45	GRST M/SPOR			
	40,00		DÅRLIG MULIG NOE CU KAN			
			FUNDT 39,40			
		40,10	GRST.			
	40,60		DÅRLIG IMP VANSKELIG Å	20	40,10 - 40,60	
			BEDØMME MET-INH.			
		40,95	BÅNDET IMP VED 40,70			
			ELLERS GRST.			
	41,20		DÅRLIG IMP SISTE 5 CM	21.	40,95 - 41,20	
			GOD CU?			
		~~50,00~~	BLÅLIG FJELL MYE KVARTS-			
		49,80	ITT UTEN SPOR BORTSETT			
			FRA 1 CM CU-HOLDIG			
			IMP VED 41,90 MEIRE KVARTS ENN FØR.			
	49,95		OBS! 15 CM MED IMP NOE CU?			
		50,00		22.	49,80 - 49,95	
	50,20		SVAK IMP			
		50,25	GRST.			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog GROVLOGG 4

(1)

Dato: 25/4-80 Sign: Retn.: ÷90° Sted: 400/42 Hull nr.: 10.078

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		6.25	GRANITT. MEDEPIDOTÅRER			
			3.85-3.90 SVAK ZN-IMP?			
			FRA 4.0-6.25 NOEN TYNNE			
			BÅND M/GROVK. KIS.			
		6.70	NOE TETTERE BÅND M/KIS			
			6.60-6.70 KAN EN MALLE			
			GROVKORNET SVAK S-KIS.			
		10.00	ENKELTE SVOVELKRYSTALLER			
			VINTRESANT. NOE EPIDOT			
			OG KVARSITT PÅ ETT PAR			
			PLASSER			
		13.35	SOM OVER			
	13.50		BÅNDET IMP M/KALK H.FJ.	1.	13.35-13.50	
		13.70	GRST M/TYNNE NOEN BÅND IMP			
	13.75		SAME IMP SOM OVER			
		14.05	GRG.			
	15.05		SVAK BÅNDET IMP	2	14.05-15.05	
		15.30	NOEN SPOR HER OG DER.			
		20.00	17.50- HAR VÆRT IMP-BÅND			
			18.50 — " —			
			ELLERS SVAKT BÅNDET MED			
			MYE KVARTS FRA 18.50-19.00			
		22.60	— " — SOM OVER.			
	23.75		SVAK IMP	3	22.60-23.75	
		23.90	GRST M/ÅRER IMP SVAK			
	24.30		SISTE 15CM KIS	4.	23.90-24.30	
		24.45	LYS GR.ST.			
25.35			MIDDELS FINKORNIG KIS	5.	24.45-25.35	
		25.65	GRST			
25.95			NOE CU-KORN KAN SEES			
			MERE FINKORNIG KIS	6	25.65-25.95	
		26.10	GRST			
26.60 →			GOD IMP TIL SVAK SISTE	7	26.10-26.60	
			20cm			
		26.90	GR.ST	8	26.90-27.40	
	27.40		GOD IMP NESTEN KIS PÅ SLUTTEN			
		27.65	GRST.	9.	27.65-27.95	
	27.95		GOD. MEN LITE CU?			
		28.25	GRST JEVN UTEN TILBL.			
28.35	~~28.35~~		KIS	10.	28.25-28.35	
		30.00	JEVN „FIN" GRST LYS			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

„GRØVLOGG"

Dato: 30.05.80 Sign: H. Retn.: +90° Sted: 1800/33 Hull nr.: 10.080

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		107.30				
107.60			BRUKBAR ZN M/0.3%CU ?	2.	107.30-107.60	
			100 - 107,30 BERGARTEN (FORGN?)			
			ER GRØNNSPETTET GANSKE			
			LYS M/OLIVIN OG KVARTSÅREE			
			HANGENDE: 107.60 - 110.m MERE			
			GLETT - NOE MERE KVARTSITT OG			
			VIEVNERE M/OLIVIN OG OGSÅ NOE			
			KALK.			
		129.5	GLOTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog GROVLOGG.

Dato: 17.06.80 Sign: ÅF Retn.: ÷90° Sted: 16V/73 Hull nr.: 10.082

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
			23-24.- OG 25.0-26.0 (SPREDT) M/M TYKKE BÅND HVOR DER ER ZN OG CU. OGSÅ PÅ 21.80. BERGARTEN ER BLANDING AV KVARTSITT OG TILDELS MØRK SPETTET GRØNSTEIN M/KVARTS ÅRER OG KALK. 26.0-30.0 MEGET MØRK OG GRØNSIERT. NOE LYSERE MOT SLUTTEN. BERGARTEN PÅ SLUTTEN VIKER MEGET TETT.			
		120				
	121.10		BÅNDET SVAK IMP.	1.	120.-121.10	
		122.75	VEKSLENDE GRØNST. M/KVARTS TUFF (LYS) TILDELS MØRK EPIDOT?			
123.10			CU-OG ZN SEES.	2.	122.75-123.10	
		130	NOE SVAKE SPOR OG BÅND M/IMP SEES TIL 126.80 SISTE 2 METERE ER MERE GRÅ (BLÅ) FRA 128-128.50 MÅ VÆRE REN KVARTSITT.			
		133.0	SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

"GROVLOGG"

Dato: 17.06.80 Sign: ÅJ Retn.: ÷90° Sted: 104/63 Hull nr.: 10.083

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		40	41.20 - 41.40 BÅNDET IMP			
			CU KAN SEES. + BN			
			BERGARTEN ER MEGET			
			LYS M/EPIDOT DE FØRSTE			
			5M I KJERNEN, SENERE			
			SYNS BERGARTEN GÅ OVER			
			I MERE KVARTSITTLIGNENDE			
			TYPE.			
		50	52.20 - 52.30 FINKORNET			
			IMP. 57.00 - 57.10 BÅNDET			
			IMP. BERGARTEN SOM			
			OVER MEN MED ØYERAV			
			KVARTS - OG KALK. PARTIER			
			ER TILDELS MEGET GRØNN			
			MED NOE MERE KLORITT			
			BETONT I DE GRØNNE PARTIER			
		60	60 M.			
		70				
		80				
		992	SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

"GROVLOGG"

(2)

Dato: 30.05.80 Sign: [illegible] Retn.: ÷90° Sted: 38Ø/39 Hull nr.: 10.084

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	33.95		SVAKE BÅNDETE SPOR			
34.90			KOMPAKT MID. FINK. MED 2,4% CU	9.	33.95 - 34,90	
		35.95	MED NOEN PYRITHÅNDSKIFER			
36.45			KIS CU KAN SEES % - 1 - 8 - 2,5 CU?	10.	35.95 - 36.45	
		40,0	GRST M/NOE EPIDOT MOT			
			SLUTTEN. PÅ 36.60 - 36.70 SEES			
			IMP. PÅ 37.70 ER DET EN			
			3-4 m/m TYKK ÅRE MED CU-			
		44.50	PÅ 41.60 - 41.70 IMP UTEN CU - KIS			
			42.50 GRUT SER EN MERE KVARTS-			
			ITT.			
			SLUTT.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog FORELØBIG, GROVLOGG (1)

Dato: 30.05.80 Sign: T. Retn.: ÷90° Sted: 380/39 Hull nr.: 10.084

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0-14.80	0-4+M TETT GRST. M/EPIDOT-ÅRER OG KALK. 4.4-14.8M ETTMERE PORØST BERG(GRAT.) M/ SPOR AV DÅRLIG IMP M/SMÅVEL-KRYSTALLER OG NOEN TYNNE (1-5 MM TYKK) ÅRER FRA CA 10M SYNES GRST. VÆRE GJÅLIG.			
15.70			KOMPAKT MID. GROV-K. KIS. MAX. 0,7% CU OG 0.3% ZN?	1.	14.80-15.70	
	1595		DÅRLIG/SVAK IMP.	2.	15.70-15.95	
		16.10	15CM M/NESTEN REN KALK?			
	17.40		MID. IMP SVAK PÅ CU OG ZN.	3.	16.10-17.40	
18.15			SKAL VI SI 1.25% CU KIS			
	18.80		18.75-18.80 HER KAN VI SE CU MEN IKKE ZN.	4.	17.40-18.15	
		20.00	SVAK BÅNDET IMP VALLKIS SOM ÅRER.	5.	18.15-18.80	
		27.20	SOM OVER MEN FRA 20M-23.3 EKSTRA SPARSOMT MED ÅRER (KIS) MÅ BETEGNES SOM SVAKE SPOR. 23.3-28.2 NOE TETTERE OG BREDERE BÅND MED IMP/ KIS. BÅNDENE KAN GÅ OPP I 2-3 CM TYKKELSE DEN SVAK IMP.			
	27.60		NOE BEDRE KOMPAKT KIS 27.45-27.50 CU KAN SEES MEN NEPPE OVER ENN ½%.	6.	27.20-27.60	
		29.10	GRST M/NOEN KVARTSÅRER			
	30.00		MEGET SVAK IMP. PÅ 29.80 KAN EN 3 MM ~~TYKK~~ TYKK ÅRE MED FIN CU SEES.			
	30.10		SVAK SOM SPOR (IMP)	7.	30.10-30.20	
30.20			MULIG FIN CU 1.1%?			
	30.25		SPOR			
30.35			10 CM DÅRLIG KIS	8.	30.20-30.40	
	30.90		MEGET SVAK IMP. BÅNDET NOE TETTERE ENN FOR.			
		32.60	GRST. MED SPOR.			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 8/7-1982 Sign: SBB Retn.: ÷ 20° Ø Sted: Store-Skorovatn Hull nr.: 11001

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prove	Analyseprove	Anmerk.
		0.90	Jordboring			c. z.
	13,00		Grønnstein, grønn, noe båndet og svakt skf. ~30°. Noen linser av massiv, andesittisk. Sonderingen er blandet bergart, litt kalk og epidot		1: 2,90-4,50	0,04 - 0,05
			Tynn, variabel båndet imp av py. 3-4 S noe på			
		14,15	Gr. st mørk grønn, noe skf. 15°. Litt epidot			
		14,50	Blåbærts med litt kalk.			
	19,20		Grønnstein, grønn, noe massiv og andesittisk. Noe epidot og kalk. Tynn imp av py og po.		2: 15,90-16,10	0,08-0,10
			V/15,9 og 16,1 bånd med mørk massiv på, spor av cpy			
			V/16,95 bånd med massiv py (2cm)			
			En del oppsprekking og stikk med kalk			
	22,00		Grønnstein, svakt skf og noe båndet. Noe kalk og epidot. Tynn imp av py og po. Skf ~ 15°		3: 19,35-19,75	0,03 0,04
		35,50	Grønnstein, grønn, båndet og skf. Skf'n 20°. Banding av kalk og epidot			
		45,00	Veksling mellom grønnstein og gabbrovarigt gr.st. Grønnstein er noe massiv og epidotrik, litt kalk			
		53,00	Grønnstein med linser og bånd av andesitt. Grønnstein er massiv med en del epidot og kalk. Et par bånd med tynn py-imp			
		58,65	Grønnstein, grønn, svakt skf, variabel. V/53,4 er det et bånd med imp av py-po.			
			SLUTT			

Arb 2.

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Dato: 13/7 - 82 Sign: BB Retn.: ÷100 Sted: Store Skorovatn Hull nr.: 11002

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		78,30	Epidotrik gr.st med linser og bånd av kvartsrik bergart. Den sist nevnten har sprekkefyllinger av mørk gr.st v/77,6 bånd med py. xx			
		82,90	Kjerneslep			
		83,60	Grønnstein, grønn, noe massiv.			
		91,20	Grønnstein med tett båndingen av lyst mat. Noe epidot. Sbf: båndingen ~ 30°, avtar til 10° mot slutten. 89,0 - 89,5 en noe oppknust.			
		105,00	Grønnstein, grønn, svakt sbf. Enkelte stikk og bånd av lyst mat. Noen andesittiske biter. 100 - 100,9 har noe kvarts, noe breksjert. 99,1 har bånd med py-imp (2cm) Noen sprekk py-xx.			
		117,45	Andesitt med litt epidot v/107,7 og 109,7 noe kvarts og gr.st, litt breksjert.			
		126,00	Grønnstein, grønn, sbf og avtagende båndingvinkel ~10°. En del epidot			
		130,00	Gabbroid gr.st, grønn, noe massiv. Den første meteren har noe finfordelt magnetitt og py-xx. Noe epidot.			
		134,88	Gabbro, epidotrik. 1-2 mm store korn av grønt mat. v/132,5 lyst bånd med imp av py. SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Arb 1.

Diaborlog

Dato: 13/7-82 Sign: LBB Retn.: ÷100 Sted: Stove - Skorovatn Hull nr.: 11002

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		19,10	Grønnstein, grønn, noe skf. Båndering av lyst mat. ~20°. Noe epidot 8,4-9,0 er massiv gr.st.			
		19,45	Båndering av rød feltspat i gr.st. Bånd med magnetitt.			
		23,00	Grønnstein, grønn, noe massiv. v/22,6 noe breksjert kvarts.			
		29,40	Grønnstein, grønn, noe skf. og båndet. 25°. v/24,2 og 24,5 mørkere gr.st med imp av py. v/24,6 er del bånd med rød feltspat v/26,1 og 27,1 bånd med magnetitt.			
		38,90	Grønnstein, grønn, noe massiv. En del stibb med lyst mat. 31,5-33 er noe skf, ~40°.			
		40,80	Grønnstein og lyst mat. Noe rotet. 40,4-40,6 har litt imp av py. Tendens til båndering, ~40°.			
		53,00	Grønnstein, grønn, noe massiv. Noe skf og båndete partier, ~20° Båndering av mørkere gr.st og lyst mat. Enkelte partier er oppsprukket. Den siste meteren har noe kvarts med breksjerte biter av gr.st.			
		56,90	Andesitisk gr.st med noe epidot. Sprukkefyllinger og flekker med mørk gr.st. Bergarten er noe oppsprukket.			
		77,25	Grønnstein, noe mørk grønn, skf og båndet. Båndering av lyst mat, opptrer også som små flekker. En del tverrgående stibb med samme mat. Skf-båndering ~10°. 69-70 er noe lysere gr.st og noe massiv. 63,5-63,6 er kvarts med et svakt rødskjær. Rundt 59 og v/70,7 noe oppknust.			

/.

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Arb 3

Diaborlog

Dato: 8/7-82 Sign: LOS Retn.: ~70° Ø Sted: Store-Skorovatn Hull nr.: 11003

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		140.00	Grønnstein, grønn, skjf. og noe bändet. Oppsprukket. Skjf ~ 30°. Noe epidot. Sterk mineralisering som kjem ut i lyst mat. Noen sprekk pg xx.			
			SLUTT			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Ark 2

Dato: 8/7-82 Sign: BOB Retn.: -70° V Sted: Store Skorovatn Hull nr.: 11003

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
	7555		Grønnstein, grønn, svakt skf		2: 7485-7525	0,03 0,04
			Tynn imp sv py			
		7930	Grønnstein grønn, skf og båndet, ~20° (Tuff) Båndlag av lyst mat.			
		8000	Andesitt med noe epidot.			
		8900	Veksling mellom andesitt og båndet grønnstein. Noe oppsprukket V/SSE bekkefyll bånd. V/85-95 bånd med py-xx.			
		9400	Grønnstein, grønn, massiv. Noen stikk med kalk			Cu Zn
		9560	Grønnstein, båndet og skf (Tuff)		2: 9745-9765	0,04 0,04
			9745-9765 har imp av py Skf: 30-40°. Par bånd med svak s.fl.			
		10045	Kvartsittisk bergart, finkornig og hard lys grågrønn med noe rød feltspat litt epidot.			
		10150	Grønnstein, grønn, noe massiv. Oppsprukket og noe bjørnetap.			
		10950	Mye bjørnetap. Det ligger noen bånd av kvartsittisk bergart, båndet over, og små biter av gr.st (meget sannsynlig).			
		11150	Grønnstein, grønn, noe båndet Par bånd med tynn imp av py.			
		11960	Gabbroid bergart med mye epidot. Noen bånd med gr st. Første halvdelen er noe oppsprukket, og i brudd-sonene ligger det brekkfyll kvarts.			
		12700	Grønnstein, grønn, svakt skf. 20°. Noe epidot og korn av norbom mat. 123-124 langsgående oppsprekkbrudd.			
		13150	Grønnstein, grønn, massiv. Noe epidot og kalk. 125,1-128,3 innfoldet bånd med kvarts			

ELEKTROKEMISK A.s
Skorovas Gruber

Diaborlog

Arb 1

Dato: 8/7 - 1992 Sign: SBS Retn.: 270° Ø Sted: Store Skorovatn Hull nr.: 11003

Kis	Imp.	Berg	Beskrivelse	Arkiv-prøve	Analyseprøve	Anmerk.
		0.20	Jordboring			
		1.90	Trondhjemitt, oppsprukket og noe bøyd, rusten.			
		15.50	Grønnstein, grønn, skj og båndet. (Tuff) Banding av lyst mot (felt spat- g og litt kalk) litt epidot. Skj varierer fra 5° til 25°. De siste 10 cm har bånd med rød feltspat			
		29.50	Grønnstein, grønn, massiv. Noen svakt skj og båndete partier. V/21.7 og 24.6 noe svakt båndete partier 24.6 gir mørke gr.st og en del g.			
		41.50	Grønnstein, grønn, svakt skj ~40° Fra 38 enkelte fragmenter av mørkere gr.st. Ovrigt 41 noe andesitt. De siste metrene har noen sprekker fyllinger med g.			
		56.70	Grønnstein, grønn, skj og båndet (Tuff) Var over mellom 20° og 60° V/46.5 noe andesitt og epidot bånd Båndingen er lys mot mørk feltspat, g og kalk. 49.4-49.7 er oppknust			
		62.40	Banding og veksling mellom andesitt og gr.st. Smafoldet.			
	62.70		Gr.st med bånd av blag Gr.st har imp av py I blag er det bånd med magnetit.			
		69.80	Grønnstein, grønn, skj og båndet (Tuff) Noen smafoldete partier. skj ~ 25° Enkelte bånd med lyse imp av py			
	74.00		Grønnstein som over noe mere imp av py Noen bånd med blag.			Cu Zn
	74.85		Grønnstein mørk grønn, svakt skj Enkelte med lys mot. Tett imp av py		1: 74.00-74.75	0.04 0.03

2/0

Elkem-Spigerverket a|s
Skorovas Gruber

Beregningsblad

Sak

DIAMANTBORING 1982
STORE SKOROVATN.

Tegning nr.

O/P	
Z-nr.	
Dato	Sign.
Bl.nr.	Ant. bl.

NR. PÅ NYE DAGHULL 1982

STED	HULL NR
6306 V / 1400 N	11.001
5900 V / 1500 N ?	11.002
6000 V / 1400 N ?	11.003

BORET LENGDE:

			1099 !
11.001	÷ 70°	α = 120°	58.65 M
11.002	÷ 100°		134.90 M
11.003	÷ 70°	α = 120°	140.00 M (COBUT 141.40)

FERDIGLOGGET 13/7-82 AV L.B.L.

14/7-82

Elkem-Spigerverket a|s
Skorovas Gruber

Beregningsblad

Sak

DIAMANTBORING 1980
GRUBEFJELLET.

Tegning nr.

O/P	
Z-nr.	
Dato	Sign.
Bl.nr.	Ant. bl.

NR. PÅ NYE DAGHULL 1980:

KOORDINAT/STED	HULL NR
350/42	10.077
400/42	10.078
120/83	10.079
180/93	10.080
21V/79	10.081
16V/73	10.082
10V/63	10.083
360/38	10.084

15/4-80

DIAMANTBORING 1980

ANTALL BORMETER BORET PR. 5/5 - 6/5 - 80

10.077,	35Ø/42	M -	50.00 (50.25)
10.078	40Ø/42	"	50.00
10.079	12Ø/83	"	118.50
10.080	18Ø/83	"	129.50
10.081	2HV/79		130.00
10.082	16V/73	"	133.00
SUM			611.00

6/5-80
H.

BORET ETTER 6/5-

10.083	104/63	M	89.2
10.084	36Ø/38	"	44.5
		M.	133,7
TIDL. BORET			611.0
I 1980		M	744,7

10/5-80
H.