Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
BV 3344		Boks nr 11	Nordland	
Kommer fra ..arkiv	**Ekstern rapport nr**	**Oversendt fra**	**Fortrolig pga**	**Fortrolig fra dato:**

Tittel

Mofjellet Gruber. Diamantboringer fra hull 473 - 759

Forfatter	Dato	Bedrift
	19	Bergverkselskapet Nord-Norge A/S

Kommune	Fylke	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Rana	Nordland	Nordlandske		

Fagområde	Dokument type	Forekomster
Råstofftype	**Emneord**	

Sammendrag

Lokalitet: Profil 43.650

Borehull: 5

Dato : Juni -81
Koordinater : X:925.405,3 Y: 43.653
Retning : S
Helling/stigning: 83°
Høyde : - 62,3
Lengde : 28,40

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0,00 - 24.15	24,15	2 gl.gn.	Rel.lys,mlk. foldet m/cm-tykke band av biot.gn. Biot. hbl.gn. og hbl.gn. og pegm. Po,Py,Sl,Cp,Gn i band 5,50-6,70, 11,50-11,80, 21.60-22,70.	60-90°	0,53	0,49	1.24			550-670
					0,62	0,32	2,46			2160-2270
24.15 - 28.40	4,25	Hbl.gn.	Mørk,mlk. m/cm-dm-tykke band av amfibolitt og 2 gl.gn. gr. 1-3 mm.	70-90°						

29/6 1981

Nils A. Bang

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43.650

Borehull: 3

Dato : Juni - 81
Koordinater : X: 925.407,4 Y: 43.651
Retning : N
Helling/stigning: 64
Høyde : - 62,3
Lengde : 37,40

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.05	1.05	2 gl.gn.	Lys,mlk. spr. gr.							
1.05 - 1.80	0.75	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spr. gr.	50-70°						
1.80 - 29.60	27.80	2 gl.gn.	Rel.lys,mlk. m/cm-tykke band av biot.gn. og hbl.gn. m/gr. 1-10 mm. Sl,po,py,gn,cp i cm-tykke band fra 4,65-6,45	50-70°	0,68	0,28	1,26			4,65-6,45
29.60 - 31.30	1.70	Hbl.gn.	Mørk,mlk. båndet m/gr. Spr. gr. 1-3 mm. impr. Py	70°						
31.30 - 33.15	1.85	Biot.hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. båndet gr. 1-3 mm. rel. rik impr. Py	60-70°						
33.15 - 37.15	4.00	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. m/biot.gn.band 5.00 - 5.15 og dm-tykke band av 2 gl.gn.impr. Py.	60-70°						
37.15 - 37.40	0.25	2 gl.gn.	Rel.lys,mlk. impr. Py	80°						

26.6. 1981
Nils A. Bang

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43.650

Borehull: 2

Dato : Mai-81
Koordinater : X:925.406,2 Y: 43.653
Retning : N
Helling/stigning: 80°
Høyde : - 62,3
Lengde : 34,25

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 5.35	5.35	2 gl.gn.	lys,mlk. m/dm-tykke biot.band og biot.hbl.band. Spr.gr. 1-3 mm.	70-90°						
5.35 - 6.70	1.35	Biot.gn.	Mørk,mlk. m/cm-tykke 2 gl.gn. band. sl,cp,py,po,gn.	60-80°	0,84	1.55	5.00			
6.70 - 17.95	11.25	2 gl.gn.	Lys,mlk. enkelte gr. litt py,sl,cp,gn,po 6.70-7.00 og 11.60-11,70.	70-90°	0,45	0,91	1.80			6,70-7.00
17.95 - 19.00	1.05	pegm.								
19.00 - 22.50	3.50	2 gl.gn.	Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm. Py,sl,cp,gn. fra 21.55-22.50	70-90°	0,73	1.97	4.66			21,55-22,50
22.50 - 23.60	0.70	biot.gn.	Mørk,mlk. tildels breksjert Py,cp,sl,gn. m/cm-tykke 2 gl.gn.band.	60-70°	0,53	0,58	3,44			
23.60 - 25.75	2.15	2 gl.gn.	Rel.lys,mlk. m/cm-dm-tykke band av hbl.gn. og biot.hbl.gn imp. Py fortrinnsvis i biot. hbl.gn.band.	60-70°						
25.75 - 27.35	1.60	Hbl.biot.gn.	Rel.mørk,mlk. m/cm-tykke 2 gl.gn.band. Spredte granater 1-3 mm. Impr. Py	60-70°						
27.35 - 30.60	3.25	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk. spr. gr. 1-3 m. rik impr. Py	60-80°						
30.60 - 34.25	3.65	Hbl.gn.	Rel.mørk,m/cm-dm-tykke amfibolitter. gr. 1-5 mm.Impr. Py	60-80°						

26.6. 1981

Nils A. Bang

FANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43.650

Borehull: 1

Dato : Mai - 81
Koordinater : X: 925.405,7 Y: 43.653
Retning : N
Helling/stigning: - 88
Høyde : - 62,3
Lengde : 28.50

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spredt Sl,cp,py	90°						
0.70 - 1.60	0.90	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spredte gr. 1-3mm	80-90°						
1.60 - 4.35	2.75	2 gl.gn.	Lys,mlk. enkelte gl.rikere partier	70-80						
4.35 - 6.35	2.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. cm-dm-tykke biot.gn.band. Sl,py,cp,gn.po fortrinnsvis i biot.gn.band + impr. enkelte cm.tykke pegm.band.	70-90°	1.31	0,84	4,43			4,35-5,35
					0,89	0,36	2,22			5,35-6,35
6.35 - 20.20	13.85	2 gl.gn.	Rel.lys,mlk, båndet m/cm tykke biot.gn.bånd. spr. impr. py,cp, gr. 1-3 mm. fortrinnsvis i biot.gn.band.	70-90°						
20.20 - 20.48	0,28	Biot.gn.	Mørk,mlk. tildels breksjert Sl,Py,Cp m/2 gl.gn.band.	60-80°	0,38	0,91	3,04			
20.48 - 21.05	0.57	Pegm.								
21.05 - 22.60	1.55	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk. m/dm-tykke 2 gl.gn. band. Sl,Cp,Py,Gn,Po.	70-80°	1.37	0,46	4,15			
22.60 - 23.95	1.35	2 gl.gn.	Rel.lys.mlk. enkelte biot. gn.band. svak impr. Py,gn.	80-90°						
23.95 - 26.30	2.35	Biot.hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. cm/dm tykke 2 gl.gn.band og hbl.gn.band m/gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	70-80°						
26.30 - 28.50	1.90	Hbl.gn.	Mørk,mlk. m/gr. 1-5 mm.	60-80°						

26/6 1981
Nils A. Bang

FANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.090

Borehull: 759

Dato : Mai -81
Koordinater : X: 925.439 Y: 44.089
Retning : N
Helling/stigning: - 33°
Høyde : - 82,6
Lengde : 33.50

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	Biot.sk. Mørk,mlk. foldet, imp. Py,Po spor Sl.	0-20°						
0.50 - 9.95	9.45	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka opp til dm.tykke biot.hbl.førende band Spr. gr. 1-3 mm. Stedvis svak imp. Py fortrinnsvis i biot. hbl.band.	30°						
9.95 - 12.00	2.05	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. biot. som skikt og striper imp. Po,Py i biot. Spor Sl	30° 35°						
12.00 - 33.50	21.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. Impr. Py Enkelte 2 gl.gn. band.							

14/5 1981

Stellan Burman

ANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: profil 44.090

Borehull: 758

Dato : Mai - 81
Koordinater : X: 925.439
Retning : N
Helling/stigning: - 45°
Høyde : - 83.6
Lengde : 29.50

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.20	1.20	Tap							
1.20 - 2.60	1.40	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-2 mm. masse.							
2.60 - 5.40	3.80	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. "skiktad" stripet Sl,Cp, Gn, Po, Py	45°	0.05	0.40	3.90			2.60 - 3.00
				0.03	0.53	2.94			3.00 - 4.00
				0.47	0.43	5.15			4.00 - 5.40
5.40 - 6.50	1.10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. skiktet med biot.hbl. imp. Py. spor Sl	45°	0.08	0.15	1.13			
6.50 - 29.50	23.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr-førende imp. Py	40° 45°						

14/5 - 81

Stellan Burmann

ANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.090

Borehull: 757

Dato : Mai 1981
Koordinater : X: 925.438 Y: 44.089 ca.
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 83,6
Lengde : 9,95

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
					0.39	0,05	2.95			
0.00 - 0.50	0.50	Skarn	Mørk, grovk. Sl, Cp, Gn, Py							
0.50 - 1.00	0.50	2 gl.gn.	Rel. lys, mlk. spor hbl. Impr. Sl, Cp, Gn, Py, Po	70°	0,14	0,10	0,95			1
1.00 - 3.55	2.55	Biot.hbl.gn.	Mørk, mlk. "skiktig" Striper Sl, Cp, Gn, Py, Po,	60, 90°	0,10	0.68	3.68			1.00 - 2.00
					0.56	0.96	6.61			2.00 - 3.55
3.55 - 5.30	1.75	Biot.hbl.gn.	Mørk, mlk. spredte gr. 1-2mm	80°	0,06	0,11	0,65			
5.30 - 9.95	4.60	Hbl.gn.	Mørk, mlk. gr-førende. Impr. Py	80°						

14/5 1981
Stellan Burman

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil: 44.870

Borehull: 754

Dato : Mai - 81
Koordinater : x=925.412,9 y=9872,9
Retning : opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde : -102,7
Lengde : 11,5 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. 5 cm pegm. ved 0.30 m, biotskikt, spredte gr.	80° 90°						
0.50 - 3.65	3.15	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. vekslende med opp til 5-10 cm biot.band. malm som striper. klysor och imp. Foldet Sl,Cp,Gn,Py,Po.	70-90°	0,93	0,94	4,48			0,50-1,50
				1,43	0,62	3,96			1,50-2,50
				0,87	0,56	2,65			2,50-3,65
3.65 - 5.15		2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-2 m.	80-90°						
5.15 - 8.05		Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-2 mm. svak impr. Py	"						
8.05 - 10.50		2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. hbl. enstaka gr.	"						
10.50 - 11.50		Hbl.gn. Mørk,mlk. spredt gr. 1-2 m	"						

29/4 1981
Stellan Burmon

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.870

Borehull: 753

Dato : Mars -81
Koordinater : X: 925.417,4 Y: 44.872,6
Retning : Opp
~~Helling~~/stigning: + 90°
Høyde : 103.0
Lengde : 10.00

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 5.60	5.60	2 gl.gn. Lys,mlk. småfoldet,mineralisering i dm-tykke band. Sl,Gn,Cp,Py, både lys og mørk Sl	60-80°	0,19	0,09	0,94			0.00-1.00
				0,94	0,21	5,10			1.00-2.00
				0,28	0,14	1,53			2.00-3.00
				0,81	0,58	2,56			3.00-4.00
				0,58	0,32	1,30			4.00-5.00
				0,05	0,04	0,15			5.00-5.60
5.60 - 6.25	0.65	Pegm.							
6.25 - 6.75	0.50	2 gl.gn. Lys,mlk. småfoldet.	70-90°						
6.75 - 7.40	0.65	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. tildels breksjert	80-90°						
7.40 - 10.00	2.60	Hbl.gn. Mørk,mlk. småfoldet. gr. 1-3mm impr. py	80-90°						

6.7. 1981

Nils A. Bang.

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.870

Borehull: 752

Dato : Mars-81
Koordinater : X: 925.422,4 Y: 44.871.5
Retning : Opp
Helling/stigning: 90°
Høyde : - 102,1
Lengde : 20.00

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 7.60	7.60	2 gl.gn.	rel.lys,mlk. noe småfoldet Sl,Cp,Py, 0.00-0.10 og 2.20-2.40. svak impr. Py	80-90°						
7.60 - 9.90	2.30	Biot.gn.	Mørk,mlk. småfoldet og undulering noe breksjert. Spredt gr. 1-3 mm. str. og impr. med Cp,Sl,Py	80-90°	0.04	0.03	0,18			7.60-8.60
					0.03	0.03	0,16			8.60-9.90
9.90 - 20.00	10.10	Biot.hbl.gn.	Rel.mørk,mlk.-grovk. undulert rik impr. Py	70-90°						

6.7. 1981

Nils A. Bang

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.870

Borehull: 751

Dato : Mars -81
Koordinater : X: 925.428,1 Y:44.872,0
Retning : Opp
Helning/stigning: + 90°
Høyde : - 101,9
Lengde : 10,00

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.30	2.30	2 gl.gn. Lys,mlk. foldet, stedvis tett foldet.							
2.30 - 10.00	7.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. foldet, stedvis breksjert. svak impr. Py Sl,Gn,Cp,Py. 9,50-10.00 i band.	70°	0,73	0,38	2,83			9.50-10.00

6.7. 1981

Nils A. Bang

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.870

Borehull: 750

Dato : Mars -81
Koordinater : X:-25.433,2 Y: 44.877,7
Retning : Opp
Helling/stigning: + 90°
Hoyde : 102,5 m
Lengde : 10,00

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0,00 - 10.00	10.00	2 gl.gn.b.d. rel.lys,mlk. m/enkelte skarnholdige band. foldet, ondulert. svak impr. Py, spor Sl 1,24 - 1,35	70°						

6.7. 1981

Nils A. Bang.

PANA BLAGS TRYKKERI

Lokalitet: 44.983

Borehull: 749

Dato : Apr.-81
Koordinater : x = 925 433,1 y = 44.983,8
Retning : N
Helling/stigning: +21°
Høyde : 1/M° -101,6
Lengde : 130.00

Arkivert.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 12.00	12.00	2 gl.gn. Lys,mlk. enstaka gr. delvis svak impr. Py enstaka cm-tykke pegm.band.	45-50°						
12.00 - 12.20	0.20	Hbl.førende 2 gl.gn.	45°						
12.20 - 13.05	0.85	2 gl.gn. - " -							
13.05 - 13.25	0.20	Hbl.gn.							
13.25 - 13.50	0.25	2 gl.gn. m hbl.band	45°						
13.50 - 28.80		" "							
		SL ved 14.30	45-30°						
28.80 - 29.80		Hbl.gn. vekslende m 2 gl.gn.band	0-30°						
29.80 - 61.80	32.00	Hbl.gn. gr.rik	35-45°						
61.80 - 73.40		Musk.biot.gn. Grovk. "Flagig" jevn imp. Py , Spredte gr.	30°						
73.40 - 91.30		Hbl.gn. Amfibolittisk	45°						
91.30 - 93.70		Biot.hbl.gn. Impr. Py	"						
93.70 - 96.00		Musk.biot.gn. "	"						
96.00 - 96.60		Pegm.	"						
96.60 - 127.30		2 gl.gn.	30-45°						
127.30 - 130.00		Hbl. 2 gl.gn. Vekslende gr. førende							

LANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 748

Dato : Mai -81
Koordinater : X: 925.427,1 Y: 44.983,8
Retning : N.
~~Helling~~/stigning: + 14°
Høyde : - 101,9 m o.h.
Lengde : 125,00 m.

5

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
98.75 - 101.90	3.15	grå gn.		10						
101.90 - 102.80	0.90	sv.malmimpr.	i grå gn.	10-25	0,38	0,04	1.27			
102.80 - 125.00	22.20	grå gn.	spredt noe gr. litt etter hvert mere gr. Mot slutten	30-50 40-50						

TANA MALIS BEVOLER

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 748

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
70.00 - 76.95	6.95	Biot.gn.	Py-impr. Spredt noe Hbl. og gr. og noe D. rel. lys Fra 73 m	35° 0-20						
76.95 - 78.00	1.05	malm	lys sf. i grå gn.	0-15	1.25	0.11	3,98			
78.00 - 79.65	1.65	grå gn. bd.		0-15						
79.65 - 80.60	0.95	malmimpr.	i grå gn. spredt noe Hbl.	0-30	1.32	0,28	4.46			
80.60 - 83.40	2.80	grå gn.	Spredt noe Py-impr.rundt	0						
83.40 - 86.50	3.10	Biot.gn.	gr. meget spredt noe Hbl. På 86.45 m noe Cp.	25-10°						
86.50 - 86.65	0.15	Pegm.								
86.65 - 88.10	1.45	Musk.gn.	gl.rik.Noe bior. Py-impr.	0-20						
88.10 - 88.80	0.70	malm	i musk.gn. i lyse sf. Cp,Py	0-10	1.03	0.91	4.98			
88.80 - 89.70	0.90	Pegm.			1,17	0.10	5,95			89.70 - 89.10
89.70 - 93.35	3.65	malm	i biot.gn. rel.lys. lyse sf. Noe pegm. innsprengt.	10-30	~~0,67~~	~~0,14~~	~~2,90~~			89.10 - 92.10
					0,72	0,21	1.90			92.10 - 93.35
93.35 - 93.80	0.45	Pegm.								
93.80 - 94.15	0.35	malmimpr.	i musk.biot.gn.	40°	1.24	0,17	3,22			
94.15 - 95.40	1.25	pegm.								
95.40 - 95.85	0.45	malmimpr.	i musk.gn. Noe biot.	0-20	0,51	0,12	1.45			
95.85 - 96.20	0.35	malmimpr.	i musk.biot.gn.	10						
96.20 - 96.65	0.45	pegm.								
96.65 - 97.50	0.95	Sv.malmimpr.	i musk.biot.gn.	0-10	0,28	0.08	1.24			
97.50 - 98.75	1.25	musk.biot.gn.	sterkt py-impr.	25 10-30						

KANA BLADE TEKNISK

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 748

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
			Enn.taka dm.tykke Pegm.-band.							
59.00 - 61.30	2.30	Pegm.								
61.30 - 65.40	4.10	Biot.gn.	Rel.mørk,mlk. enkelte Hbl-førende partier, dm.tykke gr.førende. fortrinnsvis i Hbl.førende partier. Impr. Py. Spredte Pegm.bånd.	35° 40°						
65.40 - 69.00	3.60	Hbl.gn.	Mørk,mlk. tildels skiktet m/biot.rike skikt. Spredte gr. tildels gr.førende 1-3 mm. Impr. Py.	35" 40"						
69.00 - 76.95	7.95	Biot.gn.	Mørk,mlk. rel.mass. Spr. gr. 1-2 mm. Impr. Py.	35° 20" 10°						
76.95 - 78.00	1.05	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. undulerende Impr. Sl,Cp,Gn,Py	10" 0" 5"	1.25	0,11	3.98			
78.00 - 79.35	1.35	"	Lys,mlk. impr. Py Spor gr. 1-3 mm.	5"						
79.35 - 80.70	1.35	"	Rel.lys,mlk. litt "flekkig" av Biot.anr. Svak impr.! Sl,Cp,Gn,Py.	10"	1.32	0,28	4.46			79.35 80.70
80.70 - 88.10	7.40	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. Mørk. som "flekkig" undulerend Impr. Py spor Sl Spredte gr. 1-2 mm. Cp, Po ved 76,65.	10" 0"						

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.985

Borehull: 748

Dato : April 1981
Koordinater : X: 925.427,1 Y: 44.983,*
Retning : N
Helling/stigning: + 13,5°
Høyde : - 101,5
Lengde : 125.0m Avkortet

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 26.65	26,65	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. litt variert med enkelte biotrikere band partier.	35°						
			Enstaka opp til dm-tykke pegm.band.	45°						
			Fra 0,70 - 0,90 pegm. stedvis svak impr. Py, fortrinnsvis i de biotrikere partier. Spor Sl ved 0,70 (1 cm), enstaka gr. 1-2 mm	50° 40° 30° 40°						
26.65 - 27.05	0,40	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spor gr. Py 1-2mm	50°						
27.05 - 28.10	1.05	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik. Impr. Py	35°						
28.10 - 30.30	2.20	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende med partier 2 gl.gn. Spredte gr. i hbl.gn.	45°						
30.30 - 30.50	0.20	Pegm.kv.								
30.50 - 33.40	2.90	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ biot.skikt og cm-tykke Hbl.gn.band. tildels gr-førende. spor Py							
33.40 - 35.90	2.50	Hbl. ?	Mørk,mlk. vekslende m/cm-tykke 2 gl.gn.band. Stedvis foldet sliriy med skarn-sliver. spredte gr. 1-2 mm.	50-80						
35.90 - 47.60	11.70	Hbl.gn.	Mørk,mlk. delvis skiktet med kv.rike skikt. gr.fyr. 1-3 mm. Impr. Py.	55° 90°						
47.60 - 59.00	11.40	2 gl.gn.	rel.lys,mlk. tildels hbl.-førende, samt enkelte Hbl. gn.band. Gr.førende 1-3 mm.	45° 35°						

KANA GLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.985

Borehull: 747

Dato : Mars 1981
Koordinater : x: 925.427,1 y: 44.983 K
Retning : N
Helling/stigning: + 10°
Høyde : - 101,6
Lengde : 136,5 Arkivert.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	Au g/t	Prøve m
0.00 - 13.90	13.90	2 gl.gn.bd.	Rel. lys mlk. m/enkelte smale bånd imp. Py Spredte gr. 1-3 mm. Enstaka dm-tykke pegm.bånd. Spor Sl ved 26,40.	20° 30° 10°						
35.50 - 35.90	0.40	Pegm.								
35.90 - 38.30		2 gl.gn.	Lys mlk. rel. kv.rik. Enstaka gr. 1-2 mm. spor Py	10° 0° 5°						
38.30 - 39.95	1.65	2 gl.gn.	Rel.lys mlk. svakt undulerende. Svak impr. Py, Sl, Cp, Gn.	10° 0° 5°						
39.95 - 50.50	10.55	2 gl.gn.bd.	-"- " -	5° 0° 10°						
			Spor Sl ved 41.20							
50.50 - 60.30	18.30	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. litt vekslende med biot.rikere bånd (tidl. biot.gn. spor hbl.) over enstaka skjærbånd. stedvis undulerat, svag impr. Py,Cp, Sl,Gn.	10° 0° 5° 0°	0,16	0,18	0,97		10.6	50,30-58,00
					0,46	0,13	1.68			58.00-62,30
60.30 - 74.50	5.20	2 gl.gn.drm.	Lys,mlk. kv.rik. spor gr. 1-2 mm. Py. Delvis mørk.	5°						
74.50 - 77.50	3.00	"	- " - " -	0° 5°						
			Spor Py,Cp,Gn,Sl.							

ANA BLADS FABRIKK

Lokalitet:

Borehull: 747

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

2.

Dybde	L.	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	Ag g/t	Prøve nr
77.50 - 83.10	5.60	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. vekslende m/dm-tykke biot.gn.band enstaka gr. 1-3 mm.	5''						
83.10 - 86.30	3.20	"	Lys,mlk. m/filmtynne biot. skikt. Imp. Py,Cp,Gn,Sl	0'' 5''	1.55	0.22	3,93		33.3	
86.30 - 89.00	2.70	"	- " - " -	5''						
			Enstaka spor Sl impr. Py	0''						
89.00 - 92.50	3.50	2 gl.gn.alm.	Lys mlk. svak impr. Py	5''						
92.50 - 136.50		2 gl.gn.alm.	Lys,mlk rel.mass. spredte Spredte gr. 1-3 mm. Enstaka upp till dm.tykke pegm.band.	5'' 10'' 20'' 30'' 5''						

6/5 1981

Steffen Bergan

EXTRA BLADE INNLEGG

Lokalitet: Profil 44.988

Borehull: 746

Dato :
Koordinater : X: 925.427,1 Y: 44.988,8
Retning : N
Helling/stigning: + 15° Avviksmålt + 19° medio.
Høyde : - 101,2
Lengde : 140 m Arkivert.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 2.80	2.80	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enstaka cm - 5 cm. tykke kv.pegm.band. spor gr. 1-3 mm. Spor Sl ved 2.20.	35° 40°						
2.80 - 3.70	0.90	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.enkelte 2 gl.gn. band og slirer. Svak impr. Py, spor Sl ved 3,35	35°						
3.70 - 10.70	7.00	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk.-fink. enstaka opp til 5 cm tykke kv.pegm.band. Litt vekslende m/enkelte biot.rikere partier.	35° 40° 60° 40°						
10.70 - 13.00	2.30	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-tykke biot.gn.band, spr. gr. 1-2 mm.	30° 40°						
13.00 - 15.30	2.30	Biot.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/partier 2 gl.gn. biot.gn. gr.førende 1-2 mm. Impr. Py	35°						
15.30 - 23.60	8.30	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. litt vekslende m/enstaka biot.rikere band. samt enkelte dm.tykke pegm. band. spor Sl ved 21.50	30-45						
23.60 - 26.00	2.40	Hbl.gn.	Mørk,mlk.enkelte cm-tykke biot.gn.band. svak impr. Py	30°						
26.00 - 31.50	5.50	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enkelte biot.-rikere partier m/spor hbl. spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py fortrinnsvis i pertier m/ biot.hbl. Pegm fra 29.20 - 29.40.	30° 45°						

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 746

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
31.50 - 33.30	1.80	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/ 2 gl.gn.band. svak impr. Py, enstaka gr. 1-2 mm (Foldet).	30° 50°						
33.30 - 47.30	14.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk. tildels tilsynes Skiktad m/ lysere skikt av kv. Musk? Foldet, gr.før. 1-3 mm. Svak impr. Py	50° 80° 40°						
47.30 - 53.60	6.30	2 gl.gn.	Rel.lys,skiktet , strimlet hbl.førende, spor gr. svak impr. Py, Foldet.	40° 60-10°						
53.60 - 58.60	5.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr-førende 1-3mm Impr. Py	20° 25°						
58.60 - 61.90	3.30	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. spredte gr. tildels gr-førende 1-2 mm Svak impr. Py	20°						
61.90 - 62.40	0.50	Pegm.								
62.40 - 66.80	4.40	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk. gr.førende. Impr. Py	15° 20°						
66.80 - 76,95	10.15	Biot.gn.	Rel.mørk,mlk. m (fjällig Musk) enstaka gr. 1-3 mm. Impr. Py, tildels rik.	30°						
76.95 - 80.60	3.75	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. biot.rike part. m. spor hbl. gr.før. 1-3 mm. ved 77.30 stichto= litisk impr. Py.	20°						

LANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 746

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% Ag	% Fe	Prøve nr
80.60 - 86.95	6.35	hbl.gn.	Mørk,mlk. tildels gr.før. partier 1-3 mm. impr. Py	20° 0 10°						
86.95 - 88.70	1.85	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. spredte store gr. 1-5 mm. Impr. Py	10°						
88.70 - 91.60	2.90	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. (Fjällig) Impr. Py	0° 10°						
91.60 - 94.70	3.10	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-tykke biot.gn.band. Impr. Py Sl ved 93.60 enstaka gr. 1-3 mm.	0° 10° 20° 10°						
94.70 - 96.20	1.50	Biot.gn.	Mørk,mlk. tildels ondulerende impr. Py	0° 5°						
96.20 - 96.80	0.60	Pegm.								
96.80 - 98.00	1.20	Biot.gn. (2 gl.gn. biot.rik)	Rel.mørk,mlk.-grovk. litt ondulerad. enstaka pegm. band. Impr. Sl,Cp,Gn,Py	20° 5°	0,33	0,18	141	8,8		
98.00 - 100.00	2.00	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. ondulerende rel.homogen. Impr. Sl, Cp,Gn,Py.	? 0° 10°	0,59	0,14	1.37	20,6		
100.00 - 101.50	1.50	"	" Svak impr. Sl.	10°	0,14	0,04	0,80	4,6		
101.50 - 121.00	19.50	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk. rel.kv.rik. enst. cm-dm-tykke pegm.band. ved 107,40 Py,Po, enstaka gr. 1-4 mm	10° 15° 20° 30°						
			121.00	35°						
121.00 - 140.00	19.00	"	Lys,mlk. enkelte biot.rik. part. m/spor hbl.	30° 40°						

VANA ULADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 746

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
121.00 - 140.00	19.00	2 gl.gn.bd. Gr.førende tildels gr.rik 1-3 mm.							

- 81

Stellan Herman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.830

Borehull: 745

Dato : Februar, 1981
Koordinater : X: 925.468,5 Y: 44.830
Retning : N
Helling/stigning: 15°
Høyde :
Lengde : 8,50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 – 8.50	8.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels kv.rik og m/spr. gr. 1–3 mm. Ved 0,50, 1,70 spor Sl.	10° 30°						

3/3 1981
H. Pantdalsli

EANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.820

Borehull: 744

Dato : Feb. 81
Koordinater : X: 925.468,5 Y: 44.830
Retning : N
Helling/stigning: Horisontalt
Høyde : -102,0 m
Lengde : 10.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0,00 - 1.50	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. spor Sl,Gn,Cp, impr. Py	0 o 10	0,13	0,11	0,30			
1.50 - 5.80	4.30	" Impr. Sl,Gn,Cp, Py tildels i halv kjernen	0 10°	0,76	0,19	2,20			2,30-2,30
				0,26	0,13	0,65			2,30-3,30
				0,55	0,20	1,99			3,30-4,30
				1,04	0,37	3,75			4,30-5,80
5.80 - 10.00	4.20	" Spr. gr. 1-3 mm	10° 30°	0,03	0,02	0,18			5,80-6,80

3.3. 1981
H. Pantdalski

RAPA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.820

Borehull: 743

Dato : Februar 1981
Koordinater : X: 925.468,5 Y: 44.830
Retning : N
Helling/stigning : 20°
Høyde : - 102,5 m
Lengde : 13,75 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.25	0,25	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik. spr.gr. 1-3 mm.							
0.25 - 1.00	0.75	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. impr. Py	20° 30°	0,46	0,18	0,76			
1.00 - 1.50	0.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-brede band biot.gn.	30°	0,03	0,08	0,14			
1.50 - 3.10	1.60	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. veksl.m/ dm-brede band 2 gl.gn.b.d. Spor hbl. fra 2,20-2,30 kalkspat. Impr. Sl,Gn,Cp,Py .	20° 30°	0,80	0,27	3,01			
3.10 - 4.30	1.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ parti musk.gn. tildels hbl. førende, impr. Sl,Gn,Cp,Py	30°	1.20	0,24	3,76			
4,30 - 13.75	9.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ 1-2 dm. brede pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. tildels svak impr. Py.	30°	0,15	0,04	0,38			4,30-5,30

2.3. 1981
Holger Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.820

Borehull: 742

Dato : Februar 1981
Koordinater : X: 925.468,5 Y:44.830
Retning : S
Helling/stigning: 45°
Høyde : - 103,0
Lengde : 10,00 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.80	0.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels kv.-rik, svak impr. Py	40°	0,07	0,03	0,19			
0.80 - 3.35	2.55	"	Striper, impr. Sl,Cp,Py, tildels m/skarn.	40°	1,60	0,18	5,05			0,80-2,00
					0,45	0,54	1,42			2,00-3,35
3.35 - 10.00	6.65	"	Spr. gr. 1-3 mm.	40°	0,16	0,10	0,42			3,35-4,35

3.3. 1981.
H. Pantdalsli

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.820

Borehull: 741

Dato : Febr. 1981
Koordinater : X:925.466,8 Y: 44.830
Retning :
Helling/stigning : Lodd
Høyde : - 103,5 m
Lengde : 8,40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
00,00 - 1,15	1.15	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.spor gr. 0,5-1 mm.	80°	0,04	0,04	0,15			
1.15 - 1.90	0.75	" striper, impr. Sl,Cp,Gn,Py, tildels m/skarn,hbl.	80°	2,10	0,21	3,76			
1.90 - 8.40	6.30	" Spr.gr. 1-3 mm.	80°	0,01	0,01	0,13			1,90-2,90

3.3. 1981
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 43.755

Borehull: 740

Dato : Feb-81
Koordinater : X: 925.424 . Y: 43.756
Retning : N
Helling/~~stigning~~: -58°
Høyde : 48,3
Lengde : 68,40 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 11.70	11.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spor gr. Spor gr. Ved 0.10, 0,50 8,30, 10,30 spor Sl.	75° 80°	0,06	0,07	0,33			10,20-11,20
11.70 - 12.70	1.00	"	Spr. striper Sl.		0,16	0,09	0,78			
12.70 - 14.40	1.70	"	Hbl.skarnførende striper m/impr. Sl,Cp,Gn,Py.	70°	1,88	0,37	4,53			
14.40 - 36.30	21.90	"	Rel.lys,mlk.tildels kv.rik spor gr. 0,5-2 mm.	60° 70°	0,08	0,15	0,28			13,40-15,60
36.30 - 36.55	0.25	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. hbl.skarnførende impr. Sl,Cp,Py.							
36.55 - 37.40	0.85	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.spor gr.	60°						
37.40 - 37.75	0.35	Pegm.								
37.75 - 40.30	2.55	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.spor gr.	50°						
40.30 - 43.30	3.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. veksl. m/ hbl.førende band. Svak impr. Py.	50° 60°						
43.30 - 46.50	3.20	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/dm-brede band 2 gl.gn.bd. spr.gr. tildels rik 1-5mm	40° 50°						
46.50 - 48.40	1.90	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl.førende, spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	50°						
48.40 - 59.20	10.80	Hbl.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/ cm-brede pegm.band. spr.gr. 1-3 mm.	50° 40°						

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 740

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
59.20 - 61.30	2.10	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.enkelte biot. rike band m/ gr. 1-5 mm.	50°						
61.30 - 61.50	0.20	Hbl.gn.	Mørk,mlk.gr.førende 1-3mm							
61.50 - 65.50	4.00	2 gl.gn.alm.	rel.lys, mlk. kv.rik, veksl. m/dm.brede biot. rike gr. 1-5 mm.førende band.	50°						
65.50 - 68.40	2.90	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. gr.førende 1-5 mm.	50°						

4.3. 1981
H. Pantdalsli

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 43.755

Borehull: 739

Dato : Jan - 81.
Koordinater : X: 925.424 . Y: 43.756
Retning : N
Helling/stigning: 68°
Høyde : - 48,3
Longde : 50.0 m.

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 7.80	7.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk,vekslende m/ cm-brede biot.rike band, Spr. gr. 1-3 mm.	75° 80°	0.02	0.01	0.04			480-780
7.80 - 9.20	1.40	"	Vekslende m/dm-brede biot. hbl.førende band, fortr.v. m/impr. Sl,Cp,Gn,Py	70° 80°	0.50	0.19	1.91			
9.20 - 9.80	0.60	"	Svak impr. Py, spor Sl.		0.07	0.09	0.34			
9.80 - 10.20	0.40	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk.spor hbl. impr. Sl,Gn,Cp,Py.	60°	0.77	0.31	1.47			
10.20 - 10.60	0.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. svak impr.Py		0.21	0.12	0.42			
10.60 - 11.30	0.70	"	Vekslende m/dm-brede biot. hbl.rike band fortrinnsvis med impr. Sl,Gn,Cp,Py	60°	3.30	0.16	4.75			
11.30 - 12.60	1.30	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik spr. str. m/biot.hbl. Sl,Cp,Gn. Py.	60°	0.14	0.10	0.31			
12.60 - 13.65	1.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. Hbl.-førende, impr. Sl,Gn,Cp,Py	60°	0.95	0.56	3.16			
13.65 - 14.35	0.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spor gr., svak impr. Py.	60°	0.05	0.06	0.21			
14.35 - 14.60	0.25	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. impr. Sl,Cp,Py		0.57	0.23	1.40			
14.60 - 15.35	0.75	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spr. gr.1-3mm	60°	0.10	0.05	0.39			
15.35 - 15.80	0.45	"	Hbl.førende striper fortrinnsvis m/impr. Sl,Cp, Gn.Py.		0.97	0.58	3.43			

RANA GRUBER NYHOLT

Lokalitet:

Borehull: 739

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
15.80 - 36.20	20.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. tildels m/ spr. gr. 1-3 mm. Ved 18.60, 18,70, 32,70, 32,90, 33,20, spor Sl,Gn, Cp,Py.	60°						
36.20 - 42.30	6.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede band 2 gl.gn. alm. Impr. Py ved 37.40 spor Sl.	60°						
42.30 - 44.60	2.30	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/dm-brede band 2 gl.gn.b.d. tildels gr.rik 1-3 mm.	60°						
44.60 - 48.00	3.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede hbl.gn.band. fortrinnsvis gr.førende 1-3 mm.	60°						
48.00 - 50.00	2.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl.gn.b.d. Spr. gr. 1-5 mm.	60°						

3.3. 1981
H. Pantdalsli

RANA BLADE TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43.760

Borehull: 738

Dato : Febr. -81
Koordinater : X: 925.423 Y: 44.755
Retning : N ?
Helling/stigning: 74° ? Må kontr.
Høyde : - 48,3
Lengde : 50.0 m.

1.

Dybde	L.	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 8.30	8.30	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk. rel.kv.rik. enst. cm-tykke biot.gn.band. spor gr. 1-2mm.ved 2.50-255 Sl, Py	80° 90°	0.09	0.14	0.20			2.30 - 8.30
8.30 - 10.05	1.75	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ partier biot.sk. (endulerad) hbl. tildels skarnførende str. impr. Sl,Cp,Gn,Py.	80° 85°	0.81	0.23	2.50			
10.05 - 10.65	0.60	"	Lys,mlk. spor Cp,Sl.	75° 80°	0.20	0.15	0.65			
10.65 - 11.55	0.90	Biot.gn.	Rel.mørk,mlk. hbl.skarn-førende, enkelte Pegm. 2 gl.gn.band. striper Sl, Cp,Gn,Py.	70° 70°	1.60	0.42	5.85			
11.55 - 12.10	0.55	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.-link. enstaka gr. 1-2 mm.	70°	0.15	0.03	0.65			
12.10 - 13.00	0.90	"	Rel.lys,mlk, spredte biot. hbl.gn.band med Sl,Cp,Gn,Py	75°	0.43	0.27	2.32			
13.00 p 14.30	1.30	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk. rel.kv.rik. Svak impr. Py	75° 80°	0.04	0.04	0.13			
14.30 - 15.40	1.10	"	- " - Enstn. cm.tykke skarnband med Sl,Cp,Gn,Py.	75°	0.14	0.02	0.59			
15.40 - 17.30	1.90	"	Lys,mlk.enstaka mmtn Sl,Cp, Gn,Py, striper.	75°	0.18	0.06	0.44			
17.30 - 17.70	0.40	Skarn	Mørk,mlk-grov. Sl,Cp,Gn,Py		0.88	0.26	3.64			
17.70 - 18.30	0.60	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk. enstaka gr.1-1 mm.	70°	0.04	0.03	0.18			

KARA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 738

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
18.30 - 18.55	0.25	Skarn biot.	mørk,mlk. Cp,Cy, Sl ?		0,36	0,24	0,76			
18.55 - 22.10	3.55	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk. rel.kv.rik. spr. gr. 1-3 mm. ved 20.70 - 20.90 pegm.	70°	0,03	0,06	0,10			18,55-22,10
22.10 - 22.65	0.55	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-tykke biot.sk.band m/ Cp,Py,Sl?	65°	0,09	0,23	0,16			
22.65 - 24.25	1.60	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spredt gr. 1-3 mm. spor Py.	60° 65°						
24.25 - 25.90	1.65	2 gl.gn	rel.lys mlk. vekslende m/ dm.tykke gl.rikere partier m/filtet preg. gr.førende i biot.rikere partior 1-3 mm. fra. 24.25-24.35 Sl.	60° 40° 60°						
25.90 - 33.20	7.30	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk.kv.rik.litt vekal. m/enstaka cm-tykke biot.hbl. pegm.band. Spr. gr. 1-2 mm svak impr. Py	65°	0,05	0,09	0,10			32,20-33,20
33.20 - 33.75	0.55	skarn	rel.lys,mlk.-grov m/2 gl.gn. striper. Stripet impr. Sl,Cp, Gn,Py,Po.		2,70	0,60	2,65			
33,75 - 34,90	1,15	2 gl.gn.sm.	Lys,mlk. kv.rik.	15°	0,18	0,11	0,42			
34,90 - 35,75	1,85	Hbl.bl.gl.gn.	Mørk,grovk. Oftkkrudd Stripet Cp,Py,Sl,Gn.	85°	0,03	0,08	0,04			
35,75 - 36,80	1,05	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. tildels skiktad m/tillutynne biot. skikt. spor hbl.. Impr. Sl,Cp,Gn,Py	65° 80° 65°	0,09	0,24	0,44			

* LIA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 738

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
					0,01	0,04	0,04			3420-3430
36.80 - 38.30	1.50	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. tildels filtet preg. Spr. gr.1-2mm	65°						
38.30 - 40.20	1.90	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende med opp til dm-tykke biot. gn.band. spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py	65° 70°						
40.20 - 41.35	1.15	Biot.gn.	Mørk,mlk. impr. Py	65 50 70°	0,03	0,12	0,08			
41.35 - 47.35	6.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk.enstaka opp til dm.tykke pegm.band. Gr.førende 1-4 mm.Impr.Py	75° 80°						
47.35 - 50.00	2.65	"	Mørk,mlk.bandet (lagdelt) med cm-tykke Amf.band. Sprudte gr. 1-3 mm. fortr. vis i Amf.band.	70° 75°						

19/2 1981
Staffan Burman

RAPA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 43.755

Borehull: 737

1.

Dato : Jan. -81
Koordinater : X: 925.423,4 Y 43.756,4
Retning : S
Helling/stigning: - 60°
Høyde : - 48,3
Lengde : 50.0 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 7.65	7.65	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enstaka cm-tykke biot.rikere band. Spredte gr. 1-2 mm. Sl ved 0.70-1.00 m	65° 70°						
7.65 - 8.10	0.55	Biot.gn.	Mørk,mlk. m/2 gl.gn.band. Impr. Sl,Cp,Gn,Py.	70°	0.29	0.49	1.14			
8.10 - 9.35	1.25	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enstaka cm-tykke Biot.gn.band. m/Sl Cp,Gn,Py.	65° 70°	0.03	0.06	0.27			
9.35 - 9.70	0.35	2 gl.gn.	Rel.lys,mlk.enkelte skarn-band Sl,Cp,Gn,Py.	70°	2.20	0.52	4.64			
9.70 - 14.60	4.90	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk.rel.kv.rik. Spr. opp til dm.tykke biot. lbl.gn.band m/skarn. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	60° 70°						
14.60 - 19.45	4.85	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.-fink. kv.rik.Spr. gr. 1-2 mm. spor Py. homogen.	70°?						
19.45 - 20.65	1.20	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk. kv.rik.enstaka cm-tykke Sl,Py striper. Sl,Py striper. Spr. gr. 1-2 mm.	60°	0.13	0.14	0.76			
20.65 - 22.20	1.55	Biot.gn.	Mørk,mlk. str. Sl,Cp,Gn,Py	60°	0.68	0.60	3.10			
22.20 - 22.80	0.60	Pegm.	Spor Gn.		0.67	0.11	0.28			
22.80 - 23.05	0.25	Biot.gn.	Mørk,mlk. (skarnførende) Rik Sl,Cp,Gn,Py.		1.70	0.51	3.16			

RANA BLADE TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 737

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
23.05 - 23.70	0.65	2 gl.gn.bb	Rel.lys,mlk.spor gr. 1-2 mm. ved 23.60-23.70 Biot.hbl. gn. m. Sl,Cp,Gn,Py.	65°	0,17	0,13	1.67			
23.70 - 29.20	5.50	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk.enstaka gr. 1-3 mm Svak impr. Py Ved 26.50 spor Sl	60° 65°						
29.20 - 29.70	0.50	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. Brecciert Sl,Cp, Gn,Py		0.31	0.69	1.40			
29.70 - 34.60	4.90	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.enstaka opp til 5 cm. tykke Pegm.og Biot.gn.band. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	65° 70°						
34.60 - 35.70	1.10	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. Py,Cp, Sl?	65°	0.02	0.14	0.14			
35.70 - 36.65	0.95	2 gl.gn.b.p.	Rel.lys,mlk. spor Py	65°	0.01	0.04	0.10			
36.65 - 37.95	1.30	Biot.gn.	Mørk,mlk.enkelte partier 2 gl.gn. spr. Sl,Cp,Gn,Py	65° 70°	0.65	0.18	1.90			
37.95 - 42.70	4.75	2 gl.gn.bb.	Rel.lys,mlk. enstaka cm-tykke Pegm./Biot.gn.band. Spr. gr. 1-2 mm.	70°	0.14	0.09	0.41			3845-3895
					0.01	0.03	0.06			4415-4470
42.70 - 44.05	1.30	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ hbl.biot.gn.band. Str. gl,Cp,Gn,Py.	65°	2.80	0.19	5.36			
44.05 - 44.60	0,55	2 gl.gn.	Rel.mørk,mlk. skarnførende		0,19	0.09	0.16			
44.60 - 46.90	2,30	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. bandet m/opp til 5 cm.tykke hbl.gn.band gr.førende 1-4 mm. forr. vlu i hbl.gn.band. Impr.Py	65°						
46.90 - 50.00	3.10	hbl.gn.	Mørk,mlk.enstaka cm.tykke 2 gl.gn.band.gr.førende 1-5 mm. Impr. Py	60° 65 70°						

NANA BLADS TRYKKERI

18/2 1981 Steffan Bergmann

Lokalitet: Profil 44.430

Borehull: 736

Dato : Jan-81
Koordinater : X: 925.473 Y: 44.480
Retning : 0
Helling/stigning: - 45°
Høyde : + 64
Lengde : 13.50 m.

Dybde	L	Bergart		Ø	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0,00 - 0,60	0,60	Kv.Pegm.	Ulike glot.nedlet, spor Gl		<0,01	0,03	0,04			
0,60 - 1.80	1.20	Biot.gn.	Mørk,mlk- enstaka opptil 5 cm. tykke 2 gl.gn.band, impr. Py	45°	0,04	0,13	0,53			
1.80 - 4.80	3.00	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.spor gr. svak impr°. Py	45°						
4.80 - 7.00	2.20	Biot.sk.	Mørk,mlk.-grovk. enstaka cm-tykke Amf.band. Impr. Py,Cp,(Sl?).	20-45°	<0,01	0,18	0,16			480-6.80
					0,12	0,72	1,63			6.80-8.00
7.00 - 7.60	0.60	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.impr. Sl,Cp,Gn, Py,Po.	45°	0,66	0,36	3,59			
7.60 - 10.40	2.80	Biot.gn.	Mørk,mlk.tildels hbl.før. impr. Py.	45°	0,01	0,17	0,06			760-9.60
10.40 - 11.30	0.90	Hbl.gn.	Mørk,mlk.spredte gr. 1-2mm	45-50°						
11.30 - 15.50	4.20	Biot.gn.	Mørk,mlk. enstaka cm-tykke kv. og hbl.band. Impr.Py	45-50°						
15.50 - 17.50	2.00	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk.kv.rik,enstaka gr 1-2 mm. Svak impr. Py	45° 40°						

23/1 1981
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.430

Borehull: 735

Dato : 23/1 1981
Koordinater : X:925.473 Y:44.430
Retning : S
Helling/stigning: Horisontalt
Høyde : - 62,5
Lengde : 14,65 m

Dybde	L		Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.40	1.40	2 gl.gn.	rel.lys,mlk. kv.rik Middels grov, spor Py	25° 30°						
1.40 - 1.65	0.25	Pegm.			0.01	0.01	0.07			
1.65 - 2.10	0.45	2 gl.gn.gn.	Rel.lys,kv.rik.bd. middels grov. impr. Py,Po,Cp	25° 30°	0.01	0.17	0.03			
2.10 - 2.50	0.40	Biot.sk.	Mørk,mlk. kv.rik. Py,Po Stripet impr. Sl	20° 25°	0.52	0.16	3.44			
2.50 - 3.00	0.50	Tbl.gn.	Mørk,middels grov i veksl. med 5 cm bånd med pegm. spor Po,Py	60° 70°	0.01	0.07	0.14			
3.00 - 5.45	2.45	2 gl.gn.	b.d. rel.lys,middels til grov k. kv.rik.impr. Py	0-10°	0.01	0.24	0.31			3.45-5.45
5.45 - 6.00	0.55	2 gl.gn.	Lys,middels grov kv.rik impr. Py		0.01	0.21	0.12			
6.00 - 7.00	1.00	Biot.gn.	Mørk,grovkornet.Impr. Py,Po,Cp,	0-20°	0.01	0.43	0.18			
7.00 - 14.65	7.65	2 gl.gn.	rel.lys,ml.grov. sv.impr. Py	0-15°	0.02	0.26	0.19			7.00-8.00

Lokalitet: 44.430

Borehull: 734

Dato : Jan -81
Koordinater : X: 925.473 Y: 44.430
Retning : S
Helling/stigning: + 45°
Høyde : -63.5
Lengde : 9.70 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.55	0.55	Biot.gn.	Mørk,mlk. Brecciert med spor Sl, som sprekkefyll.							
0.55 - 1.05	0.50	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.	20°						
1.05 - 1.55	0.50	Biot.gn.	Mørk,mlk.stripet Sl,Cp,Gn, Py	20°	0.98	0.06	4.57			
1.55 - 4.15	2.60	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. m/enkelte dm-tykke hbl.gn.band.	10° 20°						
4.15 - 4.60	0.45	Hbl.gn.	Mørk,mlk.							
4.60 - 8.45		2 gl.bd.	Rel.lys,mlk. enst. hbl.band spr. gr. 1-2 mm.	0						
8.45 - 9.70		Hbl.gn.								

EANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43.755

Borehull: 732

Dato : Jan-81
Koordinater : X: 925 426 Y: 43.735
Retning : S
Helling/stigning : 70°
Høyde : -48
Lengde : 52.60 m.

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 7.05	7.05	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk.rel.kv.rik. enstaka cm-tykke biot.gn.band. Spr. gr. 1-2 mm. spor Py Ved 0,50 og 6,50 spor Sl	60°	0.04	0.02	0.21			6.05-7.05
7.05 - 7.90	0.85	Skarn biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. Impr. Sl, Cp,Gn,Py	60°	0.43	0.34	1.59			
7.90 - 9.60	1.70	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.vekslende med opp til dm-tykke biot.gn. band. impr. Py. Spor Sl fortrinnsvis i biot.gn.bånd	70°	0.11	0.11	0.39			
9.60 - 10.10	0.50	Skarn,biot.gn.	Mørk,mlk-grov. impr. Sl,Cp,Gn,Py.		2.30	0.42	6.15			
10.10 - 17.05	6.95	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enstaka biot. rikere partier, opp til dm-tykke. Sl ved 10.90-11.00	60°	0.43	0.10	0.77			10.10-11.10
17.05 - 17.70	0.65	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. delvis med skarn, pegm. biot. Sl,Cp, Gn,Py.	70°	0.85	0.81	1.65			
17.70 - 18.95	1.25	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk. enstaka små gr. 1-2 mm.	80°	0.05	0.06	0.13			
18.95 - 20.00	1.05	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. bandet med skarnførende biot.gn.band m/Sl,Cp,Gn,Py	70° 60°	0.28	0.98	2.31			
20.00 - 20.50	0.50	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk. svak impr. Py Ved 20.25-20.40 Sl,Gn,Py	70°	0.52	0.73	0.53			
20.50 - 21.90	1.40	Biot.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/opp til dm-tykke 2 gl.gn.bånd. Biot. Sl, Cp, Gn, Py	60°	2.00	0.49	4.35			

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 732

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
21.90 - 24.90	3.00	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk.enstaka små gr. 1-2 mm. Spor Py.	60°	0,38	0,08	0,26			2190-2280
24.90 - 26.10	1.20	Pegm.								
26.10 - 34.60	8.50	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk. enstaka små gr. 1-2 mm. ved 33.80-33.95 Sl.	60° 70°	0,08	0,13	0,56			3360-3460
34.60 - 36.45	1.85	Biot.gn.	Mørk,mlk. litt vekslende med 2 gl.gn.band. Spor hbl. Striper Sl,Cp,Gn,Py	80°	0,07	0,30	2,20			3460-3560
					<0,01	0,16	0,34			3560-3640 ?
36.45 - 36.70	0.25	2 gl.gn.			0,02	0,06	0,13			
36.70 - 37.65	0.95	Pegm.								
37.65 - 39.30	1.75	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk.spredte gr. 1-2 mm.	70°	<0,01	0,01	0,03			
39.30 - 40.90	1.60	" "	" " " striper Lys Sl,Cp,Gn,Py	60°	0,94	0,22	3,89			
40.90 - 42.40	1.50	" "	Rel.lys,mlk.enkelte dm-tykke bl.førende band. Spr. gr. 1-2 mm. forekommsvis i hbl. førende band.	70°						
42.40 - 44.80	2.40	Biot.hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. enkelte opp til dm.tykke bl.gn.band. gr.førende 1-4 mm. Impr.Py	70° 80°						
44.80 - 49.50	4.70	Bl.gn.	Mørk,blk. enkelte parti av biot.hbl.gn.gr.førende 1-4 mm. Impr. Py	70°						
49.50 - 50.55	1.05	Biot.sk.	Mørk,mlk.striper Py(Brecciert)	60°						
50.55 - 52.20	1.65	Hbl.gn.	Mørk,mlk. Amfibolittisk Gr.førende 1-2 mm.	60°						

SANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 732

Dato :
Koordinater :
Retning :
Holling/stigning:
Høyde :
Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
52.20 - 52.30	0.10	Pegm.							
52.30 - 52.60	0.30	Klorit sk.? Grønn, mlk. fin, bløt, komp.							

23/1 1981
Steilan Burmøn

KOPIA BLAUD TAVKKER

Lokalitet: 43.755

Borehull: 731

Dato : Jan - 81
Koordinater : X: 925.426 Y: 43.755
Retning : S
Helling/stigning : - 80°
Høydo : — 48
Lengde : 50.0 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.40	0.40	2 gl.gn.bd.	Lys, mlk. kv.rik, spor gr. 1-2 mm.	80°						
0.40 - 0.65	0.25	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. skarnførende striper Sl,Cp,Gn,Py	70	0,82	0,27	2,03			
0.65 - 6.75	6.10	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk.rel.kv.rik. enstaka cm-tykke biot.hbl. band. spredte gr. 1-3 mm	70 80	0,04	0,02	0,06			6,75-6,15
6.75 - 7.30	0.55	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. tildels skarnførende. Striper imp. Sl,Cp,Gn,Py	80°	0,85	0,48	0,77			
7.30 - 7.80	0.50	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk.kv.rik enstaka filmtynne biot.skikt. svak impr. Py	80	0,03	0,02	0,04			
7.80 - 9.60	1.80	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. skiktad.m/mm-tynne biot.skikt. enkelte dm.tykke skarnførende band med rik Sl,Gn. Striper impr. Sl,Gn,Cp,Py	80 90	1,26	0,28	2,23			
9.60 - 10.10	0.50	Biot.hbl.gn.(sk)	Mørk, mlk-grovk. Brunfarg med Sl,gnn spredkrystaller,Sl,Cp, Gn,Py	70 90°	1,75	0,41	2,36			
10.10 - 10.50	0.40	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk. rel.kv.rik. enstaka cm-tykke hbl.biot. band. Striper Sl,Cp,Gn,Py.	70 80	2,35	0,49	4,90			
10.50 - 15.00	5.40	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk.kv.rik. spredte gr 1-2 mm. Svak impr. Py	70 80	0,05	0,05	0,14			11,50-11,10
					0,03	0,01	0,02			15,00-14,60

RAPA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil. 44.570.

Borehull: 730

Dato : Des. 1980
Koordinater : X: 925.474,5 Y: 44.570
Retning : Opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 94.5
Lengde : 41.45 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % g/t					Prøve nr
					% Pb	% Cu	% Zn		% Fe	
0.00 - 32.00	32.00	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.enkelte dm-tykke Pegm.band. samt fra 20.00 enkelte biot.rikere partier.	70° 80°						
32.00 - 33.00	1.00	Pegm.								
33.00 - 33.45	0.45	Biot.gr.(sk).	Mørk,mlk.kv.sprengt impr. Py,Cp,Gn,Po.	60° 70°	0.17	0.43	4.48	9.9		
33.45 - 34.15	0.70	2 gl.gn.	Rel.lys mk. spor Py	80°	0.07	0.10	0.22	2.9		
34.15 - 34.65	0.50	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grov. impr. Sl,Cp Gn,Py.	70 60°	1.85	0.34	3.22	64.0		
34.65 - 35.50	0.85	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. impr. Py.		0.06	0.05	0.23	5.0		
35.50 - 35.80	0.30	Amf.	Mørk, massiv gr.førende 1-4 mm.							
35.80 - 38.85	3.05	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.vekslende m/cm-tykke hbl.gn.band. Hbl.gn. band. gr.førende impr. Py	60°						
38.85 - 39.10	0.25	Kv.								
39.10 - 41.45	1.35	Biot.hbl.gn.	mørk,mlk.	70°						

23/12 1980

Stellan Burman

KNUK BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.570

Borehull: 729

Dato : Des, -80
Koordinater : X: 925.475 Y: 44.570
Retning : N
Helling/stigning: + 77°
Høyde : - 94,5
Lengde : 47,40 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	%	% Fe	Prøve m
0.00 - 34.70	34.70	2 gl.gn.b.c.	Rel.lys,mlk. enstaka dm-tykke pegm.band.	70° 80°						
34.70 - 35.65	0.95	biot.gn.	Mørk,mlk.enkelte cm-tykke 2 gl.gn.band. svak impr. Py	70°	0,24	0,12	0,67	5,8		
35.65 - 36.65	1.00	"	Mørk,mlk.litt skarn str. imp. Sl,Cp,Gn,Py.	70°	1,60	0,15	2,28	27,7		
36.65 - 37.20	0.55	"	Mørk,mlk.litt skarn. Stripet impr. Py,Po(Sl,Gn)?		0,06	0,25	1,23	5,0		
37.20 - 38.40	1.20	"	" Sl,Cp,Gn,Py	70°	1,01	0,05	7,20	18,5		
38.40 - 39.00	0.60	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.filtepreg svak impr. Cp,Sl,Py.	70°	0,27	0,13	1,06	2,1		
39.00 - 40.00	1.00	"	Rel.lys,mlk.enstaka gr.1-2 mm. impr. Py	60° 70°	0,03	0,08	0,27	2,6		
40.00 - 41.40	1.40	Biot.gn.	Mørk,mlk. enkelte gr. 1-3mm impr. Po,Py	60°						
41.40 - 47.40	6.00	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enkelte opp til 5 cm tykk biot.gn.band. Svak impr. Py. Spredte gr. 1-3 mm.	70°						

21/12 1980
Steinar Barman

Lokalitet: [illegible]

Borehull: 728

Dato : Des. 80
Koordinater : X: 923.580 Y: 60.570
Retning :
Helning/stigning: + 72°
Høyde : - 94,5
Lengde : 47,50

Dybde	L	Bergart		S	Analyser gr/tonn					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	Ag	% Fe	
0.00 - 40.50	40.50	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ spr. biot.rikere partier også dm-tykke Pegm.band. Spredte gr.	60° 70°	0.25	0.03	0.48	2.2		400-40.50
40.50 - 41.00	0.50	Biot.gn.	Mørk,mlk. Striper Sl,Cp, Gn,Py.	70°	1.28	0.56	3.41	23.9		
41.00 - 43.90	2.90	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.enstaka cm-tykke Biot.band m/gr. 1-3 mm.	70°						41.50-42.00
43.90 - 47.50	3.60	Biot.gn.	Mørk,mlk. litt vekslende m/s gl.gn.band. Svak impr. Py . Spredt gr. 1-2 mm	60° 70°						

23/12 1980

Stellan Burman

RAMA BLADS TRYCKERI

Lokalitet:

Borehull: 727

Dato : Jan - 81
Koordinater : X: 925.426 Y: 43.755
Retning : Lodd.
Helling/~~stigning~~: - 90°
Høyde : - 48.0 m
Longde : 50.0 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 7.80	7.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ dm.brede b.d.parti. Spr. gr. 1-2 mm cm-brede striper Sl, ved 0,25,0,35, 1,40, 1,50.	70° 80°						
					0.01	0.01	0.05			6.80-7.20
7.80 - 8.75	0.95	"	Impr. Sl,Cp,Gn,Py	80°	0.24	0.32	1.78			
8.75 - 9.30	0.55	"	Lys,mlk,kv.rik. Svak impr. Py		<0.01	0.05	0.11			
9.30 - 9.85	0.55	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. impr. Sl,Gn, Cp,Py	65°	1.14	0.38	2.20			
9.85 - 16.70	6.85	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.vekslende m/cm-dm-brede bånd 2 gl.gn.b.d. Cm-brede striper Sl ved 11.60, 11.80,12.70, 13.25, 13.70, 14.10 (spor).	70°	0.12	0.08	0.08			9.85-10.15
					<0.01	<0.01	0.01			16.60-12.60
16.70 - 17.10	0.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. impr. Sl,Cp, Gn,Py		0.97	0.33	2.27			
17.10 - 18.05	0.95	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spr.gr. 1-3mm Svak impr. Py	70°	0.04	0.07	0.10			
18.05 - 20.15	2.10	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. tildels bl.t. skarnførende, impr. Sl,Gn Cp,Py	70° 80°	0.40	0.31	0.99			18.05-18.80
					1.91	0.20	0.80			18.80-19.10
20.15 - 30.65	10.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.vekslende m/cm-dm-brede bånd 2 gl.gn.b.d. forstrimlevis m/ sp. gr.1-3mm	80°	0.11	0.04	0.20			20.0-21.00
					0.11	0.05	0.03			29.00-29.60
30.65 - 31.70	1.05	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. vekslende m/cm-dm-brede bånd pegm. og 2 gl.gn.alm. impr. Sl,Cp,Gn, Py, forstrimlevis i biot.gn.	70° 80°	0.49	0.37	1.20			

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull:

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
31.70 - 32.55	0.85	2 gl.gn.alm.	rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede band 2 gl.gn. b.d. m/spor Sl.	80°	0.02	0.13	0.11			
32.55 - 33.50	0.95	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. tildels hbl. og skarnførende, impr. Sl,Cp,Gn,Py	80°	0.57	0.46	4.80			
33.50 - 34.90	1.40	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm.	80°	0.05	0.07	0.04			
34.90 - 35.05	0.15	Malm			2.65	0.30	8.00			
35.05 - 36.55	1.50	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm.brede band biot.gn. hbl.førende. Spr. gr. spor Sl. ved 35.30.	80°	0.06	0.21	0.32			
36.55 - 37.00	0.45	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. tildels skarn-førende. Str. impr. Sl,Gn,Cp,Py.		0.36	0.74	3.29			
37.00 - 37.50	0.50	Biot.gn.	Mørk,mlk.svak impr. Py. Ved 37.35 impr. Sl.	80°	0.10	0.07	0.18			
37.50 - 38.10	0.60	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ 2 gl.gn.alm. Spr. strippor Sl,Gn,Cp,Py.	80°	1.56	0.20	4.60			
38.10 - 43.00	4.90	"	Vekslende m/cm- 2 dm.brede band 2 gl.gn.alm. spor hbl. gr. og skarn.	80°	0.03	0.04	0.07			1870 - 4810
43.00 - 50.00	7.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm.	70-80°						

29.1. 1981
H. Lundadalen

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.670

Borehull: 726

Dato : Des. 80
Koordinater : X: 925.485,5 Y: 44.680
Retning : N
Helning/stigning: + 82°
Høyde : - 94.0
Lengde : 41.50 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	g-Ag/t	% Fe	Prøve m
0.00 - 26.20	26.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede 2 gl.gn.bd. og pegm.band. spr. gr. 0,5-3 mm fortrinnsvis i biot. rike parti.	70° 80°						
26.20 - 27.40	1.20	Biot.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/dm.-brede pegm.band. spor hbl. impr. Py,Po. Fra 26.20-26.25 spor Sl.	80°						
27.40 - 28.15	0.75	Pegm.			0.03	0.03	0.06	0.1		
28.15 - 29.35	1.20	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. spor hbl. impr. Sl,Gn,Cp,Py,Po	70° 75°	0.61	0.51	4.78	19.4		
29.35 - 31.40	2.05	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.vekslende m/dm brede 2 gl.gn.b.d.band. Spr. gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py. Fra 29.70-29.75 Spor Sl.	60° 80°	0.06	0.09	0.24	2.9		2935-3035
31.40 - 32.70	1.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk, spr.gr. 1-5 mm. svak impr. Py.	70°						
32.70 - 41.50	8.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede 2 gl.gn.b.d. og pegm.band. spr. gr.0,5-3 mm. Svak impr. Py.	60° 80°						

4.12. 1980

H.P.

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.670

Borehull: 725

Dato : Des. -80
Koordinater : X: 925.486 Y: 44 680
Retning : N
~~Helling~~/stigning: 67°
Høyde : – 94.0
Lengde : 44.35 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	g Ag/t	% Fe	Prøve m
0.00 - 30.00	30.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl. gn.bd. og pegm. Spr. gr. 1-3 mm, forøvrig innsvis i b.d. parti.	70° 80°						
30.00 - 30.25	0.25	Pegm.								
30.25 - 34.05	3.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm.	60° 70°						
24.05 - 35.45	10.40	Biot.gn.	Mørk,mlk.tildels hbl. førende. Fra 34.05 - 35.00 god impr. Sl,Cp,Gn,Py. Fra 35.00-35.45 spr. striper malm.	30° 60°	0.03	0.02	0.05	0.6		33.05-34.05
					1.65	0,28	5,40	29.1		34.05-35,45
35.45 - 40.00	4.55	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spr. dm. brede pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	60°	0.06	0.04	0.20	0.9		35,45-36,45
40.00 - 40.85	0.85	Pegm.								
40.85 - 44.35	3.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	70°						

3/12 1980
H. Pantdalsli

RANA GRAFISKE TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.670

Borehull: 724

Dato : Nov. 80
Koordinater : X 923.486 Y: 44.680
Retning : N
~~Helning~~/stigning: + 60°
Høyde : - 94.0
Lengde : 56,50 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 20.70	20.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik. veksl. m. spredte dm.brede 2 gl. gn.bd. partier med spr. gr. 1-3 mm. Spor Py i de biot.rikere partier. även enstaka Pegm.band.	80° 70°						
20.70 - 44.20	23.50	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk.enstaka opp til 5 cm. tykke biot.hbl.band. Spredte gr. 1-3 mm. spor Py. Gr.førende i Biot. hbl.band.	60° 70°						
44.20 - 45.25	1.05	Pegm.								
45.25 - 47.70	2.45	2 gl.gn.bd.	(Se ovenf.)	70°						
47.70 - 49.20	1.50	Biot.sk.	Mørk,mlk-grovk. litt ondulerende. Gr.førende 1-2 mm. Impr. Py.							
49.20 - 50.05	1.15	Biot.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. Impr. Py	70° 80°						
50.05 - 51.60	1.55	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.spredte gr. 1-2 mm.	70°						
51.60 - 51.85	0.15	Skarn	foldet.							
51.85 - 54.80	3.95	Biot.gn.	Mørk,mlk.vekslende m.opp til 5 cm. tykke hbl.gn. band. gr.førende 1-4 mm.	70°						
54.80 - 55.10	0.30	Hbl.gn.	Mørk,mlk.-grov.							
55.10 - 56.50	1.40	Biot.gn.	Se ovenf.							

2.12. 1980, Stellan Burman

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 4.670

Borehull: 723

Dato : Nov. 80
Koordinater : x: 925.486 y: 44.680
Retning : N
Helling/stigning: 75°
Høyde : - 94.0
Lengde : - 47,45 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	g Ag/t	% Fe	Prøve m
0.00 - 13.60	13.60	2 gl.gn.alm.	rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede pegm.og 2 gl.gn. bd.band. Spr. gr. 0,5-2 mm fortrinnsvis i b.d.partiene Fra 5.60-5.65 spor Sl.	80° 60°						
13.60 - 28.90	15.30	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk.vekslende m/ cm-dm-brede pegm. og 2 gl. gn.alm.band. spr. gr. 1-3mm	70° 80°	0.03	0.02	0.09	0.4		2790-2890
28.90 - 29.45	0.55	"	Striper, impr. Sl,Gn,Cp,Py	80°	4.10	0.24	7.56	98.1		
29.45 - 30.30	0.85	Biot.gn.	Mørk,mlk.tildels m/hbl. svak impr. Py	80°	0,19	0.09	0.37	8.1		
30.30 - 31.00	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ dm-bred biot.gn.parti. Spr. striper Sl,Gn,Cp,Py	80°	0.41	0.20	2,02	11.9		
31.00 - 31.60	0.60	Biot.gn.	Mørk,mlk.tildels m/hbl. impr. Sl,Gn,Cp,Py	80°	0.68	0,15	6.66	12,8		
31.60 - 32.20	0.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. striper, impr. Sl,Gn,Cp,Py	80°	1.40	0.04	5,75	32.9		
32.20 - 47.45	15.25	"	rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm.	80°	0,10	0.06	0.40	4.1		32.20-33,20

2.12. 1980
Holger Pantdalsli

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43.980

Borehull: 728

Dato :
Koordinater : X: 925.425 Y: 43.983
Retning : S
Helling/stigning: - 70°
Høyde : - 67
Lengde : 29.30 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 1.85	1.85	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.rel.kv.rik. Spr. cm-dm-tykke skarnstriper med Sl,Cp,Gn,Py, Tap 1.00 - 1.30	65° 70°	1.18	0.19	4.54			
1.85 - 2.45	0.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.kv.rik. impr. Py Spor Sl,Cp,Gn.	65°	0.35	0.23	1.50			
2.45 - 3.60	1.15	"	Lys,mlk.kv.rik.enstaka striper Sl.	65°	0.36	0.81	2.65			
3.60 - 3.95	0.35	Biot/pegm.	Mørk,mlk.-grov. striper Sl, Gn,Py	65°	2.80	0.23	2.03			
3.95 - 4.80	0.85	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. striper impr. Sl,Cp,Gn,Py.	60°	1.00	0.23	2.03			
4.80 - 9.75	4.95	"	Rel.lys,mlk. enstaka cm-tykke biot.hbl.band med gr. 1-3 mm. Spor Sl,Gn,Cp, Py	65° 70°	0.29	0.12	0.79			480-580
					0.30	0.23	0.96			580-680
					0.01	0.01	0.01			480-780
9.75 - 10.45	0.70	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.imp. Py	80°						
10.45 - 11.35	0.90	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.kv.rik.spredte gr. 1-3 mm. spor Py							
11.35 - 12.45	1.10	Biot.gn.	Mørk,mlk. litt undulerende Py - nem klyser/sliror 11,65-11,75 hbl.førende	75° 65°						
12.45 - 14.75	2.30	2 gl.gn.bd.	rel.lys mlk. vekslende med cm-dm-tykke biot.gr.band, enkelte hbl.førende. Imp. Py,fortrinnsvis i biot.gn. band.	70° 75°						
					0.02	0.06	0.06			13.5-14.75
14.75 - 15.50	0.75	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grov.litt undu-lerende,tildels breccierte striper Sl,Cp,Gn,Py,Po	70°	4.54	0.34	3.03			

SANA GLASS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 722

2

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
15.50 - 16.40	0.90	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.kv.rik. enkelte striper Py,Po,Sl	70°	0,10	0,13	0.61			
16.40 - 16.80	0.20	Biot.hbl.pegm.	Mørk,grovk. sliror, Py,Po,Sl	65° 75°	0.04	0.25	0.75			
16.80 - 17.50	0.70	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. filmtynne biot. skikt.svak impr. Py Spor gr. 1-2 mm.	70°	0.01	0.03	0.01			
17.50 - 18.50	1.00	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.tildels skiktad m/biot. impr. Py, Sl? enstaka gr. 1-2 mm.	75°	0.01	0.07	0.07			
18.50 - 18.90	0.40	Biot.sk.	Mørk,mlk.-grovk. ondulerad Py,Po som klysor,striper	75°	0.01	0,32	1.42			
18.90 - 19.60	0.70	2 gl.gn.m/ skarn	rel.lys,mlk. enkelte biot. hbl.skikt. Impr. str. Sl,Cp,Gn	75°	0.75	0.29	3.28			
19.60 - 20.10	0.50	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spredte gr.1-3 mm. Spor Py.	70°	0.07	0.07	0.89			
20.10 - 20.40	0.30	Komp.malm.	Sl,Cp,Gn,Py,Po		0.69	0.51	16.20			
20.40 - 23.50	3.10	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.enstaka dm-tykke biot.hbl.gn.partier. Svak impr. Py. spr. gr. 1-3 mm. Fortrinnsvis i biot.hbl.bend. Ved 23.35 - 23.40 Sl.	75°						23,40-23,40
23.50 - 29.30	5.80	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. litt vekslende med hbl.biot.gn.partier. Impr. Py Gr.forende, fortrinnsvis i hbl.gn.							

25/11 1980
Stellan Burman

KANA GLADS TRYKKERI

Lokalitet: 43.980

Borehull: 721

1.

Dato :
Koordinater : X:925.424 Y: 43.983
Retning : S
Helling/stigning: - 85°
Høyde : - 67
Lengde : 29.60 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk.kv.rik.impr. Py. Sl ved 0,05-0,07.		0,34	0,13	1.11			
0.50 - 3.60	3.10	"	Lys,mlk.kv.rik. bandet med cm-dm-brede malmband og slirer, Sl,Cp,Cn,Py	80°	0.95	0.28	3.96			0,50-2,00
					1.50	0.33	4.30			2,00-3,60
3.60 - 4.15	0.55	Biot.gn.	Mørk,mlk.(skiktet) impr. Py Sl,Cp,Gn	70° 80°	0,61	0.25	1.29			
4.15 - 4.60	0.45	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.kv.rik.svak impr.Py	80°	0,24	0,11	1.14			
4.60 - 5.10	0.50	2 gl.gn.(skarnførende/	Lys,mlk-fink. Applitisk(kornig) impr. Py,Sl,Gn-?		0,29	0,25	1.30			
5.10 - 6.95	1.85	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk. kv.rik. enstaka biot.rikere partier. m/imp. Py,Sl	70° 60°	0.23	0,24	0,57			
6.95 - 10.30	3.25	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk.rel.kv.rik.spredte gr. 1-2 mm. spor Py.	70° 80°	0,02	0,06	0,06			6,95-7,45
10.30 - 10.55	0.25	Pegm.,								
10.55 - 11.50	0.95	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.-grovk. impr. Py	70°						
11.50 - 12.45	0.95	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spor gr. 1-3mm, svak impr. Py	70°						
12.45 - 13.45	1.00	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. skiktet med opp til cm-tykke biot.skikt spor hbl. i biot.skiktene.	70° 60°	0,01	0,02	0,12			
13.45 - 13.80	0.35	Biot.gn/m 2 gl.gn.	Mørk,mlk-grovk. brecciert, Po,Py som sprekkefyllinger	"	0,08	0,44	0,60			
13.80 - 14.05	0.25	Komp. malm.			1,88	0,23	4,52			

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 721 2.

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
14.05 - 14.60	0.55	2 gl.gn./ Biot.gn.	Rel.lys,mlk.(Brecciert) Po,Py som sprekkefylling		0.06	0,29	0,63			
14.60 - 14.90	0.30	Pegm.								
14.90 - 19.20	4.30	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ dm-tykke biot.gn. m/hbl.band striper og impr. Sl,Cp,Gn,Py fortrinnsvis i biot.hbl.band.	70° 65°	0,13	0.21	0,88	1,79 Zn.		14,90-16,00
					0,02	0,13	0,39			16,00-17,50
					0,07	0,13	0,68			17,50-19,20
19.20 - 19.75	0.55	Biot.gk.	Mørk,mlk-grov. skifrig, impr. Sl,Cp,Gn,Py,Po	70°	0,21	0,36	2,32			
19.75 - 19.90	0.15	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spor hbl. Spor Py	75°	0,31	0,16	0,80			
19.90 - 20.35	0.45	komp. malm			5,30	0,25	20,30			
20.35 - 20.55	0.20	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk. skarnførende Str. impr. Sl,Cp,Gn,Py	70°	1,60	0,72	6,30			
20.55 - 21.90	1,35	2 gl.gn.bd	Rel.lys,mlk. enstaka biot. skikt spor hbl. svak impr. Py, Sl	70° 80°	0,33	0,10	0,06			
21.90 - 25.05	3.15	hbl.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/dm-tykke biot.hbl.gn.band. gr. 1-3 mm. impr. Py, fortrinnsvis i biot.hbl.gn.	70° 80°	0,13	0,05	0,32			21,90-22,90
25.05 - 26.40	1.35	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.enstaka gr. 1-4mm impr. Py	80°						
26.40 - 29.60	3.20	hbl.gn.	Mørk,mlk.enstaka partier Biot.hbl.gn. gr.førende 1-4 mm. imp. Py mellom-lagig. 26.40-26,70. 28,40-28,60.	70° 80° 70°						

RANA BLADS TRYKKERI

24/11-80 Steffan Bergman

Lokalitet: Profil 44.965

Borehull: 720

Dato : Nov. 1980
Koordinater : X: 925.422,5 Y: 44.965
Retning : Opp
~~Hetning~~/stigning: + 90°
Høyde : - 97.5
Lengde : 1.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py	80°						

18/11 1980

Holger Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.965

Borehull: 719

Dato : Nov. -80
Koordinater : X: 925.420 Y: 44.965
Retning : S
Helling/stigning: 20°
Hoyde : - 101,5
Lengde : 11.70 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.70	1.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede biot.gn. band. striper impr. Sl,Gn, Cp,Py	10° 20°	0,81	0,39	2,53			
1.70 - 2.00	0.30	"	Impr. Py		0,12	0,35	0,78			
2.00 - 2.90	0.90	"	Impr. Sl,Gn,Cp,Py	15°	0,60	0,38	2,23			
2.90 - 11.70	8.80	"	Rel.mørk,mlk.-grovk. veksl. m/cm-dm-brede biot.gn.band spr. gr. 1-5 mm. svak impr. Py.	20° 30°	0,03	0,07	0,12			2,90-5,90

18/11 1980
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.965

Borehull: 718

Dato : Nov. 1980
Koordinator : X: 925 Y: 44.965
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 103,0
Lengde : 4,90 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0,00 - 3,90	3.90	2 gl.gn.b.d.	Rel. mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede 2 gl.gn.alm. band. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	80° 90°						
3.90 - 4.90	1.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-5 mm.	80°						

18/11 80
Holger Pantdalsli

GRANA BLADS TRYCKERI

Lokalitet: Profil 44.965

Borehull: 717

Dato : Nov. 1980
Koordinater : X: 925.425 Y: 44.965
Retning : N
Helling/stigning: 20°
Høyde : - 101,5
Lengde : 17.0 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.90	1.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py Fra 1.50 - 1.52 spor Sl.	40°						
1.90 - 2.30	0.40	Pegm.								
2.30 - 17.00	14.70	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede pegm. og biot. band, spr. gr. 0,5-3 mm svak impr. Py.	30° 40°						

18/11 1980
H. Pantdalsli

FANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.965

Borehull: 716

Dato : Okt. -80
Koordinater : N: 925.420
Retning : S
Helling/stigning: + 45°
Høyde : - 99.5
Lengde : 11.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 4.00	4.00	2 gl.gn. Lys.mlk.	40°						
4.00 - 11.00	7.00	Hbl.biot.gn. Mørk mlk. gr.førende 1-3 mm. Svak impr. Py	40-45°						

16/11-80
Stellan Bursen

Lokalitet: Profil 44.965

Borehull: 715

Dato : Okt. -80
Koordinater : X:925.420
Retning : S
Helling/stigning : - 45°
Høyde : - 103
Lengde : 5,40

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 3.50	3.50	2 gl.gn.	Lys,mlk. enstaka gr.1-2 mm	40°						
3.50 - 3.80	0.30	Biot.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. Svak impr. Py	45°						
3.80 - 5.50	1.70	2 gl.gn.	Lys,mlk.	40°						

16/11 1981 .

Stellan Burman

KANA GLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.965

Borehull: 714

Dato : Okt. -80
Koordinater : X: 925.425 Y: 44.965
Retning : N
Helling/stigning: - 45°
Høyde : - 103
Lengde : 4.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 1.00	1.00	2 gl.gn. Lys,mlk.	40°						
1.00 - 1.50	0.50	Pegm.							
1.50 - 4.50	3.00	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. enstaka gr. 1-2 mm. spor Py	40° 45°						

16/11 1980
Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.965

Borehull: 713

Dato : Okt. -80
Koordinater : X:925.425
Retning : N
Helling/stigning: + 45°
Høyde : - 99.5
Lengde : 10.65 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 0.30	0.30	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. tildels biot. rik. Sl,Cp,Gn,Py	45°						
0.30 - 1.00	0.70	"	Lys,mlk.	40-45°	0,12	0,22	0,90			
1.00 - 1.15	0.15	"	" Po	45°	0.28	0.20	0.58			
1.15 - 1.55	0.40	Biot.gn.	Mørk,mlk.	40°						
1.55 - 2.05	0.50	Skarn	Litt 2 gl.gn. stripet imp. Sl,Cp,Gn,Py		2.00	0,55	6,75			
2.05 - 5.00	2.95	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spredte gr. 1-3 mm.	40-45°	0,04	0.03	0,27			205-1951
5.00 - 5.70	0.70	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.	"						
5.70 - 5.95	0.25	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spredte gr. svak impr. Py	40°						
5.95 - 9.50	3.55	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk. vekslende m-tykka biot.b/md, gr.førende fortrinnsvis i hbl.gn. 1-3 mm.	40° 45°						
9.50 - 10.65	1.15	2 gl.gn.	Rel.lys,mlk. spor Py.	40°						

16/11 - 80

Steffan Bergman

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 43.980

Borehull: 712

1.

Dato :
Koordinater : X:925.425 Y: 43.983
Retning : N
Helling/stigning: 83°
Høyde : - 67
Lengde : 26.55

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.30	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. Impr. Py		0.12	0.30	0.45			
0.30 - 1.00	0.70	"	Impr.Sl,Gn,Cp,Py	65°	0.54	0.77	3.29			
1.00 - 1.30	0.30	Pegm.			0.04	0.26	0.23			
1.30 - 3.20	1.90	2 gl.gn.bd.	Rel-mørk,mlk.vekslende m/dm brede pegm.band. tildels hbl.førende.impr. Sl,Gn,Cp, Py.	70°	0.19	0.57	2.13			1.30-2.30
					0.11	0.53	1.14			2.30-3.20
3.20 - 11.90	8.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.spor gr. svak impr. Py	70°	0.02	0.03	0.10			3.20-4.20
					0.01	0.01	0.04			10.40-11.40
11.90 - 13.20	1.30	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk.-grovk. veksl. m/dm-brede pegm. og 2 gl.gn. alm.band. spr. striper Sl,Gn,Cp,Py	70°	0.27	0.23	1.84			
13.20 - 13.40	0.20	Malm	Hbl.førende		1.45	0.20	16.30			
13.40 - 15.70	2.30	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spr.gr. 1-3 mm. Svak impr. Py. Ved 13.60 spor Sl.	70°	0.02	0.01	0.25			13.40-14.60
					<0.01	<0.01	0.01			14.60-15.70
15.70 - 16.40	0.70	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk-grovk.veksl. m/cm-brede hbl.-rike band. Spor Hbl. spr. av Spor Sl, Gn,Cp,Py	70°	0.23	0.38	2.12			
16.40 - 16.90	0.50	"	Svak impr. Py		0.03	0.02	0.16			
16.90 - 18.40	1.50	"	Vekslende m/biot.rike hbl.-førende band, tettere impr. m/god impr.Sl,Gn,Cp,Py.	1	1.14	0.67	9.86			

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 712

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
18.40 - 19.05	0.65	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spr. biot.rike band. svak impr. Py.	70°	0,07	0,08	0,36			
19.05 - 19.70	0.65	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ dm-brede biot.rike hbl.før. band, fortrinnsvis m/god impr. Sl,Cn,Cp,Py	70°	0,42	0,39	4.00			
19.70 - 20.60	0.90	"	Svak impr. Py.	70°	0,03	0,13	0,34			
20.60 - 21.30	0.70	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. tildels hbl.førende striper, impr. Sl,Cn,Cp,Py,Po	70°	0,20	0,79	4,93			
21.30 - 22.70	1.40	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede biot.gn. og hbl.gn. band. tildels spr.gr. 1-3 mm. Impr. Py.	75°	0,02	0,09	0,15			2180-2320
22.70 - 25.00	2.30	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. Svak impr. Py.	80°						
25.00 - 26.00	1.00	Biot.gn.	Mørk,mlk.god impr. Py.	70-80°						
26.00 - 26.55	0.55	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-2 mm.							

21/11 1980
H. Pantdalali

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 43.980

Borehull: 711

1.

Dato :
Koordinater : X: 925.425 Y: 43.983
Retning : N
Helling/stigning: 63°
Høyde : - 67
Lengde : 29.50 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 1.00	1.00	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. vekslende m/dm-brede pegm.band. tildels hbl (skarn)førende Impr. Sl,Cp,Gn,Py,Po.	50°	0,14	0,24	1.03			
1.00 - 1.30	0.30	Pegm.	Impr. Cp,Py,Po		0.06	0,35	0,24			
1.30 - 2.75	1.45	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. impr. Sl, Cp,Py,Po.	55°	0,32	0,29	2,30			
2.75 - 2.95	0.20	Pegm.			0,05	0,06	0,15			
2.95 - 3.60	0.65	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. impr. Sl,Gn, Cp,Py.	55°	0,28	0,26	0,58			
3.60 - 15.40	11.80	"	Tildels kv.rik, spr. gr. 1-3 mm	50° 60°	0,21	0,07	0,05			360-460
15.40 - 16.70	1.30	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. svak impr. Py.	50°						
16.70 - 20.50	3.80	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spr.gr.1-3mm	50-60°	0,02	0,01	0,04			1850-2050
20.50 - 21.80	1.30	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk.tildels kv.rik Impr. Sl,Cp,Py,Po.	60°	0,01	0,14	0,52			
21.80 - 22.80	1.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede biot.gn.band. svak impr. Py.	60°	0,01	0,05	0,17			
22.80 - 23.70	0,90	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. tildels kv.rik,spor hbl. Impr. Py	60°	0,01	0,11	0,06			
23.70 - 24.60	0,90	"	Malm		2,10	0,46	12,16			
24.60 - 25.20	0,60	"	Impr. Py, spor hbl.gr.	60°	0,04	0,06	0,32			
25.20 - 26.30	1.10	hbl.gn.	Mørk,mlk.gr.førende 1-5 mm	60°						
26.30 - 27.00	0.70	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	60°						

RANA MEKS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 711

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
27.00 - 29.50	2.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm	60°						

20/11 1980
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.160

Borehull: 710

Dato :
Koordinater : X: 925.392 Y: 44.160
Retning : S
Helling/stupning : - 50°
Høyde : - 71 m
Lengde : - 25.5 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 3.05	3.05	2 gl.gn.bd.	rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede band 2 gl.gn. alm. tildels hbl.førende impr. Sl,Gn,Cp,Py	50° 30°	1.05	0.56	3.68			0.0 - 1.50
					2.60	0.53	8.50			1.50 - 3.05
3.05 - 3.30	0.25	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. spor hbl. impr. Sl,Gn,Cp,Py	50°	0.14	0.53	1.26			
3.30 - 3.80	0.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl. førende. impr. Sl,Gn,Cp,Py	45°	0.05	0.77	0.16			
3.80 - 4.15	0.35	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. spor hbl. impr. Sl,Cp,Py	50°	0.10	0.59	1.52			
4.15 - 5.00	0.85	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.kv.rik.tildels hbl.førende. striper, impr. Sl,Gn,Cp,Py	50°	0.42	0.23	0.66			
5.00 - 7.30	2.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.hbl.førende, impr. Sl,Gn,Cp,Py	50°	1.07	0.75	5.46			5.00 - 6.00
					0.34	0.41	3.10			6.00 - 7.30
7.30 - 10.00	2.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik. tildels hbl.førende. striper, impr. Sl,Gn,Cp,Py	50°	0.41	0.21	1.30			7.30 - 8.60
					0.60	0.31	2.04			8.60 - 10.00
10.00 - 10.90	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende impr. Sl,Gn,Cp,Py	50°	1.00	0.34	6.10			
10.90 - 13.30	3.40	"	Rel.mørk,mlk. tildels hbl.-førende, spr. gr. 1-2 mm. svak impr. Py.	40° 50°	0.05	0.02	0.17			10.90 - 11.40
13.30 - 16.80	3.50	hbl.gn.	Mørk,mlk.spr. gr. 1-3 mm. god impr. Py	50°	0.05	0.08	0.10			13.40 - 13.80
16.80 - 17.30	0.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende impr. Sl,Gn,Cp,Py.	50°	0.15	0.64	0.90			

ANVA BLADS TYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 710

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
				0,04	0.05	0,12			17,30 - 18,30
17.30 - 19.70	2.40	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm. god impr. Py.	50°	0.03	0,03	0,05			18,30 - 19,70
19.70 - 20.90	1.20	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. hbl.førende, Striper impr. Sl.Gn,Cp,Py,Po	50°	1.55	0,33	6.55			
20.90 - 26.50	5.60	" Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede band pegm. og hbl. gn. spr. gr. 1-3 mm. fortrinnsvis i hbl.gn. Svak impr. Py.	50°	0,06	0,03	0,21			

17/11 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.160

Borehull: 709

Dato :
Koordinator : X: 925.392 Y: 44.160
Retning : S
Helling/stigning: - 70°
Høyde : + 71,0 m
Lengde : 20,5 m

Dybde	L	Bergart		Ø	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 4.30	4.30	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ 1-2 dm.brede biot.gn.band. tildels hbl.førende, str. Impr. Sl,Gn,Cp,Py	50° 80°	1,70	0,20	4,38			0,00-1,50
					0,64	0,31	5,07			1,50-3,00
					0,61	0,25	3,37			3,00-4,30
4.30 - 6.20	1.90	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.kv.rik,spor gr. svak impr. Py	60°	0,14	0,05	0,14			4,30-5,30
					0,02	0,02	0,06			5,30-6,20
6.20 - 9.10	2.90	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk.hbl.førende, impr. Sl,Gn,Cp,Py	50°	1,06	0,12	4,88			6,20-7,90
					0,62	0,34	5,00			7,90-9,10
9.10 - 11.20	2.10	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. Hbl.førende impr. Sl,Gn,Cp,Py	50°	0,41	0,29	1,10			9,10-10,10
					0,35	0,37	1,41			10,10-11,20
11.20 - 13.10	1.90	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende, vekslende m/dm-brede biot.gn. band. Impr. Sl,Gn,Cp,Py	50°	0,26	0,59	3,13			11,20-12,20
					0,23	0,47	1,90			12,20-13,10
13.10 - 14.40	1.30	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende, spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	50°	0,05	0,17	0,55			
14.40 - 16.10	1.70	"	Rel.mørk,mlk. hbl.førende, striper, impr. Sl,Gn,Cp,Py	50°	2,00	1,14	10,50			
16.10 - 20.50	4.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.kv.rik, spor gr. svak impr. Py	50°	0,06	0,04	0,24			16,10-18,10

17/11 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.122

Borehull: 708

Dato :
Koordinater : X: 925.434 Y: 44.122
Retning : N
Helling/stigning: + 62°
Høyde : - 79.5
Lengde : 44.7 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 3.40	3.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/dm-brede biot.rike band. impr. Py. Fra 0,70-0,80 spor Sl.	50° 70°						
3.40 - 5.80	2.40	Biot.gn.	Mørk,mlk.grovk. vekslende m/ dm-brede 2 gl.gn.alm.band. impr. Py,Po.	60°						
5.80 - 25.60	24.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik. spr. gr. 1-3 mm. 60°							
25.60 - 28.20	2.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.-grovk. veksl. m/1-2 dm-brede biot.gn. band fortrinnsvis m/impr. Py,Po, Ved 26.70, 27.20, 28,20 striper på ca. 1 cm m/sl.							
28.20 - 44.70	16.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik veksl. m/1-3 dm brede biot.rikere parti. spr. gr. 1-3 mm.	50° 60°						

20/11 1980

H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.122

Borehull: 707

Dato : okt-80
Koordinater : X: 925.434,5 Y: 44.122
Retning : Opp
~~Helling~~/stigning: 75°
Høyde : - 79
Lengde : 40.00 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.60	0.60	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk, impr. Py. Spor Sl	80°	0,08	0,14	0.23			
0.60 - 1.70	1.10	Biot.gn.	Mørk, grovk.-mlk., tildels m/cm-brede kv.band, impr. Py,Po, svak impr. Sl,Cp	80° 60°	0,03	0.10	0,19			
1.70 - 2.00	0.30	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. kv.rik, svak impr. Py, spor Sl,Cn.		0.03	0.06	0.07			
2.00 - 5.00	3.00	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. veksl. m/ kv.rik parti. spor skarn gr. vekslende impr. Sl, Cp,Gn,Py,Po	60° 80°	0.18	0.30	1.18			2.00-3.50
					0.02	0,13	0.20			3,50-5,00
5.00 - 5.30	0.30	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor gr. svak impr. Py		0,16	0.26	0.02			
5.30 - 5.60	0.30	Biot.gn.	Mørk,grovk.-mlk. svak impr. Py	70°	0.01	0.10	0,12			
5.60 - 11.00	5.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. tildels kv. rik. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	60° 70°						
					0,04	0.04	0.07			10.00-11.00
11.00 - 12.35	1.35	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. tildels kv. rik, spr. dm-brede band m/god impr. Sl,Gn,Cp,Py Skarn.	60° 70°	0.60 ~~0.60~~	0,13	1.43			
12.30 - 13.05	0.75	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. svak impr. Py. Spor gr.	70°	0.04	0.02	0.16			
13.05 - 14.75	1.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys.mlk. kv.rik, spor gr. svak impr. Py.	70°						
14.75 - 17.10	2.35	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk.mlk. tildels kv. rik. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	70° 80°						

FANA BLADS OVERSIKT

Lokalitet:

Borehull: 707

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
17.10 - 20.00	2.90	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. mass. kv.rik spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	70° 80°						
20.00 - 21.10	1.10	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py	70° 80°						
21.10 - 21.75	0.65	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. veksl. m/ dm.brede pegm.band. impr. Py,Po. Ved 21.70 spor Sl	75°						
21.75 - 22.10	0.35	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. svak impr. Py.	70°						
22.10 - 23.35	1.25	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. spr. gr. 1-2 mm. Svak impr. Py.	70°						
23.35 - 25.60	2.25	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. kv.rik, spor gr. svak impr. Py. Fra 23.40 - 23.45 skarn m/ god impr. Sl,Gn,Cp,Py	70° 75°						
25.60 - 26.10	0.50	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. Spr. gr. 0,5-3 mm. Fra 26.00-26.10 impr. Cp,Po,Py.	70°	0.04	0.05	0.11			
26.10 - 26.40	0.30	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.svak impr. Py		0.04	0.04	0.14			
26.40 - 26.60	0.20	" "	Impr. Sl,Gn,Cp,Py		0.96	0,20	3.30			
26.60 - 27.35	0.75	" "	Svak impr. Py, spor gr.	70°	0.05	0.05	0.27			
27.35 - 27.80	0.45	" "	Striper impr. Sl,Gn,Cp,Py		0.53	0.16	2.35			
27.80 - 28.10	0.30	" "	Svak impr. Py.							

FANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 707

3.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
28.10 - 29.50	1.40	2 gl.gn.alm.	Striper impr. Sl,Gn,Cp,Py	60°70°	1,18	0.35	2.87			
29.50 - 29.95	0.45	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.svak impr. Py		0.12	0.08	0.25			
29.95 - 31.00	1.05	" "	Impr. Sl,Gn,Cp,Py	65°	0.32	0,18	0.88			
31.00 - 31.20	0.20	Pegm.								
31.20 - 36.40	5.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/1-3 dm brede band 2 gl.gn bd. tildels kv.rik. spor gr. svak impr. Py.	60° 70°	0.09	0.07	0,24			35,40-36,40
36.40 - 37.25	0.85	" "	Striper impr. Sl,Gn,Cp,Py	60°70°	0.66	0.23	1.62			
37.25 - 40.00	2.75	" "	Vekslende m/pegm.striper svak impr. Py. Ved 39.20 spor Sl.	60°	0.03	0.01	0.07			3225-38,25

5/11 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.122

Borehull: 706

Dato : okt-80
Koordinater : X: 925.434 Y: 44.122
Retning : opp
Helling/stigning: 90°
Høyde : -79
Lengde : 38,30

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.75	1.75	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. vekslende m/dm-brede band 2 gl.gn.bd. Spor hbl. impr. Py,Po	70° 80°						
1.75 - 2.45	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. impr. Py. Fra 1.25-1.90 impr. Sl,Gn.	75°	0.11	0.11	0.77			
2.45 - 3.00	0.55	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. vekslende m/dm-bred pegm. Impr. Sl,Gn Cp,Py.	75°	0.56	0.30	2.66			
3.00 - 4.10	1.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk.mlk. tildels m/ cm-brede band biot.gn. Spor gr. svak impr. Py	75°	0.02	0.01	0.12			
4.10 - 4.85	0.75	Biot.gn.(sk).	Mørk,mlk-grovk. vekslende m/cm-dm-brede pegm.band. Impr. Sl,Cp,Py,Po.	70° 80°	0.02	0.24	0.41			
4.85 - 15.60	10.75	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede band 2 gl.gn. alm. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py. Fra 10.10 - 10.15 impr. Sl.	75°	0.21	0.15	0.10			
15.60 - 20.30	4.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. tildels m/dm-brede band pegm. spor gr.	80°						
20.30 - 23.10	2.80	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. impr. Py	75°						
23.10 - 24.50	1.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik. svak Impr. Py.	75°	0.02	0.01	0.13			24,50-26,50
24.50 - 25.40	0.90	" "	Svak impr. Sl, Gn, Cp, Py	75°	0.34	0.20	1.13			
25.40 - 35.00	9.60	" "	Rel.lys,mlk. kv.rik, spor gr. svak impr. Py	70° 80°	0.06	0.07	0.38			26.50-26.50

FANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 706

2.

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
35.00 - 38.30	3.30	2 gl.gn.od. Rel.mørk,mlk. tildels gr.førende. 1-3 mm Impr. Py	70° 80°						

7.11. 1980
Holger Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.900

Borehull: 705

Dato : Okt. 1980
Koordinater : X: 925.401,5
Retning : S
Helling/stigning: + - 0°
Høyde : - 10,6
Lengde : 5,50

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Ag g/t	Prøve m
0.00 - 2.80	2.80	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.	0° 5°						
2.80 - 3.50	0.70	Skarn	Mørk, Sl,Cp,Gn,Py (3,10-3,50 halve kjernen malm skarn, andre halvp. 2 gl.gn.)	0° 3° 0°	1.70	0,85	6,59		29.6	
3.50 - 5.50	2.00	2 gl.gn.	rel.lys,mlk.	2° 5°						

12/10 1980
Stellan Burman

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.900

Borehull: 704

Dato : Okt. 1980
Koordinater : X: 925.401,5 Y. 44.900
Retning : S
Helling/stigning : - 45°
Høyde : - 107,5
Lengde : 5,50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.30	5.30	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spredte gr. 1-3 mm.	45° 50°						

11/10 1980
Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.900

Borehull: 703

Dato : Okt. 1980
Koordinater : X: 925.417 Y: 44.900
Retning : N
Helling/stigning: - 45°
Høyde : - 107,5
Lengde : 5.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.30	5.30	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spredte gr. 1-3 mm.	50° 60°						

11/10 1980
Stellan Burman

PANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.900

Borehull: 702

Dato : Okt. -1980
Koordinater : X: 925.417 Y:44.900
Retning : N
Helling/stigning: + - 0°
Høyde : - 10,6
Lengde : 5.30

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.30	5.30	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. Spredte gr. 1-2 mm. spor Py	0° 5° 0°						
		11/10 1980 Stellan Burman							

Lokalitet: Profil 44.900

Borehull: 701

Dato : Okt. 1980
Koordinater : X: 925.413,6 Y: 44.900
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 107,5
Lengde : 2.20 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.20	2.20	2 gl.gn.bd.	Rel, lys,mlk. kv.rik Spredte gr. 1-3 mm.	80° 90°						

11/10 1980
Stellan Burman

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.900

Borehull: 700

Dato : Okt. 1980
Koordinater : X: 925.417 Y: 44.900
Retning : N
Helling/stigning: + 40°
Høyde : - 104,0
Lengde : 13,30 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	Ag g/t	Prøve m
0.00 - 0.90	0.90	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. m/skarn Sl,Cp,Gn,Py		1.03	0.23	4.41		17,3	
0.90 - 2.85	1.95	Skarn	Mørk,rik malm Sl,Cp,Gn,Py		3.50	0.33	12,56		44.8	
2.85 - 8.85	6.00	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk. enkelte biot.skikt Svak imp. Py. spor Hbl. m/gr.	45 50°						
8.85 - 13.30	4.45	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk. spredte gr. 1-2 mm.	45°						

11/10 1980
Stellan Burman

KAVA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.900

Borehull: 699

Dato : Okt. 80
Koordinater : X: 925.411,5 Y:44.900
Retning : S
Helling/stigning: + 45°
Høyde : - 104
Lengde : 11,50 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	2 gl.gn.bd.	Rel.lys, mlk. enkelte biot.band. spor hbl.	50°						
2.50 - 11.50	9.00	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enstaka hbl. band med gr. 1-3 mm	45° 50°						

11/10 1980
Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.160

Borehull: 697

1.

Dato :
Koordinater : X: 925.434 Y: 44.160
Retning : Opp
Helling/stigning: 90°
Høyde : - 79,5
Lengde : 35.55

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.05	1.05	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. impr. Sl,Cp, Py,Po	80° 50°	0.08	0.17	0.70			
1.05 - 1.95	0.90	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.kv.rik. svak impr. Py. Spr. gr. 1-2 mm.	80°						
			Fra 1,25-1,35 impr.Sl,Cp,Py,Po		0,02	0,04	0,06			
1.95 - 3.40	1.45	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. vekslende m/ dm/brede band 2 gl.gn.alm. svak impr. Sl,Cp,Py,Po	60° 70°	0,07	0,08	1,15			
3.40 - 4.10	0.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.kv.rik,enkelte band m/skarn og impr. Sl,Gn, Cp,Py,Po	70°	0.70	0.31	2.31			
4.10 - 6.75	2.65	Biot.gn.	Mørk,grovk.-mlk. vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl.gn. alm. spor hbl.	80° 70°	0.29	0.18	0.55			4.10-5.50
			Impr. Sl,Cp,Py,Po		0,02	0,11	0,09			5.50-6.75
6.75 - 7.90	1.15	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/dm. brede band biot.gn. spr. gr. 1-2 mm.	70° 80°	0,02	0,02	0,04			
7.90 - 9.25	1.35	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. vekslende m/ cm-brede band 2 gl.gn.alm. spor hbl. impr. Sl,Cp,Py,Po.	70° 80°	0,09	0,13	0,78			
9.25 - 18.10	8.85	2 gl.gn.alm.	rel.lys,mlk. Spr. gr. 1-2 mm.	80°	0,13 0,10	0,06 0,06	0,40 0,37			9,25-10,25 17,10-18,10
18.10 - 19.10	1.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk.svakt undulerende Impr. Sl,Gn,Cp,Py,Po.	80°	0,22	0,10	0,56			
19.10 - 19.75	0.65	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. m/lpor impr.Sl Gn,Cp,Py	80°	0,72	0,17	2,06			

LANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 697.

2

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
19.75 - 24.90	5.15	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.vekslende m/ dm-brede biot.rike parti fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm.	70° 80°	0,11	0,06	0,23			20.75-200
24.90 - 26.40	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor gr. impr. Py	70°						
26.40 - 29.85	3.45	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. tildels kv. rik. svak impr. Py. ved 9.25 spor S1	70° 80°						
29.85 - 35.55	5.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm.brede pegm. og bbl.gn.band. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	70° 80°						

20.11. 1980
H. Pantdalsli

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil: 44.265

Borehull: 696

Dato :
Koordinater : X: 925.428 Y: 44.265
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde :
Lengde : 8,55 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 2.95	2.95	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ dm-bred pegm. og 2 gl.gn. bd-band. svak,impr. Py, spor gr.		0.05	0.60	0.20			195-295
2.95 - 3.60	0.65	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. impr. Sl, Cp,Py		0.63	0.16	3.25			
3.60 - 3.85	0.25	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. impr. Sl, Gn,Cp,Py.		0.49	0.87	9.20			
3.85 - 5.80	1.95	"	lbl.førende, spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py		0.04	0.06	0.21			385-480
5.80 - 7.20	1.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels m/ lbl. spr. gr. 1-3 mm.							
7.20 - 8.55	1.35	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik. Svak impr. Py.							

18/11 1980
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.260

Borehull: 695

Dato :
Koordinater : X: 925.435 Y: 44.265
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde :
Lengde : 8.55 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 2.10	2.10	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik. vekslende m/dm-brede biot. rike band. spor gr. Fra 0.70 - 0.85 spor S1. Svak impr. Py.	70°						
2.10 - 3.75	1.65	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grövk. impr. Py Fra 2.50 - 2.52 spor S1	65°						
3.75 - 4.10	0.35	Pegm.								
4.10 - 5.40	1.30	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. impr. Py Ved 4.25, 4.60, 5.35 spor S1.	65°						
5.40 - 8.55	3.15	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. svak impr. Py.	60° 70°						

18.11. 80
H. Pantdalsli

HANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 694

Dato : sept-80
Koordinater : X: 925.475 Y: 44 770
Retning : Opp
~~Helling~~/stigning: + 90°
Høyde : - 95.0
Lengde : 40.0 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.40	0.40	2 gl.gn. m/skarn	Rel.lys,mlk.-grov Sl,Cp,Gn,Py.		1.80	0.33	3.75			
0.40 - 15.00	14.60	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk. litt vekslende m/dm-tykke biot.rikere band även enstaka opp til 5 cm. tykke hbl.band gr. i hbl.band.	80° 70° 80°						
15.00 - 17.80	2.80	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. spredte gr. 1-3 mm. impr. Py	80° 90°						
17.80 - 40.00	22.20	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende tildels rik 1-3 mm. Impr. Py	80° 90°						

8/10 1980

Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: [redacted]693

Dato :
Koordinater : X: 925.475 Y: 44.770 Kalla med Åge om mineralisering?
Retning : Lodd
Helling/stigning: −90°
Høyde : −10
Lengde : 17.50

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.80	0.80	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-2 mm.	90°						
0.80 - 1.00	0.20	kv.								
1.00 - 1.90	0.90	2 gl.gn.bd.	Se ovenf.	90°						
1.90 - 2.10	0.20	Skarn	Sl,Gn,Cp,Py							
2.10 - 2.90	0.80	Pegm.								
2.90 - 4.00	1.10	2 gl.gn.	Lys,mlk. enstaka pegm. band. spredte gr. 1-3 m ved 3.30 Sl. spor Py	80°						
4.00 - 4.20	0.20	skarn	Sl.Cp,Gn,Py							
4.20 - 8.70	4.50	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3mm Svak impr. Py. Ved 8.55 Sl	80° 90°						
8.70 - 9.50	0.80	2 gl.gn.b.b.	Rel.mørk,mlk. hvl.førende klyser. impr. Sl,Cp,Gn,Py	80°	0.46	0,19	1.42			
9.50 - 13.20		Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm Enstaka dm-tykke 2 gl.gn. band.	80° 70°						
13.20 - 13.80	0.60	Pegm.								
13.80 - 17.50		Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-2mm							

8/10 1980
Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 692

Dato : Sept. 80
Koordinater : X: 925.48~~2~~4 Y: 44.~~770~~ 768,6
Retning : N
Helling/stigning: + 60°
Høyde : - ~~95.5~~ -97,4
Lengde : 47.80

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 6.70	6.70	2 gl.gn.bd.	Rel.lys, mlk. kv.rik enstaka cm-tykke kv. Pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm.	60°						
6.70 - 7.90	1.20	2 gl.gn.	Lys,mlk. rel.musk.rik. Impr. Py	60°						
7.90 - 15.90	8.00	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. rel.kv.rik enstaka opp til 5 cm. tykke Pegm.band. og biot.band Spredte gr. 1-3 mm. Spor Py i biot.bandene.	60° 50°	0,05	0,02	0,12			14,90-15,90
15.90 - 17.40	1.50	2 gl.gn.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ dm-tykke biot.rike band. (Skarnførende m/lys Sl) Py,Cp,Gn.	50°	0,21	0,11	0,79			
17.40 - 20.10	2.70	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. Spr. gr. 1-3mm	50°	0,01	0,02	0,07			17,40-18,90
20.10 - 20.70	0.60	Biot.gn.	Mørk,mlk. svak impr. Py.	40°						
20.70 - 22.80	2.10	2 gl.gn.	Lys,mlk. kv.rik bandet med opp til 5 cm. tykke biot.hbl.band. Foldet.	50°	0,01	0,01	0,04			21,80-22,80
22.80 - 23.30	0.50	Biot.gn.	Mørk,mlk. spor hbl. impr. Sl,Cp,Gn,Py	60°	0,30	0,12	0,66			
23.30 - 23.70	0.40	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. Spr. gr. 1-3mm	60°	0,03	0,02	0,11			
23.70 - 25.05	1.35	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. Biot. som skikt impr. Sl,Cp,Gn,Py. Foldet (Lys Sl).	60°	0,31	0,17	1,46			
25.05 - 25.95	0.90	Pegm.	Spor Gn.		0,03	0,05	0,13			

KÅNA BLADS TYKKELSE

Lokalitet:

Borehull: 692

2.

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
25.95 - 27.50	1.65	Biot.gn.	Mørk,mlk. bandet m/2 gl.gn. Pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. Sl,Cp,Gn,Py	70°	0,19	0,16	0,68			
27.50 - 29.05	1.55	Biot.gn.	Mørk,mlk.spor hbl. foldet impr. Py,Sl,Cp,Gn.	50° 60°	0,55	0,17	2,53			
29.05 - 29.35	0.30	Pegm.								
29.35 - 30.10	0.75	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. Sl,Cp,Gn,Py	55°	0,25	0.11	1.48			
30.10 - 31.80	1.70	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-4 mm rel.mass.		0.03	0.02	0,14			
31.80 - 33.05	1.25	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grov. vekslende m/ cm-tykke pegm.band. Striper Sl,Cp,Gn,Py spor Po	60°	0.54	0,33	3,13			
33.05 - 34.30	1.25	"	Mørk,mlk. spor hbl. impr. Sl,Cp,Gn,Po,Py.	50°	0.21	0.30	3.11			
34.30 - 37.80	3.50	Biot.gn.	Mørk, mlk. litt vekslende m/cm-tykke 2 gl.gn. pegm. band. Sl? Imp. Py, Po		0.09	0,12	0,19			34.30-35,30
				50°	0,11	0,11	0,82			35,30-36,30
					0,13	0,06	0,34			36,30-37,80
37.80 - 47.80	10.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. enstaka hbl. band m gr. 1-3 mm.	60° 70°						

25/9 1980
Stellan Burman

PANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 691

Dato : Sept. -80
Koordinater : X: 925.482,5 Y: 44.~~770~~ 768,6
Retning : N
Helling/stigning: + 40°
Høyde : - ~~25~~ - 97,6
Lengde : 56,50

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.20	0.20	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. kv.rik. spr. gr. 1-3 mm.							
0.20 - 0.55	0.35	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førande 1-3mm	60°						
0.55 - 5.95	5.40	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. vekslende m. dm.tykke partier biot.gn. Biot.hbl.gn. gr.førende	60° 50°						
5.95 - 6.20										
6.20 - 23.85				60° 40°						
23.85 - 24.30	0.45	2 gl.gn.bd.								
24.30 - 24.70	0.40	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk. kv.rik	45°	0.23	0.07	0.59			
24.70 - 25.40	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. litt skarn. Impr. Py,Sl,Cp,Gn.	45°	0,80	0,16	1.73			
25.40 - 26.15	0.75	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. spor hbl.skarn Impr. Sl,Cp,Gn,Py	40°	1.10	0.25	3.18			
26.15 - 27.10	0.95	" "	Rel.lys,mlk. spor hbl. Impr. Py spor Sl !	40° 45°	0.62	0.25	2,10			
27.10 - 28.70	1.60	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk. rel.kv.rik. enstaka gr. 1-2 mm. spor Py	40°	0,04	0,01	0,08			
28.70 - 28.80	0.10	Biot.gn.	Mørk, mlk. impr. Py, Sl	35-40°	0.24	0.08	0.60			
28.80 - 30.10		2 gl.gn.bp.	Lys,mlk.kv.rik,enstaka gr. 1-3 mm.	40°						

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 691

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
30.10 - 30.90	0.80	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spredte gr. 1-3 mm.	45°						
30.90 - 32.60	1.70	Biot.gn. Mørk,mlk. tildels hbl.-førende, spr. gr. 1-3 mm	40°						
32.60 - 37.40	4.80	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. Litt veksl. m/ dm-brede Biot.gn. og Hbl.-førende band. spr. gr. 1-3 mm.	40° 45°						
37,40 - 37.75	0.35	Biot.gn. mlk. -tykke kv. er str. Sl,Gn,Py,	45°						
37.75 - 37.95	0.20	Kv.							
37.95 - 39.40	1.45	Biot.hbl. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm	45°						
39.40 - 56.50	17.10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. tildels kv-rik. Litt veksl. med enkelte biot.rikere partier. Enstaka opp til dm.tykke pegmband. Spr. gr. 1-3 mm. Tildels massiv.	40° 45°						

9/9 1980
Stellan Burman

FANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 690

Dato : Sept. -80
Koordinater : X: 925.48~~1~~,3 Y: 44.~~770~~ 768,6
Retning : N
Helling/stigning: + 70°
Høyde : - ~~95~~ - 97,2
Lengde : 40,0 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 4.60	4.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enstaka cm-tykke hbl.gn.band. Spor Py	60° 70°	0.03	0.02	0.10			2.60-4.60
4.60 - 6.60	2.00	Biot.gn.	Mørk,mlk. enstaka opp til 5 cm tykke hbl.gn. m/skarn-band, som fører Sl Gr.førende impr. Py Foldet	70° 60°	0.14	0.04	0.40			
6.60 - 14.40	7.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. litt veksl.med opp til dm.tykke biot.rikere partier, som stedvis fører hbl. Spr. gr. fortrinnsvis i de biot.hbl.førende part. Svak impr. Py. 13.45-13.50 Sl	60° 70°	0.01	0.01	0.06			6.60-7.60
					0.14	0.09	0.36			12.60-14.40
14.40 - 15.35	0.95	Biot.gn.	Mørk,mlk. tildels hbl.før. enstaka striper Sl,Cp,Gn,Py	70°	0.19	0.09	0.69			
15.35 - 16.25	0.90	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. kv.rik	70°						
16.25 - 16.70	0.45	Biot.sk.	Mørk,grovk.	70°						
16.70 - 18.05	1.35	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spr. gr.1-3 mm							
18.05 - 19.80	1.75	Biot.gn.	Mørk,mlk. hbl.førende impr. Py,Po,Sl?	70°	0.08	0.07	0.32			
19.80 - 20.15	0.35	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor Py	65°	0.13	0.06	0.54			
20.15 - 21.90	1.75	Biot.gn.	Mørk,mlk. skarn-førende litt ondulert. Impr. Sl,Cp, Gn,Py.		0.49	0.19	2.08			
21.90 - 22.20	0.30	Pegm.								
22.20 - 22.80	0.60	Biot.gn.	Mørk,mlk. hbl.førende filmtynne skikt Sl,Cp,Py,Gn	70°	0.39	0.16	1.32			

Lokalitet:

Borehull: 690

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
					0.02	0.02	0.06			22.80 - 23.80
22.80 - 25.30	2.50	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm impr. Py. Rel. mass.							
25.30 - 25.80	0.50	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-3 mm. impr. Py	70°	0.02	0.04	0.06			
25.80 - 26.25	0.45	Biot.gn.	Mørk,mlk. impr. Sl,Cp,Gn.Py	70°	0.46	0.21	1.94			
26.25 - 26.40	0.15	Pegm.								
26.40 - 27.30	0.90	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-tykke biot.gn. Pegm.band impr. spor Sl.	70°	0.11	0.10	0.42			
27.30 - 30.65	3.35	Hbl.gn.	Mørk,mlk. tildels mass. gr.førende 1-3 mm. Impr. Py	70°						
30.65 - 34.40	3.75	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. impr. Py	60-70°						
34.40 - 36.95	2.55	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk. vekslende mellom Hbl.gn. og biot.gn. gr.førende i hbl.gn. svak impr. Py	70°						
36.95 - 38.05	1.10	Biot.sk.	Mørk,grovk. spr. gr. 1-2 mm impr. Py	70°						
39.75 - 39.85	0.10	Kv.		80°						
39.85 - 40.00	0.15	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. kv.rik. Spr. gr. 1-3 mm.	70°						

9/9 1980
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 689

Dato : Sept. -80
Koordinater : X: 925.481,5 Y: 44.~~770~~ 768,6
Retning : N
Helling/stigning: + 50°
Høyde : - ~~98~~ 97,5
Lengde : 53.85

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 27.15	27.15	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. skiktad m. biot. samt enstaka dm.tykke partier biot.gn. gr.førende 1-3 mm, fortrinnsvis i de biot.rikere partier. Även enstaka dm.tykke pegm. band. (Fra 0.00-5.60 mlk-grovt-mlk).	60° 65°	0.04	0,01	0,12			24,15-27,15
27.15 - 29.50	2.35	2 gl.gn.b.d.	Rel. lys mlk. enkelte biot. rikere band med Sl,Cp,Gn,Py	60°	0.26	0.10	0,91			27,15-28,15
					0.30	0.07	0.57			28,15-29,50
29.50 - 30.30	0.80	2 gl.gn.m/skarn	Rel.lys,mlk. god impr. Sl,Cp,Gn,Py (impregnasjonstype Lys Sl.)	60°	1,83	0,13	4,35			
30.30 - 32.50	2.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. skiktet og slirig m/biot. spr. str. Sl,Cp,Gn,Py	50°	0,29	0.07	0,57			30,30-31,30
					0,60	0,24	0,71			31,30-32,50
32.50 - 34.85	2.35	Biot.gn.	Mørk,mlk. skiktet, slirig spor hbl. god stripet malm Sl,Cp,Gn,Py. Lys Sl	50° 60°	1.11	0,51	2,00			32,50-33,50
			(Kan delvis oppfattes som deformert, med Sl som fyllinger).		1,47	0,38	5,47			33,50-34,85
34.85 - 37.20	2.35	Malm skarn	m/enstaka 2 gl.gn.band god impr. Sl,Cp,Gn,Py		1.21	0,45	3,95			34,85-35,85
					2,22	0,42	11,08			35,85-37,20
37.20 - 37.65	0.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. med biot-rikere band der Sl,Cp,Gn,Py opptrer.	45°	0,57	0,17	2,08			
37.65 - 53.85	15.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enstaka opp til 5 cm tykke pegm.band. spor Py Spr. gr. 1-3 mm.	45°	0,04	0,04	0.08			37,65-38,65

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 688

Dato :
Koordinater : X: 925.482 Y: 44.770
Retning : N
Helling/stigning: - 45° ?
Høyde : ~~-106~~ -101
Lengde : 26,40

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 9.80	9.80	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk. rel.kv.rik. Spredte gr. 1-2 mm. Ved 8,85 - 8.90 hbl.gn. Spor Py.	45° 70°						
9.80 - 12.30	2.50	Pegm.								
12.30 - 15.40	3.10	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enstaka opp til 5 cm tykke. Biot.hbl.gn.band. gr.førende	50						
15.40 - 16.00	0.60	Pegm.								
16.00 - 17.30	1.30	2 gl.gn.	Lys,mlk.tildels musk.rik m/filtet preg. Impr. Py	40 45	0.12	0,17	0,39			
17.30 - 18.00	0.70	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. litt skarn og hbl. Enkelte klyser og Str. Sl,Gn,Cp,Py.	45°	1.20	0,26	2,45			
18.00 - 26.40	8.40	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/str. Biot.hbl.gn. Gr.førende	50° 60°						

8/10 1980
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 687

Dato : Aug. -80
Koordinater : X:925.455 Y:44.770
Retning : Opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 95,5m
Lengde : 23,50

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 13.60	13.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. vekslende m. dm.tykke partier biot.gn. m.spor hbl. Spredte gr. 1-3 mm og spor Py fortrinnsvis i de biot-rike partier.	70° 80°						
13.60 - 14.10	0.50	Pegm.								
14.10 - 14.60	0.50	Hbl.biot.gn.	Mørk,grovk. Biot. og hbl. som flakig masse.							
14.60 - 23.50	8.90	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk. vekslende med partier hbl.gn. gr.fførende fortr.vis i hbl.rike part. 1-4 mm. enstaka cm-tykke biot.skikt.	80° 90°						

26.8. 1980

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.770

Borehull: 686

Dato : Aug. 1980
Koordinater : X: 925.445 Y: 44.770
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 100,0
Lengde : 20,0 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.90	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels m/ spor hbl.og gr. Svak impr. Py. Fra 0.50-0.65 spor Sl,Gn	80°						
0.90 - 1.80	0.90	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik. Fra 1.30-1.40 pegm. Spor gr.	75°						
1.80 - 2.80	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ dm-brede 2 gl.gn.alm.band. Spor gr. svak impr. Py.	75°						
2.80 - 3.10	0.30	Pegm.								
3.10 - 3.50	0.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor gr.							
3.50 - 4.00	0.50	Pegm.								
4.00 - 15.40	11.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels kv.rik vekslende m/1-3 dm-brede 2 gl.gn.alm. og pegm.band. Spr. gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py.	70°						
15.40 - 17.40	2.00	Biot.-hbl.gn.	Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm. god impr. Py.	70°						
17.40 - 20.00	2.60	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm.	75°						

26.8. 1980
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.770

Borehull: 685

Dato : Aug. 1980
Koordinater : X: 925.445 Y: 44.770
Retning : Opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 95,5
Lengde : 17,65 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 2.90	2.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede pegm.band Svak impr. Py	80°						
2.90 - 3.40	0.50	Pegm.								
3.40 - 4.70	1.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. svak impr.Py	80°						
4.70 - 5.00	0.30	Pegm.								
5.00 - 10.00	5.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. kv.rik, enkelte 1-2 dm brede pegm. band. Svak impr. Py	80°						
10.00 - 10.80	0.80	" "	Spr.gr. 1-3 mm.							
10.80 - 13.55	2.75	Biot.gn.	Mørk,mlk.gr.førende 1-3mm. tildels m/hbl. og skarn, svak impr. Py.	80°						
13.55 - 15.60	2.05	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm	80°						
15.60 - 17.65	2.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ 1-2 dm-brede hbl.gn.band. gr.førende 1-3 mm. Svak impr. Py.	80°						

26.8. 1980
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 684

Dato : Aug. 1980
Koordinater : X: 925.435 Y: 44.770
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 100,0
Lengde : 17.50

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.45	0.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. spør hbl. enstaka gr. 1-2 m.	60°						
0.45 - 0.65	0.20	hbl.gn.	mørk,mlk. gr.førende 1-2 mm. impr. Py	60°						
0.65 - 9.65	9.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enstaka hbl.gn. og kv.band opp til 5 cm tykke. Spr. gr. 1-2 mm. ved 7,70-7,75 Bl	60° 70°						
9.65 - 10.10	0.45	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende Impr. Py	70°						
10.10 - 10.90	0.80	Pegm.								
10.90 - 12.40	1.50	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. svak impr. Py	70° 80°						
12.40 - 12.85	0.45	Pegm.								
12.85 - 17.50	4.65	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. Impr. Py.	80°						

25/8 1980
Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.770

Borehull: 683

Dato : Aug. 80
Koordinater : X: 925.435 Y: 44.770
Retning : Opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 95.5
Lengde : 18.45 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 2.00	2.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik, impr. Py	80°						
2.00 - 10.80	8.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band hbl.gn fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py. ved 10.15 spor sl.	80° 90°						
10.80 - 14.10	3.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. enkelte gr. 1-5 mm. svak impr. Py. ved 11.30 spor Sl.	80°						
14.10 - 14.90	0.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spr. gr 0,5 - 2 mm. Impr. Py. Fra 14.35-14.45 impr. Sl.	80°						
14.90 - 15.20	0.30	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm. svak impr. Py.							
15.20 - 16.00	0.80	Biot.gn.	Mørk,mlk. tildels hbl-førende. spr. gr. 1-3 mm Impr. Py	80°						
16.00 - 18.45	2.45	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 0,5-3 mm. Svak impr. Py.	90°						

25/8 1980
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 682

Dato ~~Augxxx80~~ Aug. -80
Koordinater : X: 925.426 Y: 44.770
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 100,0
Lengde : 17.40 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.80	0.80	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk. kv.rik. spor gr. 1-2mm.	80°						
0.80 - 1.30	0.50	TAP								
1.30 - 5.90	4.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. kv.rik. Spr. gr. 1-2 mm. ved 1.30 - 1.32 Sl	90						
5.90 - 7.70	1.80	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm	80°						
7.70 - 10.85	3.15	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enkelte (som brede bånd) Biot.bånd. Spredt gr. 1-2 mm. fortrinnsvis i Hbl.Biot.bandene. Svak impr. Py. Ved 8.30-8.35 og 8.75-8.80 Sl.	80° 90°						
10.85 - 11.00	0.15	Pegm.								
11.00 - 11.25	0.25	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk. kv.rik impr. Py	90°						
11.25 - 11.35	0.10	Pegm.								
11.35 - 11.50	0.15	Biot.gn.	Mørk,mlk. m/skarn. Impr. Sl, Gn, Cp, Py.	80°						
11.50 - 11.70	0.20	Pegm.								
11.70 - 13.90	2.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. kv.rik. enstaka gr. 1-3 mm.Spor Py	80°						
13.90 - 15.30	1.40	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. gr.førende 1-3 mm. impr. Py	80°						
15.30 - 15.90	0.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. svak impr. Py	90°						
15.90 - 17.40	1.50	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm Svak impr. Py	80° 90°						

26/8 1980
Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.770

Borehull: 681

Dato : Aug. 80
Koordinater : X: 925.426 Y: 44.770
Retning : Opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 95,5
Lengde : 17,40

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. svak impr. Py	80°						
1.50 - 1.75	0.25	Skarn	Mørk,mlk-grovk. impr. Sl, Gn,Cp,Py							
1.75 - 8.50	6.75	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk.tildels m/striper og band pegm. hbl. spr. gr. 0,5-2 mm impr. Py, spor Po.	70° 80°						
8.50 - 12.60	4.10	Hbl.gn.	Mørk, mlk. gr.førende 1-3 mm. Svak impr. Py.	75°						
12.60 - 17.40	4.80	Hbl.g-biot.gn.	Mørk,mlk, gr.førende 1-3 mm. Tildels m/skarn striper, god impr. Py.	70°						

26/8 1980
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.770

Borehull: 680

Dato : Aug. 80
Koordinater : X: 925.418,5 Y: 44.770
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 95,5
Lengde : 17.00

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 5.50	5.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/1-3 dm brede band 2 gl. gn.alm. spr.gr. 1-3 mm, svak impr. Py	80°						
5.50 - 8.20	2.70	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm impr. Py	80°						
8.20 - 11.40	3.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ striper og dm.brede hbl.-førende band. spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py.	80°	0.01	0.02	0.14			8.40-11.40
11.40 - 12.30	0.90	" "	Enkelte pegm.band, ondulerende, svak impr. Sl,Cp, Gn,Py	70° 80°	0.26	0.21	1.01			
12.30 - 13.90	1.60	Hbl.-biot.gn.	Mørk,mlk. spr.gr. 1-2 mm, god impr. Py.	80°	0.01	0.02	0.08			12.30-13.30
13.90 - 17.00	3.10	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/små pegm.striper,gr.førende 1-3 mm.	80°						

26.8. 80
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 679

Dato : Aug. -80
Koordinater : X:925.418,5 Y:44.770
Retning : Opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 95,5
Lengde : 17.50

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.25	0.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. skarnførende spor hbl. impr. Sl,Cp,Gn,Py	90°	1.85	0.65	5.91			
0.25 - 1.60	1.35	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk. rel.kv.rik. svak impr. Py	70°	0.03	0.01	0.17			0.25 - 1.60
1.60 - 1.95	0.35	Pegm.								
1.95 - 3.90	1.95	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik. enstaka biot.rikere band opp til 5 cm. Spr. gr. 1-3 m. spor Py	70° 80°						
3.90 - 11.05	7.15	Hblg.ng.	Mørk,mlk. enstaka 2 gl.gn. band. opp til 5 cm. Gr.førende. 1-4 mm. Impr.Py	80°						
11.05 - 11.55	0.50	Hblg.biot.gn.	Mørk,mlk. spredte gr. 1-3m Impr. Py		0.00	0.01	0.05			
11.55 - 11.80	0.25	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grov. litt ondulerende. Impr. Cp,Sl,Py?	70° 80°	0.02	0.04	0.07			
11.80 - 17.50	5.70	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/hbl./amf.band opp til 10 cm. Impr. Py Spredte gr. 1-3 mm.	70° 80°	0.01	0.02	0.07			11.80 - 12.50

26.8. 1980
Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.770

Borehull: 678

Dato : Aug. 80
Koordinater : X: 925.411 Y: 44.770
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : -100
Lengde : 17.60 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. impr. Sl,Cp, Gn,Py		0.58	0,66	2,94			
0.50 - 1.70	1.20	"	Impr. Py		0,03	0,10	0.05			
1.70 - 2.50	0.80	"	Striper,impr. Sl,Cp,Gn,Py		1.30	0.38	6.90			
2.50 - 2.65	0.15	"	Lys,mlk. svak impr. Py		0.08	0.04	0,60			
2.65 - 3.05	0.40	Pegm.								
3.05 - 6.40	3.35	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede bånd hbl.gn. Spr. gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py.							
6.40 - 6.60	0.20	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm.							
6.60 - 8.00	1.40	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl-førende. Spr.gr. 1-3 mm. impr. Py							
8.00 - 8.70	0.70	Pegm.								
8.70 - 10.70	2.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. spr. gr. 1-3 mm. Impr.Py.	0.06	0.04	0.40				9.20-10.20
10.70 - 10.85	0.15	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. impr. Sl,Cp, Gn,Py	0.68	0,08	1.87				
10.85 - 11.40	0.55	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. tildels m/ pegm. spor hbl. impr. Py	0,05	0,15	0,40				
11.40 - 11.80	0.40	"	rel.mørk,mlk. striper, impr. Sl,Cp,Gn,Py	1.95	0,31	6.00				
11.80 - 14.30	2.50	"	Rel.mørk,mlk. hbl.førende spor gr. impr. Py.	0.02	0.02	0.10				12.80-13.80
14.30 - 17.60	3.30	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm.							

14/8 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil. 44.770

Borehull: 677

Dato : Aug. -80
Koordinater : X: 925.411 Y: 44.770
Retning : Opp
Helling/stigning: + 90°
Hoyde : - 95,5
Lengde : 17.20 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.80	0.80	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk. enstaka gr. 1-3mm Ved 0,05 - 0,10 Sl	80°						
0.80 - 1.05	0.25	Kvarts								
1.05 - 1.70	0.65	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spr.gr. 1-3mm Spor Py	80 90						
1.70 - 4.20	2.50	Hbl.gn.	Mørk,mlk.gr.førende 1-3mm Svak impr. Py	90°						
4.20 - 4.90	0.70	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm. impr. Py	90°						
4.90 - 6.00	1.10	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm. svak impr. Py	80°						
6.00 - 7.50	1.50	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spor hbl. Impr. Py	90°						
7.50 - 8.60	1.10	Biot.gn.	Mørk,mlk-grov. tildels skiktet m/mm-tykke biot-skikt. (även Biot som flager) Impr. Py, Po	80° 90°						
8.60 - 12.80	4.20	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. enkelte cm-tykke biot.band. Spr. gr. 1-2 mm. Svak impr. Py	80° 90°						
12.80 - 17.20	4.40	Hbl.gn.	Mørk,mlk. tildels gr.førende 1-3 mm. Svak impr. Py	80° 90°						

14.8. 1980
Stellan Burman

KALVA BLADS TRYCKERI

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 676

Dato : Aug. 1980
Koordinater : X: 925.493 Y: 44.770
Retning : S
Helling/stigning: + - 0° Horisontalt
Høyde : -98.5
Lengde : 20,0 m

Dybde	L.	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 2.30	2.30	Hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. gr.før. 1-3 mm. Stedvis undulerende Impr. Py	30° 0° 30°						
2.30 - 7.75	5.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enkelte cm-tykke hbl.førende band. samt ved 5.60-5.70 pegm. Spr. gr. 1-2 mm. Svak impr. Py	20°						
7.75 - 8.95	1.20	Pegm.								
8.95 - 10.60	1.65	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. hbl.førende svak impr. Py. Spr. gr. 1-2 mm.	20° 5°						
10.60 - 20.00	9.40	Hbl.gn.	Mørk,mlk. enkelte partier m/hbl.biot.gn. Spredte gr. 1-3 mm. Impr. Py.	5° 0°						

14/8 1980
Stellan Bormen

Lokalitet: 44.770

Borehull: 675

1.

Dato : Aug. 1980
Koordinater : X: 925.394 Y: 44.770
Retning : S
Helling/stigning: + 45
Høyde : - 95,5
Lengde : 19.90 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.60	0.60	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spr.gr.1-3 mm. Spor hbl. Impr. Py	50° 60°						
0.60 - 2.30	1.70	"	Rel.mørk,mlk. hbl.førende Spr. gr. 1-3 mm.Impr. Py	50° 60°						
2.30 - 2.60	0.30	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.rik 1-5 mm.							
2.60 - 4.20	1.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	60°						
4.20 - 5.40	1.20	"	Rel.mørk,mlk. spor hbl. Spr. gr. 0,5-2 mm. Svak impr. Py	50°						
5.40 - 8.60	3.20	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/dm-brede 2 gl.gn.bd. band. Spr. gr. 1-3 mm. Impr.Py	50° 60°						
8.60 - 9.10	0.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.spor hbl.gr.	55°						
9.10 - 12.20	3.10	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm. impr. Py. Fra 10.70-10.80 spor Sl,Cp,Cu,Py. Skarn							
12.20 - 13.05	0.85	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk.-grøvk. undulerende. spr. gr.1-3mm svak impr. Py	60°						
13.05 - 12.30	0.15	Pegm.								
13.20 - 13.90	0.70	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	60°						
13.90 - 16.30	2.40	Hbl.gn.	Mørk,mlk.spr.gr. tildels rik, 1-3 mm. Svak impr.Py	60°						
16.30 - 16.70	0.40	2 gl.gnb.d.	rel.mørk,mlk. tildels hbl-førende,spr.gr.0,5-2mm. Svak impr. Py.	60°						

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 675

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Hoyde :
Lengde :

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
16.70 - 17.00	0.30	Skarn							
17.00 - 18.10	1.10	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede band skarn, hbl.gn. spor gr. svak impr. Py.							
18.10 - 19.90	1.80	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. vekslende m/dm-brede band, pegm. 2 gl.gn. b.d. spor gr. Svak impr. Py.							

14.8. 1980
B. Pantdalsli

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.770

Borehull: 674

1.

Dato : Aug. -80
Koordinater : X: 925.394 Y: 44.770
Retning : S
Helling/stigning: - 45°
Høyde : - 100
Lengde : 20.00 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.40	0.40	Pegm.								
0.40 - 0.75	0.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. veksl. m/cm-brede kv.band. Impr. Py	60°						
0.75 - 1.00	0.25	Pegm.								
1.00 - 5.50	4.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. veksl. m/cm-dm-brede biot.rike parti fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm og hbl.førende Svak impr. Py. Fra 1,30-1,32 spor Sl,Gn.	45° 50°						
5.50 - 6.20	0.70	Hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. skarn-før.							
6.20 - 6.80	0.60	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. Spr. gr. 1-5 mm. Impr. Py.	50°						
6.80 - 8.40	1.60	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk. tildels biot.rik. spor hbl.spr.gr. ~0,5-2 mm Impr. Py	50°						
8.40 - 9.00	0.60	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.rik 1-3 mm.							
9.00 - 9.90	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende, Spr. gr. 0,5-2mm. Impr. Py	55°						
9.90 - 10.30	0.40	Pegm.								
10.30 - 14.85	4.55	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl. førende, m/enkelte biot.-rikere parti, cm-dm-brede. Enkelte spr. gr. 2-3 mm. Impr. Py	60° 70°						
14.85 - 15.70	0.85	Pegm.								
15.70 - 16.15	0.45	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. Spr. gr. 0,5-2 mm. Svak impr. Py	60° 70°						

KANA BLAUS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 674

2

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
16.15 - 16.50	0.35	Pegm.							
16.50 - 18.60	2.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-brede hbl. og pegm. band, spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	70°						
18.60 - 19.70	1.10	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-4mm	70°						
19.70 - 20.00	0.30	Pegm.							

14/8 1980
H. Pandalsli

Lokalitet: 44.770

Borehull: 673

Dato : Aug. -80
Koordinater : X: 925.398 Y: 44.770
Retning : Opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde : -95.5
Lengde : 14.30

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spor hbl. gr.-førende 1-3 mm. Svak impr. Py	80° 90°						
0.70 - 1.70	1.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk.gr.førende 1-3mm. Svak impr. Py Rel.mass.	90°						
1.70 - 1.80	0.10	Kvarts.								
1.80 - 2.55	0.75	Hbl.gn.	Se ovenf.	90°						
2.55 - 5.65	3.10	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enkelte cm-tykke musk.band. m/filtet preg. Svak impr. Py	80°						
5.65 - 14.30	8.65	Hbl.gn.	Mørk,mlk.litt vekslende m/dm.tykke hbl.førende 2 gl.gn.band. gr.førende forts.vis i hbl.fn. 1-3 mm. Svak impr. Py.	80° 90°						

14/8 1980
Stellan Burman

Lokalitet: 44.770

Borehull: 672

Dato : Aug. -80
Koordinater : X: 925.398 Y: 44.770
Retning : Lodd
Helling/stigning : - 90°
Høyde : — 100.0
Lengde : 15.75 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.30	0.30	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spr. gr.1-3mm Svak impr. Py.	70°						
0.30 - 3.80	3.50	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. veksl. m/cm-dm brede band 2 gl.gn.bd. tildels kv.rik.spor gr. svak impr. Py. Ved 0,80, 3.10 spor Sl.	80°						
3.80 - 4.30	0.50	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende, svak impr. Py	70° 80°						
4.30 - 5.80	1.50	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk.tildels m/ spor hbl. Svak impr. Py Spr. gr. 1-3 mm.	80°						
5.80 6.10	0.30	Pegm.								
6.10 - 9.80	3.70	Hbl.gn.	Mørk,mlk. veksl.m/dm brede band 2 gl.gn.bd. Spr. gr. 1-5 mm. svak impr. Py	80°						
9.80 - 14.40	4.60	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. veksl. m/dm brede band pegm. Spor gr. impr. Py	80°						
14.40 - 15.75	1.35	Hbl.gn.	Mørk,mlk. rel.mass. gr.rik 1-3 mm.							

14/8 -80
H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.770

Borehull: 671

Dato : Aug. -80
Koordinater : X: 925.405 Y: 44.770
Retning : Opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde :
Lengde : 17.70 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 1.40	1.40	2 gl.gn.bd.	rel.mørk. mlk. tildels hbl.førende, Spr.gr. 1-3mm Svak impr. Py	80° 90°						
1.40 - 3.40	2.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk.spr.gr. 1-5mm. Svak impr. Py	70° 80°						
3.40 - 11.20	7.80	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. tildels biot. og hbl.rik. Spr. gr. 1-3mm Impr. Py	70°						
11.20 - 17.70	6.50	Hbl.gn.	Mørk,mlk. tildels m/cm-dm-brede Pegm.band. Gr.før. 1-3 mm. Svak impr. Py.	55°						

14/8 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.770

Borehull: 670

Dato : Aug. 1980
Koordinater : X: 925.405 Y: 44.770
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : -100
Lengde : 17,65 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.30	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. kv.rik Svak impr. Py.	70°	0,07	0,19	0,32			
0.30 - 1.85	1.55	"	Rel.mørk,mlk. tildels m/svak impr. Cp,Po,Py.	70°	0,02	0,23	0,11			
1.85 - 2.30	0.45	"	Rel.mørk,mlk. str. impr. Sl,Cp,Gn,Po,Py	70°	0,81	1,37	10,72			
2.30 - 2.95	0.65	"	Rel.mørk,mlk. impr. Po,Py	70-80°	0,01	0,03	0,12			
2.95 - 5.50	2.55	Pegm.								
5.50 - 9.50	4.00	Biot.-hbl.gn.	Mørk,mlk. spr. gr.1-3 mm impr. Po,Py	70°						
9.50 - 10.55	1.05	Pegm.			0,02	0,02	0,04			
10.55 - 10.75	0.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. striper, impr. Sl,Cp,Gn,Py,Po.		1,53	1,10	6,08			
10.75 - 11.80	1.05	"	Rel.mørk,mlk. vekst. m/dm-brede band pegm. Spor hbl. og gr. Impr. Py,Po.	70°	0,01	0,04	0,08			
11.80 - 13.50	1.70	Biot.gn.	Mørk,mlk. hbl.førende, tildels spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	80°						
13.50 - 16.90	3.40	Biot.-hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-5mm Svak impr. Py	80°						
16.90 - 17.45	0.55	Pegm.								
17.45 - 17.65	0.20	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. tildels m/skarn spr. gr. 1-3 mm.							

15/7 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: 4.800

Borehull: 669

Dato : Juli-80
Koordinater : X.925.467 Y: 44.800 Ikke målt
Retning : N
Helling/stigning: - 45°
Høyde : - 101,5
Lengde : 11,55 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk. spredte gr. 1-3mm Svak impr. Py	45°	0,04	0,05	0,13			
0.70 - 2.60	1.90	Skarn	Rel.lys,mlk.-grovk. god malm. Sl,Cp,Gn,Py, mass.		1,46	0,49	5,37			
2.60 - 3.80	1.20	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enkelte cm-tykke skarnband, m/Sl,Cp, Gn,Py. Svak impr. Sl i 2 gl.gn.	45°	0,26	0,22	0,65			
3.80 - 4.20	0.40	Skarn	Rel.lys,mlk-grovk. god malm Sl,Cp,Gn,Py, mass.		1,74	0,31	3,33			
4.20 - 5.05	0.85	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enstaka små gr. 1-1,5 mm. Svak impr.Py	45°	0,20	0,21	0,65			
5.05 - 5.50	0.45	Skarn	Se ovan. på skarn. god malm		1,57	0,80	5,32			
5.50 - 6.40	0.90	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-2mm Svak impr. Py	50°	0,10	0,05	0,29			
6.40 - 6.55	0.15	Pegm.								
6.55 - 11.55	5.00	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik. enstaka dm-tykke biot.rikere part. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	45° 50°						

14/7 1980
Steffan Burman

FANA GLASS TRYKKERI

Lokalitet: 44.800

Borehull: 668

Dato : Juli 1980
Koordinater : X: 925.462 Y: 44.800 Ikke målt
Retning : S
Helling/stigning: - 45° Ned
Høyde : - 101.50 Ca.
Lengde : 10,0 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 0.40	0.40	2 gl.gn.m/ skarn	Rel.lys, mlk. Sl i skarn-band.	80° 90°	1.45	0.39	4.40			
0.40 - 0.55	0.15	TAP								
0.55 - 0.75	0.20	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. impr. Py	80°	0,19	0.62	0.83			
0.75 - 0.95	0.20	Pegm.								
0.95 - 1.30	0.35	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. tildels skarn m/Sl,Cp,Gn,Py	80°	0.07	0.29	0.73			
1.30 - 1.65	0.35	Pegm.								
1.65 - 5.95	4.35	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk. spr.gr. 1-3mm Svak impr. Py	70° 80°	0.06	0.07	0,22			1.65-2.65
5.95 - 6.90	0.95	Biot.gn.	Mørk,mlk. spor hbl. Svak impr. Py	70°						
6.90 - 10.00	3.10	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm. enkelte dm-tykke biot.gn.partier. Ved 9.50 - 9.70 Hbl.gn.	60°						

14/7 1980
Stellan Bergman

FANA BLADS TYKKERI

Lokalitet: 44.800

Borehull: 667

Dato : Juli: 1980
Koordinater : X: 925.460 Y: 44.800 ikke målt
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90
Høyde : - 101.5
Lengde : 10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 10.00	10.00	2 gl.gn.bp. Lys,mlk. enstaka cm-tykke band m biot.gn. m/hbl. og gr. 1-3 mm. Spor Py.	80° 90°						

14/7 1980
Stellan Burman

RANA BRUK TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.800

Borehull: 666

Dato : Juli - 80
Koordinater : X: 925.467 Y: 44.800 ikke målt
Retning : N. Horisontalt
Helling/stigning: + - 0°
Høyde : - 99,5 ca.
Lengde : 14,50 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 2.50	2.50	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk. m/smale striper pegm.	0° 3°	0,20	0,19	0,46			0,00-1.25
			Halve kjernen svak spor Py, Lys Sl, Cp	0°	0,17	0,24	0,42			1.25-2.50
2.50 - 3.30	0.80	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk. svakt ondulerende Impr. Py,Sl,Gn,Cp	0° 5°	0,34	0,24	1.04			
3.30 - 4.55	1.25	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk. tildels skiktet Svakt ondulerende. i halve kjernen skarn m/sl,cp,gn, Py	5° 0° 5°	0,89	0,37	2.59			
4.55 - 6.00	1.45	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk. enkelte cm-tykke biot.rikere band. spor gr. 1-2 mm Svak impr. Py, spor Sl.	5° 20° 0° 20°	0,31	0,11	0.82			
6.00 - 7.90	1.90	Skarn	Rel.mørk, mlk-grovk. m/ god malm Sl,Cp,Gn,Py,mass.		0,86	0.20	2,63			6.00-7.00
					3,30	0,45	8,54			7.00-7.10
7.90 - 8.20	0.30	Pegm. (Sl)			0,63	0,10	1,87			
8.20 - 8.50	0.30	Skarn	- " - - " -		1.74	0,18	5,95			
8.50 - 8.95	0.45	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enkelte biot.+ flagor. Spredte gr. 1-3mm Spor Py	0° 5°	0,05	0,03	0,14			
8.95 - 9.25	0.30	Pegm.								
9.25 - 14.50		2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spor hbl. gr. førende 1-2 mm. spor Py	0-10°						

14/7 1980
Stellan Burman

Lokalitet: 44.800

Borehull: 665

Dato	:	Juli - 80
Koordinater	:	X: 925.467 Y:44.800
Retning	:	N
Helling/stigning:		+ 45° opp
Høyde	:	- 97
Lengde	:	10.00 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.25	0.25	Biot.gn.	Mørk,mlk. impr. Py spor Sl?	25°	0,05	0,10	0,18			
0.25 - 2.50	2.25	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk. spredte gr. 1-3 mm spor Py	25° 30°	0.01	0.08	0,11			0.25 - 1.25
2.50 - 3.40	0.90	Biot.gn.	Mørk,mlk. tildels skifrig impr. Py, Sl?	25°	0,06	0,11	0,16			
3.40 - 4.10	0.70	Biot.sk.	Mørk,mlk. spor hbl. Impr.Py Sl?		0,02	0,11	0,17			
4.10 - 10.00	5.90	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enkelte biot-rikere partier impr. Py	25° 50°	0,00	0,03	0,09			4,10 - 5,00
10.00 - 14.00	4.10	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-2 mm.	60° 70°	0,15	0,03	0,43			10,10 - 12,10
14.10 - 14.40	0.30	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. impr. Sl.	70°	0,88	0,07	2,72			
14.40 - 17.50	3.10	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	60°	0,05	0,03	0,12			14,40 - 15,40

14/7 1980
Stellan Burman

VANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.800

Borehull: 664

Dato : Juli 1980
Koordinater : X: 925.645 Y: 44.800 ikke målt
Retning : opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 96,5
Lengde : 14.75 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik, spor gr. 1-3 mm. Impr. Py	70°						
2.00 - 9.05	7.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ 1-3 dm brede 2 gl.gn.alm. band. Impr. Py.	70°						
9.05 - 9.60	0.55	Pegm.								
9.60 - 12.20	2.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spor gr. ved 10.30 spor S1.	70°						
12.20 - 12.40	0.20	Pegm.								
12.40 - 12.60	0.20	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. Spor gr. impr. Py.							
12.60 - 12.70	0.10	Pegm.								
12.70 - 13.00	0.30	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. spr.gr. 1-3 mm. Impr. Py.							
13.00 - 13.50	0.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor skarn og gr. svak impr. Py	70°						
13.50 - 14.75	1.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/linser skarn og cm-dm-brede band hbl.gn. m/gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	70°						

14/7 1980
Holger Pantdalsli

Lokalitet: 44.800

Borehull: 663

Dato	:	Juli - 80
Koordinater	:	X: 925.462 Y: 44.800 Ikke målt.
Retning	:	Syd
Helling/stigning:		+ 50°
Høyde	:	- 97,0 m
Lengde	:	9.30 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.05	1.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. svak impr. Py	45°	0.00	0.02	0.05			
1.05 - 1.40	0.35	Skarn	Gn,Sl,Cp,Py, Mass.		0.24	0.24	1.03			
1.40 - 9.30	7.90	2 gl.gn.b.d.	Rel. lys,mlk. visse dm-tykke partier med biot.gn. Enstaka gr. 1-3 mm.	40° 50°						

14/7 1980
Stellan Burman

KAVA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.800

Borehull: 662

Dato : Juli - 80
Koordinater : X:925.462 Y: 44.800 Ikke målt.
Retning : S
Helling/stigning: + - 0°
Høyde : - ca. 99,5 m
Lengde : 10,0 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 2.00	2.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. halve kj. skarn. impr. Sl,Gn,Cp,Py	0 5°	2.27	0.31	4.11			0.00-1.00
					0.94	0.28	2.61			1.00-2.00
2.00 - 3.20	1.20	"	Mørk,mlk.-grovk. impr. Py	5°	0.05	0.03	0.21			
3.20 - 3.80	0.60	Pegm			0.01	0.04	0.09			
3.80 - 8.10	4.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.-grovk. spor gr. og hbl. Fra 4.00 - 4.20 spor Sl. 6.80 - 7.00 skarn m/spor Sl, ved 7.80 spor Sl.	5° 10°	0.29	0.05	0.86			3.80-5.00
					0.01	0.05	0.04			5.00-6.80
					0.04	0.00	0.20			6.80-8.10
8.10 - 8.50	0.40	Pegm.			0.00	0.02	0.05			
8.50 - 9.10	0.60	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. impr. Sl, Gn,Cp,Py	5° 10°	1.58	0.25	2.33			
9.10 - 10.00	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. svak impr.Py	10°	0.02	0.01	0.03			

ANA ELAUS TRYKKERI

Borehull: 661

Koordinater : X: 925.400 Y: 44.570
Retning : opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde :
Lengde : 26.35 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.40	2.40	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enstaka cm-tykke hbl.førende band. svak impr. Py. Ved 2,20 spor Sl.	80° 90°						
2.40 - 2.75	0.35	Pegm.								
2.75 - 6.55	3.80	2.gl.gn.b.d.	Som ovenfor	80°						
6.55 - 8.30	1.75	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm Svak impr. Py	70°						
8.30 - 12.00	3.70	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enkelte dm-tykke hbl.førende partier. enstaka dm-tykke pegm.band Spredte gr. 1-2 mm. Svak impr. Py.	70° 80°						
12.00 - 13.50	1.50	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm svak impr. Py	80°						
13.50 - 14.50	1.00	biot.gn.	Mørk,mlk. m/spor hbl.gr. 1-2 mm. Impr. Py	80°						
14.50 - 14.75	0.25	Pegm.								
14.75 - 15.15	0.40	Biot.gn.	Mørk,mlk m/spor hbl. gr. 1-2 mm. Svak impr. Py	80°						
15.15 - 15.35	0.20	Pegm.								
15.35 - 17.40	2.05	Biot.gn.	Se ovenfor	80°						
17.40 - 18.15	0.75	Pegm.								
18.15 - 19.10	0.95	Biot.gn.	Se ovenfor	80°						
19.10 - 19.50	0.40	Pegm.								
19.50 - 19.90	0.40	Biot.gn.	Se ovenfor på Biot.gn.							
19.90 - 21.30	1.40	Pegm.								

Borehull: 661

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
21.30 - 21.80	0.50	Biot.gn.	Mørk,mlk. m/spor hbl.gr. 1-2 mm. Impr. Py	80°						
21.80 - 22.30	0.50	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm.							
22.30 - 22.80	0.50	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. kv.rik impr. Py	70°						
22.80 - 24.30		Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/biot. gn. gr.førende 1-3 mm. svak impr. Py	80°						
24.30 - 24.70	0.40	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik	80°						
24.70 - 26.35	1.65	Biot.gn.	Mørk,mlk. hbl.førende vekslende m/dm-brede 2 gl.gn. alm.band. Spr. gr. 1-2 mm. Svak impr. Py	70 80°						

14/7 1980
Stellan Burman

Lokalitet:

Borehull: 660

Dato :
Koordinater : 2
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve nr
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.70	8.70	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. veksl. m/dm-brede hbl.gn.band. Spr. dm.brede pegm.band. Hbl.førende. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py.	80°						
8.70 - 11.55	2.85	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm.	80°						

14/7 1980
H. Pantdalsli

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil ~~44.780~~ 44.680

Borehull: 659

Dato : Juni 1980
Koordinater : X: 925.680 Y: 44.680
Retning : Opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 9,5
Lengde : 20,0 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 3.95	3.95	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik. rel.moss. spor Py	80° 90°						
3.95 - 4.25	0.30	Pegm.								
4.25 - 5.60	1.35	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. svak impr.Py	80°						
5.60 - 6.80	1.20	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. Tildels filtet preg. Spr. gr. 1-3 Svak impr. Py	80° 70°						
6.80 - 12.70	5,90	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enstaka em-tykke Pegm.band. ved 12,15-12.20 Py,Po, Svak impr.Py	70° 80°						
12.70 - 13.50	0.80	Pegm.								
13.50 - 20.00	6.50	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. Enstaka gr. 1-2 mm. Svak impr.Py	70° 80°						

16/6 1980
Steffan Bergsen

FANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil ~~45.720~~ 44.680

Borehull: 658

Dato : Juni -80
Koordinater : X: 925.448 Y: 44.680
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 100
Lengde : 20,0 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. str. og impr. Sl, Cp, Gn, Py	70° 80°	0,53	0.49	2,46			
0.70 - 1.40	0.70	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. svak impr.Py	70°	0,01	0,05	0,10			
1.40 - 2.20	0.80	Pegm.	(ved 1.80-1,85 biot.gn. ondulerende).							
2.20 - 3.25	1.05	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. svak impr.Py	70°	0,01	0.04	0,10			
3.25 - 7.35	4.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. veksl. med dm-tykke pegm.skarn.band. Spr. striper og tildels impr. Sl,Cp,Gn,Py,Po.	70° 80°	0,67	0,35	0,55			3,25 - 4,25
					0,52	0,19	1,78			4,25 - 5,25
					0,21	0,68	1,95			5,25 - 6,00
					2,02	0,76	2,47			6,00 - 7,35
7.35 - 10.20	2.85	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-2 mm. svak impr. Py	70° 80°	0,12	0,10	0,25			7,35-8,35
10.20 - 11.20	1.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm							
10.20 - 10.80	0.60	Pegm.								
10.80 - 11.80	1.00	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.-grovk. Svak impr. Py	80°						
11.80 - 18.80	7.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende. enstaka cm-tykke 1-3 mm 2 gl.gn.band. svak impr.Py	80°						
18.80 - 19.60	0.80	Pegm.								
19.60 - 20.00	0.40	2 gl.gn.alm.	lys, mlk-fink. kv.rik. enstaka mø gr. 0,5-1.00mm	80°						

16/6 1980
Stellan Burman

DATA BLAD SKRIVER

Lokalitet: Profil 44.680

Borehull: 657

Dato : Juni 1980
Koordinater Ca: X: 925.439 Y: 44.680 Ikke målt.
Retning : Opp
Helling/stigning: + 90°
Hoyde ca.: - 96
Lengde : 20,0

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 1.50	1.50	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. svak impr.Py Spor Sl, Cp, Gn	70°	0,33	0,16	0,71			
1.50 - 2.55	1.05	2 gl.gn. (skarnførende)	Rel.lys,mlk. rel.mass. god impr. Sl,Cp,Gn,Py		0,91	0,67	5,59			
2.55 - 5.65	3.10	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk. kv.rik enstaka biot.rikare band. svak impr. Py		0,13	0,05	1,02			
5.65 - 8.40	2.75	hbl.gn.	Mørk,grovk. enkelte 5 cm-tykke amfband. Svak impr. Py	70° 80°						
8.40 - 10.05	1.65	Pegm.	(Litt biot. som flager).							
10.05 - 10.50	0.45	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik. spr. gr. 1-2 mm	70° 80°						
10.50 - 11.10	0.60	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.							
11.10 - 12.50	1.40	Biot.gn.	Mørk,grovk. spor hbl. (fläckig)	70°						
12.50 - 15.40	2.90	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. enkelte cm-tykke hbl-band. Spr. gr. 1-2 mm. fortrinnsvis i hbl.band. Svak impr. Py	70° 80°						
15.40 - 19.50	4.10	hbl.gn.	Mørk,mlk. gr-førende 1-3mm Spr. partier gr.rik. Svak impr. Py (veeksd)	70° 70°						
19.50 - 20.00	0.50	Pegm.								

23/6 1980
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.680

Borehull: 656

Dato : Juni -80
Koordinater ca: X: 925.411 Y: 44.680 ikke målt
Retning : 0
Helling/stigning: - 68°0
Høyde ca: - 98,5
Lengde : 17,50 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.10	0.10	Skarn	Sl,Cp,Gn,Py		0,74	1.27	1,92			
0.10 - 0.70	0.60	2 gl.gn.bd.	lys,mlk. kv.rik. Svak impr. Py. spor Sl.	60°	0,20	0,18	0,69			
0.70 - 1.30	0.60	2 gl.gn.bd.	Rel. lys,mlk. skarnførende impr. Sl,Cp,Gn,Py	60°	0,63	0,19	2,62			
1.30 - 1.70	0.40	Biot.gn.	Mørk,mlk. spor hbl. svak impr. Py	70°	0,02	0,14	0,17			
1.70 - 3.70	2.00	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enkelte cm-tykke hbl.band m/gr. 1-2mm	60°	0,00	0,01	0,08			1,20-2,20
3.70 - 4.15	0.45	Pegm.								
4.15 - 6.35	2.20	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. litt veksl. med enstaka cm-tykke 2 gl.gn. band. spr. gr. 1-3 mm.	60°						
6.35 - 12.00	5.65	2 gl.gn. bd.	Rel.lys,mlk. veksl. med dm-tykke hbl.gn.band. Spredte gr. 1-2 mm. Svak impr. Py.	50° 60°						
12.00 - 17.50	5.50	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm tildels amfibolittisk.	60°						

23/6 1980
Steffan Bergman

Lokalitet: Profil: 44.680

Borehull: 655

Dato : Juni 1980
Koordinater ca: X: 925.429,5 Y: 44.680 ikke målt
Retning : Opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde ca. : - 96
Lengde : 17.30 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.40	0.40	2 gl.gn.b.d.	rel.lys mlk.	80°	0.04	0.09	0.14			
0.40 - 0.70	0.30	Skarn	god impr. Sl,Cp,Gn,Py		4.10	0.31	8.30			
0.70 - 1.20	0.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk,tildels skarnførende m/Sl,Cp,Gn,Py	80°	1.20	0.30	1.61			
1.20 - 1.50	0.30	Pegm.								
1.50 - 3.60	2.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enkelte dm-tykke partier m/biotskiktet Spor Py.	80°	0.08	0.03	0.24			2.60-3.60
3.60 - 4.15	0.55	Hbl.biot.gn.	Mørk,grovk. god impr. Sl, Cp,Gn,Py. rel.mass.		0.14	0.20	5.75			
4.15 - 4.60	0.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enkelte film-tynne biotskikt. Svak impr. Py	80°	0.02	0.15	0.19			
4.60 - 5.75	1.15	Hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. god impr. Sl,Cp,Gn,Py. Rel.mass.		0.04	0.36	3.32			
5.75 - 6.55	0.80	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk. spor hbl. Svak impr. Py spor Sl	80°	0.16	0.21	2.15			
6.55 - 8.55	2.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.enkelte 5 cm-tykke hbl.gn.band. Svak impr. Py,Po,Cp, Po, Cp i hbl.bandene	70° 80°	0.00	0.09	0.06			
8.55 - 9.30	0.75	Pegm.								
9.30 - 13.70	4.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. spredte 5 cm-tykke partier med hbl.biot. Svak impr. Py	80° 70°						
13.70 - 17.30	3.60	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm Svak impr. Py	70° 80°						
		23/6 1980	Stellan Burman							

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.680

Borehull: 654

Dato : Juni 1980
Koordinater ca.: X: 925.430 Y: 44.680 ikke målt
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde ca. : - 98,5
Lengde : 15.85 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 2.95	2.95	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik, enstaka gr. 1-2 mm. Svak impr. Py	80°	0,13	0.07	0.31			1.95-2.95
2.95 - 3.35	0.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. litt skarn Impr. Sl,Cp,Gn,Py	80°	0.25	0.98	0.91			
3.35 - 4.20	0.85	Hbl.gn.	Mørk,mlk.gr.førende 1-4 mm svak impr. Py	80°	0.01	0.02	0.04			
4.20 - 5.10	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. spor·hbl. Spredte gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	80°	0.01	0.02	0.10			
5.10 - 5.80	0.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik. Stripet Sl,Cp,Gn,Py Spredte gr. 1-3 mm.	80°	2,30	0.35	5,76			
5.80 - 6.70	0.90	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk. kv.rik spor Py	80°	0.14	0.07	0.44			
6.70 - 8.00	1.30	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk. kv.rik,spr. gr. 1-2 mm. tildels skarnførende m/ Sl,Cp,Gn,Py	80° 70°	0.69	0.62	3.10			
8.00 - 11.20	3.20	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik,enstaka gr. 1-2 mm. svak impr. Py	80° 75°	0.02	0.06	0.14			8.00-9.00
11.20 - 14.10	2.90	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm	80°						
14.10 - 15.60	1.50	Pegm.								
15.60 - 15.85	0.25	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm							

23/6 1980
Stellan Burman.

Lokalitet: Profil. 44.680

Borehull: 653

Dato : Juni 1980
Koordinater : x: 925.420 y: 44.680
Retning : opp.
~~Helling~~/stigning: + 90°
Høyde : ~~20.0~~ m −95.0
Lengde : 20.0 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.55	1.55	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk.-fink. kv.rik. spor gr. rel. mass.	80° 90°						
1.55 - 2.85	1.30	Pegm.								
2.85 - 3.65	0.80	Hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. tildels skarn. god impr. Sl,Cp,Gn Py	80°	0,39	0,18	5,38			
3.65 - 4.70	1.05	Skarn	Mørk,grovk. Sl.Cp,Gn,Py		0,94	0.15	3.52			
4.70 - 5.70	1.00	2 gl.gn.b.d.	rel.lys,mlk. litt skarn-førende, spor Sl,Gn,Cp,Py	70° 80°						
5.70 - 7.05	1.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. litt filtet preg, svak impr. Py	80°						
7.05 - 7.60	0.55	Pegm.								
7.60 - 11.30	3.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enkelte gr. 1-2 mm. svak impr. Py	80°						
11.30 - 11.60	0.30	Pegm.								
11.60 - 14.70	3.10	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm	80-90°						
14.70 - 20.00	5.30	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spredte gr. 1-2 mm. Enkelte dm.tykke hbl.gn. partier gr.førende Impr. Py	70° 80°						

12/6 1980
Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.680

Borehull: 652

Dato : Mai 1980
Koordinater : x: 925.411 y: 44.680
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 99.5
Lengde : 14.60

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.30	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. kv.rik Impr. Sl,Cp,Gn,Py	80°	0.67	0.34	3.49			
0.30 - 2.50	2.20	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.kv.rik. enstaka små gr. 0,5-1.0 mm.	80°	0.08	0.04	0.03			230 - 250
2.50 - 6.10	3.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,m[illegible]ildels hbl.-førende, [illegible]enstaka cm-tykke hbl [illegible]band m/gr. 1-3 mm.	80° 90°						
? 6.10 - 6.30	0.20	skarn	Sl.Cp,Gn,[illegible].		0.05	0.28	0.88			
6.30 - 6.95	0.65	Pegm.								
6.95 - 7.80	0.85	Biot.hbl.gn. m/skarn	mørk,mlk. [illegible]et preg Sl,Cp,Gn, [illegible]i de skarn-førende partier.	80° 70°	0.49	0.54	2.68			
7.80 - 7.95	0.15	Pegm.								
7.95 - 9.50	1.55	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. spor hbl. enkelte cm-tykke Sl,Cp,Gn band.	80° 90°	0.18	0.11	0.25			
9.50 - 9.90	0.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. spor hbl/gr. 1-2 mm. svak impr. Py	90°	0.06	0.02	0.08			
9.90 - 10.35	0.45	Pegm.								
10.35 - 11.35	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. rel. mass. sbak impr. Py							
11.35 - 14.50	3.15	hbl.gn.	Mørk,mlk. amfibolittisk gr.førende, tildels rik 1-3 mm.	80° 90°						

12/6 1980
Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil: 44.680

Borehull: 651

Dato : Juni -80
Koordinater : X: 925.411 Y: 44.680 ej innmålt
Retning : Opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 95.0 m
Lengde : 26.30

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.00	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-2 mm. rel. mass.	ca.90°	0.29	0.30	0.84			
1.00 - 2.55	1.55	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. vekslende med dm-tykke skarn band m/ Sl Cp,Gn,Py,Po	70°-90°	2.50	0.66	5.19			
2.55 - 4.95	2.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. [illegible] 60 Po	80-90°	0.13	0.26	0.47			2.55-3.55
4.95 - 5.40	0.45	" "	Rel.lys,mlk. [illegible] l.før. rel. mass.							
5.40 - 10.30	4,90	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm rel.mass. svak impr. Po,Py	80° 90°						
10.30 - 10.55	0.25	Pegm.								
10.55 - 14.90	4.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. [illegible] s hbl-førende. gr. 1-[illegible] mm. svak impr. Py, Po	80°						
14.90 - 15.30	0.40	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. Svak impr. Py							
15.30 - 18.35	3.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enstaka dm-tykke hbl.førende partier Svak impr. Py Spr.gr. 1-2 mm. Ved 16.05-16.10 Sl	70° 90°						
18.35 - 20.75	2.40	Hbl.gn.	Mørk,mlk.tildels gr.før. 1-3 mm. svak impr. Py	80°						
20.75 - 21.00	0.25	Pegm.								
21.00 - 24.70	3.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. spr.gr. 1-3 mm. Enkelte cm-tykke hbl.band.	70°						
24.70 - 26.30	1.60	hbl.gn.	Mørk,mlk. rel. mass.							

12.6. 1980
Stellan Barman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.680

Borehull: 650

Dato : Mai 1980
Koordinater : X: 925.396 Y: 44.680
Retning : S
~~Helling~~/stigning: + 45°
Høyde : - 96 m
Lengde : 25.00

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 4.70	4.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys, mlk. spr.gr. 1-2 mm. Spor Py	60°						
4.70 - 5.70	1.00	hbl.gn.	Mørk,mlk. litt hbl.biot. gn. gr.førende 1-3 mm. Svak impr. Py	60° 70°						
5.70 - 9.70	4.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.vekslende med opp til 3 cm bred hbl.gn. band. Spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py, fortrinnsvis i hbl.gn. bandene.	60° 50° 60°						
9.70 - 10.05	0.35	Pegm.								
10.05 - 13.40	3.35	Hbl.gn.	Mørk,mlk.tildels gr.før. 1-3 mm. impr. Py	60°						
13.40 - 20.70	7.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enstaka dm-tykke Pegm. og hbl.band impr. Py tildels gr.førende 1-3 mm. Spor Sl ved 19.80.	60° 50°						
20.70 - 24.05	3.35	Hbl.gn.	Mørk,mlk.spr.gr. 1-4 mm. spor Py	60°						
24.05 - 25.00	0.95	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk. kv.rik enkelte gr. 1-3 mm. rel.mass.	60° 70°						

12/6 1980
Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.680

Borehull: 649

Dato : Mai - 80
Koordinater ca.: X: 925.396 Y: 44.680 ikke målt
Retning : S
Helling/stigning: - 45°
Høyde : - 99
Lengde : 23.30 m

I.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.55	0.55	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.-fink. kv.rik komp. Sl, Cp, Gn, Py band ved 0,0 - 0,05, 0,30-0,35, 0,50-0,55 m.	60°	0,86	0,48	2,96			
0.55 - 1.10	0.55	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik.	70°	0,22	0,16	0,21			
1.10 - 2.55	1.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enkelte dm.-tykke band m/Sl,Cp,Gn,Py.	60°	0,50	0,32	1.38			
2.55 - 3.30	0.75	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. spredte gr. 1-2 mm.	60°	0,04	0,04	0,09			
3.30 - 3.60	0.30	Pegm.								
3.60 - 4.60	1.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm	50°						
4.60 - 10.60	6.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl-førende. også noen cm-tykke amf.band.	50° 60°						
10.60 - 11.05	0.65	Pegm.								
11.05 - 13.45	2.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-2 mm. svak impr. Py	60°						
13.45 - 13.80	0.35	Pegm.								
13.80 - 14.40	0.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. svak impr. Py	60°						
14.40 - 14.45	0.05	Pegm.								
14.45 - 15.50	1.05	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm Svak impr. Py							
15.50 - 16.50	1.00	Pegm.								
16.50 - 18.10	1.60	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm	60° 50°						
18.10 - 18.30	0.20	Pegm.								
18.30 - 21.70	3.40	Hbl..gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm enstaka cm-tykke Amf-band svak impr. Py	60° 70°						

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 649

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
21.70 - 23.80	1.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. tildels kv.rik Spr. små gr.	60°						
		2/6 -80 Stellan Burman							

EKSTRA BLADS TILVEKST

Lokalitet: Profil 44.680

Borehull: 648

Dato : MAI - 80
Koordinater ca.: X 925.442 Y 44.680 ikke målt
Retning : opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 95
Lengde : 17.65 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.95	1.95	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik, enkelte små gr. 0,5-1.0 mm. spor Py	70° 80°						
1.95 - 4.20	2.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enkelte hbl-førende band. gr.rik i hbl.bandene 1-4 mm.	70° 60°						
4.20 - 6.10	1.90	hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.rik 1-4 mm.	70°						
6.10 - 17.65	11.55	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl-førende m/gr. 1-3 mm.	70° 80°						

2/6 1980

Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.680

Borehull: 647

Dato : Mai-80
Koordinater ca: X 925.442,5 Y: 44.680 ikke målt
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 99
Lengde : 10,70 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.10	0.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. impr. Py		0.03	0.23	0.19			
0.10 - 0.80	0.70	Pegm.			0.04	0.10	0.04			
0.80 - 0.90	0.10	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik, svak impr. Py	70°	0.02	0.04	0.09			
0.90 - 1.45	0.55	2 gl.gn.m/ skarn	Rel. lys mlk-grovk. god impr. Sl,Cp,Gn,Py	60° 80°	2.00	0,32	7,48			
1.45 - 1.80	0.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. filtet preg. Svak.impr. Py	60° 70°	0.34	0.28	0,90			
1.80 - 2.15	0.35	skarn	Mørk mlk-grovk.Impr. Sl,Cp Gn, Py. rel.mass.		0.99	0,81	2,77			
2,15 - 2.95	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. nd- 2.25-2.30 hbl.gn. 2.70 - 2.75 m skarn. Enkelte gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.		0.01	0.03	0.02			
2.95 - 3.30	0.35	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm	70° 70°						
3.30 - 4.80	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys, mlk. tildels hbl.-førende gr. i de hbl.førende partier.1-3 mm. svak impr.Py	70° 80°						
4.80 - 6.40	1.60	Hbl.gn.	Mørk,mlk. enkelte 2 gl.gn.-partier. gr.førende, for-trinnsvis i hbl.gn. 1-3 mm. Svak impr. Py.	70° 80°						
6.40 - 9.30	2.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. enkelte hbl. førende partier. Spr. gr. 1-2 mm.	80°						
9.30 - 10.70	1.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm rel. mass.							

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 646

Dato : Mai 1980
Koordinater ca: X: 925.457,5 Y: 44.770 ikke målt
Retning : Lodd
Helling/stigning: −90°
Høyde : −100
Lengde : 14,20 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.10	0.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. kv.rik	80°						
0.10 - 0.25	0.15	Skarn	Spor Py		0,06	0,06	0,10			0,0 - 0,90
0.25 - 0.90	0.65	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik,spor Sl,Py	80°						
0.90 - 1.10	0.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. cm-tykke skarn band m/Sl,Cp,Py	80°	0,28	0,22	0,80			
1.10 - 1.35	0.25	Pegm.			0,04	0,05	0,07			
1.35 - 2.35	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. rel.kv.rik. Svak impr. Sl, Py	80° 90°	0,27	0,18	0,50			
2.35 - 2.80	0.45	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik. enkelte flager biot. spor gr.1-2 mm	70° 70°	0,01	0,02	0,05			
2.80 - 3.25	0.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. kv.rik. svak impr. Sl, Py	80°	0,85	0,20	2,00			
3.25 - 7.40	4.15	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys, mlk. kv.rik. enkelte gr. 1-2 mm. rel.mass		0,01	0,02	0,03			3,25 - 4,20
7.40 - 7.70	0.30	skarn								
7.70 - 14.20		2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. kv.rik. enkelte cm.tykke biot.band. Spredte gr. 1-2 mm.	70° 80°						

28/5 1980
Steffan Bergman

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 645

Dato : Mai -80
Koordinater ca: X: 925.465 Y: 44.770 ikke målt
Retning : Lodd
Helling/stigning: -90°
Høyde : – 100
Lengde : 8.30

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 – 4.40	4.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. kv.rik Spredt gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	70° 80°	0,02	0,01	0,07			3,40-4,40
4.40 – 5.85	1.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk-grovk. tildels skarnførende, fortrinnsvis i dm.tykke band. Grov. impr. Sl,Cp,Gn,Py helst i skarnbandene.	80° 70° 70° 80°	1,15	0,31	3,05			
5.85 – 6.70	0.95	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk. kv.rik	80°	0.03	0.03	0.01			
6.70 – 6.90	0.20	Skarn	Rel.lys, grovk. Gorv impr. Sl, Cp, Gn, Py		0,97	0,35	7,60			
6.90 – 8.30	1.40	2 gl.gn.b.d.	Rel. lys,mlk. kv.rik spredte gr. 1-2 mm. Enkelte filmtynne biot-skikt.	70° 80°	0,03	0,03	0,05			6,90-7,90

23/5 1980
Steffan Burman

KANA BLADS FABRIKAT

Lokalitet: Profil 44.789 (ca.)

Borehull: 644

Dato : Mai -80
Koordinater ca: X: 925.458,4 Y: 44.789 ikke målt
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : ca 100,5
Lengde : 5,35

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.40	0.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. kv.rik Svak impr. Sl,Gn,Cp,Py	80°	0,16	0,19	0,03			
0.40 - 2.60	2.20	2 gl.gn.	Rel.lys, mlk-grovk. tild. skarnførende, fortrinnsvis i dm.tykke band med god impr. Sl,Cp,Gn,Py (impr. typ.)	70° 80°	1,25	0.05	3,49			
2.60 - 3.90	1.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. kv.rik	80°	0,05	0,01	0,10			
3.90 - 4.30	0.40	Pegm.								
4.30 - 5.30	1.00	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik. enstaka gr. 1-2 mm. rel. mass.	80°						

23/5 1980

Stellan Burman

2

Lokalitet: 44.780 Ca.

Borehull: b43

Dato : Mai - 80
Koordinater : X 928,460 Y: 44.780
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : — 100,5
Lengde : 8.55

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	gr Ag/ton	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.60	1.60	Malm Rel. lys, mlk-grovk. Skarnførende 2 gl.gn. god. impr. Sl,Gn,Cp,Py		2,30	0,32	7,68	59,7		
1.60 - 8.55	6.95	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. tildels kv.rik enkelte og spredte gr. 1-3mm Spor Sl ved 7.80 og 8.40	80° 90°	0,05	0.03	0,13			1.60-2,60

22/5 1980

Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil ca. 44.780

Borehull: 642

Dato : Mai -80
Koordinater ca: x: 925.465,5 y: 44.780 ikke målt
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 100,5
Lengde : 10.0 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.80	0.80	Malm Rel.lys,mlk-grov. Skarnførende 2 gl.gn. God impr. Sl,Gn,Cp,Py		1.50	0,32	3,92			
0.80 - 1.40	0.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik	70	0,03	0,03	0,01			
1.40 - 2.00	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. m/enkelte cm-tykke hbl.band. gr. 1-3 mm	70°						
2.00 - 7.35	5.35	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk. rel.kv.rik. Spr. gr. 1-2 mm. Ved 4.50-4.55 Sl, Gn	80°						
				0,01	0,01	0,06			6,50 - 7,35
7.35 - 7.95	0.65	2 gl.gn. Lys,mlk. tildels skarnførende Impr. Sl,Gn,Cp,Py	60° > 90° 60°	1,60	0,62	5,32			
7.95 - 10.00	2.05	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik. Spr. små gr. 0,5 - 1.0 mm. rel.mass.		0,03	0,03	0,21			7,95-8,50

22/5 1980
Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.680

Borehull: 641

Dato : Mai -80
Koordinater ca: 925.438 ø. Ø:44.680 ikke målt.
Retning : Lodd
Helling/stigning: -90°
Høyde : – 101,5
Lengde : 18,40 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 – 4.10	4.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enkelte part. er skiktet med filmtynne biot.skikt. Spredte gr.1–2mm	70° 80°	0,01	0,03	0,04			3,50–4,40
4.10 – 4.40	0.30	Pegm.								
4.40 – 6.30	1.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. vekslende med dm.tykke biot.gn.band, impr. Sl,Cp,Gn,Py fortrinnsvis i de biot.rikere part.	80°	0,76	0,22	1,27			
6.30 – 7.20	0.90	2 gl.gn.alm.	Lys,kv.rik, mlk. kv.rik enkelte gr. 1–2 mm.	70°	0,02	0,03	0,04			
7.20 – 8.30	1.10	2 gl.gn.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ dm.tykke biot.rikere part. spor skarn. Sl,Cp,Gn.Py	80°	0,36	0,38	2,78			
8.30 – 12.40	4.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enkelte cm-tykke hbl.gn.band. Enkelte spredte gr. 1–2 mm	80°	0,01	0,04	0,11			8,30–9,40
12.40 – 18.40	6.00	hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1–3 mm	70° 80°						

28/5 1980
Stellan Burman

LANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.680

Borehull: 640

Dato : Mai 1980
Koordinater ca. X: 925.467. Y: 44.680
Retning : Lodd
~~Helling~~/stigning: + 90°
Høyde : – 935 –
Lengde : 34 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.90	0.90	2 gl.gn.alm.	Rel. lys,mlk. kv.rik, spr. gr. 0,5 - 2 mm. Fra 0,30-0,40 impr. Sl.	80°	0,30	0.05	975			
0.90 - 2.30	1.40	"	Rel.lys,mlk. god impr. Sl, Cp,Gn,Py, tildels skarnførende.	80°	1.40	0,37	4.84			
2.30 - 2.70	0.40	Pegm.			0.06	0.04	0.11			
2.70 - 3.60	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. enkelte cm-brede pegm.band. impr. Py Fra 2.70 - 3.60 impr. Sl.	80°	0.13	0.07	0.63			
3.60 - 4.00	0.40	Pegm.			0.02	0.08	0.25			
4.00 - 5.00	1.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik m/impr. Sl,Cp,Gn,Py		0,62	0,26	1.97			
5.00 - 5.60	0.60	" "	Impr. Sl,Cp,Gn,Py. Fra 5.40 - 5.50.	70°	0,38	0.15	1.17			
5.60 - 6.70	1.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. impr. Py		0.09	0.12	0.11			
6.70 - 8.45	1.75	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik, spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py	80°						
8.45 - 9.10	0.65	Pegm.								
9.10 - 19.30	10.20	2 gl.gn.b.d.	Rel. mørk,mlk.-grovk. veksl. m/cm-dm-brede 2 gl.gn.alm. bånd. Svak impr. Py, spor Po.	80° 70°						
19.30 - 21.60	2.30	2 gl.gn.bd.	rel.mørk,mlk. tildels hbl.-førende m/spr. gr. 0,5-2mm svak impr. Py.	80°						
21.60 - 23.00	1.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. ondulerende, m/impr. Py. Fra 22.30-22.60 svak impr. Sl,Cp,Gn,Py							

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 640

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
23.00 - 24.60	1.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ 2 gl.gn.alm. Hbl. og gr. førende, fortrinnsvis i 2 gl.gn.b.d.. Svak impr.Py	80°						
24.60 - 31.50	6.90	Hbl.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl.gn.b.d. Spe. gr. 1-3 mm, svak impr. Py.	80°						
31.50 - 31.75	0.25	Biot.sk.	Mørk,grovk.hbl.førende, impr. Py, Po, spor Sl.	80°.						
31.75 - 34.00	2.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende vekslende m/1-3 dm brede band hbl.gn. spr. gr. tildels rik 1-3 mm. Svak impr. Py. Fra 31.80-31.85 impr. Sl.	80°						

21.5. 1980
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.680

Borehull: 639

Dato : Mars 1980
Koordinater : X: 925.467 Y: 44.675
Retning : Lodd
Helling/stigning: $\pm 90^{o}$
Høyde : - 99 m
Lengde : 15.45 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 6.40	6.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.kv.rik. spor gr. 1-3 mm. svak impr. Py Ved 6.20 spor Sl.	70° 80°						
6.40 - 7.10	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py							
7.10 - 11.00	3.90	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm bred 2 gl.gn.b.d. band. tildels m/hbl. Spor gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	70° 80°						
11.00 - 15.45	4.45	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/dm-brede 2 gl.gn. b.d.band Spr. gr. tildels rik 1-3 mm. Svak impr. Py.	70° 80°						

25/3 1980
H. Pantdalsli

SAMA BLADS TYKKELSE

Lokalitet: 44.680

Borehull: 638

Dato : Mars 1980
Koordinater : X: 925.485 Y: 44.675
Retning : Lodd
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 94,0 m
Lengde : 43.50 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	g/t Ag	% Fe	Prove m
0.00 - 26.60	26.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik, vekslende m/cm-dm-brede 2 gl.gn.b.d. band. fortr. m/spr. gr. 1-5 mm. svak impr. Py. Ved 16.85 spor Sl.	70° 80°	0,04	0.02	0.08	2.0		25.60-26.60
26.60 - 27.30	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede pegm.band. Svak impr. Sl,Gn,Cp,Py		0,12	0,14	1.25	25,3		
27.30 - 29.10	1.80	Biot.gn.(sk.)	Mørk,mlk - grovk. impr. Sl,Cp,Py,Po.	80° -	0.07	0,41	1,84	10.5		
29.10 - 29.90	0.80	Pegm.			0.03	0.05	0,14	2.9		
29.90 - 32.60	2.70	Biot.gn.(sk).	Mørk,grovk-mlk. svak impr. Sl,Cp,Py,Po	60° 70°	0,17	0,26	4.50	9.8		29.90-31.30
					0.03	0.03	1.04	12.6		
32.60 - 33.70	1.10	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. svak imrp.Py	70°	0.04	0.03	0,16	1.0		
33.70 - 38.10	4.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl. førende, spr. gr. 1-3 mm impr. Py. Fra 34.70-34.90 Stiehtolitisk	70° 80°						
38.10 - 43.50	5.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede 2 gl.gn.b.d. band fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	70° 80°						

25/3 1980
H. Pantdalsli

SANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.680

Borehull: 637

Dato : mars 80
Koordinater : X: 925.485 Y: 44.675
Retning : Lodd
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 99 m
Lengde : 20.00 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve nr
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.80	1.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik, spor gr. 0,5-2 mm. Svak impr. Py	70°						
1.80 - 2.00	0.20	Pegm.								
2.00 - 7.50	5.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik. veksl. m/Cm-dm-brede 2 gl. gn. b.d. band fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	70° 80°						
7.50 - 12.75	5.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende, vekslende m/cm-dm-brede hbl.gn. band. Spr. gr. tildels rik 1-5 mm. impr. Py.	70° 80°						
12.75 - 12.95	0.20	Pegm.								
12.95 - 14.95	2.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk. enkelte cm-dm-brede pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. impr. Py.	70°						
14.95 - 15.85	0.90	Pegm.								
15.85 - 20.00	4.85	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py.	70° 80°						

25/3 1980
H. Pantdalslí

VANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.740

Borehull: 636

Dato : mars 1980
Koordinater : X:44.740 Y:925.461
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 102 m
Lengde : 14.45 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	g/t Ag	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.alm.	rel.lys,mlk.kv.rik,veksl. m/spr. striper Sl,Cp,Gn,Py, Spor gr.	80°	0.43	0.18	1.08	9.1		
0.50 - 2.60	2.10	" "	Rel.lys,mlk. kv.rik,spr. gr. 1-5 mm, svak impr. Py	80°	0.02	0.02	0.02	0.8		
2.60 - 2.75	0.15	" "	Kv.rik,ompr. Sl,Cp,Gn,Py		1.48	0.35	3.47	17.6		
2.75 - 3.05	0.30	" "	Kv.rik,spr.gr. 1-3 mm, svak impr. Py	80°	0.04	0.01	0.08	0.4		
3.05 - 4.00	0.95	" "	Kv.rik,striper impr. Sl,Cp Gn,Py		0.47	0.13	1.46	5.0		
4.00 - 5.95	1.95	" "	Rel.lys,mlk,kv.rik,spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	80°	0.03	0.05	0.13	0.8		
5.95 - 6.60	0.65	" "	Kv.rik,tildels med skarn, striper,impr. Sk,Cp,Gn,Py		0.44	0.47	3.34	14.4		
6.60 - 6.90	0.30	Pegm.			0.06	0.06	0.08	1.7		
6.90 - 10.00	3.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede 2 gl.gn.alm. og pegm.band. Spr.gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	80°	0.02	0.04	0.09	1.4		
10.00 - 14.45	4.45	" "	Rel. mørk,mlk. vekslende m/striper og småparti hbl. gn. Spr.gr. 1-3 mm, impr. Py.	80°						

5/3 1980
H. Pantdaleli

KANA GLADSTEKKERI

Lokalitet: 44.740

Borehull: 635

Dato : Mars 1980
Koordinater : X 44.740 X: 925.461
Retning : Lodd
~~Helling~~/stigning: + 90°
Høyde : - 97 m
Lengde : 8,85 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	g/t	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.20	1.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik Spr. striper m/sl,cp,gn,Py	80°	0,36	0,14	1,26	11.8		
1.20 - 2.75	1.55	" " Vekslende m/cm-dm-brede biot.d.band. kv.rik, spor gr. svak impr. Py.	80°	0.01	0,02	0.04	1.7		
2.75 - 3.65	0.90	" " Kv.rik,spr. skarn-førende striper m/sl,Cp,Gn,Py	80°	0,64	0,11	1,45	11.2		
3.65 - 5.20	1.55	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. m/svak impr. Sl,Cp,Py.		0,18	0,22	0,62	15.3		
5.20 - 8.85	3.65	" " Rel.mørk,mlk. enkelte dm.brede hbl.førende band. Spor gr., svak impr. Py	80°	0.04	0.02	0.11	1.3		

5/3 1980

B. Pantdalsli

EAN BLACK TYKKEN

Lokalitet: 44.570

Borehull: 634

Dato : Jan. 1980
Koordinater : X:44.580 Y:925.466
Retning : Lodd
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 94,5m
Lengde : 99 m

1.

Arkivert.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	g/t	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.40	1.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-brede biot.d. og pegm. band. Biot.d.band fortr- vis m/spr. gr. 0,5-2 mm	80°						
1.40 - 1.70	0.30	Pegm.								
1.70 - 8.50	6.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. veksl. m/cm-dm-brede biot.d. og pegm.band. spor gr, svak impr. Py. Fra 7.90-8.20 meget svake spor Sl,Gn,Cp, Py	80° 90°						
8.50 - 8.95	0.45	Pegm.								
8.95 - 11.30	2.35	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.vekslende m/ cm-brede biot.d.band, for- trinnsvis m/spr. gr.0,5-2mm	80° 90°						
11.30 - 11.70	0.40	Pegm.								
11.70 - 14.45	2.75	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.vekslende m/ cm-dm-brede biot.d. og pegm.band,spor gr., svak impr. Py	80° 90°	0,04	0,01	0.06	3.0	1.80	13.50-14.45
14.45 - 15.05	0.50	Pegm.			0.02	0.04	0.03	2.0	1.00	
15.05 - 15.60	0.55	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/parti 2 gl.gn.alm. Str. impr. Sl,Cp,Gn,Py	80°	0.21	0,21	1.47	14.0	6.10	
15.60 - 16.40	0.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. svak impr.Py	80°	0.01	0.02	0.04	3.0	1,20	
16.40 - 16.85	0.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.-grøvk. veksl. m/pegm.band. Spor Cp,impr. Po,Py.	80°	0,05 ~~0,22~~	0,08	0.03	44.0	4.40	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 634

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	g/t Ag	% Fe	Prøve m
16.85 - 18.40	1.55	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/striper og band,biot.d. gn. Fra 17.10-17.40 musk. gn. Spr.svak impr. Sl,Cp Gn,Py	80°	0,23	0,10	0,42	15,5	4,30	
18.40 - 24.00	3.60	" "	Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm brede biot.d.band. Fra 21.00 - 21.40 impr. Po,Py, spor gr.	75°	0,00	0,01	0,02	1,0	1,70	18,40-19,4
24.00 - 25.40	1.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/parti biot.gn. svak impr. Py	70° 80°						
25.40 - 26.50	1.10	Pegm.								
26.50 - 27.00	0.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. kv.rik.							
27.00 - 27.30	0.30	Pegm.								
27.30 - 29.90	2.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. Fra 29.80-29.90 hbl.førende. Impr. Py	70°						
29.90 - 30.30	0.40	Pegm.								
30.30 - 30.70	0.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/str. hbl.gn. impr. Py	70°						
30.70 - 31.60	0.90	Biot.gn.(sk).	Mørk,grovk. tildels m/ impr. Sl,Cp,Py,Po.							
31.60 - 36.20	4.60	Hbl.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/cm-dm-brede 2 gl.gn.b.d.band Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py. Fra 31.70-31.80 stichrolitisk.	60°						

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 634

3.

Dybde	l.	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
36.20 - 54.30	18.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede hbl.gn. 2 gl.gn. alm. og lyse stichtolitiske band. Spr. gr. tildels rik. 0,5-3 mm. Impr. Py	70°						
54.30 - 75.80	21.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede biot.d.band. Spor hbl. spr.gr. 0,5-2mm Tildels m/dm-brede stich-tolitiske band. Svak impr. Py.	60° 70°						
75.80 - 83.60	7.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.vekslende m/ dm-brede hbl.gn.band. Hbl.førende. Spr. gr. 0,5-2 mm. Impr. Py	70°						
83.60 - 91.25	7.65	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.vekslende m/ cm-dm-brede hbl.gn. og 2 gl.gn.b.d.band. fortr. vis m/ spr. gr. 0,5-3 mm Svak impr. Py.	70°						
91.25 - 92.90	1.65	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spr.gr. tildels rik 1-3 mm.							
92.90 - 94.50	1.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spor hbl. gr.rik 1-3 mm. Impr. Py	70°						
94.50 - 99.00	4.50	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/cm-brede pegm.band. spr. gr. tildels rik 1-3 mm.							

6/3 1980
H. Pantdalsli

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.570

Borehull: 633

Dato : Feb. 1980
Koordinater : X:44.580 X: 925.465
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 99 m
Lengde : 5.05 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.10	0.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk. impr. Py							
0.10 - 0.60	0.50	Pegm.							
0.60 - 5.05	4.45	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. veksl. m/ små parti 2 gl.gn.b.d. Spr.gr. 0,5-2 mm. Impr. Py. Ved 2.80 svake spor Sl.	70° 80°						

5/3 1980
H. Pantdalsli

RANA BLADT TRYKKERI

Lokalitet: 44.570

Borehull: 632

Dato : Jan.-Febr. 80
Koordinater : X: 925.480 Y: 44.580
Retning : N
Helning/stigning: + 50°
Høyde : - 94,5 m
Lengde : 70 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 4.50	4.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.tildels hbl. og skarnførende, spr. gr. 0,5-3 mm, impr. Py.	60° 70°						
4.50 - 5.00	0.50	Musk.gn.	Lys,mlk-grovk. impr. Py							
5.00 - 8.20	3.20	2 gl.gn.alm.	Rel. lys,mlk, spor gr. Spr. små pegm.band. svak impr. Py.	60° 70°						
8.20 - 8.80	0.60	Pegm.								
8.80 - 54.80	46.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. veksl. m/str. og dm.brede 2 gl.gn.b.d. og pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. forrimsvis i b.d. parti,svak impr. Py	50° 60°						
54.80 - 70.00	15.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. veksl. m/ striper og dm-brede hbl.-førende bånd, tildels hbl. gn. spr. gr. 1-3 mm. Spr. dm.brede pegm.bånd impr. Py.	60°						

12.3. 80
Rolper Pantdalsli

Lokalitet: 44.570

Borehull: 631

Dato : Jan. 80
Koordinater : X 925.~~430.7~~ 450 Y: 44.570
Retning : N
Helling/stigning: + 75°
Høyde : - 95 m
Lengde : 46.65 m

1.

Arkivert.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	g/t Ag	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. tildels kv.rik svak, impr. Sl,Cp,Gn,Py		0,13	0.23	0,42	3.8	4.2	
0.50 - 0.95	0.45	Pegm.			0.09	0.56	0.09	1.3	0.8	
0.95 - 4.30	3.35	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.tildels kv.rik veksl. m/parti 2 gl.gn.b.d. hbl. og skarnførende parti fortrinnsvis m/impr. Sl, Cp,Am, Py	50°	1,04	0.32	3.71	12,6	5,0	0.95-2.50
					0.75	0.32	2,61	14.7	5.8	
4.30 - 5.70	1.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/parti biot.gn. tildels hbl.førende fortrinnsvis m/god impr. Sl,Cp,Gn,Py	60°	1.32	0.33	5.50	20.9	9,6	
5.70 - 6.90	1.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik, spor hbl. og skarn. god impr. Sl,Cp,Gn,Py	60°	1.52	0.36	3.57	31.5	5.5	
6.90 - 7.90	1.00	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. spor hbl. impr. Sl,Cp,Gn,Py,Po.	60°	0,17	0.49	1.20	10,0	8.9	
7.90 - 8.90	1.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik,bandet m/ 2 gl.gn.b.d. Svak impr. Sl,Cp,An.Py	60°	0,17	0.14	0.50	4.4	3,5	
8.90 - 10.00	1.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spr.gr. tildels rik. 1-3 mm.		0,02	0,01	0.03	0,9	2,6	
10.00 - 10.30	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. impr. Sl.Cp,Gn,Py		1.50	0.18	3.41	29.5	3.3	
10.30 - 12.00	1.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik, spor gr. ved 10.60 og 11.20 cm-bred band Sl, svak impr. Py		0,10	0.06	0.23	4.3	2.1	

RANA BLADE TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 631

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
12.00 - 12.30	0.30	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk. spor hbl. og skarn. impr. Sl,Cp,Gn,Py		0,24	0,25	1,75	13,8	4,8	
12.30 - 12.80	0.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik,spor gr. svak impr. Py		0,08	0,08	0,18	3,7	2,4	
12.80 - 13.75	0.95	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. og skarn. „Striper impr. Sl, Cp,Gn,Py		0,60	0,19	1,69	26,8	4,3	
13.75 - 20.30	6.55	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor gr. fra 18.40-18.50 impr. Cp,Po	60°	0,02	0,03	0,12	2,9	2,6	13,75-15,00
					0,03	0,02	0,07	14,1	3,0	15,00-16,50
					0,01	0,03	0,07	1,6	3,2	16,50-19,30
20.30 - 21.60	1.30	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. tildels m/ hbl. og spor Sl,Cp, god impr. Py	60°	0,01	0,01	0,01	0,9	3,2	19,30-20,30
					0,08	0,08	0,94	3,7	8,8	
21.60 - 27.60	6.00	Pegm.								
27.60 - 27.85	0.25	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. god impr. Py.							
27.85 - 28.10	0.25	Pegm.								
28.10 - 28.70	0.60	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. veksl. m/ dm brede pegm.band. tildels m/hbl. god impr. Py, Po	60°						
28.70 - 29.00	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor gr. god impr. Py	60°						
29.00 - 35.30	6.30	Biot.-hbl.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/parti skarn og pegm. tildels spr. gr. 1-3 mm. impr. Py	60°						
35.30 - 37.00	1.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. fra 36.25 - 36.35 kv. spor gr. svak impr. Py	60°						

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Borehull: 631

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve nr
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
37.00 - 41.50	4.50	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. tildelsrik 1-5 mm. Svak impr. Py	60°						
41.50 - 46.65	5.15	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk-grovk. Spr. gr. 1-2 mm. spor hbl. god impr. Py.	60°						

25/1 1980
Holger Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.570

Borehull: 630

Dato : Jan. 80
Koordinater : y: 44.569 X: 925.434
Retning : Lodd
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 95 m
Lengde : 22.10 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S/Ag/Co	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.30	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels biot. rik, (biot.gn.) svak impr. Sl,Cp,Py	60°	0,57	0,39	0,99	16,3	5.1	
0.30 - 0.50	0.20	Pegm.								
0.50 - 2.70	2.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. grovk. veksl. m/1-2 dm.brede biot.gn.-band. Svak impr. Sl,Cp, tildels god impr. Py.	60°	0,26	0,31	0.94	9.0	5,9	0,50-1.50
					0,24	0.31	1.83	8.1	5.5	1.50-2,70
2.70 - 3.90	1.20	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. hbl.skarn førende, god impr. Sl,Cp,Py	60°	0,21	0,34	4.88	10,2	6,7	
3.90 - 7.40	3.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. veksl. m/dm-brede biot.gn.band. fortr.-vis m/hbl. Svak impr. og spr. striper Sl,Cp,Gn,Py	60°	0.26	0.25	1.05	7.5	3.9	3.90-5.00
					0,32	0.20	0,82	7,2	3.8	5.0-6.0
					1.00	0,31	2,81	21,6	3,3	6.00-7,40
7.40 - 12.20	4.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys, mlk. veksl. m/dm-brede band 2 gl.gn.b.d. Spr. gr. svak impr. Py	70°	0.05	0.04	0.08	4.3	1.5	7,40-8.40
12.20 - 12.90	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. impr. Py	70°						
12.90 - 13.80	0.90	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik. Spor gr.							
13.80 - 15.60	1.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk, mlk. svak impr. Py	70°						
15.60 - 17.60	2.00	Pegm.								
17.60 - 22.10	4.50	Biot.-hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm Impr. Py. ved 18.05 spor Sl.	70°						

22.1. 1980
Holger Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.570 Oppbevart

Borehull: 629

Dato : Des. 79
Koordinater : X: 44.580 Y: 925.481
Retning : N
Helling/stigning: - 40°
Høyde : - 99 m
1. Lengde : 140.30 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.80	0.80	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. tildels kv.rik svak impr. Py	50°						
0.80 - 1.75	0.95	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl.førende. spr. gr. 0.5 - 3 mm. impr. Py	50°						
1.75 - 6.75	5.00	hbl.gn.	Mørk,mlk. rel.massiv, gr.rik 1-10 m stichtolitisk. Svak impr. Py	50°						
6.75 - 9.25	2.50	Hbl.gn.	Mørk,mlk. enkelte partier m/2 gl.gn.b.d. hbl.før. Spor anhydritt ved 7.75 gr.førende 1-3 m. svak impr. Py.	50°						
9.25 - 14.85	5.60	hbl.gn.	Mørk,mlk. tildels mass. gr.førende 1-3 m. Veksl. med stichtolitiske partier gr. 1-5 m. Impr. Py	50°						
14.85 - 17.30	2.45	Amf.	Mørk,mlk. hom. Spredte gr. 1-3 m	50°						
17.30 - 19.50	2.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. svakt hbl. førende. Spredte gr.1-3m Svak impr. Py	50°						
19.50 - 20.80	1.30	hbl.gn.	Mørk,mlk. spor gr. Py	50°						
20.80 - 23.80	3.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl. førende. Enkelte cm-tykke pegm.band. Spor gr. 1-3 m Py	50°						
23.80 - 26.40	2.60	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. spor gr. 1-2 m	50°						

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 629

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
26.40 - 26.70	0.30	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk. cm.tykke pegm. band, spredte gr. 1-3 mm Svak impr. Py	50°						
26.70 - 31.50	4.80	2 gl.gn.	Lys, mlk. enstaka cm̃ dm brede hbl.gn.band. Spor gr. 1-2 m i hbl.bandene gr.førende 1-3 mm.	50°						
31.50 - 32.60	1.10	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk,enkelte hbl.-førende band.	50°						
32.60 - 40.00	7.40	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. enstaka dm.brede hbl.gn.band. Spredte gr. 1-2 mm.	50°						
40.00 - 42.90	2.90	Hbl.gn.	Mørk,mlk. Amf.preget gr.-førende tildels rik. Enstaka 5-10 1-5 mm Spr. cm-brede pegm.band.	50°						
42.90 - 43.35	0.45	Pegm.								
43.35 - 59.20	15.95	Amf.	Mørk,mlk. vekslende med hbl.gn. med amf.preg. Gr.førende tildels rik 1-10 mm. Stichotolitisk fr 56.10 - 56.55.	50°						
59.20 - 62.20	3.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm Tildels Stichotolitisk	40°						
62.20 - 66.70	4.50	Amf.	Mørk,mlk. vekslende m/hbl. gn, gr.førende tildels rik 1-3 mm	40° 50°						
66.70 - 94.30	27.60	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/amf. parti.gr.førende tildels rik 1-5 mm.Spr. cm-dm-brede pegm.band.	40° 50°						

KAN-A BLAUS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 629

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
94.30 - 101.80	7.50	Amf.	Mørk, mlk. vekslende m/ hbl.gn. førende 1-3 mm	40°						
101.80 - 140.30	38.50	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/parti amf. og cm-dm.brede pegm. band. gr.førende 1-3 mm.	35°						

22/1 1980
H. Pancdalsli

RANA BLADD TRYKKERI

Lokalitet: 44 570

Borehull: 628

Dato : Nov. 79
Koordinater : X: 925.434 y: 44.570 ca.
Retning : Indd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 99
Lengde : 14.50 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.40	0.40	Biot.gn.	Mørk,grønnl.mlk. god impr. Py							
0.40 - 4.30	3.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede pegm.bånd, spor gr., ved 0.90 spor Sl Svak impr. Py	60°						
4.30 - 4.50	0.20	Pegm.								
4.50 - 5.80	1.30	Biot.gn.	Mørk,mlk. hbl.førende, spr. gr. 0,5-1 mm. Svak impr. Py	80°						
5.80 - 14.50	7.70	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 0.5-3 mm. Svak impr. Py.	80°						

6.12. 1979

H. Pantdalsli

KAHA BLADI TRYKKERI

Lokalitet: 44 570

Borehull: 627

Dato : Nov. 79.
Koordinater : X: 925.405 Y: 44.570
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 99
Lengde : 10.45 m.

4 immaer

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 4.50	4.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.tildels hbl. førende. spor gr. Svak impr. Py.	80°					
4.50 - 5.60	1.10	Hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. spr. gr. 1-5 mm. Svak impr. Py						
5.60 - 8.40	2.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl. førende. spor gr. impr. Py	80°					
8.40 - 10.45	2.05	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spr. gr. 0.5-3 mm. Svak impr. Py	80°					

13.12. 1979
H. Pedersen

NORA BERGS TRYKKERI

Lokalitet: 44 570

Borehull: 626

Dato : Nov. 1979
Koordinater : X: 925.392 Y: 44.570 ca.
Retning : S
Helling/stigning: + 45°
Høyde : - 94,5
Lengde : 29,65 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 5.10	5.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/dm-brede hbl.gn.bånd. Fortrinnsvis m/spr. gr. 1-5 mm. Svak impr. Py	40° 50°						
5.10 - 5.70	0.60	Pegm.								
5.70 - 7.10	1.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende. spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	50°						
7.10 - 8.00	0.90	Pegm.								
8.00 - 19.70	11.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.-grovk. hbl.-førende, vekslende m/1-2 dm-brede hbl.gn.bånd. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	50° 60°						
19.70 - 21.50	1.80	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/dm-brede pegm.bånd. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	50° 60°						
21.50 - 23.95	2.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede pegm.bånd. Rel. hbl.førende. spr. gr. 1-3 mm Svak impr. Py	50° 60°						
23.95 - 24.45	0.50	Pegm.								
24.45 - 26.00	1.55	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	50°						
26.00 - 29.65	3.65	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk.vekslende m/ dm-brede 2 gl.gn.b.d. bånd Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	60°						

11.12. 1979
H. Pantdalsli

NANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.570

Borehull: 625

Dato : Nov. 1979
Koordinater : X: 925.450 y: 44.576 ca.
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 99.0 ca.
Lengde : 80,0 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 3.20	3.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/dm brede pegm.band. Spor Sl ved 0.30. Impr. Py	70°						
3.20 - 7.70	4.50	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk, vekslende m/ dm brede Hbl.gn.band fortrinnsvis gr.førende 1-3 mm. Tildels god impr.Py	60° 70°						
7.70 - 16.00	8.30	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/parti 2 gl.gn.b.d. Spr. gr. 1-3mm Svak impr. Py	70°						
16.00 - 19.70	3.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	70°						
19.70 - 22.40	2.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. Spr. gr. 1-3mm	80°						
22.40 - 32.00	9.60	Hbl.gn.	Mørk,mlk. Spr. gr. 1-5 mm	80°						
32.00 38.00	6.00	2 gl.gn.b.d.	Rel. mørk, mlk. vekslende m/cm-dm-brede band hbl.gn. Spr. gr. 1-3 mm.	80°						
38.00 - 80.00	42.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/dm-brede band 2 gl.gn.b.d. Spr. gr. tildels rik 0,5-3 mm.	60° 80°						

23/11 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44570

Borehull: 624

Dato : Okt. 79-
Koordinater : X: 925.419 Y:44.570
Retning : S
Helling/stigning: + 60°
Høyde : − 95,5
Lengde : 15,60 m

Dybde	L	Bergart		S °	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 2.50	2.50	2 gl gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. veksl. m/ dm-brede band 2 gl.gn.alm. Spor gr. svak impr. Py	50° 60°	0.05	0,17	1,85		6,10	1.50-2.50
2.50 - 3.30	0.80	"	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ biot.rike parti, spor hbl. impr. Cp, Po	55°	0,00	0,57	0,72		12,00	
3.30 - 4.50	1.20	"	Rel. mørk,mlk. spor hbl.gr. Svak impr. Py,Po	55°	0,00	0,09	0,09		5,50	
4.50 - 5.60	1.10	Biot.-hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. spor gr. impr. Py, Po	55°						
5.60 - 5.90	0.30	Pegm.								
5.90 - 6.80	0.90	Biot.gn.	Mørk,mlk. spor gr. Svak impr. Py.							
6.80 - 7.00	0.20	Pegm.								
7.00 - 8.05	1.05	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. tildels kv.rik. Impr. Sl,Cp,Po	55°	0,01	0,34	1,43		9,90	0
8.05 - 14.75	6.70	Pegm.								
14.75 - 15.60	0.85	Biot.-hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm Impr. Py							

14.11. 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.670

Borehull: 623

Dato : Okt. 79
Koordinater : X: 925 419,5 y: 44 570 ca:
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 99.0
Lengde : 14.60 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl.-førende, m/striper. Impr. Sl, Cp, Gn, Py	80°	2,70	0,18	4,74		5,40	
0.50 - 1.00	0.50	"	Rel.mørk,mlk. tildels hbl-førende. Spr. gr. 0.5-2 mm Svak impr. Py	80°	0,11	0,03	0,11		4,40	
1.00 - 1.40	0.40	"	Rel.mørk,mlk. tildels hbl-førende, striper impr. Sl, Cp, Gn, Py.	80°	1.01	0,34	3,28		8,10	
1.40 - 2.80	1.40	"	Rel.mørk,mlk. spor hbl. Spr.gr. 0.5-2 mm, ved 1.60 spor Sl, svak impr. Py	80°	0,03	0,05	0,29		3,90	
2.80 - 3.00	0.20	Pegm.								
3.00 - 3.90	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spr. gr. 0.5-2 mm. Ved 3.35 spor Sl	80°						
3.90 - 4.50	0.60	Pegm.								
4.50 - 8.90	4.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. veksl. m/dm-brede hbl.gn.band. fortrinnsvis gr.førende 1-3 mm. Tildels god impr. Py.	80°						
8.90 - 14.60	5.70	Hbl.gn.	Mørk,mlk. tildels m/dm-brede pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm Svak impr. Py	80°						

14.11. 1979
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44570

Borehull: 622

Dato : Okt. 1979
Koordinater : X: 925.392 y: 44.570 ca:
Retning : S
Helling/stigning: - 45°
Høyde : - 99
Lengde : 91.0 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.20	1.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl.førende, m/dm-brede pegm.band. impr. Sl,Py	50°	0,85	0,17	4,24		4,90	
1.20 - 1.70	0.50	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.spor gr. svak impr. Py	50°	0,06	0,05	0,28		2,20	
1.70 - 2.50	0.80	"	Lys,mlk. tildels hbl.førende impr. Sl,Cp,Gn,Py	50°	0,89	0,59	2,44		7,40	
2.50 - 3.80	1.30	"	Lys,mlk.spor hbl. gr. svak impr. Py	50°	0,03	0,03	0,09		2,10	
3.80 - 12.10	8.30	Hbl.gn.	Mørk,mlk.enkelte cm-dm-brede pegm.band. God impr. Py.	50°						
12.10 - 12.65	0.55	Pegm.								
12.65 - 22.00	9.35	Hbl.gn.	Mørk, mlk. vekslende m/biot og hbl.rikere parti. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	50°						
22.00 - 27.00	5.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.-fink. Tildels kv.rik.vekslende m/cm-dm-brede hbl. biot.rike band, fortrinnsvis m+spr. gr. 0,5-3 mm.	50°						
27.00 - 35.00	8.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk.enkelte cm-brede pegm.band. Gr.førende 1-3mm	50°						
35.00 - 41.80	6.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk, enkelte cm-dm-brede pegm.band, tildels hbl.førende, spr. gr. 1-3mm	50°						

SANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 622

2.

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
41.80 - 54.60	12.60	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/ 2 gl.gn.b.d. og enkelte pegm.band, gr.førende 1-3 mm	50° 55°						
54.60 - 55.10	0.50	Pegm.								
55.10 - 91.00	35.90	Hbl.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/biot. rike parti og enkelte dm-brede pegm.band. gr.førende 1-3 mm.	50°						

13/11 1979
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43.440

Borehull: 621

Dato : Sept. 79
Koordinater : X: 925.485.5 Y: 43.440
Retning : S
Helling/stigning: ~~-5~~ 60°
Høyde : ~~60°~~ -31m
Lengde : 34.45 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende, god impr. Sl,Cp,Gn,Py.	40°	2,45	0,32	6,87		3.0	
0.50 - 5.00	4.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	40°	0.02	0.01	0.11		1.5	0,50-4,50
5.00 - 5.40	0.40	TAP								
5.40 - 15.70	10.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. Spr. gr. 1-3 mm. Enkelte dm-brede kv.band, ved 15.40 5 cm. band m/impr. Sl.	40°						
15.70 - 16.10	0.40	Kv.								
16.10 - 16.80	0.70	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm Svak impr. Py	40°						
16.80 - 23.40	6.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels m/ dm-brede hbl.gn. og pegm. band. Spr. gr. 1-3 mm.	40°	0.00	0.05	0.09		2,1	22,40-23,40
23.40 - 24.60	1.20	Biot.gn.	Mørk,grovk.-mlk. Hbl.før. Impr. Sl,Cp,Py	50°	0,33	0,56	1.23		7,4	
24.60 - 28.00	3.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm.	50°	0.01	0.03	0.06		1.6	24,60-25,60
28.00 - 29.00	1.00	Pegm.								
29.00 - 33.20	4.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. enkelte dm-brede biot.gn.band. Spr. gr. 1-3 mm.	50°						
33.20 - 34.30	1.10	Pegm.								
34.30 - 34.45	0.15	Biot.gn.	Mørk,mlk. hbl.førende	50°						

6/9 1979
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 43.440

Borehull: 620

Dato : Aug. -79
Koordinater : Y: 925.435.5 X: 43.440
Retning : S
Helling/stigning: - 12°
Høyde : - 31 m
Lengde : 16.75 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik. 1/2 2/2 malm Sl,Gn,Cp,Py	0°	2,10	0,38	14,4		3.5	
0.70 - 6.40	5.70	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grov. vekselnde hbl. innhold. Litt undulerende, stripet Sl,Gn,Cp Py	0-5°	2,70	0,27	10,50		2,9	0,70-2,70
				0°	1,36	0,28	4,80		5,8	2,70-4,70
					0,90	0,58	2,80		5,1	4,70-6,40
6.40 - 12.80	6.40	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk-grov. Vekslende biothbl.,hblbiot. gn. även hbl.gn.band. Spredte gr. 1-3 mm fortrinnsvis i de hbl.rikere partier Imp. Py.	0-5°	0,01	0,10	0,09		5,7	6,40-7,60
12.80 - 13.25	0.45	Hbl.gn.	Mørk,grov,gr.rik 1-5 mm stichtolitisk							
13.25 - 16.75	3.50	Hbl.gn.	Mørk,mlk-grov. gr.førende 1-3 mm. Tildels grørik Enkelte dm-brede biot.rike partier. Rel.mass. Impr.Py	0-5°						

6/9 1979
Stellan Burmun

RANA BLADS TRYKKERI

Ikke innmålt

Lokalitet: Profil 43.440

Borehull: 619

Dato : Aug. 79
Koordinater : x: 925.435.6 x: 43.440
Retning : S
Helling/stigning: Horisontal
Høyde : - 31 m
Lengde : 10.80 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.70	1.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. kv.rik, tildels hbl.førende, Striper impr. Sl,Cp,Gn,Py	30°	1.70	0.66	5.45		5.7	
1.70 - 6.50	4.80	"	Rel.mørk,mlk. tildels hbl.førende, spredte gr. 0,5 - 2 mm. Impr. Py	30°	0.09	0.15	0.27		6.8	1.70-2.70
6.50 - 10.05	3.55	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.rik 1-5 mm. Stichtolitisk							
10.05 - 10.80	0.75	Hbl.gn.	Mørk,mlk. svak impr. Py	30°						

6/9 1979
H. Pantdalsli

Ikke innmålt.

Lokalitet: Profil 43.440

Borehull: 618

Dato : Aug. 79
Koordinater : X: 925.435.5 m Y: 43.440
Retning : S
Helling/stigning: - 35°
Høyde : - 31 m
Lengde : 30.50 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 2.20	2.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. hbl.førende, tildels skarn. god impr. Sl,Gn,Cp,Py.	20° 30°	2.90	0.22	8,80		7.5	
2.20 - 2.50	0.30	Pegm.	Spor Sl,Cp.		0,43	0,33	0.70		1,6	
2.50 - 4.00	1.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. tildels hbl-førende, kv.rik, impr. Sl,Cp,Gn,Py	25°	0.46	0,17	1,46		2.6	
4.00 - 6.50	2.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. kv.rik, spr. gr. 1-3 mm. impr. Py.	25°	0,01	0,01	0.55		1,5	
6.50 - 7.90	1.40	2 gl.gn.alm.	Tildels hbl.førende Svak impr. Sl,Cp,Gn,Py.	30°	0,18	0,17	0,92		2.8	
7.90 - 13.90	6.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spr. gr.1-3mm Svak impr. Py	25° 30°	0,01	0,01	0,02		1.4	7.90 - 9.00
					0,03	0,07	0,01		1.7	12.90 - 13.90
13.90 - 23.90	10.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. svakt ondu-lerende, tildels hbl.før. kv.rik, god impr. Sl,Cp, Gn,Py	20° 25°	0.33	0.67	2.39		8.9	13.90 - 15.90
					0.74	0,13	3.57		2.4	15,90 - 17.90
					0,40	0.75	2.17		7.5	17.90 - 19.90
					0.92	0,57	9,00		8.3	19.90 - 21.90
					0.35	0,63	4.02		5.6	21.90 - 23.90
23.90 - 25.00	1.10	Tap								
25.00 - 30.50	5.50	2 gl.gn.alm.	Rel. lys,mlk. Hbl.førende tildels m/skarn, god impr. Sl,Cp,Gn,Py	25°	0.78	0.36	5.22		7.0	25.00 - 27.00
					1.00	0,15	9.50		7.7	27.00 - 29.00
					0.55	0.20	6.20		7.0	29.00 - 30.50

6/9 1970
H. Pantdalsli

PANA BLADI TRYKKERI

Lokalitet: 43.440

Borehull: 617

Dato : Aug.-79
Koordinater : X: 925.435.5 X: 43.440
Retning : S
Helling/stigning: - 25°
Høyde : - 31 m
Lengde : 20.00 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
					1,60	0.08	10,74		6,9	0.00-2.00
					1,70	0.55	13,78		9.7	2.00-4.00
0.00 - 11.70	11.70	2 gl.gn.alm. (malm)	Rel. lys,mlk. enkelte dm-tykke hbl.band. God malm. Sl,Cp,Gn,Py	10 - 20°	1,70	0,15	11,42		8,0	4.00-6.00
					4,10	0,02	17,66		13.7	6.00-8.00
					4,90	0.02	16.54		12.6	8.00-10.00
					4.20	0,10	16,00		10,9	10.00-11.70
11.70 - 17.80	6.10	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spor hbl. Enstaka dm-tykke hbl.band. Enstaka gr. 1-3 mm.	15°	0.08	0.24	0.65		5.8	11.70-12.70
17.80 - 20.00	2.20	Hbl.gn.-	Mørk mlk. gr.rik 1-10 mm Stichtolitisk							

6/9 1979
Stellan Burman

FANA BLADS TRYKKERI

Ikke innmålt.

Lokalitet: 43.440

Borehull: 516

Dato : Aug. 79
Koordinater : X: 975.435.5 X: 43.440
Retning : ~~30°~~ S
Helling/stigning: ~~S~~ 30°
Høyde : ~~34.90 m~~ 31 m
Lengde : 34.90 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.65	0.65	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. m/spor hbl. rel. svak impr. Sl,Cp,Gn, Py	10°	0,55	0.18	2.21		11.20	
0.65 - 3.80	3.15	Malm	Tildels hbl.førende, rel. kompakt Sl,(lys)Cp,Gn,Py	5° 10°	3.70	0,03	17.04		9.20	
3.80 - 5.80	2.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. m/spor hbl., rel. svak impr. Sl,Cp,Gn, Py	0 5°	0.67	0,15	1,50		2.80	
5.80 - 8.50	2.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-fink. kv.rik, spor gr., hbl. enkelte parti svak impr. Sl,Cp,Py	5°	0,74	0,24	1.99		4,00	
8.50 - 9.30	0.80	TAP			0,71	0,29	2,03		4.40	9,30 - 11,30
9.30 - 16.50	7.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl-førende, impr. Sl,Cp,Gn,Py	5°	0.17	0.32	2.12		6.00	11.30 - 13.30
					0.80	0.34	3.74		6.90	13.30 - 16.50
16.50 - 32.80	16.30	Malm	Tildels hbl.førende, m/spr. anhydritt, god malm tildels kompakt Sl,Cp,Gn, Py	5°	8.90	0,08	17.88		10.10	16.50 - 19.50
					4,30	0,06	23,92		13.70	19.50 - 22.50
					3.80	0,04	21.12		12.00	22.50 - 25.50
					3,10	0.16	13.84		9,40	25.50 - 28.50
					4.30	0,06	22.52		14.20	28.50 - 31.50
					4.40	0.04	18.52		9.40	31.50 - 32.80
32.80 - 34.90	2.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. m/spor hbl. rel. svak impr. Sl,Cp,Py	5°	0.44	0.64	1,52		6.50	

29/8 1979
H. Pantdalsli

BANG BLADS TRYKKERI

Ikke innmålt.

Lokalitet: Profil 43.440

Borehull: 615

Dato : Aug. -79
Koordinater : x: 925.435.5 y: 43.440
Retning : S
Helling/stigning: 40°
Høyde : -31 m
Lengde : 30,0 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.70	1.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.-fin. kv.rik ved 0.30 - 0.40 skarn. Stripet impr. Sl,Gn,Cp,Py	20°	1,43	0,58	5,08		5,00	
1.70 - 2.30	0.60	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-grov. litt onduler-ende (fjällig) Svak impr. Py,Sl	20° 0°	0,14	0,14	0,33		2,10	
2.30 - 3.15	0.85	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.-fin. kv.rik Impr. Sl,Gn,Cp,Py	0-20°	1,74	0,22	4,15		3,30	
3.15 - 4.00	0.85	2 gl.gn.alm.	Lys,fink. kv.rik. mass. svak impr. Py		0,08	0,05	0,32		2,00	
4.00 - 5.40	1.40	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. rel.kv.rik Spr. gr. 1-2 mm.	20°	0,11	0,05	0,32		1,90	
5.40 - 6.50	1.10	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. kv.rik. Spredte gr. 1-2 mm. Impr. Sl,Gn,Cp,Py	20°	0,66	0,14	1,42		3,00	
6.50 - 14.60	8.10	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. kv.rik. enkelte gr. 1-3 mm.	30° 40°	0,05	0,02	0,09		1,50	6.50-7.50
14.60 - 17.40	2.80	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. senstaka gr. 1-3 mm. spor Py	30°	1,07	0,22	0,48		5,40	16.40-17.40
17.40 - 19.05	1.65	2 gl.gn.	Rel.lys,mlk-grovk. vekslende med kv.bånd Pegm,skarn.striper., Impr. Sl,Cp,Gn,Py.		0,42	0,84	3,43		4,10	
19.05 - 20.60	1.55	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. kv.rik enkelte gr. 1-3 mm. spor Py.	30°	0,09	0,05	0,30		1,80	
20.60 - 26.50	5.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk.mlk-grov. litt varierende med nigtrikere partier og hbl.skarn. str. tild.god malm,Sl,Gn,Cp,Py,Po	30° 20°	0,86 0,97	0,92 0,61	3,79 5,06		8,40 7,70	20.10-23.60 23,60-26,50

LAXÅ BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 615

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
26.50 - 27.80	1.30	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enkelte små gr. 0,5-1,0 mm. Svak impr. Py	35°	0,08	0,05	0.33		1,40	
27.80 - 28.60	0.80	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-2 mm. impr. Sl,Gn,Cp,Py	35°						
28.60 - 29.15	0.55	Pegm.			0.10	0,06	2.15		1,90	
29.15 - 30.00	0.85	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. rel.kv.rik Spr. gr. 1-2 mm. spor Py	35°						

29/8 1979
Stellan Borman

TANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43.440

Ikke innmålt.

Borehull: 614

Dato : Aug. -79
Koordinater : X: 925.435,5 Y: 43.440
Retning : S
Helling/stigning: - 50°
Høyde :
Lengde : 12.15 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.50	0,50	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. Impr. Sl,Py,Cp	40°	1.28	0,33	4,24		4,00	
0.50 - 1.80	1.30	2 gl.gn.alm.	Lys, mlk-fin. kv.rik. Svak impr. Py, Sl	35°-40°	0.29	0,08	1,31		2.40	
1.80 - 12.15	10.35	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. tildels kv.-rik. enkelte dm.tykke partier 2 gl.gn.alm. (ved.2.90 -.2.95 Sl) Spor gr. 1-2 mm. Spor Py	40° 30°						

29/8 1979
Stellan Burman

TANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43.830

Borehull: 613

Dato :
Koordinater : X: 925. 411,7 Y: 43.827,3
Retning : N
Helling/stigning: – 50°
Høyde : – 61,2
Lengde : 35,45 m.

1

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 6.00	6.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spor gr. svak impr. Py	50° 60°	0.12	0.05	0.29		2.00	5.00-6.00
6.00 - 7.60	1.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/hbl.førende band. Striper, impr. Sl,Cp,Gn,Py	60°	1.01	0,50	3.08		6,50	
7.60 - 9.00	1.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. tildels kv.rik enkelte hbl.førende band. m/impr. Sl,Cp,Gn,Py	50° 60°	0,37	0.50	0,94		3,90	
9.00 - 10.50	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende god impr. Sl,Cp,Gn,Py.	55°	1.17	1.06	2,93			
10.50 - 12.00	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor gr. svak impr. Py	60°	0.07	0.08	0.19		3,1	
12.00 - 12.50	0.50	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. svak impr. Py	60°						
12.50 - 13.00	0.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. svak impr. Py	60°	0,02	0.09	0.33		4.5	
13.00 - 15.50	2.50	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. vekslende m/dm brede pegm.band. Vekslende impr. Sl,Cp God impr. Py, Po.	60°	0,03	0,52	0,47		10,1	
15.50 - 16.70	1.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor gr.	60°	0.07	0.04	0.04		2.20	
16.70 - 17.00	0.20	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. svak impr. Py	60°						
17.00 - 17.50	0.50	TAP								
17.50 - 19.70	2.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. svak impr.Py	50°	0,03	0.06	0.09		3,2	1900-1970
19.70 - 21.70	2.00	" "	Enkelte striper Sl,Cp,Py,Po	60°	0.24	0,40	0.68		5,6	
21.70 - 22.50	0.80	Pegm.			0.06	0,20	0,16		1.5	

NORA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 613

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
22.50 - 24.50	2.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spor gr. Svake spor Sl,Cp,Py	60°	0,12	0,14	0,28		2,7	
24.50 - 25.30	0.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende rikdels god impr. Sl,Cp, Gn,Py	60°	0,71	0,48	5,12		9.0	
25.30 - 26.90	1.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor gr. svak impr. Py.	60°	0.09	0,21	0,19		3.4	
26.90 - 27,60	0.70	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. impr. Sl, Cp,Py,Po	60°	0,17	0,67	2,60		10.6	
27.60 - 29.50	1.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk.mlk. vekslende m/hbl.førende band. forrr. vis m/impr. Sl,Cp,Gn,Py	60°	1.08	1.19	4.58		7.0	
29.50 - 35.45	4.95	" "	Rel. mørk, mlk. m/spor hbl. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr Py.	60°	0,10	0,18	0.07		3,5	29.50-35.45

6/7 1979
H. Pantdalsli

ANA BLADS (XY-1-EP)

Lokalitet: Profil 48.830

Borehull: 612

Dato : Juni 79
Koordinater : x: 925 411,2 y: 43.827,4
Retning : N
Helling/stigning: + 45°
Høyde : - 57,5
Lengde : 32,40 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 9.60	9.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ dm-brede band pegm. spor gr. Ved 0.60 spor Sl.	55°	0,23	0.05	0.28		1.70	8.60-9.60
9.60 - 10.00	0.40	" "	Enkelte hbl.førende band, fortrinnsvis m/impr. Sl,Cp Py.	55°	0,28	0,17	1.09		2,20	
10.00 - 11.35	1.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl-førende, striper impr. Sl,Cp,Gn.Py.	50° 60°	1.70	0,85	5,41		7.60	
11.35 - 12.85	1.50	" "	Enkelte hbl.førende band fortrinnsvis m/impr. Sl, Gn, Py.	50° 60°	0,67	0,38	2.01		3,90	
12.85 - 16.10	3.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede band pegm. Spor gr.	60°	0,08	0,05	0,13		2.00	12,85-13,85
16.10 - 16.60	0.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spor gr. svak impr. Py	60°	0,12	0,18	0.08		1,50	
16.60 - 17.20	0.60	Musk.gn.	Lys,mlk-grovk. ondulerende impr. Sl,Cp,Gn,Py		0,32	0,23	0,19		4,50	
17.20 - 22.00	4.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl-førende god impr. Sl,Cp,Gn.Py	60°	1.14	0.88	4.14		4.40	17,20-18,50
					1.10	0,41	4.51		7.30	19,52-22,00
22.00 - 22.30	0.30	Pegm.								
22.30 - 22.45	0.15	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk. hbl.førende god impr. Sl,Cp,Py		0,79	0.20	6,77		6,50	
22.45 - 22.70	0.25	Pegm.								
22.70 - 28.20	5.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ hbl.førende parti, spr. gr 1-3 mm. Svak impr. Py. Ved 27.70 spor Sl	60°	0,32	0.07	0,10		4.30	22,20-23,20

HAGA BLADS TRYCKERI

Lokalitet:

Borehull: 612

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
28.20 - 32.40	4.20	Bbl.gn.	Mørk,mlk.spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	60°						

6/7 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 43.830

Borehull: 611

Dato : Juni - 79
Koordinater : X: 925.411,2 Y: 43.827,3
Retning : N.
Helling/stigning: + 70°
Høyde : -57,0
Lengde : 20.0 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 3.40	3.40	2 gl.gn.alm.	Lys, rel. kv.rik, enkelte gr. 1-2 mm. Sl som enstaka cm tykke band. Svak impr. Py	65° 70°	0.11	0.06	0.42		1.90	
3.40 - 3.85	0.45	Pegm.								
3.85 - 5.20	1.35	2 gl.gn.alm.	Lys kv.rik enstaka biot. skikt., spredte gr. 1-3 mm Spor Py	60°	0.04	0.03	0.19		2.00	
5.20 - 5.35	0.15	Pegm.								
5.35 - 6.30	0.95	2 gl.gn. m/skarn	Rel.lts,mlk-grovk. vekslende m/diopsid(skarn) samt enkelte filmtynne biotskikt. Stripet malm. Sl,Gn,Cp,Py.	70°	0,19	0,40	2.60		4.10	
6.30 - 12.50	6.20	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. partier m/ 2 gl.gn. alm. enstaka gr. 1-2 mm. Spredte striper og band Sl,Cp,Gn,Py	60°	0,35	0.25	2,51		4.60	6,30-8,30
				70°	0,42	0,14	1.00		2,80	8.30-10,30
					0,52	0,21	2,48		3,30	10,30-12,30
12.50 - 13.00	0.50	Biot.hbl.gn.	Mørk.rel.grovk. enstaka gr. 1-3 mm. impr. Py. spor Sl?.	70°	0,09	0.25	0,37		7,80	7
13.00 - 14.45	1.45	Hbl.gn.	Mørk,grovk-mlk. spredte gr 1-3 mm. Impr. Py	60°	0,07	0.04	0,20		5,60	
14.45 - 14.55	0.10	Pegm.								
14.55 - 20.00	5.45	Hbl.gn.	Mørk,grovk. Amfibolitiske partier (dm-tykke) impr. Py Gr.førende 1-3 mm.	60° 70°						

6/7 1979
Steilan Burman

Lokalitet: Profil 44.460

Ikke innmålt.

Borehull: 6/0

Dato : Juni 1979
Koordinater :
Retning : S
Heilling/stigning: + 45°
Høyde :
Lengde : 25.80

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 6.40	6.40	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. hbl-førende, Enkelte dm-brede hbl.band Spr.gr. 1-3 mm.Svak impr.Py	60°						
6.40 - 24.20	18.20	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede 2 gl.gn.b.d. band Spr.gr. (23.00-24.00 gr.rik) 1-3 mm. Svak impr. Py	60°						
24.20 - 25.80	1.60	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm Svak impr. Py	60°						

18/6 1979
H. Pantdalsli.

Ikke innmålt.

Lokalitet: Profil 44.460

Borehull: 609

1.

Dato : Juni 1979
Koordinater :
Retning : S
Helling/stigning: - 45°
Høyde :
Lengde : 23.50

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.70	5.70	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende, Spr.gr. 1-3 mm. tildels god impr. Py (vekslende innhold hbl. Py).	40°						
5.70 - 5.90	0.20	Pegm.								
5.90 - 7.30	1.40	2 gl.gn.b.d.	Som forgående	40°						
7.30 - 7.50	0.20	Pegm.								
7.50 - 8.80	1.30	2 gl.gn.b.d.	Som forgående	40°						
8.80 - 9.00	0.20	Pegm.								
9.00 - 10.70	1.70	2 gl.gn.b.d.	Som forgående	40°						
11.70 - 15.10	3.40	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk,enkelte dm-brede hbl.førende band, tildels biot.gn. spr. gr. 0,5-2 mm. Impr. Py	50°						
15.10 - 17.00	1.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.vekslende biot. innhold, spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	50°						
17.00 - 17.20	0.20	Hbl.gn.	Mørk,mlk.gr.rik 1-3 mm. Impr. Py.							
17.20 - 17.40	0.20	Pegm.								
17.40 - 18.70	1.30	Hbl.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/dm-brede band pegm. og 2 gl.gn.b.d. tildels gr.rik 1-3 mm. Impr. Py	50°						
18.70 - 23.00	4.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. små parti svakt undulerende, hbl-førende, spr. gr. 1-3mm Impr. Py	40° 50°						

KANJA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning :
Høyde :
Lengde :

Borehull: 609

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
23.00 - 23.20	0.20	Pegm.							
23.20 - 23.50	0.30	2 gl.gn.b.d. Som forgående							

12/6 1979
H. Pantdalsli

FANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.460

Borehull: 508

Dato : Mai 1979
Koordinater : X: 925.453 Y: 44.460
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : -91.9 m
Lengde : 15.75 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spor gr. Svak impr. Py	60°	0,01	0,08	0,07		2,90	
0.70 - 1.60	0.90	"	Vekslende m/pegm.band, enkelte striper Sl,Gn,Cp Svak impr. Py	60°	0,17	0,23	0,53		6,40	
1.60 - 2.20	0.60	"	Lys, mlk. spor gr.		0,01	0,07	0,13		2,60	
2.20 - 3.70	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede bånd 2 gl.gn. alm. striper impr. Sl, Cp,Gn,Py,hbl.	60°	0,89	0,22	3,75		8,40	
3.70 - 7.60	3.90	"	Rel.mørk,mlk. spr. gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py, Ved 6.30 spor Sl	60° 70°	0,02	0,02	0,13		1,70	3,70-4,70
7.60 - 8.00	0.40	Pegm.								
8.00 - 9.30	1.30	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor gr.	60-70°						
9.30 - 10.65	1.35	Pegm.	m/enkelte dm.brede band 2 gl.gn.b.d.							
10.65 - 11.50	0.85	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.							
11.50 - 13.20	1.70	"	hbl.førende,god impr. Py.							
13.20 - 14.05	0.85	Biot.-hbl.gn.	Mørk,mlk.spr.gr. 1-3 mm Svak impr. Py							
14.05 - 14.50	0.45	Pegm.								
14.50 - 15.75	1.25	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. spr.gr. 0,5-2mm Svak impr. Py.	60° 70°						

8/6 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44 460

Borehull: 607

Dato : Mai 1979
Koordinater : X: 925.455 Y: 44.460
Retning : N
Helling/stigning: + 60°
Høyde : - 88.4 m (c9)
Lengde : 46.20 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.80	1.80	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.tildels hbl-førende Kv.rik, striper,impr. Sl, Cp,Gn,Py.		0,72	0.41	4.26		4.80	
1.80 - 4.50	2.70	"	Kv.rik, spor gr.	50-60°	0.03	0.09	0.15		2.20	1.80-2.80
4.50 - 5.40	0.90	Pegm.								
5.40 - 6.00	0.60	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.kv.rik.							
6.00 - 7.60	1.60	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede pegm.band. Svak impr. Py.	60°						
7.60 - 15.20	7.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. tildels kv.rik spor gr. ved 13.50 og 14.10 spor Sl.	50° 60°	2.01	0.03	0,03		1.70	14,20-15,20
15.20 - 15.70	0.50	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor hbl., Striper impr. Sl.Cp,Gn,Py		0,45	0,20	3,82		5,60	
15.70 - 19.30	3.60	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. hbl.før. Spr. gr. God impr. Py	60°	0.00	0,10	0,22		6,00	15,20-16,20
19.30 - 20.00	0.70	Biot.gn.(sk)	Mørk,grovk. spr. gr. 1-3 mm Impr. Py	60°						
20.00 - 20.80	0.80	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende, Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	60°	0,00	0,06	0,03		5,90	
20.80 - 23.40	2.60	Biot.gn(sk)	Mørk,grovk. hbl-førende, Impr. Sl,Cp,Py,Po	60°	0,00	0,12	1,25		12,20	
23.40 - 24.50	1.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.-grovk. veksl. m/dm-bred biot.sk.band. fortrinnsvis m/striper Sl, impr. Py, Po.	60°	0,08	0,10	0,56		6,40	
24.50 - 25.00	0.50	Pegm.								

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 607

2.

Dato
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
25.00 - 26.80	1.80	Biot.gn(sk).	Mørk,grovk. hbl.førende, vekslende m/dm-brede pegm.-band. Striper impr. Sl,Cp Py,Po.	60°	0.00	0,25	0,23		10,10	
26.80 - 28.10	1.30	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende spor gr. tildels impr. Sl, Cp,Py	60°	0,00	0,06	0,01		4,80	
28.10 - 29.10	1.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk.spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	50°	0,00	0.03	0,00		3,90	
29.10 - 32.00	2.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. hbl.-førende tildels biot.gn. Striper impr. Sl,Cp,Py,Po	60°	0,13	0,17	1.35		2,50	
32.00 - 46.20	14.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.- tildels hbl-førende. Spr.gr. 1-3 mm Vekslende m/dm-brede pegm.-band. Svak impr. Py	50° 60°	0.00	0,02	0,06		1,90	32,20-32,30

8.6. 1979
H. Pantdalsli

KANA BLADS TRYKKERI

Ikke innmålt.

Lokalitet: PROFIL 44.460

Borehull: 606

Dato : Mai 1979
Koordinater :
Retning : N
Helling/stigning: + 60°
Høyde :
Lengde : 53,40 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 6.40	6.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl. gn.bd. Spr. gr. 0,5-2 mm, Svak impr. Py. Fra 6.00 - 6.40 spor hbl. Sl,Py	70°	0,03	0,03	0,16		2,20	5,00-6,00
					0,40	0,45	1,79		2,40	6,00-6,40
6.40 - 7.70	1.30	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/dm-brede band biot.gn. Impr. Sl,Cp,Py,Po	70°	0,00	0,41	0,17		0,80	
7.70 - 8.70	1.00	"	Spor Sl,Cp,Py,Po. Spr. gr. 1-3 mm.		0,00	0,08	0,15		3,70	
8.70 - 13.70	5.00	"	Vekslende m/2 gl.gn.alm. Spr. gr. 0,5-2 mm. Svak impr. Py. Fra 12.80-13.10 spor Sl,Gn,Cp,Py,hbl.	65° 70°						
13.70 - 14.00	0.30	Pegm.								
14.00 - 14.50	0.50	2 gl.gn.alm.	lys,mlk.spor gr. Svak impr Py	70°	0,01	0,02	0,11		1,90	
14.50 - 15.20	0.70	"	Enkelte striper Sl,Cp,Gn, Py, hbl.		1,14	0,31	1,33		3,80	
15.20 - 18.30	3.10	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. impr. Sl, Cp,Py,Po	60°	0,05	0,18	1,11		2,40	
18.30 - 21.00	2.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spor gr.	70°	0,00	0,04	0,11		2,50	19,50-18,50
21.00 - 28.50	7.50	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. enkelte dm-brede pegm.b/md. Spr. gr. 1-3 mm.	60° 70°	0,00	0,04	0,17		2,60	27,50-27,70
28.50 - 30.70	2.20	Biot.gn.	Mørk,grovk.spor hbl. impr. Sl,Cp,Py,Po.	60° 70°	0,07	0,20	2,17		9,50	

Lokalitet:

Borehull: 606

Dato 6(
Koordinater :
Retning :
Heiling/stigning:
Høyde :
Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
30.70 - 32.70	2.00	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. impr. Py. Po. spor Sl	60° 70°	0,04	0,06	0,17		6,10	
32.70 - 37.00	4.30	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk-grovk. vekslende m/cm-dm-brede biot.gn.band. Spr. gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py.	60° 70°	0,00	0,01	0,03		2,60	3330-3345
37.00 - 53.40	16.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. veksl. m/cm-dm-brede band 2 gl.gn. bd. Spor gr. 0.5-2mm. tildels kv.rik og mass.	70°						

8.6. 1979
H. Pantdalsli

KANN BLADS SYKKOS

Lokalitet: Profil 44.460

Borehull: 605

Dato : Mai 1979
Koordinater : x: 925.467.2 y: 44.459.3
Retning : N
Helling/stigning: 45°
Høyde : - 91.5 m
Lengde : 39 m

1

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.40	0.40	Biot.gn.	Mørk, mlk-grovk. hbl.førende Impr. Sl, Cp, Py, Po	50°	0,02	0.38	2.86		11.60	
0.40 - 1.00	0.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk, mlk. vekslende m/ små pegm.band, impr. Py	50°	0.02	0.06	0.13		4.20	
1.00 - 1.20	0.20	Pegm.								
1.20 - 2.90	1.70	Biot.gn.	Mørk, mlk.-grovk, tildels hbl.førende, vekslende impr. Sl, Cp, Py, Po	50° 40°	0.02	0.23	0.59		7.20	
2.90 - 3.20	0.30	Pegm.								
3.20 - 3.70	0.50	Biot.gn.	Mørk, mlk-grovk. tildels hbl.førende, vekslende m/ små pegm.band, spor Sl, Cp Py, Po	40° 50°	0.01	0.36	0.25		7.70	
3.70 - 4.20	0.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk, mlk. svak impr. Py		0.01	0.04	0.21		2.40	
4.20 - 4.55	0.35	Biot.gn.	Mørk, mlk-grovk, hbl.førende Impr. Sl, Cp, Py, Po	50°	0.01	0.16	0.42		8.20	
4.55 - 4.85	0.30	Pegm.								
4.85 - 5.10	0.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk, mlk. spr.gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	40-50°						
5.10 - 6.75	1.65	2 gl.gn.alm.	Lys, mlk-fink. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	40-50°	0.00	0.03	0.05		2.70	4.85-5.85
6.75 - 8.60	1.85	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk, mlk. gr.førende tildels rik 1-3 mm. Svak impr. Py.	40-50°						
8.60 - 9.00	0.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys, mlk, spor gr. Svak impr. Py	50°						
9.00 - 13.00	4.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk, mlk, vekslende m/ hbl.førende parti, spr.gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	50°						

OMÅ BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 605

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
13.00 - 19.70	6.70	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk.vekslende m/ 1-3 dm brede band 2gl.gn.b.d Spr. gr. 1-3 m tildels rik Svak impr. Py.	40°						
19.70 - 22.60	2.90	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.spr. små band pegm. Spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py.	50°						
22.60 - 22.90	0.30	Pegm. ''								
22.90 - 26.60	3.70	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/dm.bred band og 2 gl.gn.alm. Spr.gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	50°						
26.60 - 29.15	2.75	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. vekslende m/striper biot.gn. tildels kv.rik, Spr. gr. 0,5-2 mm.	50°						
29.15 - 29.70	0.55	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.rik 1-3 mm.							
29.70 - 37.60	7.90	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ 1-3 dm brede band 2 gl.gn. b.d. Spr. gr. 1-3 mm.	40° 50°						
37.60 - 39.00	1.40	Hbl.gn.	Mørk,mlk, spr. gr. tildels rik 1-3 mm.	50°						

29/5 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.460

Borehull: 604

Dato : Mai 1979
Koordinater : Y: 925 443.2 X: 44.457.5
Retning : N
Helling/stigning: + 59°
Høyde : - 89 m
Lengde : 42,40 m

1

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. Svak impr. Sl,Cp,Gn,Py	70°	0.88	0.44	2.22		5.60	
0.50 - 2.05	1.55	2 gl.gn.alm.	Rel.lys, mlk. Fra 1.10 - 1,55 spor hbl. svak impr. Sl,Cp,Gn,Py	70°	0.05	0.05	0.15		1.60	0.50-1.10
					1.44	0.46	4.81		6.50	1.10-1.55
					0.05	0.04	0.17		2.00	1.55-2.05
2.05 - 2.50	0.45	Pegm.								
2.50 - 12.00	9.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ enkelte biot.rike band og dm-brede pegm.band. Spor gr. Svak impr. Py.	60°						
12.00 - 14.00	2.00	Biot.gn.	Mørk,grovk.-mlk. svak impr. Py	55°						
14.00 - 14.60	0.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. veksl. m/cm-brede pegm.band. Spor gr. Fra 14.50 - 14.60 spor Sl.	60°						
14.60 - 16.30	1.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.-finK. kv.rik, Spor gr.	55°						
16.30 - 17.30	1.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ biot. ved 16.90 Po.Spor gr.	55°						
17.30 - 18.00	0.70	" "	Hbl.førende m/spor gr. 1-3 mm.							
18.00 - 19.00	1.00	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. Fra 18.30-18.60 biot.sk. Spr. gr. 1-3 mm.	60°						
19.00 - 21.20	2.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende, Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	60°						

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 604

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
21.20 - 22.00	0.80	Biot.gn.	Mørk,mlk. impr. Py		0.38	0.14	1.49		10.40	
22.00 - 22.70	0.70	"	Mørk,mlk-grovk. vekslende m/kv.rike band og spor hbl. Impr. Sl,Cp,Py	50°	0.28	0.10	1.30		11.70	
22.70 - 24.20	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/dm-brede biot.gn.band. spor hbl. gr. svak impr.Py	50°	0,02	0.04	0.25		6.45	22.70-23.70
24.20 - 27.60	3.40	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. tildels gr.-rik 1-3 mm. Svak impr. Py	50°						
27.60 - 29.00	1.40	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. svak ondulerende Spor gr.	50°						
29.00 - 30.20	1.20	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.rik 1-3 mm.	50°						
30.20 - 42.40	12.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende tildels hbl.gn. m/spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	50° 70°						

16/5 1979
H. Pantdalsli

KANIA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.460

Borehull: 603

Dato : Mai 1979
Koordinater : X: 925.443 / Y: 44.458.9
Retning : ~~230°~~
Helling/stigning: Lodd
Høyde : - 92 m
Lengde : 13,90 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.90	0.90	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. Fra 0.00 - 0.05 spor Sl,Cp	70°	0,03	0.10	0,15		2,88	
0.90 - 3.20	2.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/1-3 dm brede band god malm (skarntype)		0,49	0.24	2.00		7.20	
3.20 - 5.05	1.85	" "	Hbl.førende tildels kv.rik, impr. Sl,Cp,Py,Po	70° 80°	0,09	0.24	0,82		5,30	
5.05 - 5.45	0.40	" "	Dpor gr. svak impr. Py	80°	0,01	0,07	0,07		4,30	
5.45 - 7.20	1.75	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/biot.rike parti. Striper impr. Sl,Cp, Py, Po.	80° 60°	0,47	0.35	1.21		6.70	
7.20 - 9.50	2.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-link. kv.rik ved 7.80, 9.20 spor Sl. Enkelte gr. 1-3 mm.	80°	0,11	0,13	0,41		3,70	7,20-8,20
9.50 - 13.90	4.40	" "	Hbl.førende tildels hbl.gn. Spr. gr. 1-3 mm.	80°						

16/5 1979
H. Pantdalsli

RANA BLADTRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.510

Borehull: 602

Dato : April 79
Koordinater : X: 925.418 Y: 44.510
Retning :
Helling/stigning: Lodd
Høyde : ~ 97
Lengde : 10 m

Skiss innmålt.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.20	0.20	TAP								
0.20 - 0.80	0.60	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. spor Sl, Cp,Py,Po.	80°	0.04	0.31	0.90			
0.80 - 1.80	1.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende, god impr. Sl,Cp,Gn,Py	80°	1.55	0.42	2.65			
1.80 - 2.60	0.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. spor gr.	80°	0.04	0.03	0.10			
2.60 - 3.10	0.50	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende, god impr. Sl,Cp,Gn,Py		0.63	0.86	4.44			
3.10 - 5.20	2.10	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spor gr.		0.00	0.02	0.03			3.10-4.10
5.20 - 10.00	4.80	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. enkelte pegm.band. tildels hbl.-førende. Spr. gr. 0,5-3 mm Svak impr. Py.	80°						

24/4 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.490

Dato : April 1979

Koordinater : X: 925.416,5 Y: 44.490

Retning :

Borehull: 601

Helling/stigning: Lodd

Høyde : - 96,5

Lengde : 10 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.20	0.20	TAP								
0.20 - 0.55	0.35	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor Sl,Cp,Py	80°	0,06	0,19	0,27			
0.55 - 0.95	0.40	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. impr. Sl Cp,Py.	70°	0,03	0,30	2,52			
0.95 - 1.15	0.20	Pegm.								
1.15 - 3.75	2.60	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-flink. Fra 1.15 - 2.60 enkelte dm-brede hbl-førende hand m/impr. Sl, Cp,Py	70°	0,43	0,22	1.99			1,15-2,60
				80°	0,02	0,02	0,04			2,60-3,75
3.75 - 4.20	0.45	Biot.gn.	Mørk,mlk,hbl.førende m/ spr. gr. 0,5-3 mm	80°						
4.20 - 4.70	0.50	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spr. gr. 0,5-3mm	85°						
4.70 - 5.15	0.45	Biot.gn.	Mørk,mlk. hbl.førende m/ spr. gr. 1-2 mm.	80°						
5.15 - 7.20	2.05	2 gl.gn.bd.	Rel. mørk, mlk. -grovk, tildels undulerende Spor hbl. spr. gr. 1-7 mm	80°						
7.20 - 7.50	0.30	Pegm.								
7.50 - 10.00	2.50	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.tildels gr.rik 1-3 mm	80°						

23/4 1979
H. Pantdaleli

FANA BLADS TRYKKERI

Ikke innmålt.

Lokalitet: Profil 44.490

Borehull: 600

Dato : April 79
Koordinater : x: 925.408 y
Retning :
Helling/stigning: Lodd
Høyde : - 96,5
Lengde : 9.90 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 1.10	1.10	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. veksl. m/ dm-brede band biot.gn. hbl.førende. Spor gr. svak impr. Py.	70°	0,00	0,01	0,04			
1.10 - 1.85	0.75	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. Veksl. m/striper impr. hbl. Sl,Cp,Py.	70°	0,33	0,16	4,51			
1.85 - 3.10	1.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. striper hbl. Spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py	70°	0,03	0,03	0,20			
3.10 - 4.90	2 gl.gn.alm.		Lys,mlk-fink. tildels kv.-rik. Fra 3.70-4.00 (skarn) impr. hbl. Sl,Cp,Py		0,00	0,02	0,20			3,10-3,70
					2,23	0,19	3,16			3,70-4,00
					0,06	0,04	0,16			4,00-4,90
4.90 - 9.90	5.00	Biot.-hbl.gn.	Mørk,mlk, spr..gr. tildels rik 1-3 mm.	70°						

23/4 1979
H. Pantdalsli

Ikke overført

Lokalitet: Profil 43.790

Borehull: 599

Dato : April 1979
Koordinater : X 925.359 Y 43.790
Retning : S
Heiling/stigning: − 20°
Høyde : − 66,5
Lengde : 86.80 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 14.40	14.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/små parti 2 gl.gn.alm. Spr. gr. 1-3 mm. fra 3.10 - 3.20. 12.20 - 12.30 spor Sl.	40°	0.04	0,07	0,14			13.40-14.40
14.40 - 15.65	1.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ 10-30 cm band god malm, hbl.førende og 2 gl.gn.alm Impr. Sl,Cp,Gn,Py,Po.	30° 40°	1,03	0,34	5,17			
15.65 - 17.20	1.55	2 gl.gn.alm.	Rel.lys mlk, vekslende m/ dm-brede 2 gl.gn.b.d.band fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py.	35°	0,13	0,08	0,10			
17.20 - 26.90	9.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.- tildels ondulerende, vekslende med små parti 2 gl.gn.alm. spor hbl. Impr. Sl,Cp, Py,Po	5° 30°	1,05 0,38 0,34 0,40 0,23	0,25 0,14 0,16 0,18 0,21	3,30 0,94 0,53 0,46 0,61			17,20-19,20 19,20-21,20 21,20-23,20 23,20-25,20 25,20-26,90
26.90 - 27.60	0.70	Pegm.								
27.60 - 29.50	1.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. impr. Sl,Cp,Py,Po	40°	0,39	0,27	1,30			
29.50 - 30.90	1.40	Biot.gn.	Mørk,grovk.-mlk. hbl-førende tildels rik, impr. Sl,Cp,Py,Po.	40°	0,42	0,31	1,82			
30.90 - 51.20	20.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. veksl. m/ cm-dm-bred hbl. og biot. gn.band. Spr. gr. tildels rik 1-3 mm. Impr. Py	20° 40°	0,03	0,04	0,05			30,90-32,00

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 599

2

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
51.20 - 61.50	10.30	Hbl.-biot.gn.	Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm Impr. Py	35°						
61.50 - 68.80	7.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. grovk. ondulerende. Spor gr. impr. Py.	10° 30°						
68.80 - 75.80	7.00	Hbl.-biot.gn.	Mørk, mlk, vekslende m/ små parti pegm. og hbl.gn. Spr. gr. tildels rik 1-3mm Svak impr. Py	30°						
75.80 - 77.50	1.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. ondulerende. spor gr. impr. Py	10° 30°						
77.50 - 82.70	5.20	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	35°						
82.70 - 86.80	4.10	Hbl.-biot.gn.	Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm Svak impr. Py	35°						

2/5 1979
H. Pantdalsli

KANA GLADS TRYKKERI

Ikke innmålt.

Lokalitet: Profil 43.790

Borehull: 598

Dato : Mars 1979
Koordinater : X: 925,359 Y: 43.790
Retning : S
Helling/stigning: - 30°
Høyde : -66,5
1. Lengde : 68,65 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 9.40	9.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk,vekslende m/ 2 gl.gn.alm. og dm.brede pegm.band. Fra 4.60-4.80. 6.60-6.80, 7.20-7.30 spor Sl,Cp, Enkelte parti m/ spr.gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py	40° 50°						
9.40 - 12.30	2.90	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. tildels kv.rik, Fra 9.80-12.30 Striper impr. Sl,Cp,Gn,Py Fra 11.60 - 11.90 hbl.førende. Fra 12.10 - 12.20 Po-rik.	50°	0.03	0.04	0.01			8.80-9.80
					0.53	0.34	2.30			9.80-12.30
12.30 - 12.70	0.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. Fra 12.60-12.70 impr. Sl,Cp,Py,Po.		0.37	0.19	1.88			
12.70 - 15.00	2.30	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ kv.rike parti og 2 gl.gn.b.d striper impr. Sl,Cp,Gn,Py,Po	50°	0.50	0.26	1.60			
15.00 - 20.00	5.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.vekslende m/cm-dm-brede pegm. og 2 gl.gn. alm.band. Parti m/spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py. Fra 15.50 - 15.55 spor Cp,Py,Po Fra 18.25-19.00 svak impr. hbl. Sl,Cp,Py	50°	0.17	0.18	0.30			15.00-16.00
					0.02	0.15	0.19			17.5-18.5
					0.24	0.12	0.41			18.25-19.00
					0.84	0.17	0.23			19.00-20.00
20.00 - 21.00	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. impr. Sl,Cp,Gn, Py.	50°	0.14	0.15	0.78			
21.00 - 21.60	0.60	" "	Spor hbl. Spr.gr. 0,5-2 mm	50°	2.06	0.06	0.18			
21.60 - 22.00	0.40	" "	Impr. Sl,Cp,Gn,Py	50°	0.37	0.22	3.00			
22.00 - 23.10	1.10	" "	Spr. gr. 1-3 mm.	50°	0.03	0.03	0.12			
23.10 - 24.00	0.90	" "	Svakt ondulerende. Impr. Sl,Cp Gn,Py	50°	0.58	0.21	2.30			

SANA GLASS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 598

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
24.00 - 25.70	1.70	2 gl.gn.b.d.	Spor hbl. skarn, svak impr. Sl,Cp,Gn, god impr Py	50°	0,13	0.17	0.42			
25.70 - 26.10	0.40	Biot.gn.	Mørk,grovk-mlk. hbl.førende impr. Cp, Py	50°	0.02	0.14	0.08			
26.10 - 28.15	2.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl-førende, spr. diffuse gr. 0,5-2 mm Impr. Py	50°	0.01	0.05	0.06			26.10-27.10
28.15 - 28.85	0.70	2 gl.gn.b.d.	Enkelte gr. 1-5 mm	50°						
28.85 - 30.20	1.35	" "	Hbl.førende m/spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	"						
30.20 - 32.60	2.40	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende, spr. gr. tildels rik 1-5 mm.	"						
32.60 - 36.95	4.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede hbl.gn.band. Spr. gr. 1-3 mm. Fra 34.50-34.55 spor Sl	"						
36.95 - 37.40	0.45	Biot.gn.	Mørk,mlk.hbl.førende, Spr. gr. 1-3 mm	"						
37.40 - 40.05	2.65	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. Spr. gr. 1-3 mm.	50°						
40.05 - 40.50	0.45	2 gl.gn.alm.	Rel.lys, mlk, spr. gr. 0,5-2 mm.	50°						
40.50 - 40.60	0.10	Biot.gn.	Mørk,grovk-mlk. god impr. Sl, Cp, Gn, Py							
40.60 - 40.75	0.15	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. kv.rik, Spr. gr. 0,5-2 mm							

KANA GLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 598

3.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
40.75 - 40.85	0.10	Biot.gn.(sk)	Mørk,grovk. spor anhydritt, god impr. Cp,Sl,Py,Po							
40.85 - 41.30	0.45	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk. spr. gr. 0,5-2 mm.	50°						
41.30 - 47.80	6.50	Bipt.hbl.gn.	Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm	50°						
47.80 - 48.80	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. Spr.gr. 1-3 mm	50°						
48.80 - 49.05	0.25	" "	Impr. Sl, Py							
49.05 - 50.45	1.40	" "	Tildels hbl.førende. Spr. gr. 0,5-3 mm. Impr. Py	50°						
50.45 - 58.00	7.55	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	50°						
58.00 - 62.65	4.65	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede hbl.gn.bånd. Spr.gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	50°						
62.65 - 62.80	0.30	Pegm.								
62.80 - 64.30	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk.Impr.Py	50°						
64.30 - 64.95	0.65	Biot.gn.	Mørk,mlk. spr. gr.1-3 mm	50°						
64.95 - 65.40	0.45	Pegm.								
65.40 - 65.70	0.30	Biot.gn.	Mørk,mlk.spr. gr. 0,5-2 mm							
65.70 - 68.65	2.95	Hbl.gn.	Mørk,mlk.gr.rik,0.5-3 mm	50°						

24/4 1979
H. Pantdalsli

EIDA BLAIS (NYKØBING)

Lokalitet: Profil 44.460

Borehull: 597

Dato : Mars 1979
Koordinater :
Retning : N
Helling/stigning: - 76°
Høyde :
Lengde : 9,40 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.20	1.20	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ dm-brede biot.gn.band hbl.førende fortrinnsvis m/ striper impr. Sl,Cp,Gn,Py	80°	0,73	0,24	2,22			
1.20 - 4.20	3.00	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. spor gr. 0.5-2 mm	80°	0,04	0,16	0,06			120-240
4.20 - 9.40	5.20	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede band hbl.gn. Spredte gr. tildels rik 0,5-3 mm. Svak impr. Py	80°						

27/3 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44410.

Dato : Mars 1979
Koordinater : X: 925.417.3 Y: 444102
Retning : N
Helling/stigning: - 80
Høyde : - 87.4 m
Lengde : 7,35 m

Borehull: 596

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.15	0.15	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. spor hbl. Impr. Sl,Cp,Py.		0,16	0.28	2.07			
0.15 - 0.30	0.15	TAP								
0.30 - 0.80	0.50	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl.gn. b.d. tildels kv.rik. Spor hbl. Stripet impr. Sl,Cp,Py	70°	0,17	0.32	1.11			
0.80 - 1.60	0.80	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ dm-brede pegm.band. Spor hbl. stripet, impr. Sl,Cp Gn,Py.	60° 70°	0,17	0.34	4.38			
1.60 - 2.40	0.80	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. vekslende m/ cm-dm-brede pegm.band. Striper impr. Sl,Cp,Gn,Py	60° 70°	0.05	0.17	1.28			
2.40 - 3.80	1.40	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ dm-brede 2 gl.gn.alm. band hbl.førende, striper impr. Sl,Cp,Gn,Py.	70°	1.09	0.16	4.76			
3.80 - 5.30	1.50	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.-fink. spor gr. svak impr. Py.	70°	0.05	0.03	0.32			5.10-5.80
5.30 - 7.35	2.05	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede band hbl. m/gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py.							

27/3 1979
Holger Pantdalsli

RANA ELALS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.40

Borehull: 595

Dato : Mars 1979
Koordinater : X: 925.413.2 Y: 44.408.2
Retning : N
Helling/stigning: - 73°
Høyde : ~ 87.2 m
Lengde : 7.60 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.80	1.80	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. Hbl.før. Striper impr. Sl,Cp,Py,Po	60°	0,33	0,51	7,24			
1.80 - 5.80	4.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. Fra 1.80-3.50 enkelte cm-brede biot.hbl. rike striper m/spor Sl,Cp Gn, Py	60°	0,13	0,18	0,81			1,80-3,50
					0,01	0,02	0,05			3,50-5,80
5.80 - 6.60	0.80	Biot.-hbl.gn.	Mørk,mlk,gr.førende 0,5-2 mm. Svak impr. Py	60°						
6.60 - 7.20	0.60	Pegm.								
7.20 - 7.60	0.40	Biot.gn.	Mørk,mlk. spor hbl. og gr. 0.5-2 mm. Svak impr. Py.	60°						

27/3 1979
Holger Puntdalsli

FANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.060

Borehull: 594

Dato : Mars 1979
Koordinater : X: 925.410,3 Y: 44.059,4
Retning : N
Helling/stigning: - 53°
Høyde : -60,5
Lengde : 50,00 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 3.90	3.90	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk, mlk. vekslende m/dm brede bånd 2 gl.gn.alm. Fra 1.30 - 2.40 striper Sl,Gn,Cp,Py m.hbl.	45°	0.03	0.11	0.02			0,00-1.30
					0.76	0.36	2,57			1.30-2,40
					0,07	0,10	0,36			2,40-3,90
3.90 - 4.35	0.45	Pegm.								
4.35 - 4.80	0.45	Musk gn.	Lys,mlk-grovk. spor Sl, Impr. Py	45°	0,13	0,14	0,34			
4.80 - 5.70	0.90	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.-fink. veksl. m/hbl. førende bånd. Fortrinnsvis m/impr. Sl,Cp Gn,Py.	45°	0,42	0,64	1.98			
5.70 - 7.40	1.70	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/hbl.(skarn)førende parti fortrinnsvis m/striper og impr. Sl,Gn,Cp,Py	45°	3.00	0,45	9,60			
7.40 - 9.60	2.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ parti 2 gl.gn.bd. Enkelte spr. striper Sl,Gn Cp, impr. Py.	45°	0,27	0,09	0,30			
9.60 - 11.80	2.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende tildels hbl.førende. Striper impr. Sl,Gn,Cp,Py	45°	0,74	0,57	0,53			
11.80 - 14.00	2.20	Skarn	Mørk,mlk. vekslende m/1-2 dm brede 2 gl.gn.alm. band. Striper, impr. Sl,Gn,Cp,Py	50°	0,52	0,66	2,71			
14.00 - 19.00	5.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ 1-2 dm brede 2 gl.gn.alm. band. Tildels spr. gr. 1-3 mm. Fra 14.00-15.00 Svak impr. Sl,Gn,Cp,Py	50°	0,24	0,24	3,84			14,00-15,00
					0,03	0,03	1,09			15,00-16,00

KUNA GLACO TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 594

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
11.80 - 14.00	2.20	Skarn (Hbl.rik)	mørk,mlk.vekslende m/1-2 dm brede 2 gl.gn.alm.band Striper, impr. Sl,Gn,Cp,Py	50°						
14.00 - 19.00	5.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk.vekslende m/ 1-2 dm brede 2 gl.gn.alm. band. Tildels spr. gr. 1-3 mm. Fra 14.00-15.00 svak impr. Sl,Gn,Cp,Py	50°						
19.00 - 19.20	0.20	Pegm.								
19.20 - 20.80	1.60	Biot.gn.	Mørk,grovk.-mlk. spor Cp impr. Py.	50°						
20.80 - 21.60	0.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. Spor gr. svak impr. Py	40°	0.04	0.03	0.09			
21.60 - 23.40	1.80	Biot.gn.	Mørk,grovk.-mlk,vekslende m/1-2 dm brede 2 gl.gn.bd. band. impr. Sl,Cp,Py i biot.gn.	40°	0.03	0,36	1.44			
23.40 - 25.20	1.80	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/dm.brede biot.gn.band fortrinnsvis m/impr. Sl,Cp, Py	40° 45°	0.01	0.04	0.07			
25.20 - 25.70	0.50	Biot.gn.	Mørk,grovk. spor hbl. Sl,Cp Py	45°	0.01	0.27	0.40			
25.70 - 25.90	0.20	Pegm.								
25.90 - 28.30	2.40	Biot.gn.	Mørk,grovk.-mlk. hbl.førende impr. Sl,Cp,Py,Po	45° 50°	0.14	0,34	1.84			
28.30 - 28.90	0.60	Pegm.								

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 594

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
28.90 - 29.50	0.60	Biot.gn.	Mørk,grovk. spor hbl. Cp, Sl,Py	45°	0.02	0.22	0.86			
29.50 - 30.50	1.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. Spr. difuse gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	45°	0.01	0.05	1.53			
30.50 - 31.80	1.30	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. tildels hbl førende. Impr. Sl,Cp,Gn,Py	45°	1.26	0.35	6.40			
31.80 - 36.00	4.20	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. veksl.m/hbl. førende parti. fortrinnsvis m/gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	45° 50°	0.04	0.10	2.04			S/80-36.00
36.00 - 38.80	2.80	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.rik 1-5 mm.							
38.80 - 50.00	11.20	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/1-3 dm-brede band 2 gl.gn.bd. Spr. gr. 1-3 mm.	50°						

14/3 1979
Holger Pantdalsli

KANA GLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43.830

Borehull: 593

Dato : Mars 79
Koordinater ca: X: 925.972 Y: 43.830 (gj.innmål)
Retning : N
Helling/stigning: - 70°
Høyde : -63,7
Lengde : 11.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.30	0.30	TAP							
0.30 - 1.80	1.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor hbl. Impr. lys,Sl,Gn,Cp,Py	70°	1.39	0.21	7.81			
1.80 - 4.80	3.00	2 gl.gu.bd. Rel.mørk,mlk. spor hbl. vekslende biot.innhold. Impr. Sl,Gn,Cp,Py	70°	0.56	0.24	3.97			1.80-3.00
				0.29	0.30	1.88			3.00-4.80
4.80 - 5.20	0.40	TAP							
5.20 - 5.80	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. impr. Sl,Gn,Cp,Py	70°	0.67	0,53	3,65			
5.80 - 7.00	1.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. Spor gr. svak impr. Py	75°	0.21	0.09	0,80			
7.00 - 7.60	0.60	TAP							
7.60 - 10.20	2.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.-fink. veksl. m/dm-brede biot.hbl. førende band. Impr. Sl,Gn Cp,Py	70°	0.36	0.19	2.23			
10.2½ - 10.40	0.20	TAP							
10.40 - 11.50	0.90	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor hbl. Impr. Sl,Gn,Cp,Py Fra 10.60 - 10.80 skarn (God malm).		0.56	0.74	4.49			

14/3 1979
Holger Pantdaisli

Lokalitet: Profil 44.060

Borehull: 592

Dato : Feb. 1979
Koordinater : X: 925.377,8 Y:44.057.2
Retning : S
Helling/stigning: - 75°
Høyde : - 69,5 m
Lengde : 20.00 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 3.70	3.70	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. Spr. gr. 0.5 - 3 mm.	70°	-					
					0.03	0.03	0.06			2.20-3.70
3.70 - 4.70	1.00	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.svak impr. Py. fra 3.80-3.95 impr. Sl,Cp Gn,Py spor hbl.	70°	0.25	0.26	1.56			
4.70 - 7.00	2.30	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. impr. Sl,Cp,Gn,Py	70°	0.53	0.27	3.14			
7.00 - 7.80	0.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.svak impr. Sl Cp,Gn,Py	70°	0.35	0.28	1.13			
7.80 - 10.60	2.80	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende impr. Sl,Cp,Gn,Py	70°	0.93	0.41	2.95			
10.60 - 12.60	2.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende spr.gr. 0.5-3 mm. Svak impr. Py.	60°	0.08	0.05	0.15			
12.60 - 14.00	1.40	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. hbl. og skarnførende. Impr. Sl, Cp,Gn,Py		1.20	1.09	3.76			
14.00 - 15.00	1.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende, spr. gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py.	60° 70°	0.05	0.09	0.11			
15.00 - 15.30	0.30	Pegm.								
15.30 - 17.00	1.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. Spr. gr. 0,5-3 mm. Fra 15.30 - 15.90. impr. Sl Cp,Gn,Py	60°	1.48	0.33	5.97			15.30-15.90
					0.08	0.04	0.30			
17.00 - 18.10	1.10	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spor gr.	60°						
18.10 - 20.00	1.90	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende gr.rik o,5-3 mm.Svak impr. Py.	60°						

KANA BLADS TRYKKERI

7/3 1979 Holger Pantdalsli

Lokalitet: Profil 43.860

Borehull: 591

Dato : Febr. 1979
Koordinater : X: 925.390.8 Y: 43.866.5
Retning : X
Helling/stigning: -70°
Høyde : - 63,7 m
Lengde : 18.35 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 0.10	0.10	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. Sl,Cp,Gn,Py		0.14	0.06	2.61			
0.10 - 0.20	0.10	TAP								
0.20 - 3.60	3.40	Malm	God malm, med litt hbl.biot		1.26	0.70	8.74			
3.60 - 4.00	0.40	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.kv.rik (mot musk gn.) Svak impr. Py	40°	0.38	0.30	2.40			
4.00 - 4.60	0.60	TAP								
4.60 - 6.60	2.00	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. spr.gr. 1-2 mm. (Fra 5.45-5.85 svake spor Sl,Cn,Cp)	40°	0.64	0.12	0.60			
6.60 - 7.40	0.80	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spor hbl. spor Sl,Cp.		0.95	0.46	2.50			
7.40 - 7.60	0.20	TAP								
7.60 - 7.80	0.20	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spor hbl. spor Sl,Cp	40°	1.80	0.32	6.50			
7.80 - 8.20	0.40	Pegm.	m/Py							
8.20 - 9.20	1.00	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. spor gr. 0.5 - 1.0 mm.	60°	0.05	0.02	0.17			
9.20 - 12.30	3.10	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spor gr. 1-2mm Spredte spor Sl,Cp	60°	0.57	0.10	0.54			
12.30 - 13.00	0.70	Biot.gn.	Mørk,mlk. m/cm-tykke 2 gl. gn.band. Spor hbl, Spor Sl, Cp, Py	60°	0.46	0.38	1.62			
13.00 - 13.20	0.20	TAP								
13.20 - 14.30	1.10	Biot.gn.	Mørk,mlk. spor Sl,Cp,Py	60°	0.03	0.25	1.20			
14.30 - 14.80	0.50	TAP								
14.80 - 15.20	0.40	Biot.sk.	Mørk,mlk. Sl,Cp,Py,Po.	60°	0.02	0.21	1.73			
15.20 - 15.30	0.10	TAP								

KAFJA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 591

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
15.30 - 15.60	0.30	Biot.sk. Mørk,mlk. Sl,Cp,Py,Po	60°	0.01	0.63	3.58			
15.60 - 18.85	3.25	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink. Fra 16.30 - 17.40 cm-tykke Biot,hbl,pegm. striper. Spor Sl,Cp,Gn,Py	60°	0.16	0.11	0.48			

6/3 1979
Stellan Burman

FANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43.860

Borehull: 590

Dato : Feb - 79.
Koordinater : X: 925.386,8 Y: 43.864,8
Retning : N.
Helling/stigning: - 70°
Hoyde : - 63,1
Lengde : 11,70 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve fra
0.00 - 3.90	3.90	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ 1-3 dm-brede biot.d. Hbl.førende band fortr.vis m/malm. Impr. Sl,Cp,Cn,Py		0,50	0,24	3,80			0,0-2,00
				70°	0,69	0,38	4,00			2,00-3,90
3.90 - 4.15	0.25	TAP								
4.15 - 5.75	1.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende stripet malm fra 4.15-5.20 m/spor hbl.	70°	0,46	0,29	3,40			4,15-5,20
					0,02	0,03	0,17			5,20-5,75
5.75 - 6.16	0.40	TAP								
6.15 - 6.40	0.25	Pegm.								
6.40 - 6.70	0.30	TAP								
6.70 - 9.00	2.30	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor gr. svak impr. Py	70°						
9.00 - 9.20	0.20	TAP								
9.20 - 11.70	2.50	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ dm-bred pegm.band, spor gr. Svak impr. Py.	70°						

28/2 1979
H. Pantdalsli.

Lokalitet: Profil 44.060

Borehull: 589

1.

Dato : Februar 1979
Koordinater : X: 925.399,1 y: 44.054,7
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 61,7
Lengde : 30.00 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.30	1.30	Malm	Skarn, vekslende m/band 2 gl.gn.alm. ondulerende.		3,10	0,18	10,60			
1.30 - 2.30	1.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. vekslende m/biot. d. hbl.førende band. impr. Sl,Gn,Cp,Py	60° 70°	1.80	0,81	5,44			
2.30 - 9.80	7.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. fra 2.30-4.00 spr. cm-dm-brede band m/impr. Sl,Gn,Cp,Py Fra 8.20 - 9.80 spr. cm-dm-brede band m/impr. Sl,Gn,Cp Py. Spor gr.	70° 80°	0,88	0,41	2,86			2,30-3,00
					0,16	0,07	1,26			3,00-4,00
					0,09	0,06	0,14			4,00-5,00
					0,07	0,01	0,15			8,20-8,80
					0,45	0,09	1,05			8,80-9,80
9.80 - 10.10	0.30	Malm	Skarn, hbl.rik.		3,50	0,21	13,40			
10.10 - 11.30	1.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. Ved 11.20 spor Sl.	70°	0,08	0,07	0,32			
11.30 - 15.20	3.90	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk.vekslende fra skarn til biot.sk. m/hbl. Impr. Sl,Cp,Po,Py. Tildels meget rik på magnetkis (Po) ondulerende.		0,23	0,69	3,19			11,30-12,30
					0,45	1,82	4,57			12,30-13,30
					0,43	0,62	5,94			13,30-14,30
					0,13	1,45	2,07			14,30-15,20
15.20 - 16.20	1.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. impr. Py spor Sl.	70°	0,15	0,38	0,76			
16.20 - 19.20	3.00	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. vekslende m/parti skarn m/hbl. Impr. Sl,Cp,Po,Py. Ondulerende.		0,45	0,49	2,58			16,20-17,20
					0,47	0,68	2,19			17,20-18,20
					0,31	0,52	6,13			18,20-19,20
19.20 - 19.80	0.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. spor Sl. Impr. Py	70°	0,36	0,21	1,67			

KAHA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 589

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
2. Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
19.80 - 20.30	0.50	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. impr. Sl,Gn, Cp, Py		0,78	0,53	4,62			
20.30 - 22.15	1.85	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ band 2 gl.gn.alm., spor hbl. spr.gr. 0,5-2 mm.	70°	0,04	0,05	1,33			8030-2/80
22.15 - 22.70	0.55	Pegm.								
22.70 - 24.10	1.40	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede hbl.gn.band. Svak impr. Py.	70°						
24.10 - 25.10	1.00	Biot.hbl.gn.	Mørk,grovk.gr.rik 1-3 mm.	60°						
25.10 - 30.00	4.90	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm-bred pegm. hbl.gn.. band, tildels gr.rik 1-3 mm.	70°						

26/2 1979

Bolger Pantdalsli

HAMA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.060

Borehull: 588

Dato : Feb. 1979
Koordinater : X: 925.409,6 Y: 44.059,2
Retning : N
Helling/stigning: - 75
Høyde : — 60,6
Lengde : 38.60 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 0.60	0.60	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor gr. Sl, Py	60°	0,05	0.09	0.18		3.10	
0.60 - 4.90	4.30	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/1-3 dm brede skarn band (god malm). hbl.førende. Impr. Sl,Cp,Gn,Py	40°	1.20	0,55	5,30		6.50	0,60-3,60
				60°	1,55	0,59	6.00		6,70	3,60-4,90
4.90 - 7.00	2.10	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. Fra 5,55-5,65 Sl,Gn,Cp. Fra 6,80-6,90 Sl,Gn,Cp. Spor gr. svak impr. Py.	50° 60°	0,99	0,08	1.20		1.70	
7.00 - 7.40	0.40	Pegm.								
7.40 - 9.20	1.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. rel. mass. Fra 8.05-8.10 og 9.05-9.15 Impr. Sl,Cp,Gn,Py. Spor gr.	50° 60°						
9.20 - 9.80	0.60	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. spor gr.		0.02	0.03	0.06		1.60	
9.80 - 12.70	2.90	2 gl.gn.alm.	Rel. lys,mlk-fink. veksl. m/1-2 dm bred skarnband. (god malm) hbl.førende. Impr. Sl,Gn,Cp,Py	50° 60°	0,91	0.55	4.00		9.80	
12.70 - 13.15	0.45	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. hbl.førende Impr. Sl,Cp,Po,Py		0,21	0,84	2,60		10,50	
13.15 - 13.55	0.40	Pegm.	Spor Cp, Po, Py		0.02	0,12	0.27		3,40	
13.55 - 14.80	1.25	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. vekslende m/1-2 dm-brede skarnband. hbl.førende. Impr. Sl,Cp, Po, Py	50°	0,32	0,61	3,20		14,20	
14.80 - 15.40	0.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. Spor gr. Sl, Cp, Py	50°	0,17	0,26	0,20		8,00	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 588

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
15.40 - 19.00	3.60	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. vekslende m/dm-brede 2 gl.gn.b.d.band Spor hbl. svak impr. Sl,Cp, Po,Py	50°	0,01	0,32	0,47		7,00	15,40-17,00
					0,00	0,11	0,18			17,00-17,00
19.00 - 20.90	1.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spr.gr.0,5-2mm	50°	0,00	0,03	0,03		2,00	
20.90 - 21.30	0.40	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. m/spor hbl. Impr. Sl,Cp,Py.	50°	0,01	0,33	1,60		9,50	
21.30 - 21.70	0.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spr. gr. 0,5-2 mm. Svak impr. Py	60°	0,00	0,12	0,25		4,80	
21.70 - 22.95	1.25	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. vekslende m/1-2 dm.brede pegm. og 2 gl.gn.b.d. band. Impr. Sl Cp, Py, Hbl. fortrinnsvis i biot.gn.	50° 60°	0,00	0,22	0,41		2,40	
22.95 - 25.00	2.05	Skarn	Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band. 2 gl.gn.alm. kv.rik. Impr. Sl,Cp,Gn,Po,Py		0,61	0,37	2,30		4,00	
25.00 - 27.70	2.70	Biot.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/dm-brede 2 gl.gn.bd. band. Tildels hbl. og skarn førende Spr. gr. 0,5-2 mm. Svak impr. Py.	50°	0,00	0,03	0,04		4,20	25,00-26,00
				70°						
27.70 - 30.70	3.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ dm-brede band hbl.gn. Spr. gr. 0,5-1mm.	70° 80°						

HANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 588

3.

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
30.70 - 32.40	1.70	Biot-hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 0,5-3 mm Svak impr. Py.	60° 70°						
32.40 - 33.70	1.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm.brede band biot.hbl.gn. Spr. gr. 0,5-3 mm.	70°						
33.70 - 38.60	4.90	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. tildels gr.rik 0,5-3 mm.	70°						

23/2 1979
H. Pantdalsli.

Lokalitet: Profil 43960

Borehull: 587

Dato : Jan. -79
Koordinater : X: 925.400,8 Y: 43.863,1
Retning : N
Helling/stigning: - 70°
Høyde : - 62,2
Lengde : 13,70 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 0.45	0.45	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. spor Py	60°						
0.45 - 0.60	0.15	TAP								
0.60 - 12.70	12.10	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. sprett dm.brede bd-partier m/enstaka gr. 1-3 mm. Ved 7.60 - 7.65 Sl 8.40-8.60 Sl. Spor Sl ved 10.20. 10.70-11.00 svak impr. Py.	60°						
12.90 - 13.70	1.00	Biot.gn.	Mørk, mlk-grov. m/gr. 1-4 mm.	60°						

28/2 1979
Stellan Burman

Lokalitet: 44.460

Borehull: 586

Dato : Jan -79
Koordinater : X: 925.406,6 Y: 44 463,5
Retning : S
Helling/stigning: - 45°
Høyde : - 91,1
Longde : 28,15 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 0.40	0.40	Pegm.	cm-tykke biot.hbl.band							
0.40 - 1.00	0.60	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk. Imp. Py	60°						
1.00 - 1.40	0.40	Biot.gn.	mørk,mlk-grovk. hbl.førende ved 1.30 spor Sl, Cp Imp.Py	60°						
1.40 - 1.90	0.50	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.enkelte korn Sl,Gn,Py.	60°						
1.90 - 2.95	0.35	Pegm.	Enkelte korn Gn.							
2.25 - 4.10	1.85	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. litt veksl. biot.innhold. spor gr.1-2mm ved 2,30 2,80 2,90 3.00 finnes mm-tynne Sl-striper	60°						
4.10 - 5.80	1.70	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk.vekslende biot. og hbl.rike partier. Spredt gr. 1-3 mm. fortrinnsvis hbl.	60°						
5.80 - 7.70	1.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels spor hbl. spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py.	50° 60°						
7.70 - 9.60	1.90	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. enkelte dm-brede pegm.band. spr. gr. 1-2 mm. ved 7.95-8.05 spor Sl,Cp, Ved 9.50-9.55 Sl,Cp, impr. Py.	50°						
9.60 - 11.30	1.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. vekslende enkelte dm-tykke 2 gl.gn.bd-band. spor gr. 1-2 mm. Svak impr. Py.	55°						
11.30 - 11.90	0.60	2 gl.gn.b.d.	Rel. lys,mlk. spor gr. 1-2mm Py	55°						

Lokalitet:

Borehull: 586

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
2. Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
11.90 - 13.20	1.30	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grov. Spr. gr. 1-4 mm. Impr. Py.	50°						
13.20 - 13.45	0.25	Pegm.								
13.45 - 18.50	5.05	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm Imp. Py.	50°						
18.50 - 21.80	3.30	2 gl.gn.bd.	Ref.mørk,mlk. vekslende med dm.brede hbl.pegm. band. Spredte gr. 1-3 mm. gr.rikere i hbl.bandene impr. Py	50°						
21.80 - 25.00	3.20	Hbl.gn.	Mørk,mlk. enkelte dm-tykke pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py.	50°						
25.00 - 25.40	0.40	Pegm.								
25.40 - 25.95	0.55	Biot.gn.	Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm Impr. Py	50°						
25.95 - 28.15	2.20	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. vekslende med cm/dm-tykke enkelte Biot. gn. og Pegm.band. Spredte gr. i Biot.gn.band	50°						

6/1 1979
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.460

Borehull: 585

Dato : Jan. 1979
Koordinater : X: 925.407,6 Y: 44.462,9
Retning : S
Helling/stigning: + 70°S
Høyde : — 87,9
Lengde : 18,15 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 1.05	1.05	Hbl.gn.	Mørk,mlk. 0,5 - 1.05 gr. førende tildels rik 1-3 mm Svak impr. Py.	70°						
1.05 - 8.00	6.95	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl. førende, spr.gr. 0,5-2 mm Svak impr. Py.	70° 90°						
8.00 - 18.15	10.15	Hbl.gn.	Mørk,mlk. enkelte cm-brede pegm. og amf.band. Spr. gr. 0,5 - 3 mm. svak impr. Py.	70° 90°						

6.2. 1979
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.400

Dato : Jan-79
Koordinater : X: 925, 428,5 Y: 44. 456,5
Retning : S
Borehull: 584 Helling/stigning: +70°
Høyde : -88,1
1. Lengde : 30.0 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 0.50	0.50	Biot.gn.	Mørk,grovk. impr. Sl,Cp.Py		0.09	0.48	1.88			
0.50 - 1.30	0.80	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor gr. Impr. Py.	55°	0.06	0.21	0.08			
1.30 - 2.65	1.35	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. spr. gr. 0,5 - 2 mm. impr. Py	60°	0.01	0.02	0.02			
2.65 - 3.20	0.55	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/pegm.band. spor gr. impr. Py	60°	0.08	0.21	0.30			
3.20 - 4.05	0.85	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. bandet m/rel. rike striper og impr. Sl, Cp, Py.	60°	1.34	0.23	4.28			
4.05 - 5.40	1.35	Biot.gn.	Mørk,grovk.-mlk. vekslende tildels sk. impr. Sl,Cp, Py, Po fortrinnsvis i biot.rike parti.	60°	0.14	0.34	1.67			
5.40 - 6.60	1.20	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede band 2 gl.gn.alm. impr. Sl,Cp,Py,Po	50° 60°	0.03	0.19	0.24			
6.60 - 6.95	0.35	Hbl.gn.	Mørk,mlk.impr. Py		0.00	0.04	0.09			
6.95 - 7.80	0.85	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. Fra 7.20-7.40 2 gl.gn.alm. Spor gr. hbl. Sl, Py	70°	0.15	0.13	0.52			
7.80 - 8.40	0.60	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. rel. mass.		0.02	0.10	0.06			
8.40 - 9.55	1.15	Biot.gn.	Mørk,grovk.-mlk. spor gr. impr. Sl, Cp, Py	70°	0.19	0.20	3.20			
9.55 - 10.35	0.80	Pegm?			0.02	0.02	0.17			

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 584

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr.
10.35 - 12.40	2.05	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. spor gr. vekslende m/dm-brede pegm. band. impr. Py.	70°	0.00	0.04	0.04			
12.40 - 14.25	1.85	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk.spr.gr. 0.5-3 mm. impr. Py	70°	0.00	0.04	0.03			
14.25 - 15.10	0.85	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/band 2 gl.gn.alm. Spor hbl. impr. Sl,Cp,Py	70°	1.10	0.22	4.12			
15.10 - 16.50	1.30	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. gr. impr. Py.	70°	0.09	0.04	0.25			
16.40 - 30.00	13.60	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/aml. band. spr. gr. tildels rik 1-3 mm. impr. Py.	70°						

31/1 1979
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.460

Borehull: 583

Dato : Jan - 79
Koordinater :
Retning : S
Helling/stigning: -70°
Høyde : -915 ca
Lengde : 27,80

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 2.00	2.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. rel. mass.							
2.00 - 4.35	2.35	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spr.gr., 0.5-4 mm.	70°						
4.35 - 5.00	0.65	2 gl.gn.alm.	Rel.lys, mlk.							
5.00 - 8.20	3.20	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. Spor gr. 0.5-3 mm.	70°						
8.20 - 10.20	2.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. enkelte pegm.band. spor gr.	70°						
10.20 - 11.00	0.80	2 gl.gn.alm.	rel.lys,mlk. enkelte pegm. band. spor gr.	70°						
11.00 - 13.50	2.50	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. gr. impr. Py.	70°						
13.50 - 18.60	5.10	Hbl.gn.	Mørk,mlk. enkelte pegm. band. spr. gr. 1-3 mm.	70°						
18.60 - 20.70	2.10	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spor gr. 0,5 - 3 mm.	70°						
20.70 - 27.30	6.60	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/ band 2 gl.gn.alm. og pegm. tildels amf. spr.gr. 1-3mm	70°						

31/1 1979
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43 860

Borehull: 582

Dato : Jan. 79
Koordinater : X: 925.404.2 Y: 43.863.3
Retning : N
Helling/stigning: - 70°
Høyde : - 62.6 m
Lengde : 32.80 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.45	0.45	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enkelte gr. 1-2 mm	75°						
0.45 - 0.90	0.45	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. spr. gr. o,5-2 mm	75°						
0.90 - 1.35	0.45	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.enkelte gr. 1-2 mm.	70°						
1.35 - 1.50	0.15	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. spr. gr. 0,5-2 mm	70°						
1.50 - 1.95	0.45	Biot.gn.	Mørk,mlk. gr.rik. 1-3 mm.	70°						
1.95 - 2.30	0.35	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. tildels gr. rik 1-3 mm.	70°						
2.30 - 4.10	1.80	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik. spor gr. 0,5-1.0 mm	70° 60°						
4.10 - 5.60	1.50	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ dm.brede 2 gl.gn.alm.band Spr. gr. 1-3 mm.	60°						
5.60 - 6.00	0.40	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik. spor gr. 0.5 - 1.0 mm.	60°						
6.00 - 6.20	0.20	TAP								
6.20 - 7.50	1.30	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik. spor Sl	60°	0.08	0.14	0.28			
7.50 - 8.10	0.60	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. impr. Sl, Cp, Gn, Py, Po	65°	0.27	0.30	0.61			
8.10 - 8.60	0.50	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. Hbl.-førende impr. Sl,Cp,Gn,Py	65°	0.99	1.70	6.50			
8.60 - 10.00	1.40	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk-grov litt veksl. med enkelte cm-dm-tykke biot.band. Impr. 8.60-9.70 Sl,Cp,Gn	65°	1.98	0.24	1.20			8.60-9.70
					0.01	0.02	0.05			9.70-10.00

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 582 2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
10.00 - 11.25	1.25	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. rel.kv.rik. Spor gr. 0,5-1 mm.	65°	0.06	0.06	0.15			
11.25 - 12.25	1.00	TAP								
12.25 - 13.00	0.75	2 gl.gn.alm.	Se foregående	65°						
13.00 - 13.65	0.65	TAP								
13.65 - 14.00	0.35	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spor gr. 0,5 - 1.0 mm. Svak impr.Py	65°	0.00	0.01	0.05			
14.00 - 14.45	0.45	Biot.gn.	Mørk, mlk-grovk. Py, Po? Spor Sl, Gn, Cp	65°	0.00	0.05	0.13			
14.45 - 15.10	1.65	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk,tildels grovk. svak impr. Py	65°	0.00	0.03	0.05			
15.10 - 15.35	0.25	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. Py	60°	0.00	0.05	0.13			
15.35 - 16.10	0.75	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. tildels kv.rik spor gr. 1-2 mm. Svak impr. Py	60°	0.00	0.01	0.04			
16.10 - 16.60	0.50	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. Sl,Cp,Py	60°	0.00	0.18	0.26			
16.60 - 18.50	1.90	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. tildels kv.rik. Fra 17.40 - 17.50 Biot.gn. m/Sl,Cp	60° 65°	0.00	0.01	0.06			16.60-17.40
					0.00	0.02	0.35			17.40-18.50
18.50 - 19.85	1.35	TAP								
19.85 - 23.45	3.60	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. rel.kv.rik.spor gr. 1-2 mm.	60° 65°						
23.45 - 23.70	0.35	TAP								
23.70 - 24.70	1.00	Musk.gn.	Lys,mlk. ondulerende spor Sl,Gn,Cp,Py	60°	0.21	0.07	0.36			
24.70 - 26.10	1.40	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede biot.bd.hbl.førend band m/god malm Sl,Gn,Py,Cp	60° 65°	1.72	0.84	6.80			

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 582

3.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
26.10 - 26.70	0.60	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spor gr. 1-2 mm.	65°						
26.70 - 28.30	1.60	Breccia	Rel.lys,mlk-grov,vekslende m/hbl.gn. skarn 2 gl.gn.kv pegm. stykker hopkittet av fink. lys ubestemmbart materiale (små druserum med apophyllit) spor gr. 1-2 mm	?	0,03	0,02	0,09			2610-27
28.30 - 29.50	1.20	Hbl.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/dm-tykke 2 gl.gn.band. gr.førende fortrinnsvis i de hbl.førende band 1-3 mm	65°						
29.50 - 31.60	2.10	Breccia	Se ovenstående.							
31.60 - 32.80	1.20	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grov. Impr. Py	65°						

28/2 1979

Stellan Burman

RANA ILAGS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.350

Borehull: 581

Dato : Okt.,Nov. 1978
Koordinater : X: 925.422,9 Y 44.349,2
Retning : Ø
Helling/stigning: – Avviksboring.
Høyde : – 65,1
1. Lengde : 200 m Avsluttet.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.90	0.90	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk.impr. Py							
0.90 - 3.05	2.15	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk-grovk.m/impr. Py. Halve kjernen onduler-ende med filmtynne biot.-skikt samt "øgon" av fink. kv.pegm. imp. Sl,Cp,Py	5°-0 0-5°						
3.05 - 3.90	0.85	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk.spor hbl. gr-førende tild. gr.rik. 1-4 mm. svak imp. Py	5-10°						
3.90 - 6.05	2.15	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. sprette små gr. 0,5-1 mm	10-5 5-0-5°						
6.05 - 6.95	0.90	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.hbl.jevnt fordelt som spor.tildels hbl.førende imp Py spor gr.	5°						
6.95 - 20.50	13.55	2 gl.gn.bd. hnl.gn.	Rel. mørk,mlk. impr. Py Spr. gr. 0,5-1,0 mm.	0-5°						
20.50 - 20.95	0.45	Hbl.gn.	Mørk,mlk.spr. gr. tildels gr.førende 1-2 mm.	5-30° 30-0°						
20.95 - 23.50	2.55	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. impr. Py. Spredt gr. 1-2 mm.	0-5°						
23.50 - 23.90	0.40	Hbl.gn.	" "	20° 30°						
23.90 - 45.50	21.60	Hbl.gn.	" " (Små partier med 2 gl.gn.bd. hbl.førende).	0-10°						
45.50 - 56.95	1.45	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk.hbl.førende Spr. gr. 1-2 mm. Imp. Py.	0						
46.95 - 51.95	5.00	TAP	(Avviksboret)							

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 581

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
51.95 - 54.80	2.85	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende Spr. diffuse gr. 1-3 mm, Imp. Py.	0-5°						
54.80 - 59.00	5.20	"	Rel.mørk,mlk,spor gr.0,5-3mm Svak impr. Py	5-0°						
59.00 - 60.00	1.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk.gr.rik 0,5-3mm Svak impr. Py.	0-5°						
60.00 - 60.80	0.80	"	Rel.mørk,mlk. spor gr. Imp. Py	10°						
60.80 - 61.70	0.90	Pegm.								
61.70 - 62.50	0.80	Musk.gn.	Lys,mlk.-grovk. svakt ondulerende. spor Cp, Impr. Py	10°-0						
62.50 - 64.00	1.50	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. tildels kv.rik Spor gr. impr. Py	0-5°						
64.00 - 66.00	2.00	Pegm.	M/innslag av 2 gl.gn.bd. Hbl.førende,impr. Py	5°-0 0-10°						
66.00 - 67.00	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. impr. Py	10°-0						
67.00 - 73.70	6.70	TAP	Avviksboring							
73.70 - 74.00	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. impr. Py pegm.ca. halve kj.	0-5°						
74.00 - 76.80	2.80	TAP	Avviksb.							
76.80 - 80.00	3.20	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/ bd.gn. og pegm. Spr.gr. 1-2 mm. impr. Py	5°-0 0-10°						
80.00 - 80.75	0.75	TAP	Avviksb.							
80.75 - 81.00	0.25	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende impr. Py	10°-5						

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 581

3.

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
81.00 - 83.30	2.30	TAP	Avviksboret							
83.30 - 85.80	2.50	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. spr. gr. 0,5-3 mm Impr. Py	5°						
85.80 - 89.60	3.80	TAP	Avviksboret							
89.60 - 95.00	5.40	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm Svak impr. Py	5-0°						
95.00 - 95.50	0.50	Pegm.								
95.50 - 100.50	5.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende tildels m/parti hbl.gn. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	5°-0						
100.50 - 112.50	12.00	"	Rel.mørk,mlk. spor hbl. spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	0-5°						
112.50 - 131.30	18.80	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. vekslende med parti b.d. gn. og pegm. gr.førende. tildels rik 1-5mm	5°-0						
131.30 - 133.00	1.70	"	" " (tildels skarn og kv.rik)	0-25°						
133.00 - 135.10	2.10	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. Spr. gr. 1-10 mm.	25°						
135.10 - 139.05	3.95	Hbl.gn.	Mørk,mlk.gr.førende.Tildels rik 0,5-3 mm. Svak impr. Py	20°-30°						
139.05 - 146.00	6.95	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk.vekslende m/små parti hbl.gn. spor gr. svak impr. Py	30°-20°						
146.00 - 155.70	9.70	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. tildels mass. gr. førende 0,5-3 mm. Svak impr. Py	20° 25°						

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 581

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
155.70 - 160.00	4.30	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. hbl. gr.førende 0,5 - 3 mm. Impr. Py	25° 30°						
160.00 - 162.40	2.40	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk.tildels mass. svak impr. Py	30° 25°						
162.40 - 172.30	9.90	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/hbl. førende parti. Spor gr. Impr. Py	25° 20°						
172.30 - 175.00	2.70	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. spor hbl. gr. svak impr. Py	20° 15°						
175.00 - 176.50	1.50	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. gr.rik 1-3 mm, mass.	15° 20°						
176.50 - 178.90	2.40	"	Rel.mørk,mlk-grovk. tildels gr.førende, små parti m/biot. gn. svak impr. Py	20°						
178.90 - 180.00	1.10	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. tildels gr.-førende 1-3 mm. vekslende m/ små parti hbl.gn. svak impr.Py	20°						
180.00 - 182.30	2.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-vekslende m/hbl. band og pegm. Spr. gr. 1-3 mm Svak impr. Py	20° 15°						
182.30 - 183.30	1.00	"	Lys,mlk.vekslende m/mørke biot.rike band. spor gr.	15°						
183.30 - 200.00	16.70	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor hbl.og gr. enkelte hbl.rikere parti. svak impr. Py	15°						

23/11 1978
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Mofjellet Gruber

Borehull: 580 profil 44.180

Dato : juni
Koordinater : 925.409,6 X, 44.173,3 Y
Retning : vest
~~Helling~~/stigning: + 70°
Høyde : - 66,2 m
Lengde : 23.85

Side 1

Dybde	L	Bergart	S°	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.20	0.20	musk.gn. py-impr.	30						
0.20 - 0.40	0.20	pegm.		0.01	0.10	0.13		4.40	
0.40 - 2.00	1.60	2-gl.gn. gl.-rik. py-impr.	60						
2.00 - 2.10	0.10	god malm	60						
2.10 - 2.55	0.45	m. spredte malmimpr. 2-gl.gn. gl.-rik	55	0.85	0.17	2.13		4.07	
2.55 - 4.35	1.80	gr.hbl.biot.gn. D. Py-impr. Sprekk 20°, strøk parallell med S. Vinkel med S = 60°	55	0.04	0.11	0.15		5.93	
4.35 - 4.40	0.05	musk.gn.	55						
4.40 - 4.85	0.45	meget god malm grågrønn skarn + karb.	60-70	3.28	0.51	7.09		5.93	
4.85 - 6.10	1.25	middels-god stripet malm 2-gl.gn.bp, D + grågrønn karb.skarn (rikest malm).	60-70						
6.10 - 7.80	1.70	ditto	60-80	2.12	0.41	5.39		7.25	
7.80 - 8.90	1.10	ditto, hbl. i skarn	45						
8.90 - 9.00	0.10	meget god malm	55	0.94	0.61	3.53		5.71	
9.00 - 9.50	0.50	malmstr. i 2-gl.gn. med skarn	55						
9.50 - 14.35	4.85	gr.hbl.biot.gn. D.Py-impr. Foldet tildels liten hbl.	55-75						
14.35 - 14.70	0.35	gr.amf.	65						

RANA BLADTRYKKERI

Lokalitet:

Borehull:

Dato :
Koordinater :
Retning : vest
~~Helling~~/stigning:
Hoyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
14.70 - 16.00	1.30	gr.hbl.biot.gn D. Py-impr.	65						
16.00 - 19.00	3.00	gr.amf.	65						
19.00 - 23.85	4.85	gr.hbl.biot.gn. D. Py-impr. Foldet	45-75						

10.7. 78 A. Kruse

RANA BLADTRYKKERI

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER

Borehull: 579 profil 44.180

Side 1

Dato : juni 1978
Koordinater : 44.184,3 Y, 925.432,6 X
Retning : nord
Helling/stigning : - 60°
Høyde : - 69,9 m
Lengde : 40.35 m

Dybde	L	Bergart		S°	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.50	0.50	2-gl.gn.	med gr.	30						
0.50 - 0.70	0.20	biot.gn.	biot.rik, sv. py-impr.		0.03	0.08	0.28		4.55	
0.70 - 0.85	0.15	kvarts								
0.85 - 1.10	0.25	biot.gn.								
1.10 - 2.50	1.40	malmstr. biot.hbl.gn.	sl,po,ccp,py mørk,delvis skiferaktig kv.-feltspatøyer(durchbewegt)	50-40	0.09	0.22	1.41		11.48	
2.50 - 2.75	0.25	2 gl.gn.b.d.	noe gr.	40-50	0.03	0.11	0.71		8.75	
2.75 - 3.45	0.70	malmstr. og impr. biot.gn.+biot.hbl.gn.	Skiferaktig	50						
3.45 - 3.60	0.15	kvarts								
3.60 - 4.50	0.90	2-gl.gn.,bp	med gr.	60-70						
4.50 - 5.00	0.50	biot.gn.	kv.feltsp. øyer Noe py, po, ccp	55-70						
5.00 - 7.50	2.50	2-gl.gn.	med gr. fold på 6,00-6.40, Si	70 65						
7.50 - 7.80	0.30	kvarts								
7.80 - 9.80	2.00	Spredte.malmstr. og impr. biot.gn.	I starten lyse noe hbl. sl.	50-60	0.17	0.12	0.50		4.89	
9.80 - 10.00	0.20	2-gl.gn.								
10.00 - 11.20	1.20	stripet malm grågrønn skarn + pegm.			1.30	0.16	3.83		2.61	

Lokalitet:

Borehull:

Dato
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
11.20 - 11.30	0.10	2-gl.gn.,b.p.		45						
11.30 - 11.45	0.15	pegm.								
11.45 - 14.35	2.90	2-gl.gn.b.p.	noe gr.	30-60						
14.35 - 15.55	1.20	malmstr. biot.gn.	med hbl.	30-50	0.07	0.17	0.91		5.68	
15.55 - 16.00	0.45	2-gl.gn.bd.		50						
16.00 - 17.50	1.50	stripet malm,middels-god. hbl.biot.gn.	noe po med grågrønn skarn	45-70	0.15	0.41	3.98		8.30	
17.50 - 18.00	0.50	malmimpr. amf.	rel. mye po. tett mørkegrønn.Noe biot.	50-60	0.03	0.48	1.11		11.82	
18.00 - 18.20	0.20	hbl.biot.gn.	Py-impr.	60						
18.20 - 18.65	0.45	2-gl.gn.bd	Noe båndet	60						
18.65 - 18.70	0.05	malmstr. + impr. hbl.biot.gn.		40-70						
18.70 - 19.35	0.65	2-gl.gn.		60						
19.35 - 19.90	0.55	gr.hbl.biot.gn.		60						
19.90 - 20.50	0.60	2-gl.gn.	Noe gr. Noe foldet	60						
20.50 - 21.30	0.80	gr.hbl.biot.gn.	foldet	0-60						
21.30 - 22.05	0.75	gr.amf.	Noe gullig sk. Foldet	0.70						
22.05 - 23.20	1.15	2-gl.gn.bp.	med gr. På 22.40 m 2 x 1 mm sl.	60	0.10	0.05	0.38		1.98	
23.20 - 24.00	0.80	biot.gn.	Noe gr.po-py-impr. spor ccp.	60-25	0.05	0.10	0.53		6.59	

PAPIA BLADS TYKKEL

Lokalitet:

Borehull:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Hoyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
24.00 - 24.80	0.80	gr.hbl.biot.gn.	Py-impr.	25	0.03	0.06	0.08		6.15	
24.80 - 25.40	0.60	biot.musk.gn.,md (D)	Py-impr. Foldeomb.	25-0	0.14	0.05	0.25		4.18	
25.40 - 26.30	1.10	sv.malmimpr. musk.biot.gn.bp.(D)	Overveiende	0-50 40	0.60	0.16	2.56		5.27	
26.50 - 29.20	2.70	gr.hbl.biot.gn.	Noe py-impr. 26.50 : 27.50 28.70 29.20	40 10 0 45						
29.20 - 29.70	0.50	gr.amf.		70						
29.70 - 31.60	1.90	gr.hbl.biot.gn.	Rel.lys,gr.rik	75						
31.60 - 32.10	0.50	gr.amf.	rik på små gr.	75						
32.10 - 32.35	0.25	kvarts								
32.35 - 32.80	0.45	gr.amf.								
32.80 - 33.15	0.35	gr.hbl.biot.gn.	rel.lys, gr.rik	80						
33.15 - 34.20	1.05	2-gl.gn. bd.	gr.rik	80-90						
34.20 - 35.20	1.00	gr.hbl.biot.gn.								
35.20 - 36.90	1.70	2-gl.gn.	gr.rik,amf.type.Noe foldet.	70-80						
36.90 - 37.40	0.50	gr.amf.	stict. med store gr.	70						
37.40 - 40.35	2.95	gr.amf.	mlk. og gr.rik	70						

10.7. 78 A. Kruse

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER

Borehull: 578 Profil 44.180

Dato : juni 1978
Koordinater : 925.432,6 X, 44.184.4 Y
Retning : nord
Helling/stigning: + 50°
Høyde : - 65.8 m
Lengde : 48.40 m

Dybde	L	Bergart		S °	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.40	0.40	musk,gn.		55°						
0.40 - 2.25	1.85	2-gl.gn.	Noe gr.	45						
2.25 - 3.00	0.75	sv.malmimpr. 2-gl.gn.	I starten honningblende							
3.00 - 4.75	1.75	m.sv. og spredt musk.gn.	malmimpr. D, grovskjellet, med biot.	45	0.27	0.21	0.70		6.05	
4.75 - 4.85	0.10	middels malm musk-gn.		40						
4.85 - 5.70	0.85	2-gl.gn.	rel. gl.rik,middelsk. Noe gr. og noe py-impr.	30-20						
5.70 - 8.00	2.30	2-gl.gn,bp-bd.	Med gr. D.	20						
8.00 - 9.50	1.50	gr.hbl,biot.gn.	Steilt foldet	0						
9.50 - 11.60	2.10	2-gl.gn.		20-40						
11.60 - 12.00	0.40	2 gl.gn.bp-bd.	Med gr.	40						
12.00 - 13.00	1.00	hbl.biot.gn.	grågrønn skarn, noe gr.	40-60						
13.00 - 13.35	0.35	2-gl.gn.		40						
13.35 - 14.30	0.95	malmstr. og impr. 2-gl.gn.	Noe anhydritt og grågrønn skarn.	40	0.49	0.30	1.66		6.87	
14.30 - 14.95	0.65	2 gl.gn.	Spredt noe gr.	40	0.07	0.06	0.19		4.58	
14.95 - 17.05	2.10	sv. malmimpr. musk,gn.	ml-grovk.skjellet,med biot (D)	40	0.50	0.21	0.93		7.36	
17.05 - 17.80	0.75	biot.gn.	D?	30-5	0.05	0.21	0.37		11.78	

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Borehull:

Helling/stigning

Høyde

Side 2

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
17.80 - 19.50	1.70	spredte malmstr. og impr. 2-gl.gn. Noe grågrønn sk. på 18.50	40	0.25	0.16	0.91		4.74	
19.50 - 21.30	1.80	2 gl.gn. av og til spredt noe gr.	50						
21.30 - 23.00	1.70	meget spredte malmstr. og impr. 2-gl.gn.	60	0.12	0.11	0.55		3.07	
23.00 - 25.00	2.00	m.spredte malmstr. og impr. i 2-gl.gn.	50-60	0.08	0.09	0.33		2.50	
25.00 - 25.90	0.90	malmstr. + impr. 2-gl.gn.	40-50	0.25	0.09	1.11		3.07	
25.90 - 27.10	1.20	2-gl.gn. med gr.	45						
27.10 - 29.10	2.00	spredte malmstr. og impr. 2-gl.gn.		0.22	0.14	0.48		3.75	
29.10 - 30.05	0.95	2-gl.gn.	50						
30.05 - 30.90	0.85	malmstr. og impr. 2-gl.gn.	40-60						
30.90 - 31.35	0.45	2-gl.gn. med gr.	55	0.15	0.13	0.60		3-18	
31.35 - 31.80	0.45	spredte malmimpr. 2-gl.gn.	50						
31.80 - 32.30	0.50	2-gl.gn. spredt noe gr.-	50						
32.30 - 33.25	0.95	stripet malm grågrønn båndet skarn med hbl. steilt foldet	50-0						
33.25 - 33.50	0.25	musk.gn.	35	0.04	0.13	3.13		2.50	
33.50 - 33.65	0.15	malm Hbl.skarn	45						

Lokalitet:

Borehull: 6

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
33.65 - 35.00	1.35	musk.gn.	Py-impr. spor sl. gl.rik.Noe biot. (D?)	50	0.15	0.12	0.38		3.64	
35.00 - 35.85	0.85	musk.biot.gn.	sv. py-impr.	50-35						
35.85 - 36.10	0.25	gr.musk.biot.gn.	sv. py-impr.	35-45						
36.10 - 37.55	1.45	gr.hbl.gn.		55						
37.55 - 38.10	0.55	gr.hbl.biot.gn.	sv. py-impr.	55						
38.10 - 38.90	0.80	gr.musk.biot.gn.	D. py-impr.	55						
38.90 - 39.30	0.40	hbl.gl.gn.	noe gr. sv.py-impr.	60						
39.30 - 40.05	0.75	spredte malmstr. og impr. musk.biot.gn.		60	0.34	0.12	0.58		3.64	
40.05 - 41.20	1.15	biot.musk.gn. båndet	Noe gr. sv. py-impr.	45-55						
41.20 - 41.50	0.30	gr.hbl.gl.gn.		60						
41.50 - 41.65	0.15	malmstr. biot.musk.gn.								
41.65 - 41.95	0.30	hbl.skarn	gullig sk.							
41.95 - 42.60	0.65	gr.amf.	båndet							
42.60 - 42.90	0.30	gr.hbl.biot.gn.	D. py-impr.							
42.90 - 44.80	1.90	gr.amf.	steilt foldet	0-35						
44.80 - 46.20	1.40	gr.hbl.b.gn.	sv. py-impr.	60						
46.20 - 46.40	0.20	gr.gl.gn.	lys,fink. gr.rik	v						
46.40 - 47.25	0.85	gr.b.m.gn.	D, middelsgrå	50-60						
47.25 - 48.40	1.15	gr.hbl.b.gn.	mlk.	55						

6.7. 78 A. Kruse

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER

Dato: mai/juni 1978

Koordinater: 925.432,3 X. 44.184,5 Y

Retning: nord

Borenull: 577 Profil 44.180

Hoxxxg/stigning: + 70°

Høyde: - 65.2 m

Side 1

Lengde: 39.00 m

Dybde	L	Bergart		S°	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.75	0.75	2-gl.gn.	Noe vekslende type spredt noe gr.	80° avtakende til 60						
0.75 - 2.60	1.85	speedte malmstr. og impr. musk.gn.	Rel. gl-rik. Lyse sl.	50°						
2.60 - 3.15	0.55	musk.gn.		50	0.58	0.16	0.10		6.20	
3.15 - 3.45	0.30	malmstr. musk.gn.								
3.45 - 3.55	0.10	2-gl.gn.		55						
3.55 - 3.75	0.20	gr.biot.gn.	D.mlk.	55						
3.75 - 4.90	1.15	2-gl.gn.	litt gr.	50						
4.90 - 6.30	1.40	gr.hbl.gn.	gr.rik,mlk.	40-50						
6.30 - 8.00	1.70	2-gl.gn.	med gr. På 7.20 m: 1 cm malm							
8.00 - 9.10	1.10	2-gl.gn.b.p.		Ca. 0						
9.10 - 10.30	1.20	2-gl.gn.	med gr.	50						
10.30 - 10.90	0.60	musk.gn.	spredt gr. litt biot.	50						
10.90 - 11.85	0.95	2-gl.gn.	vekslende type, med gr.	50						
11.85 - 12.90	1.05	spredt malmimpr. 2-gl.gn.	I starten lyse sl. (honningblende)	60-70	0.29	0.17	0.07		5.40	
12.90 - 13.85	0.95	m.spredte malmimpr. 2-gl.gn.		70						
13.85 - 15.25	1.40	2-gl.gn.	med gr.	70	0.03	0.02	0.09		2.62	

Lokalitet

Borehull

Dato
Koordinater
Retning
Helling/stigning
Høyde
Lengde

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
15.25 - 18.10	2.85	m.spredte malmimpr. 2-gl.gn.		50-60	0.28	0.16	0.64		5.40	
18.10 - 19.25	1.15	2-gl.gn. sv. py-impr.		50-60	0.09	0.12	0.19		6.05	
19.25 - 20.30	1.05	2-gl.gn. b.p.	D. sv. py-impr.	30-70						
20.30 - 21.75	1.45	gr.hbl.gn.	Store gr. sv.stict.	70						
21.75 - 27.90	6.15	gr.hbl.b.gn.	Py-impr. Noe småfoldet.	55, Ò.70						
27.90 - 29.60	1.70	gr.amf.	med biot. Flere folde-ombøyninger, akseplan ca. Ø	V steilt foldet						
29.60 - 35.75	6.15	gr.b.hbl.gn. båndet	A. noe py-impr. Meget foldet	V,steilt foldet						
35.75 - 36.00	0.25	2-gl.gn.	båndet	70						

A.Kruse 4.7.78

Lokalitet: Rana 44.180

Borehull: 576

Dato : 11.5.-78
Koordinater : X: 925.328,7 X: 44.186,7
Retning : E
Helling/stigning: +70°
Høyde : -65,1
Lengde : 2940 —

1

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 2.05	2.05	2 gl.gn.musk.d.	Lys,mlk. Py-rik m/spor Sl, Gn.	80°	0,12	0,11	0,36		1,55	
2.05 - 3.85	1.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.tildels mass. svak. imp. Py	80°	0,02	0,02	0,05		1,94	2,05-3,05
3.85 - 7.30	3.45	Hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. Vekslende m/parti biot.gn. tildels gr.rik. 1-3 mm. Imp. Py	60° 80°	0,01	0,03	0,03		6,82	4,50-7,50
7.30 - 8.40	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk-grovk. veksl. m/dm brede hbl.førende parti, imp. Sl,Gn,Cp,Py	70°	1,56	0,31	2,96		7,44	
8.40 - 9.20	0.80	2 gl.gn.musk.d.	Lys,mlk,spor hbl. Sl,Gn, Cp, Py	70°	0,53	0,10	0,92		2,71	
9.20 - 11.00	1.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/cm brede biot-hbl.før. bånd. Spor Sl,Gn,Cp, imp. Py	60° 70°	0,67	0,13	1,17		3,92	
11.00 - 12.10	1.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. Spor hbl. Svake spor Sl,Cp,Gn. Imp. Py	70°	0,06	0,18	0,88		6,61	
12.10 - 17.00	4.90	Hbl.gn.	Mørk,mlk,veksl. m/parti 2 gl.gn.b.d. tildels gr. rik 1-3 mm. Imp. Py	70° 80°						
17.00 - 17.40	0.40	Musk.gn.	Lys,mlk-fink. Rel.kv.rik. mass. Svak imp. Py							
17.40 - 19.40	2.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk-frovk. tildels mass. gr.rik 1-5 mm. Imp. Py	70° 80°						

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 576

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
19.40 - 20.10	0.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink.rel.mass. imp. Py.							
20.10 - 29.90	9.80	Hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. Veksl. med små parti 2 gl.gn.b.d. Cm-brede pegm.bånd. Rel. mass. gr.førende 1-3 mm. Omp. Py.	70° 80°						

31.5. 1978

Holger Pantdalsli

Lokalitet: Prof.L 43.640

Dato : Jan-79
Koordinater : X: 925.438,7 Y: 43.656,9
Retning : N
Borehull: 574
Helling/stigning: -70°
Høyde : - 44.0
Lengde : 15,10

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 5.80	5.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/dm-brede pegm.band, Spor gr.	75°						
5.80 - 6.00	0.20	TAP								
6.00 - 15.10	9.10	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl.gn.bd. Spor gr. Ved 6.85 spor Sl. Fra 9.75 - 9.80 impr. Sl,hbl. Fra 10.05 - 10.10 spor Sl. Fra 11.40 - 11.45 spor Sl.							

19/1 1979
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.460

Borehull: 573

Dato : Jan. 1979
Koordinater : X:925.411.9 Y:44.462.9
Retning : N
Helling/stigning: - 65°N
Høyde : 91.9
Lengde : 7.50 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.35	0.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. impr. Sl,Cp,Py.	70°	0.24	0.43	7.10			
0.35 - 0.65	0.30	Tap								
0.65 - 1.30	0.65	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-brede biotrike band, rel. mass.	70°	0.03	0.06	0.50			
1.30 - 1.55	0.25	Pegm.			0.02	0.02	0.02			
1.55 - 2.20	0.65	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. veksl. m/biot.rike band, impr. Sl,Cp,Py	70°	0.12	0.11	1.02			
2.20 - 3.00	0.80	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-brede band pegm. spor hbl. impr. Sl,Cp,Py	70°	0.48	0.40	4.47			
3.00 - 5.00	2.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.-fink.veksl. m/cm-bred biot.rike band fortrinnsvis m/spor gr.	70°	0.04	0.04	0.26			
5.00 - 6.10	1.10	2 gl.gn.bd.	Rel. mørk, mlk. hbl. førende, m/sor. gr. 0.5-3 mm. Svak impr. Py							
6.10 - 6.55	0.45	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spor gr.							
6.55 - 7.30	0.75	Pegm.								
7.30 - 7.50	0.20	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk. m/pegm-band.							

10/1 1979
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: 44.460

Borehull: 572

Dato : Jan. -79
Koordinater : X: 925.406.9 Y: 44.462.6
Retning : S
Helling/stigning: - 70°
Høyde : - 91.9
Lengde : 5.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.00	1.00	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk-grovk. hbl.førende, spor Py	60° 70°	0.01	0.16	0.06			
1.00 - 2.00	1.00	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.tildels kv.rik. enstaka 5 cm. tykke Sl,Gn band.	60° 70°	0.59	0.15	3.48			
2.00 - 5.40	3.40	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.vekslende m cm-tykke band. hbl. biot.rik 2 gl.gn. spredte gr. fortrinnsvis i hbl.bandene	60° 70°	0.01	0.04	0.10			

10/1 1979
Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 42.500

Dato : 7/1-79

Koordinater : X: 925.425,2 Y: 43.572,0

Retning : S

Borehull: 571

Helling/stigning: — 60°

Høyde : - 45,4

Lengde : 11,90 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 6.40	6.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl.gn.bd. og pegm. Spredte gr. 0,5-2 mm.	55° 60°						
6.40 - 7.00	0.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mør,mlk. vekslende m/ parti 2 gl.gn.alm. Spr. gr. 0,5 - 3 mm.	55°	0.01	0.03	0.01			
7.00 - 8.00	1.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/dm-brede hbl.førende band fortrinnsvis m/impr. Sl,Cp,Py		1.05	0.46	2.86			
8.00 - 9.30	1.30	Mask,gn.	Lys,mlk. tildels kv.rik, spor gr.	60°	0.04	0.02	0.03			
9.30 - 11.90	2.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-dm.brede 2 gl.gn.bd. og pegm.band, spor gr.	60°						

19/1 1979
H. Pantdalsli

RANA GLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 48.580

Borehull: 570

Dato : 4/10-78
Koordinater : X 1925.426,5 Y: 48.580,1
Retning : N
Helling/stigning: -76°
Høyde : -45,2
Lengde : 12,00 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 5.40	5.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/enkelte cm-brede band pegm. spr. gr. 1-3 mm.	70°	0,04	0,03	0,15			4,40-5,40
5.40 - 6.50	1.10	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/pegm.band og biotslepper Spor hbl. Sl,Cp,Py	80° 50°	0,24	0,17	0,90			
6.50 - 7.10	0.60	musk.gn.	Lys,mlk, tildels kv.rik, spor gr.		0,03	0,05	0,05			
7.10 - 7.50	0.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. rel.mass. spor gr.							
7.50 - 8.10	0.60	2 gl.gn.bd..	Rel. mørk,mlk. vekslende m/dm.brede band 2 gl.gn.alm spor hbl. gr.	70°						
8.10 - 8.50	0.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spor gr.							
8.50 - 12.00	3.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ dm-brede band. 2 gl.gn.bd. Spr. gr. 1-3 mm.	65°						

19/1 1979
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.420

Borehull: 569

Dato : des - 78
Koordinater : X: 925.425,0 Y: 44.421,6
Retning : N.
Helling/stigning: - 77°
Høyde : - 88,8
Lengde : 9,17 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.65	0.65	Pegm.	Bandet m/biot.gn.		0.02	0,10	0,11			
0.65 - 2.50	1.85	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. enkelte dm-brede band m/2 gl.gn. alm. spor hbl. Impr. Sl, Cp, Py	60° 70°	0,30	0,21	1,25			
2.50 - 3.45	0.95	2 gl.gn.alm.	rel.lys,mlk.	65°	0,08	0,05	0,30			
3.45 - 4.00	0.55	Pegm.								
4.00 - 4.55	0.55	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. spor hbl.	65°						
4.55 - 5.55	1.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys, mlk-fink.	65°						
5.55 - 7.80	2.25	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. tildels biot.gn. hbl.førende. spr. gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py.	65°						
7.80 - 9.10	1.30	2 gl.gn.alm.	Rel. lys, mlk.	65°						

4/1 1979
H. Pantdalsli

RANA SLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43.480

Borehull: 568

Dato : Dec - 78
Koordinater : X: 925.418,8 Y: 43.477,5
Retning : N.
Helling/stigning: − 71°
Høyde : − 51,3
Lengde : 12,20 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.10	0.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. impr. Sl,Cp, gn.Py.							
0.10 - 0.30	0.20	Pegm.	Spor Sl,Cp,Gn,Py							
0.30 - 1.80	1.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.vekslende m/dm brede biot.rike band fortrinnsvis m/spr. gr. 0,5-2 mm.	40°						
				50°	0,05	0,02	0,10			1,00-1,80
1.80 - 2.05	0.25	Pegm.	Spor Sl,Cp,Gn,Po,Py		0,45	0,15	0,08			
2.05 - 3.05	1.00	Biot.gn.	Rel.mørk,mlk-grovk.tildels hbl.førende.Fra 2.40-2.60 Pegm. Impr. Sl,Cp,Gn,Py.	50°	1,04	0,98	2,70			
3.05 - 3.70	0.65	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.tildels spor hbl. impr. Sl,Cp,Gn,Py.	60° 70°	0,54	0,59	3,10			
3.70 - 3.85	0.15	TAP								
3.85 - 7.45	3.60	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.rel.mass.spor gr. 0.5-2 mm. fra 4.92 - 4.95 Sl,Cp.	60°	0,03	0,06	0,20			3,85-4,85
					0,02	0,03	0,07			6,45-7,45
7.45 - 8.15	0.70	Malm	Biot.,hbl.rik.		1,76	1,99	7,70			
8.15 - 12.20	4.05	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. rel.mass. Spor gr. 0.5-2 mm. tildels kv:rik.	50°	0,16	0,27	0,63			8,15-9,15

14/12 1978
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Bofil 43.720

Borehull: 567

Dato : Nov – 78
Koordinater : X: 925.416,0 Y: 43.725,7
Retning : S
Helling/stigning: – 55°
Høyde : – 49,1
Lengde : 24,60 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 – 0.85	0.85	TAP								
0.85 – 9.60	8.75	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl.gn.b.d. spredte gr. 1-3 mm.	60°	0,25	0,04	0,30			8,60-9,60
9.60 – 10.00	0.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ biot.rike band. Fortr.vis m/spor Sl,Cp,Gn,Py	50°	0,44	0,22	0,90			
10.00 – 11.45	1.45	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/10-30 cm brede band. rel. kompakt hbl.førende malm, Sl,Cp,Gn,Py.		1,90	0,67	6,80			
11.45 – 12.35	0.90	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. kv.rik,mass.		0,15	0,08	0,40			
12.35 – 12.70	0.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. m/spredte gr. 1-5 mm.	50°						
12.70 – 14.50	1.80	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. rel.kv.rik, mass. spor gr.							
14.50 – 14.85	0.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spr. gr.1-3mm	50°						
14.85 – 16.40	1.55	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,-fink. tildels kv.rik og mass. Spor gr. Sl, Cp, Py	60°	0,15	0,04	0,30			
16.40 – 16.85	0.45	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ 5-10 cm brede biot.,hbl-førende band. god malm. Sl,Cp,Gn,Py		1,30	0,77	4,55			
16.85 – 17.60	0.75	Pegm.			0,24	0,15	0,66			
17.60 – 18.20	0.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. tildels kv.rik. spor gr.	60°						
18.20 – 18.80	0.60	Pegm.								

PANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 567

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
18.80 - 19.40	0.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. Spredte gr. 0,5 - 2 mm	60°						
19.40 - 19.60	0.20	Pegm.							
19.60 - 24.60	5.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede band 2 gl.gn. bd. og pegm. spor gr.	60°						

22/1 1979
Holger Pantdalsli

Lokalitet: Profil 43.480

Borehull: 566

Dato : Dec - 78
Koordinater : X: 925, 423, 2 Y: 43.477, 6
Retning : N.
Helling/stigning: -60°
Høyde : -51,0
Lengde : 12,10 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. vekslende m/biot.-rike dm-brede band. svak impr. Py.	60°						
0.50 - 1.50	1.00	Pegm.	Fra 1.10 - 1.20 biot.gn. spor Cp, Po,Py.							
1.50 - 4.60	3.10	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede biotrike band fortrinnsvis m/spr. gr. 0,5-3 mm. Spor Sl,Cp,Gn,Py	60°	0.04	0.05	0.19			3,60-4,60
4.60 - 5.00	0.40	Biot.gn.	Mørk,mlk.hbl.førende, impr. Cp, Gn, Py		0.70	0.35	0.04			
5.00 - 6.25	1.25	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.vekslende m/ cm-dm brede biot.rike band. Fra 5.90-6.00 pegm. Spr. gr	60°	0,17	0.07	0.04			
6.25 - 7.90	1.65	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk.tildels hbl-førende. fra 6.70-6.85 pegm. 7.05-7.30 alm. gn. Impr. Sl,Cp,Gn,Py	60° 70°	0,74	0,58	3,60			
7.90 - 12.10	4.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. Fra 8.60-8.75 Pegm. 11.70-11.90 biotrik. Spr. gr. 0.5-3 mm.	60° 40°	0,73	0,11	0,30			7,90-9.00
			12/12 1978 H. Pantdalsli							

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43.720

Borehull: 565

Dato : Nov. 1978
Koordinater : X: 925.417,8 Y: 43.725,6
Retning : N
Helling/stigning: - 55°
Høyde : - 49,1 m
Lengde : 36,10 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.80	0.80	TAP								
0.80 - 7.00	6.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spor gr.	55°60°						
7.00 - 7.70	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. fra 7.10 - 7.20 god impr. Sl,Cp,Gn.Py Fra 7.55-7.65 spor Sl,hbl.	60°						
7.70 - 11.95	3.25	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.ved 9.65 spor Cp,Sl,Po. Enkelte små mørke biot.rike parti. spor gr.	60°	0,14	0.04	0,45			11.00-11,95
11.95 - 13.70	1.75	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende med dm-brede biot.rike hbl. førende band. Impr. Sl,Cp Gn, Py.	50° 60°	1.02	0.26	2,20			
13.70 - 14.70	1.00	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. rel.mass. spor gr.		0,12	0.06	0,18			
14.70 - 15.40	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende med dm-brede biot. gr.rike band Ved 14.85 spor Sl, Cp	55°	0.01	0,10	0.28			
15.40 - 21.00	5.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/spr. striper og band opptil 20 cm bred m/impr. Sl,Cp,Gn,Py hbl. spor gr.	60°	0,17	0,10	0.65			15,40 -18,00
					0,85	0,13	1.20			18,00 -21,00
21.00 - 23.75	2.75	2 gl.gn.alm.	rel.lys,mlk.enkelte små pegm.band. spr. gr. 0,5-2 mm.	60°	0.06	0,01	0,16			21.00-22,00
23.75 - 24.00	0.25	Biot.gn.(sk).	Mørk, grovk. impr. Py.							
24.00 - 36.10	12.10	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.vekslende med spr. striper og dm-brede band 2 gl.gn.bd. og pegm. Spr. gr. 0,5 - 3 mm.	60°						
		19/12 1978	H. Pantdalsli							

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43.480

Borehull: 564

Dato : Nov-78
Koordinater : X: 925.423,2 Y: 43.477,6
Retning : N.
Helling/stigning: - 76°
Høyde : - 50,5
Lengde : 12,21

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. vekslende med små biot.rike band, fortrinnsvis m/spr. gr.	70°						
0.50 - 1.40	0.90	Pegm.	Spor Gn,Cp,Py,Po							
1.40 - 3.10	1.70	Musk.gn.	Lys,mlk.vekslende med dm-brede biot.rike band med gr. 0,5 - 2 mm.	70°						
3.10 - 3.45	0.35	Pegm.	Spor Gn,Cp,Py,Po							
3.45 - 6.20	2.75	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk, Fra 3.45 - 4.00 spor Sl,Cp,Gn,Py. Fra 5.60 - 5.75 pegm. Spor gr.	70°	0.03	0.05	0,07			5,20-6,20
6.20 - 7.60	1.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-grovk. veksl. m/dm-brede band biot.gn. m/spor hbl. fortrinnsvis med impr. Sl,Cp,Gn,Py	70°	0,95	0,25	3,80			
7.60 - 11.05	3.45	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.rel.mass. spor gr.	70°	0.02	0.02	0.04			7,60 -8,60
11.05 - 12.20	1.15	Pegm.								

18/12 1978

H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43.480

Borehull: 563

Dato : Nov - 78
Koordinater : X: 925.423,3 Y: 43.477,6
Retning : N.
Helling/stigning: - 45
Hoyde : - 50,5
Lengde : 15,20

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.95	0.95	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. rel.mass. kv.rik. spor gr.	50°						
0.95 - 1.40	0.45	Pegm.								
1.40 - 1.80	0.40	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. Rel. mass. kv.rik. spor gr.	50°						
1.80 - 2.05	0.25	Pegm.								
2.05 - 2.80	0.75	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. rel.mass. kv.rik. spor gr.	60°						
2.80 - 3.10	0.30	Pegm.								
3.10 - 6.30	3.20	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. rel. mass. Kv.rik. vekslende med cm-dm brede pegm. og biot.-rike band. spor gr.	50° 60°						6,00 -
6.30 - 7.00	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende med 2 gl.gn.alm. spor gr.	60°	0.05	0.02	0.04			- 7,00
7.00 - 7.60	0.60	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. spor hbl. ondulerende impr. Sl,Cp,Gn, Py.		0,65	0,52	1,30			
7.60 - 15.30	7.70	2 gl.gn.alm.	Rel lys,mlk. vekslende m/ pegm. og biot.rike band. Spr. gr. 0,5-5 mm.	60° 40°	0.02	0.04	0.10			7,60-8,60

14/12 -78

H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43.720

Borehull: 562

Dato : Nov. 78
Koordinater : X: 925.417,1 Y 43.725,9
Retning : N
Helling/stigning: 70°
Høyde : - 49,1
Lengde : 30 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.30	0.30	TAP								
0.30 - 6.55	6.25	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ biot.rike mørke band fortrinnsvis m/gr. 0,5-3mm	70°	0.04	0.02	0.11			0,55-6,55
6.55 - 7.00	0.45	Biot.gn.	Mørk,grovk.-mlk. spor hbl. impr. Sl,Cp,Gn,Py	70° 60°	0,25	0,92	0,93			
7.00 - 7.25	0.25	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. svak impr. Py.		0.03	0,40	0.39			
7.25 - 7.75	0.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/biot.rike band. Ved 7.30 spor sl. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	50° 80°	0.04	0,10	0,61			
7.75 - 8.20	0.45	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. spr. gr. 0,5-2 mm Svak impr. Py.	50°	0.06	0.07	0.16			
8.20 - 8.50	0.30	Malm	Hbl.rik.		3,25	0.63	9,75			
8.50 - 17.80	9.30	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. Fra 8.90-9.00 lys Sl. 11.10 - 11.15 Sl, Cp. 13.15-13.30 pegm. Spr. gr. 0,5-3 mm. Svake impr. Py.	50° 60°	0,48	0,12	1.70			8,50-9.50
					0,06	0.02	0,21			9.50-10,50
					0,02	0,03	0,06			16,80-17,80
17.80 - 21.90	4.10	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,grovk. vekslende m/band biotgn.(sk.)spor hbl, impr. Sl,Cp,Gn,Py.	40° 50°	0,45	0,29	1.70			17,80-17,80
					1.01	0,29	2,25			1980-2/90
21.90 - 23.10	1.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink,spor hbl. gr.0,5-2 mm. Fra 22.00 - 22.10 Sl,Cp, 22.95-23.10 Sl,Cp,Gn.	50°	0,51	0,08	0,80			
23.10 - 23.60	0.50	Pegm.			0,02	0,05	0,05			

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 562

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
23.60 - 24.00	0.40	2 gl.gn.bd Rel.mørk,mlk. spor hbl. Sl,Cp,Py	60°	0,14	0,29	0,31			
24.00 - 24.30	0.30	Pegm.		0.08	0.06	0.09			
24.30 - 25.30	1.00	2 gl.gn.bd Rel.mørk,mlk. tildels hbl.førende Impr. Sl, Gn,Py	45°	0.54	0.36	1.20			
25.30 - 30.00	4.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/dm brede pegm.band. Spr. gr. 0.5-3 mm	30° 50°	0,05	0,03	0,10			25,30-26,30

11/12 1978

H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 48.440

Borehull: 561

Dato : Nov – 78
Koordinater : Ø: 925.411,1 Y: 43.464,0
Retning : N.
Helling/stigning: – 80°
Høyde : – 53,1
Lengde : 40,85 m.

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 3.80	3.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk,spor gr.0,5-2mm Svak impr. Py.	70°						
3.80 - 4.20	0.40	Pegm.								
4.20 - 19.30	15.10	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. veksl. m/dm-brede mørke biot.rike band Spr. gr. 0,5-5 mm.	70°						
19.30 - 19.70	0.40	Pegm.								
19.70 - 29.50	9.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ dm-brede mørke biot.rike band, spor græ	60° 70°	0,04	0,07	0,07			29,00-29,50
29.50 - 30.00	0.50	Biot.gn.	Mørk,mlk. svak impr. Py	60°	0,02	0,05	0,08			
30.00 - 31.30	1.30	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. veksl. m/ band rel. kompakt malm.m/ hbl. impr. Sl,Cp,Py	60°	0,64	0,42	2,60			
31.30 - 32.05	0.75	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,-fink. spor gr. svak impr. Py	60°	0,03	0,80	0,15			
32.05 - 32.40	0.35	Pegm.								
32.40 - 33.90	1.50	Biot.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/band hbl.gn. spr.gr. 0,5-3 mm fortrinnsvis i hbl.gn. Impr. Py.	60°						
33.90 - 34.10	0.20	Pegm.								
34.10 - 34.80	0.70	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. spr.gr. 0,5 - 3 mm.	60°						
34.80 - 35.00	0.20	Pegm.								
35.00 - 36.80	1.80	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. veksl. med biot.gn. og pegm.band Svak impr. Py	60° 70°						

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 561

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
36.80 - 38.80	2.00	Biot.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/ pegm.band, spor hbl. Spr. gr. 0,5 - 3 mm. Svak impr.Py	60° 70°						
38.80 - 40.85	2.05	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. Spr. gr. 1-3mm	70°						

24/11 1978
Holger Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 42,700.

Borehull: 560

Dato : okt. 78.
Koordinater : X: 925.400.8 Y: 42.706.4
Retning : S
Helling/stigning: - 80°
Høyde : - 22.7 m
Lengde : 52.20 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.75	0.75	Tap								
0.75 - 1.25	0.50	2 gl.gn.alm.	Lya,mlk. oppknust. Spor gr impr. Py							
1.25 - 1.95	0.70	Tap								
1.95 - 6.80	4.85	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. ved 5.30 1 cm Sl,Cp, Spor Gr.	60° 70°						
6.80 - 7.00	0.20	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk. foldet, impr. Sl, Cp, Py.							
7.00 - 19.10	12.10	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. Vekslende m/b inhold, spr. gr. 0,5-3 mm tildels kv.rik.	60° 70°						
19.10 - 19.50	0.40	Pegm.								
19.50 - 20.10	0.60	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk, spor gr.	60°	0,18	0,06	0,06			
20.10 - 21.00	0.90	Biot.gn.	Mørk,grovk. tildels sk. preget, hbl.førende, små foldet, impr. Sl,Cp,Gn,Py		0,58	0,68	4,18			
21.00 - 23.70	2.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.-fink. var. m/b.d. band. 21.55-21.65 Impr. Sl, Cp. Spor diffuse gr.	70° 80°	0,21	0,17	0,60			21,00-22,00
23.70 - 24.20	0.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.		0,02	0,04	0,12			
24.20 - 26.00	1.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. impr. Sl,Cp,Gn,Py	60° 80°	0,73	0,33	3,35			
26.00 - 28.90	2.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl-førende. Spr. gr. 0,5-3 mm imp. Py.	70° 80°	0,08	0,04	0,37			26,00-27,00
28.90 - 36.90	8.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk.-grovk. 31.10 - 31.20 anhydrit. tildels gr.rik 0,5-3 mm.	60° 70°						

RANA BLADS TRYKKERI

Kalitet:

Borehull: 560

Dato :
Koordinater
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
36.90 - 40.80	3.90	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk. vekslende m/band av hbl.gn. fortrinnsvis m/gr. 0,5-3 mm. Impr. Py.	60° 80°						
40.80 - 46.10	5.30	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spr. gr. 0,5-3mm	70°						
46.10 - 47.50	1.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. enkelte små pegm.band.	60° 70°						
47.50 - 49.50	2.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. var. m/cm-brede hbl.gn.band m/gr.	70°						
49.50 - 52.20	2.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spr. gr. 0,5 - 3 mm.	70°						

14/11 1978
Holger Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil F 43.730

Borehull: 559

Dato : Nov - 78
Koordinater : X: 925.417,8 Y: 43.726,1
Retning :
Helling/stigning: – 90°
Høyde : – 49,1
Lengde : 42.0 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.55	0.55	TAP								
0.55 - 6.50	5.95	2 gl.gn.alm.	Lya,mlk-fink. rel. hom. enkelte små pegm.band. spor gr. svak impr. Py	60° 70°	0.18	0.10	0.50			5,50-6,50
6.50 - 6,85	0.35	Biot.gn.(sk)	Mørk,grovk.hbl.førende, impr. Sl,Cp,Py	70°	2.40	0.85	3.80			
6.85 - 9.40	2.55	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band god malm Sl,Cp, og Hbl. Svak impr. Py	70°	0.31	0.60	1.30			~~9,40-10,40~~
9.40 - 12.10	2.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk,rel. hom. spr gr. Svak impr. Py.	60° 70°	0.03	0,13	0,46			9,40-10,40
12.10 - 13.05	0.95	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. enkelte gr. 0,5-2 mm.	70°						
13.05 - 17.20	4.15	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. enkelte pegm.band. spor gr. rel.mass. fra 16.40-16.50 impr. Sl, Cp, Py.	60°	0,07	0,05	0,29			16,20-16,20
					0,26	0,21	0,70			16,20-17,20
17.20 - 18.50	1.30	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. svak impr. Sl, Cp, Py.	60°	0.53	0.80	1.40			
18.50 - 20.20	1.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spor gr. svak impr. Py	60°	0.21	0,25	0.70			
20.20 - 21.60	1.40	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. fra 20.20-21.00 rik på kalkspat. Impr. Sl, Cp, Gn, Py	60°	1.00	0.41	2,50			
21.60 - 23.00	1.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/biotrikere parti. Fra 22.20-22.30 lys sl,Cp Gn. Py. Spor gr.	60°	0.57	0,15	160			

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 559

2.

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
					0,42	0,15	~~1.60~~ 0.06			23.00-24.00
23.00 - 24.80	1.80	Pegm.	Spor Sl,Gn.							
24.80 - 31.00	6.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/biot.rikere band. SPor gr.	70°	0.06	0.05	0,04			30.00-31.00
31.00 - 31.40	0.40	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. impr. Sl CP, Py		0,70	0,67	2,00			
31.40 - 34.30	2.90	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/biot.rikere band. Fra 32.45-32.50 lys Sl, hbl. Fra 32,65-32.67 Sl,Cp, hbl. spor gr.	70° 50°	0,18	0,12	0,80			
34.30 - 35.45	1.15	Biot.gn.	Mørk,grovk. spor hbl. Imp sl,Cp, Py	60°	0.05	0,86	3,80			
35.45 - 37.05	1.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.Fra 36.80-36.85 Sl, Po, Py Spor gr. Svak impr. Py	70°	0,11	0,23	0,50			
37.05 - 41.30	4.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor gr. Fra 38.65 - 38.70 spor Sl,Cp. Svak impr. Py	70°						
41.30 - 42.00	0.70	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. gr.førende 0.5-3 mm. Svak impr. Py	70°						

27/11 1978
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 42.700

Borehull: 558

Dato : 06/ 78
Koordinater X: 925.398,2 Y: 42.706,4
Retning : S
Helling/stigning: – 60°
Høyde : – 22,7
Lengde : ~~23,45 m.~~ 76.00 m.

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.50	0.50	TAP								
0.50 - 2.30	1.80	Musk.gn.	Lys,mlk.-grovk. Karakteristisk ondulerende foliasjon, filtet preg, litt gr. 0,5-2 mm. god impr. Py	40°						
2.30 - 10.00	7.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. kv.rik. mass. enkelte diffuse gr. 0,5-1mm. fra 6.10-6.30 god impr. Py	50°	0.02	0.02	0,15			2,0 - 10,00
10.00 - 10.15	0.15	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. impr.Sl,Py		0.22	0.21	3.04			
10.15 - 10.30	0.15	Pegm.								
10.30 - 10.60	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. impr. Sl,Cp Py	40° 60°	0,35	0,41	1.77			
10.60 - 23.30	12.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. Veksl. med biotrikere band, fortrinnsvis m/spr. gr. 0,5 - 3 mm. enkelte små pegm.band.	45° 60°	0,04	0.11	0,31			10,60 - 11,60
					0.00	0.05	0.01			22,50 - 23,50
23.30 - 23.55	0.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,grovk. tildels musk-biot.sk. ondulerende, impr. Sl,Cp,Py		0.20	0.51	2.06			
23.55 - 23.75	0.20	TAP								
23.75 - 24.35	0.60	2 gl.gn.b.d	Rel.lys,grovk-mlk. Svakt ondulerende, tildels sk.rig Impr. Sl,Cp, Py	50° 60°	0,88	0,33	3,29			
24.35 - 24.55	0.20	Pegm.	Spor Sl, Gn.		0,22	0,10	0,70			
24.55 - 27.40	2.85	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. fra 24.70 - 24.80 biot.gn. enkelte spr. gr. 0,5 - 5.mm	70°	0.03	0.02	0,11			

RANA BLADS TRYKKERI

Borehull: 558

2.

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
27.40 - 28.00	0.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. Impr. Sl,Cp,Gn,Py.	70°	0,16	0,23	0,62			
28.00 - 28.60	0.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. enkelte cm-brede hbl.band.	70°	0.02	0.05	0.03			
28.60 - 28.80	0.20	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.spor hbl. impr. Sl, Cp, Gn, Py	70°	3,50	0.07	11.00			
28.80 - 29.80	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. impr. Py	70°	0.28	0,17	0.62			
29.80 - 30.15	0.35	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.kv.rik. hbl.førende impr. Sl, Cp, Gn, Py		1.30	0.26	2,62			
30.15 - 30.70	0.55	Musk.gn.	Lys,mlk. små parti m/litt b. Impr. Py	60° 70°	0,28	0,18	0.60			
30.70 - 31.40	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. grovk. impr. Sl, Cp, Gn, Py		0.93	0,52	1.61			
31.40 - 33.00	1.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk, spr. dm.brede band hbl.førende. Spr. gr. 0,5 - 3 mm.	60° 70°	0,07	0.02	0,17			31,40 -32,40
33.00 - 42.70	9.70	Hbl.gn.	Mørk,mlk, stichtolitisk fra 42.00 - 42.70. Tildels gr.-rik 0,5 - 3 mm.	50° 70°						
42.70 - 49.50	6.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. 44.20 - 45.30 dm.brede stichtolitiske band. Spr. gr. tildels rik 0,5-5 mm. 42.70-45.50 impr. Py	60° 70°						
49.50 - 51.70	2.20	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.rik 0,5-3 mm	60°						
51.70 - 52.00	0.30	Pegm.								
52.00 - 55.80	3.80	Biot.-hbl.gn.	Mørk,mlk,spr. gr. 0,5-3 mm	60°						

RANA BLADS TRYKKERI

Borehull: 558

3.

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
55.80 - 63.60	7.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys, mlk. spr. gr. 0,5 - 3 mm.	60°						
63.60 - 76.00	12.40	Hbl.gn.	Mørk,mlk. 63.60 - 66.40 gr.førende 0,5 - 3 mm	60°						

13/11 1978
Holger Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 42.700

Borehull: 557

Dato : okt - 78
Koordinater : X: 925.398,4 Y: 42.706,4
Retning : S.
Helling/stigning: - 40°
Høyde : - 22,7
Lengde : 73,45 m.

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.40	0.40	Tap								
0.40 - 0.80	0.40	Musk.gn.	Lys,grovk. spor sl.	20°50°	0.86	0.29	1.70		5.60	
0.80 - 5.30	4.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,grovk.-mlk. Spor gr. 1-2 mm. fra 3.50 til 3.70. Spor Sl, Cp. God imp. Py fra 0.80 - 3.00.	25° 40°	0.49	0,30	1.30		9.70	0.80-3.00
					0,05	0.07	0,15		5.90	3.00-4.00
5.30 - 9.00	3.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spredte gr. 0,5 - 3 mm.	30°						
9.00 - 10.70	1.70	Biot.gn.	Rel.mørk,grovk.-mlk. Vekslende m/parti 2 gl.gn. alm. Spr. gr. 1-3 mm.	35° 40°						
10.70 - 16.20	5.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. Spr. gr. 1-3 mm.	40°	0.02	0,02	0,06		1.80	15.20-16.20
16.20 - 16.85	0.65	Biot.gn.	Mørk,grovk. god.imp. Sl, Cp, Gn, Py.	10° 30°	5.10	1.17	0.44		16.20	
16.85 - 17.50	0.65	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. spor 0.5-1 mm gr.	10°40°	1.90	0.21	0.09		3.20	
17.50 - 19.65	2.15	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. Vekslende m/biot. og gr.rikere band. Spr. gr. 0,5-2 mm.	20° 40°						
19.65 - 19.85	0.20	Pegm.								
19.85 - 25.30	5.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. Vekslende m/ biot.rikere band, spr. gr. 0,5 - 2 mm.	20° 50°						
25.30 - 27.60	2.30	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. Spr. gr. 0,5 - 1 mm.	45°						

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 557

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
27.60 - 30.30	2.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.-fink. Veksl. m/parti 2 gl.gn.alm. Spredte gr. 0,5 - 2 mm.	30° 40°						
30.30 - 34.35	4.05	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. pegm. fra 31.20 - 31.45. Spr. gr. 0,5 - 1 mm. Tildels mass.	40°	0,04	0,01	0,02		1,10	3335-3435
34.35 - 34.85	0.50	biot.gn.	Mørk,grovk. pegm. fra 34.40 - 34.60. Spor Sl,Cp Gn, Hbl. Py.	70°	0,17	0,43	0,14		7,20	
34.85 - 35.60	0.75	Malm	Skarn,diopsid,hbl.		2.90	0.77	5.60		7.70	
35.60 - 37.75	2.15	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.-fink. Veksl. m/biot.rikere band. Enkelte gr. 0,5-1 mm.	40° 50°	0.14	0,05	0,33		2.30	
37.75 - 39.00	1.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. Veksl. med band 2 gl.gn.alm. mineralisering fortrinnsvis i biot.rike partier. Imp. Sl, Cp, Gn, Py	0 40°	0,46	0,23	3,00		6,60	
39.00 - 39.85	0.85	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk,enkelte band m/hbl. svake spor Sl,Cp Gn,Py.	50°	0,17	0,20	0,34		8,00	
39.85 - 41.60	2.75	2 gl.gn.alm.	Rel. lys, mlk.	50°	0,02	0,02	0,08		1,75	39.85-40.85
41.60 - 49.00	7.40	Hbl-biot.gn.	Rel.mørk,mlk-grovk. Veksl. m/hbl. Gr. 1-3 mm. tildels mass.	40° 50°						
49.00 - 50.80	1.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. enkelte diffuse gr. 0,5-1 mm.	50° 70°	0,03	0,05	0,07		4,38	50.00-50.90
50.80 - 51.25	0.45	Biot.gn.(sk).	Mørk,grovk. Imp. Sl,Gn,Cp Py.	50°	0,79	0,23	2,10		6,83	6

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 557

3.

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
51.25 - 52.80	1.55	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enkelte spor hbl. gr. 0,5-1 mm. Imp. Py	50°	0.08	0.05	0,13		5.90	
52.80 - 56.40	3.60	Amf	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm m/enkelte biot.rike parti	30° 60°						
56.40 - 56.95	0.45	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink.	45°						
56.95 - 58.15	1.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. Pegm. 57.45 - 57.65. Spor hbl. Imp. Py	50°	0.10	0.16	0,07		5,10	
58.15 - 60.20	2.05	Hbl.gn.	Mørk,mlk. enkelte cm-brede band m/spor sl, imp. Py	50°	0.08	0.19	0,22		6.80	
60.20 - 62.05	1.85	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. Enkelte biot-band.	50° 60°	0,05	0,07	0,16		2,19	
62.05 - 64.50	2.45	Biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. spor hbl. Imp. Py	50° 60°						
64.50 - 66.30	1.80	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. Imp. Py	20° 50°						
66.30 - 73.15	6.85	amf.	Mørk,mlk.tildels gr.rik 1-3 mm.	60°						
73.15 - 73.45	0.30	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.	60°						

1/11 1978
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 556

Dato : Sep – 78
Koordinater : X: 925.385 Y: 42.950
Retning : S
Helling/stigning: - 60
Hoyde : -42.3
Lengde : 58,10 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.20	0.20	Hbl.biot.gn.	Rel.mørk,mlk. gr.førende 1-2 mm. svak imp. Py	40	0.09	0.10	0.17		13.37	
0.20 - 2.90	2.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grov-mlk. (tildels bladig) enkelte partier med spor hbl. Sprett imp. Sl,Gn,Cp,Py	30 0 80	0.58	0.32	2.18		8.37	
2.90 - 3.10	0.20	Amf.	Mørk,mlk. Biot som spredte filmtynne skikt.	30	0.11	0.09	0.21		5.35	
3.10 - 4.40	1.30	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. med Spredte cm-tykke hbl.førende band enstaka gr. 1-2 mm. Spor Sl,Cp,Gn,Py.	30	0.06	0.13	0.31		6.95	
4.40 - 4.80	0.40	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik.	30°	0.05	0.08	0.15		2.85	
4.80 - 5.15	0.35	TAP								
5.15 - 10.60	10.45	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.-fink.-mlk. Spredte cm-tykke biot.rike band. Enstaka små granater 0,5 - 1.0 mm.	30 35						
10.60 - 10.80	0.20	Pegm.								
10.80 - 17.40	6.60	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. rel.kv.rik, med enkelte dm.tykke biot.d. partier. Spr. gr. 1-3 mm.	35 50	0.04	0.03	0.06		2,52	16.40-17.40
17.40 - 18.95	1.55	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk. rel.kv.rik.Spr. gr. 1-2 mm. Enkelte str. Sl,Cp,Gn, Svak imp. Py.	45 50°	0.49	0.20	1.12		4.28	
18.95 - 19.40	0.55	Malm komp.			1.00	0.64	5.83		12.88	
19.40 - 21.20	1.80	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk. rel. kv.rik. Spr. gr. 1-2 mm. enkelte Striper Sl,Cp,Gn,Py	45°	0.08	0.12	1.08		3.74	

FANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 556

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
					1.80	0,38	0,16		8,91	21,20-22,20
21.20 - 23.50	2.30	2 gl.gn.bd	Rel. lys,mlk. spor hbl. svak imp. Py spor Gn.	45						
23.50 - 36.70	13.20	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. tildels mass. Enkelte hbl.rikere partier Gr.førende 1-3 mm fortrinnsvis i hbl.rikere partier. Svak imp. Py.	50 70						
36.70 - 37.20	0.50	Amf.	Mørk,mlk. rel. mass.							
37.20 - 39.80	2.60	Biot.hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-2m Svak imp. Py.	60						
39.80 - 42.40	2.60	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-2 m Svak imp. Py.	70						
42.40 - 43.00	0.60	Pegm.								
43.00 - 47.60	4.30	2 gl.gn.b.d.	Rel. lys,mlk. opp til 5 cm tykke hbl.gn.band. Gr.førende 1-2 mm. Svak imp. Py	70 80						
47.60 - 48.00	0.40	Pegm.								
48.00 - 56.70	8.70	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. gr.førende 1-2 mm. enkelte dm-tykke pegm.band. svak imp. Py	70 80						
56.70 - 58.10	1.40	hbl.gn.	Mørk,mlk.rel.mass. gr.før. 1-4 mm.							

4/10 1978

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 42,950

Borehull: 555

Dato : Sep - 78
Koordinater : X: 925.385,3 Y: 42.950
Retning : N
Helling/stigning: - 60°
Høyde : - 42,3
1. Lengde : 59,25

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 3.70	3.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. rel. homogen og kv.rik. Enstaka små gr. 0.5 - 1.0 mm. Spor Py.	60°						
3.70 - 3.95	0.25	Pegm.								
3.95 - 6.05	2.10	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk.enstaka cm-tykke hbl.biot.band. Spredte gr. 1-2 mm. ved 4.90-4.95 Gn. Spor Py.	70° 80°						
6.05 - 6.55	0.50	Pegm.								
6.55 - 8.60	2.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. spor hbl. (som mm tykke skikt). Spredte gr. 1-2 mm. Ved 6.60 - 6.80 spor Sl,Cp	80°						
8.60 - 9.50	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk mlk. tildels gr. hbl.førende. Ved 8.60 - 8.70 spor Sl, Gn	70°						
9.50 - 10.00	0.50	TAP.								
10.00 - 20.60	10.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. kv.rik. enkelte dm.tykke partier biot.rikere m/spor hbl. Spr. gr. 1-2 mm. spor Py	75° 80°						
20.60 - 21.00	0.40	Hbl.gn.	Mørk,mlk. rel.mass. gr.-førende 1-3 mm.							
21.00 - 26.80	5.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. litt veksl. med Biot.rikere partier. Enkelte opp til 5 cm tykke pegm.band og hbl.gn. band. Spr. gr. hovedsakelig i hbl. bandene. Spor Py.	70°						

PANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 555

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
26.80 - 36.00	9.20	hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende. Enkelte cm-tykke pegm.band Fr. 29.00 - 30.60 stichtolitisk. Svak imp. Py.	60° 80°						
36.00 - 37.80	1.80	hbl.gn.	Mørk, fin-mlk. gr.førende 1-3 mm. rel.mass.(amfibolitisk). Svak imp. Py	70° 80°						
37.80 - 42.70	4.90	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.enstaka dm-tykke Pegm.band.	70° 10° 70°						
42.70 - 45.70	3.00	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fin. Spr. gr. 1-2 mm. Enstaka cm-tykke pegm. band.	70° 80°						
45.70 - 51.80	6.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enkelte cm-tykke amf.band m/gr.-1-3m	70° 80°						
51.80 - 52.50	0.70	Amf.	Mørk,mlk. mass.gr.førende 1-3 mm.	70°						
52.50 - 55.40	2.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spr. gr.1-2 m. 54.20 - 54.30 amf.	80°						
55.40 - 56.00	0.60	Biot.hbl.gn.	Mørk-mlk. gr.førende 1-2mm	70°						
56.00 - 56.40	0.40	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.rik 1-3 mm.	70°						
56.40 - 59.60	3.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. gr.førende spor hbl.	70°						

22/9 1978
Stellan Burman

RANA BLADTRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 554 Profil 44.120

1.

Dato : Aug - 78
Koordinater : X: 925.420,5 Y: 44.115,7
Retning : N
Helling/stigning: - 45°
Høyde : -52.0
Lengde : 58,31 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.40	0.40	Hbl.biot.gn.	Rel.mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. Spor Py.	45°						
0.40 - 1.80	1.40	Pegm.	Med spredte musk.flagor							
1.80 - 3.80	2.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. rel.kv.rik. pegm.mellom 2.80-3.00 m Svak impr. Py.	40° 45°	0,08	0,11	0,23		4.00	2,80-3,80
3.80 - 4.80	1.00	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.spor hbl. Impr. Sl, Cp, Gn, Py	40° 45°	0.49	0.34	1.56		6.00	
4.80 - 5.40	0.60	Pegm.								
5.40 - 7.80	2.40	2 gl.gn.bd.	Rel. lys,mlk. spor hbl. Striper Sl,Cp,Py	40° 45°	0,30	0,14	1.00		4.00	
7.80 - 17.25	9.45	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.homogen. svakt gr.førende med små gr. 0,5 - 1.0 mm.	45° 60°	0.05	0.03	0,18		2,20	7,80-9,80
17.25 - 17.45	0.20	Pegm.								
17.45 - 19.20	1.75	2 gl.gn.bd.	Mørk,mlk.vekslende med opp til cm-tykke band hbl.biot. og kv. spredte gr. 1-3 mm.	50° 60°	0.01	0.01	0.08		2.00	
19.20 - 21.50	2.30	biot.sk.	mørk,mlk-grov. vekslende med band og slirer pegm. hbl, Sl,Cp,Py som skikt og klyser fortrinnsvis i biot.skikten.	10° 40°	0.00	0.15	0.33		9.40	
21.50 - 22.70	1.20	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk mlk. vekslende med mm-tykke skikt av biot.hbl. Enslige gr. 1-2 mm. Spor Cp, Py	20° 30°	0.01	0.03	0.10		4.00	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 554

2

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
22.70 - 24.30	1.60	Biot.sk.	Mørk,mlk-grovk. vekslende med band og slirer pegm. Hbl. Sl,Cp,Py	20° 30°	0.05	0,11	1.16		4.80	
24.30 - 25.40	1.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. dm.tykke partier kv. anhydrite ved 25.10-25.20 Py, Cp	30° 40°	0.08	0.07	0.18		2,20	
25.40 - 26.45	1.05	Biot.gn.	Mørk,mlk. spor hbl. og Sl Cp Py	40° 60°	0.03	0,12	0.20		7.00	
26.45 - 27.90	1.45	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enkelte mm-tykke biot.skikt. Onduler-ende. Py, Po	20° 40°	0.00	0.08	0.07		2,40	
27.90 - 28.70	0.90	Biot.gn.	Mørk,mlk-grov. litt veksl. med cm-tykke band 2 gl.gn. og Pegm. spor hbl. Enstaka Sl striper og Py, Cp	20° 40°	0.16	0.16	0.50		7.20	
28.70 - 30.20	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enkelte biot.-rikere band. Svak imp. Py	40° 45°	0.04	0.17	0.27		4.60	
30.20 - 31.40	1.20	2 gl.gn.	Rel.lys,mlk.vekslende med mm-tykke striper biot. hbl. str. imp. Sl,Gn,Cp,Po,Py	40°	0.47	0.23	3.43		9.60	
31.40 - 33.45	2.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. rel.kv.rik imp. Py, Po	40° 45°	0.03	0.05	0,47		4.00	
33.45 - 34.50	1.05	2 gl.gn.bd.	Mørk,mlk.vekslende med partier mot gl,sk. Spor Sl,Cp	20° 40°	0,02	0,08	0,13		5,40	
34.50 - 36.40	1.90	Biot.hbl.gn.	Mørk mlk.-grov.vekslende med enstaka 2 gl.gn.part. Stripet imp. malm. Sl,Gn, Cp, Po, Py	40°	0,05	0,30	1.50		10,60	

SANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 554

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
36.40 - 37.65	1.25	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/biot.hbl.skikt. Stripet imp. malm. Sl,Gn, Cp,Py,Po	30° 40°	1.23	0,70	3,79		9.40	
37.65 - 40.90	3.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. svak impr. Py	40,45°	0.09	0.24	0.40		5.60	37,65 - 38,65
40.90 - 42.90	2.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk.rel.mass. Gr.førende stichtolitisk.	45°						
42.90 - 45.80	2.90	Pegm.								
45.80 - 51.30	5.50	Hbl.gn.	Mørk,mlk. rel.mass. enstaka dm-tykke pegm.band. Gr.førende 1-3 mm.	60° 70°						
51.30 - 52.10	0.80	Pegm.								
52.10 - 52.70	0.60	Hbl.biot,gn.	Mørk,mlk. mass.							
52.70 - 53.20	0.50	Pegm.								

11/9 1978
Stellan Burman

Lokalitet: Profil: 44.120

Borehull: 553

Dato : Aug -78
Koordinater : X: 925.419,3 Y: 44.115,7
Retning : N
Helling/stigning: - 60°
Høyde : -58,9
Lengde : 48,85 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.20	0.20	kv.								
0.20 - 1.25	1.05	2 gl.gn.bd.	Rel.lys mlk. tildels gr. og hbl.førende,med enstaka kv. band opp til 5 cm tykke. gr. fortrinnsvis i de hbl. rikere partier. Spor Py	45° 50°						
1.25 - 7.40	6.15	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk. rel homogen. (Mellom 6.20 - 6.40 pegm.) Spredte gr. 1-2 mm. Svak imp. Py.	50° 70°						
7.40 - 7.90	0.50	Pegm.								
7.90 - 7.95	2.05	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. rel.mass. enstaka gr. 1-2 mm. spor Py.	50°						
9.25 - 12.60	2.65	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.kv.rik. rel. mass. Spr. gr. 1-2 mm.	50° 60°						
12.60 - 14.00	1.40	Biot.sk.	Mørk,mlk-grov,spor hbl. Kv. feltspat som små linser (eller øyne) Svak imp. Py Cp, som spor.	50° 0 - 50°						
14.00 - 17.90	3.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. rel.mass. enkelte cm-tykke hbl. biot-rikere band. Spr. gr. 1-2 mm. Svak imp. Py	55°	0.05	0.07	0.14		4.17	16,90 - 17,90
17.90 - 18.60	0.70	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. delvis ondulerende stripet impr. Sl, Cp, Gn, Py	50° 60°	0,59	0,47	3,42		11.08	
18.60 - 19.50	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. spredte gr. 1-3 mm ved 19.20 en biot. band cm tykk (muligens glid plan?).	50°	0,09	0.06	0,51		4.08	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 553

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
19.50 - 20.30	0.80	Biot.gn.	Mørk,mlk.spr. gr. spor hbl. Py,Cp	40° 50°	0.01	0.04	0.08		6.04	
20.30 - 23.25	2.95	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enkelte biot. rikere partier med spor hbl. Spredte gr. 1-3 mm.	50° 60°	0.06	0.05	0,17		3,88	
23.25 - 25.80	2.55	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk-grov vekslende med opptil cm-tykke band og slirer av biot. Veckad og tildels nermest becciert. Spor Sl,Py,Cp,Gn	50° 60°	0,10	0,17	0,49		5,18	
25.80 - 26.70	0.90	Biot.hbl.gn.	Mørk,grovk.stripet impr. malm Sl,Cp,Gn,Py	50° 60°	1.62	0.46	5,84		10,94	
26.70 - 27.60	0.90	Biot.gn.	Mørk mlk-grov.Enkelte 2 gl. gn.band.Spor hbl. enstaka gr. 1-3 mm. Spor Py.(Sl,Gn?)	50° 60°	0,12	0,13	0,53		5,47	
27.60 - 29.70	2.10	Biot.hbl.gn.	Mørk mlk-grov mye vekslende med biot,hbl kv. band. Sl,Cp,Py,Po,Gn.	50° 60°	0,03	0,51	1,24		9,21	
29.70 - 31.30	1.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.vekslende med opp til 5 cm tykke hbl.band. og opp til cm-tykke biot.skikt noe ondulerende. Ved 29.80 - 29.95, 31.05 - 31.30. Komp. malm.	40° 60°	0,69	0,60	4,73		11,94	
31.30 - 34.60	3.30	2 gl.gn.bd.	Rel. lys mlk.rel.mass. Svak imp. Py	50°	0,03	0,18	0,24		4,60	5410 - 5430
34.60 - 34.70	0.10	Amf.	Mørk,mlk. mass.	50°						
34.70 - 37.30	2.60	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.hbl.førende spr. gr. 1-2 mm. Svak imp. Py	50° 60°						

RANA BLADTRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 553

3

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
37.30 - 48.80	11.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. rel. mass. Enstaka dm.tykke pegm.band. Gr.førende 1-3 mm. Svak imp. Py	40° 60°						

31/8 1978

Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil: 44.120

Borehull: 552

Dato : Aug - 78
Koordinater : X: 925.419,8 Y: 44.115,7
Retning : —
Helling/stigning: lodd
Høyde : — 59,0
Lengde : 38,37 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.70	1.70	hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. enkelte cm-tykke band 2 gl.gn.bd. gr-førende 1-3 mm svak imrp. Py	80° 90°						
1.70 - 4.35	2.65	2 gl.gn.bd	rel.lys,mlk. rel.homogen imp. py.	80°	0,07	0.08	0,11		4.69	3,55 - 4,35
4.35 - 5.35	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.kv.rik. imp. Py Lys sl	80° 90°	0.58	0,34	2,26		6,75	
5.35 - 6.90	1.65	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. kv.rik med enkelte opp til 5 cm tykke pegm.band. imp. stripet malm sl,gn,cp,py.	70° 80°	1,37	0,23	6,44		6,88	
6.90 - 8.30	1.40	2 gl.gn.b.d.	rel.lys,mlk. impr. sl,cp,py	80°	0,75	0,18	2,20		5,25	
8.30 - 11.00	2.70	2 gl.gn.alm.	lys,mlk.kv.rik.homogen svak impr. Py	80°	0,09	0,04	0,22		1.88	8,80 - 9,80
				90°	0,04	0,02	0,08		1.20	9,80 - 11.00
11.00 - 12.25	1.25	2 gl.gn.b.d.	rel.lys,mlk.kv.rik. Impr. Py,Cp,Sl,Gn	80°	0,57	0,20	1.96		7,69	
12.25 - 13.35	1.10	Pegm								
13.35 - 14.05	0.70	Biot.gn.	Mørk,mlk-grov slirig med mm tjukke biotslirer. Spor hbl. gr. 1-2 mm impr. Py spor Cp	60° 80°						
14.05 - 16.90	2.85	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.rel.kv.rik spredte gr. 1-3 mm. svak imp. Py	mass. 80° 90°						
					0,08	0,04	0,17		2,26	16,00 - 16,90
16.90 - 18.55	1.65	Biot.gn.	Mørk,mlk-grov.spor hbl. stripet imp. malm Sl, Gn, Cp, Py	70° 90°	2,61	0,34	7,37		11,81	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 552

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
18.55 - 20.20	1.75	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk-grov tildels biot. gn. og hbl.førende. Impr. Sl,Gn,Py,Cp.	80°	0,42	0,44	2,17		12,56	
20.20 - 21.00	0.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.kv.rik.Imp. Py	70°	0,32	0,19	0,75		5,63	
21.00 - 21.70	0.70	Biot.sk.	Mørk,grovk.slirig med Hbl. slirer (Brecciert) Stripet malm Sl,Cp,Py,Po.	60° 90°	0,18	1.34	2,65		18,56	
21.70 - 23.80	1.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.vekslende med cm-tykke biot.hbl.band. Imp. Py,Po,Sl,Cp	70° 80°	0,32	0,42	1.81		6,94	
23.80 - 32.10	10.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys mlk. rel. kv.rik homogen enstaka gr. 1-2 mm. svak imp. py	80° 90°	0,04	0,03	0,12		1.76	
32.10 - 33.30	1.20	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. spr. gr. svak impr. Py	80°						
33.30 - 34.70	1.90	Biot.sk.	Mørk mlk. Spr. gr. svak impr. Py	80°						
34.70 - 35.80	1.10	hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-5 mm Imp. Py	80°						
35.80 - 37.40	1.60	Biot.sk.	Mørk,mlk-grov. Spr. gr. 1-3 mm. Imp. Py	80° 90°						
37.40 - 38.30	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende med opp til 5 cm tykke band kv og hbl førende band. gr-førende fortrinnsvis i de hbl.rikere part.	80°						

24/8 1978
Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil: 44.120

Borehull: 551

Dato : 17 aug - 78
Koordinater : X: 925.420,6 Y: 44.115,9
Retning : N
Helling/stigning: + 60°
Høyde : - 54.8
Lengde : 28,45 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink.	65°						
0.70 - 0.90	0.20	Pegm.	Med Sl,Gn		1,14	0,22	5,51		5,44	
0.90 - 2.45	1.55	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.enkelte filmtynne skikt biot. spor Py og gr. 1-2 mm.	45° 60°						
2.55 - 4.20	1.75	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. homogen. Spredte gr. 1-2 mm Svak imp. Py. Spor Sl Cp ved 3.95-4.00 m	60° 30°						
4.20 - 6.70	2.50	Biot.gn.	Mørk,mlk-grov.Tildels skiktet med opp til mm-tykke biot.skikt onduler-ende.Enstaka cm-tykke pegm.band. svak imp. Sl, Gn, Cp, Py	30° 55°	0,30	0,20	0,99		6,75	
6.70 - 9.00	2.30	Biot.gn.	Mørk,mlk.rel.homogen Spr. gr. 1-2 mm. Imp. Py spor Cp(Sl?)	55° 70°	0,04	0,11	0,17		7,50	6,70-7,70
9.00 - 13.20	4.20	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.rel.mass.tildels gr.førende.(Stichtolitisk) fortrinnsvis i de hbl. rikere partier. Svak imp. Py	55°						
13.20 - 28.50	15.30	Hbl.gn.	Mørk fin-grov-mlk. Veksl. med dm-tykke biot.gn.part. samt tildels båndet med opp til cm-tykke pegm.band Spredte gr. 1-3 mm. Spor Py (Ved 27.80-27.90 biotsk.) Rotazon?	50° 60°						

RANA BLADS TRYKKERI

24.8. 1978 Stellan Burman

Lokalitet: Profil: 44.120

Borehull: 550

Dato : 12 9 - 78
Koordinater : X: 925.415,4 Y: 44.117,5
Retning : S
Helling/stigning: + 60
Høyde : - 54.4
Lengde : 26,95 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.20	1.20	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. Svak imp. Py spor Sl	70° 80°	0,65	0,18	1,35		4,64	
1.20 - 1.70	0.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys, mlk. spor hbl. enkelte Sl striper imp.Py Spor Cp	50-70 70	1,14	0,30	4,51		7,23	
1.70 - 5.00	3.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. rel.mass. enkelte gr. 1-2 mm. svak impr. Py	80°	0,03	0,12	0,12		7,79	1,70-2,70
5.00 - 8.60	3.60	hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. rel.mass. Enkelte cm-tykke pegm. band. Spr. gr. 1-3 mm.	60° 70°						
8.60 - 10.20	2.60	hbl.gn.	Rel.mørk,grovk. gr.førende 1-3 mm. spor Py	60° 70°						
10.20 - 13.10	2.90	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk-grovk. Imp. Py spor Cp. Gr.førende 0,5 - 1.0 mm.	70°						
13.10 - 18.80	5.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,hbl.førende dm-tykke partier m. hbl.gn samt stichtolitisk. gr-førende, fortrinnsvis i de hbl.rikere partier. Svak impr. Py, spor Cp	80°						
18.80 - 20.80	1.50	hbl.gn.	mørk,mlk-grov. veksl. med cm-tykke band pegm. og biotrike render. Spredt gr. 1-5 mm.	50° 70°						

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 550

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
20.30 - 25.80	5.00	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.-fink. tildels mass. med enkelte opptil cm-tykke band biot.hbl. Spr. gr. 1-3 mm fortrinnsvis i hbl. biot.band svak imp. Py	70° 80°						
25.80 - 26.50	1.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. enkelte dm-tykke parti biot-hbl.gn. Gr.førende. 1-3 mm.	70° 80°						

28/8 1978
Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER

Borehull: 549 profil 44.020

Dato : juni 1978
Koordinater : 925.413,0 X 44.018.8 Y
Retning : nord
Helling/~~stigning~~ : - 45°
Høyde : - 58,4 m
Lengde : 34,55 m

Dybde	L	Bergart		S°	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.25	0.25	2-gl.gn.	med gr. py-impr.	15°,20						
0.25 - 4.65	4.40	gr.hbl.-(biot.)gn.	sv. py-impr. gr.rik foldet fra 0.25 til m(0-75°) S=0 på 0.5 m, 1,7 m, 2,4 m, 3,3 m.	v						
4.65 - 5.85	1.20	2-gl.gn.,bp.	Foldet D? mlk.	75,0 50						
5.85 - 6.50	0.65	sv.malmimpr. 2-gl.gn.		60,55	0.27	0.32	0.71		9.11	
6.50 - 7.00	0.50	god malm skarnh.gn.+pegm.	mørke sl.	50	0,70	0,30	3,19		7,01	
7.00 - 7.75	0.75	spredt malmimpr. 2-gl.gn.	Rel.gl.(musk.)-rik,mlk.	45,60						1.35m
7.75 - 7.85	0.10	god malm pegm.	mørke sl.							
7.85 - 9.70	1.85	malmstr. + impr. musk.gn.	Overveiende lys sl. noe biot. og hbl.	65,30 55,40	0,49	0,42	1,89		7,95	
9.70 - 10.00	0.30	god malm skarnh.gn.	Lyse sl, py, ga.	40	2,23	0,09	10,67		9,35	
10.00 - 12.10	2.10	god stripet malm skarnh.gn.med karb.	og hbl. På 12 m noe anhydritt (violett).	50,70	1,33	0,39	4,08		7,24	
12.10 - 13.50	1.40	2-gl.gn.	Spredt noe malmimpr.	70,40						
13.50 - 13.70	0.20	hbl.gn.	Lys, noe biot. Sterkt py-impr.	70	0,34	0,22	0,65		7,24	

ANA BLADT TRYKKERI

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER

Borehull: 549 profil 44.020

Dato : juni 1978
Koordinater : 925.413,0 X 44.018.8 Y
Retning : nord
Helling/stigning : - 45°
Høyde : - 58,4 m
Lengde : 34,55 m

Dybde	L	Bergart		S°	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
13.70 - 14.60	0.90	god stripet malm hbl.biot.gn.	Steilt foldet Rel.lys	70,35 0,30 70,50						
					1.68	0,35	3,89		9,11	
14.60 - 15.25	0.65	pegm.								
15.25 - 16.05	0.80	m.sv.malmimpr. musk.gn.	Py og litt honningbiende mlk.,noe biot.	50,40	0,24	0,20	0,62		6,08	
16.05 - 16.50	0.45	god malm skarnh.gn.								
16.50 - 16.90	0.40	malmimpr. 2-gl.gn.		40,50 60,50	1.76	0,98	2,24		9,82	
16.90 - 21.40	4.50	2-gl.gn.	Noe gr.På 17.5 m ½ cm py ½ ga. Fra 18,5-21 m	40,25 0,60 40						
21.40 - 21.60	0.20	pegm.	små årer ga + cp.							
21.60 - 23.15	1.55	musk.gn.	Noe biot.	20,0 35,45						
23.15 - 29.25	6,10	2-gl.gn.	med gr.	35,45						
29,25 - 30,60	1.35	biot.gn.	Noe musk.Mlk.Steilt foldet	40,0 60,60						
30,60 - 31,00	0.40	2-gl.gn.		20						
31.00 - 32.20	1.20	biot.gn/sk.	Spredt noe hbl.Grovk. sv.impr. med py,po,cp. Virker "durchbewegt"	30,40 25,35						
32.20 - 33.25	1.05	2-gl.gn.alm.	Noe gr. Mlk.	50,30						
33.25 - 33.65	0.40	biot.gn.	Med gr. Grovk.	20,45						
33.65 - 34.55	0.90	2-gl.gn.b.d.	Noe gr. Mlk.	45						

14/7 1978 A. Kruse

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER

Borehull: 548 profil 44.020

Dato : juni 1978
Koordinater : 925.413,1 X 44.018.5 Y
Retning : nord
Helningsstigning: + 30°
Høyde : - 54,6 m
Lengde : 28.45 m

Dybde	L	Bergart		S°	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.60	1.60	Malmstr. og impr. 2 gl.gn.	Malmstr. i grågrønn Rel.musk.rik.	35.50, 60,50	0.61	0.17	1.27		4.21	
1.60 - 2.05	0.45	2 gl.gn.	med gr.	40						
2.05 - 2.60	0.55	spredte malmstr. og impr. 2 gl.gn.		35						
2.60 - 3.65	1.05	2-gl.gn.	Spredt gr.	40,35						
3.65 - 4.15	0.50	malmimpr. 2-gl.gn.		55	0.73		0.19	1.13		5.14
4.10		2-gl.gn.		50,40						
4.15		Forkastning paralell 4.10 m, disk. 4.20 m		40						
4.20		2-gl.		40						
			Strøkforskjell ff- 4.20 m = ca. 20°, forøvrig ca. loddrett S på 4.20m (100°). ff med i mm biot.							
4.15 - 7.20	3.05	2-gl.gn.	Rel.musk.rik i starten	40,30						
			spredt gr.	20,10						
7.20 - 9.50	2.30	spredt malmimpr. 2-gl.gn.	flere(2-3?) foldeombøyn. (på 9.1 m)	ca.0 45.0	0.43	0.16	0.86		4.21	
9.50 - 10.00	0.50	god malm skarn	grågrønn	10,45						
10.00 - 10.80	0.80	2-gl.gn.	spredt gr.	35,0	1.62	0.36	2.57		4.67	
10.80 - 11.50	0.70	stripet malm gl.gn.-skarn	lys, grågrønn skarn. svakr foldet rundt 0°	15.0 15,0						
11.50 - 12.65	1.15	2-gl.gn.	med gr. Svakt foldet rundt 0							
12.65 - 13.25	0.60	malmstr. 2-gl.gn.	svakt foldet rundt Litt grågrønn skarn.	0	0.38	0.21	1.43		5.84	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER

Borehull: 548 profil 44.020

Dato : juni 1978
Koordinater : 925.413,1 X 44.018.5 Y
Retning : nord
[illegible]stigning: + 30°
Høyde : - 54,6 m
Lengde : 28.45 m

Dybde	L	Bergart		S°	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
13.25 - 13.90	0.65	God malm 2-gl.gn.	Svakt foldet rundt Med grågrønn skarn rel. mye po	0						
13.90 - 14.00	0.10	2-gl.gn.	med pegm.							
14.00 - 14.60	0.60	stripet malm 2-gl.gn.	svakt foldet rundt Litt grågrønn skarn	0 40,50						
14.60 - 15.40	0.80	2 gl.gn.	med granat	50,55	0.27	0.11	0.87		2.80	
15.40 - 16.00	0.60	spredte malmstr. 2-gl.gn.		55, 40,20						
16.00 - 16.50	0.50	spredt malmimpr. 2-gl.gn.	Litt pegm.	15,0, 15						
16.50 - 18.70	2.20	2-glg.n.	med gr.	30,45, 55	0.06	0.03	0.11		2.01	
18.70 - 20.05	1.35	spredte malmstr. 2-gl.gn.		45,25, 35						
20.05 - 20.35	0.30	spredt malmimpr. 2-gl.gn.		35,0						
20.30		ditto		50	0.43	0.09	0.70		3.01	
20.35		forkastning	Ca. samme strøk som på 20.30 og 20,40	15						
20,40		ditto som før	Vinkel ff-20,30 m:ca.60° " " 20,40m:ca.145°	20						
20.35 - 21.20	0.85	spredte malmstr. 2-gl.gn.		20,10						
21.20 - 21.90	0.70	ditto		10,20	0.35	0.16	0.74		4.88	
21.90 - 23.20	1.30	m.sv. malmimpr. 2-gl.gn.		20						

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER

Borehull: 548 profil 44.020

Side 3

Dato : juni 1978
Koordinater : 925.413,1 X 44.018.5 Y
Retning : nord
Helling/stigning: + 30°
Høyde : - 54,6 m
Lengde : 28.45 m

Dybde	L	Bergart		S°	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
23.20 - 24.70	1.30	2-gl.gn.	Py-impr.,spredt noe gr.	20,5 30						
24.70 - 27.00	2.30	gr.hbl.biot.gn.	Svakt foldet rundt 0	30,0						
27.00 - 27.35	0.35	kverts.		10						
27.35 - 28.50	1.15	gr.amf.	svakt foldet rundt 0	20.30 0.20						

12.7. 1978
A. Kruse

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.020

Borehull: 547

1.

Dato : Mai/jun.-78
Koordinater : X:925.413.0 Y:44.018.6
Retning : N
Helling/stigning: + 45°
Høyde : - 54.7
Lengde : 22.15 m.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 2.10	2.10	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. rel.mass. kv.rik, sv.imp. Sl,Cp, Py	40°	0,43	0,13	0,94		3,75	
2.10 - 3.00	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels mass. kv.rik. Spr. diffuse gr. 1-3 mm. Imp. Py	55°	0,05	0,02	0,08		2,35	
3.00 - 3.50	0.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. mass. kv.rik, sv. imp. Py		0,04	0,03	0,05		2.03	
3.50 - 3.80	0.30	Pegm.			0,07	0,05	0,06		1,09	
3.80 - 4.40	0.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. mass. kv.rik. spor sl, Svak imp.Py		0,17	0,06	0,51		2,66	
4.40 - 5.10	0.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. rel.mass. kv.rik, tildels hbl.førende stripet imp. Sl,Cp,Py	50°	0,80	0,41	2,95		7,67	
5.10 - 6.60	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk,tildels mass. kv.rik, enkelte pegm.band spor gr. Fra 6.30-6.35 spor Sl. Svak imp. Py	40° 50°	0,09	0,04	0,29		3,44	
6.60 - 7.20	0.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. rel. mass. kv.rik tildels hbl.førende imp. Sl,Cp,Py.		0,27	0,27	2,76		9,10	
7.20 - 7.70	0.50	2 gl.gl.alm.	Rel.lys,mlk-fink. Rel.mass. kv.rik. Imp. Sl,Py	40	0,49	0,17	1,73		5,32	
7.70 - 8.80	1.10	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. Rel.mass. kv.rik, tildels hbl.førende og biot.rikere parti. imp. Sl,Cp,Py	40°	0,51	0,32	3,93		8,14	
8.80 - 9.70	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels kv.rik og hbl.førende. Imp. Sl, Cp, Py	30° 40°	1,28	0,29	2,85		6,73	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Hoyde :
Lengde :

Borehull: 547

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
9.70 - 11.20	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.vekslende m/ parti 2 gl.gn.alm. Spor gr. Sl,Cp,Py	40°	0,41	0,18	1,08		4,70	
11.20 - 17.00	5.80	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. vekslende m/parti hbl.gn. Fra 15.90-16.10 stichtolitisk Spr. gr. 1-3 mm. God imp. Py	50°	0,03	0,23	0,09		2,61	11,20-12,20
17.00 - 22.25	5.25	Hbl.-biot.gn.	Mørk,mlk. rel. mass., tildels gr. rik 1-3 mm. Imp. Py	50°						

9.6. 1978
Holger Pantdalsli

ANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.020

Borehull: 546

Dato : Mai – 78
Koordinater : X: 925.410,9 Y: 44.020,4
Retning : S
Helling/stigning: –70°
Høyde –58.4
Lengde : 26.10 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.30	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. med cm-brede pegm.band. spor Sl, Cp, Py.							
0.30 - 1.10	0.80	Hbl.gn.	Mørk,mlk, tildels gr.rik 1-3 mm. Imp. Py.	70° 80°						
1.10 - 1.70	0.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. Spr. cm-brede bånd. Pegm. imp. Py.		0,14	0.05	0.23		2.09	
1.70 - 2.70	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. mass. god imp. Py spor Sl, Cp		0.24	0.20	0.41		8.73	
2.70 - 3.45	0.75	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. tildels kv.rik. imp. Sl,Cp,Py	70° 80°	0,15	0.24	0.76		6.54	
3.45 - 3.65	0.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. Kv.rik.Hbl.-førende. god. imp. Sl,Cp, Gn. Py.		2,54	0,14	8,21		7.64	
3.65 - 4.30	0.65	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. mass. kv.rik, Spor gr. imp. Sl Gn, Py.		0.56	0.30	0,25		4.36	
4.30 - 5.10	0.80	2 gl.gn.b.d.	Rel. lys,mlk. tildels kv.-rik. spor hbl. imp. Sl,Cp, Py	65°	0,56	0.40	0,78		8,54	
5.10 - 6.50	1.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. rel.mass. kv.rik. tildels hbl.førende fortrinnsvis m/imp. Sl (lys) Gn, Cp, Py	60° 70°	1.20	0,21	0,68		8.91	
6.50 - 8.05	1.55	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.rel. mass. tildels kv.rik. God imp.Py Spor Sl, Gn, Cp.	60°	0.33	0,12	0,99		4.00	
8.05 - 9.40	1.35	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. rel.mass. tildels kv.rik.vekslende m.dm.brede biot.rike parti	50° 70°	0.49	0.05	0.05		1.84	

Lokalitet:

Borehull: 546

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
			Fra 9.05 - 9.10 spor Gn,Cp Imp. Py.		0,08	0,03	0,04		2,09	
9.40 - 10.40	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk,mass. spor gr. 1-3 mm.							
10.40 - 10.65	0.25	Malm			5,14	1,20	5,75		8,36	
10.65 - 11.80	1.15	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.-fink. rel.mass. tildels kv.rik. fra 11.40-11.80 hbl.førende bånd fortrinnsvis m/imp. Sl,Cp, Py. Gn.	60° 70°	0,37	0,40	0,89		5,64	
11.80 - 14.40	2.60	Diopsid	Skarn m/imp. Sl,Cp,Gn,Py		2,84	0,50	3,47		3,81	
14.40 - 14.90	0.50	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. svak imp. Py	50°	0,65	0,12	2,04		5,09	
14.90 - 15.70	0.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. tildels hbl.førende, imp. Sl,Cp,Py	50°	1,03	0,34	4,77		14,36	
15.70 - 18.00	2.30	2 gl.gn.alm.	Rel.lys, mlk. tildels mass., kv.rik,vekslende m/dm brede parti 2 gl.gn.b.d. Svak imp. Py.	60° 70°	0,03	0,03	0,12		3,09	
18.00 - 19.30	1.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. Hbl.før. tildels kv.rik. Imp. Sl,Cp Py	60° 70°	0,18	0,43	3,54		13,45	
19.30 - 23.90	4.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. kv.rik. mass. vekslende m/parti 2 gl.gn.b.d. Spor gr. 1-3 mm Svak imp. Py.	70°	0,05	0,06	0,37		4,18	19,30 - 20,30
23.90 - 24.30	0.40	Pegm.								

Lokalitet:

Borehull: 546

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
24.30 - 25.25	0.95	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. kv.rik, spor hbl. Gr.rik 1-4 mm, svak imp. Py, spor Po	70°	0,21	0,26	1.07		10,91	
25.25 - 26.10	0.85	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. tildels kv.rik. Ondulerende, imp. Sl, Cp, Py, Po	70°						

2/6 1978

Holger Pantdalsli

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER

Borehull: 545 Profil: 43.880

Dato : Mai 1970
Koordinater : 925.404.3 X 43.897.5 Y
Retning : nord
Helling/stigning: + 55°
Høyde : - 79.6 m
Lengde : 56.25 m

Relogging Side 1

Dybde	L	Bergart		S %	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 3.80	3.80	2-gl.gn.	Med gr. Steilt foldet rundt o	45.0 0.45						
3.80 - 5.10	1.30	Kvarts								
Ca 5.10 - ca. 5.75	0.65	2-gl.gn.	Med gr. M.sv. py-impr.	0.50						reanalyser av 2. splitt (splittet o og analysert før).
Ca.5.75 - ca. 5.80	0.05	malmimpr. 2-gl.gn.								
ca 5.80 - ca. 6.10	0.30	Pegm.								
Ca.6.10 - ca. 7.00	0.90	Spredt malmimpr. 2-gl.gn.	Spredt noe hbl.	55.70						"
7.00 - 8.00	1.00	Spredt malmimpr. 2 gl.gn.		65.50 55						"
8.00 - 9.00	1.00	2 gl.gn.	Noe pegm.M.sv. py-impr.	55.50 40						"
9.00 - 9.40	0.40	2-gl.gn.	M.sv. py-impr.	45						analyser av hele kjernen
9.40 - 9.70	0.30	ditto	Spredt litt gr.	40						
9.70 - 10.00	0.30	god malm gl.gn.	med grågrønn skarn og noe hbl.	40						
10.00 - 13.80	3.80	malmstriper og impr. 2 gl.gn.	Malmstriper ofte i karb-skarn. Kofr. tidligere logging og analyser.	55 50						
13.80 - 19.10	5.30	2 gl.gn.	med gr. steiltfoldet. Fra 16.00 til 16.50 m Fra 16.50 m steiltfoldet Fra 18.50	ca. 0 40 ca. 40 45.55						
19.10 - 19.55	0.40	Pegm.								

Lokalitet:

Borehull: 545

Dato
Koordinater
Retning
Helling/stigning:
Høyde
Lengde

Reloggi-g side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
19.55 - 24.05	4.50	Malmstr. og impr. 2 gl.gn.	55.65						
24.05 - 24.20	0.15	2-gl.gn. med gr.	45						
24.20 - 24.50	0.30	Spredt sv. malmimpr. 2-gl.gn.	45.55						
24.50 -		2-gl.gn. med spredt gr. kr. tidligere beskrivelse.	55.65						

12.7. 78

A..Kruse

Lokalitet MOLJELLET GRUBER

Dato Mai 1976
Koordinater : 925.404.3 X 43.897.5 Y
Retning : nord
Helning/stigning: + 55°
Høyde : - 79.6 m
Lengde : 56.25 m

Borehull 5-5 Profil 43.800

Relogging Side 1

Dybde	L	Bergart		S°	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 3.80	3.80	2-gl.gn.	Med gr. Steilt foldet rundt o	45.0 0.45						
3.80 - 5.10	1.30	Kvarts								
Ca 5.10 - ca. 5.75	0.65	2-gl.gn.	Med gr. M.sv. py-impr.	0.50						reanalyser av 2. splitt (splittet o og analysert før).
Ca.5.75 - ca. 5.80	0.05	malmimpr. 2-gl.gn.			0,19	0,09	0,62		2,80	
ca 5.80 - ca. 6.10	0.30	Pegm.								
Ca.6.10 - ca. 7.00	0.90	Spredt malmimpr. 2-gl.gn.	Spredt noe hbl.	55.70	0,24	0,18	0,78		3.74	"
7.00 - 8.00	1.00	Spredt malmimpr. 2 gl.gn.		65.50 55	0,20	0,11	0,51		3,57	"
8.00 - 9.00	1.00	2 gl.gn.	Noe pegm.M.sv. py-impr.	55.50 40	0,05	0,03	0,14		1,96	"
9.00 - 9.40	0.40	2-gl.gn.	M.sv. py-impr.	45	0,04	0,02	0,09		2,13	analyser av hele kjernen
9.40 - 9.70	0.30	ditto	Spredt litt gr.	40						
9.70 - 10.00	0.30	god malm gl.gn.	med grågrønn skarn og noe hbl.	40	1,00	0,50	3,19		8,64	
10.00 - 13.80	3.80	malmstriper og impr. 2 gl.gn.	Malmstriper ofte i karbskarn. Kofr. tidligere logging og analyser.	55 50						
13.80 - 19.10	5.30	2 gl.gn.	med gr. steiltfoldet. Fra 16.00 til 16.50 m Fra 16.50 m steiltfoldet Fra 18.50	ca. 0 40 ca. 40 45.55						
19.10 - 19.55	0.40	Pegm.								

Hvordan kan det forelegge tidligere analyser (ofr. tidligere kjernelogg) når jeg fant hele kjernen mellom 9,00 og 9,70 m?

KANA BERG TRYKKERI

Lokalitet

Borehull 5-5

Dato
Koordinater
Retning
Helling/stigning
Høyde
Lengde

Reloggi-g side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
19.55 - 24.05	4.50	Malmstr. og impr. 2 gl.gn.	55.65						
24.05 - 24.20	0.15	2-gl.gn. med gr.	45						
24.20 - 24.50	0.30	Spredt sv. malmimpr. 2-gl.gn.	45.55						
24.50 -		2-gl.gn. med spredt gr. kr. tidligere beskrivelse.	55.65						

12.7. 78

A..Kruse

Lokalitet: Profil 43.880

Borehull: 545

Dato : Mai 78.
Koordinater : x: 925.404.3 Y: 43.897.5
Retning : N
Helling/stigning: +55°
Høyde : -79.6 m
Lengde : 56.30 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 3.80	3.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.-fink. veksl. m/2 gl.gn.b.d. enkelte pegm.band. Spr. diffuse gr. 0.5 - 1 mm svak imp. Py	50° 60°						
3.80 - 5.10	1.30	kv-pegm.	Svake spor cp, Gn, Sl, Py							
5.10 - 5.80	0.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ 2 gl.gn.b.d. Spor gr. 0.5-4 mm. Fra 5.75-5.80 svake spor Sl, Py.		0.11	0,05	0,23		2,60	
5.80 - 6.10	0.30	Pegm.	Svake spor Sl,Gn,Cp,Py.		0,04	0,03	0.05		1,38	
6.10 - 8.20	2.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. Svak imp. m/rikere parti Sl,Cp,Py	40° 60°	0.24	0.13	0.63		4.67	
8.20 - 8.60	0.40	Pegm.	Vekslende m/parti 2 gl.gn. b.d. Svak imp. Py		0,08	0.07	0.21		2.08	
8.60 - 9.80	1.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk.Enkelte cm-brede pegm.band. Svak imp. Sl,Cp,Py	40°	0.03	0.03	0.09		2.25	
9.80 - 10.25	0.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,grovk.-fink. Hbl.-førende. Fra 10.05 - 10.15 kv.rik, god stripet imp. Sl,Cp,Gn,Py.	40°	0.47	0.63	3.03		9.17	
10.25 - 11.20	0.95	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. Kv.rik, tildels mass. Spor Sl, Svak imp. Py.	60°	0.22	0.10	1,00		3,29	
11.20 - 11.35	0.15	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende, kv.rik god imp. Sl,Cp,Py		0.12	0.63	4.12		9.17	
11.35 - 11.70	0.35	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. Kv.rik, tildels mass. Imp. Py	40° 60°	0,01	0.03	0.02		1.38	

Lokalitet:

Borehull: 545

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
11.70 - 11.95	0.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. Hbl.førende kv.rik. God imp. Sl,Cp,Py		1.54	0.43	4.93		9.87	
11.95 - 12.45	0.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. Tildels mass. Imp. Py	50°	0.01	0.08	0.14		2.60	
12.45 - 12.85	0.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk.Hbl-førende.Fra 12.65-12.75 2 gl.gn.alm. Striper imp. Sl, Cp, Po, Py		0,15	0.66	5.59		15.40	
12.85 - 19.10	6.25	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,m/mørke parti, Mlk. vekslende m/biotrikere part tildels mass. Enkelte dm-brede pegm.band, spredte diffuse gr. 1-3 mm. Svak imp. Py.	50° 60°	0,01	0.03	0.05		2,08	12.85-13.85
19.10 - 19.60	0.50	Pegm.								
19.60 - 20.10	0.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.tildels mass. Spr. diffuse gr. 0.5-1 mm, Imp. Py.		0.01	0.03	0.05		2.60	
20.10 - 20.40	0.30	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. Kv.rik, mass. Str. imp. Sl,Cp,Gn,Py		2.54	0.11	2.79		2.60	
20.40 - 21.30	0.90	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. Tildels kv.rik, mass. spr. gr. 0.5-1 mm. Svak imp. Py.	50° 60°	0.01	0.02	0.05		1.56	
21.30 - 21.95	0.65	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.kv.rik.Spor gr. mass. Spr. hbl.førende band fortrinnsvis med god imp. Sl, Cp, Gn, Py		0.74	0.03	3.05		3.46	
21.95 - 23.30	1.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. tildels kv.rik,spr. hbl.førende band.Str. imp. Sl,Cp,Gn,Py	60°	1.71	0.14	2.79		7.62	

Lokalitet:

Borehull: 545

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
23.30 - 24.10	0.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink.enkelte biot.rike band m/spor gr. Ved 23.90 spor Sl, Svak imp. Py.	50° 65°	0,39	0,08	0.70		3,29	
24.10 - 24.80	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. Fra 24.25 - 24.30 pegm.band m/spor hbl. Sl,Cp, svak imp. Py.	50°						
24.80 - 29.30	4.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.tildels mass. svake spor gr. Py.	50°						
29.30 - 29.50	0.20	Pegm.								
29.50 - 33.80	4.30	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. tildels mass. enkelte pegm.band. Spr. gr. 0.5-1 mm.Svak imp. Py	60°						
33.80 - 34.30	0.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk.Spor Sl,Cp,Gn,Py.	50°						
34.30 - 38.50	4.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink.tildels mass. kv.rik,Spr. diffuse gr. 0.5-2 mm.	50°	0.02	0.02	0,05		1.90	37.50-38.50
38.50 - 38.80	0.30	Pegm.			0.28	0.09	0.61		1.73	
38.80 - 39.80	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. str. imp. Sl,Cp,Cu,Py	50°	1.35	0.37	2.82		5.19	
39.80 - 41.90	2.10	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink.tildels mass.kv.rik,svake spor Sl,Gn,Py	50°	0.19	0.09	0.56		2.42	
41.90 - 43.10	1.20	2 gl.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk.Veksl. m/hbl.førende parti fortrinnsvis m/imp. Sl,Cp Gn,Py	50°	1.11	0.28	2.63		4.67	
43.10 - 44.60	1.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-grovk.Veksl. m/biot.rike parti,tildels ondulerende,svak imp.Sl,Cp.	50°	0.68	2.22	1.20 ~~1.80~~		6.37	

FANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 545

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
44.60 - 51.70	7.10	Biot-hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. vekslende m/cm-brede band hbl.gn. Spredte gr. 0.5-3mm. God impr. Py.	50°						
51.70 - 52.35	0.65	Hbl.gn.	Mørk,mlk-fink. rel.mass. gr.rik 1-3 mm. Impr. Py							
52.35 - 56.30	3.95	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk, veksl. m/dm-brede gn.band. Fortrinnsvis gr.rik. Gr.førende 1-3 mm. Imp. Py.	50°						

24/5 1978

Holger Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.020

Borehull: 544

Dato : Mai 78.
Koordinater : X: 926.412.4 Y: 49.019.4
Retning : S N
Helling/stigning: -70°
Hoyde : -58.4 m
Lengde : 38.20 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.00	1.00	Hbl.gn.	Mørk, mlk.tildels mass, kv. gr.rik 1-3 mm. Fra 0.10 - 0.20 pegm. Imp. Py							
1.00 - 2.45	1.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.tildels mass. kv. gr.rik 1-5 mm. Imp. Py	50°						
2.45 - 2.65	0.20	Pegm.								
2.65 - 4.70	2.05	2 gl.gn.b.d.	Rel. mørk, mlk-grovk. tildels kv.rik, imp. Py	50°	0,07	0.11	0.21		5.56	3.70-4.70
4.70 - 5.30	0.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. Str. imp. Sl, Cp, Py	50°	0.85	0.48	2.99		7.79	
5.30 - 6.80	1.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. tildels mass. kv.rik. Str. imp. Sl, Cp, Gn, Py, fortrinnsvis m/spor hbl.	50° 70°	0.92	0.41	3.53		6.49	
6.80 - 7.60	0.80	Malm	Skarn type, veksl. m/ 2 gl. gn. b.d.		7.31	0.31	36.41		8.16	
7.60 - 8.50	0.90	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. rel.mass. kv.rik. Fra 8.40-8.50 malm Svak imp. Py.		1.85	0.29	2.89		3.71	
8.50 - 11.20	2.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. rel.mass. kv.rik. Spor gr. Sv.imp.Py	70°	0.06	0.03	0.09		2.07	8.50-9.50
					0.29	0.07	0.51		1.80	9.50-10.30
11.20 - 11.70	0.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-fink.Tildels mass.kv.rik fra 11.20-11.30 imp. Sl, Cp, Py	70°	0.14	0.05	0.21		2.07	10.20-11.20
					0.19	0.26	0.41		4.82	
11.70 - 11.85	0.15	Biot.gn.	Mørk,grovk-mlk. Hbl.førende god imp. Sl,Cp,Py		1.33	0.49	3.22		7.51	
11.85 - 14.30	2.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels kv.-rik, spor hbl. str. imp. Sl, Cp, Gn, Py	70°	1.24	0.53	2.3		6.12	

Kvalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Hoyde :
Lengde :

Borehull: 544

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
14.30 - 19.90	6.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.tildels mass. kv.rik spr. gr. 1-2 mm. svak impr. Py	70°	0.21	0,14	0.57		5.19	1430-1530
					0.06	0,02	0.14		2.41	1890-1990
19.90 - 20.70	0.80	Biot.gn.	Mørk,grovk-mlk. m/cm-brede band pegm. Spr. str. Sl, Cp, Py.	50°	0.00	0.31	1.19		15.95	
20.70 - 20.95	0.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.spor gr.1-2mm	50°	0.00	0,07	0.23		8.72	
20.95 - 21.85	0.90	Biot.gn.	Mørk,grovk-mlk. veksl. med parti 2 gl.gn.b.d. Spor gr. 1-2 mm. Svak imp Py,Po	55°	0.01	0.09	0.21		9.09	
21.85 - 22.10	Pegm.				0.01	0.03	0.06		2.23	
22.10 - 23.50	1.40	2 gl.gn.b.d.	Mørk,grovk.-mlk.Veksl. med cm-tykke band 2 gl.gn.b.d. og pegm. Spor Sl,Cp,Py,Po	55°	0.01	0.17	0.36		4.82	
23.50 - 24.70	1.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. rel. mass. kv.rik.Spr. biot.rike band spor gr. 0,5-1 mm. Svak impr. Py	50°	0.02	0.07	0.09		4.27	
24.70 - 26.00	1.30	Biot.gn.	Mørk,grovk-mlk.Veksl. med cm-brede band pegm. Enkelte str. Sl, Cp, Py, Po	50°	0.20	0.23	1.11		8.16	
26.00 - 26.60	0.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. m/biot.rike band. Svak imp. Py	50°	0.02	0.06	0.09		4.02	
26.60 - 27.20	0.60	Pegm.								
27.20 - 28.60	1.40	2 gl.gn.alm.	Rel. lys, mlk. rel.mass. kv.rik. spor gr. 0,5-1 mm Svak imp. Py.	60°						
28.60 - 30.10	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. Vekslende m/dm-brede biot-band.Svak imp. Py	50°	0.1	0.2	0.6		3.43	2710-2860

Lokalitet:

Borehull: 544

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
30.10 - 31.70	1.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. med dm-brede band biot.gn. fortrinnsvis m/striper Sl Cp, Py, Po	50°	0.52	0.19	1.82		9.83	
31.70 - 32.50	0.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. svak imp. Py	65°	0.01	0.03	0.07		3.71	
32.50 - 34.50	2.00	2 gl.gn.b.d.	Rel. mørk,mlk. spr. hbl. førende band (dm-brede). fortrinnsvis m/gr. 1-3 mm. Sv. imp. Py	50° 60°						
34.50 - 35.05	0.55	Hbl.gn.	Mørk,mlk.gr.rik.1-3 mm. Svak imp. Py							
35.05 - 35.50	0.45	Biot.gn.	Mørk,grovk.imp. Py	60°						
35.50 - 35.70	0.20	Pegm.								
35.70 - 36.70	1.00	Hbl.gn.	Mørk,mlk.mass.gr.rik 1-3 mm Stichtolitisk, imp. Py							
36.70 - 37.30	0.60	Biot.gn.	Mørk,grovk. spr. gr. 1-2 mm Imp. Py	40° 50°						
37.30 - 38.20	0.90	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk-grovk. Spr. gr. 1-2 mm. Imp. Py.	60°						

24.5. 1978
Holger Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.270

Borehull: 543

Dato : Mai – 78
Koordinater : X: 925.393,3 Y: 44.270,5
Retning : Ø
Helling/stigning: – 88°
Høyde : – 71,6
Lengde : 24,20 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.10	0.10	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm spor Py							
0.10 - 1.25	1.15	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. rel.kv.rik. dm.tykke partier med spor hbl. gr. 1-2 mm. ved 0.20-0.30 sl. 0.70-0.80 sl 1.15-1.25 sl svak impr. Py	50°	1.24	0.30	1.56		6.77	
1.25 - 2.20	0.95	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik. mass. svak impr. Py.	60° 70°	0.06	0.04	0.02		1.43	
2.20 - 3.25	1.05	2 gl.gn.	Mørk,mlk. kv.rik, hbl. Rel. god malm. Sl,Cp,Gn,Py.		0.25	0.58	3.55		19.25	
3.25 - 4.80	1.55	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk-grovk. jevnt bandet med cm-tykke hbl. band. Impr. Sl,Cp,Py Enstaka gr. 1-2 mm	80°	0.08	0.22	0.82		7.66	
4.80 - 5.40	0.60	2 gl.gn.alm.	Lys,fink. kv.rik (applitisk) små gr. 0.5-1.0 mm. mass.		0.36	0.08	0.16		8.88	
5.40 - 5.70	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.Spor hbl. diffuse gr. impr. Py Spor Sl, Cp	80°	0.08	0.06	0.04		8.29	
5.70 - 5.95	0.25	Pegm.			0.04	0.05	0.09		8.18	
5.95 - 6.55	0.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys mlk. Spr. gr. 1-2mm 1-2 mm. spor Sl,cp, py	80° 90°	0.06	0.05	0.11		8.58	
6.55 - 7.05	0.50	biot.gn.	Mørk,mlk.spor Cp,Sl,Py	70°	0.07	0.28	0.12		10.06	
7.05 - 8.30	1.25	biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.-grovk. Skiktet. str. impr. malm sl,cp,gn, Py,po. (Cp som klyser)	70° 80°	1.46	1.41	3.72		15,35	

Kalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 543

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
8.30 - 10.70	2.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grov-mlk. jevnt bandet med cm-tykke hbl.,pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py.	70° 80°	0.09	0.06	0.26		4.94	8,30 - 9.30
10.70 - 11.30	0.60	hbl.gn.	Mørk,mlk.rel.mass. Spr. gr. 1-2 mm	70° 80°						
11.30 - 15.00	3.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. jevnt skiktet og bandet med mm-tykke biot. skikt. og cm-tykke hbl.før. band. spr. gr. 1-2 mm. svak impr. Py.	70° 80°						
15.00 - 18.00	3.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende spr. gr. 1-2 mm. 15.40-15.60 spor sl,cp,gn 16.50-16.60 spor sl. Svak impr. Py.		0.09	0.09	0.16		7.24	13,00 - 13,40
				70°	0.53	0.96	0.96		12,88	15,40 - 15.60
					0.36	0.50	0.76		8.82	15.60 - 16,50
				80°	0.23	0.34	0.92		7.59	16,50 - 16.60
					0.04	0.07	0.08		6.88	16,60 - 18,00
18.00 - 21.50	3.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. med enkelte cm-tykke hbl.førende band ved 19.40. Spor anhydrite	70° 80°						
21.50 - 22.60	1.10	TAP								
22.60 - 23.20	0.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende	80°						
23.20 - 24.20	1.00	Pegm.								

9/5 1978
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.300

Borehull: 542

Dato : April - 78
Koordinater : X: 925.411,9 Y: 44.300.1
Retning : N.
Helling/stigning: -86°
Høyde : -70.95
Lengde : 26.00 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	biot.gn.	Mørk,mlk. ved 0.80 en cm-tykk biot.band. Spr. gr. 1-2 mm. (rotazon) Svak impr. Py.	80°						
1.00 - 2.05	1.05	Hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. enkelte gr. 1-2 mm.	80°						
2.05 - 2.60	0.55	Hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. gr.rik 1-10.0 mm. Tildels stich-tolitisk.							
2.60 - 3.90	1.30	Hbl.gn.	Mørk,mlk.mass. spor gr. 0.5-1.0 mm.							
3.90 - 5.05	1.15	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. rel. kv.rik Svak impr. Py.	70° 80°						
5.05 - 5.50	0.45	Pegm.								
5.50 - 5.60	0.10	Biot.sk.	Mørk,grovk Ondulerende Spr. gr. 1-2 mm.	70° 80°						
5.60 - 6.00	0.40	TAP								
6.00 - 6.20	0.20	Biot.sk.	Mørk,mlk-grovk. Spor gr. 1-2 mm. Spor Py.	70°						
6.20 - 7.20	1.00	Hbl. biot.gn.	Mørk,mlk. tildels mass. gr.førende 1-2 mm. Svak impr. Py.	70° 80°						
7.20 - 7.50	0.30	Biot.gn.	Mørk, mlk-grovk. Spor hbl. Svak impr. Py.	70°						
7.50 - 8.10	0.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.Spr. gr.1-2mm	80°						
8.10 - 10.00	1.90	Hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk.veksl. med enstaka dm-tykke partier 2 gl.gn.b.d. samt tykke pegm.band.Gr.førende 1-3mm fortrinnsvis i hbl.gn.	60° 80°						

Lokalitet:

Borehull: 242

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
10.00 - 11.70	1.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. Tild. biot.gn. vekslende med cm tykke hbl.band samt opp til dm-tykke pegm.partier Impr. Py spor Cp	60° 80°	0.02	0.12	0.46		8.55	
11.70 - 13.40	1.70	biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. skiktet med mm-tykke biot.skikt. Str. impr. Sl,Cp,Py,Po	70°	0.29	0.64	3.11		19.07	
13.40 - 14.90	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel. lys,mlk. spor hbl. tildels kv.rik, str. I-pr. Sl, Py, Cp, Po	60° 70°	1.48	0.47	8.93		7.66	
14.90 - 15.30	0.40	biot.sk.	Mørk,mlk. spor hbl. Sl,Py,Po,Cp	70°	0.35	0.60	3.28		9.27	
15.30 - 16.80	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. spor onhydrit ved 16.10 m. Impr. sl	70° 80°	1.26	0.46	3.21		7.13	
16.80 - 17.60	0.80	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.kv.rik.Spor Py,Sl Gn.	70° 80°	0.10	0.07	0.50		3.03	
17.60 - 18.10	0.50	Pegm.								
18.10 - 18.90	0.80	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. rel.kv.rik.Spor Py	80°	0.02	0.03	0.16		1.78	
18.90 - 19.40	0.50	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk. Rel.kv.rik. Strip. impr. Sl, Cp, Py	80°	2.54	0.33	5.82		8.91	
19.40 - 21.80	2.40	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. Kv.rik. Spor gr. 1-2 mm. Spor sl.	90°	0.08	0.05	0.16		2.14	
21.80 - 23.90	2.10	2 gl.gn.b.d.	Rel. lys,mlk. Enkelte dm-tykke hbl.band. Spor gr. 1-2 mm. Spor Py.	80°						
23.90 - 26.00	2.10	biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. Spr. gr. 1-3mm	80-90°						

8/5 1978
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 42.880

Borehull: 541

Dato :
Koordinater : X: 925.404.3. Y: 43.897.5.
Retning : N
Helling/stigning: +45°
Hoyde : - 79.9. m
Lengde : 74.65 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 1.35	1.35	2 gl.gn.b.d.	Rel. mørk,mlk. rel. mass. spr. gr. 1-3 mm.	60°						
1.35 - 1.65	0.30	Pegm.								
1.65 - 2.85	1.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. rel. mass. tildels.kv.rik. spr. gr. 1-2 mm.							
2.85 - 4.60	1.75	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. rel.mass. kv.rik, Spr. diffuse gr. 1-2 mm.	70°						
4.60 - 5.00	0.40	Pegm.	Spor Gn, cp,po							
5.00 - 6.15	1.15	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. rel.mass, Spr. diffuse gr. 0.5-1 mm.	70°						
6.15 - 6.85	0.70	Pegm.								
6.85 - 8.05	1.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. delvis mass, biot.rike parti, spor diffuse gr. 0.5-1mm	50°	0,20	0,10	0.54		3,03	
8.05 - 8.25	0.20	Pegm.	Str. sl,gn,cp,po,py.		2,14	0.07	3.33		10.87	
8.25 - 8.55	0.30	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. spor hbl. Imp. sl,cp,Py,Po	50°	0.98	0.18	1.81		7.64	
8.55 - 9.25	0.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk,mass. kv.rik, spor Py		0.12	0.09	0.29		2.89	
9.25 - 10.00	0.75	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. enkelte str. m/ imp. Sl,Cp,Py	50°	0.39	0.19	1.06		4.75	
10.00 - 12.10	2.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. rel. mass. spor gr. 1-2 mm.	50°	0.02	0.03	0.08		2.39	
12.10 - 12.50	0.40	Malm	(Skarn type)		0.83	1.37	5.20		9.17	
12.50 - 12.90	0.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. mass, kv.rik enkelte str. sl,cp,py	50°	1.74	0.26	2.52		4.92	

Dato :
Koordinater :
Retning :
Borehull: 541 Helling/stigning:
2. Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
12.90 - 13.60	0.70	Malm	Enkelte parti m/hbl, b.d.gn. og pegm. Tildels kompakt malm, Po-rik.		0.36	0.29	1.59		24.62	
13.60 - 14.50	0.90	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink, tildels mass. spor diffuse gr. 0.5-1mm.	50°	0.06	0.04	0.19		2.02	
14.50 - 16.75	2.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk, veksl. m/hbl. kompakt malmførende parti, fra 14.50-15.00 lys sl. Imp. sl,cp,gn,py	50°	0.98	0.58	5.01		11.89	
16.75 - 17.50	0.75	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk-grovk. tildels hbl-førende. Imp. sl,cp,gn,Py	50°	0.86	0.18	2.88		8.49	
17.50 - 17.90	0.40	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. mass. svak imp. Py		0.03	0.05	0.06		1.43	
17.90 - 18.40	0.50	2 gl.gn.alm.	Rel.mørk, mlk. mass. kv.rik, vekslende m/hbl. Sl,Gn,Py		2.88	1.05	2.40		10.53	
18.40 - 18.60	0.20	2 gl.gn.alm.	Lys, mlk, mass, svak imp. Py		0.14	0.12	0.16		2.05	
18.60 - 19.45	0.85	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels kv. hbl.rik. Imp. sl, cp, gn, Py	40°	0.86	0.54	1.52		7.69	
19.45 - 20.90	1.45	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. m/pegm.band, enkelte str. m/sl,cp,gn,Py	50°	0.27	0.22	0.48		4.58	
20.90 - 21.80	0.90	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk-grovk. hbl-førende, god imp. sl,cp, gn, Py		1.62	0.87	2.53		9.65	
21.80 - 22.70	0.90	2 gl.gn.alm.	Rel. lys,mlk. mass, svake spor gr. Py.		0.19	0.12	0.32		2.95	
22.70 - 23.00	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.hbl.førende imp. sl,cp,gn,py	60°	1.72	0.96	2.76		10.15	
23.00 - 23.35	0.35	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. mass. svak imp. Py		0.01	0.05	0.05		1.70	
23.35 - 23.50	0.15	Malm			2.82	0.27	2.92		19.64	

Borehull: 541

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
23.50 - 26.20	2.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. tildels mass. ved 23.90 spor Sl. Fra 25.70 - 25.85. Spor hbl, sl svak imp. Py Spor gr. 0.5-1 mm.		0.08	0.07	0.41		2.78	
26.20 - 26.50	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.hbl.førende, God imp. sl,gn,Py		1.04	1.79	5.74		17.35	
26.50 - 29.30	2.80	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-grovk. tildels mass. spr. dm-brede bånd pegm. spor diffuse gr. Svak impr. Py.	40° 50°	0.11	0.13	0.39		4.09	26.50-27.50
29.30 - 41.20	11.90	2 gl.gn.alm.	Rel. lys,mlk. tildels mass. spr. pegm.band. spor gr. spor gr. 1-2 mm.	40° 50°						
41.20 - 41.40	0.20	Pegm.								
41.40 - 44.10	2.70	2 gl.gn.alm.	Lys, mlk.-fink. mass,kv.rik spor diffuse gr. 1-3 mm.							
44.10 - 44.60	0.50	Pegm.								
44.60 - 46.40	1.80	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. mass. spor gr.							
46.40 - 46.60	0.20	Pegm.								
46.60 - 50.80	4.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-grovk, spr. pegm.band. svake spor gr. Py	40°	0.19	0.12	0.44		3.60	49.30-50.80
50.80 - 51.20	0.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.spor hbl.imp. Sl,Cp,Py		0.77	0.35	1.85		6.36	
51.20 - 51.95	0.75	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-grovk. imp. Py Spor sl	40°	0.30	0.18	0.75		5.56	

Borehull: 541

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Hoyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
51.95 - 53.70	1.75	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-grovk, svak imp. sl, cp, gn, py	40°	0.65	0.22	1.17		5.24	
53.70 - 60.00	6.30	Hbl-biot. gn.	Mørk,mlk,tildels mass. Fra 53.70-55.50 Stichtolitisk gr.førende 1-5 mm. Svak imp. Py.	40° 50°	0.03	0.05	0.12		5.89	53.70-54.70
60.00 - 74.65	14.65	Hbl-biotgn.	mørk, mlk, tildels mass, enkelte dm brede pegm bånd, gr førende 1-3mm svak imp Py							

10-5-78.

Holger Pauntdalen

Lokalitet: Profil 44.350

Borehull: 540

1.

Dato : April -78
Koordinater : X: 925.418,2 Y: 44.349,2
Retning : E
Helling/stigning: - 45°
Høyde : — 66,5
Lengde : 36,80 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.90	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk, rel. biot.rik impr. cp,sl,Py.	45°	0.08	0.72	0.18		9.81	
0.90 - 2.05	1.15	malm	komp.malm		4.43	0.67	12.66		10.14	
2.05 - 3.40	1.35	hbl.gn.	mørk,mlk-grovk. tildels biot.rik. spor gr. 1-2 mm impr. Py,cp,sl?	45°	0.05	0.05	0.10		7.36	
3.40 - 3.65	0.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.biot.rik spr. gr. 1-2 mm. impr. Py,cp	50°	0.07	0.11	0.16		11.62	
3.65 - 5.40	1.75	Pegm.			0.03	0.02	0.07		11.64	
5.40 - 6.35	0.95	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.biot.rik. spor gr. 0.5-1 mm.Impr. Py	50°	0.02	0.09	0.05		7.53	
6.35 - 8.30	1.95	hbl.gn.	mørk,mlk-grov-mlk. veksl. med cm-tykke band 2 gl.gn. b.d. og pegm.band. gr.før. fortrinnsvis i hbl.gn. Impr. Py, Po.	45°						
8.30 - 8.65	0.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor gr. 1-2 mm. impr. Py, Po	55°						
8.65 - 9.00	0.35	TAP								
9.00 - 9.25	0.25	hbl.gn.	mørk,mlk. impr. Py.		0.03	0.16	0.03		7.20	
9.25 - 10.00	0.75	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk mlk. tildels hbl-førende. impr. Py	50°	0.03	0.18	0.08		7.85	
10.00 - 11.05	1.05	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk. kv.rik, spor hbl. ved 10.50. Impr. py, spor Sl.	55°	0.09	0.23	0.31		7.20	
11.05 - 11.40	0.35	malm			1.34	0.64	13.51		13.20	

...alitet:

Borehull: 540

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
11.40 - 11.80	0.40	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,grovk. gl.rik. (nærmest gl.skifer) ondulerende. impr. py spor sl	60°	0.28	0.46	1.62		11.78	
11.80 - 13.20	1.40	2 gl.gn.b.d.	lys,mlk-fink. enkelte dm.-tykke partier som er hbl.-førende. impr. Py.	55°	0.07	0.07	0.19		6.05	
13.20 - 13.50	0.30	TAP								
13.50 - 14.45	0.95	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.skiktet med filmtynne biot.skikt. spor gr. 1-2 mm. Svak impr. Py.	55°						
14.45 - 15.00	0.55	TAP								
15.00 - 16.70	1.70	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk.spor hbl. enkelte gr. 1-2 mm.	50°	0.06	0.07	0.04		8.02	
16.70 - 17.20	0.50	biot.sk.	Mørke grovk. ondulerende spr. gr. 1-3 mm. impr. py	50°	0.03	0.10	0.12		10.15	
17.20 - 17.65	0.45	biot.sk.	mørk,grovk.ondulerende spr. gr. 1-3 mm. Cm-tykke hbl.band.Str. imp. sl,po,py,cp.	50°	0.03	0.15	4.71		15,38	
17.65 - 18.50	0.95	hbl.biot.gn.	mørk,mlk-grovk. veksl. med cm-tykke pegm.band.imp. Py, Po	55°	0.00	0.14	0,26		8.66	
18.50 - 19.95	1.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl. førende spr. gr. fortrinnsvis i de hbl.rikere part. 1-2 mm. Impr. Py	50°	0.00	0.11	0.09		7.83	
19.95 - 21.80	1.85	2 gl.gn.b.d.	mørk mlk.-grovk. biot.rike tild. biot.sk) cm-tykke hbl.band med enk. gr. 1-2 mm impr. Py,Po, spor sl,cp	55°	0.10	0.32	0.55		12,83	

.alitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 540

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
21.80 - 22.40	0.60	malm	Mørk,biot.hbl.pegm. Cp,Py,Sl		0.37	0.76	3.86		17.83	
22.40 - 23.55	1.15	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk,kv.rik,spor hbl. Impr. Py,sl,gn. (lys sl.)	50°	1.40	0.25	2.70		8.00	
23.55 - 23.95	0.40	biot.sk.	Mørk,mlk-grovk.spor hbl. Stripet impr. Py,sl,cp.	40° 50	1.10	0.97	4.39		14.33	
23.95 - 24.15	0.20	biot.	mørk,grovk. (rotazon?) Cp, Py, Sl?	40°	0.08	1.46	0.67		15.16	
24.15 - 25.90	1.75	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk.jevnt skiktet med mm-tynne biot.skikt. spor hbl. impr. Py,po,cp,sl.	50°	0.06	0.54	1.69		11.83	
25.90 - 26.60	0.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fin. rel.kv.rik Spor hbl.impr. Py,Cp,Sl	65°	0.39	0.30	1.78		7.50	
26.60 - 27.85	1.25	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk.rel.kv.rik. film-tynne biot.skikt.Cm-tykke pegm.band. spor hbl. Str. og impr. Py,Sl,Cp,Gn.	50°	1.43	0.41	3.70		8.00	
27.85 - 28.80	0.95	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink.Kv-rik.Enkelte små gr. 0.5-1 mm. Impr. Py	60°	0.28	0.24	0.79		5.00	
28.80 - 29.15	0.35	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink.kv.rik. Bandet med komp.malm.	60°	1.94	0.32	7.74		8.66	
29.15 - 29.95	0.80	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink.kv.rik.Enkelte cm-tykke band med 2 gl.gn.b.d.	55°	0.10	0.08	0.55		3.67	
29.95 - 31.10	1.15	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.homogen. Impr. Py spor Sl.	55°	0.04	0.25	0.40		5.65	
31.10 - 34.00	3.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.homogen.Svak impr. Py	55°	0.00	0.14	0.04		3.17	31.10-32.10
34.00 - 34.70	0.70	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk.veksl. med dm-tykke pegm.band. svak impr. Py	60°						

Kalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 540

4.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
34.70 - 36.00	1.30	2 gl.gn.b.d. Rel. lys mlk.	55°						
36.00 - 36.80	0.80	Pegm.							
		26/4 -78							
		Stellan Burman							

SANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43.880

Borehull: 539

Dato : April -78
Koordinater : X: 925.403,3 Y: 43.897.6
Retning : N.
Helling/stigning: + 70°
Høyde : - 79,3
Lengde : 50.0 m.

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 3.60	3.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels kv.-rik, enkelte spr. gr. 1-4 mm spor skarn eller epidot? Fra 1.80-2.00, 2.70-2.75 pegm. svak imp. Py.	70°						
3.60 - 4.20	0.60	Pegm.	Bandet med 2 gl.gn.		0.13	0.13	0.37		2.68	
4.20 - 5.45	1.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk, mlk, tildels kv.-rik, svak imp. Sl,Cp.Py	50°	0.19	0.29	0.66		5,68	
5.45 - 7.55	2.10	Pegm.	Spor Sl,Cp,Py		0.02	0.14	0.13		2,21	
7.55 - 8.00	0.45	Biot.gn.	Mørk, mlk-grovk, tildels hbl.førende. Imp. Sl,Cp,Py	70°	1.89	0.81	4.47		11,36	
8.00 - 8.60	0.60	Musk.gn.	Lys,mlk-fink. Kv.rik massiv, spor hbl, Sl,Cp,Py.		0.29	0,18	0.90		4,73	
8.60 - 9.70	1.10	Malm	Fra 8.60-9.00 biot-hbl.gn. m/lys Sl. Fra 9.00-9.70 Pegm.kv.rik,m/diopsid(skarn)		1.03	0.45	4.56		8.84	
9.70 - 12.80	3.10	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk,enkelte spr.. gr. 1-2 mm. Fra 10.85-10.90 Sl.	70°	0,44	0,20	1.17		3,31	9,70 - 10,70
12.80 -14.30	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.spr.gr.1-5 mm	70°						
14.30 - 15.30	1.00	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. tildels m/pegm.band Spr. gr. 1-2 mm. 1-2 mm	70° 80°						
15.30 - 15.85	0.55	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. bandet med 2 gl.gn.alm. Spr.gr. 1-5 mm	70°						
15.85 - 18.30	2.45	2 gl.gn.alm.	Lys.mlk,bandet med 2 gl.gn. b.d. Spor gr. 0,5-1 mm.	70°	0.00	0.03	0.05		2,25	17,30 - 18,30
18.30 - 19.70	1.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.-grovk. m/biot. Hbl.rike band.fortr.vis med Sl, Cp, Gn, Py	60° 70°	0,79	0.52	2,75		4.22	18,30 - 19,30

RANA GLADTRYKK

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Borehull: 539 Helling/stigning:
Høyde :
2
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
19.70 - 24.65	4.95	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.tildels massiv m/biot.rike band. spor gr. Fra 20.35-20.40, 24.25-24.30 24.45-24.46 Spor Sl	60° 65°	0,18	0,14	0,85		3,21	1970 - 2070
					0,22	0,07	0,58		2,89	2366 - 2465
24.65 - 25.15	0.50	Biot.hbl.gn.	Mørk,grovk-mlk, bandet med 2 gl.gn.alm. Imp. Sl,Cp,Py	70°	1,22	0,51	4,13		8,68	
25.15 - 26.60	1.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.mass. spor gr. Imp. Py	70°	0,89	0,11	0,86		2,89	
26.60 - 27.00	0.40	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. Kv.rike parti m/ Sl, Cp, Py		0,30	0,16	1,66		7,71	
27.00 - 28.20	1.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk,mass. spor gr. 0.5 - 1 mm. Svak imp. Py	70°	0,05	0,05	0,20		2,73	
28.20 - 30.20	2.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.-grovk. rel.mass. tildels kv.rik,biot.hbl. rike band, fortrinnsvis m/sl,Cp, Py.	60° 65°	0,22	0,34	1,21		6,75	
30.20 - 31.10	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk, tildels mass. kv.rik m/hbl.førende band fortrinnsvis m/sl,Cp,Py	70°	0,75	0,31	1,64		6,59	
31.10 - 32.35	1.25	Malm	Kompakt (Skarn).		3,86	0,24	13,86		5,79	
32.35 - 32.85	0.50	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink.mass.kv.rik, hbl. biot.band.Imp. Sl,Cp,Py		0,63	0,63	2,22		6,11	
32.85 - 33.50	0.65	Malm	Kompakt (Skarn)		3,21	0,96	12,35		9,48	
33.50 - 34.10	0.60	2 gl.gn.alm.	Rel.mørk,mlk.kv.rik.Hbl.før. kompakt malmband Sl, Cp, Py	70°	2,09	0,53	7,56		9,16	

FANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 539

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
34.10 - 36.50	2.40	Hbl.-biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. med kv.-band. Spr. gr. 1-5 mm. Fra 35.00-35.40 Stichtolitisk. Imp. Py.	60°	0,19	0,08	0,55		6,45	34,10-36,10
36.50 - 50.00	13.50	Hbl.gn.	Mørk, mlk-grovk. tildels mass. gr.rik 1-4 mm. Fra 46.40 - 46.60 Stichtolitisk. Imp. Py.	50° 60°						

26/4 1978
H. Pantdalsli

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Mofjellet Gruber

Borehull: 538

1.

Dato : 1978
Koordinater : 925.364,6 X, 43.892,2 Y
Retning : rett S
~~Helling~~/stigning: + 50° S
Høyde : - 75,0 m
Lengde : 32,40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.95	0.95	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk. Kv.rik. Impr. og stripet malm. Sl,Gn, Cp, Py	50° 60°	1,12	0,56	4,97		8,84
0.95 - 1.70	0.75	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk-fink. Kv.rik impr. Py. Spor Sl, Cp	50°	0,27	0,30	0,75		6,05
1.70 - 2.05	0.35	2 gl.gn.	Rel.lys,mlk. Str. malm. Sl, Cp, Gn, Py.	50°	0,86	0,11	10,95		17,84
2.05 - 3.80	1.75	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk-fink. Spor hbl. Svak impr. Py, Cp, Sl.	45°	0,08	0,26	1,06		6,21
3.80 - 5.70	1.90	2 gl.gn.b.d.	Lys, mlk-grovk. Impr. Py Spor Sl.	50°	0,18	0,24	0,73		7,45
5.70 - 7.10	1.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. Spor hbl. Impr. Sl, Cp, Py	45°	1,23	0,64	3,19		7,60
7.10 - 8.00	0.90	2 gl.gn.musk.d.	Lys,mlk-grovk. grovskjellig musk. Svak impr. Sl,Cp,Py	40° 45°	0,76	0,22	1,97		4,97
8.00 - 8.50	0.50	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. kv.rik Impr. Py spor Sl	45°	0,59	0,23	0,91		3,72
8.50 - 9.10	0.60	2 gl.gn.musk. dom.	Lys, mlk. Kv.rik. Spor Py Sl	50°	0,24	0,15	0,46		4,19
9.10 - 9.90	0.80	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk-grovk. Impr. Lys Sl, Py, Cp, Gn.	50°	0,41	0,22	1,36		4,97
9.90 - 11.20	1.30	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. tildels Kv-rik. Spor hbl. Jevn. impr. Sl, Gn, Cp, Py	45°	0,87	0,49	2,43		6,36
11.20 - 13.45	2.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. enkelte biot. rikere band med spor hbl. opp til cm-tykke. Svak impr. Py, spor Sl, Cp	50° 60°	0,49	0,32	1,57		5,90

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 538

2.

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
13.45 - 13.60	0.15	Pegm.								
13.60 - 14.05	0.45	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk. spr. gr. 1-2 mm. Impr. Py, spor Cp	50°	0,11	0,31	0,38		6,83	
14.05 - 14.30	0.25	hbl.gn.	Mørk,mlk. mass. gr.førende 1-2 mm. Svak impr. Py	50°	0,10	0,16	0,35		6.36	
14.30 - 15.35	1.05	2 gl.gn.b.d.	Rel. mørk,mlk. Hbl.førende ved 14.05 - 14.15.	40°	0,03	0,05	0,11		7,29	
			Gr.rik 1-2 mm. svak impr.Py	50°						
15.35 - 15.65	0.30	hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.rik.Spor Py	40°						
15.65 - 16.10	0.45	2 gl.gn.b.d.	Rel. lys mlk-grovk. Veksl.	0°						
			med pegm.slirer. Tynne biot. skikt,spor hbl. og gr. 1-1.5 mm. Ondulerende. Klyser av Py, Po.	40°						
16.10 - 16.40	0.30	hbl.gn.	Mørk,mlk. mass. gr.rik 1-3mm spor Py.							
16.40 - 17.80	1.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. Spor hbl. Ved 16.90 - 17.00. Hbl.førende. Gr.førende 1-2 mm. Svak impr. Py.	50°						
17.80 - 22.30	4.50	Hbl.gn.	Mørk,mlk. Rel.homogen. Gr-førende 1-2 mm. Svak impr.Py	50°						
22.30 - 22..70	0.40	2 gl.gn.alm.	Lys,fink. kv.rik mass. gr. rik. 0.5-1 mm.							
22.70 - 23.90	1.20	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk. rel.kv.rik. Enkelte dm.tykke partier med fink. opplitisk gn. gr.før.	50°						
			1-2 mm. Spor hbl. og Py	60°						

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 538

3.

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
23.90 - 24.95	1.05	Hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. Gr.førende 1-3 mm.	60°						
24.95 - 26.80	1.85	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. Hbl.førende Enkelte gr. 1-2 mm. Spor Py	60°						
26.80 - 27.90	1.10	hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. Gr.førende 1-3 mm.	50°						
27.90 - 30.70	2.80	2 gl.gn.alm.	Lys, mlk-fink. Tildels kv.rik Spr. gr. 1-2 mm. Enkelte cm-tykke band biot. og hbl. med store gr. 2-5 mm.	45°						
30.70 - 31.05	0.35	Gn.breccia.	Lys,fin-grov. Bruddstykker og fragment av 2 gl.gn.hbl. gn. i et matrix av fink. kv. feltspat.							
31.05 - 32.70	1.65	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk. tildels kv.rik fr. 22.00 jevnt bandet med cm-tykke hbl.biot.band.med gr. 1-2 mm.	50°						

19/4 1978
Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.340

Borehull: 537

Dato : April-78
Koordinater : X: 925.417,1 Y: 44.343,9
Retning : W
Helling/stigning: - 85°
Hoyde : -66,6
Lengde : 29.00 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.60	0.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. impr. Py Spor Cp	80°	0.09	0.32	0.44		8.68	
0.60 - 0.80	0.20	malm			2.60	0.38	6.56		7.26	
0.80 - 2.20	1.40	hbl.gn.	Mørk,mlk.homogen.Spor gr. 1-2 mm.	70	0.06	0.10	0.20		7.73	
2.20 - 2.50	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende spor hr. 1-2 mm.	80	0.02	0.07	0.84		9.78	
2.50 - 3.80	1.30	Pegm.								
3.80 - 4.80	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.hbl..førende	70-80						
4.80 - 5.70	0.90	hbl.gn.	Mørk,mlk-grov. veksl.med opp til cm-tykke band med biot. m. pegm. gr.fortrinnsvis i de hbl.rikere part. ved 4.90-4.95. Sl, Imp.Py	80	0.03	0.12	0.34		7.73	
5.70 - 6.00	0.30	TAP								
6.00 - 6.20	0.20	hbl.gn.	Mørk,mlk.gr.førende.1-2 mm Impr. Sl,Py	80°	0.84	0.08	3.20		8.68	
6.20 - 8.40	2.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.veksl. med opp til dm-tykke partier med hbl.gn. spr. gr. fortrinnsvis i de hbl.rik. part. Impr. Py.	80° 90°	0.06	0.15	0.04		8.68	6.20-7.20
8.40 - 9.35	0.95	TAP								
9.35 - 10.40	1.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.Hbl.førende spor gr. 1-2 mm. Impr. Py	80°						
10.40 - 12.50	2.10	biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. jevnt båndet og skiktet med hbl. rike band og biot.skikt. samt enkelte cm-tykke pegm. band. Enkelte gr.1-2 mm. Py opptrer som slirer og klyser. Spor Cp..	80° 90°						

Borehull: 537

2.

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
12.50 - 13.10	0.60	Pegm.								
13.10 - 14.00	0.90	TAP								
14.00 - 16.35	2.35	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grov.Jevnt bandet med hbl.rike band og biot. skikt samt enkelte cm-tykke pegm.band. Py opptrer som slirer med klyser. Fra 14.40 - 16.35 blir det str. impr. Sl, Cp.	80°	0.02	0.22	0.39	~~0.6~~	10.41	14.00-14.40
					0.28	0.52	1.68	~~15~~	13.10	
16.35 - 16.55	0.20	TAP								
16.55 - 18.40	1.85	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.hbl.førende partier med skarnmalm Sl,Cp,Gn,Py,Po	80°	0.26	0.35	3,07		7.25	
18.40 - 18.50	0.20	Pegm.								
18.60 - 19.30	0.90	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. rel.kv.rik. Enkelte biot.skikt,Spor Sl, Py,	90°	0.17	0.08	0.46	~~2.6~~	2.68	
19.30 - 19.70	0.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. stripet malm	80°	2.23	0.60	5.83		10.73	
19.70 - 21.30	1.60	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. Rel.kv.rik. spor Py	80°	0.11	0.05	0.84		2.68	
21.30 - 23.20	1.90	Pegm.								
23.20 - 25.20	2.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.Rel.kv.rik med spor Py	90°						
25.20 - 25.50	0.30	TAP								
25.50 - 28.60	3.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. rel.kv.rik Homogen,svak impr. Py	80°						
28æ60 - 28.70	0.10	Pegm.								
28.70 - 29.00	0.30	hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende 1-2 mm Impr. Py	90°						

27/4-78 Stellan Burman

Lokalitet: Profil 43.890

Borehull: 536

Dato : April - 78
Koordinater : X: 925.365,5 Y: 43.892,3
Retning : S
Helling/stigning: +70°
Hoyde : - 75
Lengde : 36.23

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.75	0.75	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.rel.mass. veksl. med hbl.førende partier. Str. imp. Sl,Cp,Gn,Py	60°	1.76	0.52	4.84		10.80	
0.75 - 1.20	0.45	Biot-hbl.gn.	Mørk,grovk-mlk. Rel.mass. 0.80 - 0.85 grov biot., God imp. Sl,Cp,Py	60°	0.48	0.64	4.60		15.22	
1.20 - 3.10	1.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk-fink- grovk rel. mass. veksl. med hbl. førende partier. 2.70-2.75 grov biot. Str. imp. Sl,Cp Py.	60°	0.18	0.25	1.44		11.62	
3.10 - 5.10	2.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,grovk-mlk, svakt ondulerende, spor hbl.D. Imp. Sl,Gn,Cp,Py	50° 80°	0.39	0.23	1.17		11.45	
5.10 - 6.15	1.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. rel. mass. hbl.førende.Enkelte pegm. band. Str. imp. Sl,Cp,Gn,Py	60° 70°	0.87	0.48	4.97		8.35	
6.15 - 8.20	2.05	2 gl.gn.musk.d.	Lys,mlk-grovk,veksl.m/band biot. spor hbl. Imp. fortr. lys Sl,Cp,Gn,Py	60° 70°	0.68	0.20	1.70		5.40	
8.20 - 9.50	1.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk-grovk.spor hbl. imp. Sl,(lys) Gn,Cp,Py	60°	0.83	0.28	2.85		7.30	
9.50 - 10.50	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,grovk-mlk. hbl.før. imp. Sl,Cp,Gn,Py	60°	1.26	0.36	3.82		8.60	
10.50 - 11.40	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.mass.hbl.før. Spr. gr. 1-2 mm. Imp. Py	60°	0.13	0.06	0.46		7.80	
11.40 - 14.90	3.50	biot.-hbl.gn.	Mørk,mlk-fink. rel.massiv, bandet m/amf. gr.førende 1-3 mm. Imp. Py	60° 70°						

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 536

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
14.90 - 19.75	4.85	hbl.gn.	Mørk,mlk.mass. spr. pegm. band. Gr.førende. Tildels rik 1-3 mm. Imp. Py	60° 70°						
19.75 - 20.40	0.65	Breksje								
20.40 - 24.55	4.15	hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. rel.mass. bandet m/amf. gr.førende 1-3 mm. Imp. Py.	70°						
24.55 - 26.10	1.55	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,fink. mass. biot.-rikere band 24.50-24.60 epidot? Gr.førende 0.5-2 mm.	70°						
26.10 - 26.60	0.50	Pegm.								
26.60 - 27.90	1.30	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,fink-mlk, mass. Enkelte mørke biot.rike band. Spr. gr. 0.5-2 mm	80°						
27.90 - 28.30	0.40	Pegm.								
28.30 - 30.90	2.60	2 gl.gn.alm.	Lys, fink.-mlk. mass. Enkelte mørke biot.rike band. Spr. gr. 0.5-2 mm.	80°						
30.90 - 36.20	5.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk,mass.enkelte hbl.rike band. Spr. gr. 1-3 mm.	70° 80°						

19/4 1978
H. Pantdalsli

Lokalitet: Prof. C 44.230

Borehull: 535

Dato : April - 78
Koordinater : X: 925 378,4 Y: 44 230,2
Retning : S
Helling/stigning: - 69°
Høyde : - 78,7
Lengde : 29,80 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.35	0.35	2 gl.gn.b.d.	Rel..mørk,mlk. cm.tykke pegm.band. mm-tykke skikt biot.Spr. gr. 1-2 mm.	60°						
0.35 - 0.80	0.45	TAP								
0.80 - 4.50	3.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. bandet med opp til cm-tykke kv.rike band. samt skiktas med filmtynne biot.skikt.Enkelte gr. 1-2 mm. Py opptrer som enstaka klysor og svak impr. spor sl, cp ved 2.65 m.	80°						
4.50 - 4.65	0.15	TAP								
4.65 - 6.20	1.55	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl. førende gr.førende 1-2 mm fortrinnsvis i de hbl.før. partiene. Svak impr. Py.	80°						
6.20 - 9.05	2.85	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. jevnt bandet med cm-tykke kv.rike og hbl. rike band. svak impr. Py.	70° 80°						
9.05 - 16.60	7.55	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.Enkelte cm-tykke pegm.band. Svak impr. py.	70° 80°						
16.60 - 17.70	1.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl.-førende.Spr. gr. 1-3 mm.	70° 80°						
17.70 - 20.00	2.30	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk.spr. gr. 1-2 mm. svak impr. Py.	70°						
20.00 - 20.70	0.70	2 gl.gn.musk.d.	Lys,mlk-grovk. spor Py	70°						
20.70 - 24.20	3.50	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk.svak imp. Py	70°						

KANA BLADTRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 535

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning :
Høyde :
Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
24.20 - 24.70	0.50	biot.gn.	Mørk,grovk.gr.førende 1-3 mm.	80°						
24.70 - 25.25	0.55	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys, mlk. spor gr. 1-2mm Spor Py.	70°						
25.25 - 25.85	0.60	TAP								
25.85 - 26.80	0.95	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.spr. gr. 1-2 mm. Svak impr. Py.	60° 70°						
26.80 - 27.10	0.30	Pegm.								
27.10 - 29.40	2.30	hbl.gn.	Mørk,mlk.gr.førende 1-3 mm.	80°						
29.40 - 29.60	0.20	Pegm.								
29.60 - 29.80	0.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.hbl.førende. svak impr. Py.	80°						

12/4 - 1978

Stellan Burman.

RANA BLADI (RYKKET)

Lokalitet: Profil 43.890

Borehull: 534

Dato : April 78
Koordinater : X: 925.367,6 X: 43.889.0
Retning :
Helling/stigning: +70°
Hoyde : - 74,9 m
Lengde : 30 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.35	1.35	Pegm.	Spor sl,Gn,Cp,Py		1,64	0,14	0.35		15.56	
1.35 - 1.90	0.55	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.imp. Py	60°	0,20	0,14	0,17		28,68	
1.90 - 2.10	0.20	Malm	Mørk,mlk,hbl.rik, god imp. Sl,Cp,Py		0,83	1,05	1,35		17.24	
2.10 - 3.20	1.10	2 gl.gn.musk.d.	Lys,mlk-grovk.hbl.rike band fortrinnsvis med imp. sl,cp,py	50° 60°	0,14	0,22	1,77		7.17	
3.20 - 5.80	2.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,grovk.-mlk,tildels ondulerende,Veksl.med partier musk.d.gn. Spr. hbl.rik band fortrinnsvis med imp. sl,cp gn,py	20° 60°	0.45	0.26	1,84		7,32	
5.80 - 6.80	1.00	Malm	Rel.mørk,mlk.hbl.rik,veksl. med 2 gl.gn. god imp.sl, cp Gn, Py.	60°	1,48	0.59	7.43		12.05	
6.80 - 9.30	2.50	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.-grovk.hbl.før. band fortrinnsvis med imp. sl,cp,gn,py.	50° 60°	0.53	0.30	2,13		7,02	
9.30 - 10.45	1.15	Malm	Mørk,mlk,hbl.rik veksl.med partier 2 gl.gn.b.d. God imp. sl,cp,gn,py	60°	0.55	0,63	5.25		13,27	
10.45 - 11.60	1.15	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.hbl.førende, spr. diffuse gr. 1-3 mm. Svake spor Sl,cp, imp. Py	60°	0.39	0.20	0.45		9.00	
11.60 - 17.80	6.20	Hbl.-biot.gn.	Mørk,mlk-grovk.rel.massiv, gr.førende 1-3 mm.Spor Gn ved 14.30 Imp. Py.	60°						

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 534

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
17.80 - 18.40	0.60	Hbl.gn.	Mørk,mlk.massiv gr.førende 1-4 mm. Svak imp. Py.							
18.40 - 18.65	0.25	Musk,gn.	Lys,grovk.spor gr. 1-2 mm.							
18.65 - 19.40	0.75	Hbl.-biot.gn.	Mørk, mlk-grovk. rel.massiv gr.førende 1-3 mm. Spor Cp imp. Py.	60°						
19.40 - 19.70	0.30	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.kv.rik, massiv.							
19.70 - 20.90	1.20	Hbl.-biot.gn.	Rel.mørk,mlk-grovk. rel. massiv,veksl.med band av 2 gl.gn.alm. gr.førende 1-3 mm. Svak imp. Py.	70°						
20.90 - 21.60	0.70	Hbl.gn.	Mørk,mlk,massiv,gr.førende 1-5 mm. Svak imp. Py.							
21.60 - 22.30	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. tildels hbl. gr.førende 1-3 mm. Svak imp. Py.	70° 80°						
22.30 - 22.60	0.30	Musk.gn.	Lys,grovk.massiv.							
22.60 - 23.80	1.20	Hbl.-biot.gn.	Mørk,mlk,rel.massiv. Spr. gr. 0.5-2 mm.Imp. Py							
23.80 - 24.00	0.20	Pegm.								
24.00 - 25.05	1.05	Hbl.biot.gn.	Mørk,mlk.massiv,spr. band pegm. Spr. gr. 1-3 mm. imp. Py.							
25.05 - 30.00	4.95	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.-fink.Kv.rik,spor gr. rel.massiv.	60°						

13/4 1978
H. Pantdalsli

FANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43 580

Borehull: 533

Dato : 1975 – 78
Koordinater : X: 925 376,7 Y: 43 583,7
Retning : N.
Helling/stigning: + 35°
Høyde : – 76,0
1. Lengde : 64,20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.90	0.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.-fink.kv.rik, tildels mass. Impr. sl,cp, Gn, Py.		0,67	0.57	3.34		9,24	
0.90 - 1.40	0.50	2 gl.gn.musk.d. Lys mlk-grovk. impr. sl, cp, gn, py	40°	0.85	0,30	3,60		5.35	
1.40 - 2.50	1.10	2 gl.gn.b.d. Rel. lys mlk-grovk. enstaka gr. 1-3 mm. spor Py	40°	0,08	0,03	0.30		2.59	
2.50 - 9.30	6.80	2 gl.gn.b.d. Rel. lys,mlk. tildels mass. enstaka gr. 1-3 mm. svak impr. Py.	20° 30°						
9.30 - 9.70	0.40	Pegm.							
9.70 - 11.20	1.50	2 gl.gn.alm. Lys,fink. kv.rik mass.spor gr. 1-2 mm. spor Py	40°	0,07	0,09	0,15		2,76	
11.20 - 11.50	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende god impr. sl,cp,gn,py	40 50°	0.38	0.25	7.58		16.05	
11.50 - 12.00	0.50	2 gl.gn.alm. Lys,fink.kv.rik,spor sl, Cp, Py	40° 50°	0,47	0.23	1,57		4.22	
12.00 - 12.45	0.45	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. rel. kv.rik. impr. Sl,Cp,Gn,Py.	40° 50°	1.92	0.22	5,12		6.92	
12.45 - 13.10	0.65	2 gl.gn.alm. lys,fink.med biot.rikere band.imp. sl,cp,gn,py.	40°	0.63	0,18	1.70		3.73	
13.10 - 15.20	2.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.massiv.hbl. førende. God imp. sl,cp Gn, py.		0.94	0.59	7,10		12,92	
15.20 - 15.90	0.70	2 gl.gn.musk.d. Lys,mlk-grovk. onduler-ende, spor sl, py	10° 30°	0,19	0,07	0.81		3.73	

KANA BLADS TRYKKERI

...litet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 533

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
15.90 - 16.90	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. Ondulerende,hbl.førende,god imp. sl,cp,gn,Py.	40°	1.21	0.58	6.47		9.89	
16.90 - 19.15	2.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk-grovk. svakt ondulerende,god imp. sl,cp, gn,py	40°	0.70	0.44	3.09		8.43	
19.15 - 19.80	0.65	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk.Rel.mass, kv.rik, hbl.førende. God imp. sl,cp,gn,py.		5.95	0.20	12.92		8.27	
19.80 - 22.20	2.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.rel.massiv. tildels kv.rik,vekslende mineralisering m/hbl. God imp. sl,cp,gn,py.	40°	1.34	0.30	4.92		10.54	
22.20 - 22.50	0.30	hbl.gn.	Mørk,grovk.imp. sl,cp,gn,py	30-40°	2.19	1.07	2.08		6.81	
22.50 - 23.00	0.50	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.rel.massiv.Imp. Py		0.15	0.14	0.48		2.27	
23.00 - 25.00	2.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk,rel. massiv, hbl-førende.tildels kv.rik God stripet imp. sl,cp,gn,py	0° 30°	1.44	0.64	6.21		12.49	
25.00 - 34.25	9.25	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk,rel. massiv, tildels kv.rik med spr. band av pegm. enkelte gr.1-3 mm Fra 29.75-29.80,31.80-31.95 imp. sl,Cp,Gn,Py	10° 30°	0.18	0.08	1.04		3.73	25.00-26.00
					0.11	0.03	0.35		2.27	33.25-34.25
34.25 - 35.00	0.75	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk,kv.rik,hbl.før. imp. sl,cp,gn,py.	10° 20°	1.40	0.41	4.70		6.56	
35.00 - 35.50	0.50	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.massiv.Svake spor sl,cp,gn,py		0.66	0.10	1.87		3.05	
35.50 - 36.80	1.30	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk-fink. tildels kv.rik og massiv.Spr. miner.hbl.før.band.imp.sl,cp gn,py	30° 40°	2.23	0.14	2.31		3.81	

PANA BLADE TRYKKET

.alitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 533

3.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
36.80 - 38.00	1.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,grovk.ved 37.80 spr. med druserom. Svak impr. sl,cp,gn,py	30°	0,23	0.23	0.65		10.98	
38.00 - 39.15	1.15	Malm (skarn)	Rel.lys,mlk,kv.rik,hbl.før. Ved 38.30 druserom,god imp. sl,cp,gn,py.	10° 20°	2.31	0.13	10.99		10.98	
39.15 - 41.30	2.15	2 gl.gn.alm.	rel.lys,mlk.-fink.tildels kv.rik og massiv.bandet minerals m/hbl. imp. sl, cp,gn,py.	30° 40°	0.67	0.69	3.66		6.86	
41.30 - 44.60	3.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.tildels kv.rik og massiv. hbl.førende med rikere band, tildels god sl,cp,gn,py.	10° 40°	0,27	0.50	0.86		9.31	41.30-42.95
					0.92	0.48	2.02		7.69	42.95-44.60
44.60 - 44.90	0.30	Pegm.			0.10	0.30	4.41		2,27	
44.90 - 46.30	1.40	2 gl.gn.alm.	rel.lys,mlk.tildels kv.rik massiv og hbl.førende, imp. sl,cp,gn,py	30°	1,05	0.38	1.92		5.49	
46.30 - 47.30	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.tildels kv.rik massiv og hbl.før. imp. sl,cp,gn,po,py.	30°	1.15	0.41	3.14		9.76	
47.30 - 51.30	4.00	Malm(skarn)	Rel.mørk,mlk-grovk.tildels massiv,kv.rik.hbl.diopsid førende. God imp. sl,cp,gn. Py.	20°	2.24	0.41	7.92		6.86	47.30 49.30
				30°	2.23	0.13	12.13		9.61	49.30-51.30
51.30 - 52.65	1.35	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.-fink.Tildels kv.rik, massiv hbl.førende, imp. sl,cp,gn,py.	30°	1.80	0.22	4.03		6.10	
52.65 - 53.75	1.10	Malm(skarn)	Rel.mørk,mlk.massiv,hbl. og diopsid førende.God imp. sl,cp,Py		0.84	1.36	6.55		12.47	

ANA BLADS TYKKELSE

.alitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 533

4.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
53.75 - 55.40	1.65	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. musk.-rik fra 53.75-54.00.Hbl.før. fra 54.30 - 54.45. Svak imp. sl,cp,py.	30°	0.23	0.24	0.70		8.24	
55.40 - 59.30	3.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. tildels massiv,hbl.førende med spr. gr. 1-2 mm, imp. Py	30°	0.09	0.18	0.47		8.24	55.40-56.40
59.30 - 64.20	4.90	hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk.tildels mass. spor gr. 1-2 mm. imp. Py	30°						

12/4 1978

H. Pantdalsli.

Lokalitet: Bofl. 44230

Borehull: 532

1.

Dato : Mai - 78
Koordinater : X: 9253819 Y: 4422949
Retning : N.
Helling/stigning: - 55°
Høyde : - 782
Lengde : 1980 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk.hbl-førende. Impr. sl,cp,gn,py	50°	0,29	0.57	1.22		14.27	
0.70 - 1.70	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.hbl.før.svak impr. Py spor cp,sl	40° 60°	0.08	0.30	0.28		7.95	
1.70 - 1.95	0.25	Pegm.								
1.95 - 2.40	0.45	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende spor Py, Cp.	50°	0,00	0.22	0,05		8.76	
2.40 - 3.95	1.55	Malm			1.56	0.61	7.23		12.65	
3.95 - 10.00	6.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. jevnt bandet med 2 gl.gn.,hbl.gn. samt enstaka cm-tykke amf.band. Gr.førende fortrinnsvis i hbl.rikere part. 1-2 mm.	70° 80°	0.97	0.47	0.35		6.70	3.95-5.00
10.00 - 10.65	0.65	TAP								
10.65 - 12.00	1.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.gn. ved 10.65-10.70 m. Spr. gr. 1-2 mm. Svak impr. Py.	80°						
12.00 - 12.30	0.30	TAP								
12.30 - 15.15	2.85	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.med enstaka cm-tykke pegm. og hbl.rike band. spr. gr. 1-2 mm.	80°						
15.15 - 15.30	0.15	Pegm.								
15.30 - 16.00	0.70	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk.enk.gr. 1-3 mm.	70°						
16.00 - 16.20	0.20	hbl.gn.	mørk,mlk.gr.rik 1-4 mm. stichtolitisk.							
16.20 - 16.70	0.50	TAP								
16.70 - 17.60	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.spor hbl. tildels gr.før. 1-2 mm. impr. Py.	70° 80°						

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 532

2.

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
17.60 - 17.80	0.20	hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. gr.førende 1-3 mm. (amfibolitisk)						
17.80 - 18.20	0.40	TAP							
18.20 - 18.55	0.35	Hbl.gn.	Mørk,mlk.enkelte gr. 1-2 mm. spor Py.	80°					
18.55 - 19.05	0.50	Pegm.							
19.05 - 19.50	0.45	hbl.gn.	mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm. spor Py.	80°					
19.50 - 19.80	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. gr.førende 1-2 mm. Svak impr. Py	80°					

13/4 -78
Stellan Burman

KANA BLACK TRYKKERI

Lokalitet: Profil 43 880

Borehull: 531

Dato : Mars - 78
Koordinater : X: 1925 376,1 Y: 43 883,7
Retning : N
Helling/stigning: + 60°
Hoyde : — 75,8
Lengde : 36,05 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 2.10	2.10	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.spor gr. 1-2 mm (fr.0.10-0.20 spor sl,gn.)	60°						
2.10 - 2.90	0.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.-grovk. spor hbl.gr.0.5-1.0 mm. 0.5 cm tykk sleppe med diopsid ved 2.80.	60°						
2.90 - 6.05	3.15	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.rel.mass.spor gr. 0.5 - 1.0 mm.	60						
6.05 - 6.90	0.85	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk-grovk. veksl. med part. med peg, samt opp til cm-tykke biot.rikere band, fortrinnsvis med gr. 1.0 - 3.0 mm.	60°	0.01	0,03	0.05		2.70	
6.90 - 9.00	2.10	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. jevnt bandet med lys sl,gn.cp,py og hbl.	65°	0.59	0.23	2.16		6,00	
9.00 - 10.30	1.30	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. part. med god imp. sl,gn,cp,py.	60°	1.29	0.49	5.50		9.30	
10.30 - 12.10	1.80	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-grovk. tildels musk.rik enkelte hbl. rike band imp. sl,cp,Gn, Py.	60	0.38	0.27	1.52		5.85	
12.10 - 12.30	0.20	Pegm.			0.89	0.35	0.10		1.35	
12.30 - 15.80	3.50	2 gl.gn.	Rel.lys,mlk-grovk. med ondulerende preg. veksl. med hbl. rikere partier, samt cm-tykke pegm.band. God imp. Sl,Gn,Cp,Py.	20° 50°	1.01	0,50	4.01		8.55	
15.80 - 16.70	0.90	2 gl.gn.musk.d.	Lys,grovk. spor sl,py	50°	0.35	0.15	0.33		4.80	

VANA BLADE TRYKKES

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 531

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
16.70 - 19.10	2.40	malm	(Skarntype)		1.23	0.59	1.34		10.50	
19.10 - 20.00	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. bandet, spor hbl, gr. 1-2 mm Py.	60°	0.07	0.38	0.23		3.25	
20.00 - 20.40	0.40	Pegm.								
20.40 - 36.05	15.65	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk.delvis mass. gr. førende 1-3 mm.Enkelte hbl førende partier (ved 24.80 - 25.00 Stichtolitisk).	40° 60°						

28/3 -78

Stellan Burman

FANA BLADTRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.270

Borehull: 530

Dato : Mars – 78
Koordinater : X: 925.370,1 Y: 44.272,6
Retning : N
Helling/stigning: – 79°
Høyde : – 713
Lengde : 18.70 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 5.00	5.00	2 gl.gn.b.d.	Rel. lys,mlk. rel.mass. spor hbl. gr.førende 1-3mm spor Py	70°						
5.00 - 5.20	0.20	Pegm.								
5.20 - 5.50	0.30	2 gl.gn.bb.	Rel.lys,mlk. svak imp. py	70°						
5.50 - 6.00	0.50	hbl.gn.	mørk,mlk-grovk. rel. mass. gr.førende 1-5 mm. stichtolitisk. Spor py.							
6.00 - 6.20	0.20	TAP.								
6.20 - 6.70	0.50	hbl.gn.	mørk,mlk-grovk. rel.mass. gr.førende 1-5 mm. Stichtolitisk, spor py.							
6.70 - 8.70	2.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.spor hbl. gr.førende 1-2 mm.svak impr. Py, spor Cp.	70°						
8.70 - 9.40	0.70	2 gl.gn.musk.d.	Lys,mlk.kv.rik enkelte gr. 1-2 mm.	75°						
9.40 - 12.20	2.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. tildels båndet med cm-tykke kv.rikere bånd. spr.gr. 1-3 mm. Spor hbl. Svak impr. Py	60° 70°	0.09	0.03	0.08		4.95	11.20-12.20
12.20 - 12.40	0.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. med hbl. Impr. sl,cp,Py		0.30	0.26	0.46		6.75	
12.40 - 13.55	1.15	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.jevnt båndet med opp til cm-tykke band av kv.pegm. hbl.rikere band samt mm.tykke skikt av biot. spor Py.Gr-før.1-2mm	60° 70°	0.02	0.06	0.08		4.50	
13.55 - 13.75	0.20	malm	komp. malm.		1.15	0.34	6.77		6.80	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 530

2.

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
13.75 - 18.70	4.95	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. jevnt båndet med opp til cm-tykke band av kv.pegm. hbl.rikere band. samt mm-tykke skikt av biot. svak impr. Py. Gr.førende 1-2 mm.	70°	0,07	0,06	0,13		4,35	13,75-14,75

11/4 1978
Stellan Burman

Lokalitet: Profil: 44270

Borehull: 529

Dato : Mars - 78.
Koordinater : X: 925.380,0 Y: 44.271,0
Retning :
Helling/stigning: - 90°
Hoyde : - 71.5
Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 3.00	3.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. gr. 1-3 mm og hbl førende, imp. Py	75° 80°						
3.00 - 3.15	0.15	TAP							
3.15 - 8.40	5.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,med lysere parti. Mlk., tildels massiv, gr. 1-3 mm og hbl. førende, imp. py.	70°						
8.40 - 10.00	1.60	2 gl.gn.alm. Lys,fink-mlk. Veksl. med biot.rikere parti, spr. gr. 1-2 mm. svak imp. Py.	80°	0.11	0.05	0.38		4.05	
10.00 - 11.50	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. Ondulerende preg, spor hbl.gr. Imp. sl, cp,py		0.39	0.60	2.76		9.90	
11.50 - 14.70	3.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende, spr. gr. 1-2 mm.imp. Py.	80°	0.06	0.13	0.38		4.64	11.50-12.50
14.70 - 15.00	0.30	TAP							
15.00 - 19.60	4.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.-grovk.hbl.før. Spr. gr. 1-3 mm. Imp. Py.	80°						
19.60 - 19.90	0.30	TAP							
19.90 - 24.70	4.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.båndet m/2 gl. gn.alm. Spor hbl,gr. 1-2mm fra 20.15-20.20,21.30-21.35, 22.00-22.05 kv.rik m/spor cp, po. Imp. py.	75°						
24.70 - 25.00	0.30	TAP							
25.00 - 28.10	3.10	2 gl.gn.b.d. mørk,mlk,rel.massiv,spor hbl spr. gr. 1-2 mm. Imp. py	80°						

11/4 1978
Holger Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.010

Borehull: 528

Dato : Febr. 78
Koordinater : X: 925.364.7 Y: 44.009.3
Retning : SV
Helling/stigning: - 60°
Høyde : 68.6 m
Lengde : 12 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.45	0.45	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk-grov, spor hbl. gr. imp. py.	40°	0,19	0.24	0,43		7,71	
0.45 - 0.80	0.34	TAP							
0.80 - 2.25	1.45	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,m/lysere parti, mlk.-grov, spor hbl, imp. sl, cp, py.	40°	0.45	0.30	1.03		2.39	
2.25 - 2.45	0.20	TAP							
2.45 - 6.90	2.45	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.spor hbl. God imp. sl, cp, gn, py.	50° 60°	0.78	0.38	3,97		10,12	
4.90 - 6.00	1.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,spor hbl. gr. Imp. sl, cp, gn, py.	65°	0.42	0,28	1.32		5,95	
6.00 - 6.10	0.10	TAP							
6.10 - 7.30	1.20	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.imp. sl,cp,gn.py	60°	1.04	0.20	2,09		6,43	
7.30 - 7.70	0.40	TAP							
7.70 - 8.60	0.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk, svake spor hbl. gr. sl, cp, gn, py.	60°	0,20	0.08	0,43		5,30	
8.60 - 8.80	0.20	TAP							
8.80 - 12.00	3.20	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. fra 9.60-9.75 pegm. svak imp. Py.	60°	0,02	0.02	0,06		4.50	8,80-9,80
		14.3. 1978 Holger Pontdahl							

PANIA GRDS TRYKKERI

Lokalitet: Linse 3

Borehull: 527

side 1

Dato : 1-3 -78
Koordinater : x: 925.376.3 Y: 43.883.7
Retning : N
Helling/stigning: + 25°
Høyde : - 77
Lengde : 56m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 2.90	2.90	2 gl.gn.alm.	lys,mlk-grovk. svak imp. sl py, cp	80° 40°	0.24	0.20	0.74		4.96	
2.90 - 4.15	1.25	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. spor hbl. impr. sl, py, cp.	0 30	0.32	0.19	0.99		9.00	
4.15 - 4.90	0.75	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.-grovk. svak imp. sl, py, cp.	20°	0,06	0.12	0.52		4.78	
4.90 - 5.90	1.00	2 gl.gn.b.p.	lys,mlk-fink. rel. mass. imp. sl,gn.cp,py.	0 20°	0.63	0.34	2.16		7.90	
5.90 - 7.00	1.10	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk.spor hbl..imp. sl,cp py	0 20°	0.57	0.29	1.57		4.41	
7.00 - 8.70	1.70	2 gl.gn.alm.	lys,mlk. svak imp. py	30°	0,08	0.07	0.19		2.39	
8.70 - 9.00	0.30	2 gl.gn.b.d.	rel.lys,mlk. spor hbl. imp. py	25°						
9.00 - 9.60	0.60	2 gl.gn.alm.	lys,mlk.	0-10°						
9.60 - 10.10	0.50	Peg.								
10.10 - 11.30	1.20	2 gl.gn.alm.	lys,mlk.-grov.	0-20°	0.10	0.10	0.06		3.12	
11.30 - 13.20	1.90	2 gl.gn.b.p.	lys,grovk. med onduleret preg. impr. sl, cp (Sl,Cp, som klysor och sprickfyllnader).	0° 10°	0.27	0.34	0.43		4.78	
13.20 - 13.60	0.40	Peg.	Spor MoS_2 ?		0.65	0.06	0.06		1.10	
13.60 - 15.90	2.80	2 gl.gn.alm.	lys,mlk-grov-mlk. vekslende med opp til cm-tykke peg. slirer. imp. sl,cp.py.	0 20°	0.25	0.23	0.37		3.67	
15.90 - 17.90	2.00	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. mass.kv.rik.spor gr. 0.5 - 1.0 mm. spor sl,py,cp.		0.05	0.12	0.46		2.39	15.90-16.90
					0.02	0.04	0.03		1.29	16.90-17.90
17.90 - 18.00	0.10	Peg.			0.08	0.05	0.01		1.29	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 527

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
18.00 - 19.70	1.70	2 gl.gn.b.d.	rel.lys,mlk. spor hbl. ved 18.90-19.05 cm tykk biot. bånd. spor sl,gn,cp,py	0° 30°	0.35	0.07	0.52		3.67	
19.70 - 20.50	0.80	2 gl.gn.b.p.	lys,mlk.kv.rik imp. sl,gn. Py. (lys sl).	30°	1.12	0.28	7.87		11.44	
20.50 - 22.90	2.60	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. kv.rik imp. sl, cp, Py	10° 20°	0.51	0.25	1.47		6.44	
22.90 - 26.05	3.15	malm	mørk,kv.hbl. diopsid? mass. god malm. sl, gn. cp, py		8.74	0.85	9.61		12.32	
26.05 - 36.10	10.05	2 gl.gn.alm.	lys,mlk. kv.rik.tildels mass. spor gr. 0å5-1.0 mm.Ved 32.70-32.90 spor sl,cp,py	10° 20°	0.07 0.47	0.94 0.19	0.17 0.91		3.03 3.79	26.05-27.05 35.10-36.10
36.10 - 36.70	0.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,kv.rik.spor hbl. imp. sl,gn.cp.py.	25°	4.91	0.23	13.22		9.28	
36.70 - 37.70	1.00	2 gl.gn.alm.	lys,mlk-fin. kv.rik. spor sl,gn,cp,py (lys sl)	30°	1.18	0.13	2.27		2.46	
37.70 - 38.00	0.30	2 gl.gn.b.d.	rel.lys,mlk. spor hbl. imp. sl,gn.cp.py.	30°	2.80	0.35	6.05		5.31	
38.00 - 38.30	0.30	2 gl.gn.alm.	lys,mlk-fin. vekslende med cm-tykke peg. og hbl. band. spor sl,cp,py.	30°	0.31	0.19	0.91		4.17	
38.30 - 39.40	1.10	2 gl.gn.alm.	lys,mlk.kv.rik.Spr. gr. 1.0-2.0 mm. spor py,cp,po.	25°	0.02	0.02	0.05		1.89	
39.40 - 41.00	1.60	2 gl.gn.alm.	lys,mlk-fin. kv.rik.tildels mass. spr. gr. 1-3 mm.	25°	0.07	0.07	0.12		2.08	
41.00 - 41.60	0.60	2 gl.gn.b.p.	rel.lys,mlk. slirig, spor hbl. mm-tykke biot.skikt. imp. sl,gn,cp,py	10° 80°	2.45	0.46	4.82		9.09	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull:

Side 3

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
41.60 - 49.50	7.90	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk. rel. kv.rik. Spr. gr. 1-2 mm.	20°	0.45	0.09	0.68		2.84	41.60-42.60
49.50 - 49.70	0.20	kv.peg.	Lys,melkekv.							
49.70 - 51.95	2.25	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk.rel.kv.rik. Tildels mass. spor Py	20° 30°						
51.95 - 52.20	0.25	Peg.								
52.20 - 56.00	3.80	2 gl.gn.b.p.	Lys.mlk. rel.kv.rik. bandet med opp til 5 cm. tykke band peg. spor gr. 0.5-1.0 mm.	20° 30°						

1/3 1978

Steffan Burman

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Profil 44.010

Borehull: 526

Dato : Febr. 78
Koordinater : X:925.364.7 Y:44.010.3
Retning : S
Helling/stigning: - 58°
Høyde : - 68.6 m
Lengde : 18.10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.20	0.20	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. imp. sl, py		1.03	0.31	2,00		6,59	
0.20 - 0.65	0.45	Tap							
0.65 - 1.65	1.00	2 gl.gn.alm. lys,mlk.imp. sl,cp,py	30-40°	0.74	0.24	1.59		6.75	
1.65 - 2.55	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk.m/spor hbl. Imp. sl,cp,py.	40°	0.25	0.27	0.77		9.16	
2.55 - 3.45	0.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.m/imp. sl,cp,py.	40°	0.52	0.20	1.56		4.66	
3.45 - 5.45	2.00	2 gl.gn.alm. rel.lys,mlk-grov,Veksl. med kv.rikere parti,god imp. sl cp, gn, py (spor hbl.)	40°	0.91	0.34	4.24		10.77	
5.45 - 6.40	0.95	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grov, m/spor gr. 1-2 mm. Svak imp. sl,cp py	60°	0.25	0.12	0.79		6.75	
6.40 - 6.60	0.20	skarn? Rel.lys,mlk. kv.rik,god imp. sl, cp, py.		2.41	0.18	6.14		5.14	
6.60 - 7.30	0.70	2 gl.gn.alm. lys,fink.-mlk.m/spor gr. 0.5 - 1 mm. Imp. Py.	60°	0.11	0.05	0.48		4.34	
7.30 - 7.50	0.20	TAP							
7.50 - 7.65	0.15	Pegm.							
7.65 - 9.60	1.95	2 gl.gn.alm. rel.lys,mlk. stichtolitisk ved 8.20. Spr. gr. 1-3 mm, imp. Py	60°						
9.60 - 10.25	0.65	TAP							
10.25 - 16.60	5.35	2 gl.gn.alm. Rel.lys,m/mørkere parti.mlk. spor hbl. spr.gr. 1-3 mm. delvis god impr. Py.	60°						
16.60 - 16.80	0.20	TAP							
16.80 - 18.10	1.30	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.spor hbl.imp. Py.	60°						

14.3. 1978 Holger Pantaleli

FARA BLAD TRYKT

Lokalitet: Forsirings-ort
Profil 44.250

Borehull: 525

Side 1

Dato : Feb. 78.
Koordinater : X 925.392.7 Y 44.246.5
Retning : S
Helling/stigning: – 40°
Høyde : – 69.7
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.55	0.55	2 gl.gn.b.d.	Rel. lys,mlk. spr. gr. 1-2 mm. spor py	35°						
0.55 - 0.70	0.15	Tap.								
0.70 - 1.55	0.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. spor hbl. spr. diffuse gr. 1.0-1.5 mm. spor Py	30° 40°						
1.55 - 2.60	1.05	biot.hbl.gn.	rel.mørk,mlk. rel.mass. spr. gr. svak impr. Py	30°						
2.60 - 5.90	3.30	biot.gn.	mørk,mlk-grov. litt varierende med små partier hbl. opp til cm-tykke band og slirer med kv.peg..Spr. gr. 1-2 mm. svak imp. py	30° 50°	0.04	0.11	0.18		6.69	4.50-5.90
5.90 - 6.55	0.65	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. spor hbl. Kv-rik imp. sl,py,po (lys sl)	30°	0.70	0.36	3.36		9.39	
6.55 - 7.70	1.15	TAP								
7.70 - 9.40	1.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.-grov-mlk. ford. spor hbl. tildels kv.rik imp. og slirer sl,py,po,cp	0° 10°	0.28	0.66	1.08		6.05	
9.40 - 10.50	1.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grov.biot.rik spor hbl. foldet spor sl, py, cp, po	0° 10°	0.12	0.29	0.70		7.17	
10.50 - 11.70	1.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.tildels kv.rik imp. og slirer sl,py,po,cp	10°	1.21	0.71	5.72		9.87	
11.70 - 12.00	0.30	biot.gn.	mørk, mlk-grov.	10-20°	1.15	0.27	1.48		6.53	
12.00 - 12.70	0.70	2 gl.gn.b.d.	rel.lys,mlk-grov. rel.kv.-rik spor hbl. spor sl, py	10° 20°	0.50	0.33	0.62		6.37	
12.70 - 13.00	0.30	biot.skifer	mørk,grovk.foldet, muligens rørlsezone?	0° 10°	0.06	1.26	1.45		9.24	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 525

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
13.00 - 14.40	1.40	biot.gn.	mørk,mlk-grov varierende med cm-smale band og striper peg.hbl. spr. gr. 1-3 mm. spor py	10° 30°	0.08	0.36	0.48		7.81	
14.40 - 15.40	1.00	TAP			0,02	0,06	0,07		4.78	14.40-15.45
15.40 - 16.45	1.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. vekslende (bandet) med opp til cm-tykke band og slirer kv.peg, hbl.biot. Spr. gr. 1-2 mm spor Py	20°						
16.45 - 16.80	0.35	TAP								
16.80 - 18.30	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.veksl. mlk-grov. veksl. (bandet) med opp til cm-tykke band med kv.peg. hbl. biot. spor gr. 1-2 mm. spor Py	30° 40°						

14/2 1978

Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil

Borehull: 524

Dato : Febr. 1978
Koordinater : X: 925.395.7 Y: 44.240.8
Retning : S
Helling/stigning: - 63°
Høyde : - 70.7 m
Lengde : 23.82

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.alm.	Lys,fink.-mlk.	70						
0.50 - 0.60	0.10	TAP								
0.60 - 1.30	0.70	2 gl.gn.alm.	Lys, fink-mlk.	70°						
1.30 - 2.10	0.80	2 gl.gn.b.p.	rel.lys,mlk. kv.rik	65						
2.10 - 5.50	3.40	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk. kv.rik.svak imp. py	65°						
5.50 - 7.10	1.60	Pegm.								
7.10 - 9.40	2.30	2 gl.gn.b.d.	mørk,mlk.-grovk. svak impr. py.	60° 65°	0.16	0.12	0.59		7.65	8.40-9.40
9.40 - 9.95	0.55	2 gl.gn.alm.	lys,mlk.svak.spor sl,imp.Py	65°	0.21	0.28	0.46		4.30	
9.95 - 10.45	0.50	TAP								
10.45 - 11.25	0.80	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.svake spor sl,impr. py.	65°	0.35	0.27	0.99		5.26	
11.25 - 11.80	0.55	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk. kv.rik delvis hbl. imp. sl,cp,py,po.	65°	0.93	0.32	4.00		10.67	
11.80 - 12.65	0.85	2 gl.gn.b.d.	mørk,mlk-grovk. band m/hbl. spr. gr. 1-3 mm. Imp. py.	65°	0.40	0.25	0.15		6.21	
12.65 - 12.85	0.20	2 gl.gn.b.p.	rel.lys,mlk. spr. gr.1-3 mm	65°						
12.85 - 14.10	1.25	2 gl.gn.b.d.	mørk,mlk-grovk.hbl.førende spr. gr. 1-3 mm. svak imp.Py	50°	0.16	0.11	0.29		5.89	13.10-14.10
14.10 - 14.55	0.45	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk. hbl.før. imp. sl, py	60°	0.63	0.25	0.94		5.42	
14.55 - 16.20	1.65	2 gl.gn.b.d.	mørk, m/lyse parti mlk.-grovk. dm.brede band m/hbl.gn. spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py	60°	0.02	0.02	0.05		4.46	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 524

Side 2

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
16.20 - 18.50	2.30	hbl.gn.	mørk,mlk-grovk. delvis gr. rik 1-3 mm. svak impr. Py	50° 60°						
18.50 - 19.40	0.90	TAP								
19.40 - 19.60	0.20	hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. spr. gr. 1-3 mm. svak imp. py		0.09	0.14	0.07		6.05	
19.60 - 20.10	0.50	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,grovk.-mlk. hbl.før. spredte gr. 1-3 mm. imp.Py	50° 60°	0.03	0.09	0.05		5.58	
20.10 - 20.75	0.65	2 gl.gn.b.p.	rel.lys,mlk,h-l.førende. kv.rik.imp. sl,cp,py,po.		0.40	2.41	2.42		16.09	
20.75 - 20.90	0.15	2 gl.gn.b.d.	mørk,mlk-grovk.spor hbl. gr. 1-2 mm. svak imp. py.		0.07	0.09	0.25		7.33	
20.90 - 21.00	0.10	TAP								
21.00 - 21.10	0.10	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk-grovk.spor gr.1-2mm		0.04	0.09	0.05		8.60	
21.10 - 21.40	0.30	TAP								
21.40 - 22.60	1.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,grovk.-mlk. spr. gr. 1-2 mm. imp. py	50° 60°	0.04	0.09	0.12		8.60	
22.60 - 22.80	0.20	TAP								
22.80 - 23.80	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,grovk.-mlk. spredte gr. 1-2 mm. imp. py	50° 60°						

13.2. 1978

Holger Pantdalsli

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.240

Borehull: 523

Dato : Febr. 78
Koordinater : X:925.395.6 Y:44.240.4
Retning : S
Helling/stigning: + 68°
Høyde : - 68.5 m
Lengde : 13.58 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 5.70	5.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk-grov-mlk. spor hbl. spredte gr. 1-2 mm. spor Py.	60°	0.09	0.06	0.07		8.30	4.50-5.70
5.70 - 6.65	0.95	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.spr. gr.1-2mm spor hbl. svak imp. sl,py	60° 70°	0.58	0.12	1.05		6.83	
6.65 - 9.70	3.05	hbl.gn.	mørk,mlk.tildels biot.rik (2 gl.gn.b.d.hbl.førende) spr. gr. 1-2 mm. svak imp py	70° 80°	0.07	0.03	0.07		7.27	6.65-8.00
					0.05	0.02	0.05		7.79	8.00-9.00
9.70 - 12.10	2.40	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk.cm-tykke band med kv.preg,og hbl. spr. gr. 1-3 mm.	70° 80°						
12.10 - 12.70	0.60	hbl.gn.	rel.mørk,grovk.lyse str. peg. spr. gr. med stichtolitisk preg. 1-4 mm. spor py.	60° 80°						
12.70 - 13.60	0.90	2 gl.gn.alm.	lys,mlk-fink. mass.kv.rik	80°						

14/2 1978

Stellan Burman

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.240

Borehull: 522

Side I

Dato : Febr. 1978
Koordinater : X:925.401.3 Y:44.241.2
Retning : N
Helling/stigning: - 65°
Høyde : - 70.8
Lengde : 22.90

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.enkelte hbl.band. str. imp. sl,py	55°	0,68	0,12	2.59		3,98	
0.50 - 2.30	1.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. Hbl. førende.Rik fra 2.00-2.30 imp. sl, py	50° 60°	1.03	0,28	3,31		8,83	
2.30 - 5.30	3.00	Pegm.			0.10	0.05	0.23		1.25	2,30 - 3.80
5.30 - 6.70	1.40	Biot.-hbl.gn.	mørk,grovk.-mlk. Imp. sl,py	60°	0.06	0.04	0.04		1.71	3.80 - 5.30
					0,35	0.34	3.03		14.37	
6.70 - 6.90	0.20	Pegm.			0.09	0.36	0.92		6.75	
6.90 - 8.00	1.10	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk. spor hbl.gr. svak imp. py.	70°	0,05	0,07	0,23		6.23	
8.00 - 8.50	0.50	biot.-hbl.gn.	Mørk,grovk. imp. sl,py.		0.11	0.28	3.54		13.33	
8.50 - 9.00	0.50	TAP								
9.00 - 10.45	1.45	Biot.-hbl.gn.	Mørk,grovk. fra 9.10-9.20, 9.50-9.60, 10.35-10.45 kv.pegm.band.Imp.sl,cp,py,po	60° 70°	0.24	0.47	0.82		10.73	
10.45 - 11.75	1.30	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk. hbl.førende svak imp. sl,cp.py		0,04	0.85	0.10		9.69	
11.75 - 13.65	1.90	biot.hbl.gn.	Mørk,veksl. m/lyse parti grovk. tildels kv.rik Imp. sl,cp,py,po	50°	0,17	0,55	2,08		15,95	
13.65 - 14.25	0.60	TAP								
14.25 - 16.65	2.40	Biot.-hbl.gn.	Mørk,m/lyse parti grovk-mlk m/kv.rike parti 15.35-15.50 pegm. Imp. sl,cp.py.po	60°	0.05	0.78	4.46		16.62	14.25-15.45
					0.67	0.34	4.64		11.42	15.45-16.65
16.65 - 16.80	0.15	TAP								
16.80 - 17.10	0.30	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk. imp. sl,py	60°	0.56	0.39	2.13		7.96	
17.10 - 18.55	1.45	Malm	rel.lys,mlk-grovk. kv.rik, hbl.førende.Imp. sl,cp,py		0,74	0.98	6.90		10.56	

VANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 522

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
18.55 - 18.90	0.35	TAP								
18.90 - 20.50	1.60	Malm	Rel.lys,mlk-fink. veksl. m. parti 2 gl.gn.alm.hbl.-førende. Imp. sl,cp,py	60°	1,48	0,47	5,31		7,27	
20.50 - 22.80	2.30	2 gl.gn.alm.	lys,fink.spor hbl. gr. 0.5 - 1 mm. Py	70°	0,14	0,04	0,25		1,90	20,50-21,50

13/2 1978

Holger Pantdalsli

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: FORSERINGSORT

Profil 44.240

Borehull: 521

Dato : Jan. 78
Koordinater : X: 925.401.6 Y: 44.240.8
Retning : N
Helling/stigning: + 65°
Høyde : - 68.3 m
Lengde : 14.99

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.50	0.50	malm	rel.lys,mlk.kv.rik.spor m/hbl. lmp. og striper sl cp, py, gn.		6,85	0,66	15,81		10.67	
0.50 - 1.30	0.80	musk.gn.	lys,mlk-fink.kv.rik imp. sl,py,po,cp	45°	0.41	0,63	0,87		12,83	
1.30 - 2.00	0.70	malm	rel.lys,mlk. tildels kv.rik m/spor hbl. diopsid.		0.76	2,24	1.58		12,33	
2.00 - 2.40	0.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk-grovk. spor sl, Py, cp	50° 60°	0,09	0,45	0,59		5,83	
2.40 - 4.00	1.60	malm	rel.lys,mlk. tildels kv.rik m/hbl. diopsid mass.		1,52	0,65	6,89		10.00	
4.00 - 4.20	0.20	2 gl.gn.b.p.	lys,mlk-grov. spor hbl. gr. 1-2 mm.	50°	0,57	0,19	1,58		5,17	
4.20 - 7.00	2.80	2 gl.gn.b.d.	rel.lys, mlk. varierende med kv.rikere partier.spor hbl. gr. 1-2 mm.	60°	0,06	0,05	0,46		7.17	4,20-5,20
			ved 5.05-5.10 spor sl,cp,py	70°	0,35	0,16	0,07		6,33	5,20-7,00
7.00 - 10.20	3.20	2 gl.gn.b.d.	rel.lys,mlk.spor hbl. smale part. tildels hbl.førende med gr. 1-3 m imp. py.	60° 70°						
10.20 - 13.90	3.70	hbl.gn.	mørk,mlk.-fink. spredte gr. 1-3 mm. svak imp. py	80°						
13.90 - 15.20	1.30	hbl.gn.	mørk,grov-mlk. svak imp. py	60-70°						

13/2 1978

S. Burman

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.220

Borehull: 520

Dato : Jan. 78
Koordinater : X:925.397.8 Y:44.221.3
Retning : S
Helling/stigning: + 67°
Høyde : - 68.6
Lengde : 16.57 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.30	1.30	Malm	Rel.lys,mlk. kv.rik m/spor hbl. diopsid.Veksl. m/str. 2 gl.gn.b.d. Stripet,imp. sl, cp, py	80°	1.51	0.69	6.12		11.83	
1.30 - 4.80	3.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. Frg.2.00 - 2.30. Stichtolitisk. Hbl. førende. spr. gr. 1-3 mm. Imp. py.	70° 80°	0.13	0.12	0.20		7.33	1.30-3.00
					0.04	0.03	0.10		7.50	3.00-4.80
4.80 - 5.25	0.45	musk.gn.	Lys,mlk.-grovk. m/spor sl, gn. py		0.45	0.08	0.38		8.50	
5.25 - 6.60	1.35	2 gl.gn.b.d.	Rel. mørk,mlk-grovk. Hbl. førende parti. spr. gr. 1-2 mm. impr. Py.	80°	0.04	0.08	0.10		8.83	
6.60 - 7.30	0.70	musk.gn.	Lys,grovk. spr. diffuse gr. 0.2 - 0.5 mm. Impr. Py.	70° 80°						
7.30 - 10.70	3.40	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk. m/hbl.førende parti. spr. diffuse gr. 1-2 mm. impr. py.	75°						
10.70 - 11.80	1.10	hbl.gn.	mørk,mlk. gr. 1-3 mm.Imp.Py	70-80°						
11.80.- 13.70	1.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spr. gr.1-3 mm. Imp. py	80°						
13.70 - 16.70	3.00	2 gl.gn.alm.	Lys,fink.spor Py.	80°						

13.2. 1978

H. Pantdalsli

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.220

Borehull: 519

Side 1

Dato : Jan. 78
Koordinater : X: 925.398.0 Y: 44.221.5
Retning : S
Helling/stigning: - 60°
Høyde : - 70 m
Lengde : 21.33 m

Dybde	L.	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. 0.40 - 0.45. Mye grov biot.hbl. førende, m/spr. gr. 1-3 mm impr. py	45°						
0.70 - 1.65	0.95	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,grovk.-mlk. Peg.-band fra 1.15-1.20. spor D. ved ca. 1.00 enkelte striper m/hbl. Imp. py.	60°	0.03	0.47	0.05		8.33	
1.65.- 2.20	0.55	2 gl.gn.alm.	lys,mlk-grovk.spor hbl fra 1-95 - 2.15. Imp. sl, py	60°	0.31	0.17	3.82		9.33	
2.20 - 3.00	0.80	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk. band hbl.gr. 1-3 mm fra 2.65-2.70 svak imp. py	60°	0.10	0.11	0.35		8.83	
3.00 - 3.70	0.70	2 gl.gn.alm.	lys,mlk.spor sl ved 3.70. svak imp. py	45° 50°	0.22	0.09	0.27		3.83	
3.70 - 4.90	1.20	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk.grovk.kv.rik fra 4.00 - 4.10. Rik på grov biot. fra 4.10-4.90 spor hbl. Imp. lys sl,py fra 3.70-4.10. imp. mørk sl, py, po fra 4.10-4.90	50° 60°	0.41	0.74	4.27		10.83	
4.90 - 5.55	0.65	2 gl.gn.b.p.	lys,mlk,hbl.førende. Imp. lys sl, py	60°	0.31	0.23	3.07		8.00	
5.55 - 6.00	0.45	2 gl.gn.b.d.	rel. mørk,mlk-grovk, hbl.-før. imp. sl, py, po		0.09	0.89	2.14		10.17	
6.00 - 6.15	0.15	TAP								
6.15 - 6.80	0.65	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. pegm. fra 6.30-6.40. Imp. sl, py, po.	60°	0.05	0.66	2.40		11.67	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 519

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
6.80 - 7.85	1.05	biot.gn.	Mørk,grovk.-mlk. tildels hbl.førende fra 7.75-7.85 kv.rik. svak imp. sl,cp,Py Po.	60°	0.13	0.41	1.19		9.67	
7.85 - 8.65	0.80	TAP								
8.65 - 9.25	0.60	hbl.biot.gn.	Rel.lys,mlk-grovk.tildels kv.rik imp. sl,cp,py,po.	60°	0.69	1.72	6.14		17.00	
9.25 - 10.20	0.95	2 gl.gn.b.d.	mørk,mlk-grovk. tildels biot.gn. str. m/hbl. Impr. lys sl, py, spor po.	60°	1.23	0.55	3.29		9.83	
10.20 - 12.70	2.50	malm	rel.lys,mlk-grovk.kv.rik, hbl. diopsid førende. impr. sl, cp, py, po.		0.46	0.28	5,97		12,17	
12.70 - 13.25	0.55	biot.-hbl.gn.	Rel.mørk,m/lyse kv. rike parti, svak imp. sl,py,po	60°	0.12	0.39	1.50		17.17	
13.25 - 13.80	0.45	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk-grovk.spor hbl. gr. 1-3m imp. py	60°						
13.80 - 16.15	2.35	2 gl.gn.b.p.	rel.lys,m/mørkere parti, mlk.-grovk. band dm brede hbl.førende,spr. gr. 1-3 mm svak imp. py	60°	0.01	0.03	0.05		4.33	13.25-14.25
16.15 - 20.70	4.55	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,m/lysere parti, mlk,hbl, gr. 1-3 mm. førend. vekslende svak imp. py.	60°						
20.70 - 21.15	0.45	TAP								
21.15 - 21.30	0.15	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk.svak imp. Py							

10/2 1978

H. Pantdalsli

PANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: FORSERINGSORT
Profil 44.100

Borehull: 518

Dato : Jan – 78
Koordinater : X 925.367,2 Y 44 102,9
Retning : N.
Helling/stigning: – 58
Høyde : – 72,0
Lengde : 22.50

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.50	1.50	Biot.gn.	Noe mørk,mlk.Enkelte lysere partier.Noe spr. hbl. Spr. gr. 0.5-1 mm.	55-60	0.24	0.16	0.20		5,83	
1.50 - 2.00	0.50	biot.gn.	Noe mørk,mlk.Noe kv. og pegm. Impr. sl, py.	55-60	1.80	0.75	4.82		13.17	
2.00 - 6.10	4.10	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.-grovk.Enkelte biot.rikere partier.Noe spr. hbl.Impr. sl,py, noe gn, cp	60	0.71	0.29	1.57		5.33	2.00-4.00
					0.89	0.33	2.97		7.50	4.00-6.10
6.10 - 6.90	0.80	biot.gn.	Noe mørk,mlk-grovk.Noe hbl. Impr. sl,gn,po,cp,gn.	60	1.39	1.23	4.16		10.33	
6.90 - 7.50	0.60	2 gl.gn.b.p.	Noe lys,mlk.Spr. spor hbl. Noe kv.	50-55						
7.50 - 9.85	2.35	hbl.-biot.gn.	Noe lys,mlk.Noe kv. og pegm Enkelte musk.rike part. Spredte gr. 0.5-1 mm.	60	0.11	0.16	0.41		5,00	6.90-8.00
9.85 - 10.05	0.20	Pegm.	hvit, grovk.							
10.05 - 11.30	1.25	hbl.biot.gn.	Samme b.art som før pegm.		0.06	0.07	0.10		6.49	
11.30 - 11.50	0.20	biot.gn.	Mørk,mlk-grovk.Noe pegm. litt hbl.Impr. py,po,cp.		1.00	0.39	0.05		23.33	
11.50 - 14.10	2.60	hbl.gn.	Noe mørk,mlk.-grovk. Endel partier med grovk. biot og hbl. Noe kv. Rel.jevnt besatt gr. 1-2 mm. Sv. impr. py.	60	0.04	0.06	0.05		7.50	11.50-13.50
					0.03	0.09	0.05		6.17	
14.10 - 14.55	0.45	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk. Noe kv. og hbl. Rel. godt impr. sl, py		0.03	0.03	0.05		5,33	

VAHA BLADS TRYCKERI

Lokalitet:

Borehull: 518

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
14.55 - 15.15	0.60	2 gl.gn.b.d.	Noe mørk,mlk.Enkelte biot-rike bånd. Litt hbl. Spredte gr. 1-2 mm. Impr.py	60°	1.69	0.18	5.15		6.00	
15.15 - 15.85	0.70	hbl.gn.	Noe mørk,grovk-mlk. Endel kv. og pegm. Endel skarn i hbl.		0.12	0.06	0.37		6.67	
15.85 - 16.05	0.20	Pegm.	Hvit, grovk.							
16.05 - 16.95	0.90	hbl.gn.	Noe mørk,grovk.-mlk. Mye kv. og pegm. En god del skarn i hbl. Gr. 0.5- 1 mm i biot-bånd. Sv. impr. py							
16.95 - 22.50	5.55	hbl.gn.	Noe mørk,mlk.Enkelte str. 2 gl.gn.alm. Noe kv. Rel. jevnt besatt gr. 1-2 mm. Impr. py.	60						

3/2 1970

Kaare M. Hegrum

SANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.100

Borehull: 517

Dato : Jun - 78
Koordinater : X 925.3647 Y 44108.2
Retning : S,
Helling/stigning: - 28
Høyde : - 72.0
Lengde : 21.0

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0.00 - 0.25	0.25	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk. Enkelte biot.str.	35-40						
0.25 - 4.10	3.85	2 gl.gn.b.d.	Litt mørk,mlk. Enkelte str. grovk.biot.Noe kv. og pegm. Spr. gr. 1-2 mm. Gn.-impr. på 0.50-0.60.	25-30						
4.10 - 4.65	0.55	hbl.-biot.gn.	Noe mørk,mlk.Endel kv. Rel. jevnt besatt gr. 1-2 mm.							
4.65 - 5.20	0.55	biot.gn.	Noe mørk,mlk.Endel kv. Noe ujevnt besatt gr. 0.5-1 mm							
5.20 - 6.30	1.10	hbl-biot.gn.	Noe lys,mlk.Tenderer stedvis mot hbl.gn. Noe kv. Rel.jevnt besatt gr. 0.5-1 mm.	30						
6.30 - 7.80	1.50	2 gl.gn.b.d.	Noe lys,mlk.Endel 2 gl.gn. alm. - b.p. partier. Noe kv. spr. gr. 1-2 mm	30	0.04	0.06	0.21		5.09	
7.80 - 8.75	0.95	biot.gn.	Noe mørk,mlk.Enkelte partier 2 gl.gn.b.d. Noe kv. Spr. spor hbl. Impr. sl,py,cp.	30-35	0.92	0.52	3.35		9.39	
8.75 - 9.50	0.75	musk.gn.	Lys,mlk.Noe spr. biot. Sv. impr. sl	35-40	0.20	0.10	0.64		2.22	
9.50 - 10.45	0.95	2 gl.gn.b.p.	Noe lys,mlk.Noe kv. Sv.spor hbl.Impr. sl, py	35-40	1.41	0.36	3.17		7.70	
10.45 - 11.00	0.55	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-grovk.Noe kv. Impr. sl, py	30-35	0.93	0.27	2.88		5.61	
11.00 - 12.55	1.55	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk.Noe pegm.og kv. Enkelte partier noe rikere på musk.Spor hbl.Tildels godt impr. sl, py, noe cp.	35-40	0.84	0.32	5.58		10.50	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 517

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
12.55 - 14.60	2.05	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.Stedvis noen biot-rike str. Noe kv. Stedvis spor sl, py	35-40	0.21	0.13	0.53		4.83	
14.60 - 15.10	0.50	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk.Enkelte biot.rike part. Spr. gr. 0.5 - 1 mm. Spor py.		0.02	0.05	0.10		5.67	
15.10 - 15.75	0.65	biot.gn.	Noe mørk,mlk. Litt hbl.Noe kv. sv.impr. sl, py, po.	30-35	0.08	0.39	0.71		13.83	
15.75 - 17.50	1.75	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.Enkelte biot.rike str. Spor hbl.Spor gr. 0.5 - 1 mm	30-35	0.02	0.06	0.10		5.83	
17.50 - 21.10	3.60	2 gl.gn.b.d.	Noe mørk,mlk.Noe kv.Tender-stedvis mot biot.gn. Noe spredt hbl.Spredte gr. 0.5 - 1 mm. Stedvis sv. impr. py.	30-35						

3/2 1978

Kaare H. Hegrum

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: FORSLRINGSORT
Profil 44.100

Borehull: 516

Dato : Jan. 78
Koordinater : X: 925.364.6 Y:44.103.1
Retning : S
Helling/stigning: - 50°
Høyde : - 72.0 m
Lengde : 22.80 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.85	0.85	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.Stedvis biot-rikere partier Noe kv.	30						
0.85 - 1.10	0.25	biot.gn.	Noe mørk,mlk.Spredte gr. 1-2 mm.	30-						
1.10 - 1.25	0.15	hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. Litt kv.							
1.25 - 2.20	0.95	biot.gn.	Noe lys.mlk.Spor hbl. Spor gr. 0.5-1 mm. Noe kv.	35-40	0.19	0.12	0.25		6.08	
2.20 - 2.70	0.50	biot.gn.	Samme b.art som over. Impr. sl, py.		0.97	0.68	2.89		9.45	
2.70 - 3.00	0.30	TAP								
3.00 - 3.70	0.70	biot.gn.	Noe lys, mlk. Tynne part. 2 gl.gn.b.p. Sv. impr. sl, py, cp.	40-45	1.16	0.39	2.60		5.85	
3.70 - 5.50	1.80	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk. Enkelte partier musk-rik. Andre biot-rik. Noe kv. sv. impr. sl, py.		0.65	0.26	1.52		5.18	
5.50 - 6.60	1.10	2 gl.gn.b.p.	Noe lys,mlk.Noe kv. Spor hbl. Rel.godt impr. sl,py		1.16	0.38	6.10		11.03	
6.60 - 7.70	1.10	2 gl.gn.b.p.	Samme b.art som over. Spor sl, py	40-45	0.58	0.29	1.90		5.85	
7.70 - 11.45	3.75	2 gl.gn.b.p.	Noe lys,mlk. Enkelte str. biot.gn. Gr. 0.5 - 1 mm. i disse.Noe kv. og pegm.	55-60	0.06	0.04	0.25		4.28	7.70 - 10.00
11.75 - 14.65	2.90	hbl.-biot.gn.	Noe lys, mlk.Noe kv.striper Tynne partier 2 gl.gn.b.p. Stedvis gr.0.5-1mm. Impr. py, sl.	60	0.03	0.09	0.12		10.58	13.30 - 13.80
					0.47	0.26	1.63		10.80	13.80 - 14.10
					0.05	0.06	0.14		5.85	14.10 - 14.35
14.65 - 15.20	0.55	TAP								

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 516

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
15.20 - 19.50	4.30	2 gl.gn.b.d.	Noe lys,mlk.Tynne partier musk.gn. og biot.gn. Endel kv. og pegm. Spredte gr. 1-5 mm. Spredt impr.py	60-65						
19.50 - 22.80	3.30	hbl.gn.	Noe mørk,mlk.Noe kv. og pegm. Enkelte partier 2 gl. gn.alm. Noe ujevnt besatt gr. 1-3 mm. Sv. impr. py.	60-65						

30/1 1978

Kaare M. Hegrum

FANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: FORSERINGSORT
Profil 44.220

Borehull: 515

1.

Dato : Jan. 78
Koordinater : X:925.403.5 Y:44.219.5
Retning : N
Helling/stigning: - 51°
Høyde : - 70.6 m
Lengde : 25.84 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 3.10	3.10	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk.Enkelte partier rike på musk, andre på biot. Stedvis kv.rik.Noe hbl. Impr. sl, py, noe gn.	60-65	1.36	0.13	6.58		9.71	0.00-1.00
					1.53	0.32	3,65		7,10	1.00-2.00
					1.19	0.46	2.90		8.53	2.00-3.10
3.10 - 4.20	1.10	biot.gn.	Noe lys,mlk.Enkelte striper grovk. biot. Noe kv. Endel hbl. Sv. impr. py, sl.	60-65	0.09	0.24	0.48		9.47	
4.20 - 6.45	2.25	hbl.gn.	Noe mørk,mlk. Endel kv. Rel.jevnt besatt gr.1-3 mm Impr. py.	40-45	0.00	0.04	0.04		8.50	4.20-5.50
6.45 - 8.15	1.70	biot.sk.	Mørk grovk. Endel kv. ibl. Spor hbl. Rel.jevnt besatt gr. 1-2 mm.Stedvis spor po, cp.	40-45						
8.15 - 10.00	1.85	biot.gn.	Noe lys,mlk.Stedvis tynne partier med 2 gl.gn.b.d. Noe hbl. rel.jevnt besatt gr. 1-3 mm.	30-35						
10.00 - 11.40	1.40	hbl.gn.	Noe mørk,mlk. Endel kv. iblandet.Jevnt besatt gr. 1-2 mm.	25-30						
11.40 - 11.80	0.40	biot.sk.	Mørk,grovk.Endel kv. Impr.py							
11.80 - 12.45	0.65	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk.Rel.kv.rik Enkelte tynne str. grovk. biot.	30						
12.45 - 12.70	0.25	biot.sk.	Mørk,grovk. Endel kv. Sv. impr. py.							
12.70 - 13.40	0.70	hbl.gn.	Noe mørk,mlk.Noe kv. sv. impr. py.	40-45						

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 515

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
13.40 - 13.75	0.35	Pegm.	Hvit, grovk. Noen striper grovk. biot.		0.03	0.13	0.14		7.82	12.70 - 14.10
13.75 - 14.10	0.35	biot.gn.	Noe lys, mlk. Kv.rik	40-45						
14.10 - 14.75	0.65	biot.gn.	Noe lys, mlk. Striper av grovk. biot.sk. Noe hbl. Tenderer mot slutten mot 2 gl.gn.b.d. Impr. sl, py, Noe gn.		1.07	0.59	3.49		13,97	
14.75 - 15.00	0.25	TAP								
15.00 - 16.75	1.75	hbl.gn.	Noe mørk, mlk. Endel kv. Endel grovk. biot. Impr. sl, py, noe gn, cp.		0.77	0.85	3.22		14,45	
16.75 - 18.00	1.25	2 gl.gn.b.d.	Noe lys, mlk. Noe kv. og pegm. Enkelte striper grovk. biot. Impr. sl, py.	30-35	0.78	0.29	1.44		4.97	
18.00 - 18.25	0.25	TAP								
18.25 - 19.50	1.25	2 gl.gn.b.d.	Samme 2 gl.gn.b.d. som før tap.		0.59	0.32	1.81		8.55	
19.50 - 19.85	0.35	TAP								
19.85 - 20.15	0.30	2 gl.gn.b.d.	Lys, mlk-fk. Noe kv.		0,10	0,12	0.25		3.83	
20.15 - 22.10	1.95	biot.gn.	Noe mørk, mlk-grovk. Tenderer stedvis mot biot.sk. Endel kv. og pegm. Spor hbl. spredt impr. sl, py.	40-45	0,19	0.64	1.60		12.60	
22.10 - 23.65	1.55	2 gl.gn.b.d.	Lys, mlk. kv-rik. Noen pegm.-str. Noe hbl. Impr. sl, py, Noe gn.	40-45	1.93	0.67	5.63		6.53	
23.65 - 24.35	0.70	2 gl.gn.b.p.	Lys, mlk. Kv.-rik. Stedvis litt py, sl.	35-40	0.23	0.05	0.35		2.00	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 515

3.

Dato :
Koordinater
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
24.35 - 25.00	0.65	TAP								
25.00 - 25.40	0.40	2 gl.gn.b.p.	Samme 2 gl.gn. som før tap.							
25.40 - 25.80	0.40	hbl.gn.	Noe mørk,mlk. Noe kv. og grovk. biot. Spor skarn. Spredte gr. 1-3 mm.	40-45	0,07	0.04	0.11		4.05	

30/1 1978

Kaare M. Hegrum

KANA GLADS TRYKKERI

Lokalitet: FORSLRINGSORT
Profil 44.220

Borehull: 514

Dato : Jan. 78
Koordinater : X:925.403.4 Y:44.219.5
Retning : N
Helling/stigning: + 77°
Høyde : - 68.7 m
Lengde : 15.05 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 2.40	2.40	hbl.gn.	Noe mørk,mlk. Enkelte part. grovk. hbl.Noe kv. Rel.jevnt besatt gr. 0.5-1 mm.Impr.py	65-70						
2.40 - 2.70	0.30	Pegm.	Hvit. grovk.							
2.70 - 4.10	1.40	hbl.gn.	Samme hbl.gn. som før pegm.	45-50						
4.10 - 5.30	1.20	2 gl.gn.b.p.	Noe lys,mlk.Enkelte part. 2 gl.gn.b.d. Kv.rik.Spor hbl. Spredte gr. 1-2 mm.	45-50	0,00	0,03	0,08		6,39	4,10 - 5,30
5.30 - 5.65	0.35	2 gl.gn.b.p.	Noe lys,mlk. Tynne partier musk.gn. og 2 gl.gn.b.d. Impr. sl, py.		0.48	0.78	2.58		9.24	5.30-5.65
5.65 - 6.55	0.90	2 gl.gn.b.d.	Noe mørk,mlk.Partier med 2 gl.gn.alm. og biot.gn. spor hbl.Tildels sterkt impr. sl, py, noe gn, cp.		3.49	0,31	12.78		9.24	5.65-6.55
6.55 - 7.85	1.30	hbl.biot.gn.	Noe lys,mlk. Noe pegm. Impr. sl, py.	35-40	0,58	0,25	2.64		9.47	6.55-7.85
7.85 - 8.35	0.50	hbl.biot.gn.	Samme b.art som over. Rel. godt impr. sl, py.		1.97	0,49	6.87		12.32	7.85 - 8.35
8.35 - 9.25	0.90	biot.gn.	Noe mørk,mlk. Noe hbl. Spredte gr. 0.5-1 mm. Sv. impr. py.	60-65	0,03	0,24	0,16	-	9,00	8.35 - 9.25
9.25 - 11.20	1.95	hbl.gn.	Noe lys,mlk. Enkelte kv-str. Rel. jevnt besatt gr. 1-2 mm. Impr. py.	60-65						
11.20 - 14.90	3.70	amf.	Mørk,fk.-mlk. "Tett" Noe ujevnt besatt gr. 1-3mm	70-75						

27/1 1978
Kaare M. Hegrum
Kaare M. Hegrum

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: FORSERINGSORT
PROFIL 44.200

Borehull: 513

Dato : JAN. 78
Koordinater : X: 925.398,5 Y: 44.200,5
Retning : S
Helling/stigning: ÷62°
Høyde : ÷71.1 m
Lengde : 19.86 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.45	0.45	hbl.gn.	Noe lys,mlk. Endel biot. Impr. sl, py, gn.	30-35	2.76	0.71	1.43		6.75	
0.45 - 5.20	4.75	2 gl.gn.b.d.	Noe lys,mlk. En del kv. og pegm.str. Spredte spor hbl. Enkelte musk-rike partier. Tildels godt impr. sl,py, Noe gn.	55-60	2.00	0.35	3.76		8.78	0.45 - 1.50
					2.00	0.80	5.14	NB	9.45	1.50 - 3.00
					0.66	0.41	3.88	NB	8.55	3.00 - 4.00
					0.34	0.78	4.23	NB	10,13	4.00 - 5.20
5.20 - 5.90	0.70	biot.gn.	Noe lys,mlk.kv. rik spor hbl. Impr. sl, py, noe po, cp.		1.18	1.00	4.35	NB	9.90	
5.90 - 6.00	0.10	TAP								
6.00 - 6.75	0.75	biot.sk.	Mørk,grovk-mlk. Endel kv. Tynne partier biot.gn. Impr. py,spor sl.	60	0.03	0.40	4.38		9.90	
6.75 - 7.70	0.95	TAP								
7.70 - 8.10	0.40	biot.gn.	Noe mørk,mlk.Tenderer stedvis mot biot.sk.Endel kv. Noe hbl.Impr.sl,py, Noe cp.	60	0.77	1.26	5.05		15,98	
8.10 - 8.75	0.65	Biot.gn.	Noe lys,mlk.Endel kv.striper Noe hbl. Impr. sl,py,noe gn.		0.56	0.69	4.37		13.50	
8.75 - 9.00	0.25	TAP								
9.00 - 10.00	1.00	2 gl.gn.b.d.	Noe lys,mlk.Enkelte str. grovk. biot.Noe hbl.Impr.py	60	0.20	0.26	0.53	NB	5.40	
10.00 - 10.55	0.55	TAP								
10.55 - 13.00	2.45	biot.gn.	Noe mørk,mlk.Enkelte part. tenderer mot 2 gl.gn.b.d. Endel kv. og pegm.str. Endel hbl. Tildels god impr. sl, py, Noe po, cp.	60	0.89	1.45	4.66		11.93	10.55 - 12.00
					1.04	1.00	5.56		14.63	12.00 - 13.00
13.00 - 13.20	0.20	TAP								

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 513

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
13.20 - 14.40	1.20	Hbl.gn.	Noe lys,mlk.Noe kv.og pegm. Stedvis partier med 2 gl. gn.b.p. sv. impr. py.	60°	0.03	0.18	0.05	NB	3.29	
14.40 - 15.00	0.60	biot.gn.	Noe lys,mlk.Endel kv. Enkelte partier 2 gl.gn. b.p. Spredte gr.0.5-1 mm							
15.00 - 16.10	1.10	2 gl.gn.alm.	Noe lys,mlk.-grovk. Spor hbl. Spredte gr. 1-2 mm.	35-40						
16.10 - 16.75	0.65	biot.gn.	Noe lys,mlk.Endel kv. Litt hbl.Spredte gr. 0.5-1 mm.	35-40	0.06	0.05	0.07	NB	4.05	
16.75 - 17.40	0.65	biot.gn.	Samme b.art som over,uten gr. Impr. sl, py, po, cp.		0.43	0,06	1.54		10.80	
17.40 - 19.70	2.30	hbl.gn.	Noe mørk,mlk.Noe grovk. biot. Spredte gr. 1-2 mm.	45-50	0.03	0.11	0.09		4.84	17.40 - 18.50

27/1 1978
Kaare M. Hegrum
Kaare M. Hegrum

PRØVER MERKET NB I %S-RUBRIKKEN ER NOE USIKRE, DA PRØVE POSENE VAR GÅTT [illegible] I STYKKER VED ANKOMST TIL LABORATORIET. MEN KJERNENE ER LAGT TILBAKE I ANTATT RIKTIGE POSER

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: FORSERINGSORT
Profil 44.240

Borehull: 512

Side 1.

Dato : Jan. 78
Koordinater : X:925.399.2 Y:44.243.5
Retning : - 90°
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 70.8
Lengde : 86.48

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.20	0.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. impr. sl	90°	1.58	0.98	4.85		5.61	
0.20 - 0.95	0.75	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.filmtynne skikt med biot.spor py.	80°	0.03	0.06	0.24		7.09	
0.95 - 1.30	0.35	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik. impr. sl, gn.po.py.	90°	6.39	0.57	1.41		7.57	
1.30 - 1.65	0.35	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.spor hbl. svak impr. Py.	80°	0.03	0.11	0.03		3.13	
1.65 - 2.20	0.55	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.spor hbl.impr.py	70°	0.17	0.15	0.16		10.43	
2.20 - 3.30	1.10	Pegm.								
3.30 - 4.30	1.00	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk.diffuse gr. 0.5-1.5 mm. Svak impr. Py,spor Po	70° 80°						
4.30 - 4.80	0.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.mm tykke biot.-band. spor hbl. svak impr. py, spor po.	80°						
4.80 - 5.10	0.30	Pegm.								
5.10 - 5.70	0.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys.spor gr. 0.5-1.0 mm svak impr. py.	80°						
5.70 - 6.00	0.30	Pegm.								
6.00 - 7.00	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,grov-mlk. hbl.før. tildels kv.rik.diffuse spor gr. 0.5-1.0 mm. Ved 6.70-6.75 spor sl. Imp. py.	70° 90°	0.22	0.08	0.48		7.57	
7.00 - 7.30	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.-grovk. biot.rik imp. Py.	70°	0.01	0.11	0.08		9.26	
7.30 - 7.75	0.45	skarn	Mørk,mlk.		0.01	0.03	0.01		3.00	
7.75 - 8.00	0.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. spor hbl. svak imp. py.	70° 80°	0.00	0.02	0.00		5.35	
8.00 - 8.90	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys mlk.-grovk. svakt hbl.før.spor gr.0.5-1.0mm. svak imp. py	80°	0.04	0.05	0.32		7.34	

RANA BLADE TRYKKERI

...alitet:

Borehull: 512

side 2

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
8.90 - 9.45	0.55	hbl.gn.	mørk,grovk. impr.sl,cp,py	80°	0.17	2.53	3.14		14.22	
9.45 - 10.15	0.70	biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. spor hbl. Imp. sl,cp,po,py.	70° 80°	0.16	1.11	2.69		19.57	
10.15 - 10.40	0.25	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk-fink. med cm-tykke band av hbl. svak imp. py spor sl.	80°	0.02	0.22	0.02		3.13	
10.40 - 11.05	0.65	biot.gn.	Mørk,grovk-mlk. hbl.førende noen kv.slirer. impr. sl,cp Py, po.	80°	0.40	0.74	6.90		22.70	
11.05 - 11.70	0.65	2 gl.gn.b.d.	Rel. mørk,mlk. med mm.tykk skikt biot. og hbl. spor gr. 0.5-1.0 mm. impr. py	80°	0.09	0.18	0.35		8.09	
11.70 - 13.00	1.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende. cm tykke band med hbl. gn. kv.rikere partier. spr. gr. 1-3 mm. svak impr. py.	70° 80°	0.44	0.14	0.75		6.65	
13.00 - 15.35	2.35	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk.spor hbl. tildels kv. rik. imp. lys sl, py	70° 80°	0.59	0.46	2.37		7.43	
15.35 - 17.75	2.40	2 gl.gn.b.d.	Rel. lys,mlk. hbl.førende dm.tukke kv.rike partier. Spredte gr. tildels gr-før. 1-3 mm. ved 16.00 - 16.10 amf. Svak imp. Py spor sl.	80°	0.25	0.09	0.51		5.48	
17.75 - 20.25	2.50	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik. spor gr. 1-2 mm. spredte spor hbl. cm-tykk band pegm.	80° 90°	0.07	0.02	0.27		3.13	17.75-19.50
20.25 - 20.90	0.65	hbl.gn.	Rel.mørk,grov-mlk. gr.førende tildels gr.rik.1-10 mm.spor py	80°						

RANA BLADS TRYKKERI

Kvalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 512

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
20.90 - 24.45	3.55	2 gl.gn.b.d.	Rel. lys,mlk. vekslende med dm.tykke band hbl.gn. spr. gr. tildels gr.førende 1-3 mm fortrinnsvis i hbl.gn. svak impr. py.	80° 90°						
24.45 - 25.95	1.50	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk.rel.kv.rik.spor hbl. spr. gr. 1-2 mm. svak imp. Py.	80° 90						
25.95 - 26.75	0.80	Peg.								
26.75 - 28.65	1.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. spor hbl. 27.45 - 27.55 amf. band. spr. gr. 1-3 mm.	80° 90°						
28.65 - 29.15	0.50	Peg.								
29.15 - 30.45	1.30	Hbl.gn.	Rel.lys,fink.gr. tildels gr. før. rel.mass. cm.tykke peg.band. spor py.	80° 90°						
30.45 - 30.70	0.25	Peg.								
30.70 - 31.05	0.35	hbl.gn.	Rel.lys,fink.kv.rik.mass. Spr. diffuse gr. 0.5-1.0 mm	80°						
31.05 - 31.35	0.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.hbl.førende. spor gr. 1-2 mm.	80°						
31.35 - 32.05	0.70	Peg.								
32.05 - 33.60	1.55	hbl.biot.gn.	Rel.mørk,mlk. vekslende cm-tykke band peg. spr.gr.1-3mm	80° 90°						
33.60 - 34.20	0.60	2 gl.gn.b.p.	Lys,fink.mass.kv.rik. spor gr. 1-2 mm.	90°						
34.20 - 34.70	0.50	Peg.								
34.70 - 36.20	1.50	2 gl.gn.b.p.	Lys,fink.mass.kv.rik spor gr. 0.5 - 2 mm.	90°						
36.20 - 36.80	0.60	hbl.gn.	mørk,mlk. gr.førende	80o						

FANA BLADS TRYKKERI

...alitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 512

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
36.80 - 37.70	0.90	amf.	mørk, mlk. mass.	90°						
37.70 - 38.20	0.50	hbl.gn.	Mørk,mlk.amf.preg.	85°						
38.20 - 38.35	0.15	Peg.								
38.35 - 38.85	0.50	hbl.gn.	mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm	90						
38.85 - 39.20	0.35	Peg.								
39.20 - 43.50	4.20	Hbl.gn.	Mørk,mlk-fink. enkelte cm-tykke band med peg. gr.før. tildels rik. 1-4 mm.	80° 90°						
43.50 - 44.55	1.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,fink.-mlk. tildels kv.rik gr.førende 1-3 mm.	90°						
44.55 - 44.80	0.25	kv.	vit. (Mjølk, kv.)							
44.80 - 47.50	2.75	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,fink. rel.mass. kv. rik. gr.førende 1-3 mm tildels gr.rik.	80° 90°						
47.50 - 47.90	0.40	hbl.gn.	rel.mørk.mlk. gr.rik.1-3 mm.	90°						
47.90 - 48.60	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.-fink. tildels kv.rik. gr.førende.1-3 mm.	80° 90°						
48.60 - 57.90	9.30	hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. vekslende med smale peg.band.og amf. opp til cm-tykke. Gr.førende tildels rik 1-3 mm.	80° 90°						
57.90 - 58.25	0.35	2 gl.gn.b.p.	Lys,fink.kv.rik. opplitisk. gr.rik. mass. 0.5-1.0 mm.	90°						
58.25 - 61.70	3.55	hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. jevnt bandet med cm-tykke lysere band. kv.peg.gr.førende tildels rik. 1-3 mm.	80° 90°						

RANA BLADS TRYKKERI

Kvalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 512

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
61.70 - 61.90	0.20	kv.								
61.90 - 67.10	5.20	hbl.gn.	Mørk,mlk-fink. meget veks-lende med diffuse overganger mellom biot.hbl.gn. Hbl.gn. med amf.preg. samtidig gjennom-krysset av opp til cm-tykke slirer og band av peg. gr.-førende,tildels rik.0.5-2 mm	70° 90°						
67.10 - 68.05	0.95	hbl.biot.gn.	Mørk,fink. mass. gr.førende 0.5 mm.							
68.05 - 68.40	0.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,fink.mass.preg. opp til cm-tykke peg.slirer.. gr.førende 0.5 - 1.0 mm.	70° 80°						
68.40 - 73.20	4.80	hbl.gn.	mørk,fink-mlk-grov.vekslende med små partier av fink. hbl. biot.gn. cm-tykke bånd med peg. gr.før. tildels gr.rik. 1-3 mm.	70° 90°						
73.20 - 73.75	0.50	Peg.								
73.75 - 75.00	1.25	hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.rik. 1-3 mm.	90°						
75.00 - 75.20	0.20	Peg.								
75.20 - 78.90	4.40	hbl.gn.	Mørk,mlk. med smale kv.rikere partier.fra 77.15-77.20 peg. gr.førende 1-3 mm.	70° 90°						
78.90 - 79.10	0.20	Peg.								
79.10 - 79.60	0.50	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk-fink. kv.rik.gr.før. 0.5 - 1.0 mm.	90°						
79.60 - 81.50		hbl..gn.	mørk,mlk.med smale 0.5 cm tykke peg.band. spr. gr. 1-3 mm.	80° 90°						

KANA BLADS TRYKKERI

Kvalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning :
Høyde :
Lengde :

Borehull: 512

side 6

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
81.50 - 81.75	0.25	Pegm.							
81.75 - 86.40	4.65	hbl.gn. Mørk, mlk. bandet med opp til 0.5 cm-tykke lysere tildels filmtynne kv.peg.band. Spr. gr. tildels gr.førende.1-3mm.	80° 90°						

10/2 1978

Stellan Burman

BAHA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: FORSLRINGSORT
PROFIL 44.200

Borehull: 511

Dato : JAN. 78
Koordinater : Ø: 925.404.4 Ø: 44.197.8
Retning : N
Helling/stigning: ÷ 62°
Høyde : ÷ 70.8 m
Lengde : 25.94 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 3.50	3.50	hbl.gn.	Noe lys,mlk.Enkelte partier ekstra kv.rike. Litt pegm. Noen biot.rike partier. Godt impr. sl,py,gn,noe cp.	60	1.65	0.74	8.78		9.00	0.00-1.00
					2.48	0.21	8.86		7.93	1.00-2.00
					0.92	0.84	5.94		11.36	2.00-3.50
3.50 - 4.30	0.80	Pegm.	Hvit, grovk.		0.11	0.08	0.82		1.48	
4.30 - 5.70	1.40	hbl.gn.	Noe mørk,mlk.Litt pegm. Noe skarn. Rel. jevnt besatt gr. 2-4 mm. Sv. impr. py	70°	0.00	0.04	0.07		6.00	
5.70 - 6.05	0.35	biot.sk.	Mørk,grovk. Spor gr.Noe kv.	60-65						
6.05 - 7.20	1.15	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk.-fk. kv-rik	45-50						
7.20 - 8.70	1.50	biot.sk.	Mørk,grovk.-mlk. Endel kv. iblandet. Spor hbl. Sv.impr. py.	50-55						
8.70 - 9.00	0.30	TAP								
9.00 - 9.75	0.75	Hbl.biot.gn.	Noe mørk,mlk.Noe kv.Spredte gr. 1-2 mm. Flekk sl,py, på 9.13 - 9.15	30-35						
9.75 - 10.05	0.30	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fk.Kv.rik.Noen biot-rike partier	40-45						
10.05 - 11.00	0.95	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk.Enkelte biot.str. Noe kv. spor py.	55-60	0.06	0.25	0.16		4.93	
11.00 - 11.50	0.50	biot.sk.	Mørk,grovk.Endel kv.ibl. impr. py. Sv. impr. sl.		1.51	0.28	1.79		11.79	
11.50 - 11.80	0.30	hbl.gn.	Noe mørk,mlk.Endel kv. Impr. sl, py.		1.46	0.40	3.58		10.07	
11.80 - 12.35	0.55	2 gl.gn.b.d.	Noe mørk,mlk. Litt kv. Sv. impr. sl, py.		0.47	0.31	1.25		9.00	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 511

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
12.35 - 13.05	0.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-grovk.Spor hbl. Sv. impr. py.	40-45	0.24	0.17	0.82		5.14	
13.05 - 16.00	2.95	biot.sk.	Mørk,grovk.-mlk.Endel kv. iblandet.Endel grovk.hbl. Delvis godt impr. sl, py po. Noe cp.	40-45	0.25	1.66	2.56		18.43	13.05 - 14.00
					0.20	0.99	1.48		15.86	14.00 - 16.00
16.00 - 16.40	0.40	TAP								
16.40 - 16.55	0.15	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. Noe kv.		0.15	0.18	0.41		5.14	
16.55 - 19.20	2.65	hbl.gn.	Mørk,mlk.Noe vekslende ford. av biot og hbl. Delvis noe grovk.biot. Endel kv. Delvis godt impr. sl, py, po. Noe cp.	55-60	0.52	0.86	6.08		12.86	16.55 - 18.00
					0.27	0.74	1.82		11.36	
19.20 - 20.10	0.90	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. Noe kv.Stedvis noe hbl.Impr. sl, py	55-60	1.64	0.19	3.15		5.79	
20.10 - 22.05	1.95	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.Litt pegm. og kv. Enkelte biot.rike striper	60-65	0.23	0.05	0.37		1.71	20.10 - 22.00
22.05 - 24.60	2.55	hbl.biot.gn.	Noe mørk,mlk. Endel kv.og pegm. Enkelte hbl.rike og biot-rike partier.Spredte gr. 1-2 mm. Sv. impr. py.	30 35						
24.60 - 24.90	0.30	Pegm.	Hvit grovk.							
24.90 - 25.90	1.00	Biot.gn.	Lys,mlk-fk. kv-rik.Spor gr. 0.5-1 mm.	60						

25.1. 1978

Kaare M. Hegrum

Kaare M. Hegrum

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: FORSERINGSORT
PROFIL 44.200

Borehull: 510

Dato : JAN. 78
Koordinater : X: 925.404,3 Y: 44.198,2
Retning : N
Helling/stigning: + 83°
Høyde : ÷ 68,3 m
Lengde : 10.34 m

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.15	0.15	Pegm.	Hvit grovk.							
0.15 - 1.20	1.05	Hbl.biot.gn.	Noe mørk,mlk. Enkelte større flekker hbl. Spor gr. 0.5-1mm Impr. py.	60-65						
1.20 - 1.55	0.35	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.Tenderer mot musk.gn. Noe grovk. hbl. Spor gr. 1-2 mm. Tynn stripe sl,py, på 1.52 - 1.54	60-65						
1.55 - 3.40	1.85	Biot.gn.	Noe mørk,mlk.Spredte spor hbl.Enkelte pegm.striper. Spor gr. 1-2 mm.Impr. py. Stedvis D.	60-65	0.09	0,29	0.21		8,42	
3.40 - 3.80	0.40	hbl.gn.	Noe mørk,mlk-grovk. Noe kv. og pegm. Sv. impr. sl,py.		0.50	0.17	1.23		4.91	
3.80 - 4.30	0.50	biot.gn.	Noe mørk,mlk. Enkelte lyse partier.2 gl.gn.alm.Litt hbl.	75-80	0.02	0.32	0.11		6.08	
4.30 - 4.55	0.25	Pegm.	Hvit, grovk.							
4.55 - 4.90	0.35	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.Noe hbl.mot slutten Impr. py, noe sl.		1.08	0.15	3.25		7.71	
4.90 - 5.20	0.30	biot.gn.	Noe lys,mlk-fk. Kv-rik.Noe hbl. Impr. sl,py,cp.	75-80	1.33	1.22	7.81		13.09	
5.20 - 6.25	1.05	hbl.gn.	Noe lys,mlk.kv.rik.Enkelte biot.rike partier.Impr. sl, py, noe cp.		2.05	0.63	5.82		9.35	
6.25 - 6.55	0.30	malm	Noe mass. sl-malm med gn,cp kv. og hbl. iblandet.		9.03	0.26	12.38		7.71	
6.55 - 6.75	0.20	hbl.gn.	Noe mørk,mlk.-grovk. Noe grovk. biot. og hbl. Impr. sl, po, cp.		1.02	2.11	2.85		10.52	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 510

Dato :
Koordinater
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
2. Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
6.75 - 7.45	0.70	biot.gn.	Noe mørk,mlk. Sv.spor hbl. Impr. py, spor sl. Noe kv.	60-65	0.29	0.22	1.53		6.86	
7.45 - 7.70	0.25	malm	Rel. mass. sl-malm.Endel grovk. biot. og hbl. ibl.		2.43	0.37	12.01		11.57	
7.80 - 8.00	0.30	biot.gn.	Noe mørk,mlk.Noe kv. spor hbl. Impr. py.		0.11	0.26	0.43		7.50	
8.00 - 9.20	1.20	hbl.gn.	Noe lys,mlk.Enkelte biot-rike partier.Noe kv. Impr. py.	60-65						
9.20 - 10.00	0.80	amf.	Mørk,mlk.Enkelte biot.rike partier.Noe kv.Rel. jevnt besatt gr. 2-4 mm.De største stichtolitisk preget.Impr.py							
10.00 - 10.35	0.35	hbl.gn.	Noe mørk,mlk.Noe kv.Rel. jevnt besatt gr. 1-2 mm. Impr. py.							

25.1. 1978
Kaare M. Hegrum
Kaare M. Hegrum

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: FORSERINGSORT
PROFIL 44.170

Borehull: 509

Dato : JAN. 1978
Koordinater : X: 925.396,3 Y: 44.171,2
Retning : S
Helling/stigning: ÷63°
Høyde : ÷711 m
Lengde : 21.38 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.50	1.50	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.Enkelte biot-rike partier.Noe pegm. Spor hbl. Tildels godt impr. sl(lys type). Py, noe cp,gn.	35°	2.29	0.30	5.39		9.82	
1.50 - 4.60	3.10	biot.gn.	Noe mørk,mlk-grovk. En god del kv.striper.Stedvis noe hbl. Tildels godt impr. sl, py, noe po, cp.	40°	0.48	0.46	2.70		14.73	1.50 - 3.00
					1.22	0.80	3.56		15.43	3.00 - 4.60
4.60 - 5.90	1.30	hbl.gn.	Lys,mlk-fk. kv-rik.Noen biot.str. Godt impr. sl (lys type). Py.	40-45	0.65	0.16	5.06		11.69	
5.90 - 6.60	0.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. Enkelte biot-rike partier.	60°	0.12	0.06	0.40		2.34	
6.60 - 7.20	0.60	hbl.gn.	Lys,mlk.-fk. kv.rik Impr. lys,sl, py.		0.12	0.13	4.17		9.35	
7.20 - 7.80	0.60	hbl.gn.	lys,mlk.-fk. Endel pegm. Enkelte biot.str. Impr. sl, py.		0.62	0.48	3.59		7.01	
7.80 - 9.90	2.10	hbl.gn.	mørk,mlk-grovk.biot. og hbl. Endel kv. Godt impr. Mørk sl, py.po, Noe cp.	60°	0.69	0.57	7.36		13.32	
9.90 - 11.20	1.30	hbl-biot.gn.	Noe mørk,mlk-grovk. Endel grovk.biot. og hbl. Enkelte kv-striper.Spredte gr. 1-2 mm. Impr. py.	30-35	0.18	0.16	0.77		5.84	
11.20 - 13.30	2.10	hbl.gn.	Noe mørk,mlk-grovk. Endel grovk.biot og hbl. Noe kv. striper. Sv. impr. sl, py	40-45	0.52	0.63	2.11		9.12	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull:

Dato :
Koordinater
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
13.30 - 14.50	1.20	hbl.gn.	Noe mørk,mlk-grovk. Noe grovk. biot. og hbl. Rel. jvent besatt gr. 1-2 mm. spor py.	55-60	0.07	0.11	0.38		6.31	
14.50 - 15.00	0.50	TAP								
15.00 - 15.55	0.55	hbl.gn.	Noe mørk,mlk. Samme som før tap.		0.02	0.14	0.21		6.08	
15.55 - 16.00	0.45	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. Tenderer mot musk. gn. Impr. Sl, py.	60-65	1.51	0.15	3.92		6.78	
16.00 - 16.85	0.85	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.-grovk. Spor sl,py.	40-45	0.24	0.18	1.04		3.51	
16.85 - 17.25	0.40	malm	Rel.mass.Sl-malm med str. av 2 gl.gn.alm. og pegm.		2.38	0.10	11.46		10.99	
17.25 - 21.35	4.10	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. Enkelte tynne striper biot.gn. Enkelte pegm.-striper.	55-60	0.05	0.03	3.06 x		2.81	17.25-18.50

25/1 1978
Kaare M. Hegrum

Kaare M. Hegrum

x HER MÅ LITT AV DET FORUTGÅENDE HA KOMMET MED

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: FORSERINGSORT
PROFIL 44.170

Borehull: 508

Dato : Des. 77
Koordinater : X:925.401.8 Y:44.170.2
Retning : N
Helling/stigning: - 54°
Høyde : - 71.3 m
Lengde : 19.86 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk. Stedvis biot-rike partier. Flekker av hbl. Impr. py. Godt impr. sl helt først.	45°	1.31	0.35	4.13		8.75	
0.50 - 1.00	0.50	Pegm.	Hvit,grovk-mlk. Stedvis noe biot.		0.19	0.13	0.52		4.37	
1.00 - 2.50	1.50	biot.gn.	Mørk,mlk.-grovk. Stedvis gått over til biot.sk. Endel kv. Spor hbl. Stedvis svake spor sl, py.	45	0.02	0.17	0.44		8.58	
2.50 - 3.00	0.50	TAP								
3.00 - 3.25	0.25	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk. Noen biot.rike str.	25-30	0.06	0.06	0.49		4.54	
3.25 - 3.55	0.30	biot.gn.	mørk,grovk.-mlk. Tenderer noe mot biot.sk.Endel kv. Impr. sl, py.		0.08	0.38	1.10		10.60	
3.55 - 3.85	0.30	TAP								
3.85 - 4.55	0.70	biot.gn.	Mørk,mlk-grovk.Endel hbl. Noe kv. Spor sl, py.		0.04	0.23	0.54		9.42	
4.55 - 5.50	0.95	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk.Enkelte musk.rike soner.Stedvis hbl.Noe impr. py. Sv. spor sl.	35-40	0.52	0.24	0.84		6.73	
5.50 - 7.20	1.70	2 gl.gn.b.d.	lys,mlk.Kvartsittisk.Endel hbl. sv. impr. sl,py.	20-25						
7.20 - 7.65	0.45	biot.gn.	Noe mørk,mlk.-grovk. Tenderes noe mot biot.sk. Endel kv. Impr. sl,py,po.		0.95	0.57	2.63		13.96	
7.65 - 8.70	1.05	hbl.gn.	Lys,mlk. Endel biot.Noe kv. Impr. sl, py.	30	1.28	0.18	3.63		8.58	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 508

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
8.70 - 9.00	0.30	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk.-grovk. sv. impr. py, spor sl.		0.33	0.19	0.79		6.73	
9.00 - 9.25	0.25	TAP								
9.25 - 9.70	0.45	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk-grovk. Endel biot. Noe kv. Noe hbl. mot slutten sv. impr. sl, py.	45						
9.70 - 10.45	0.75	malm	Rel. komp. sl malm med py cp, po. Svært mye grovk. biot og hbl. iblandet.		0.05	1.56	5.73		27.42	
10.45 - 14.00	3.55	hbl.biot.gn.	Noe mørk,mlk. Stedvis partier grovk. biot. Også grovk. hbl. Endel kv-str. Impr. sl, py, gn, po.	30-35	0.53	0.63	3.18		10.93	10.45 - 12.00
					0.54	0.52	4.53		9.85	12.00 - 14.00
14.00 - 15.85	1.85	2 gl.gn.b.p.	Noe lys,mlk.Endel kv. Noe biot. Impr. sl, py.	60	0.42	0.37	3.45		6.43	
15.85 - 16.30	0.45	2 gl.gn.b.p.	Noe lys, mlk. Spor sl, cp.		0.34	0.16	1.37		3.86	
15.30 - 17.30	1.00	2 gl.gn.b.p.	Noe lys,mlk. Enkelte biotrike partier. Spor gr.1-2mm	55-60	0.04	0.06	0.13		2.96	
17.30 - 19.75	2.45	hbl.gn.	Mørk,mlk. Stedvis amf.-partier. Også flekker av skarn. Noe ujevnt besatt gr. 1-2 mm. Impr. py.							

18/1 1978
Kaare H. Hegrum

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: FORSERINGSORT
PROFIL 44.170

Borehull: 507

Dato : Des. 77
Koordinater : X:925.401.8 Y:44.170.1
Retning : N
Helling/stigning: + 78°
Høyde : - 69 m
Lengde : 14.83 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 2.40	2.40	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk. Enkelte tynne partier musk.gn. Flekker hbl. Impr. sl, py.	60	1.26	0.34	3.76		6.22	
2.40 - 2.65	0.25	TAP								
2.65 - 3.40	0.75	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk. flekker hbl. Enkelte biot-rike striper. Impr. sl, py.		1.01	0.32	2.74		5.38	
3.40 - 4.25	0.85	biot.gn.	Nor mørk,mlk. Enkelte kv.-striper. Spor hbl. Sv.impr. sl, noe py.	45	0.34	0.52	0.55		10.09	
4.25 - 5.25	1.00	kvartsittisk gn.	Lys,fk-mlk. stedvis bånd av 2 gl.gn.b.p. Noe hbl. Impr. sl, gn.		1.56	0.25	4.76		9.59	
5.25 - 5.40	0.15	TAP								
5.40 - 6.00	0.60	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. Noe kv. Enkelte biot.pregede soner, spor hbl.	75-80	0.26	0.28	0.43		5.21	
6.00 - 8.80	2.80	hbl.gn.	mørk,mlk. Meget godt impr. sl, py. Endel massive str. sl. Enkelte biot.str. også gn, po.		1.82	0.61	8.63		11.77	6.00 - 7.50
					3.18	0.74	9.73		11.77	7.50 - 8.80
8.80 - 15.00	6.20	hbl.gn.	Noe mørk,mlk. Noe mere biot-rik helt til å begynne med. Jevnt besatt gr.1-2mm Impr. py.	60	0.09	0.15	0.29		9.08	8.80 - 10.00

18.1. 1978
Kaare M. Hegrum
Kaare M. Hegrum

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.150

Borehull: 506

1.

Dato : Des. 77
Koordinater : X: 925.392.3 Y:44.155.7
Retning : S
Helling/stigning: - 60°
Høyde : - 71.4 m
Lengde : 11.62 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.40	0.40	Biot.gn.	Mørk,mlk. endel kv. Impr. sl, py, cp.		1.17	1.12	6.71		11.09	
0.40 - 1.00	0.60	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. Endel biot. i striper. Noe kv. Impr. sl, py.	40-45	1.10	0.10	2.39		9.00	
1.00 - 2.00	1.00	hbl.gn.	Noe mørk,mlk. Endel kv.-striper. Mye hbl. som større, rene partier. Godt impr. sl, py.	45	1.64	0.72	6.55		13.60	
2.00 - 2.55	0.55	biot.gn.	Noe lys, mlk. Spor hbl. Noe kv.-striper. Av. impr. py	30	0.11	0.26	0.24		9.21	
2.55 - 2.85	0.30	biot.str.	Mørk, grovk. Noe kv. Spor hbl. Impr. py, sl.	30	0.02	1.42	1.06		18,42	
2.85 - 3.75	0.90	hbl.-biot.gn.	Noe mørk,mlk. hbl. Noe uregelmessig. Endel kv. Impr. sl, py.	30	0.57	0.82	4.07		12,14	
3.75 - 4.00	0.25	TAP								
4.00 - 5.15	1.15	biot.gn.	Noe mørk,mlk. Spor hbl. Flere kv.striper. Impr. sl, py.	35-40	0.70	0.64	2.48		9.42	
5.15 - 6.30	1.15	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. Endel rene biot-striper. Noe kv. Impr. sl, py, cp.	45	0.47	0.29	1.32		2,93	
6.30 - 7.35	1.05	2 gl.gn.b.d.	Noe mørk,mlk. Noen tynne partier 2 gl.gn.alm. Endel kv.striper. Impr. sl, py.	45-50	1.34	0.38	2.94		7,33	
7.35 - 8.00	0.65	TAP								

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.150

Borehull: 506

2.

Dato : Des. 77
Koordinater : X: 925.392.3 Y:44.155.7
Retning : S
Helling/stigning: - 60°
Høyde : - 71.4 m
Lengde : 11.62 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
8.00 - 9.15	1.15	biot.gn.	Noe mørk,mlk. Stedvis noe hbl. Noen kv.striper. Impr. sl, py.	60	0.98	0.37	3.68		10.67	
9.15 - 11.75	2.60	Hbl.gn.	Mørk, mlk-grovk. Endel grovk. biot. Noen kv.-striper. Rel. tett besatt gr. 1-2 mm. Spor py.		0.10	0.10	0.52		6.07	9.15-10.00

5.1. 1978
K.M. Hegrum
K M Hegrum

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44150

Borehull: 505

Dato : Des. 77
Koordinater : X: 925.396,6 Y: 44.152,7
Retning : N
Helling/stigning: -48
Høyde : - 71,2m
Lengde : 21,38m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0,00 - 0,30	0,30	2gl.gn.b.d	lys,mlk.kv. rik impr. sl,cp, gn.py		1.02	0.52	2.48		6.96	
0,30 - 1,80	1,50	biot.sl	mørk grovk. biot.Endel kv. og kv.linser.Stedvis hbl.Godt impr sl, py, po, noe cp	30	1.06	0,71	3.42		15.79	
1,80 - 2,35	0,55	biot.gn	noe lys,mlk-fk.Stedvis striper grovk. biot.Flekker av hbl. Godt impr. py,po,sl,cp		0.24	0.86	1.60		17,66	
2,35 - 2,75	0,40	biot.sk	mørk,grovk.Noe kv. flekker hbl.Godt impr. py,sl	30	0.78	0.24	5.12		21,06	
2,75 - 3,00	0,25	Tap								
3,00 - 4,25	1,25	biot.sk	Samme biot.sk.som over.også cp,gn	40-45	1.06	0.20	7.69		27,68	
4,25 - 5,35	1,10	biot.gn	noe lys,mlk.kv.rik.Endel hbl Enkelte pegm-striper.Meget godt impr sl,py.Også gn		1.98	0.55	7,11		13,25	
5,35 - 7,50	2,15	biot.gn	noe lys,mlk.Vekslende innhold av kv. og pegm.Noen få striper grovk. biot.Impr.sl,py.Noe gn	45	0.57	0,17	3.30		6.45	
7,50 - 8, 15	0,65	biot.sk	mørk.grovk.Noe kv.iblandet spor hbl.Impr. py,po,sl,cp	45	0.69	0.37	4.10		18.85	
8,15 - 13,35	5,20	biot.gn (hbl.-biot.gn)	Noe lys,mlk.Endel kv. iblandet. Enkelte striper grovk. biot. rel. jevnt fordelt hbl.rel. jevnt impr. sl,py,po.Noe gn,cp	60-65	0.30	1.01	4.03		15.11	8,15-9,50
					0.15	0.77	2.42		18.34	9,50-10,50
					0.30	0.71	3.13		17,32	10,50-11,50
					0.57	0.45	2.77		13.58	11,50-12,50
					1.08	0.48	3.11		6.45	12,50-13,35

....2

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 505

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
13,35 - 13,80	0,45	Tap								
13,80 - 15,85	2,05	hbl-biot.gn	Noe lys,mlk.Flekker av muss. hbl.Biot rike striper Kv.rik.		0.82	0.64	5.75		8.49	13,80-15,00
			Noen pegm-striper.Godt impr. sl,py,Noe cp,gn	45	0.41	0.71	7.70		12.40	15,00-15,85
15,85 - 16,50	0,65	biot.gn	Noe lys,mlk.Endel kv.Stedvis muss-rike partier.Impr.sl,py po,gn		0.88	0.18	2.19		6.11	
16,50 - 16,75	0,25	Tap								
16,75 - 17,40	0,65	2gl.gn.b.p	Noe lys,mlk.Enkelte biot.rike partier.Noe pegm	55-60	0.55	0.07	0.18		4.42	16,75-18,00
17,40 - 17,50	0,10	pegm	hvit,grovk.Litt biot.Litt sprekkefulling av gn og po							
17,50 - 18,85	1,35	hbl.b.a	grønn,mlk-fk.Består stort sett bare av hbl.Litt biot. Rel.mye gulgrønn skarn.Sv. impr. py	45						
18,85 - 20,20	1,35	hbl.gn	Noe mørk,mlk.Noe vekslende biot.innhold.Endel kv.Spor gr. 1-2mm.Impr.py	45						
20,20 - 21,35	1,15	2gl.gn.b.p	Noe lys.mlk.Vekslende biot. fordeling.Ebdel kv.	40-45						

21/12-77
K.M.Hegrum
K.M. Hegrum

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forserings-ort
Profil Y: 44350

Borehull: 504

Side 1

Dato : Des 77.
Koordinater : X: 925.424.9 Y: 44.346.1
Retning : 270°
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 66.3
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 1.35	1.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk med lysere part. Mlk. smale hbl.band. Spr. gr. 1-4 mm. Svak impr. Py	60° 70°						
1.35 - 4.30	2.95	Peg.								
4.30 - 5.70	1.40	biot.gn.	Mørk,med lysere band.mlk-grovk. jevnt båndet med cm-tykke band med peg. hbl.biot.spr.gr. företrädesvis i dom mørkare partierna 1-3 mm. svag impr. py, po	80°						
5.70 - 6.95	1.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk med lysere band. mlk. tildels med hbl-rikere part. Spor gr. 1-2 mm. ved 6.05-6.35 svake spor sl, impr. py.	70° 80°						
6.95 - 7.40	0.45	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.kv.rik.spor gr.1-2mm	70°						
7.40 - 9.00	1.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.svake spor hbl. spor gr. 1-3 mm. spor Py	80°						
9.00 - 10.10	1.10	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.kv.rik ved 9.90-9.95 spor hbl.gr.0.5-1 mm.sv.impr Py.	80°						
10.10 - 12.80	2.70	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk.rel.biot.rik på visse partier.Spor og tildels hbl.førende ved 11.50-11.60 biot.skiffer.Spr.gr. 1-3mm. fra 12.35-12.45 stichtolitisk svak impr. py.	80°						
12.80 - 13.60	0.80	Biot.gn.	Rel.mørk,mlk-grovk.spor hbl. ved 13.00-13.05.Spr.gr. 1-2mm svak impr. py.	70° 80°	0.05	0.12	0.33		7.14	

KAHA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Hoyde :
Lengde :

Borehull: 504

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
13.60 - 14.15	0.55	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.ved 13.95-14.00 biot.rikere partier.Spor hbl.svak impr. sl, py	70° 80°	0.07	0.11	0.59		5.05	
14.15 - 14.80	0.65	Biot.gn.	Mørk,grov-mlk. skifrig preg spor hbl.impr. sl, py	70° 80°	0.40	0.18	2.78		14.86	
14.80 - 16.40	1.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.biot-rikere part. svake spor hbl. impr.sl,py	70° 80°	0.49	0.24	2.35		9.14	
16.40 - 17.40	1.00	Biot.gn.	Rel.mørk m/lyse band,mlk-grovk.hbl.førende.skifrig preg.Impr. sl,py,po.	70°	0.86	0.38	0.82		10.91	
17.40 - 17.65	0.25	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.svak impr.py.	70°	0.03	0.10	0.18		3.55	
17.65 - 18.75	1.10	2 gl.gn.b.d.	Mørk,m/lyse parti mlk-grovk. bandet m/biot.rik s.gl.gn. alm. pegm. dm.brede. 18.00 -18.10 hbl.Imp. sl,cp py, po.	70° 75°	0.40	0.52	2.42		6.59	
18.75 - 19.10	0.35	2 gl.gn.b.d.	Lys,rel.kv.rik,spor sl,py	60-70°	0.26	0.22	0.69		6.14	
19.10 - 19.80	0.70	Pegm.	Lys,mlk.kv.sittisk preg. 19.45-19.55.2 gl.gn.alm. kv.rik spor sl.		0.12	0.09	0.23		2.86	
19.80 - 20.55	0.75	2 gl.gn.b.p.	Rel.lys,mlk.cm.brede pegm. band,spor hbl.sl,cp.py.	70° 80°	0.22	0.13	1.56		3.68	
20.55 - 20.95	0.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.hbl.førende. impr.sl,cp.py.	75°	1.33	0.96	2.91		11.05	
20.95 - 24.15	3.20	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk-fink.rel.kv.rik, diffuse svake spor gr. 0.5 - 2 mm.	80°	0.07	0.05	0.28		2.86	2095-2220

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 504

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
24.15 - 26.70	2.55	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.hbl.førende 26.05 - 26.15. Amf.band 25.50 - 25.60-25.70-25.75 pegm.spredte gr.1-4 mm. svak impr. py.	80° 90°						
26.70 - 27.35	0.65	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.spor hbl. gr. 1-3 mm. svak impr. py	80°						
27.35 - 27.65	0.30	Pegm.								
27.65 - 28.35	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.kv-rik 27.75-27.90 biot.rikere. 27.90-28.00 pegm.band.Svak impr.py	80°						
28.35 - 29.15	0.80	Pegm.								
29.15 - 30.90	1.75	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk-fink.sv.impr.py	80°						
30.90 - 34.10	3.20	hbl.gn.	Rel.mørk,mlk.spr.band pegm. biot.rik gr.1-3mm.førende svak impr. py.	80°						
34.10 - 36.00	1.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.band spor hbl. spr. gr. 1-4 mm.impr. py.	80°						
36.00 - 40.40	4.40	hbl.gn.	Rel.mørk,mlk.spr. band pegm, biot.rik spr. gr.1-5 mm.	80°						
40.40 - 43.90	3.50	2 gl.gn.b.p.	Rel.lys,mlk.spr. biot.rik band fra 2-4 cm. brede. Pertier m/spr. gr.0.5-3 mm	80°						
43.90 - 45.50	1.60	hbl.gn.	Rel.mørk,mlk.spr.band pegm. gr.førende 1-5 mm.	80°						
45.50 - 48.40	2.90	amf.	Mørk,fink.-mlk.noen få 3-4 cm bred pegm.band.	80°						
48.40 - 53.15	4.75	hbl.-biot.gn.	mørk,mlk. homogen.							

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 504

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
53.15 - 53.60	0.45	2 gl.gn.b.d.	Mørk,fink-mlk.hbl.førende fra 53.15 - 53.40	75°						
53.60 - 54.45	1.45	biot.gn.	Mørk,m/lyse parti mlk.,hbl førende.spr. gr. 1-3 mm.	75°						
54.45 - 56.20	1.75	Pegm.								
56.20 - 57.90	1.70	hbl.-biot.gn.	Mørk,mlk.rel.massiv gr. rik 1-3 mm.							
57.90 - 61.50	3.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,m/lysere parti, enkelte pegm.band,tildels kv. gr.rik 1-4 mm, rel.mass.	70° 80°						
61.50 - 62.30	0.80	hbl.gn.	mørllk,m fink.rel.massiv gr.rik 0.5-2 mm.	70°						
62.30 - 64.30	2.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.rel.massiv. fra 63.10-63.30 hbl.gn. 64.15-64.20 hbl.band. Gr.rik 0.5-2 mm.	70° 80°						
64.30 - 69.15	4.85	hbl.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/amf. preg. rel.massiv.gr.før. 0.5-2 mm.	70° 80°						
69.15 - 69.30	0.15	Pegm.								
69.30 - 70.30	1.00	hbl.gn.	Mørk,mlk.-fink. Spr. gr. 0.5 - 2 mm.	70°						
70.30 - 71.35	1.05	amf.	Mørk,fink.gr.førende 0.5-2 mm.	70°						
71.35 - 71.55	0.20	Pegm.								
71.55 - 71.80	0.25	hbl.gn.	Mørk,mlk.spr. gr.1-3 mm.							
71.80 - 72.05	0.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-fink. gr.rik 0.5 - 2 mm.							

KAHA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 504

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
72.05 - 74.30	2.25	amf.	Mørk,fink-mlk. spredt bånd pegm. Tildels m/hbl.gn.preg. gr.førende 0.5-2 mm.	75°						
74.30 - 76.70	2.40	Pegm.								
76.70 - 77.00	0.30	Amf.	mørk,fink.massiv.spr. gr. 0.2 - 0.5 mm.	70°						
77.00 - 77.40	0.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,fink.massiv hbl. førende.gr.rik 0.2-0.5 mm.							
77.40 - 79.85	2.45	amf.	mørk,m/lyse parti fink,bandet m/dm brede 2 gl.gn.b.d. hbl. førende parti.Tildels gr.rik 0.5 - 3 mm.	70° 80°						
79.85 - 80.15	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,fink.massiv.gr.rik 0.5 - 3 mm.							
80.15 - 81.80	1.65	hbl.gn.	Mørk,m/lyse parti fink.-mlk. parti m/amf.preg,rel.massiv Tildels gr.rik.0.5-3 mm.	70° 80°						
81.80 - 82.00	0.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,fink-mlk. Rel.massiv gr.førende 0.5-3 mm.							
82.00 - 82.53	0.53	hbl.gn.	Rel.mørk,m/lysere parti,mlk.-fink. cm-brede bånd pegm. spr. gr. 1-4 mm.	80°						

9/2 1978

Holger Pantdalsli

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.150

Borehull: 503

Dato : Des.77
Koordinater : X: 925.396,6 Y:44.152,6
Retning : N
Helling/stigning: + 79°
Høyde : - 68,9m
Lengde : 26,86m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0,00 - 0,50	0,50	2gl.gn.alm	lys,mlk.Stedvis biot.sb.Noe kv. sv.impr. py,sl		0.53	0.28	0.80		4.75	
0,50 - 1,10	0,60	2gl.gn.b.d	noe lys,mlk.Enkelte partier med musk-dominans.Endel kv. Spor hbl.Impr.sl,py	45	0.65	0.61	2.53		10.50	
1,10 - 1,30	0,20	hbl.gn	mørk,grovk. ambud bare grovk. hbl og biot.Litt kv. Impr.py, sl.		0.43	0.48	3.32		11.25	
1,30 - 2,00	0,70	2gl.gn.alm	lys,mlk.Litt kv.Stedvis biot.-dominans.Spor hbl til å begynne med.Impr. sl,py	30	0.80	0.29	2.36		6.00	
2,00 - 2,40	0,40	biot.gn	noe mørk,mlk.Stedvis noe musk. Endel kv. Impr.sl,py.Noe cp		0.57	0.45	2.73		7.25	
2,40 - 2,65	0,25	Tap								
2,65 - 5,90	3,25	2gl.gn.b.p	Noe lys,mlk.Stedvis biot.rike partier.Ebdel kv.og pegm. Stedvis spor hbl.Tildels meget godt impr. sl,py noe gn,cp	60	0.77	0.32	3.29		7.75	2,65-4,00
					1.35	0.30	5.57		7.60	4,00-5,00
					1.63	0.26	7.38		7.58	5,00-5,90
5,90 - 6,15	0,25	hbl.b.a	grønn,mlk.Ombrent bare hbl.og kv.Litt biot.Impr.sl,py,po,cp		0.59	1.14	2.61		10.75	
6,15 - 6,80	0,65	2gl.gn.b.p	rel.lys,mlk.Stedvis ekstra biot og musk-rike parteier.Spor hbl. Meget godt impr. sl,py tildels som massive striper	55-60	1.81	0.14	9.37		10.75	
6,80 - 7,00	0,20	Tap								
7,00 - 7,20	0,20	2gl.gn.b.p	samme b.art som over.Impr.sl,py		1.04	0.08	1.99		4.53	
7,20 - 8,10	0,90	biot.gn	noe mørk,mlk.Stedvis spor hbl. Noe kv.Sporadisk gn.1-2mm.Impr.py	70-75	MANGLER					
8,10 - 8,40	0,30	Tap								

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 503

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
8,40 - 12,95	4,55	hbl.gn	mørk,mlk.Litt kv.Spredte gr. 1-2mImpr. py Stedvis ekstra hbl-og biot-rike partier.Noe staurolitt	70-75	0.11	0.05	0.57		7.33	12,00-12,95
12,95 - 13,15	0,20	hbl.gn	mørk,mlk-grov.samme b.art som over.Impr sl,py		1.23	0.15	1.76		6.38	
13,15 - 16,50	3,35	hbl-biot.gn	mørk,mlk-grovk.Endel kv.stedvis rik på staurolitt.Spredte gr 1-2mm.Impr.py	65-70	0.20	0.06	0.40		7.05	13,15-14,00 ~~13-15-14,7~~
16,50 - 16,95	0,45	amf	mørk,mlk-fk.Tett besatt gr 1-3mm	30						
16,95 - 19,85	2,90	hbl-biot.gn	mørk mlk-grovk.Noe kv.Stedvis rik på staurolitt.Enkelte rene biot-sbr.Spredte gr 1-2mm.Impr py	30 -35	0.26	0.05	0.25		8.28	18,50-19,85
19,85 - 20,60	0,75	biot.gn	mørk,grovk-mlk.Noe kv.Endel staurolitt stedvis rene biot. sk.Spor hbl.Impr.sl,py		1.50	0.16	2.41		10.00	
20,60 - 26,70	6,10	hbl.gn	mørk,mlk.Stedvis noe vekslende hvl-innhold.Endel kv.linser Spor staurolitt.Spredte gr 1-2mm. Impr. Py		0.12	0.05	0.40		7.83	20,60-22,00

23/12-77
K.M.Hegrum

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
profil 44.140

Borehull: 502

Dato : Des. 1977
Koordinater : X:925.389,3 Y: 44.134,2
Retning : N
Helling/stigning: $+72^0$
Høyde : -69,0m
Lengde : 25,39m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0,00 - 0,80	0,80	hbl.gn	lys,mlk.Delvis sterke innslag av biot. og kv.Impr py.sl	45-50	1.25	0.41	3.32		9.50	
0,80 - 4,00	3,20	2gl.gn.b.p	Noe mørk,mlk.En god del hbl som flekker.Endel kv.stedvis ekstra biot.rike bånd.Godt impr. sl,py.Noe gn,cp	60^0	0.71	0.71	3.95		14.25	0,80-2,00
					1.20	0.59	7.41		11.50	2,00-3,00
					1.46	0.71	6.22		10.50	3,00-4,00
4,00 - 12,30	8,30	biot.gn	mørk,mlk.Noen kv. og pegm. striper.Stedvis noe hbl.rel. jevnt fordelt gr 1-3mm.Stedvis litt staurolitt.Sv.impr.py Sv.spor sl, på 10,90 og 11,90	60^0	0.18	0.31	0.54		9.00	4,00-5,50
12,30 - 25,50	13,20	hbl.gn	mørk,mlk.Stedvis pegm striper Enkelte flekker ren hbl.Jevnt besatt gr.1-2mm.Impr.py.Stedvis tynne partier med biot.gn preg.	45-50						

28/12-77
K.M.Hegrum

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.140

Borehull: 501

Dato : Des. 77
Koordinater : X:925.384.4 Y:44.138.0
Retning : S
Helling/stigning: - 45°
Høyde : - 71.4 m
Lengde : 19.86 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.60	1.60	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. Noe kv. Spredte spor sl, py	30	0.14	0.10	0.30		2.47	
1.60 - 2.15	0.55	biot.gn.	Lys/mørk,mlk. Svært mye kv. gir b.a. et noe lyst utseende. Mørk ved biot.ansml. Spor hbl. Impr. sl,py,po.		0.28	0.26	4.07		13.19	
2.15 - 2.55	0.40	2 gl.gn.b.p.	Noe lys,mlk. Noe kv. Impr. sl, py, po.		0.64	0.30	2.78		6.91	
2.55 - 4.35	1.80	2 gl.gn.b.p.	Noe lys,mlk. Stedvis tynne partier 2 gl.gn.alm. Noen pegm.striper. Spredt impr. sl, py.	30-35	0.72	0.21	1.19		4.40	
4.35 - 4.70	0.35	2 gl.gn.b.p.	Noe mørk, mlk. Noe kv.	40-45	0.09	0.12	0.48		2.80	
4.70 - 5.00	0.30	2 gl.gn.b.p.	Samme b.art som over. Noe pegm. Impr. sl, py.		0.28	0.20	1.94		3.56	
5.00 - 9.20	4.20	2 gl.gn.b.d.	Noe mørk,mlk. Noe kv. og pegm. Tynn sprekkefylling av cp i kv. på 5.80	30-35	0.07	0.16	0.65		2.93	5.00-6.00
					0.00	0.02	0.04		2.05	8.00-9.20
9.20 - 11.15	1.95	biot.gn.	Noe mørk,mlk.-grovk. Enkelte partier med 2 gl. gn.alm. Spor hbl. Impr. sl, py, gn.	40-45	0.27	0.19	1.03		6.28	9.20-10.00
					1.23	0.27	3.10		7.74	10.00-11.15
11.15 - 12.30	1.15	biot.gn.	Noe mørk,mlk-grovk. Spredte Noe lysere partier. Spor hbl. Noe ujevnt besatt gr. 0.5 - 1 mm.	40-45	0.20	0.04	0.35		3.98	
12.30 - 19.85	7.55	hbl.-biot.gn.	mørk,mlk.-grovk. Endel kv. og pegm.-striper. Noe ujevnt besatt gr. 1-2 mm Delvis impr. py.	40-45						

5/1-78 K.M. Hegrum

EINA BLADS TEYKERI

Lokalitet: Forseringsort

Profil 44.140

Borehull: 500

Dato : Des. 1977

Koordinater : X: 925.384,1 Y: 44.138,0

Retning : S

Helling/stigning: + 72°

Høyde : - 69,0m

Lengde : 17,54m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0,00 - 15,15	15,15	hbl.gn	noe mørk,mlk.En del kv.striper Stedvis ektra biot.rike bånd Av og til amf-preget,med delvis stichtolitsike gr.Rel. jevnt besatt gr.1-3mm.Stedvis staurolitt.Impr.py	60°						
15,15 - 15,55	0,40	biot.gn	mørk,mlk.Stedvis spor hbl.Relativt besatt gr1-2mm sv.impr py	65-70						
15,55 - 17,50	1,95	2gl.gn.b.p	lys,mlk.Tenderer stedvis inn mot 2gl.gn.alm.Enkelte ektra biot.rike bånd.Noen kv.linser Spredte gr 0,5-1mm	80-85						

28/12-77

K.M.Hegrum

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forserings-ort
Profil 44350

Borehull: 499

Dato : Nov. - Des. 77.
Koordinater : X: 925.408.7 Y: 44.347.9
Retning : S
Helling/stigning: - 35°
Høyde : - 66.1 m
Lengde : 75.15 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.75	0.75	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.hbl.førende med spredte gr. 1-3 mm.Impr. py	60°						
0.75 - 1.30	0.55	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk-fink.hbl.førende lysere band med kv.pegm. spor gr. 1-2 mm.Impr. py.	60°						
1.30 - 2.30	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk mlk.hbl.førende impr. py	50°	0.01	0.02	0.05		6.27	
2.30 - 4.90	2.60	Musk,gn.	lys,grovk.-mlk. med litt brun biot. ondulerende foliotion(Filtet preg). spor gr.1-2 mm.Sv.sp. sl,py	50°	0.28	0.07	0.56		7.36	
4.90 - 6.70	1.80	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk.-grovk.delvis muskrikere partier under-ordnet med hbl.spor gr.1-3 mm. Spor sl, impr. py	60°	0.29	0.09	0.64		6.68	
6.70 - 7.50	0.80	D.biot.gn.	Mørk,grovk-mlk.spor hbl. gr. 1-2 mm.sv.impr. py.	50° 60°	0.21	0.08	0.31		6.41	
7.50 - 9.00	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk mlk.spor hbl. gr.1-3 mm. impr. Py	50°						
9.00 - 10.50	1.50	Musk.gn.	Lys,grovk.-mlk.litt brun biot. spor gr.1-2 mm.imrp.py	30° 40°						
10.50 - 13.00	2.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.-grovk.spor hbl.gr. 1-2 mm. impr. py	25°						
13.00 - 13.50	0.50	TAP								
13.50 - 14.30	0.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.-grovk. spor hbl.gr. 1-2 mm.impr. py	25°	0.04	0.15	0.23		7.91	
14.30 - 15.00	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk.hbl.før. tildels hbl-gn.svake spor sl impr. py	35°	0.56	0.21	1.73		8.45	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull:

side 2

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
15.00 - 18.00	3.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.-grovk.spor hbl.gr.1-2 mm.16.30-16.40 spor sl 16.90 - 17.00 spor sl impr. py. spor po	30°	0,04	0.10	0.41		7.64	
18.00 - 19.00	1.00	hbl.gn.	Rel.lys,mlk.-fink.kv.rik m/ gr.1-3 mm.Stichtolitisk preg fra 18.00 - 18.60 sv.impr. py	25° 40°	0.00	0.03	0.05		5.32	
19.00 - 22.50	3.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.19.80-20.25 pegm.band.(parti) gr.førende 1-4 mm.svak spor hbl. py.	45°						
22.50 - 23.45	0.95	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.rel.kv.rik.parti m/ biot.preg og spor gr. 1-2 mm. svak impr. py.	55°						
23.45 - 25.80	2.35	hbl.gn.	Mørk,mlk.svake spor gr. 0.5-2 mm svak impr. py	60°						
25.80 -26.35	0.55	amf.	rel.mørk, mlk massiv svak impr. py							
26.35 - 28.70	2.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,m/lyse parti mlk. veksl. m/hbl. rik parti (27.00 - 27.15 hbl.gn. m/ stichtolitisk preg)band m/ delv. gr. 1-3 mm. sv.imp. py	55°						
28.70 - 29.30	0.60	2 gl.gn.alm	Lys,kv.rik m/spor gr.1-2mm	60°						
29.30 - 32.70	3.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk m/lyse parti mlk.-grovk. hbl.førende bånd spr. gr. 1-3 mm. 32.10-32.15 pegm. svak impr. py	60°						
32.70 - 33.50	0.80	hbl.-biot.gn.	Mørk,grovk.-mlk.Spr. gr.1-3 mm.32.80-32.90 amf.band. Impr. py	50°						

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Hoyde :
Lengde :

Borehull: 449

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
33.50 - 33.80	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.hbl.førende spor gr. 1-3 mm.	40°						
33.80 - 36.70	2.90	hbl.gn.	Mørk, m/lyse parti.Mlk.-grovk.Vekslende m/parti 2 gl.gn.b.d. Sprette gr. 1-3 mm.Svak impr. py	40° 60°						
36.70 - 39.40	2.70	2 gl.gn.b.d.	Lys m/mørke parti.mlk. 36.90-36.95, 38.30-38.50 Hbl.rik 37.00-37.15 seresit kv.sit. sprette gr.1-3 mm svak impr. py	40° 60°						
39.40 - 43.50	4.10	hbl.biot.gn.	Mørk m/lyse parti,mlk.-grovk vekslende m/parti 2 gl.gn.b.d. partier rel.rik på gr.1-3 mm svak impr. py	30° 40°						
43.50 - 44.50	1.00	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk.spr. gr. 0.5-2 mm spor hbl. svak impr. py	30°						
44.50 - 44.80	0.30	Pegm.								
44.80 - 49.80	5.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk m/lyse parti.Mlk-grovk.Kv-rik parti.Spr. gr. 0.5 - 2 mm, spor hbl, god impr. py	40° 50°						
49.80 - 50.95	1.15	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk,spr.gr.1-2mm.spor Py	45°						
50.95 - 51.90	0.95	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.spr.gr.1-2mm. spor Py	45°						
51.90 - 52.65	0.75	TAP								
52.65 - 55.70	3.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.-grovk.med spr. gr. 1-3 mm.Peg.band 55.65 - 55.70	40°						
55.70 - 57.20	1.50	TAP								

FANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater
Retning :
Borehull: 499 Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
57.20 - 58.20	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk mlk.-fink.med smale band hbl.gr.førende 1-3 mm spor py.	40° 50°						
58.20 - 61.10	2.90	hbl.gn.	Mørk,mlk-fink. gr-førende 1-3 mm. ved 60.80-60.85 pegm.bånd.	45°						
61.10 - 62.60	1.50	hbl.gn.	Mørk,grovk.biot.rik.gr.før. 1-4 mm.	45°						
62.60 - 63.20	0.60	hbl.gn.	Rel.mørk,mlk-fink.rel.kv.rik gr.rik 1-4 m	45°						
63.20 - 63.60	0.40	2 gl.gn.b.d.	Mørk,mlk.hbl.peg.str.Spr.gr. 1-3 mm.	45°						
63.60 - 64.25	0.65	Peg.								
64.25 - 64.75	0.50	2 gl.gn.b.d.	Mørk,grovk.spor hbl.og gr. 1-4 mm.	45°						
64.75 - 66.15	1.40	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink.med små part. b.d. spor gr. 1-3 mm.	40° 50°						
66.15 - 66.65	0.50	TAP								
66.65 - 69.40	2.75	2 gl.gn.b.p.	Rel.lys,mlk.rel.kv.rik Spredte gr. 1-2 mm	45° 50°						
69.40 - 75.15	5.75	Amf.	Mørk,fink-mlk. rel.rik på gr.1-4 mm ved 71.40-71.50 kv. pegm.	45° 50°						

6/2 1978

H. Pantdalsli

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.350

Borehull: 498

Dato : Nov-des 1977
Koordinater : x: 925.409,7 y: 44.347,5
Retning : S
Helling/stigning: ÷ 72°
Høyde : ÷ 66,4 m
Lengde : 28,93 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0,00 - 3,55	3,55	hbl.gn	Noe mørk,mlk.Stedvis noe biot.Endel kv.-iblandet. Spredte gr.2-4.Imprt.py	70-75						
3,55 - 4,30	0,75	biot.gn	Noe mørk,mlk.Stedvis noe hbl. Impr. py							
4,30 - 5,10	0,80	2gl.gn.b.g	Noe lys,mlk.Enkelte rene biot. str.Spor gr. 1-3mm	65-70	0.12	0.08	0.19		5.40	
5,10 - 5,50	0,40	malm	rel mass.sl-malmmed py, ep gn.Endel kv.og biot.iblandet		3.32	0.85	11.36		11.40	
5,50 - 5,90	0,40	pegm	hvit,grovk.-mdk.Sor biot.							
5,90 - 6,10	0,20	biot.gn	mørk,mlk.Spor hbl.Striper grovk.biot.Spredte gr 2-4mm. Impr. py	70-75	0.05	0.06	0.20		2.20	
6,10 - 6,60	0,50	2gl.gn.alm	lys,mlk.Stedvis spor gr							
6,60 - 6,75	0,15	hbl.gn	mørk,grovk-mlk.Endel biot. Impr. py							
6,75 - 7,20	0,45	hbl-biot.gn	Noe lys,mlk.Noe hbl.Impr. py	70-75						
7,20 - 7,35	0,15	hbl.gn	mørk,grovk.-mlk.Sv.impr py							
7,35 - 8,00	0,65	2gl.gn.alm	lys,mlk-grovk.Spor gr 1-3mm	60						
8,00 - 8,40	0,40	biot.gn	Noe lys,mlk.Enkelte gr 1-2mm Impr. py	60						
8,40 - 10,75	2,35	hbl.gn	Noe mørk,mlk.Enkelte kv.striper.Spredte gr 1-3mm. Impr py	60						
10,75 - 11,55	0,80	2gl.gn.alm	lys,mlk.Stedvis biot-rike partier. Spr py	60-65						
11,55 - 12,20	0,65	2gl.gn.b.p	noe lys,mlk.Enkelte biot.rike partier.Spor gr 1-2mm.Spor py							

....2

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 498

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
12,20 - 14,25	2,05	hbl-biot.gn	Noe lys,mlk-grovk.Enkelte flekker grovk.hbl.Noe kv. Stedvis spor gr 1-2mm.Impr.py	65-70	0.01	0.13	0.09		9.60	13,50-14,25
14,25 - 15,05	0,80	hbl.gn	mørk.grovk.En god del grovk. biot.Noe kv.Impr.py	65-70	0.01	0.39	0.14		11.20	
15,05 - 15,50	0,45	malm	grovk.sl- malm med iblanding av kv. og biot.		0.00	0.30	13.26		22.40	
15,50 - 15,85	0,35	2gl.gn.b.d	lys,mlk.-fl.Kv.rik		0.05	0.06	0.67		4.40	
15,85 - 16,25	0,40	biot.gn	Noe lys.grovk.-mlk.Sterke innslag av kv. ogpegm.Også grovk.biot.Godt impr.sl, py, po, Noe cp		0.02	0.36	4.45		16.00	
16,25 - 16,65	0,40	hbl.gn	Noe mørk,grovk.Sterke innslag av kv.,grovk hbl og biot. Spor skarn.Impr. py,po.Spor sl		0.00	0.22	0.80		10.00	
16,65 - 17,50	0,80	biot.gn	Noe mørk,grovk.-mlk.Sterke innslag av grovk. biot.og kv. Spor hbl.Tildels meget godt impr sl,py,po.Noe cp	45-50	0.02	1.20	5.96		17.80	
17,50 - 18,65	1,15	hbl.gn	Noe mørk.mlk.Noe kv og pegm. Spor gn 1-2mm. Sv. impr.sl py,po	65-70	0.06	0.16	0.58		6.40	
18,65 - 19,20	0,55	2gl.gn.alm	lys,mlk.Delvis noe musk.rik.Sv. impr. sl,py		0.44	0.10	1.92		4.00	
19,20 - 20,20	1,00	2gl.gn.b.d	Noe lys,mlk.Spor hbl.Noe kv. Spredte grl-2mm. Sc.spor py		0.05	0.03	0.13		4.00	

....3

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 498

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
20,20 - 21,75	1,55	hbl.gn	Noe lys,mlk-grovk.Endel kv. Enkelte musk-rike partier Impr.sl, py, po, cp.		0.46	0.61	2.34		6.20	
21,75 - 23,00	1,25	hbl.gn	Noe mørk,mlk.Enkelte kv og pegm striper.Noen biot-rike partier.Spredte gr.1-2mm. Impr.py	35-40	0.19	0.17	0.46		5.80	
23,00 - 27,90	4,90	2gl.gn.b.p	lys,mlk.Noen musk-rike partier.Noe kv.	60-65						
27,90 - 28,85	0,95	amf	Mørk.grovk.-mlk.Stedvis skarn Enekelte kv. striper.Stedvis noe hbl.gn-pregm.Spredte gr. 1-5mm.Stedvis impr. py	60-65						

9/12-77
K.M.Hegrum
K.M.Hegrum

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.350

Borehull: 497

Dato : Nov.77
Koordinater : X: 925.433,2 Y: 44.348,1
Retning : N
Helling/stigning: -45
Høyde : -66,3m
Lengde : 31,92m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0,00 - 1,20	1,20	2gl.gn.b.d	Noe lys,mlk.Enkelte striper ren biot.Spor hbl.Spredte gr 1-3mm	45						
1,20 - 4,25	3,05	hbl.gn	Noe mørk,mlk.-grovk.Enkelte store flekker ren hbl.Endel kv.rel jevnt besatt gr.1-3mm Enkelte gr. 5-8mm.Rel jevnt impr py	40-45						
4,75 - 5,00	0,75	biot.gn	Noe lys,mlk.Sv.spor hbl.Rel jevnt besatt gr.1-3mm Sv. spor py	40-45						
5,00 - 6,10	1,10	biot.sk	lys/mørk,mlk-grovk.Mye kv. mellom grovk.biot.Endel hbl. spredte gr 1-3mm.Impr py							
6,10 - 6,50	0,40	biot.gn	lys fk-mlk.Spor hbl.	40-45						
6,50 - 6,60	0,10	biot.sk	samme b.art som før							
6,60 - 7,00	0,40	hbl.gn	Noe mørk,mlk.amf-preg.kv.-rik	40-45						
7,00 - 10,00	3,00	biot.sk	Mørk,grovk.Mye kv.innblanding Enkelte tynne striper 2gl.gn. Stedvis mye hbl.Spredte gr. 1-3mm .Impr. py							
10,00 - 10,65	0,65	hbl.gn	noe lys,mlk.Enkelte striper grovk.biot.Impr. py	60^0						
10,65 - 11,00	0,35	biot.gn	noe lys,mlk.	60^0						
11,00 - 11,65	0,65	biot.sk.	mørk,grovk.Svært mye kv. innblandet.Endel grovk.hbl. spredte gr.1-3mm.Impr. py	60-65						
11,65 - 11,90	0,25	pegm	hvit,grovk.							

....2

NANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 497

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
11,90 - 13,40	1,50	biot.gn	Noe lys,mlk.En god del kv. iblandet.Endel striper grovk. biot.Impr. py. Spor po	45-50						
13,40 - 14,20	0,80	hbl.biot.gn	Noe mørk,mlk-grovk.Endel kv. striper spor gr.Impr. py noe po	45-50						
14,20 - 18,00	3,80	2gl.gn.b.p	lys,mlk.Enkelte tynne partier 2gl.gn.alm.Enkelte tynne striper biot.Spor gr 1-2mm	40-45						
18,00 - 18,25	0,25	biot.gn	mørk,grovk.Noe kv.Spor py,po	40-45						
18,25 - 19,40	1,15	2gl.gn.b.p	samme b.art som over	45						
19,40 - 20,75	1,35	biot.gn	mørk,mlk-grovk.Mye kv.iblandet Endel hbl.Impr. py		0.16	0.14	0.58		7.33	
20,75 - 21,30	0,55	hbl-biot.gn	noe lys,mlk.Impr.sl,py		0.56	0.35	2.42		7.57	
21,30 - 22,40	1,10	biot.gn	Noe lys,mlk.Stedvis spor hbl.Impr.py	40-45	0.28	0.23	0.73		6.35	
22,40 - 22,80	0,40	biot.sk	Mørk,grovk.Noe grovk.hbl.Endel kv.		0.41	0.21	0.98		6.96	
22,80 - 23,65	0,85	2gl.gn.b.p	lys,mlk.Endel kv.og tynne biot-striper	40-45	0.13	0.13	0.28		4.76	
23,65 - 24,00	0,35	Tap								
24,00 - 24,25	0,25	2gl.gn.b.p	samme b.art som over		0.08	0.10	0.29	-	3.54	
24,25 - 25,75	1,50	biot.gn	Noe lys,mlk.Stedvis endel hbl. Enkelte biot.str. Impr. py sl.	40-45	0.07	0.28	0.49		6.47	

....3

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 497

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
25,75 - 27,40	1,65	biot.gn	Mørk,grovk-mlk.Endel striper grovk.biot-sk.Noe kv.Spor hbl.Tildels grovk.impr sl,py		0.33	0.41	3.70		11.84	
27,40 - 27,70	0,30	biot.gn	lys,mlk.Noe kv.sv.impr.py,sl	40-45	0.11	0.26	0.46		4.40	
27,70 - 28,00	0,30	Pegm	hvit,grovk.		0.03	0.08	0.15		1.95	27,70-29,00
28,00 - 32,00	4,00	2gl.gn.b.p	lys,mlk.-fk.Enkelte biot.str. Noe kv.Spredte spor gr.1-2mm	35-40						

11/11-77
K.M.Hegrum
K.M.Hegrum

RINA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.350

Borehull: 496

Dato : okt. 1977
Koordinater : x: 925.433,9 Y: 44.348,0
Retning : N
Helling/stigning: +45°
Høyde : -68,m
Lengde : 27,36

Dybde	L.	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0,00 - 1,90	1,90	2gl.gn.alm	lys,mlk.Stedvis noe biot. Spor hbl.Flekk med sl på 0,60	40-45	0.20	0.08	0.35		2.96	
1,90 - 3,10	2,20	2gl.gn.alm	lys,mlk.Stedvis striper biot. Sv.impr sl, py	35-40	0.70	0.23	1.44		5.20	
3,10 - 4,30	1,20	2gl.gn.b.p	Noe lys,mlk.Noe pegm.Impr sl, py	30-35	1.21	0.28	2.47		7.00	
4,30 - 5,50	1,20	Tap								
5,40 - 7,10	1,60	biot.gn	Noe mørk,mlk.Endel kv. og pegm.Stedvis striper grovk. biot.Impr. py.Stedvis spor sl	30	0.32	0.26	0.99		8.40	
7,10 - 7,40	0,30	2gl.gn.alm	lys,mlk.Noe kv.	30	0.12	0.15	0.42		6.20	
7,40 - 8,00	0,60	biot.gn	Noe mørk-grovk.Endel kv.Impr. py.Stedvis spor py	30						
8,00 - 8,50	0,50	2gl.gn.b.p	lys,mlk-fl.Stedvis striper ren biot.							
8,50 - 10,50	2,00	hbl-biot.gn	noe lys,mlk.Noen pegm-striper. Spredte gr.1-3mm.Impr py	34-40						
10,50 - 12,45	1,95	biot.gn	noe lys,mlk.Stedvis tynne partier med amf-preg. Spor hbl.Endel kv.Rel.jevnt besatt gr.1-3mm.Impr.py	45						
12,45 - 14,30	1,85	amf.	Mørk,fl-mlk.En god del kv. iblandet.Stedvis tynne striper biot-gn.Rel.tett besatt gr 2-10mm	35-40						

....2

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 496

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
14,30 - 14,80	0,50	biot.gn	samme biot.gn. som før amf.	35-40						
14,80 - 19,00	4,20	hbl.gn	Noe lys,mlk.Noen biot rike partier.Endel kv. stedvis tynne partier med amf.-preg. Stedvis spor skarn.Noe ujevnt gr.1-3mm. Impr. py	40-45						
19,00 - 19,70	0,70	2gl.gn.alm	lys,mlk.Noe ujevnt besatt gr. 1-3mm	40-45						
19,70 - 21,50	1,80	2gl.gn.b.p	Noe lys,mlk.Noe kv.jevnt besatt gr.2-4mm	40-45						
21,50 - 22,50	1,00	hbl.gn	Noe mørk,mlk.Endel pegm.Noe ujevnt besatt gr 1-3mm.Impr. py							
22,50 - 24,75	2,25	biot.gn	noe lys,mlk.Endel kv.iblandet Spredte spor Hbl. Jevnt impr. py	40-45						
24,75 - 27,55	2,80	hbl-biot.gn	Noe lys,mlk.Endel kv.iblandet Stedvis amf.preg.Noe ujevnt besatt gr 1-5mm.Impr.py							

7/12-77
K.M.Hegrum
K.M.Hegrum

FANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.350

Borehull: 495

Dato : OKT. 1977
Koordinater : x: 925.425,3 y: 44.349,4
Retning : E
Helling/stigning: + 86°
Høyde : ÷ 63.5 m
Lengde : 20.88 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 1,95	1,95	hbl.gn	noe lys,mlk.Spredte gn 1-2mm. Sv.impr. py	70-75						
1,95 - 5,20	3,15	amf	mørk,mlk.Endel iblanset av hbl.gn.Endel kv og pegm.Stedvis store flekker gul grønn skarn.Også striper grovk. biot Noe ugjevnt besatt gr.3-10mm	70-75						
5,20 - 5,80	0,60	hbl-biot gn	Noe mørk,mlk.Ujevnt besatt gr 3-10mm							
5,80 - 11,60	5,80	hbl.gn	mørk,mlk.Store partier med gul-grønn skarn.Stedvis amf. preg.Noe pegm.Noe grovk.biot	65-70						
11,60 - 12,00	0,40	Tap								
12,00 - 12,60	0,60	hbl.gn	samme b.art som over							
12,60 - 16,20	3,60	amf.	mørk,mlk.-fk.Noen pegm-striper Enkelte partier med hbl gn-preg. Ujevnt besatt gr 0,5-1mm	40-45						
16,20 - 21,00	4,80	hbl.gn	Noe mørk,mlk.Noe pegm.Stedvis partier med biot.gn-preg. Stedvis flekker gul-grønn skarn.Ujevnt besatt gn 1-2mm. sv. impr py	45						

5/12-77
M. H. Hegrum
K.M. Hegrum

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.350

Borehull: 494

Dato : okt. 1977
Koordinater : x: 925.408,4 y: 44.348,3
Retning : S
Helling/stigning: + 75°
Høyde : ÷ 64,1 m
Lengde : 19,76 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0,00 - 2,70	2,70	hbl.gn	Noe lys,mlk.Endel biot.striper. Noe ujevnt besatt gr.2-4mm. sv. impr.py	65-70						
2,70 - 3,00	0,30	Tap								
3,00 - 3,80	0,80	2gl.gn.b.d	Noe lys,mlk.-grovk.Endel striper grovk.biot.Spredte flekker hbl. Jevnt besatt gr.1-3mm.Sv.impr.py							
3,80 - 4,00	0,20	Tap								
4,00 - 6,25	2,25	hbl-biot.gn	Noe mørk,mlk.Endel flekker grovk. hbl.Endel gul-grønn skarn på 6,10.Spredte gn.1-2mm.Sv.impr.py	65-70						
6,26 - 7,80	1,55	amf	mørk,mlk.-fk.Endel striper hbl. gn.Jevnt besatt gr 2-4 mm	65-70						
7,80 - 8,70	0,90	hbl.gn	noe lys,mlk.Noen tynne striper amf.Litt grovk.biot.Jevnt besatt gr.2-4mm.Impr.py	55-60						
8,70 - 9,10	0,40	Tap								
9,10 - 12,25	3,15	hbl.gn	Noe lys,mlk.Endel flekker grovk. hbl og biot.Noen striper med amf. preg.Jevnt besatt gr 2-3mm.sv. impr.py	55-60						
12,25 - 13,75	1,50	amf.	Mørk.fk.mlk.Noen tynne striper med hbl gn-preg.Tett besatt gr 2-4mm	70-75						
13,75 - 14,45	0,70	hbl.biot.gn	Noe mørk,mlk.Noen flekker grovk. hbl. og biot.Jevnt besatt gr. 1-3mm							
14,45 - 17,75	3,30	biot.gn	mørk,mlk.-grovk.Endel flekker hbl.Noe kv.Tett besatt gr 3-10mm	60-65						
17,75 - 20,00	2,25	2gl.gn.alm	lys,mlk.Noen tynne stiper biot. Spredte spor gr. 0,5-1mm	40-45						

5/12-77
K.M.Hegrum

PANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forsering - ort
Profil 44.380

Borehull: 493

Dato : Okt. 77
Koordinater : X 925.446.5 X: 44.380
Retning : S
Helling/stigning: – 78°
Hoyde : – 65.5
Lengde :

1.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.20	0.20	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk. noe kv. spor py	65						
0.20 - 0.65	0.45	hbl.gn.	Noe mørk,mlk.rel.jevnt ford. gr. 1-3 mm. noe kv.sv.impr.py							
0.65 - 0.85	0.20	biot.sk.	Mørk,grovk. noe kv. impr. sl py, po	40 50						
0.85 - 12.5	0.40	biot.gn.	Noe mørk,mlk. Noe kv.pegm. str. spr. gr. 0.5-2 mm.spor hbl. sv.impr. py.							
1.25 - 4.50	3.25	hbl.gn.	Mørk,med lyse part. mlk-grovmlk. enkelte partier med biot.gn. Enkelte gr.rike partier. 0.5-3 mm. 1.30, 2.20 biot.sk.str. 360 Py,Po str. spredt svak impr. py, po.	55 60						
4.50 - 4.65	0.15	biot.sk.	Mørk,grovk. spor hbl. impr. py, po.	60 70						
4.65 - 6.35	1.70	biot.gn.	Noe mørk,grovk-mlk. kv.rik med pegm.str. Striper med biot.part. hbl.rik. spor gr. 1-2 mm.Rel. jevn. Impr. py, po	60 60						
6.35 - 7.05	0.70	2 gl.gn.b.d.	Noe mørk,mlk.kv.rik med biot. str. spor hbl. Pegm.str. av impr. py spor sl	70						
7.05 - 7.25	0.20	TAP								
7.25 - 7.95	0.70	2 gl.gn.b.d.	Noe mørk,mlk. med pegm.str. spor hbl. spor sl, py, po	80						
7.95 - 8.45	0.50	2 gl.gn.b.p.	Lys,firmlk. kv.rik massiv spor gr. 1-2 mm.							

ANA BLAIS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 493

2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
8.45 - 8.70	0.25	Pegm.	Grovk.-grovmlk.Spor py.							
8.70 - 12.20	3.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.-grovk.Spr.gr. spor hbl.fr. 9.00-9.40 spor sl,po, svake sp. py	70°						
12.20 - 12.90	0.70	Biot.gn.	Rel.mørk,mlk-grovk.veksl. med part. av 2 gl.gn.b.d. spr. gr.1-2mm.Sv.spor po,py	80 90						
12.90 - 14.40	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.Spr. gr. 1-2 mm	90						
14.40 - 14.85	0.45	biot.gn.	Rel.mørk mlk.-grovk. veksl. part.med 2 gl.gn. Spr. gr. 1-2 mm.	80°						
14.85 - 22.90	8.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.fr. 22.00-22.50 dm.tykke pegm.partier. spredte gr. 1-2 mm.	80°						
22.90 - 24.20	1.30	biot.gn.	Mørk,mlk-grovk.veksl.med lysere str.spor gr. ved 23.00 - 23.20.1-2 mm. hbl.førende.	70°	0.02	0.04	0.11		3.39	22.50-23.20
			fra 23.20-24.15 impr.sl,py	90°	0.02	0.45	1.88		14.02	23.20-24.20
24.20 - 25.15	0.95	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.spor hbl. spor gr.1-3 mm. Svak impr.Sl,gn cp, po, py	80°	0.77	0.25	0.84		7.08	
25.15 - 26.20	1.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.spor hbl.ved 25.85.Svak impr. sl,py	80°	0.31	0.17	0.46		4.22	
26.20 - 26.95	0.75	2 gl.gn.b.d.	Noe mørk,mlk-grovk.Hbl.førr. impr. sl, py.	80°	0.49	0.31	1.33		8.70	
26.95 - 28.30	1.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.vekslende med opp til 2 dm. brede peg. bånd.spor gr.1-2mm.sv.sp.py	70°	0.01	0.02	0.04		1.48	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 493

3.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
28.30 - 28.70	0.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.hbl.førende spor gr.1-2 mm.sv.impr.py	80°	0.06	0.04	0.05		5.46	
28.70 - 29.40	0.70	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk.-grovk. spor hbl. Impr. sl,cp,po,py	70 80	1.26	0.39	2.59		11.36	
29.40 - 30.20	0.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.vekslende med dm.brede peg.band fra 29.80 - 30.05.Hbl.førende svak impr. sl,py	70 80	0.15	0.17	0.34		3.69	
30.20 - 30.65	0.45	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk. ved 30.45 - 30.55 impr. Po, py	90°	0.19	0.16	0.47		3.54	
30.65 - 30.95	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. impr. sl,po,cp	80°	0.63	0.47	2.27		7.91	
30.95 - 31.70	0.75	2 gl.gn.b.d.	lys,mlk. spor hbl. spor gr. 1-2 mm. svak impr. py.	80°	0.10	0.14	0.59		4.50	
31.70 - 36.30	4.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk mlk.-grovk.tildels båndet med hbl.rike bånd og gr. 1-2 mm. spor py.	70° 80°						
36.30 - 39.10	2.80	2 gl.gr.b.d.	Mørk,mlk-grovk.hbl.førende med gr. 1-4 mm.Stichtolitisk svak impr. Py.	80° 90°						
39.10 - 41.80	1.90	hbl.gn.	mørk,mlk-grovk. b førende med cm-tykke str. pegm. gr.førende 1-4 mm.40.30-40.50 kjernetap.	80° 90°						

3/2 1978

Stellan Borman

FANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.390

Borehull: 492

Dato : Okt.1977
Koordinater : X: 925.480.7 Y: 44.391,9
Retning : N
Helling/stigning: +65°
Høyde : -61,8m
Lengde : 19,76m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 2.10	2,10	2gl.gn.b.p.	lys,mlk.Endel biot.rike striper. Noe kv.spredte gr. 1-3mm	65-70	0.11	0.04	0.28		3.07	0,00-1.00
					0.02	0.08	0.12		3.07	1.00-2,10
2.10 - 2,60	0,50	biot.gn.	noe lys,mlk-grovk.Flere kraftige striper biot.sk. Endel kv. Noe hbl.Impr.sl,py		0.06	0.16	1.89		10.64	
2,60 - 3,00	0,40	biot.gn.	Noe lys,mlk.Endel kv. Enkelte biot.striper		0.06	0.05	0.36		5.52	
3,00 - 3,70	0,70	biot.sk	Lysmlk-grovk.Kraftigiblandet kv. og pegm.Endel hbl.Spor gr.		0.00	0.02	0.09		5.52	
3,70 - 4,00	0,40	biot.sk	Mørk,grovk-mlk.Noe kv.Spor hbl spor gr. 0,5mm		0.00	0.02	0.08		5.73	
4,00 - 6,15	2,15	biot.gn	noe sly,mlk.Enkelte innslag av biot.sk.Endel kv. og pegm Spor hbl.Ujevnt besatt gr. 1-3mm	65-70	0.02	0.01	0.08		3.48	4,00-5,00
					0.00	0.03	0.06		4.70	5,00-6,15
6,15 - 6,50	0,35	pegm	hvit,grovk. Også litt biot Impr. py,po,cp		0.02	0.88	0.22		9.00	
6,50 - 7,00	0,50	biot.gn	noe mørk,mlk.Meget kraftig impr. sl,py,også gn		2.06	0.27	4.98		12.07	
7,00 -15,30	8,30	2gl.gn.b.p	noe lys,mlk.Enkelte kv. striper.Enkelte biot.rike partier.Spredte gn.1-3mm	60	0.02	0.03	0.10		2.45	7,00-8,50
15,30 -15,75	0,45	biot.gn	noe mørk,mlk.Endel kv.Rel. tett besatt gr. 0,5-1mm							
										...2

RANA GLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 492

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
15,75 - 18,15	2,40	2gl.gn.b.p	samme 2gl.gn.b.p som tidligere.	70						
18,15 - 18,60	0,40	biot.gn	noe mørk,mlk.Noe kv.Rel.tett gr. 1-3mm.Enkelte gr 8-10mm							
18,60 - 19,80	1,20	2gl.gn.b.p	noe lys,mlk.Enkelte striper biot.gr.Noe kv. ujevnt besatt gr 1-3mm							

17/10-77
K.M.Hegrum
K.M.Hegrum

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.390

Borehull: 491

Dato : Okt. 77
Koordinater : X: 925.468,8 Y: 44.397,5
Retning : S
Helling/stigning: + 65°
Høyde : -62,2
Lengde : 14,86

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0,00 - 1,20	1,20	malm	rel.mass. sl-malm.En del biot. sk. iblandet.Noe hbl	50	2.15	0.19	11.05		15.51	
1,20 - 1,35	0,15	biot.sk	mørk,grovk.Noe kv.og hbl. Impr.sl, py, cp		0.23	1.77	1.57		13.85	
1,35 - 1,60	0,25	biot.gn	lys,mlk.Mye kv. iblandet.		0.03	0.05	0.12		3,32	
1,60 - 2,50	0,90	biot.sk.	mørk,grovk.Endel kv.Spor hbl.Impr.sl,py,po	55-60	0.21	0.37	2.35		15.37	
2,50 - 3,30	0,80	hbl.gn	noe mørk,mlk.Noe skarn Spredte gr. 0,5-1mm	70	0.02	0.12	0.08		5.95	
3,30 - 3,45	0,15	malm	rel.mass. sl-malm.Noe biot+ hbl.		1.77	0.16	8.90		12.60	
3,45 - 5,40	1,95	biot.gn	noe mørk,mlk.Endel striper biot.ek helt først.Spredte gr 1-2m. Impr.py	60	0.16	0.16	0.15		8.31	
5,40 - 5,70	0,30	Tap								
5,70 - 8,00	2,30	2gl.gn.b.d.	noe lys,mlk.Stedvis gr.1-2mm Spor hbl.Impr.py	45-50						
8,00 - 8,55	0,55	Tap								
8,55 - 10,00	1,45	hbl.biot.gn	noe mørk,mlk.Rel.jevnt besatt gr. 1-2mm. Sv. Impr.py	40						
10,00- 10,30	0,30	Tap								
10,30-15,00	4,70	hbl.biot.gn	noe mørk,mlk.Enkelte tynne striper biot.gn.og 2gl.gn. b.d. Noe ujevnt besatt gr 1-2mm.Et parti på 14,50-14,60 der gr. er noe større, og tydelig stichtolitisk.Sv. impr.py	40-45						

K.M.Hegrum

13/10-77, K.M.Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.390

Borehull: 490

Dato : Okt. 1977
Koordinater : X: 925.469,7 Y: 44.396,9
Retning : S
Helling/stigning: -65°
Høyde : -64,9m
Lengde : 30,40m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0,00 - 4,05	4,05	hbl.gn	noe lys,mlk. Noen striper rep. biot.Endel kv. linser Spredte gr.1-2mm.Impr py	55-60°						
4,05 - 4,25	0,20	amf	mørk,mlk-fk.Noe gul-grønn skarn							
4,25 - 4,45	0,20	biot.sk	nørk grovk.-mlk.Striper ren biot i blanding med kv.Spor impr. py							
4,45 - 7,35	2,90	hbl.gn	noe lys mlk.Tendenser sted-vis mot hbl-biot-gn.Enkelte striper ren biot.Noe kv. Spredte gr 1-2mm Sv impr.py	30-35						
7,35 - 7,70	0,35	Tap								
7,70 - 8,00	0,30	hbl.gn	samme hbl.gn som over.							
8.00 - 8,35	0,35	Tap								
8,35 - 9,40	1,05	hbl.gn	samme hbl.gn som før.	50-55	0.09	0.14	0.34		8.30	
9,40 - 10,55	1,15	biot.gn	noe lys,mlk.Endel kv-striper Spor hbl,Sv.impr.sl, py	60	0.45	0.20	0.99		8.48	
10,55-11,45	0,90	2gl.gn.b.p	noe lys,mlk.Noen striper biot.Endel kv.Impr.sl, py		1.75	0.17	1.89		3.46	
11,45-12,60	1,15	2gl.gn.b.p	noe lys,mlk.Endel kv.spredte gr 0,5 -1mm	50	0.02	0.03	0.07		1.90	
12,60-18,90	6,30	2gl.gn.b.d	noe lys,mlk.Noen striper kv. og pegm.Enkelte biot rike striper spredte gr 1-2mm	50-55						
18,90-19,90	1.00	2gl.gn.b.p	noe lys,mlk.Endel kv.Spredte striper ren biot.	60-65						

....2

RANA BLADE TRYCKERI

Lokalitet:

Borehull: 490

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
19,90-21,45	1,55	2gl.gn.b.d	noe mørk,mlk.Endel kv. Spredte gr. 1-2mm							
21,45-21,75	0,30	pegm	hvit,grovk.							
21,75-23,20	1,45	2gl.gn.b.d	Noen mørk,mlk.Enkelte biot. rike striper.Spor gr.0,5-1mm	50-55	0.06	0.06	0.11		2.60	
23,20-24,00	0,80	Tap								
24,00-24,40	0,40	2gl.gn.b.d	samme 2gl.gn.b.d som over		0.01	0.03	0.03		3,29	
24,40-24,60	0,20	2gl.gn.b.p	noe mørk,mlk.-grovk.Endel kv. og hbl.Godt impr.sl,py		2.01	0.49	3.36		11.77	
24,60-26,20	1,80	biot.gn	noe mørk,mlk.Enkelte striper med 2gl.gn b.d.Noe kv.Impr. sl,py	40	0.38	0.30	1.02		6.92	
26,20-26,50	0,30	biot.gn	mørk,mlk.En god del kv. iblandet. Godt impr.sl noe py og po		0.86	0.25	4.91		14.02	
26,50-26,65	0,15	biot.gn	noe lys,mlk.Endel kv.		0.10	0.16	0.59		5.71	
26,65-27,00	0,35	malm	rel.mass.sl.malm.Endel biot gn.iblandet		0.63	0.15	8.60		16.79	
27.00-27,35	0,35	Pegm	hvit,grovk.Noe hbl.Impr.sl, py,po cp		0.06	0.48	0.93		2.60	
27,35-27,55	0,20	hbl.b.a	grønaktig,mlk.Godt impr.sl py,po noe gn		0.91	2.70	7.56		10.56	
27,55-27,83	0,28	pegm	hvit,grovk.		0.38	0.61	1.62		4.29	
27,83-28,05	0,22	malm	rel.mass sl-malm.Endel hbl og kv.iblandet.		1.24	0.21	8.89		9.55	

....3

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 490

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	l.	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
28,05-28,60	0,55	pegm hvit,grovk.Spor impr.		0.09	0.12	0.27		1.91	
28,60-29,20	0,60	2gl.gn.b.p noe lys,mlk-fk.Noe "tett" Endel kv.Spor hbl.		0.08	0.09	0.28		2.30	
29,20-29,40	0,20	2gl.gn.b.d noe mørk,mlk.Sv. impr.sl		0.58	0.16	1.70		4.98	
29,40-30,00	0,60	2gl.gn.b.p noe lys,mlk.Enkelte biot.str. Spredte spor gn 0,5-1mm	70-75	0.05	0.06	0.12		1.84	

13/10-77
K.M.Hegrum
K.M.Hegrum

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.390

Borehull: 489

Dato : Okt. 77
Koordinater : X: 925.470,7 Y: 44.390,6
Retning :
Helling/stigning: +90°
Høyde : - 62,2m
Lengde : 16,20m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0,90	0,90	biot.gn.	lys/mørk,mlk-fl. Veksling mellom rene biot-bånd, og lysere,kv- holdig mat̊r. Spor hbl.Spor impr.		0.08	0.16	0.36		9.05	
0.90 - 1.80	0.90	2gl.gn.b.p	lys,mlk.Kv.holdig. Sv.spor impr.	75-80	0.05	0.06	0.28		2.76	
1.80 - 5.15	3.35	biot.sk.	mørk,grovk.-mlk.Hovedsk. biot-sk, meh. også biot.gn Svært mye kv.og kv.bånd noe hbl.Tildels meget godt impr. sl,py.Også po	75-80	1.92	0.15	7.77		14.59	1.80-3.00
					0.69	0.31	3.51		14.91	3.00-4.00
					0.26	0.33	1.14		12.35	4.00-5.15
5,15 - 6,70	1,55	biot.gn.	noe lys.mlk.Endel kv.Godt impr sl py.Noe gn		1.31	0.14	6.29		9.69	
6.70 - 7.00	0.30	Tap								
7.00 - 9.65	2.65	2gl.gn.b.d	noe lys.mlk.Endel partier biot.gn. Noen kv.linser. Sv.spor impr.	80-85	0.29	0.28	0.75		6.18	7.00-8.50
					0.09	0.06	0.17		6.07	8.50-9,65
9.65 -10.00	0.35	2gl.gn.b.d	noe lys.mlk.Noe kv. Impr. sl,py		1.10	0.20	2.88		6.50	
10.00-10,65	0,65	Tap								
10,65-11.00	0.35	2gl.gn.alm.	Noe lys.mlk.Noe kv.Spredte gn 1-2mm	80-85	0.15	0.03	0.25		2.28	
11.00-11.40	0.40	2gl.gn.b.p	Noe mørk,mlk.Stiper av ren biot.Noe kv.impr. sl,py		0.55	0.31	3.27		6.50	
11,40-12,55	1.15	2gl.gn.b.p	Noe mørl,mlk.Noe kv. Sv. impr py Spor sl		0.29	0.23	0.71		5.64	

...2

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 489

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
12.55-14.00	1.45	2gl.gn.b.d	Nørk mlk-grov. striper ren biot.Spor gr.Q,5mm Impr. py	80-85	0.18	0.09	0.35		6.39	
14.00-16.20	2.20	2gl.gn.b.d.	Noe lys mlk-fl.Virker noe "tett".Endel kv.Enkelte gn 3-5mm	60-65						

6/10-77
K.M.Hegrum
K.M.Hegrum

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.390

Borehull: 488

Dato : Sep. 1977
Koordinater : X:925.47,8 Y 44.391.9
Retning
Helling/stigning: -90^0
Høyde : -64,4m
Lengde : 32,02m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0,00 - 1,35	1,35	2gl.gn.alm	lys,mlk.Stedvis noe kv. Spredte gn. 1-2mm	70-75						
1,35 - 1,55	0,20	2gl.gn.b.d	noe lys,mlk.Spredte gr.1-2 mm							
1,55 - 3,15	1,60	biot.gn	noe lys,mlk.Enkelte striper ren biot.Rel. jevnt besatt gr 1-2mm	75						
3,15 - 5,90	2,75	2gl.gn.b.p	lys,mlk.Enkelte tynne biot rike partier.Spredte gr. o,5-1mm	80						
5,90 - 6,60	0,70	pegm	hvit, grovk.							
6,60 - 9,30	2,70	2gl.gn.alm	lys,mlk.Noe veksling mellom biot-og musk-rike partier.Spredte spor gr.o,5mm							
9,30 - 9,80	0,50	pegm	hvir,grovk.							
9,80 -10,65	0,85	2gl.gn.alm	lys,mlk.Spredte spor gr.0,5m							
10,65 -15,70	5,05	2gl.gn.d.p	noe lys,mlk.Endel veksling mellom biot-og musk-rike partier.Spredte gr.o,5-1mm	80-85						
15,70 -16,60	0,90	Tap								
16,60 -17,05	0,45	2gl.gn.b.p	samme 2gl.gn.b.p som tidligere.							
17,05 -17,30	0,25	pegm	hvit, grovk.							
17,30 -17,85	0,55	Tap								

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 488

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
17,85 - 18,15	0,30	pegm	hvit, grovk.							
18,15 - 10,00	0,85	2gl.gn.b.p	samme 2gl.gn.b.p som før	60-65						
19,00 - 10,40	0,40	Tap								
19,40 - 20,10	0,70	2gl.gn.b.p	samme 2gl.gn.b.p som før	65-70						
20,10 - 22,25	2,15	2gl.gn.b.d	noe lys,mlk.Veksling mellom biot-og musk-rike bånd.Spredte gr 1-2mm. Spor sl på 22,23-22,24	60-65						
22,25 - 28,40	6,15	hbl-biot gn	noe mørk,mlk.Enkelte steder biot.rike partier.Flekker av ren hbl.Endelkv.striper Ujevnt besatt gr 2-4mm rel.jevnt impr py	60-65						
28,40 - 28,85	0,45	amf.	mørk,mlk-fk.Spor skarn.Rel. tett besatt gn.3-5mm							
28,85 - 32,00	3,15	hbl gn	noe mørk,mlk.Noen tynne stiper amf.Spredte gr 2-4mm Impr.py	65						

5/10-77

K.M. Hegrum

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.180

Borehull: 487

Dato : Sept. 77
Koordinater : X: 925.415,0 Y: 44.173,4
Retning : W
Helling/stigning: + 78°
Høyde : ÷ 68,7 m
Lengde 17.99

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0,00 - 0,45	0,45	2gl.gn.h.d	noe lys,mlk.knudel kv. Spor impr.		0.16	0.27	0.75		5.37	
0,45 - 1,00	0,55	2gl.gn.h.d	noe mørk,mlk.Spor hbl.Kv-rik.Rel. godt impr sl,py		1.53	0.78	6.93		11.22	
1,00 - 1,50	0,50	pegm	hvit mlk.Stedvis noe biot impr. sl. gn		6.42	0.21	2.80		3.09	
1,50 - 2,10	0,60	biot.gn	noe lys,mlk.Flekker med hbl.Sv.impr. sl, py	70	0.56	0.35	1.37		9.43	
2,10 - 2,55	0,45	pegm	hvit. grovk.Spor gn		0.58	0.14	0.23		2.77	
2,55 - 3,70	1,15	2gl.gn.h.d	Noe mørk,mlk. Noen kv.linser	70	0.21	0.09	0.28		3.04	
3,70 - 3,75	0,05	pegm	hvit,grovk							
3,75 - 4,20	0,45	Tap								
4,20 - 5,10	0,90	Pegm	hvit. grovk.							
5,10 - 9,00	3,90	hbl-biot gn	noe mørk,mlk.Enkelte biot. rike partier. Jevnt fordelt gr. 1-2mm.Sv.impr.py	70	0.00	0.05	0.04		7.56	7,50-8,30
9,00 - 9,65	0,65	mørk.gn	lys,mlk-grovk. Noen få biot striper Spor py, sl	70	0.03	0.06	0.31		2.11	
9,65 - 10,05	0,40	kv.h.ort	lys,fl-mlk.Spor hbl.Rel. godt impr. sl.Noen cm. py		5.82	0.71	10.89		7.51	
10,05 - 13,30	3,25	2gl.gn.h.d	lys,mlk,fock i kv. Striper. Noe hbl,Stedvis impr.sl,py	50	0.77	0.30	1.85		6.43	12,45-13,30
					0.57	0.52	1.11		5.34	13,30-
					1.17	0.40	3.30		6.51	13,45

Lokalitet:

Borehull: 487

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
13,50 - 18,20	4,70	hbl-biot.gn noe mørk,mlk.Stedvis partier med ren hbl.gn. Rel. jevnt besatt gr 1-3 mm. Enkelte opp mot 5mm.Jevnt impr.py	70	0.17	0.14	0.62		7.32	13,50-15,00

19/9-77
K.M.Hegrum

RAPA BLADS TRYKKERI

Lokalitet Kvaerfjeldmoen
Profil 44.100

Borehull 16e

Dato : Sept. 77
Koordinater : X: 525.390,2 Y: 44.096,9
Retning : N
Helling/stigning: 4 80°
Høyde : 69.3m
Lengde : 14.95m

Dybde	L		Bergart	S	Analyser %Pb	%Cu	%Zn	%S	%Fe	Prøve nr
0,30 - 2,75	2,75	Sgl.gn.alm	lys mlk, Enkelte kv-flekker Stedvis spor hbl. Spredte, flekkvis impr. sl, py, cp	55-60	0.45	0.17	0.94		4.17	0,00-1,50
					0.41	0.31	0.80		3.79	1,50-2,75
2,75 - 5,10	2,40	Sal.m.b.p	Noe lys, mlk. Stedvis kv. linser. Stedvis spor hbl. sl, py, gn.	60	0.80	0.48	2.57		6.82	2,75-4,00
					2.27	0.25	4.26		7.58	4,00-5,15
5,25 - 6,45	1,30	malm	rel.mass.sl-malm med py,gn cp.Kvarts som hovd. b.arts min, også noe hbl.		2.00	0.80	11.03		13.64	
6,45 - 6,80	0,35	blot.gn.	noe lys,mlk.Også noe hbl.sv. impr. sl, py, cp		0.35	1.10	2.66		8.28	
6,80 - 7,35	0,55	malm	rel. mass sl-malm med py, po, gn.		1.55	0.20	17.81		14.78	
7,35 - 8,60	0,25	Sgl.gn.b.p.	noe lys,mlk.Enkel kv. sv. impr. sl, py.	60	0.25	0.26	3.02		5.68	
8,60 -10,10	2,30	blot.gn.	noe mørk,mlk.Enkelte kv. striper.Stedvis flekker av gr. 1-2m. Sv.impr. py.Noen få flekker hbl.	60	0.00	0.19	0.16		9.11	7,60-9,00
10,10 -14,10	3,80	hbl-brot.gn	noe mørk,mlk.Noen kv.linser Rel. jevnt fordelte gn.1-2mm Rel.jevnt fordelt py	40-45						

10/9-77
K.M.Bergrum
K.M. Bergrum

Lokalitet: FORSERINGSORT
PROFIL 44.100

Borehull: 485

Dato : SEPT. 1977
Koordinater : X: 925.384,3 Y: 44.099,9
Retning : W
Helling/stigning: +72°
Høyde : +66,9 m
Lengde : 14,75 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr
0,00 - 1,70	1,70	2gl.gn.alm	lys,mlk.Enkelte biot.rike ly stedvis flekker hbl.Flekkvis impr. sl, py, cp.	60	0.77	0.55	2.46		7.39	0;00-0;80
					0.39	0.86	1.63		8.33	0;80-1;70
1,70 - 3,55	1,85	2gl.gn.b.p	noe lys,mlk.Kv.rik b.art. Spor hbl. Rel.godt impr.sl, py, po,cp	60	1.43	0.60	2.84		8.15	1;70-2;50
					0.65	0.72	3.96		12.13	2;50-3;30
3,55 - 3,85	0,30	Tap								
3,85 - 4,00	0,15	2gl.gn.b.p	samme b.art som for tap		0.72	0.50	3.40		5.12	
4,00 - 5,30	1,30	biot.gn.	noe lys,mlk.Enkelte kv. stiper Sporatiske gr.0,50-1mm Stedvis flekker hbl.Impr. py	60-65	0.13	0.27	0.14		6.63	
5,30 -11,65	6,35	hlb.biot.gn	noe mørk,mlk.Enkelte tynne partier men hbl.gn.Noe ujevnt fordelte gr 1-2mm,Sv impr. py	60-65						
11,65 -11,90	0,25	hbl.gn	Noe mørk,mlk-fl. rel. tett besatt gr. 3-6mm.Alle tydelig stiehtolitisk.							
11,90 -14,85	2,95	hbl.biot.gn	Samme hbl-biot gn som tidligere.	60-65						

10/9-77
K.M. Hegrum
K.M.Hegrum

Lokalitet: Kom.ort
Profil 43.400

Borehull: 484

Dato : Aug.77
Koordinater : x: 925. 428,5 Y: 43.399
Retning : S
Helling/stigning: -35^0
Høyde : -31,3
Lengde : 28.98

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve nr.
0,00 - 14,00	14,00	hbl.gn mørk,mlk.Endel kv.linser.Rel. jevnt besatt gn 1-2mm.Endel biot Rel.jevnt impr.py	15-20						
14,00 -14,30	1,30	2gl.gn.b.d.Mørk,mlk.Spor hbl.Spredte gn 1-2m Impr. py							
15,30-27,00	11,70	hbl.gn mørk,mlk.Endel biot.gn iblandt. rel.jevnt impr py.Spor gn 1-2m	35-40						
27,00-27,45	0,45	2gl.gn.b.d noe lys,mlk.Rel.tett besatt gn 2-5mm.De største tydelig stichtolitisk							
27,45-29,0	1,55	2gl.gn.b.d Noe mørk mlk.Tenderer stedvis mot biot gn.rel tett besatt gn 1-2m Impr. py.Flekk med sl og py på 28,34 - 36	35-40						

1/9-77

R.M.Hegrum

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Kom.ort
profil 43.400

Borehull: 483

Dato : jul 77
Koordinater : x: 925. 428,5 Y : 43.399
Retning : S
Helling/stigning: -45°
Høyde : -31,2m
Lengde : 31,82m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0,00 - 4,50	4.50	hbl.gn	noe mørk,mlk.Endel striper biot. gn. Del jevnt. besatt gn. 0,5-1m rel.jevnt impr. py	25-30						
4,50 - 7,55	3,05	biot.gn	Noe mørk,mlk.Stedvis spor hbl. Endel kv.linser.Stedvis gn-ansamlinger gn 1-2m.Impr. py	25-30	0.05	0.33	0.17		7.65	6,00-7,55
7.55 - 7.75	0,20	musk.gn	lys,mlk-grovk.Stedvis litt biot		0.03	0.08	0.14		3.00	
7,75 - 8,05	0,30	sl-malm	rel. mass. sl-malm med py og gn litt kv. og hbl isprengt		5.09	0.06	12.76		7.95	
8,05 - 9,15	1.10	2gl.gn.alm	lys mlk.Noe kv.		0.07	0.15	0.19		2.85	
9,15 - 9,50	0,35	hbl-biot.gn	Noe mørk,mlk.Endel kv.linser. Impr. sl,py		1.25	1.36	2.24		7.95	
9,50 -13,80	4,30	sl-malm	rel.mass.sl -malm med py og gn. Endel hbl og kv. isprengt. Også cp.		0.82	1.43	9.01		8.05	9,50-10,50
					2.40	1.84	14.80		13.80	10,50-11,50
					4.94	0.19	17.26		13.80	11,50-12,50
					4.27	0.34	16.88		11.55	12,50-13,80
13,80 -19,70	5,90	2gl.gn.b.p	lys,mlk.Noe striper musk.gn.Meget kraftig impr. sl,py.Noe gn cp	25-30	2.24	0.15	4.82		11.55	13,80-15,00
					1.67	0.24	5,45		7.65	15,00-16,00
					2.26	0.17	10.80		6.75	15,00-17,00
					2.68	0.70	6.51		3.15	17,00-18,00
					2.02	0.38	7.09		4.65	18,00-19,00
					2.10	0.40	7.04		4.80	18,98-

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 483

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
19,70 - 20,60	0,90	2gl.gn.b.p lys,mlk-fl.Tildels meget kv.rik rel dårlig impr. sl, py		1.27	0.60	2.95		3.23	
20,60 - 24,60	4,00	2gl.gn.b.p Lys,mørk.Tildels kv. rik.Enkelte kv.striper.Godt impr. sl,py,gn, Spor hbl.		1.37	0.82	4.76		5.38	20,6-21,6
				1.60	0.50	5.12		7.23	21,6-22,6
				1.90	0.31	8.31		6.15	22,6-23,6
				0.77	0.49	3.33		7.38	23,6-24,6
24,60 - 27,30	2,70	2gl.gn.b.d Noe lys,mlk.Endel veksling mellom biot-rike og musk-rike bånd. Noe hbl.Godt impr. sl,py.Noe gn	35-40	1.69	0.53	8.29		10.31	24,6-26,0
				2.47	0.16	8.77		10.77	26,0-27,3
27,30 - 30,30	3.00	2gl.gn.b.d Noe mørk,mlk.Noe kv.Endel biot. gn-rike partier.Noe hbl.Rel.svakt impr.sl,py	30-35	0.36	0.75	0.85		8.31	27,3-28,8
				0.76	0.46	3.82		11.85	28,8-30,3
30,30 - 31,70	1,40	2gl.gn.alm Lys,mlk-fl.Virker delvis noe "tett".Endel kv..Spredte spor gr. 1-2mm	25-30°	0.08	0.05	2.39 *		2.65	

* Noe sl må nå delt mes fra forgående prøve.

1/9-77
K.M.Hegrum
K M Hegrum

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Kom.ort

Profil 43.400

Borehull: 482

Dato : jul 77
Koordinater : x: 925.428,5 Y: 43.399
Retning : S
Helling/stigning: - 55
Høyde : -31.3
Lengde : 27,36

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 1.85	1.85	hbl.gn.	Noe lys, mlk. Endel biot. Spredde gr 1-2m jevnstriper py	30-35	0.02	0.02	0.13		6.88	
1.85 - 2.80	0.95	biot.gn	noe lys,mlk. Endel hbl.Spredte gr 1-2m . Impr. py	30-35	0.13	0.06	0.03		8.72	
2.80 - 3.90	1.10	hbl.biot.gn	litt mørk, mlk. Endel kv.linse Brunlig biot. Spredt impr.sl py, po, cp.		0.86	1.13	1.49		10.06	
3.90 - 4.30	0.40	2gl.gn.alm	lys,mlk-fk litt kv.rik.Stedvis spor hbl. Spredt svak impr sl py	30-35	0.26	0.20	1.03		4.53	
4.30 - 5.70	1.40	sl.malm	massiv sl-malm med py, gn		3.99	0.13	19.07		18.11	
5.70 - 7.20	1.50	2gl.gn.alm	lys,mlk.Meget kraftig impr. sl Enkelte massive malmstriper		5.35	0.17	13.71		13.92	
7.20 -11.75	4.55	musk.gn.	lys.mlk.Noen kv.linser.Spredt noe biot.Vekslende impr. sl, py cp gn.	30-35	0.93	0.29	1.86		4.86	7.20-8.00
					1.47	0.43	1.49		4.36	8.00-9.00
					1.55	0.26	6.62		7.88	9.00-10.00
					0.35	0.31	3.22		8.87	10.00-11.00
					0.52	0.74	5.62		3.19	11.00-11.75
11.75 - 13.35	1.60	2gl.gn.alm	lys.mlk.Enkelte biot.rike striper.Noen kv.linser	40-45	0.03	0.05	0.11		1.09	
13.35 - 16.55	3.20	2gl.gn.b.d.	Noe lys.mlk.Enkelte kv. linser. Stedvis spor hbl. Impr. sl, py cp, gn.	40-45	0.46	0.56	1.97		8.76	13.35-15.00
					0.78	0.41	3.14		8.94	15.00 16.55

FANA GLASS TEKNISK

Lokalitet:

Borehull: 482

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
16.55 - 18.45	1.90	2gl.gn.b.d	Noe lys.mlk.Endel veksling med biot.gn. Stedvis spor skarn spor sl, py	40-45	0.05	0.13	0.31		4.61	16.55-17.50
					0.10	0.10	0.24		3.83	17.50 18.45
18.45 -20.00	1.55	biot.gn	Noe lys,mlk.Stedvis noe musk. Endel kv.og kv.striper.Spor hbl Impr.sl, py, cp gn		1.81	0.69	6.03		8.94	
20.00 -23.60	3.60	biot gn	Samme b.art som over men vesentlig kraftigere impr sl,py,gn	45-50	2.27	0.06	8.24		10.40	20.00-21.00
					3.06	0.83	10.20		10.95	21.00-22.00
					2.77	1.36	8.24		7.66	22.00 23.00
					3.08	1.38	8.30		10.22	23.00-23.60
23.60 -26.30	2.70	musk.gn	lys mlk.kv.rik spredt biot. Spredte gr o.5 - 1mm		0.03	0.04	0.14		1.28	23.60 25.00
26.30 -27.45	1.15	2gl.gn.b.d.	lys,mlk.Noen kv.striper.Noe ujevnt besatt gr 1 - 2mm	45-50						

1/9-77
K.M.Hegrum

KANA BLADS TEKSER

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.370

Borehull: 481

Dato : Jun -Jul.77
Koordinater : x: 925.457 Y: 44.367,2
Retning : N
Helling/stigning : + 5°
Høyde : ÷ 67,4 m
Lengde : 19,76

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0,00 - 3,00	3,00	hbt-biot gn.	Mørk, mlk-grovk. Noe kv. spredte gn. 1-2mm, Sv.impr py.	Hullet nesten skifrigteten S svinger mellom 0° og 10°	går langs					
					0.02	0.13	0.29		11.19	1.50-3.00
3,00 - 4,40	1,40	biot gn	mørk, grovk. mlk. Noe kv.spor hbl. Sv impr. ep, py	- " -	0.01	0.45	0.12		19.13	
4,40 - 8,70	4,30	hbl.gn.	mørk, mlk-grovk. Noe grovk. biot. Enkelte kv. og pegm. striper. Spredte gn. 1-2mm. Sv.impr. py Stedvis spor ep	- " -	0.01	0.34	0.09		13.78	4.40-5.50
8,70 - 9,00	0,30	Tap								
9,00 -11,15	2,15	hbl-gn.	Samme b.art som før Tap	- " -	0.01	0.08	0.03		8.75	10.00-12.15
11,15 -17,60	6,45	biot-hbl.gn	Mørk, grovk. Noe kv. Svært mye grovk. biot. Impr sl, py	- " -	0.02	0.12	0.48			11.15 - 12.00
					0.51	0.34	3.71			12.00 - 13.00
					0.23	0.32	1.94			13.00 - 14.00
					0.06	0.30	1.65			14.00 - 15.00
					0.05	0.37	0.89			15.00 - 16.00
					0.04	0.24	1.89			16.00 - 17.00
					0.05	0.31	2.09			17.00 - 17.60
17,60-18,00	0,40	Tap								
18,00-19,90	1,90	biot-hbl.gn.	Samme b.art som før Tap	- " -	0.07	0.50	1.27		14.27	18.00-18.90
					0.07	0.13	0.46		6.74	18.90-19.76

8/7-77
K.M.Hegrum
K.M.Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.370

Borehull: 480

Dato : Jun 77
Koordinater : x: 925.457.1 Y: 44.367,3
Retning : N
Helling/stigning : - 60°
Høyde : ÷66.2
Lengde : 16,72

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0,00 - 4,95	4,95	hbl.gn.	Noe lys,mlk.En del striper grovk.biot. Noenkv.linser Delvis noe ugjevnt besatt gn 1-3mm. Sv.impr. py	2m:45° 3m:30° 4m:45-50°						
4,95 - 5,45	0,50	2gl.gn.b.d.	Noe mørk,mlk.Spor hbl. Noe kv. Impr. py 3cm stripe sl i forb. med hbl.							
5,45 - 8,15	2,30	2gl.gn.b.p.	Lys,fk. mlk. Virker noe "tett".Noen tynne partier med grovk.biot. ny kv. spredte gn 1-3m	60°						
8,15 - 8,70	0,55	kv.biotb.a	lys/mørk,grovk.B.n av hovedsaklig kv-pegm + biot.Spor hbl.og skarn.Spor py							
8,70 - 9,00	0,30	Tap								
9,00 - 9,10	0,10	kv.biot b.n.	Samme b.a som før tap							
9,10 - 9,40	0,30	pegm	hvit,grovk.							
9,40 -10,35	0,95	biot.gn.	lys,fk.mlk.hovedsaklig kv, biot.Enkelte striper ren biot.Spor gn.1-3m.sv.impr. py	70°	0.02	0.05	0.27		4.04	
10,35-12,00	1,65	biot-hbl.gn	Noe mørk,mlk.Enkelte kv.Noe ren biot.Sv.impr Py	70°	0.03	0.06	0.13		6.90	

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet:

Borehull: 480

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning :
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
12,00-12,45	0,45	hbl.gn	lys,mlk.Impr.sl,py.Spor gn		0.95	0.35	2.82		5.90	
12,45-13,70	1,25	2gl.gn.dm	lys mlk.Et par pegm-striper Spor py.	60^0	0.03	0.04	0.06		2.14	
13,70-16,80	3,10	2gl.gn.b.p.	lys,mlk.Noe ekstra biot rike partier,Enkelte pegmstriper Spredte gn 1-2m	$45-50^0$						

8/7-77
K.M.Hegrum
K M Hegrum

KANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Forseringsorten
Profil 44.370

Borehull: 479

Dato : Jun. 77
Koordinater : x 925.949,7 y: 44.370,6
Retning : E
Helling/stigning: +68°
Høyde : ÷640 m
Lengde : 15,10

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0,00- 0,70	0,70	2 gl.gn. b.d.	Noen mørk, mlk. Enkelte kv.striper Spor gn. 1-2mm Spor Py							
0,70- 1,00	0,30	kv. linse								
1,00- 1,65	0,65	2 gl.gn.b.d.	Noe mørk, mlk. m.sv.spor py	45	0.16	0.07	0.64		3.53	
1,65- 2,00	0,35	2 gl.gn.b.d.	samme 2gl.gn.b.d. som over. Sv. impr. sl, py		1.19	0.28	3.45		6.06	
2,00- 2,40	0,40	2 gl.gn.b.d	Noe mørk,mlk.Spor gn 1-2m	45	0.07	0.03	0.22		3.20	
2,40- 2,55	0,15	2 gl.gn.b.d	Samme som over. Sv.spor sl, py		0.29	0.25	1.35		6.90	
2,55- 2,85	0,30	2 gl.gn.b.d	Samme 2gl.gn.b.d som over	60	0.01	0.02	0.06		1.34	
2,85- 3,10	0,25	kv. linse								
3,10- 4,45	1,35	2gl.gn.b.d.	Noe mørk,mlk.Enkelte kv.striper.Spor gn. 1-2mmSv.spor py,sl	60	0.03	0.03	0.07		2.86	
4,45- 4,65	0,20	2gl.gnb.d.	Samme 2gl.gn.b.d. som over.Impr.sl,py		1.02	0.26	1.70		4.37	

KANA BLADT TRYKKERI

alitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 479

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
~~4,45- 4,65~~	~~0,20~~	~~2gl.gn.b.d.~~	~~Samme 2gl.gn.b.d.som over. Impr. sl.py~~							
4,65- 5,00	0,35	2gl.gn.b.d.	Samme 2gl.gn.b.d.som over.	60	0.10	0.09	0.32		2.94	
5,00- 5,50	0,50	2gl.gn.b.p	Noe lys,mlk. Noe kv.Sv. impr.py spor sl		0.59	0.22	1.24		6.22	
5,50- 5,90	0,40	2gl.gn.b.p.	Samme som over.spor py	70	0.41	0.17	0.96		4.79	
5,90- 6,15	0,25	2gl.gn.b.p.	Samme som over.Spor py, sl		0.77	0.15	1.56		5.89	
6,15- 8,00	2,85	2gl.gn.b.d.	Noe mørk,mlk.Enkelte kv striper. Et par flekker hbl. spor gr 0,5-1mm. Sv.spor py	70 75	0.06	0.04	0.23		4.71	6.15- 7.50
8,00- 9,55	1,55	2gl.gn.alm	lys,mlk.Enkelte kv.striper	70						
9,55-10,00	0,45	Tap								
10,00-11,40	1,40	2gl.gn.b.p.	lys,mlk.Noen få biot. rike striper.	70						
11,40-12,60	1,20	2gl.gn.b.d	Noe mørk,mlk.stedvis spor py.Noen kv.linser							
12,60-14,20	1,60	Pegm	hvit,grovk. Et har tynne striper 2gl.gn.b.d							
14,20-14,95	0,75	2gl.gn.b.d	Noe mørk,mlk.Endel kv. striper.Sv.impr. py. Spor hbl.Spredte gr. 1-2mm	60						

29/6-77
K.M.Hegrum
K.M.Hegrum

RANA BLADS TRYKKERI

Lokalitet: Kom.ort
Profil 43.400

Borehull: 478

Dato : Jun. 77
Koordinater : X: 925 428,5 Y: 43 399
Retning : S
Helling/stigning : -65^0
Høyde : ÷ 319 m
Lengde : 28.88

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0,00 - 1,90	1,90	hbl.gn.	Noe mørk mlk Tenderer stedvis mot biot gn m/hbl.Jevnt besatt gn 1-2mm Sv.impr.py	40^0	0.05	0.06	0.10		6.24	
1,90 - 2,50	0,60	hbl.gn.	Noe lys,mlk.Striper av 2gl.gn alm.Endel kv.Godt impr.sl py, gn.	$40-45^0$	1.51	0.69	6.56		8.50	
2,50 - 2,95	0,45	malm	mass. sl-malm		4.12	0.05	18.48		17.57	
2,95 - 5,45	2,50	2gl.gn.alm	lys,mlk.Noen striper musk. gn.Impr. sl,py, noen cp	45^0	1.03	0.17	3.80		5.24	2.95-4.00
					0.74	0.21	1.92		5.81	4.00-5.45
5,45 - 6,00	0,55	2gl.gn.alm	lys mlk.Tenderer mot musk. gn.Spor py	45	0.14	0.11	0.34		3.83	
6,00 - 7,10	1,10	2gl.gn.b.p.	lys mlk.Endel hbl.Godt impr. sl,py.Endel partier særdeles cp-rik		0.28	3.84	3.00		12.33	
7,10 - 7,85	0,75	musk.gn.	lys mlk,Spor biot.Spor impr.	40	0.09	0.39	0.35		2.13	
7,85 - 9,85	2,00	kv.pegm.b.a	lys mlk-grovk.Består hovedsaklik av kv. og pegm.Spor biot.Flekker hbl.Godt impr. sl, py, cp.		0.25	0.95	5.20		9.64	7.85-9.00
					0.90	2.21	2.09		11.20	9.00-9.85
9,85 -10,25	0,40	kv.pegm.b.a	lys,mlk-fl. En mere fk.utg. av b.arten over.		0.47	0.22	0.94		1.28	
10,25 -10,90	0,65	kv.pegm.b.a.	samme b.art som over.Impr sl, py, cp.		0.57	0.86	3.28		7.14	
10,90 -11,30	0,40	musk	lys,mlk.Spor biot.Sv.impr.	40	0.09	0.73	0.46		6.67	

KARA GOLDS INTEKERI

Lokalitet:

Borehull: 478

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning :
Hoyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
11,30 -13,45	2,15	2gl.gn.b.d.	Noe,mlk.Litt grovk.biot.Noe kv.Godt impr.sl,py.		0.82	0.89	2.21		9.31	11.30 - 12.50
					1.23	0.69	3.74		11.02	12.50 - 13.45
13,45 -18,00	4,55	2gl.gn.b.p.	lys mlk.Endel kv.og pegm striper.Spredte yr. 1-2mm 16,27-16,34:impr.sl,py,gn.	40-45	0.03	0.05	0.15		2.64	13.45 - 15.00
18,00 -18,40	0,40	pegm	hvit,grovk.							
18,40 -23,55	5,15	2gl.gn.b.p.	samme b.art som ovenfor	45-50						
23,55 -23,85	0,30	pegm	hvit, grovk.							
23,85 -24,60	0,75	2gl.gn.b.p.	samme b.art som ovenfor	45-50	0.06	0.04	0.11		0.93	
24,60 -25,70	1,10	pegm	hvit,grovk.							
25,70 -25,75	0,05	biot.gn.	mørk,grovk.Noe hbl.Godt impr sl		1.61	0.31	8.99		9.62	
25,75 -26,20	0,45	2gl.gn.b.p.	lys,mlk.		0.02	0.05	0.11		2.17	
26,20 -26,75	0,55	biot.gn.	mørk,mlk.Noen striper 2gl.gn. p.Endel hbl.Meget godt impr. sl, py.Noen cp, gn.		1.94	0.25	10.00		13.97	
26,75 -28,90	2,15	2gl.gn.b.p.	lys,mlk.Noe pegm.Spredte gn 1-2 mm	60	0.12	0.03	0.35		2.79	26.75-28.00

8/7-77
K.M.Hegrum.
K.M.Hegrum.

KANA BLADE TRYKKERI

Lokalitet: Kom.ort
Profil 43.400

Borehull: 477

Dato :Jun. 77
Koordinater :x: 925.428,5 Y: 43.399
Retning :S
Helling/stigning: -75°
Høyde :-31,4 m
Lengde :27.36m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 1.00	1.00	hbl.gn	noe lys,mlk.Jevnt besatt gr 1-2mm. Rel.jevn impr. py	50°	0.17	0.05	0.52		7.50	
1.00 - 1.50	0.50	2gl.gn.b.d	noe lys mlk. Stedvis spor hbl. Spredte gr 1-2mm.Sp, impr,py		0.02	0.12	0.09		7.50	
1.50 - 2.50	1.00	2gl.gn.alm/ musk gn	lys,mlk.Stedvis litt biot. Noe kv. jevne impr sl,py,cp,gn	45-50°	1.89	0.60	6.04		8.50	
2.50 - 4.65	2.15	2gl.gn.alm	lys,mlk.Enkelte partier musk, gn.Noe hbl i flekker.Antydvis på 3.73.Flekkvis impr. sl,py, gn,cp	50	0.68	0.15	1.45		3.33	2.50-3.50
					0.66	0.62	2.32		9.50	3.50-4.65
4.65 - 5.50	0.85	2gl.gn.alm	lys,mlk.Spor gr 1-2m		0.02	0.05	0.08		2.67	
5.50 - 5.80	0.30	biot gn	noe lys,mlk.Endel kv.linder. spor gr 1-2m							
5.80 - 8.15	2.35	2gl.gn.alm	lys,mlk.Stedvis flekker hbl. Spor impr. sl,py:7.15-7.25	50						
					0.13	0.28	0.49		2.93	7.00-8.15
8.15 - 8.80	0.65	2gl.gn.b.p	noe lys,mlk.Spor hbl.Spor gn 1-2m. sv.impr.sl,cp.py		1.28	0.55	0.12		4.00	
8.80 - 9.35	0.35	kvarts/ kalksp.b.a	lys,mlk.Spor biot sv.impr.sl,cp, py		0.56	0.31	1.54		1.67	
9,35 -10.00	0.65	2gl.gn.b.p	noe lys,mlk.Noen biot-flekker Spor gr 1-2mm		0.36	0.19	0.08		3.17	
10.00 -10.80	0.80	2gl.gn.b.p	Noe lys,mlk.Endel kv.linser og flekker av biot.Impr.sl,py, spor cp		0.82	0.50	2.27		7.67	

RANA BLADD (NYKKEL)

Lokalitet:

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

Borehull: 477

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
10.80-13.75	2.90	2gl.gn.b.p.	Noe lys,mlk.Enkelte biot.Her spor gr. 1-2m		0.00	0.03	0.07		2.17	10.80-12.00
13.75-14.10	0.35	biot.gn	mørk,mlk.Striper av 2gl.gn.b.p Biot.gn tett besatt gr. 1-4m							
14.10-21.65	7.55	2gl.gn.b.p	noe lys,mlk.Striper 5-10cm av biot.gn.Spredte gr.1-2mm i 2gl.gn.Tett besatt gr 2-4m i biotgn.Flekker med sl,py,på 19.85	45-50	0.19	0.16	0.57		2.50	20.00-21,65
21.65-22.15	0.50	2.gl.gn.b.p	Noe mørk,mlk.Godt impr sl,py. Spor gn		1.46	0.39	5.02		11.83	
22.15-23.45	1.30	2gl.gn.alm	lys,fink. Noe tett. sl på 23,15	45-50	0.28	0.10	0.68		3.00	
23.45-25.25	1.80	2gl.gn.b.p	noe mørk,mlk.Noen biot.striper Spor hbl.Godt impr.sl,py, Noe cp,gn	på 23.80	2.73	0.49	8.20		12.67	
25.25-25.45	0.20	2gl.gn.b.p	Noe mørk,mlk. Spor impr.		0.82	0.33	3.57		7.83	
25,45-26.65	1.20	pegm	hvit, grovk.		0.11	0.05	0.68		0.85	

25/8-77
K.M.Hegrum
K.M.Hegrum

KANA GLADS TRYKKERI

Lokalitet: Kom.ort

Profil 43400

Borehull: 476

Dato : Juni -77
Koordinater :
Retning : S
Helling/stigning: -87°
Høyde :
Lengde : 29,15

Dybde	L	Bergart	S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0.00 - 0.50	0.50	hbl.gn Mørk. Har et vist amf. prg. Spredte gr. 1-3mm Sv. ingen py lys, mlk- Sv. ingen py	45	0.23	0.08	0.44		6.81	
0,50 - 0.90	0,40	2 gl.gn.b.p Lys,mlk-Sv.ingen py	45						
0,90 - 1.60	0,70	2 gl.gn.b.p lys,mlk. Tidels sterke innslag av hbl og hv Impr. sl,py,noe cp		1.34	0.60	4.42		8.75	
1,60 - 23,70	22,10	2 gl.gn.b.p. lys,mlk. Noen innslag av 2gl.gn.b.d. Enkelte tynne striper biot.gn Her ofte gn. 1-4mm tynne striper hy-sl. på:2,60-2,65, 2,95-3,0 8,75-8,80,9,15-9,25, 9,73-9,76	4m:85° 6m:90° 8m:80° 10m:7[illegible]° 12m 16m:70° 18m:60° 20m:60° 22m:60°	0.26	0.19	0.53		2.76	1.60-2.60
				0.57	0.46	1.23		5.03	2.60 - 3.00
				0.06	0.03	0.12		2.76	3.00 - 4.00
				0.35	0.11	0.12		3.09	7.50-8.75
				0.45	0.40	1.08		4.70	8.75 - 9.80
				0.00	0.01	0.03		1.62	9.80 - 11.00
				0.06	0.20	0.09		2.27	22.50-23.70
23,70 - 24,00	0,30	hbl-biot.-gn mørk mlk- Sl.impr. sl, py		0.24	1.28	0.82		10,37	
24,00 - 24,40	0,40	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk. Ganske mye pegm ,biot grovt		0,12	0.13	0.26		2.76	
24,40 - 25,35	0,95	biot. gn Mørk, grovt, spor musk Endel kv. Noe hbl. Impr. sl, py, po, cp		0.42	0.69	0.67		9.99	
25,35 - 29,15	"	2 gl.gn.b.p. Noe lys.mlk. Noe "tett" stedvis. Spredte gn. 1-3m. Enkelte kv. striper.	65-70°	0.01	0.03	0.04		1.62	25.35-26.50

22/6-77
K.M.Hegrum
K.M. Hegrum

RANA GLADE TRYKKERI

Lokalitet: Linse 2.Stuff 2
Profil 43.640

Borehull: 475

Dato : Mai - juni 1977
Koordinater : X:925.412,5 Y:43.644,3
Retning : E
Helling/stigning: -70^0
Høyde : -56,0
Lengde : 13,63

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prøve m
0,00-0,40	0,40	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk. Enkelte striper biot							
0,40-1.15	0,75	TAP								
1.15-6,85	5,70	2 gl.gn.b.p.	lys mlk. Noen striper biot. gn. Enkelte pegm striper.Spredte gn 1-3m	45^0						
6,85-8,35	1,50	biot gn.	mørk,mlk-fk.Noen kv. striper.Spredte gy 2.5mm	45						
8,35-8,65	0,30	2 gl.gr.b.p.	lys,mlk.		0,37	0.09	0.47		1.46	
8,65-9,10	0,45	pegm	hvit grovk.							
9,10-9,45	0,35	TAP								
9,45-10,40	0,95	2 gl.gn.b.d.	Mørk mlk.Tildels sterke innslag av ren biot.Spor hbl.Tegn sl.,py		1.00	0.48	2.49		9.24	
10,40-11,80	1,40	2 gl.gn.b.d.	Noe mørk mlk. Ganske mye striping av kv. og biot	40-45	0.22	0.15	0.38		3,73	
11,80-13,60	1,90	2 gl.gn.b.d.	Noe lys,mlk. Mere homogen enn b.art. over. Spor gn 1-2m	45						

16/6-77
K.M.Hegrum
K.M.Hegrum

Lokalitet: Linse 2, Stuff 2
Profil 43.640

Borehull: 474

Dato : MAI, 1977
Koordinater : X: 925.408,5 Y: 43.643.0
Retning : S
Helling/stigning: + 60°
Høyde : ÷ 54.1 m
Lengde : 15.10 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.20	0.20	biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.		0.00	0.03	0.04		2.08	
0.20 - 0.90	0.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. Noen biot-striper							
0.90 - 1.25	0.35	hbl.gn.	Mørk,mlk. Noe kv. Impr. sl, py.		1.37	1.65	6,19		11.74	
1.25 - 2.40	1.15	2 gl.gn.b.p.	Lys, mlk. Noe kv. Endel biot.str. Spor hbl. Impr. sl, py.	45	1.19	0.49	4.70		10.90	
2.40 - 3.80	1.40	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. Noen kv-striper. Spredte gr. 1-3 mm.	75-80	0.07	0.07	0.36		1.73	
3.80 - 4.40	0.60	2 gl.gn.alm	Samme 2gl.gn.alm som over. Impr. sl. , py.		0.57	0.37	3.61		8.65	
4.40 - 5.10	0.70	2 gl.gn.b.p.	Noe mørk, mlk. Impr. sl. py. Spor cp,gn.	65-70	1.26	0.44	3.11		9.87	
5.10 - 6.65	1.55	2 gl.gn.b.p.	Mørk. mlk. Spor hbl. Meget godt impr. sl. py.		3.26	0.23	16,79		11.94	
6.65 - 7.35	0.70	2 gl.gn.b.d.	Mørk. mlk. Spor hbl. Spor cp, po,py.	60 65	0.17	0.41	0.39		8.48	
7.35 - 14.20	6.85	hbl -biot.gn	Mørk. mlk. Noen kv.str. Impr. py.	65 70	0.00	0.06	0.04		6.58	7.35-8.50
14.20-14.60	0.40	amf	Mørk. mlk. Noe kv.Rel. tett besatt gn 2-5 mm Enkelte tydelig stichtolitisk							
14.60-14.90	0.30	hbl-biot.gn	Samme hbl-biot.gn som over	65-70						

12/5-77
K.M. Hegrum

KARA SLAGS TRYKKERI

Lokalitet: Linse 2, Stuff 2
Profil 43.640

Borehull: 473

Dato : April 1977
Koordinater : X:925.414.6 Y:43.644,1
Retning : N
Helling/stigning: + 60
Høyde : - 53.9 m
Lengde : 19.64 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser % Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 3.35	3.35	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk-fk.Noe "tett".Endel ekstra biot-rike striper. Spredte gr. 1-3 mm.	35-40	0.04	0.02	0.25		2.77	2.50 - 3.35
3.35 - 3.70	0.35	2 gl.gn.b.p.	Samme 2 gl.gn.b.p. som over. Har ca. 5 cm med kraftig impr. sl,py, + impr-flekker		2.53	0.40	5.71		5.54	
					0.00	0.02	0.04		1.21	3.70 - 5.00
3.70 - 11.90	8.20	2 gl.gn.b.p.	Samme 2 gl.gn.b.p. som over	40-45	0.01	0.02	0.11		1.38	10.50 - 11.90
11.90 - 13.00	1.10	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. Stedvis tynne biot-striper. Impr. sl, py.	45	0.56	0.14	3.08		9.35	
13.00 - 13.90	0.90	2 gl.gn.b.p.	Noe mørk,mlk.Spor hbl.Meget godt impr. sl, py.		3.87	0.10	15.05		10.73	
13.90 - 14.40	0.50	2 gl.gn.b.p.	Noe mørk,mlk. Spor hbl. Impr. py.		0.34	0.25	0.03		5.54	
14.40 - 19.50	5.10	biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. Endel kv.striper. Spredte gr. 1-3 mm.Rel.jevnt impr. py.	40-45	0.06	0.03	0.06		5.19	14.40 - 15.50

12/5 1977
Kaare M. Hegrum
Kaare M. Hegrum

KAMA GLADS TRYKKERI