



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 3347	Intern Journal nr	Internt arkiv nr Boks nr 13	Rapport lokalisering Nordland	Gradering
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Kjerneboringer Mofjellet Grubefelt. Dagboringer på Mofjellgrubesonens bergarter DU/DV 193-5-1+2. 1961-1984				
Forfatter		Dato 19	Bedrift Bergverkselskapet Nord-Norge A/S	
Kommune Rana	Fylke Nordland	Bergdistrikt Nordlandske	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Fagområde	Dokument type	Forekomster		
Råstofftype	Emneord			
Sammendrag				

FORKORTELSER OG UTTRYKK I BORKJERNEBESKRIVELSER.

Bergarter:

grå gneis	alminnelig (vanlig) type: lyse, finkornige, ofte homogene gneiser med omtrent like mye biotitt og muskovitt.
grå gneis, b.p.	grå gneis, biotittpreget type, hvor biotitt dominerer over muskovitt-innholdet.
grå gneis, b.d.	grå gneis, biotitt-dominert type, hvor biotitt er det altoverherskende glimmermineral. Biotitt-innholdet kan være lavt, og da er gneisen meget lys.
gn.	gneis
sk.	skifer
amf.	amfibolitt
Pegm.	pegmatitt

Structurelle uttrykk:

S	Under kolonne S: foliasjonens (skiffrighetens, lagdelingens, bandingens) vinkel med kjerneaksen.
åpne folder	angir denne foldestil 
spisse folder	angir denne foldestil 

Forkortelser:

?	formodet, usikker identifikasjon
alm.	alminnelig
avt.	avtagende
biot.	biotitt
klor.	kloritt
ca.	circa
cp.	chalcoppyritt
D	Disthen
(D)	omdannet disthen (i blek grønlig Mg-kloritt)
delv.	delvis
disk.	diskordant
diss.	disseminasjon, disseminert
evt.	eventuelt
f.	førende
feltsp., fsp.	feltspat
fink.	finkornig
gl.	glimmer
gln. (ga)	galena
gn.	gneis
gr.	granat
graf.	grafitt
grovk.	grovkornig
hbl.	hornblende
hom.	homogen
hor.	horisont

impr.	impregnasjon, impregnert
inkl.	inklusiv, inkludert
innh.	innhold
ka.	kalk, karbonat
kv.	kvarts
lign.	lignende
m.	meget
maf.	mafisk
mlk.	mellomkornig
musk.	muskovitt
omd.	omdannet
po.	pyrrhotitt
py.	pyritt
rel.	relativ
sl.	sfaleritt
staur.	staurolitt
st.	sterk
stict.	stictolittisk
sv.	svak
tilt.	tiltagende
v, var.	varierende

MOFJELL GRUBEFELT

diamentborhull fra dagen
over gruben og i grube-
feltet.

Økokartbladene: DU 193-5-1+2
DV 193-5-1+2

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8432

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29.55 - 30.15	0.60	gr.amf.	En del biot.						
30.15 - 31.20	1.05	biot.gn.	Avtagende hbl.og gr.innhold.						
31.20 - 33.65	2.45	grå gn.	G1-fattig,b.d.Noë gr.Mot slutten noe mer gl og:						
33.65 - 36.10	2.45	gr.hbl.biot.gn.	Noë amfibolittisk.						
36.10 - 37.50	1.40	gr.biot.gn.							
37.50 - 37.70	0.20	amf.							
37.70 - 42.70	5.00	grå gn.	Vanlig type.Amf.bånd på 41.35-41.55 og 42.45-42.50.						
42.70 - 42.90	0.20	amf.	Foldet.						
42.90 - 45.00	2.10	grå gn.	Vanlig-m.p.i starten. Fra 43.5 noe foldet.						
45.00 - 45.65	0.65	hbl.biot.gn.	Åpne folder.						
45.65 - 50.00	3.45	grå gn.	Noë gr.Vanlig type-m.p. Fra 47.0-47.6 åpne folder Fra 47.6: Fra 48.0 Økende til 65 Fra 49.4 åpne folder.						

19.2.1985

A. Kruse

Lokalitet: MOFJELLET - SKISTUA ØST

Dato : oktober 1984

Koordinater : ca. 45.375 Y, ca. 925.405 X

Retning : rett S

Helling/stigning: 30°

Høyde : ca. 204 m.o.h.

Borehull: 8432

Lengde : 50.0 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	jordboring							
2.50 - 3.85	1.35	grå gn. Gr.b.d.Åpen fold på 3.2m Noe olivengrønlig skarn.	75-65						
3.85 - 4.50	0.65	Pegm. Musk. biot.							
4.50 - 6.25	1.50	gr.hbl.gn/amf. I starten en del biot.og olivenfarget skarn.	70						
6.25 - 7.15	0.90	grå gn. Spredt litt gr.Noë gyllen og olivenfarget skarn. v Rel.spisse folder(45°åpn.)	70-65						
7.15 - 8.35	1.20	gr.amf. S økende fra 60 til	75						
8.35 - 20.10	11.75	grå gn. Gr.I starten m.p-m.d, fra 9.8 b.p.Fra 11.0 m p.og noe foldet.Fra 14.0 Tildels noe musk.gn-aktig og gl-rikere.Fra 15.0 åpne v folder Fra 17.0 spisse folder? Fra 17.4:vanlig,men med musk.gn.bånd.	75 50 v 0-80 80-60 70						
20.10 - 20.55	0.45	Pegm.							
20.55 - 26.55	6.00	musk.biot.gn. G-type.Noë båndet.Finmlk. Sv.po-diss.mellom 22.60- 22.70.Musk-rikere og biot rikere bånd i avveksling	80 60-80 mye75						
25.55 - 26.30	0.75	gr.hbl.biot.gn. Finmlk.	75						
26.30 - 29.55	3.25	musk.gn. av G-type.I starten noe biot.og: Fra 27.0: Mot slutten mer biot.og:	55 65 70						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8431

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		Mot slutten lite hbl.og en del musk.							
62.10 - 62.55	0.45	Gr.amf.	Noe biot.	45					
62.55 - 66.45	3.90	grå gn.	m.p.Noe gr.Musk.rike bånd Gr.hbl.biot.gn.uten py på 62.95-63.05 Deretter økende S Fra 64.3: Fra 66.3 avtagende S	50 50 60 70					
66.45 - 66.75	0.30	gr.hbl.biot.gn.		45					
66.75 - 69.30	2.55	grå gn.	m.p.Noe gr.Åpne småfolder v 0-40 Fra 68.0 med m.d.og på slutten åpen detaljfold.	70					
		19.2.1985							
		A. Kruse							

Lokalitet: MOFJELLET - SKISTUA

Borehull: 8431

Dato : oktober 1984
 Koordinater : ca. 45.268 Y, ca. 925.517 X
 Retning : rett S
 Helling/stigning: 60°
 Høyde : ca. 190 m.o.h.
 Lengde : 69.3 m

side 1

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.80	2.80	jordboring							
2.80 - 4.40	1.60	grå gn.	Åpne folder. Noe gr.	v					
4.40 - 9.50	5.10	gr.amf.	I foldeombøyningene av og til noe olivengrønlig skarn. Åpne folder Fra 7.0-8.0: Deretter igjen åpne folder	v 0-70 70-75 0-75					
9.50 - 22.40	12.90	grå gn.	Noe gr. Vanlig-b.p. Fra 10.0: Åpne folder Fra 12.2 mest Lokalt fortsatt noen små detaljfolder.	20-40 v (0-80) 80					
22.40 - 23.00	0.60	muks.biot.gn.		70					
23.00 - 23.30	0.30	gr.amf.		80					
23.30 - 62.10	38.80	gr.hbl.biot.gn.	Py-impr. Åpne folder Fra 28.5 m: S ofte vanskelig å se. Fra 38.0 m: Fra 43.0 m noe foldet. En del anhydritt. S vanskelig å se. Åpne folder fra 50.0-53.0. Deretter S vanskelig å se Fra 56.0 og avtagende S. Foldet fra 59.0 Fra 60 S økende fra til	v (0-80) 70-80 55 v 45-35 v 30 45					
		2							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8430

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
41.70 - 47.40	5.70	musk.gn.	S og fold på 40.65. Deretter: Fortsatt spredt litt hbl. Småfoldet fra 41.25. Noe biot.Meget spisse folder med akseplan 50° Fra 42.0 rel.spisse folder,men også mye Åpne folder mot slutten.	70					
47.40 - 48.05	0.65	malmimpr.	Py+sl i musk.biot.gn. Noe hbl.	0.23	0.06	0.81	3.1	4.3	47.40-48.05
48.05 - 50.50	2.45	gr.hbl.biot.gn.	Noen åpne folder i starten.Deretter py-impr.Avtagende S og fold.						
50.50 - 53.20	2.70	musk.biot.gn.	Noe gr.Litt grå gn-aktig. Noen åpne folder eller fleksurer.	25-40 (0-50)					
53.20 - 61.70	8.50	gr.hbl.biot.gn.	Py-impr.Større åpen fold med foldeombøyning mellom 55.0 og 57.0: Deretter åpne folder eller fleksurer.Mot slutten	30 0 0-50 20-30					
61.70 - 64.30	2.60	grå gn.	m.p.Noie musk.biot.gn-aktig Spredt noe gr.Åpne folder	0.40					
64.30 - 68.10	3.80	musk.biot.gn.	Noe gr.og hbl.Py-impr. Fortsatt noe foldet,men mye	40					
			19.2.85 A. Kruse						

Lokalitet: MOFJELLET - SKISTUA

Borehull: 8430

Dato : sept./okt. 1984
 Koordinater : ca. 45.268 Y, ca. 925.517 X
 Retning : rett S
 Helling/stigning: 40°
 Høyde : ca. 190 m.o.h.
 Lengde : 68.1 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.25	3.25	jordboring					g/t Ag		
3.25 - 7.55	4.30	gr.amf.	Åpne folder v (0-60) Mest: 0-30 Fra 6.70: 50-65						
7.55 - 19.50	11.95	grå gn.	Gr,b.p.-vanlig.Noen inn- foldete bånd gr.amf.mel- lom 8.80 og 9.30.Åpne folder fra 10.0-13.0 v Fra 13.0: 80 Mellom 13.20-14.20 spisse innfoldinger av smale bånd gr.amf. 80-60 Fra 14.20: 60 Fra 14.50-15.70:åpne folder v Fra 15.70: 60 Fra 16.50:spisse folder 50-70 med gr.amf.bånd. Fra 18.0: 70						
19.50 - 35.60	16.10	hbl.biot.gn.	Hengbergarttype.Py-impr. I starten noe gr. 40 S økende,ved 20.8 m 65 Fortsatt noe foldet,men 40-70 mye Fra 29.10 60-70 Mot slutten noe foldet.						
35.60 - 37.25	1.65	musk.gn.	Rel.gl-fattig.Noie biot. 50-65						
37.25 - 41.70	4.45	malmimpr.	Py+sl+noe gln og noe cp 60 i musk.biot.gn.Fra 39.60 også noe hbl.og gr.(til 40.25)Fra 40.0 avtagende	0.23 0.63	0.33 0.29	2.02 1.88	9.6 16.2	7.8 6.3	37.75-39.50 39.50-41.70
		2							

Borehull: 8429

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
59.40 - 59.90	0.50	musk.gn. Gr.type.Noë biot.	60-65						
59.90 - 60.00	0.10	pegm.							
		19.2.1985							
		A. Kruse							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8429

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S g/t Ag/Au	% Fe	
40.85 - 41.10	0.25	Pegm.	Musk.						
41.10 - 41.70	0.60	musk.gn.	Noe gr.og biot.						
41.70 - 44.10	2.40	malm	py+sl+noe gln i musk.biot. gn.Noen åpne og noen spisse folder fra 42.3 m Også mye:	1,06	0,34	3,87	25/ 0,4	6,5	41,70 - 44,10
44.10 - 45.10	1.00	musk.biot.gn.	Noe gr.				1.9/0.1		44.10-45.65
45.10 - 45.65	0.55	gr.amf.							
45.65 - 51.10	5.45	gr. hbl.biot.gn.	Py-impr.Fold i starten. Deretter: Lokalt noe staur.på 46.80 bl.a.Rel.lite hbl.mellom 46.8 og 49.0:musk.biot. gn.med noe hbl. Fra 49.0: Fra 50.0:				2.0/0.2		45.65-48.65
51.10 - 51.95	0.85	gr.biot.gn.+pegm.bånd.	Py-impr.						
51.95 - 55.00	3.05	musk.biot.gn.+pegm.bånd.	Noe gr. Noe foldet i starten Deretter: Fra 53.0 noe foldet. Fra 54.0						
55.00 - 59.15	4.15	grå gn.	m.p.Delvis noe musk.gn- aktig p.g.a.musk-rikere bånd.Noie gr.(kan også be- tegnes som grå gn-aktig musk.gn)Lokalt noe foldet						
59.15 - 59.40	0.25	Pegm.	Musk.						

.....3

Lokalitet: MOFJELLET - SKISTUA

Borehull: 8429

Dato : september 1984
 Koordinater : ca. 45.268 Y, ca. 925.516 X
 Retning : rett S
 Helling/stigning: 15°
 Høyde : ca. 190 m.o.h.
 Lengde : 60.0 m

side 1

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.15	4.15	jordboring					g/t Ag/Au		
4.15 - 6.65	2.50	gr.amf.	I starten: men åpne folder. Fra 4.50 avtagende S og fra 5.50-6.60 rundt	90 v 0 v 0-65					
6.65 - 7.75	1.10	grå gn.	b.p.Noë gr.Åpne folder.						
7.75 - 7.90	0.15	gr.amf.	Foldet.						
7.90 - 17.05	9.15	grå gn.	b.p.Noë gr. Åpne folder/fleksurer Fra 13.50 Gr.amf.bånd på 16.20-16.25 Derfra avtagende S til	v 0-60 60 10					
17.05 - 18.65	1.60	gr.amf.	Åpne folder.	0-60					
18.65 - 37.70	19.05	hbl.biot.gn.	Py-impr.Noë gr.i starten (og noen gr.amf.bånd). Åpne folder Fra 20.0: mye Fra 22.5: Gr.amf.bånd mellom 20.60 og 24.40.Avtagende S og fra 24.5-26.2: rundt Fra 26.2: og lite gr.Fra 32.70 nok så "porøst" med mm-store "hullrom" til 5.7 m,og tildels lite eller ingen hbl.Noë musk.Derfra S:	0-60 75-30 60 0 45 55			0.3/0.1 2.3/0.1	34.70-37.70 37.70-39.70	
37.70 - 40.85	3.15	musk.biot.gn.	Spredt noe gr.Mot slutten mindre biot.og:2	55 45					

Lokalitet:

Borehull: 8411

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
47.15 - 47.70	0.55	grå gn.	70-60						
		27.2.1985							
		A. Kruse							

Lokalitet:

Borehull: 8411

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
							g/tAg		
28.85 - 30.00	1.15	grå gn. Vanlig, Rel. gl-rik. Økende musk. innhold.	65						
30.00 - 30.50	0.50	musk. gn. Noe biot.							
30.50 - 31.15	0.65	malmimpr. og striper	60	0.67	0.16	3.13	5.2		30.50-31.15
31.15 - 31.95	0.80	grå gn.		0.06	0.13	0.35	1.1		31.15-31.95
31.95 - 32.60	0.65	malmimpr. og striper	60						
32.60 - 33.60	1.00	god malm		2.35	0.30	7.20	15.5		31.95-33.00
33.60 - 34.10	0.50	malmimpr.		1.57	0.30	4.32	18.4		33.00-34.10
34.10 - 38.00	3.90	grå gn. Litt musk. gn-aktig. Fra 35.3 åpne folder mye M. sv. malmimpr. på 36.45 Fra 36.7 noe gr. og: Fra 37.6:	70 v 0 50 80						
38.00 - 38.85	0.85	musk. hbl. biot. gn. Py-impr.	70						
38.85 - 39.75	0.90	gr. amf. Litt biot.	70						
39.75 - 40.00	0.25	hbl. biot. gn. Noe gr. Py-impr. med pegm. bånd.	70						
40.00 - 47.15	7.15	gr. amf. Litt biot. Noe foldet mellom 40.8 og 41.00. En del skarn og noe porøst mellom 41.0 og 41.5, og: Fra 41.5: Fra 43.0 en god del skarn og ikke gr. (olivenfarget skarn) Fra 46.6: noe gr. og ingen skarn, og:	60 60-70 70 80						
		3							

Lokalitet: FAGERÅSEN, MO

Dato : sept.-84

arkivert

Koordinater : ca 925.390 X, ca 41.380 Y (ikke innmålt)

Borehull: 8411

Retning : nord

Helling/stigning: 65°N

Høyde : ca +42 m.o.h.

Lengde : 47.20 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	jordboring					g/tAg		
1.60 - 3.95	2.35	grå gn. Gr.b.p.Mellomgrå.Åpne folder.	v (0-60)						
3.95 - 4.10	0.15	gr.hbl.gn. Py-impr.							
4.10 - 8.50	4.40	grå gn. Gr.Mellomgrå,b.p.Spredt litt py.S avtagende. Åpne småfolder fra 5.5-7.0 Fra 7.0:	55 v (0-45) 55						6.3m pegm. med py+rel. hard svart malmmineral høy glans
8.50 - 28.10	19.60	grå gn. Lys,b.p.-vanlig.Noe gr. Åpne småfolder. Fra 11.0 Fra 12.0 Åpne småfolder Et 2-3 cm tykt gr.amf-bånd repeteres p.g.a.foldingen på 12.55 og 12.70 og 12.90 og 13.05 og 13.15 og 13.20 og 13.35 og 13.85.Fra 14.5: Mer musk.mellom 16.2 og 17.4.Derfra Fra 18.0: Fra 19.7-20.0 Åpne småfolder,rel.lite gr(0-55) Fra 20.6: Fra 22.6: Fra 25.0: Fra 28.0:	v (0-55) 70 v (0-70) 75-80 65 60 v (0-55) 55 60-70 60 65						
28.10 - 28.85	0.75	malmimpr. Spredte sl+py-impr. i musk.gn.Noie biot.	65	0.53	0.08	1.17		2.5	
		2							

Lokalitet:

Borehull: 8410

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
57.90 - 61.40	3.50	amf.	45						
		Fra 58.0:	55						
		Fra 59.0 gr og:	60						
		Fra 60.5:	40						
61.40 - 61.60	0.20	pegm.							
61.60 - 65.40	3.80	grå gn.	40						
		Vanlig type. Noe gr. Noen biot-rikere bånd mellom 43.30 og 43.50.							
		Mot slutten: og en fold.	50						
		4.3.1985							
		A. Kruse							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8410

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29.55 - 30.05	0.50	pegm.	Biot. og musk.				g/tAg		
30.05 - 41.60	11.55	grå gn.	Lys, vanlig, noe gr. Delvis gl-rikere og da mlk. Spre- dt noe småfoldet. Fra 35.0: 60 Fra 36.0: 50 Fra 40.0: 45 Åpen småfold på 40.8. Fra 41.0-41.6 45-60 Noe oliven skarn på slut- ten og noe po+py-impr.						
41.60 - 46.00	4.40	malmimpr. og striper	py+po+sl+cp. Rel. mye cp. v Åpne folder. (0-45)	0.04	0.19	0.14	0.5		41.60-42.85
				0.87	0.30	8.32	7.1		42.85-44.00
				0.10	0.66	4.68	3.0		44.00-45.00
46.00 - 48.15	2.15	ditto, men overveiende	py+sl, og åpne folder ca.0	0.06	2.13	3.25	12.3		45.00-46.00
			med mye I biot. gn. og hbl.	0.06	0.33	2.92	2.7		46.00-47.00
			biot. gn. (skarn?)	0.07	0.37	5.52	2.5		47.00-48.15
48.15 - 48.30	0.15	grå gn.	Biot. gn-aktig. Impr. med py+spor sl og cp.						
48.30 - 48.90	0.60	musk. gn.	Noe biot.						
48.90 - 54.00	5.10	gr. biot. hbl. gn.	Ingen kis. Noe hbl. gn. S økende til: Fra 51.0 sv. py-impr. Noe staurolitt (52.5-52.8) og noe musk.						
54.00 - 54.30	0.30	malmimpr.	py, lyse sl, gln. I musk. gn. med en del biot. Mlk.	1.12	0.14	3.60		5.9	
54.30 - 57.90	3.60	hbl. biot. gn.	Py-impr. Litt sl. på 56.75. (30-50)						
			3						

Lokalitet: FAGERÅSEN, MO

Borehull: 8410

Dato : sept.-84
 Koordinater : X 925.388,4 Y 41.379,0
 Retning : syd
 Helling/stigning: 62°S
 Høyde : + 42.1 m.o.h.
 Lengde : 65.40 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	jordboring							
1.50 - 4.65	3.15	grå gn. Gr.Spredt noe py-impr. Foldet fra 2.5.b.p. Hbl.str.på 2.85 og 2.90 (folder)	55-65 v						
4.65 - 6.45	1.80	grå gn. Lys.m.d.Gr.Noe foldet.							
6.45 - 7.75	1.30	grå gn. Vanlig,noe båndet.Gr. Åpne folder.	v (0-60)						
7.75 - 25.95	18.20	grå gn. Lys m.p. Åpne folder, mye: Fra 11.0 vanlig type,noe gr.Fra 14.2-14.8 mørkere og mere biot,og : Fra 15.0: Åpne folder fra 16.3 Fra 17.8:noe mere biot. og gr. og : Åpne folder (50°-105°) fra 18.6 gr.musk.biot. gn-aktig og: Fra 23.0 igjen typisk grå gn.Åpne folder. Fra 24.3:	v 0-50 60-75 60 v (0-60) 70 v (0-75) 75-65 80-75						
25.95 - 26.15	0.20	gr.hbl.gn.	75						
26.15 - 29.55	3.40	grå gn. Vanlig type,noe gr.Noen åpne små folder.Fra 26.80 mer musk.og spisse små- folder med akseplan 65- 70°.Åpne småfolder mot slutten og mindre musk.2	v						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8409

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
37.40 - 38.00	0.60	god malm Rel.mye cp (gln)	30-50				g/tAg		37.50-39.00
38.00 - 38.40	0.40	gl.gn.	50-60	0.75	0.67	11.12	6.4		
38.40 - 39.10	0.70	m.god kompakt malm.En del po.	50-60						
39.10 - 39.50	0.40	malmimpr. Med cp.	60-70	0.27	0.45	5.40	3.9		39.00-39.80
39.50 - 39.80	0.30	gode malmstriper Foldet.							
39.80 - 42.15	2.35	biot.musk.gn. Spredt litt gr.Py-impr. 5 cm gr.hbl.gn.på 40.70.	60						
42.15 - 43.45	1.30	biot.hbl.gn. Py-impr.	60						
43.45 - 43.80	0.35	biot.musk.gn. Py-impr.Sl.på 43.70 (2cm impr.)	50						
43.80 - 44.55	0.75	biot.hbl.gn. Py-impr.	55						
44.55 - 47.85	3.30	biot.musk.gn. Py-impr. Fra 46.0	60-50 60						
47.85 - 51.05	3.30	gr.amf. Avtagende gr.og mer skarp	65						
51.05 - 56.55	5.50	grå gn. Vanlig type,lys.Noe gr. Foldete gr.biot.gn-band fra 52.55-53.00. Fra 53.0 og tiltakende gr. Pegm.band mellom 53.40- 54.80.Noie tiltakende gl- innhold.	65 v 55-70 mest 65						
		4.3.1985							
		A. Kruse							

Lokalitet: FAGERÅSEN, MO

Dato : sept.-84

Koordinater : X 925.388,5 Y 41.379,0

Retning : syd

Helling/stigning: 76°S

Høyde : + 42.1 m.o.h. (fast fjell)

Borehull: 8409

Lengde : 56.55 m

side 1

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	jordboring					g/tAg		
1.50 - 18.90	17.40	grå gn.	b.p.Spredt noe gr.Hbl. bånd på 1.75.Åpne små- folder.Fra 3.1 vanlig- m.p.og gr.Hbl-rik bånd på 8.80-8.85,og: Fra 9.0 litt gl-rikere og Fra 11.9 musk.gn-aktig (musk.rike bånd) åpne småfolder.Fra 13.0-14.5 Fra 14.5 åpne småfolder. Fra ca 17.0 avtagende musk.innhold.	v (0-55) 45 65 v 55 v					
18.90 - 19.60	0.70	gr.biot.gn.	Noe musk.og hbl.	70					
19.60 - 20.00	0.40	grå gn.	Noe py på 19.85	65-70					
20.00 - 21.20	1.20	gr.biot.gn.	Beksvart biot.Mlk.Spredt noe py-impr.	70					
21.20 - 34.75	13.55	grå gn.	Lys,b.p.Gr. Fra ca 25.0 gl-rikere og Fra 27.20 lys og vanlig. Fra 29.5 noe småfoldet. Fra 30.0 gl-rikere og musk.gn-aktig med musk. gn.bånd.Fra 31.0: Fra 33.0: Mot slutten 30.	60 50 55 v 50-60 50-60 40					
34.75 - 34.90	0.15	god malm	i foldeombøyning.		1.40	0.38	3.52	10.0	34.75-36.00
34.90 - 35.80	0.90	stripet malm	i fleksur	0-45					
35.80 - 37.40	1.60	m.spredte malmimpr.		50	0.09	0.28	0.55	1.4	36.00-37.50
		2							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8408

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		Tildels med lite hbl. Fra 40.0 mer hbl og:	60 (50-70)						
41.30 - 42.25	0.95	gr.amf.	60						
		Mot slutten mindre gr.og noe skarn.							
42.25 - 43.15	0.90	Pegm.							
43.15 - 43.80	0.65	biot.gn.							
43.80 - 46.85	3.05	pegm.							
		Finmlk.py+po-impr.Noie gr.							
46.85 - 46.95	0.10	biot.hbl.gn.							
		Noe skarn.							
46.95 - 49.45	2.50	grå gn.	80						
		b.p.Mellomgrå.Noie smale pegm.bånd.							
49.45 - 49.70	0.25	gr.amf.	70						
		Skarp grense:							
		Nedre grense også skarp:	80						
49.70 - 50.00	0.30	grå gn.	70						
		Mellomgrå,b.p.Noie gr.							
		4.3.1985							
		A. Kruse							

Lokalitet: FAGERÅSEN, MO

Dato : Sept.-84
 Koordinater : X 925.388.6 Y 41.379,0
 Retning :
 Helling/stigning: 90° (lodd)
 Høyde : + 42.1 m.o.h.
 Lengde : 50.00 m

Borehull: 8408

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.80	1.80	jordboring							
1.80 - 30.55	28.75	grå gn.	b.p.Rel.gl.rik.Gr.Åpne småfolder. Fra 9.6 mer musk.og vanlig til m.p.Fra 14.5: Fra 18.0-20.0 noen biot. rike bånd. Fra 20.0 mere musk.og: Noe musk.gn-aktig. Fra 23.0: Hbl.på 27.70 (2 cm).1 cm py på 28.20.Fra 30.0:	60 v (0-80) 70-80 60 65 70 80					
30.55 - 32.00	1.45	malm		0.79	1.47	5.12	11.0		
32.00 - 33.40	1.40	malm		1.35	0.96	14.24	8.3		
33.40 - 33.70	0.30	musk.gn.	Noe biot.Litt grå gn.-aktig.						
33.70 - 34.85	1.15	gr.hbl.biot.gn.	Py-impr.Noie båndet.						
34.85 - 36.50	1.65	grå gn.	Vanlig type. Gr.						
36.50 - 36.60	0.10	gr.hbl.biot.gn.							
36.60 - 36.80	0.20	pegm.							
36.80 - 37.30	0.50	biot.musk.gn.	Py-impr.Noie foldet.						
37.30 - 37.95	0.65	Pegm.med bånd musk.biot.gn.med py-impr. og noe gr.							
37.95 - 38.80	0.85	biot.musk.gn.	Noe gr.Py-impr.Åpne småfolder.						
38.80 - 41.30	2.50	gr.hbl.biot.gn.	Py-impr.Åpne småfolder.2						

Lokalitet: FAGERÅSEN, MO

Dato : sept.-84

arkivert

Koordinater : X 925.406,5 Y 41.451,4

Retning : nord

Helling/stigning: 46°N

Borehull: 8407

Høyde : + 41.1 m (toppen av røret)

Lengde : 48.90 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	jordboring							
1.20 - 2.70	1.50	grå gn.	b.p.Mellomgrå.Gr.Avtag- ende S.Fra 2.0:	50 30					
2.70 - 3.10	0.40	pegm.	med bånd gr.gn.						
3.10 - 32.50	29.40	gr.gn.	Som før.Vekslen S. Åpne folder fra 3.5: samtidig lysere og mer musk.Fra 4.2: Fra 7.0 mindre musk,noe mere biot.og gr. Noen spredt py-impr.Fra 9.0 lysere og m.p.,og: Fra 10.0 vanlig type og vekslen gl-innhold. Fra 15.0-15.8 mere biot. og mørkere.Fleksurer. Hbl.på 15.0 og 15.6 og: Hbl.på 16.2 og: 10 cm hbl.på 17.5 og der- etter åpne folder. Fra 19.3: Fra 21.0 åpne folder Fra 21.8-22.5 Åpne folder fra 22.5 Fra 23.5 Økende S.Fra 24.0 Så igjen avtagende og ved 24.6: Fortsatt m.p.grå gn.	35-65 v 60-45 40-60 40 40-55 30-65 40 40 v 45 v (0-50) 50-60 v 55 75 55 (45-60)					
32.50 - 32.70	0.20	gr.amf.		36-60					
		2							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8407

Helling/stigning:

Høyde :

side 2

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
32.70 - 34.50	1.80	grå gn. Vanlig type.Gr.	55 (50-60)						
34.50 - 36.05	1.55	gr.hbl.biot.gn. Py-impr.Anhydritt?Avtag- ende hbl.og mer musk.mot slutten.	55-40						
36.05 - 36.55	0.50	musk.gn. Spredt litt gr.Sv.py-diss. På 16.20 <u>spor sl.</u>	45						
36.55 - 37.75	1.20	biot.musk.gn. Båndet med bånd musk.gn. Sv.py-diss.	45-50						
37.75 - 41.00	3.25	gr.biot.hbl.gn. Py-impr.Med bånd gr.amf. litt etter hvert mer am- fibolittisk.Fra 40.0 av- tagende S.Ved 41.0 m:	60 (50-65) 35						
41.00 - 48.90	7.90	gr.amf. Mørk,rel.tett.I starten: Økende S.Fra 43.0: Større åpen fold fra 44.9-46.6: mye Fra 46.6:S vanskelig å se ofte: Gradvis overgang til: hbl.biot.gn. S vanskelig å se,ofte: Avtagende hbl.og sv.py- diss.	40 70-55 0 40 35						

12.3.1985

A. Kruse

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8406

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
31.60 - 32.20	0.60	grå gn.	m.p.Noë gr.Avtagende S til: Så igjen økende til:	65 75					
32.20 - 33.00	0.80	biot.musk.gn.	Finmlk.Py-impr.	80					
33.00 - 37.50	4.50	gr.biot.hbl.gn.	Py-impr.Fold på 33.45. Fra 34.00 gr.amf-striper og: Vekslende hbl-innhold. Åpne folder fra 35.7 v (0-70) Fra 36.6: Gradvis overgang til:	80 55 80					
37.50 - 43.40	5.90	gr.amf.	Med bånd py-impr.gr.biot. hbl.gn.i starten.Fra 39.6 ikke lenger biot. hbl.gn.bånd.	80					
12.3.1985									
A. Kruse									

Lokalitet: FAGERÅSEN, MO

Borehull: 8406

Dato : Sept.-84
 Koordinater : X 925.405,9 Y 41.451,4
 Retning : nord
 Helling/stigning: 82°N
 Høyde : + 41.3 m.o.h. (toppen av røret)
 Lengde : 43.40 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	jordboring					3/4 Ag		
0.80 - 6.20	5.40	grå gn.	b.p.Gr.Mellomgrå, spredt noe py-impr.Mindre gl. og gr.fra 4.15 og lysere.	65					
6.20 - 6.55	0.35	hbl-bergart	Pegmatittisk, med feltsp. Foldeombøyning?						
6.55 - 27.05	20.50	grå gn.	b.p.Gr.Mellomgrå S ofte vanskelig å se, noe foldet? v? Fra 11.7- Fra 15.4 lysere, mindre gl.og gr.Fra 16.0: åpne folder Fra 17.0: Fra 19.0: åpne folder Fra 20.0 litt etter hvert noe mere musk.og: Fra 26.40 mørkere og mer biot.og gr.: Py-impr.Noen smale amf. bånd. Noe biot.Sv.py-diss. py+sl i musk.gn.Noie biot. Spredt noe hbl. Musk. i musk.gn. sv.py-diss. py+sl+noe cp+noe po+noe gln.I biot.musk.gn.Spredt noe hbl.(og skarn?)	65 70-90 mye 75 v (0-80) 80 v (0-75) 75-80 (70-85) 80 75-80 75 65-75 75-80					
27.05 - 29.15	2.10	gr.hbl.biot.gn.							
29.15 - 29.45	0.30	musk.gn.							
29.45 - 30.10	0.65	malm		1.36	0.48	6.60		5.8	
30.10 - 30.40	0.30	pegm.							
30.40 - 30.55	0.15	malmstr.							
30.55 - 30.80	0.25	musk.gn.		1.25	0.68	5.56	10.0	9.0	
30.80 - 31.60	0.80	god stripet malm							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8405

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
35.75 - 37.90	2.15	malm		1.31	0.18	14.60	g/t Ag 8.3	11.6	
37.90 - 39.10	1.25	hbl.biot.gn. Avtagende S.py-impr. Fra 38.4:	70 35						
39.10 - 39.80	0.70	musk.gn. Noe hbl.	60						
39.80 - 42.00	2.20	gr.hbl.biot.gn. Py-impr. Fra 40.5:	50 70						
42.00 - 49.30	7.30	gr.amf. Mot slutten mere skarn og mindre gr.og:	60-65 70						
		4.3.1985							
		A. Kruse							

Lokalitet: FAGERÅSEN, MO

Dato : aug.-84

Koordinater : X 925.406.4 Y 41.455.0

Retning : syd

Helling/stigning: 75°

Høyde : + 40.5 m.o.h.

Lengde : 49.30 m

Borehull: 8405

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	jordboring					g/tAg		
1.60 - 7.00	5.40	grå gn. b.p.Gr.Spredte py-impr.	75-70						
		Fra 4.0:	60						
		Fra 6.0:åpne småfolder	v						
		Fra 6.5:	65						
7.00 - 8.50	1.50	hbl.holdig grå gn. Gr.Fold på 7.65.	65						
		Fra 8.0	85						
8.50 - 12.65	4.15	grå gn. b.p.Gr.	85						
		Fra 10.0 mer musk.og	70						
		Fra 10.5 foldet.Hbl.på	v						
		11.15. Fra 11.5:	70						
12.65 - 13.00	0.35	Pegm. Musk.							
13.00 - 13.50	0.50	gr.biot.gn. Grå gn-aktig hbl i kjerne							
		av foldeombøyning på 13.25							
13.50 - 32.00	18.50	grå gn. m.p.	60						
		Åpne småfolder	v						
		fra 14.3-17.0	(0-65)						
		Fra 17.5:	65						
		Fra 18.5:åpne småfolder	v						
			(0-65)						
		Fra 22.0:	55						
		Fra 23.0:	60						
		Fra 24.0:	70						
		Noe musk.gn-aktig.							
32.00 - 35.35	3.35	musk.gn. Tildels noe grå gn-aktig	70						
		Fra 23.3 sv.py-impr.No	(60-75)						
		biot. 1 cm py+po på 35.20							
35.35 - 35.75	0.40	malmimpr.: py+sl+cp	65-70	0.69	0.32	1.68		4.9	
		I musk.gn.No							
		biot.							
		2							

Lokalitet: FAGERÅSEN, MO

Dato : aug.-84
 Koordinater : X 925.406,4 Y 41.455,0
 Retning : syd
 Helling/stigning: 49°S
 Høyde : + 40.5 m.o.h.
 Lengde : 71.00 m

Borehull: 8404

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 22.40	22.40	grå gn.	b.p.Gr.Noë hbl.i starten? 5 cm gr.hbl.gn.på 2.30. Spredt noe py-impr. Fra 3.0-4.0 Fra 4.0 foldet? Fra 5.8: Fra 6.0: På 7.70 noe hbl.(5 cm) Fra 8.0: 5 cm gr.hbl.bergart på 9.70.Fra 10.0 åpne små folder. Fra 12.5- Fra 16.0: Foldeombøyning med hbl. på 18.50.Deretter Fra 20.2 noe foldet.	40 40 30 70 50 70 v (0-50) 45-30 50 55-45					
22.40 - 24.00	1.60	kjernetap							
24.00 - 53.30	29.30	grå gn.	Gr.Åpne folder. Fra 29.0: Fra 30.0:Åpne folder Fra 31.0: noen bånd med pegm,ogpegmatittisk gn. Fra 34.0: Fra 36.0: Åpen fold på 38.70 (Foldeåpning 110°) Fra 39.0 Fra 40.0 musk.rikere og: (m.d.) Fra 42.0: (Fleksur)Fra 42.5:	v (0-55) 60-65 v (0-60) 50 55 0-55 50-60 40 30-20 50					
		2							

Lokalitet:

Borehull: 8403

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		Åpne små folder fra 31.5-33.0: Fra 33.5: Fra 34.5: Fra 36.0: Fra 38.5 gl-rikere og:	v (0-65) 50 60-65 50 65 (50-70)				g/tAg/ A		
41.60 - 41.90	0.30	Pegm.							
41.90 - 43.05	1.15	grå gn. m.d.Noë musk.gn-aktig.Gr.	65						
43.05 - 44.20	1.15	gr.biot.gn. Finmlk. Mot slutten	40 70						
44.20 - 49.50	5.35	musk.gn. Grå gn-aktig.Åpne småfol- der med 1 cm malm impr. på 44.60 og 44.75.Også spisse folder. Fra 46.5:	v 45-55						
49.50 - 53.10	3.60	malm	50	0.22	1.12	13.48	6.2	16.4	
53.00 - 53.50	0.50	malmstriper og impr.:py+sl+litt cp. I biot.musk.gn.	40	0.38	0.64	3.23		5.2	
53.50 - 56.80	3.30	gr.biot.hbl.gn. Noen gr.amf.bånd.Sv.py- impr.2 cm sl på 55.90. Fra 55.0:	40 45						
56.80 - 59.00	2.20	biot.hbl.gn. En del musk.Py-impr. Anhydritt(?)	45	0.04	0.02	0.08	0.1	5.8	
59.00 - 60.20	0.80	biot.hbl.gn. Py-impr.	40						
60.20 - 63.70	3.50	amf. Spredt noe olivenskarn. Spredt noe gr.	45						
63.70 - 64.20	0.50	grå gn. Lys,b.p.Noë gr.	45						
4.3.1985 A. Kruse									

Lokalitet: FAGRRÅSEN, MO

Borehull: 8403

Dato : August 1984
 Koordinater : X 925.406,4 Y 41.455,0
 Retning : syd
 Helling/stigning: 59°
 Høyde : + 40,5 m.o.h.
 Lengde : 64.20

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	jordboring							
1.50 - 2.00	0.50	grå gn. Gr.Noë hbl.i starten.	65						
2.00 - 2.15	0.15	Pegm. Musk.							
2.15 - 3.65	1.50	grå gn. Vanlig.Gr.Fra 3.3 noe foldet og stictolittisk.	70 v						
3.65 - 4.35	0.70	gr.biot.hbl.gn. Åpne folder.	0-55						
4.35 - 12.80	8.45	grå gn. Rel.gl-rik.Finmlk.Gr. Foldet?Fra 7.15 mindre gl og fink.,og: Fra 10.0 mer musk.og: Spisse folder fra 11.0	55 v? 75 45						
12.80 - 13.50	0.70	Kvarts Med bånd grå gn.							
13.50 - 41.60	28.10	grå gn. b.p.Gr. Åpne folder fra 15.5 Fra 18.0: Fra 19.5: Noë hbl.på 20.40 (1 cm), 21.15 (2 cm) og 22.00 (5 cm).Fra 22.4 åpne småfolder Hbl.på 22.80 (2 cm) Fra 23.2-23.6 Økende S, ved 23.8: Åpne folder fra 25.0-26.0 Fra 26.2: Fra 26.6: Fra 27.0: Fra 28.5:åpne folder Fra 30.0	50 v(0-50) 50 65 v (0-55) 25 50 v(0-50) 75 50 65 v(0-65) 65						
		2							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8306

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 13

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
336.55 - 338.15	1.60	grå gn.	Vanlig, Noe gr. Fra 337.0: Lokalt noen spisse "ghost" folds (337.3). Mot slutten	75 85 75					
338.15 - 341.00	2.85	gr.amf.	Mørk, tett. Lokalt mye fink gyllen skarn. Spredt noe biot. (ca. 339.5-340.0) På slutten:	75-80 85-50					
341.00 - 341.10	0.10	grå gn.	Gr.	40					
341.10 - 341.65	0.55	pegm.	Biot. 10 cm grå gn. på 341.4.	70					
341.65 - 343.15	1.50	grå gn.	b.p. Rel. gr-rik.	80					
343.15 - 343.60	0.45	båndet grå gn.	Flere og flere opptil 2 cm tynne gr.amf. og gr. biot. gn. bånd. Opptil 7 mm store gr.	85					
343.60 - 345.00	1.40	gr.amf.	Mørk, tett. En del grønnlig og gyllen skarn i starten Overveiende:	50-85 85					

25/26.mars 1985

A. Kruse

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8306

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 12

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
322.30 - 323.30	1.00	gr.hbl.gn.	Med rel.fink.hbl.Grå gn-aktig.	80			g/tAg/Au		
323.30 - 329.10	5.80	biot.hbl.gn.	Py-impr.Spredt noe gr. Noen bånd med gr.amf. Lokalt en del anhydritt(?) Fra 327.0:gradvis mer gr.(75-85) amf.og avtagende py.og økende gr-innhold. Gradvis overgang til:	75			0.6/<0.1		323.30-325.80
329.10 - 330.60	1.00	gr.hbl.gn.	Med gr.amf.bånd.Spredt noe oliven skarn.Mørkere bergart.Også gr.biot.gn- bånd.	75-80					
330.60 - 330.85	0.25	musk.gn.	G-type.Diskordant eller innfoldet kontakt øverst.	85					
330.85 - 335.00	4.15	hbl.gn.	Med sv.kis-impr.biot.og hbl.biot.gn.Også bånd amf.og gr.amf.En del oli- ven skarn og gyllen-beige skarn.Lokalt litt kalk- spat.	85-70 mest 85					
335.00 - 335.95	0.95	båndet gneis	Grågneis,ofte "pegmatit- tisk",med bånd pegm,skarn- og kalkspatholdig hbl. (biot.)gn.	85					
335.95 - 336.20	0.25	pegm.	Biot.						
336.20 - 336.55	0.35	grå gn.	Fortsatt litt båndet. Som ovenfor.	75					
			13						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8306

Helling/stigning:

Høyde :

side 11

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		Fra 304.0: 4 cm gr.hbl.biot.gn.på 305.2.Fra 305.40 spredte po-impr.og økende musk. innhold.	85				g/tAg Au		
306.05 - 315.00	3.95	gr.hbl.biot.gn. Vekslede biot.og hbl. innhold.St.py-impr.Noen bånd gr.amf.Lokalt en del anhydritt (?)Fold på 311.0 En god del musk.fra ca. 310-ca.311. Ellers også noe musk.	80				0.2/<0.1		306.00-308.50
							0.1/<0.1		308.50-311.00
							0.2/<0.1		311.00-313.00
							2.2/0.1		313.00-315.00
315.00 - 316.50	1.50	ditto		0.03	0.03	0.04	2.5/0.2	6.3	315.00-316.50
316.50 - 317.70	1.20	malmimpr.og str.i biot.musk.gn. Spredt noe hbl.		0.61	0.16	2.08	15.0/0.3	5.7	316.50-317.70
317.70 - 317.95	0.25	gr.biot.hbl.gn. Py-impr.							
317.95 - 318.35	0.40	gr.amf.	80	0.01	0.04	0.06	0.9/<0.1	4.5	317.70-319.20
318.35 - 319.20	0.85	gr.hbl.biot.gn. Py-impr.	80						
319.20 - 319.60	0.40	Ditto	80-60				1.9/<0.1		319.20-320.75
319.60 - 319.85	0.25	musk.gn. Noe biot.Sv.py-impr.	60						
319.85 - 319.90	0.05	malmstripe i gl-rik musk.biot.gn.	60						
319.90 - 320.75	0.35	biot.musk.gn. Py-impr.Spredt noe hbl.	75						
320.75 - 321.50	0.75	biot.hbl.gn. Py-impr.Litt musk.	80-85				0.1/<0.1		320.75-323.30
321.50 - 321.90	0.40	hbl.gn. Grovk.En del anhydritt(?) Py-impr.	80						
321.90 - 322.30	0.40	gr.hbl.gn. Py-impr.Noe biot.	85						

.....12

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8306

Helling/stigning:

Høyde :

side 10

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S g/t Ag/ Au	% Fe	
275.05 - 289.50	14.45	gr.amf. Noe laminert, og med noe lysere bånd. Fra 280.25 mørkere og tettere. Noen spredte bånd uten gr. og med noe skarn + litt kalkspat. Fra 282.5: rel. mye skarn og: Langsomt avtagende S. Fra 285.0 igjen gr.amf. og: Økende S, fra 286.0: Fra 288.0: Noen grå gn-bånd mot slutten.	85 (80-85) 75-70 55 75 70 75						
289.50 - 294.70	5.20	hbl.biot.gn. Vekslede hbl.innhold, noe båndet. Spredt noe gr. Py-impr. Lokalt endel anhydritt(?). Noen gr.amf-band.	75-80						
294.70 - 295.55	0.85	gr.hbl.gn. Rel. lys, fink. Grå gn-aktig	85-80						
295.55 - 296.55	1.00	grå gn. Mellomgrå, b.p. Gr.	85						
296.55 - 296.90	0.35	gr.amf. Med grå gn-band.	80						
296.90 - 297.80	0.90	grå gn. I starten en del hbl. Noe gr.	85						
297.80 - 298.10	0.30	pegm. Kvartsrik.							
298.10 - 306.05	7.95	grå gn. Rel. lys-mellomgrå. Vanlig type. Noe gr. På 299.60-299.70: gr.amf. Deretter lys grå gn, vanlig type. gr. stictolittisk til 300.70. Gr.amf.bånd på 300.95-301.20	80 80 (75-85)				0.4/0.1		303.50-306.00
		ll							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8306

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 9

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
252.20 - 257.30	5.10	gr.amf.: skarn (nesten med violett skjær mot kalkspat) Fra 249.8: åpne folder. Fortsatt noe skarn og kalkspat (0-75) Gradvis overgang til: Mørk, tett. I starten noen pegm.band og foldet. Fra 253.7: Kvarts på 256.10-256.25. Derfra: Gradvis overgang til:	v v 85 75						
257.30 - 263.40	6.10	amf. Som før med beige skarn, men bare spor kalkspat. Fra 260.0 mindre og bare spredt litt skarn. Spredt litt gr. Fra 260.5 spredte py-impr. delvis i noe biot. rikere bånd.	55-75						
263.40 - 265.80	2.40	gr.amf. Spredte men rel. sterke py-impr, ofte med noe biot. Fra 265.3: ingen py og:	60-75 75						
265.80 - 272.10	6.30	båndet gr.hbl.gn. Med bånd grå gn. og gr. amf. Spredt noe py. Noe foldet fra 270.0-270.4. Deretter: og mer amfibolittisk.	75 80						
272.10 - 272.30	0.20	pegm. Musk.							
272.30 - 274.80	2.50	gr.amf. Noe laminert mest:	75-85 80-85						
274.80 - 275.05	0.25	pegm. Musk. og biot.10							

Lokalitet: MOFJELLET SKISTUTJERNET

Profil 45.270

Borehull: 8306

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 8

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
215.30 - 224.55	9.25	grå gn.	Mellomgrå-rel.mørk, b.p. Gr.Fortsatt spredt noe hbl.Foldet Fra 217.5: og mellomgrå uten hbl. Noe hbl.fra 222.65-223.05, 4 cm på 223.8.Foldet fra 224.0.	v (0-75) 75 (70-80) v					
224.55 - 224.95	0.40	gr.amf.	Foldet.	v					
224.95 - 231.00	6.05	grå gn.	Mellomgrå, b.p.-b.d.Gr. Åpne folder til 227.0. Derfra b.p.og: Noen musk.rike bånd.Mot slutt litt folder.	v (0-70) 80					
231.00 - 242.95	11.95	gr.hbl.gn.	Tildels noe amfibolittisk I starten noen grå gn. bånd og åpne folder.Spredt noe skarn.Fra 235.0: Avtagende S Fra 236.2: Fra 239.0: Mot slutten:	v 80- 55 65 75					
242.95 - 243.45	0.50	amf.	Noe gr.ofte i bånd.	80-60					
243.45 - 243.75	0.30	pegm.	Biot.						
243.75 - 247.20	3.45	gr.amf.	Mørk, tett.Gradvis over- gang til:	70					
247.20 - 252.20	5.00	amf.	Mørk, tett.En del gyllen kalkspat både i bånd og fordelt.Lokalt noe foldet Fra 249.5:også noe beige9	75					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8306

Helling/stigning:

Høyde :

side 7

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
187.60 - 188.35	0.75	Fra 176.0 rel.lys, og mindre gr. og mer musk. Fra 182.0 igjen med mørkere band med noe skarn og spor kalkspat, tildels noe hbl. Fra 186.0 fortsatt åpne folder, mye	v (0-65)						
188.35 - 196.40	8.05	båndet gr.hbl.gn. Noe amfibolittisk. Med bånd grå gn. Åpne folder.	v (0-65)						
196.40 - 196.85	0.45	grå gn. Mellomgrå, b.p.-vanlig. Gr. Fra 189.2 åpne folder	60 v						
196.85 - 210.15	13.30	Fra 189.65-189.85 noen gr.amf.band. Fra 192.0 små biot. aggregater (kan ligne hbl.) Fra 196:	(0-70) 60						
210.15 - 215.30	5.15	pegm. Musk. og biot. Mellomgrå, rel.mørk. I starten : Fra 197.4 igjen åpne små folder. Mellom 197.60 og 198.50 noe hbl.+skarn og gr.hbl. gn. Mye: Fra 200.5 en god del olivenfarget skarn og spredt noe hbl. Åpne små folder Spredt litt kalsitt. 1 mm py på 209.75.	70 v (0-70) (30-70) v (0-60)						
		Båndet biot.hbl.gn. En god del skarn og gr. Åpne folder. Større bånd grå gn.	v (0-75)						

.....8

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8306

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 6

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		Fra 141.0: Noe hbl.på 140.95 og 141.7.	65						
142.10 - 142.35	0.25	biot.gn. -	Mørk.No. gr.og litt kalk- spat.	70					
142.35 - 145.55	3.20	grå gn.	Rel.lys.b.p.Litt gr.Åpne folder fra 143.6-144.0.	70 v (0-70)					
		Fra 144.0:	65						
145.55 - 146.30	0.75	båndet gr.amf.	Med grå gn-band.Åpne folder fra 146.0.	55					
146.30 - 156.20	9.90	grå gn.	Lys-mellomgrå,b.p.Gr. Åpne folder fra 148.0 og noe mere biot.	60-70 v (0-70)					
156.20 - 156.90	0.70	gr.hbl.gn.	En del biot.	60-70					
156.90 - 157.75	0.85	gr.gn.	Rel.lys,b.p.Gr.Noen bånd gr.hbl.gn.	70					
157.75 - 158.25	0.50	gr.amf.		70-50					
158.25 - 187.60	29.35	grå gn.	Rel.lys,b.p.-b.d.Gr.No. stictolittisk.Fra 160.0 stictolittisk og foldet. Fra 160.7 ikke stictolit- tisk,med mørkere bånd, og åpne folder Tildels mye rundt (spesielt fra 166.0) Fra 171 fortsatt åpne folder,mye: Fortsatt åpne folder fra 177.3 med mye:	60 v (0-60) v (0-80) 0 v (0-45) v (0-30)					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8306

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		til ca. 105.0. Fra 105.5:	70-55						
107.20 - 108.00	0.80	pegm.							
108.00 - 116.45	8.45	grå gn.	v (0-60)						
		Musk. og biot. Mellomgrå, b.p. Gr. Åpne folder. Økende musk. og fra 108.8: m.p.-vanlig og lysere. Fra 110.0 vanlig type, rel. lys. Gr. Økende S, fra 111.0:	80-70						
116.45 - 117.15	0.70	gr. biot. hbl. gn.	80-70						
		Vekslende biot-innhold, mot slutten nesten ikke hbl.							
117.15 - 132.25	15.10	grå gn.	80-70 80						
		Lys, vanlig type. Spredt noe gr. Fra 120.0 mest: Fold på 125.5 og mer b.p. Også fold (fleksurartet) på 129.8. Noe foldet mot slutten.							
132.25 - 132.85	0.60	grå gn.	Rel. mørk, b.d. Noe gr. Spredt v litt kalkspat. Åpne folder (0-70)						
132.85 - 134.40	1.55	grå gn.	Lys-mellomgrå, b.p. Spredt litt gr.						
134.40 - 135.85	1.45	pegm.	70						
		Rel. mye grovk. musk. Lite og fink. biot.							
135.85 - 144.10	8.25	grå gn.	Rel. lys, b.p. Gr. Fra 137.0: Uregelm. pegm. Årer fra 140.0-140.7 p.g.a. åpne folder						
		6	70 40-70 v (0-70)						

Lokalitet:

Borehull: 8306

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
87.50 - 90.05	2.55	båndet gr.hbl.biot.gn.Opptil 0.5 m brede bånd med pegm.og grå gn. Mot slutten foldet.	80-90 v						
90.05 - 91.65	1.60	pegm. biot.Med 3 bånd opptil 20 cm gr.biot.gn.	60-80						
91.65 - 92.80	1.15	gr.biot.gn. Spredt noe hbl.og py.Mot slutten hbl.gn-band. Åpne folder.	v (0-75)						
92.80 - 93.55	0.75	gr.musk.gn. Gr-rik.Ligner mye den gr-rike grå gn.på 86.25-87.50.Noe foldet?	v 50						
93.55 - 94.00	0.45	gr.amf. En del biot.5 cm gr.musk. gn.på 93.95.	60-55						
94.00 - 95.60	1.60	båndet gr.amf. Med bånd grå gn.og gr.hbl. biot.gn.I starten: Avtagende S,og åpne folder fra 95.0.På 95.4 en fold med foldeåpning 50° og akseplan ca.60°.Slepp med grafitt like før pegm.,65°	80 v						
95.60 - 96.00	0.40	pegm. Musk. og biot.							
96.00 - 98.70	2.70	grå gn. Mellomgrå,b.p.Gr.Åpne folder.	v (0-50)						
98.70 - 101.30	2.60	båndet gr.amf.Med bånd biot.rik grå gn. og kv-feltsp.Mindre båndet etter hvert.							
101.30 - 107.20	5.90	grå Mellomgrå,b.p.I starten: Gr. Fra 102.0:Åpne folder til	55-60 v (0-55)						
		5							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8306

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
60.35 - 68.65	8.30	grå gn. b.p.Noen biot-rikere bånd (+noe hbl) fra 60.90-61.20 og noe foldet. Delvis noe foldet Litt gr.Mellom 62.0 og 68.5 "pegmatittisk" og med pegm-bånd. Åpne folder	v,70 v (0-75)						
68.65 - 71.85	3.20	båndet grå gn.(lys) med amf.-bånd. P.g.a. åpne folder.	v (0-55)						
71.85 - 73.05	1.20	gr.hbl.biot.gn. Py-impr.	65						
73.05 - 80.95	7.90	gr.amf. Åpne folder. Spredte partier med lyse oliven-grønn skarn. En del biot. Delvis gr.biot.hbl.-gn-aktig.	v (0-60)						
80.95 - 82.15	1.20	grå gn. Lys, b.p.Gr. Noe foldet mot slutten.	55 v						
82.15 - 82.75	0.60	gr.amf.	75-35						
82.75 - 83.00	0.25	pegm. Biot.							
83.00 - 86.25	3.25	gr.amf. I starten: Fra 84.0: større åpne folder. Mye grønnlig skarn fra 85.0-85.8.	65 v (0-55)						
86.25 - 87.50	1.25	grå gn. Lys, b.p.Gr-rik i starten og åpne folder. Mer biot. +noe hbl.mot slutten.	v (0-65)						
.....4									

Lokalitet:

Borehull: 8306

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		lysegrønn skarn og kalk- spat.Åpne folder. Fra 38.0: Fra 39.0:	(0-70) 70 60-50						
39.80 - 41.45	1.65	gr.amf.	Spredt litt (spisst)foldet	70					
41.45 - 42.65	1.20	grå gn.	b.p.Gr.	70					
42.65 - 45.10	2.45	amf.	Fra 44.15 skarnbånd, en del biot, og åpne folder.	70 v					
45.10 - 45.95	0.85	grå gn.	Lys, b.p. Spredt litt gr. Åpne folder.	v (0-70)					
45.95 - 47.45	1.50	amf.	Foldet, mot slutten Mot slutten noe gr.	v, 65					
47.45 - 51.25	3.60	grå gn.	Lys, b.p. Amfibånd: 20 cm på 48.0 og 4 cm på 48.6. Her- fra mer musk. m.d. Ant. noen spisse folder.	70					
51.25 - 51.50	0.25	gr.amf.	Åpen fold.	v					
51.50 - 53.80	2.30	grå gn.	m.p. og med musk. gn-bånd, spesielt mellom 53.15 og 53.65. Åpen fold på 53.25.	75					
53.80 - 60.00	6.20	grå gn.	Vanlig type, med gr, men gl-fattig i starten. Gl- rikere og mer b.p. mot slutten.	70 (65-80)					
60.00 - 60.35	0.35	amf.	Med beige skarn. Uregelm. foldet.	v					
		3							

Lokalitet: MOFJELLET S-FØR SKISTUTJERN

Avviksmålt

Dato : nov.+ des. 1983
 Koordinater : ca. 45.274 Y, 925.357 X
 Retning : rett syd
 Helling/stigning: 83.5°
 Høyde : ca. + 203 m
 Lengde : 345 m

Borehull: 8306

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.95	0.95	jordboring							
0.95 - 8.50	7.55	grå gn.	Fra 6.70-7.50 et gr.hbl. biot.bånd som p.g.a. åpne folder kommer igjen flere ganger. b.p.Rel.lys.	70					
8.50 - 9.75	1.25	gr.amf.	Med lyse grå gn-bånd.	80-70					
9.75 - 10.55	0.80	grå gn.	Lys,b.d.Gr.	75					
10.55 - 30.70	20.15	grå gn.	m.p.Rel.gl-rik,finmlk. Åpne folder til 11.0. Ellers spisse folder. Spredt litt gr.Delvis noe musk.gn-aktig.Åpne folder fra 20.0: Hbl.biot.gn-bånd (6 cm) på 20.5.Fra 21.0 i star- ten fortsatt noen lokale folder,men mye: Åpne folder fra 28.0- 23.5.Deretter overv.:	v (0-85) 65-75 v (0-80) 70 v 70					
30.70 - 34.05	3.35	gr.amf.	Skarp øvre grense.Tildels store gr.I starten: Avtagende S og åpne fol- der fra 32: Fra 33.0:	80 v (0-70) 70					
34.05 - 34.90	0.85	musk.gn.	Av G-type,mot slutten mer grå gn.Noe biot.	70					
34.90 - 36.30	1.40	gr.amf.	Noe foldet.						
36.30 - 36.70	0.40	pegm.	Biot.						
36.70 - 39.80	3.10	amf.	I starten spredt litt	v					

.....2

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8305

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 15

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
380.20 - 383.60	3.40	Båndet grå gn. med bånd gr.amf.b.d.Noie gr. Lokalt noen spisse folder	65-90 mye 70-75						
383.60 - 383.75	0.15	pegm. Musk.biot.							
383.75 - 385.00	1.25	grå gn. b.p.Noie gr.10 cm pegm.på 384.05.	85						
385.00 - 394.30	9.30	gr.amf. Fink.mørk,tett,delvis med cm store gr.Fra 385.5: Fra 386.0: På 387.5 fleksur (60/0/70) med skarn.Deretter: Fra 389.5 noe biot.Fra 390.85 noen bånd gr. førende b.d.grå gn.	85 80 75 80-85						
394.30 - 395.05	0.75	grå gn. Lys,b.d.Gr.	80						
395.05 - 399.85	4.80	gr.amf. Fra 395.5: Fra 397.0: Lyse beige fink.skarn fra 398.55-398.80.	80 70-75 80						
399.85 - 400.00	0.15	grå gn. Fink.meget gr.rik grå gn. lyserosa.	80						
400.00 - 402.30	2.30	gr.amf. Noen skarnbånd (gr+lyse- beige skarn+lysegrønn skarn).Noen meget gr-rike grå gn.bånd og vanlige grå gn.band.Mot slutten:	70 80						
		15.3.85							
		A. Kruse							

Lokalitet:

Borehull: 8305

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 14

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
363.20 - 365.30	2.10	skarn-amf.	Med gr.amf.bånd, lysegrønn skarn. Fra 364.0 avtakende S. På 364.50: Deretter igjen tiltakende På 365.0:	80-85					
				50					
				80					
365.30 - 366.65	1.35	gr.amf.		75-80					
366.65 - 373.05	6.30	grå gn.	Vanlig type, noe gr. Fra 367.5 mere musk.(m.p.) og fortsatt noe gr. Fra 368.8-369.8 Deretter: Mot slutten mere vanlig-b.p. grå gn.	80					
				80					
				65					
				75-70					
373.05 - 373.20	0.15	skarn amf.	Olivengrønnlig skarn.	65					
373.20 - 374.35	1.15	gr.amf.		80-75					
374.35 - 374.40	0.05	skarn amf.	Foldeombøyning med sjenk- ler 75/100?						
374.40 - 375.45	1.05	grå gn.	b.p. Rel. lys.	85					
375.45 - 376.10	0.65	gr.amf.	Noen bånd py-impr.gr.hbl. biot.gn. Gradvis overgang til amfibolittaktig grå gn.	85					
376.10 - 377.25	1.15	grå gn.	Mellomgrå, b.d. Gr. Cm-smale amf. band.	85					
377.25 - 377.75	0.50	grå gn.	Lys, vanlig, litt gr.	85-90					
377.75 - 378.80	1.05	båndet gr.amf.	Med bånd grå gn. og mørk mlk.gr.biot.gn.	85					
378.80 - 380.20	1.40	grå gn.	Lys, vanlig-b.p. Noe gr.	85					
			15						

Lokalitet:

Borehull: 8305

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 13

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
323.70 - 333.70	10.00	gr.amf. biot.+noe py på 324.00-324.05.Fra 328.20-331.80 (75-90) noen spredte grå gn.bånd og noen meget spredte py impr.og: Fra 332.0-333.2 bare uregelmessige kjernebiter med gr.amf.(bore-eller kronefeil?)Deretter	85 80-85 85						
333.70 - 335.00	1.30	gr.amf. biot.rikNoen bånd grå gn.	85						
335.00 - 343.80	8.80	grå gn. b.d.Middelsgrå.Gr.4 cm amf.på 337.5.Derfra lysere gn.av vanlig type. Noen cm-tynne gr.amf.bånd mellom 338.65-338.85 og på 340.4.Fra 342.2 mere musk.	85 85 85						
343.80 - 344.60	0.80	biot.hbl.gn. En del gyllen-grønlig skarn.Litt gr.	80-85						
344.60 - 344.90	0.30	kvarts. med bånd med hbl.+gyllen-grønlig skarn.							
344.90 - 357.45	12.55	gr.hbl.biot.gn. Py-impr. Fra 345.5-345.9 Deretter: Delvis en god del gr. Noen gr.amf.bånd lokalt på 349.6-349.9: Fra 352.0 igjen:	85 60 80-85 60 80-85						
357.45 - 358.35	0.90	gr.amf.	85						
358.35 - 363.20	4.85	gr.biot.hbl.gn. Som før.	65.85						
.....14									

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8305

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 12

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		298.20 (15°).Mørk,tett, fink.Grønlig-gyllen skarn mellom 300.40-300.80.							
304.90 - 305.50	0.60	gr.hbl.biot.gn. Noen spredte py-impr. Spredt litt kalkspat.En del anhydritt?	80						
305.50 - 308.70	3.20	gr.amf. Som før. På 308.60 grovk.hbl+grøn- lig skarn+kv-feltsp.i foldeombøyning.	80						
308.70 - 310.50	1.80	båndet gr.amf.med bånd py-impr.gr.hbl.biot gn.	80						
310.50 - 312.20	1.70	grå gn. b.p.Gr.	75						
312.20 - 312.60	0.40	gr.amf.	80-85						
312.60 - 313.85	1.25	grå gn. Gr.	80						
313.85 - 315.15	1.30	Båndet gr.amf.med bånd grå gn.	80						
315.15 - 317.55	2.40	gr.amf.	85						
317.55 - 319.95	2.40	grå gn. Gr.Rel.lys.Med noen bånd gr.amf.Delvis m.d.Over- veiende:	85						
319.95 - 322.85	2.90	gr.amf. Noe biot.og py på 320.80- 320.90.	85						
322.85 - 323.05	0.20	pegm. musk.							
323.05 - 323.45	0.40	grå gn. Noe hbl.	85						
323.45 - 323.70	0.25	pegm. musk.							
		13							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8305

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 11

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
274.15 - 274.30	0.15	gr.amf.	80						
274.30 - 274.95	0.65	grå gn. b.p.-b.d.Gr.	80 (70-85)						
274.95 - 276.00	1.05	gr.amf. Foldet øvre grense.Lokalt noe grønnlig-gyllen skarn. Åpne småfolder.	v (0-85)						
276.00 - 284.05	8.05	grå gn. Med noen spredte,opptil 5 cm tynne hbl.rike bånd Noe foldet,mye: Fra 278.0: Fra 279.0: Fra 281 bare meget få hbl striper.S vanskelig å se Noe foldet.	60-50 80-85 65-55 (50-70)						
284.05 - 284.35	0.30	Pegm.							
284.35 - 289.95	5.60	grå gn. b.p.-b.d.Igjen noe flere hbl-rike striper.No foldet,men mye: Fra 288.7:	v 60-75 80-85						
289.95 - 291.20	1.25	gr.amf. På slutten noen grå gn. bånd.	85-90						
291.20 - 291.85	0.65	grå gn. b.p.-b.d.Gr.	85-90						
291.85 - 292.15	0.30	gr.amf.	85						
292.15 - 292.75	0.60	grå gn. b.p.-b.d.Gr.	85						
292.75 - 304.90	12.15	gr.amf. Noen grå gn.bånd mellom 293.90-294.50.Ellers ho- mogen.2 cm kalkspat på 294.30.0,5 cm sprekke- fylling med kalkspat på12	80-90 mest 80-85						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8305

Helling/stigning:

Høyde :

side 10

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
248.00 - 248.30	0.30	kvarts.							
248.30 - 248.55	0.25	gr.amf.	80-60						
248.55 - 249.65	1.10	grå gn. b.p.litt etter hvert mer musk.Fra 249.3 m.p.	70-80						
249.65 - 256.50	6.85	gr.amf. Noen striper grå gn.	75						
		grå gn. b.d.lys-mellomgrå.Fink.gr. hbl.førende bånd på 251.20-251.30,251.70-251.90. Ellers cm smale hbl.førende striper.Noie kloritt. Fra 253.0: Fra 254.0:	75 80-85 60-70						
256.50 - 259.95	3.45	Båndet gr.amf. Med bånd grå gn.Spredt noe py.	60 (50-70)						
259.95 - 261.50	1.55	hornbl.førende grå gn.Fink.	65 (50-80)						
261.50 - 271.60	10.10	grå gn. b.d.rik på fink.gr.Fort-satt spredt noe hbl.og klor.Foldet fra 263.0-263.4.Deretter: Åpne småfolder fra 264.7 Mye: Noen hbl.og grønlig gyllen skarnbånd fra 267.90-269.90	v 45-80 mye 65 v 0-40 v (0-40)						
271.60 - 273.20	1.60	båndet gr.amf. med bånd b.d.grå gn.Spredt noe foldet.Fra 272.7:	60-40 70-80						
273.20 - 274.15	0.95	grå gn. b.p.Noie spisse folder med akseplan ca.35°.	70-80						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8305

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 9

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		men ofte: Homogen Åpne folder fra 220.0 og mer musk. (m.p.med musk. rike bånd) Akseplan ca.85°	80 v (0-80)						
226.95 - 227.70	0.75	grå gn.med bånd gr.biot.(hbl)gn.	80-85						
227.70 - 243.00	15.30	gr.amf. I starten åpne folder og fleksurartede småfolder med akseplan ca.80°.Mørk, tett,fink,foldet. Fra 230.3: Noen bånd gr.rik fink.grå gn.	v (0-80) 80 (45-90)						
		Fra 232.2:åpne småfolder. også spisse folder med akseplan ca.85°.Fra 232.7 igjen Åpne folder fra 234.0- 236.9 (større foldeom- bøyning?)Fra 236.9 fort- satt noe foldet,men mye: Fra 238.5 store gr.Fra 239.4 åpne småfolder. Fra 240.0 mye:	v (0-85) 80-85 v (0-80) 85 80						
243.00 - 247.70	4.70	grå gn. b.p.Noe gr.Nokså spisse småfolder.Fra 244.55- 244.70 gr.amf: Fra 245.0 Mot slutten noen gr.amf. striper.	65-75 65 70-75 (60-80)						
247.70 - 248.00	0.30	gr.amf. Noe py-impr.Foldet.							
		10							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8305

Helling/stigning:

Høyde :

side 8

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
192.00 - 194.00	2.00	grå gn.	Mer og mer innslag av gr.amf. Avtagende hbl. mot slutten. b.p.Gr. Åpne folder. v (0-75)						
194.00 - 197.90	3.90	gr.amf.	Noe båndet i starten med grå gn. Åpne småfolder Fra 197.0: v (0-70) 60						
197.90 - 200.00	2.10	gr.fels.	Opptil vel 1 cm store gr. En del feltsp. og kvarts+ noe biot. I starten bånd med gr.amf. Lokalt noe foldet. Mye 55-70						
200.00 - 200.60	0.60	gr.amf.	Båndet med grå gn. og litt pegm. Noe foldet. 55 v						
200.60 - 206.80	6.20	grå gn.	b.p. Noe gr. Med gr. biot- rikere bånd. Åpne småfolder. v (0-80)						
206.80 - 207.25	0.45	pegm.	Sv. grønlig lys gl.						
207.25 - 209.00	1.75	gr.amf.	Som vanlig mørk, tett, fin- mlk. med ofte store gr. I starten en god del biot. v Noe foldet, mye rundt: 0						
209.00 - 226.95	17.95	grå gn.	Noe gr. Åpne småfolder. Fra ca. 210 mer musk. og vanlig-m.p. og også spisse folder. Ditto fra 215 med sjenklene 65 og 110. Fra 217.90 lys vanlig- b.p. type. S vanskelig å se v (0-70) v						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8305

Helling/stigning:

Høyde :

side 7

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
164.00 - 170.45	6.45	musk.gn.	Noe foldet:	v					
			Fra 157.0 vanlig type og:	55					
			Fra 158.0 åpne folder	v					
			Fra 162.0:	50-70					
170.45 - 170.70	0.25	biot.hbl.gn.	Noen bånd m.p.grå gn. i starten.Ellers hvit og uten biot.Finmlk.Åpne folder fra 167.0.	70					
			Sv.grafittimpr.mot slutten(0-75)						
			Noen sv.grafittf.bånd. Skarp øvre grense og med det samme åpne småfolder.	v					
170.70 - 173.45	2.75	grafittholdig gneis.	Med biot.og noe musk. Foldet.	v					
173.45 - 174.45	1.00	Båndet gr.biot.hbl.gn.med graf.h.gn.Åpne småfolder.		v					
174.45 - 182.00	7.55	grå gn.	m.p.Lys.I starten sv.graf.	55-88					
			impr.Noel gr.2 cm gr.amf. på 176.4,176.5 og 176.7.						
			Lokalt noe foldet,men overveiende:	70					
			Biot.i større parallelle flak fra 180.35-180.40:	65					
182.00 - 188.20	6.20	Båndet grafittholdig gneis.	Fink.med mlk. bånd med brun biot.Åpne folder.	v					
188.20 - 192.00	3.80	hbl.biot.gn.	Brun biot.og grågrønlig hbl.i vekslende mengde. I starten noe båndet gra-	(0-75)					
			fitth.gr.Åpne folder	v					
.....8									

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8305

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 6

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		noe gr., og: Åpen fold fra 119.0-119.7 Åpne småfolder fra 120.0	60 v (0-70)						
		Fra 122.0: Avtagende S. På 124.0: Åpne folder fra 125.0:	70 60 v (0-75)						
		Fra 126.7 overveiende Fra 129.0: Mellom 131.5 og 135.3 musk. rikere med bånd musk. gn. Mellom 134.7 og 135.3 noen meget gl-fattige bånd	55 65-75						
135.95 - 136.00	0.05	gr.amfibol gn.	60-80						
136.00 - 148.50	12.50	grå gn. Vanlig type-b.p.Spredt noe gr.Avtagende S. På 136.7: Deretter økende S. Fra 137.8: Foldet fra 137.6. Fra 138.2 Åpne folder fra 140.4	55 30 50-60 270-50 v (0.70)						
148.50 - 149.00	0.50	kv-feltsp.hbl.skarn.gr.bergart.Grovk.Lyse- grønn skarn. Åpne folder.	v						
149.00 - 164.00	15.00	grå gn. Vanlig type. Åpne folder. Fra 150.0 m mere musk. m.p.-m.d. Åpne folder Fra 155.0-156.5 noe peg- matittisk og mindre musk.	v v (0-75)						
		7							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8305

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
92.60 - 99.35	6.75	grå gn.	Lokalt noe foldet.En del biot.Spredt noe gr.Fra 90.0 overveiende: 80-85 b.p.Spredt noe gr.Fold på 80 85.4 (?) 3 cm lysegrønn skarn på 96.30.						
99.35 - 99.55	0.20	Kvarts.							
99.55 - 101.45	1.90	grå gn.	Vanlig type.Noe gr.2 cm hbl+biot.på 99.60.1-3 cm lysegrønn skarn i foldeom- bøyning på 99.95.Grovk. biot.+kv+feltsp+lysegrønn skarn på 100.40-100.55. 75-85						
101.45 - 102.25	0.80	gr.hbl.biot.gn.	Fin-finmlk. 75-85						
102.25 - 102.50	0.25	Pegm.	Musk.						
102.50 - 104.00	1.50	gr.hbl.biot.gn.	Mlk.M.sv.m.fink.po-diss. Noen spisse folder med akseplan ca.85°.Båndet. 75-85						
104.00 - 117.05	3.05	grå gn.	Spredt noe gr.Veksler fra 80 b.p.til vanlig tilm.p. 5 cm grovk.hbl.gn.på 106.90.Mer og mer vanlig lys gl.gn.med noe gr. 80-85 vanlig-b.p.S ofte vanske- lig å se.Fra 115.5: 60 Fra 116.8: 45						
117.05 - 117.40	0.35	gr.amf.	En del biot. 80-60						
117.40 - 135.95	18.55	grå gn.	I starten rel.musk.rik. 75 deretter vanlig lys type,						
			6						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8305

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
58.00 - 66.10	8.10	grå gn.	b.p.-b.d.Noë gr. Fra 59.0 Fra 60.7 m.p.og noe fol- det (rel.spisse folder). Åpen fold med hbl.på 61.3 Fra 62.0 (spisse folder) Fra 63.5: Åpne småfolder fra 64.6- 65.5. Deretter: Gradvis overgang til:	75 50-75 75-60 65 70-80 65 v (0-60) 55					
66.10 - 72.55	6.45	musk.gn.	G-type.Rel.spisse småfol- der. Biot.rikere,musk-fattigere partier,S overveiende:	55-90 75					
72.55 - 80.15	7.60	grå gn.	m.p.Spredt noe gr.Noen musk-rikere bånd.Fortsatt lokalt spisse folder.Noë foldet mellom 76.0-76.5 Deretter: Åpne folder mellom 78.3- 79.3.Deretter: Gradvis overgang til:	65-75 v 75 (0-70) 70-80					
80.15 - 92.60	12.45	musk.gn.	G-type.Vekslende musk.og biot.innhold.Gneisene er hele tiden m.p.-m.d.grå gn-aktige gneiser som er rel.gl-rike,og derfor delvis er musk.gn-aktige. Åpne småfolder. Fra 81.7: Lokalt grå gn-aktige bånd	v (0-70) 70 (65-75)					
			5						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8305

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
33.15 - 33.40	0.25	Gr.amf.	50-55						
33.40 - 38.30	4.90	grå gn. b.p.Åpne småfolder.Noen musk-rikere bånd.Noen "pegmatittiske" partier fra 34.25-35.70.Også spisse folder.Fra 36.5 mer m.p. og:	v (0-55) 55-70						
38.30 - 38.95	0.65	gr.amf.	65 (55-70)						
38.95 - 40.30	1.35	grå gn. b.p.Spor grafitt(?)Fleksur 60-20 ⁸ ,Noe foldet.	v						
40.30 - 43.30	3.00	gr.amf.i avveksling med grå gn.p.g.a.åpne (og spisse)folder.	v (0-70)						
43.30 - 44.05	0.75	grå gn. m.d.	70						
44.05 - 48.60	4.55	grafittholdig grå gn.Noe båndet.Svak grafittføring,aldri sammenhengende grafittlag.Åpne folder,spisse folder, fleksurer.Noen parasittiske folder viser akseplan ca. 80 ^o .Fra 46.7m.d. og:	55-70 mest 55-70 70-80						
48.60 - 50.50	1.90	grå gn. Vanlig,men med musk-rikere bånd.M.sv.po-diss.	70						
50.50 - 58.00	8.00	musk.gn. G-type.Grå gn-aktig spisse og m.spisse folder. Fra 53.0 Foldet fra 57.5-58.0 Deretter:	70 50-80 mye 70 65						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8305

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
21.00 - 22.90	1.90	grå gn.	I starten m.d.senere vanlig-b.p.Avtagende S. På 21.6: 50 Deretter økende og på 22.0:65						
22.90 - 23.10	0.20	biot.hbl.gn.	Finmlk.(hbl.-rik grå gn.) 75						
23.10 - 24.95	1.85	grå gn.	m.d.Spredt noe gr.Fra 70 24.25 noen smale 0.5-5 cm brede biot-rike mlk.bånd. Avtagende S.						
24.95 - 25.05	0.10	gr.amf.	Noe biot. 45-70						
25.05 - 26.40	1.35	grå gn.	Vanlig.Noen smale biot-rikere bånd. 70						
26.40 - 27.00	0.60	pegm.	Biot. musk.						
27.00 - 27.65	0.65	grå gn.	Vanlig. 55						
27.65 - 28.60	0.95	gr.amf.	Spisse folder med akseplan 60-75(refoldet?) og åpne småfolder.Mørk. Finmlk. (0-50) v						
28.60 - 29.05	0.45	grå gn.	b.p. 45						
29.05 - 29.65	0.60	gr.amf.	Spisse folder,akseplan ca. 60°.						
29.65 - 31.10	1.45	grå gn.	Spisse folder med akseplan ca. 55°. 45-65						
31.10 - 33.15	2.05	musk.gn.	G-type.Litt fleksurartet foldet?Også spisse folder Åpne småfolder på 32.7. Spredt noe gr. 65-55						

.....3

Lokalitet: MOFJELLET S-FOR SKISTUTJERN

Dato : Sept. og okt. -84
 Koordinater : ca. 45.273 Y, ca. 925.210 X
 Retning : syd
 Helling/stigning: 88°S
 Høyde : ca. 255 m.o.h.
 Lengde : 402.30 m

Borehull: 8305

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.80	2.80	jordboring							
2.80 - 14.50	11.70	grå gn. Vanlig type-b.p.lys.Gr. 3 cm lysegrønn skarn på 6.40.Gradvis avtagende S: ved 7.0: ved 8.0: Noe større foldeombøyning på 9.5 med foldeåpning 40°.Deretter: Mellom 10.0 og 14.4 kv. feltsp-rike partier med en god del gr.og mlk. (psendo-pegmatittisk).	75-65 65 55 70						
14.50 - 15.00	0.50	grafittholdig musk.biot.gn.Grafitt-føringen er svak og aldri i sammenhengende lag.	70						
15.00 - 16.40	1.40	grå gn. Vanlig b.p.	70						
16.40 - 18.70	2.30	biot.gn,eller grovmlk.grå gn.Beksvart biot. Spredt noe gr.og po.Kvarts-rike,opptil 1 cm større øyner omgitt av bøyete, opptil 6 mm store biot. flak(blastomylonitt?) Innimellom bånd med vanlig fink.grå gn.Uregelmessig innfoldet kontakt på 18.5.	70						
18.70 - 20.00	1.30	grå gn. Lys,vanlig.Spredt noe gr. Mot slutten mer musk.	65-75						
20.00 - 21.00	1.00	musk.gn. Gr.type.Noie biot.	70 (60-75)						
.....2									

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8304

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 15

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		Fra ca.410.5 noe mørkere. Åpne småfolder mellom 412.5-412.6, og 413.2- 413.5 og mere musk,ellers:	80						
414.65 - 414.80	0.15	gr.biot.hbl.gn. Py-impr.	85						
414.80 - 415.40	0.60	musk.gn. Noe biot.og gr.Spor py.	85						
415.40 - 416.00	0.60	gr.amf.	80						
416.00 - 416.20	0.20	pegm.+musk.biot.gn.							
		27.2.1985							
		A. Kruse							

Lokalitet:

Borehull: 8304

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 14

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
384.85 - 387.25	2.40	grå gn. Øl-og gr.rik.Finmlk.Fra 365.5:åpne og spisse folder. b.p.	70 v (0-70)						
387.25 - 387.45	0.20	pegm.	Musk.						
387.45 - 396.55	9.10	grå gn. Gr- og gl-rik. b.p.Rel. mørk.Fra 388.0 økende S: på 388.5: Fra 389.0: Fra 388.7 noen musk.rike bånd (musk.gn.) Fra 390.0: Fra 390.4 bånd med lyse grå gn.b.d,gr.og: Fra 392.5: Fra 393.25-393.40 noe hbl.og: Fra 393.95 spredt noe hbl. og:	30 50 60-65 70-75 75 65 75 85						
396.55 - 398.60	2.05	grå gn.	Tildels musk.gn. Rel.gl-rik.No gr.Mest	70-85 30					
398.60 - 400.00	1.40	grå gn.	Lys, vanlig.	85					
400.00 - 401.90	1.90	grå gn.	Mellomgrå, vekslende musk. biot.forhold.Gr.No amfi- bol på 401.85.	85					
401.90 - 406.00	4.10	grå gn.	m.p.Delvis musk.rik.Spredt noe gr.Fra 402.8 noen åpne folder, til 407.7.	35					
406.00 - 414.75	8.75	grå gn. Lys mellomgrå, b.p.-b.d. Noe gr.Fra 408.0: Fra 408.7-409.7 noen (spisse folder).15	85						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8304

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 13

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
358.05 - 359.15	1.10	pegm.	Biot. og musk.						
359.15 - 360.25	1.10	grå gn.	Gr.mellomgrå, b.d. På 359.55-359.70 pegm. Ditto på 360.05-360.25.						75-85
360.25 - 380.00	19.75	gr.amf.	Enkelte bånd uten gr. Noe båndet med hbl-fattige bånd og grå gn.bånd. Fra 366.0-366.6: Noe foldet, delvis spisse folder (75°/100°). Fra 369.0 Fra 373.2-373.5 Åpne folder. Deretter: Fra 373.5- mindre gr. og noe skarn. Noe varierende S: Mest: 15 cm pegm. på 376.5. Økende skarn. innhold. Fra 379.0-379.5 Åpne folder. Gradvis overgang til:	85 70-80 v 85 60-85 80 v (0-80)					
380.00 - 381.45	1.45	grå gn.	Mellomgrå, b.d. Gr. Rel. biot. rik. Foldet fra 380.50.						55
381.45 - 383.20	1.75	gr.biot.musk.gn.	Vekslende forhold biot. musk. Foldet (?)						v (0-70)
383.20 - 383.35	0.15	kvarts.							
383.35 - 383.65	0.30	musk.sk.	Noe biot. og gr.						55
383.65 - 384.85	1.20	gr.musk.gn.	En god del biot. gl. rik. Noe båndet. S øker til:						60 70

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8304

Helling/stigning:

Høyde :

side 12

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
336.15 - 336.70	0.55	malmimpr.i musk.gn.	Grovskjellet, med en del biot. og noe hbl. Striper og impr. med py+sl.	70	0.42	0.14	1.83		5.6
336.70 - 341.20	4.50	gr.biot.hbl.gn.	Py-impr. Økende S, fra 337.0 Gr.amf.bånd.	70 80-85					
341.20 - 342.10	0.90	gr.amf.	Fint båndet.	85					
342.10 - 343.95	1.85	gr.biot.hbl.gn.	Uten py-impr. Noen bånd grå gn. Ofte gr.amf.bånd.	85					
343.95 - 347.00	3.05	grå gn.	Vanlig type, lys. Noe gr.	85					
347.00 - 347.65	0.65	gr.amf.	(Er den kommet feil i kassen og er fortsettelsen av gr.amf. på 343.95?)	85					
347.65 - 350.55	2.90	grå gn.	Noe gr. b.d. Noe hbl. i fold på 349.10.	85					
350.55 - 350.70	0.15	pegm.							
350.70 - 352.85	2.15	gr.amf.	Mørk, tett, massiv. Fin-fin-mlk. med store opptil 1 cm store gr.	85					
352.85 - 353.50	0.65	grå gn.	Gr.	85					
353.50 - 353.80	0.30	gr.amf.		85					
353.80 - 354.35	1.05	grå gn.	b.d. Gr. Noen smale bånd (cm) gr.amf.	85					
354.85 - 358.05	3.20	gr.amf.	Fold på 355.45. Som før, men gr. er mlk. På 356.3: spisse folder med åpning 30° (70°/100°). Fra 356.5: noen smale pegm-bånd og:	80					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8304

Helling/stigning:

Høyde :

side 11

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
301.70 - 303.70	2.00	gr.amf.	I starten lite gr.og spredt noe skarnbånd. Fra 303.0	85-75					
303.70 - 308.20	4.50	gr.amf.	Med grå gn.bånd.Fra 305 litt po i grå gn.båndene og: Mot slutten fra 306.5 bred- ere grå gn.bånd uten po.	70 75 80					
308.20 - 312.70	4.00	grå gn.	Gr. b.p.-b.d.Til 309.0 m enda noe hbl.(i bånd). Også fra 310.90-311.20.	35					
312.70 - 315.55	2.85	grå gn.	Vanlig-m.p.Noen musk.biot rikere bånd.Mot slutten:	30 60					
315.55 - 315.90	0.35	kvarts.							
315.90 - 318.95	3.05	grå gn.	Vanlig.I starten noe gr. mest:	80-70 80					
318.95 - 319.55	0.60	hbl.gn.	Grå gn.med vekslende hbl- føring+noe gr.amf.	80					
319.55 - 321.35	1.80	grå gn.	Vanlig type.Gr.Noe foldet mellom 320.5 og 320.8.	80					
321.35 - 336.15	14.30	gr.biot.hbl.gn.	Py-impr.Varierende biot. og hbl-innhold.Mest hbl- rik.Fra 323.60 Foldeombøyning på 324.50. Deretter Fra 328.0 en del bånd gr. amf.(uten py)Ellers også noe mindre py.Noen spisse folder på 330.3.Fra 331.5 noe musk.	85 70 80-75					
			12						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8304

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
277.20 - 278.85	1.65	amf.	Som før.	80-85					
278.85 - 279.30	0.45	gr.amf.	Noen grå gn.bånd.	85					
279.30 - 282.00	2.70	grå gn.	Gr.Mellomgrå,b.p.-b.d. Spredt noe hbl.holdige smale bånd på 280.90 m, 281.35 m,281.65 m.	85 (80-90)					
282.00 - 285.40	3.40	gr.gn.med hbl.-rike bånd.	Gr.l starten øken- de S.Ved 283.00: Deretter	65 80 85 (75-90)					
285.40 - 293.75	3.35	gr.amf.	Med bånd mellom-rå grå gn.med gr.S hurtig økende til: Noen fleksurer på 286.50 Deretter varierende mellom og fra 287.9: Grå gn.båndene opptil 0.5 m.Fra 290.00-290.20 py-impr.i bånd og foldet. Svakt foldet til 292.5 Deretter	50 60-90 85 v 85					
293.75 - 293.95	0.20	pegm.							
293.95 - 298.90	4.95	gr.amf.	Med grå gn.bånd (+gr). Fra 297.0 spredt noen spisse folder.	70 80					
298.90 - 301.70	2.80	amf.	Med smale skarnbånd og og noen gr.amf.bånd. Fra 301.3- (spisse)folder.Avtagende skarn mot slutten.	65-70 v 65-85					

.....11

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8304

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 9

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
252.40 - 256.10	3.70	båndet gr.amf. med bånd grå gn.(spredt noen småfolder).Fra 254.3-255.1 åpne småfolder Fra 255.1:	70-85 v 45						
256.10 - 256.40	0.30	pegm.	Musk.og biot.						
256.40 - 258.00	1.60	grå gn.	Rel.lys-mellomgrå, vanlig type.Cr.						
258.00 - 261.10	3.10	gr.amf.	I starten noen bånd grå gn.Åpne folder.						
261.10 - 262.00	0.90	gr.biot.gn.	Spredt noe hbl.St.py-impr Med bånd gr.amf.Noe foldet?						
262.00 - 262.70	0.70	gr.amf.	Åpne folder.						
262.70 - 263.00	0.30	hbl.biot.gn.	St.py-impr.						
263.00 - 271.20	3.20	gr.amf.	Spredt noen meget spisse folder.Fra 267.15-267.80: åpne folder. Fra 268.0: S økende til:						
271.20 - 271.80	0.60	sterkt po-impr.+noe py i grovk.amf.(+noe biot.)	80-70	0.03	0.03	0.03		11.9	
271.80 - 277.05	5.25	amf.	Fin-finmlk.Skarnbånd, åpne småfolder.Fra 274.5 også spisse folder til 275.0 Fra 275.0: Noen spisse folder på 276.7.						
277.05 - 277.20	0.15	sterkt po-impr.+noe py i grovk.amf.(+noe biot)med et 4 cm pegm.bånd.	80						

....10

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8304

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 8

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
218.60 - 230.50	11.90	grå gn. b.d.Gr.Mellomgrå. Fra 220.0 småfoldet Fra 220.0-221.3 noe stic- tolittisk. Fra 221.80-221.95 gr.amf. og S: Deretter: og fra 222.60: Fra 226.0-228.3 Fra 228.3-228.3 åpne fold. Fra 228.8	75-80 60 80 60-75 75 80-85 v 75-85						
230.50 - 230.80	0.30	gr.amf.	75						
230.80 - 234.50	3.70	grå gn. Middelsgrå,b.d.Noë gr. Noë hbl.på 231.3.	85-75						
234.50 - 236.30	1.80	grå gn. Som før,med spredte,opp- til 20 cm brede gr.amf- bånd.Spisse folder: Også noen bånd med sv.py- impr.musk.biot.gn.	65-85 65-85						
236.30 - 249.90	13.60	grå gn. Åpne folder fra 236.4- 237.4.Litt etter hvert gl- rikere.Derfra igjen: Fra 240.45-241.90 noe biot. musk.gn-aktig.Lokalt noen (spisse) detaljfolder.Rel gr.rik og gl-rik.Småfoldet fra 246.40- men mest mellom:	v 85-65 v 50-85						
249.90 - 252.40	2.50	båndet grå gn. med bånd gr.amf.(delvis gr.hbl.biot.gn.)	75-85 (60-85)						
		 9							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8304

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 7

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
188.00 - 190.00	2.00	gr.amf.	Som før. Avtakende S og noe foldet (0-40)						
190.00 - 190.40	0.40	pegm.	Biot.						
190.40 - 210.75	20.35	gr.amf.	Som før, tett, fink, men til- dels store gr.S ofte van- skelig å se, ofte foldet. Noen spredte pegm.bånd. Fra 196.70: Gradvis avtakende S: fra 198.0: Ved 200.0: Fra 201.0-202.0 (Foldeombøyning) Deretter økende S: Ved 202.3: Noe foldet. Fra 207.5- Grå gn.bånd mellom 209.50- 209.70 med: 210.75 - 211.70 211.70 - 213.35 213.35 - 213.85 213.85 - 216.70 216.70 - 217.00 217.00 - 218.60	v (0-50) 50-40 40 25 0 45 (0-80) 70-75 75 30-50 70 80 80 30-80 75 50-70					
210.75 - 211.70	0.95	grå gn.	Gr. b.d.						
211.70 - 213.35	1.65	gr.amf.	I starten noe foldet, så:						
213.35 - 213.85	0.50	grå gn.	Gr.						
213.85 - 216.70	2.85	gr.amf.	(Mellom 214.5 og 215.0: 50°). Fra 215.7:						
216.70 - 217.00	0.30	grå gn.	Gr. b.d. Lys.						
217.00 - 218.60	1.60	gr.amf.							
			8						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8304

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 6

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
171.60 - 175.00	3.40	båndet grå gn. med gr.amf.	Fra 169.0: Gr.b.d. Fra 172.3-174.0 Åpne folder og spisse (refoldete ?) folder.Fra 174.0-174.60: Fra 174.60 åpne folder med akseplan ca.80°.De spisse (refoldete ? litt usikker om det virkelig er folder) har da akse- plan ned til 30°.	35-45 40 v (0-60) 85-80 v					
175.00 - 182.85	7.85	gr.amf.	Som før.Åpne folder. Fra 178.0 spisse folder på 178.50 med akseplan 80°. Fra 178.70:åpne folder Spredte konsentrasjoner av lys olivenbrunlig skarn Fra 180.5 men fortsatt lokalt litt foldet.	v 70 v (0-55) mys:50-80					
182.85 - 183.15	0.30	pegm.	Biot.						
183.15 - 187.10	3.95	gr.amf.	Som før.(spisse folder med sjenkler 65 og 95). Fra 185.0-186.8 noen grå gn.bånd og S overveiende:	65-85 ca.80					
187.10 - 188.00	0.90	pegm.	Biot.						
			7						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8304

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		Fra 149.3:	60						
		Fra 15.0 Åpne folder	v						
			(0-45)						
152.00 - 153.40	1.40	båndet gr.biot.gn.med grå gn.Biot gn.med lys oliven skarn.Åpne folder.	v						
			(0-40)						
153.40 - 155.35	1.95	grå gn. Gr.Fortsatt foldet.Meget skarp diskordant (?)grense med:							
155.35 - 158.70	3.35	gr.amf. Fink,mørk,fin-finmlk,gr. Åpne folder.Men øvre grense 85 (diskordant?) Gradvis overgang nederst til:	v						
			(0-40)						
158.70 - 158.80	0.10	grå gn. Noe gr.							
158.80 - 159.15	0.35	pegm.							
159.15 - 162.25	3.10	grå gn. Mellomgrå,b.d.Åpne folder Noe gr. Fra 160.0	v						
			(0-45)						
			50						
162.25 - 163.40	1.15	gr.amf. Noe biot,båndet m/grå gn. Åpne folder Fra 162.60:	v						
			0-55						
			75						
163.40 - 165.00	1.60	grå gn. Gr.b.d.Noie foldet men mye:	v(0-50)						
			50						
165.00 - 166.80	1.80	båndet gr.amf.med kvarts- og pegm-og grå gn. bånd.Mye:	80						
166.80 - 171.60	4.80	gr.amf. Noe biot (i bånd)Åpne folder.Noen spredte partier med oliven skarn.	v						
			(0-40)						
		6							

Lokalitet:

Borehull: 8304

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
122.20 - 123.20	1.00	Pegm. Biot.Hbl-skarn bånd (6cm) på 122.60.							
123.20 - 124.05	0.85	grå gn. Pegmatittisk.Noë py-impr. Gr.	70						
124.05 - 125.35	1.30	grå gn. m.p.med musk.rikere bånd. Gr.	80						
125.35 - 126.85	1.50	båndet biot.gn. Med m.p.grå gn.I biot. båndene lys olivenfarget skarn.	80						
126.85 - 131.30	4.45	hbl.biot.gn. En del gr.og lys oliven skarn.Py-impr.Åpne folder Noë båndet En god del rundt	v 0-80 0						
131.30 - 132.45	1.15	grå gn. Lys b.p.Gr.Åpne folder.	v 0-30						
132.45 - 133.15	0.70	skarnrik biot.gn. Som før.Åpne folder. Mye	v 0-30						
133.15 - 152.00	18.85	grå gn. Lys,noë gr.i starten en del lys oliven skarn.b.p. Foldet i starten Fra 14.70: gradvis avtagende S. Fra 136.0-139.5 Fra 139.5 raskt økende S til Fra 140.5.Åpne folder Fra 145.4 mye Fra 147-148 Åpne folder	(0-30) 30 10 50 v (0-40) 40 v (0-40)						
		5							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8304

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
84.00 - 93.45	9.45	grå gn. m.p.Med noen musk.rikere bånd.Fra 86.0:åpne folder	70 v 0-75						
93.45 - 95.90	2.45	gr.hbl.biot.gn. Hbl.Hoveds.i smale bånd. Fra 95.0 åpne folder.	65						
95.90 - 96.75	0.85	grå gn. b.d.Lys.Åpne folder.No	gr0-60						
96.75 - 100.40	3.65	biotittbåndet grå gn.Rel.smale mlk.biot. rike bånd,ofte med hbl. Noe po-impr.Gr.	70						
100.40 - 101.85	1.45	grå gn. Lys,b.d.No	gr.S økende til: 80						
101.85 - 103.10	1.25	gr.hbl.gn. Rel.feltsp.rik.	70						
103.10 - 106.50	3.40	grå gn. Noe gr.	75						
106.50 - 107.90	1.40	båndet hbl.gn. Med bånd grå gn.No	gr.i starten.I hbl.båndene og så biot+po-impr.Åpne fold. v i starten,deretter: 80						
107.90 - 111.25	3.35	gr.hbl.gn. Gr.rik.Spredt noe kis.	80						
111.25 - 113.85	2.60	gr.hbl.biot.gn. Py-impr.Spredt noe klor.	80-70						
113.85 - 119.00	5.15	gr.hbl.gn. I starten noen spisse fol- der.Noen mer amfibolitti- ske bånd.	70-80						
119.00 - 120.25	1.25	gr.amf. Delvis noe hbl.gn-aktig.	75						
120.25 - 122.00	1.75	grå gn. b.d.Middels grå.Gr-rik. Noe hbl.på 121.55.	80-85						
122.00 - 122.20	0.20	skarnrik hbl.biot.bergart:lyse olivenfarget skarn.Rel.mye kv-feltsp. noe pegmatittisk.							

.....4

Lokalitet:

Borehull: 8304

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
45.30 - 46.35	0.95	biot.diopsidskarn:biot+diopsid+kv.feltsp. med bånd grå gn.Noë hbl?	80-70						
46.35 - 46.65	0.30	pegm. Med hbl.biot.diops.							
46.65 - 47.15	0.50	hbl.biot.kv.feltspatfels.Grovk.Noë kalkspat							
47.15 - 48.65	1.50	biot.diops.skarn:biot.diops+kv.feltsp.Noë hbl.med biot-fattige bånd.							
48.65 - 56.65	7.00	grå gn. b.d. biot.bånd på 49.80-70-75 49.85.							
56.65 - 58.80	2.15	På 52.10:3 cm skarn.amf.	70-85						
58.80 - 60.00	1.20	kjernetap.							
60.00 - 61.10	1.10	biot.diops.skarn.Som ovenfor,men med smale pegm.bånd.							
61.10 - 64.50	3.40	grå gn. b.d. Noë gr.Fra 63.80 mer musk.Mot slutten musk.gn.	70-80						
64.50 - 64.55	0.05	kvarts.							
64.55 - 67.20	2.65	grå gn. b.d. Mot slutten:	80 45						
67.20 - 83.05	15.85	gl.fattig grå gn. m.d.Ingen biot.Med bånd vanlig grå gn.og musk.gn. Åpne folder. På 68.75 2 mm po.Fra 68.50 mer vanlig m.p.grågn Fra 80.0:åpne folder Fra 82.0	v 0-65 65 v 80-50						
83.05 - 84.00	0.95	grafittholdig grå gn. Sv.graf.impr.Po-impr. Åpen fold med musk.rik grå gn.i kjernen.	50- v						
.....3									

Lokalitet: MOFJELLET S-FOR SKISTUTJERN

Dato : august 1983

Avviksmålt

Koordinater : ca. 45.263 Y, ca. 925.297 X

Retning : rett S

Helling/stigning: 88°

Høyde : ca. 225 m.o.h.

Lengde : 416,2 m

Borehull: 8304

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	jordboring							
1.00 - 1.60	0.60	hbl.biot.gn.	Mlk.3 cm skarn på 1.50.	60					
1.60 - 10.00	8.40	grå gn.	b.d.Lys.Noë gr.Ant.noë foldet,men mye Fold på 5.70 Fra 8.0-9.0 Fra 9.0 foldet Mye:	55-80 60-70 35-80 80 v 60-70					
10.00 - 10.25	0.25	grønn skarn	i en fold med grå gn. og pegm.	v					
10.25 - 45.30	35.05	grå gn.	m.p.Noë gr.På 12.80 ses 2 foliasjoner med 20° forskjell nl.60 og 80°. Finmlk.musk.følger til- dels 60°.Herfra musk. rikere (litt musk.gn-akt.) Ved 15.3 noe gyllen kalk- spat. Mindre musk.En god del utydelige småfolder, antagelig fleksurer.Tyde- lig på 19.00-19.40:65-0. Fra 31.00-34.00 åpne folder i båndet grå gn. Fra 34.00 fortsatt noe foldet,men også mye: Fra 29.5 tydelige åpne folder,også spisse folder.Fra 34.0: Fra 34.9 rel.musk.rikere og foldet. Mot slutten lite foldet og mye	50-70 mye 65 v 0-70 v 60-70 v 70 v 70-75					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8303

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
80.40 - 90.55	10.15	grå gn. I starten noen smale biot.rikere bånd.Ellers lys og b.p.Litt gr.Fra 85.0-85.6 mer musk. Fra 86.0 noe båndet (mer biot) og: NB! Dybdene refererer seg til opptaks- markeringene i kjerne-kassene. 16/4-85 A. Kruse	60-65 60 60-65						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8303

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
59.60 - 59.75	0.15	pegm.	Musk.og biot.						
59.75 - 60.40	0.65	gr.amf.	Som før.Økende biot.innhold.	45					
60.40 - 63.00	2.60	grå gn.	Lys,b.p.-b.d.Noe gr.	45					
63.00 - 66.15	3.15	gr.amf.	Mørk,tett.Fink.Overveiende fink.gr.Noen smale bånd	45					
			grå gn.+grå gn.fra 64-70 65.15.	45					
66.15 - 70.00	3.85	båndet grå gn.	Lys b.d.En del gr.Med som oftest skarpt avgrensete gr.amf-bånd (opptil 20 cm brede)Også biot-rikere bånd.	50					
70.00 - 70.35	0.85	kvarts.							
70.85 - 71.80	0.95	grå gn.	Lys b.p.Avtagende gr.og økende musk.innhold.	55					
71.80 - 75.00	3.20	musk.gn.	Svakt båndet p.g.a.finfinmlk.biot.SPredt litt gr(i de mer grå gn-aktige partier)	55-60					
75.00 - 77.40	2.40	grå gn.	Lys mellomgrå,b.p.Spredt litt gr.	55-50					
77.40 - 80.40	3.00	hbl.grå gn.	Båndet,lys mellomgrå.Fink,hbl.grå gn-bånd avv.,med hbl.h.rel.biot.rik grå gn og lys grå gn.Noe gr. Fra 79.5:	55-60 60-65					
....5									

Lokalitet:

Borehull: 8303

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
40.80 - 41.00	0.20	pegm.	Musk.og biot.						
41.00 - 42.45	1.45	gr.amf.	Som før,gr-rik,fink.Noen spisse folder i starten.	65-80 mest 80					
42.45 - 47.25	4.80	gr.amf.	Finmlk-mlk.Gr.(mindre gr-rik enn forrige)Noe biot.Åpne folder fra 45.3-45.8.Deretter:	80-70 v 60-50					
47.25 - 47.45	0.20	kvarts	Noen amf.striper.						
47.45 - 52.05	4.60	gr.amf.	Som før finmlk-mlk. Fra 49.0:	65 55					
52.05 - 52.55	0.50	grå gn.	Lys.Mot slutten innfoldet (spisst)noe amf.	50					
52.55 - 53.60	1.05	gr.amf.	Fink.En del biot.	60-50					
53.60 - 53.80	0.20	pegm.	Biot.						
53.80 - 55.70	1.90	gr.amf.	Som før fink.og en del biot.Spisse folder i sta- rten og der: Fra 54.0 spisse folder med akseplan ca. 55° og S Fra 55.0:	45 45-60 60-55					
55.70 - 59.40	3.70	båndet grå gn.	Lys,b.p.Vekslende gr- innhold.Opptil 20 cm bre- de bånd gr.amf.Noen spisse folder.	50-45					
59.40 - 59.60	0.20	gr.amf.	Finmlk.Tildels store gr. (ca. 1 cm)	45					
		4							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8303

Helling/stigning:

Høyde :

side 2

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
22.55 - 23.70	1.15	gr.amf.	Som før.	70-60					
23.70 - 23.90	0.20	grå gn.	Lys, vanlig. Litt gr.	55					
23.90 - 34.40	10.50	gr.amf.	Som før. I starten noen småle bånd rik på fink. olivengyllen skarn. Åpne folder fra 25.2-25.4, akseplan 65-70. Deretter: Fra 27.0 avtagende til: Fra 28.0: Spisse folder fra 28.7-29.0 med akseplan 65-70°. Fortsatt noen meget spisse folder og: Åpne folder fra 30.2-31.0. Også spisse folder. Fra 31.2: Åpne folder fra 31.8-34.4 med akseplan ca. 30°. Noen tynne granatrike kv. feltsp. bånd i.f.m. de åpne folder.	55-70 v (0-75) 75-70 55 70-60 70-75 v (0-80) 80-85 v (0-85)					
34.40 - 34.95	0.55	pegm.	Musk. og biot. Spor kis.						
34.95 - 40.80	5.35	gr.amf.	Som før. Gr-rik og med tynne gr.rike kv. feltsp. bånd (opptil 4 mm) Fink. Noe biot. Åpne folder, og også spisse folder. Fra 38.0 fortsatt noen spisse folder og:	v (0-75) 70-85					
.....3									

Lokalitet: KJEMPHEIA

Borehull: 8303

Dato : juli 1983

Koordinater : ca. 50.588 Y, ca.925.245 X (eller ca.50.600 Y,

Retning : ca.25.270 X i

Helling/stigning: 10dd

NGU's nett)

Høyde : ca. 150 m.o.h.

Lengde : 90.55 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	jord							
1.00 - 4.35	3.35	gr. amf. Mørk, tett, fink-finmlk.	55-70						
4.35 - 4.70	0.35	skarnh.amf. Tynt laminert.	65						
4.70 - 8.85	4.15	gr.amf. Som før. Noen folder på 7.4.	65-85 mest 65						
8.85 - 10.70	1.85	"flekke"gr.amf. Fink, rel.mørk, med "flekker" av opptil 5 mm store hbl- krystaller og krystall- aggregater, som kan være langstrakte (mye lengre enn 5 mm) i lineasjonsret- ningen. Åpne folder fra 9.0-10.3. Mot slutten mindre flekket og skarp nedre grense:	75-70 v (0-85) 70 70						
10.70 - 13.50	2.80	grå gn. Lys, b.p. Noe gr. I starten noen gr.hbl.biot.gn-bånd og spisse folder. Foldet fra 12.7. Spredt litt hbl. og skarn. På slutten:	70-60 70						
13.50 - 19.05	5.55	gr.amf. Som før. Skarp grense: Fra 14.0: ofte tynt laminert. Fra 17.5 spisse folder med akseplan ca. 70°. Også åpne folder fra 18.0-18.6.	70 70-60 v (0-60)						
19.05 - 22.55	3.50	grå gn. Lys, b.p. Noe gr. Spredt noe hbl+skarn. Mot slutten:	60-50 70						

.....2

Lokalitet:

Borehull: 8302

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 6

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
84.75 - 87.40	2.65	grå gn. Rel.lys b.p.-b.d.Noë gr. Fortsatt noen smale musk- rikere bånd.Fra 86.5:	60-65 70						
87.40 - 87.70	0.30	pegm. Musk.							
87.70 - 89.50	1.80	grå gn. Lys, vanlig-b.p.Spredt noë gr.	65-70						
NB! Dybdene refererer seg til opptaks- markeringene i kjernkassene.									
12.4., 16.4.1985									
A. Kruse									

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8302

Helling/stigning:

Høyde :

side 5

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		lag.En del spisse folder og "ghost"-structures (folder).	70-80						
62.20 - 62.65	0.45	grå gn.	Lys, vanlig-b.p.Noë gr.	70					
62.65 - 65.30	2.65	gr.amf.	Rel.mørk.Tett.Noë lyse b.p.grå gn.bånd.Mot slutten avtagende hbl.og mer biot.	65					
				65					
65.30 - 67.65	2.35	grå gn.	Lys, vanlig, b.p.Noë gr.	65					
67.65 - 68.55	0.90	gr.amf.	Mørk, tett.Noë biot.	60					
68.55 - 69.70	1.15	grå gn.	Lys, vanlig.Ikke eller m. lite fink.gr.	60					
69.70 - 75.40	5.70	båndet gr.amf.	Som før.En del biot.Opp- til 35 cm brede bånd lys, vanlig grå gn.og mørke gr.biot.gn.	55-65					
75.40 - 76.75	1.35	grå gn.	Lys, vanlig, noe kalkspat i tynne lag.Noë få tynne opptil 5 cm brede bånd amf.	55-70					
76.75 - 77.60	0.85	gr. amf.	Noë biot.	65					
77.60 - 84.75	7.15	båndet grå gn.	Lys, vanlig.Noë gr.Opptil 20 cm brede bånd gr.amf. Avtagende antall gr.amf. bånd som erstattes av gr. biot.gn.Litt etter hvert mer musk.Lokalt noen spisse folder.	65					
				65					
		5							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8302

Helling/stigning:

Høyde :

side 4

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
41.70 - 50.60	8.90	gr.biot.musk.gn. Mellomgrå, finmlk. Åpne folder. Rel. gl-rik. Fra 42.8: Avtagende S fra 43.9. Fra 44.5: Fold på 44.9. Lokalt og spredt noe skarn og litt hbl. Mellom 46.0 og 48.0 noen pegm.årer og økende S fra 30 ^o til 40 ^o ved 47.4. Fra 48.0: 2-4 cm grovk. hbl. på 50.0 Mot slutten: B.a. kan også betraktes som en gl. (musk) rik og m. gr. rik grå gn.	v (0-70) 70 30 30 55-60 70						
50.60 - 53.45	2.85	gr.hbl.biot.gn. Tildels st.py-impr. med en god del musk. i starten. Fra 51.25 lite musk. og: Fra 51.9 avtagende py-impr. og:	80 60 70						
53.45 - 62.20	3.75	gr.amf. Mørk, tett. Fink. lys grå gn. bånd på 54.80-55.00 og 54.15-54.25. Gradvis noe lysere gr.amf. Tynne lag med noe kalkspat fra 55.8-57.6, spiss fold på 57.0 med akseplan ca. 70 ^o . Ditto fra 58.4-58.6. Noen spisse og uregelm. folder fra 60.4-60.8. Fra 61.1 tynne gr.rike kv.feltsp.	65 60 70						
		5							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8302

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
33.20 - 33.90	0.70	gr.hbl.biot.gn. Py-impr. Spisse folder med akseplan ca. 70° (80-0-70: foldeombøyning 30°)	v 70-80						
33.90 - 36.70	2.80	hbl.grå gn. Gr. rik, ellers som vanlig fin-finmlk, rel. kortprismatisk hbl., vekslende hbl.-innhold i vanlig grå gn. En del fink. olivengyllen skarn. Spor py.	75						
36.70 - 39.30	2.60	flekket gr. hbl.gn. Fin mlk. Rel. gr. og kv-feltsp. rik, mellomgrønlig grå, med mlk-grovmlk. hbl. krystaller og krystallaggregater etter S. Spor py. Noen bånd hbl.grå gn.	75-80						
39.30 - 39.90	0.60	pegm. Musk.							
39.90 - 41.00	1.10	hbl.gn. Rel. lys (kv-feltsp-rik), noe "flekket". Py-impr. Avtagende gr. innhold, økende musk-innhold. Ingen biot. (omvandlingssone?)	70-55						
41.00 - 41.15	0.15	kvarts							
41.15 - 41.20	0.05	kompakt grovk.py-krystall (aggregat) + kloritt.							
41.20 - 41.70	0.50	gr.musk.klor.gn. I starten hvit (kv-feltsp-rik) Fra 41.35 sv. grønlig (mindre kv.feltsp) Py-impr. (Omvandlingssone?) Gradvis overgang til:	40						
		4							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8302

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
16.30 - 19.25	2.95	hbl.grå gn.	Som før.I starten en del grovk.musk.(aggregater) Vekslende hbl-innhold og mindre hbl-frie partier. Åpne folder.Noe kloritt og tildels mye skarn i småfoldene.Også spisse småfolder.	v (0-60)					
19.25 - 20.00	0.75	gr.skarn-amf.	Mellomgrå.Åpne småfolder.	v					
20.00 - 21.50	1.50	hbl.grå gn.	Som før.Åpne småfolder.						
21.50 - 22.50	1.00	gr.amf.	Rel.kv-feltsp.rik.En del skarn.Spisse og fleksur-artete småfolder.	75-80					
22.50 - 28.90	6.40	hbl.grå gn.	Som før.Noen spisse folder Noen tynne gr.amf.bånd (25.1 og 25.5).Fra 26.1-27.5 sv.py-impr.og: Fra 28.0:	75-80 75 60-70					
28.90 - 29.15	0.25	pegm.	Musk.						
29.15 - 30.70	1.55	hbl.grå gn.	Åpne småfolder.Sv.py-impr fra 29.90 og økende musk-innhold.	v					
30.70 - 31.80	1.10	gr.hbl.biot.musk.gn.	Py-impr.Ikke ulik hengbergart linse II.Rel.lite hbl.Mot slutten avtagende py-impr.og hbl.innh.	70-80					
31.80 - 33.20	1.40	grå gn.	Lys-middelsgrå,vanlig, rel.gr.rik.Mot slutten spisse folder.	70-60					
			3						

Lokalitet: KJEMPHEIA

Borehull: 8302

Dato : juli 1983

Koordinater : ca. 50.645 Y, ca. 925.319 X (eller ca. 50.657 Y,

Retning : ca. 925.344 X i

Helling/stigning: lodd

Høyde : ca. 122 m.o.h.

Lengde : 89.5 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.30	1.30	jord							
1.30 - 1.50	0.20	gr.hbl.gn. Rel.lys.	65						
1.50 - 2.60	1.10	hbl.grå gn. Vanlig rel.gr.rik grå gn. med hbl.Spor kis.Avtagende hbl.innhold.	60						
2.60 - 3.35	0.75	grå gn. Rel.lys, vanlig b.p.Rel. gr.rik.	55-60						
3.35 - 4.15	0.80	hbl.grå gn. Som før, sv.py-impr.	75						
4.15 - 4.90	0.75	hbl.musk.biot.gn. Mlk.mellomgrå, st.py-impr (type hengbergart linse II .	60-70 mest 70						
4.90 - 6.20	1.30	grå gn. Vanlig, rel.gr.rik. Fra 5.2 b.p.og innfoldet noe hbl+ skarn (hbl.grå gn). Åpne småfolder fra 5.2	70						
6.20 - 15.15	8.95	hbl.grå gn. b.p, vekslende hbl+skarn Rel.gr.rik. Fleksurartete folder. Fra 6.90: ofte noe båndet: bånd rikere i olivengyllen fink. skarn og fin-finmlk.hbl. avveksler med grå gn.bånd (=noe hbl) Åpne folder fra 13.8.	30 (15-40) 45-50 v (0-55)						
15.15 - 16.30	1.15	gr.hbl.gn. Rel.mye kv-feltsp.og gr. En god del fink.oliven-gyllen skarn. Noe biot.	50						
		2							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8301

Helling/stigning:

Høyde :

side 6

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
81.30 - 83.95	2.65	grå gn. Lys, vanlig-b.p. Noe gr. Fra 83.0-83.95 vanlig m.d.	70 65-70						
83.95 - 96.00	12.05	grå gn. Mellomgrå, vanlig-b.d. Fin-finmlk. Oftest gr-fri Tildels laminert. Mest b.d. Fra 88.7: Fra 90.5: Fra 93.7-94.8 noen rel. gr. rike partier og noe stictolittisk. På 95.6 en fleksurartet fold. Mot slutten gradvis mer musk.	65 60 65-70 (60-70)						
96.00 - 97.10	1.10	grå gn. Lys, vanlig-m.p. med musk. rike (musk. gn-aktig) bånd. Noe gr.	65-70						
97.10 - 100.40	3.30	grå gn. Lys, mellomgrå, vanlig med b.p.-partier. Noe gr.	60						
100.40 - 100.55	0.15	Kvarts.							
NB! Dybdene refererer seg til opptaksmerkene i kjerne-kassene.									
11/12.4.1985									
A. Kruse									

Lokalitet:

Borehull: 8301

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
61.80 - 63.50	1.70	gr.amf.	Rel.mørk og tett.Noelaminert og tynt båndet.	65					
63.50 - 64.05	0.55	hbl.grå gn.	Fink,gr-rik,mellomgrå,tynt båndet-laminert,gr. ofte i gr.rike kv-felt-spatlag på noen mm tykkelse.	65					
64.05 - 65.40	1.35	grå gn.	Lys,b.d.Noel gr.Fra 64.30-64.50 noe mørkere (biot.+litt hbl.)Tildels rel.gr.rik.	65					
65.40 - 66.25	0.85	pegm.	Biot.musk.						
66.25 - 67.75	1.50	Båndet hbl.grå gn.	Gr-rik,med bånd gr.biot,hbl.gn.	70					
67.75 - 69.85	2.10	grå gn.	Lys,b.d.Noel gr.	65-75					
69.85 - 76.70	6.85	båndet grå gn.	Grå gn.som før,med noen opptil 20 cm brede bånd mørk,tett,tildels biot-rik gr.amf. 3 pegm.bånd (5-10 cm) mellom 72.6-73.4.	70 (65-75) mest 70					
76.70 - 77.55	0.85	gr.amf.	Mørk,tett,fink,som før.	65-70					
77.55 - 81.30	3.75	båndet grå gn.	Lys,b.p.-b.d.I starten noen musk.rikere bånd. Mindre gr.enn før.En del 0.5-10 cm brede biot-rike bånd (+ gr,+ hbl,+ musk.)	65 (60-70)					
.....6									

Lokalitet:

Borehull: 8301

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
44.80 - 46.85	2.05	hbl.grå gn.	Noen spredte tynne biot- rike lag med litt py. Rel.lys, vanlig grå gn. med gr.og vekslende hbl- innhold.På 46.4 skarn. hbl.gn.(15 cm).Spor kis.	50-60					
46.85 - 48.15	1.30	grå gn.	Mellomgrå, b.p.Gr.Spor kis.Åpne folder fra 47.1.	50					
48.15 - 49.55	1.40	gr.hbl.gn.	Rel.kv-feltsp.rik, tildels hbl.grå gn-aktig. Åpne folder	v (0-40)					
49.55 - 49.85	0.30	Pegm.	Musk.						
49.85 - 50.70	0.85	gr.hbl.gn.	Som før.Åpne folder.Av- tagende hbl.mot slutten.	v (0-25)					
50.80 - 53.50	2.70	grå gn.	Som før.Åpne folder.Inn- foldet noe hbl.	v (0-30)					
53.50 - 54.50	1.00	gr.hbl.gn.	Som før.Åpne småfolder i starten.Fra 53.5:	v 50-55					
54.50 - 56.30	1.80	hbl.grå gn.	Som før.Vekslende hbl- innhold.	55 (50-60)					
56.30 - 60.30	4.00	gr.amf.	Gradvis mørkere og tettere På 59.0 noen folder.	50-60					
60.30 - 60.60	0.30	Kvarts.							
60.60 - 60.95	0.35	gr.amf.	Mørk, tett.Fink.	60					
60.95 - 61.80	0.85	grå gn.	Lys, b.p.Noe gr.Gradvis overgang til:	65					
			5						

Lokalitet:

Borehull: 8301

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		3 skarpt avgrensede 1-2 cm tynne lyse grå gn.-lag på 15.70-15.80 og: Deretter lokale, spisse folder, ofte fleksurartede Fra 29.5 fink.og: Fink.lys-oliven skarn på 30.50-30.60: Spisse folder og grøvere fra 31.6-32.0: Deretter fink.og: Fra 33.0: Mot slutten skarn og noe foldet.	70 70 (60-80) 75-80 80 60-80 75 50-60						
34.05 - 35.20	0.15	grå gn. Mørk, b.p. Finmlk. Gr. Spisse folder.	65						
35.20 - 38.20	3.00	"linset" -rå gn. Lys, vanlig. Gr. Smale, opp- til 1 cm brede mellom- mørke grå linser og lag med noe grafitt (?) Hbl.+skarn på 36.2.	55-65						
38.20 - 41.25	3.05	båndet grå gn. Vanlig. Gr. Med tynne lag gr.amf. Fortsatt noe graf. i starten. Åpne folder fra 39.0. Fra 40.5: Mot slutten færre gr.amf. bånd. Noe py på 40.9.	60 v (0-60) 60						
41.25 - 44.80	3.55	grå gn. Lys, vanlig. Gr. Åpne folder fra 41.6-43.0 Deretter:	50 v (0-50) 50						
		4							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8301

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
16.70 - 18.90	2.20	gr.amf.	utseende.Ellers fin lami- nert.En god del oliven skarn.Kvarts fra 15.75- 16.00. Som før, stort sett fink. mørk, tett. Tette-åpne folder med mlk-grovmk. skarn+hbl. fra 17.0-17.8. med akseplan ca. 70°. v Fra 18.0: (0-50) 75						
18.90 - 19.15	0.25	pegm.	Biot.						
19.15 - 22.00	2.85	gr. amf.	Mørk, tett, tildels lami- nert og fint båndet.Fold på 20.3 med akseplan ca. 70°. Åpne folder fra 21.0- v 22.0.Delvis spisse folder (0-65)						
22.00 - 22.20	0.20	grå gn.	Lys, b.p.Gr.Skarpe kontak- ter:Øverste parallell S, nederste uregelmessig (spisse innfoldninger?) med en kalsitt-rik kon- taktsone i den nedenfor- liggende biot.hbl.gn. (reaksjonssone?)S= 70						
22.20 - 22.55	0.35	gr.kalk.hbl.biot.gn.	Gradvis avtagende kalkspat og biot-innhold ved økende hbl-innhold.						
22.55 - 34.05	11.80	gr. amf.	Som før.Mlk. v Åpne folder, men også spis- (0-65) se folder til 24.0.Der- etter fin-finmlk.og: 65-703						

Lokalitet: KJEMPHEIA

Dato : juli 1983

Koordinater : ca. 50.600 Y, ca. 925.277 X (ca. 50.612 Y,

Retning : ca. 25.302 X i

NGU's nett)

Borehull: 8301

Helling/stigning: lodd

Høyde : ca. 140 m.o.h.

Lengde : 100,55

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	jordboring							
1.00 - 2.00	1.00	gr.amf. Mørk.Noë biot.Rel.feltsp. rik.	75-45						
2.00 - 2.50	0.50	pegm. Biot.							
2.50 - 15.20	12.70	gr. amf. Mørk, en god del feltsp. Partier med mye oliven-skarn skarn Mlk. Tette til mer åpne folder fra 4.3-5.4. Skarn ofte i foldeknærne Fra 5.4: Åpne folder med skarn fra 7.0-8.5: Også mer spisse folder med akseplan ca.70°. Fra 8.5: Fra 9.2 fink.og: Fra 10. igjen mlk.og: Fleksurartede småfolder. Tette til mer åpne folder fra 11.0.Delvis mye biot. Fra 13.2 mer fink.og: 2 cm po på 13.5. Åpne småfolder fra 13.7-14.0. Fra 14.0 fin mlk.og: Fra 14.4-15.0 mindre-lite hbl.og mer biot.	75-50 v (50-0) 65-70 v (0-70) 70-80 80 70-80 v (0-80) 50 v 60 60						
15.20 - 16.70	1.50	Flekket amf. Fink.med opptil 4 mm store hbl.aggregater etter foliasjonen, som gir et flekket	65-55						
		2							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8217

Helling/stigning:

Høyde :

side 16

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
285.05 - 285.25	0.20	grå gn.							
285.25 - 287.90	2.65	Gr.amf. Med bånd sv.py-impreg- nerte gr.hbl.biot.gn. Småfoldet i starten: senere:	v 75-80						
287.90 - 288.00	0.10	pegm.							
288.00 - 289.35	1.35	biot.gn. Gr.Noë hbl.(i bånd) py-impr.	80-85						
289.35 - 291.45	2.10	grå gn. Gr.Noë smale biot. rikere bånd med spor py.	80						
291.45 - 293.25	1.80	hbl.biot.gn. Hbl.rik,Spredt litt py-impr.Delvis noe amfibolittisk Noë foldet,men mest:	v, 80-85						
293.25 - 293.50	0.25	pegm. Litt gr.							
293.50 - 296.05	2.55	hbl.biot.gn. Gr.en del kloritt, spredt litt py-impr. Mot slutten mange opptil ca 10 cm brede grå gn.-bånd.	80-85						
2.3.1983.									
A. Kruse									

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8217

Helling/stigning:

Høyde :

side 15

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
270.80 - 271.85	1.05	hbl.biot.gn.	Gr.Noë foldet.	v,80					
271.85 - 272.35	0.50	grå gn.	Gr.	80					
272.35 - 275.05	2.70	musk.gn.	Fin mlk., litt fink. svart biot.Grå-gn.- aktig.Spredt små gr.	80-85					
275.05 - 275.65	0.60	grå gn.	Noë gr.	80-85					
275.65 - 278.30	2.65	hbl.biot.gn.	Særlig i starten bånd- det med grå gn.Gr., spredte sv.py-impr. Grønlig-gullig skarn. Ellers også bånd med gr.-fri hbl.gn. Små folder.	v, 60-85					
278.30 - 279.00	0.70	Grå gn.	Båndet(biot).Småfol- der med åpningsvinkel ca.30°.	v,60- 85					
279.00 - 285.05	6.05	Gr.amf.	Båndet med hbl.gn. Rel.åpne folder(åpnin- gsvinkel ca.60°)med akseplan ca.85. Fra 280.0: På 280.45 en parasit- tisk detaljfold i overenstemmelse med storfolden,også ellers slike småfolder. Ellers spredt litt foldet.Noen bånd hbl. biot.gn.med gr.og svake py-impr.	v, 70					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8217

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 14

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
250.00 - 251.90	1.90	grå gn.	Noe foldet+pegm mellom 249.50-250.00. For det meste gl.-rikere og grovere (fin mlk.) enn den typiske grå gn.	60					
251.90 - 253.65	1.75	hbl.biot.gn.+ hbl.gn.	Rel.Kv.rik.Grønlig svart hbl.Mlk.Gr. Spredt litt py, av og til konsentrert i mm-tynne bånd uten at krystallene henger sammen.	70-85					
253.65 - 255.30	1.65	biot.gn.	Noe gr. og noen bånd med hbl. Spredt litt py. Noen bånd musk. biot.gn.	70					
255.30 - 268.80	13.50	grå gn.	Fin-fin mlk.Gr.En god del musk. Spredte sv.py-dissimineringer. Delvis litt musk. gn-aktig (musk. rikere bånd). Fra 262.8-265.0: spisse småfolder. Mot slutten åpne småfolder.	75-80					
268.80 - 270.35	1.55	hbl.biot.gn.	Gr.No. båndet.	75					
270.35 - 270.80	0.45	biot.musk.gn.	Musk. overherrs. Grå gn.-aktig.	75					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8217

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 13

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
238.15 - 239.00	0.85	hbl.gn. Gr.+gullgrønnlig skarn.Fin-mlk.	70-90						
239.00 - 239.60	0.60	musk.gn. Mlk.Noë fink.svart biot.Gr.økende biot.	70-80						
239.60 - 242.80	3.20	musk.biot.gn. Fin-mlk.Gr.Grågn.-aktig.Fink.svart biot. På 241.80 olivenfarset skarn.Rel.mye musk.	80						
242.80 - 244.15	1.35	Amf. mørk,fink.,tett,små gr.Mot slutten mer hbl.gn-aktig med biot bånd og noe spredte py-impr.	80						
244.15 - 244.95	0.80	biot.gn. Noen hbl.-førende bånd og noen grågn.-bånd.Gr.Litt py-impr. En åpen fold og noe pegmatittisk i kjernen							
244.95 - 247.50	2.55	Amf. Noe hbl-gn-aktig. Spredt noe py-impr. Oliven skarn.Mot slutten båndet (biot.+gr.)	80						
247.50 - 247.90	0.40	musk.biot.gn. Noe båndet(musk/biot) Gr.Litt grå gn-aktig.	80						
247.90 - 248.90	1.00	biot.gn. Gr.En del musk.Rel. mørk,fin mlk.	80						
248.90 - 250.00	1.10	musk.biot.gn. Gr.Mer og mer grå gn-Aktig.							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8217

Helling/stigning:

Høyde :

side 12

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		Jevnt py-impr.Grov- mlk.Dist.opptil ca. 1 cm.							
216.25 - 216.75	0.50	pegm.							
216.75 - 221.50	4.75	musk.biot.gn. Som ovenfor, rel. dist. rik. Dist. delvis omvandet.	75						
221.50 - 222.65	1.15	grå gn. Fink. En del gr. Spredt sv. py-impr.	80						
222.65 - 228.50	5.85	musk.biot.gn. Som før, rel. dist. rik og jevnt py-impr. Gr. spiss fold (åpning 25-30°), med grov py på 222.75-222.85. Ellers er py av og til også grovk. ofte kryst. Spredt noe staur. Mot slutten avtagende dist og bånd grå gn.	75-80						
228.50 - 233.00	4.50	grå gn.b.d. Lys, fink. Gr. På 229.15 noen cm med fink. lysegrønn hbl. Noen bånd med staur.+py. Åpen fold på 230.6. Mot slutten musk. rikere og mindre fink.	70						
233.00 - 238.15	5.15	musk.biot.gn. Som før, rel. dist. rik og jevnt, men noe svakere py-impr. Gr. Mlk. En fold på grensen.	80-70						

Lokalitet:

Borehull: 8217

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 11

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
201.15 - 202.35	1.20	hb1.biot.gn. Gr.Rel.lite biot. Spredt sv.po-impr.	80						
202.35 - 202.70	0.35	biot.musk.gn. Gr.dist.,vekslende musk.innh.Delvis grå- gn.-aktig.	80						
202.70 - 203.35	0.65	grå gn. Gr.lys.	80-85						
203.35 - 204.35	1.00	Ka-sil.gn. Lysegrønn diops(?)og hvit zoisit+kvarts+ biot.+gr.Båndet.	80-85						
204.35 - 205.30	0.95	musk.biot.gn. Båndet(musk./biot.) Noe gr.Fin-mlk.No grågn.-aktig.	75-90						
205.30 - 205.75	0.45	biot.gn. Fin-mlk.Rel.mørk,Gr. rik,store gr.opptil ca.1 cm.	80						
205.75 - 206.50	0.75	biot.musk.gn. Ant.ondannet dist.gn. Noe gr.	80						
206.50 - 207.50	1.00	Musk.gn. Noe biot.No dist(?)Biot.svart,fink.	85						
207.50 - 207.65	0.15	Kvarts.							
207.65 - 210.00	2.35	Grå gn. Lys.En del mlk.musk. Biot.svart og fink. M.spredt litt gr.Grad- vis overgang til:	75-80						
210.00 - 216.25	6.25	musk.biot.gn. Rel.dist.-rik.Homogen men litt vekslende forhold musk/biot., men vanligvis mest biot.En del gr.	75-80						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8217

Helling/stigning:

Høyde :

sidel0

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
194.25 - 194.60	0.35	Bånd med gr.amf.og grå gn.i avvek-sling.	75-85						
194.60 - 195.50	0.90	grå gn.b.d. Lys,fink.Noe gr.Gr. delvis i lyse slirer.							
195.50 - 195.90	0.40	musk.gn. Av grå-gn.type.Veks-lende innhold med fink.biot.Litt gr.	80						
195.90 - 196.05	0.15	grå gn.b.d. Smale musk.rikere bånd.Gr.	80-85						
196.05 - 196.50	0.45	hbl.biot.gn. Gr.rik,mlk.Går grad-vis over i:							
196.50 - 196.85	0.35	ditto,men sliret-laminert:mm-tynne biot.band og opptil 5 mm tynne fink.lyse hbl.førende bånd.Gr. mellomk.3-6mm.	75-85						
196.85 - 197.00	0.15	Amf. Fink.tett,mørkegrønn.	85						
197.00 - 199.05	2.05	hbl.biot.gn. mlk.Gr.rik.Av og til noen grå gn.-bånd.	85-80						
199.05 - 199.90	0.85	grå gn.b.d. Fin-mlk.mellomgrå, delvis rel.biot.rik. Litt po på 199.60-199.65.	80						
199.90 - 200.10	0.20	hbl.biot.gn. Gr.rik.Litt amfibolit-tisk.	-80						
200.10 - 201.15	1.05	grå gn. Med smale bånd rike på biot.+disthen + noe gr.	80-90						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8217

Helling/stigning:

Høyde :

side 9

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S i/t Ag	% Fe	
191.35 - 192.15	0.80	biot.musk.gn. Disthen+gr., mlk. Po-impr. Litt grafitt i smale mer fink-bånd. Noen spredte smale bånd med hbl.	75-85	0,03	0,01	0,05	<0,1	5,8	190,95 - 192,95
192.15 - 192.95	0.80	grafitt-musk.gn. Noe båndet. Kraftig po-impr. Po+graf. danner av og til glidespeil med utsmurt po+graf. Mot slutten mindre graf. og noe biot.+dist.	70-75						
192.95 - 193.15	0.20	gr.amf. ml.	70-80						
193.15 - 193.35	0.20	biot.musk.gn. fin.mlk. Noe gr.+dist. Sv.po-impr. Gradvis overgang til:	80-70						
193.35 - 193.80	0.45	grafitt-musk.gn. Som ovenfor, også her med graf.+po glidespeil, paralell bånding/skiffrighet. Striasjon(striping/lineasjon)på glidespeilene har vinkel med båndingens fall på ca. 80°. Gradvis overgang til:	70						
193.80 - 194.25	0.45	musk.biot.gn. Fin mlk. Noe gr. og disth. Po-dissiminert. Mot slutten grå gn.-aktig.	75						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8217

Helling/stigning:

Høyde :

side 8

Lengde :

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
175.55 - 175.75	0.20	musk.gn.	Noe biot.	60-75						
175.75 - 179.30	3.55	hbl.biot.gn.	Gr.I kjernen gr.hbl.gn.	75 (65-80)						
179.30 - 182.00	2.70	biot.gn.+ hbl.biot.gn.	Gr.Delvis noe hbl.gn.	75-70						
182.00 - 182.45	0.45	grå gn.b.d.	Gr.	80						
182.45 - 182.95	0.50	musk.gn.	Litt grafitt.	80						
182.95 - 184.00	1.05	grå gn.	Med musk.rikere bånd Noen <u>glidespeil</u> med py+po+grafitt.Litt dist.	65-80						
184.00 - 185.00	1.00	musk.gn.	Noe fink.biot.Litt <u>grafitt</u> .Litt grafitt i starten.	75-80						
185.00 - 186.70	1.70	grå gn.	Noen dist.førende bånd.	85						
186.70 - 187.10	0.40	musk.gn.	Noe fink.biot.	85						
187.10 - 189.30	2.20	biot.musk.gn.	Fin mlk.Gr.+dist. Mot slutten grå gn.	85						
189.30 - 190.95	1.65	musk.gn.	En del fink.,svart biot.Mlk.Noie gr	85-70						
190.95 - 191.35	0.40	musk.gn.	En god del biot.,mlk. Tildels sterkt impr. med po.Svakt grafitt- førende.	80						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8217

Helling/stigning:

Høyde :

side 7

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
150.90 - 152.25	1.35	grå gn. musk.gn.-aktig.Litt gr.Spredt litt py- impr.	80-85						
152.25 - 154.30	2.05	hbl.biot.gn. I starten liten hbl. Gr.Py-impr.	80						
154.30 - 155.00	0.70	biot.musk.gn. Rel.musk.rik.Gr.+dist Spredte py-impr.	80-85						
155.00 - 157.70	2.70	biot.gn. Gr.Noë musk.Py-impr. Noë grå gn-aktig. Noë hbl.	80						
157.70 - 158.10	0.40	grå gn. Gr.	80						
158.10 - 159.10	1.00	biot.musk.gn. Rel.musk.rik.Dist.+ noë gr.Biot.svart og fink.	80						
159.10 - 159.95	0.85	hbl.biot.gn. Gr.Litt py-impr.	80						
159.95 - 160.30	0.35	Amf+hbl.gn. Gr.	80						
160.30 - 161.10	0.80	musk.gn. Dist.Noë gr.og biot.	80-75						
161.10 - 162.50	1.40	hbl.biot.gn.+grå gn. Båndet.	75						
162.50 - 167.30	4.80	hbl.gn. Gr.Av og til båndet. Mer biot. mot slutten	75						
167.30 - 170.00	2.70	biot.gn. Gr.Fink.	75						
170.00 - 171.65	1.65	hbl.biot.gn. Gr.Fin-mlk.	75						
171.65 - 172.60	0.95	biot.gn. Gr.	70-75						
172.60 - 173.10	0.50	hbl.biot.gn. Gr.	75-80						
173.10 - 175.55	2.45	biot.gn. Gr.Noë musk.Grå gn- aktig.Spredt noe hbl.	75						

Lokalitet:

Borehull: 8217

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 6

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
132.05 - 133.25	1.20	grå gn.	Gr.Rel.gl.rik.Fink.	75					
133.25 - 134.30	1.05	hbl.gn.	Noe gr., og lys oliven skarn.	70					
134.30 - 137.00	2.70	grå gn.b.d.	Gr. Fra 134.60-134.80 hbl.gn.Spredte bånd med noe hbl.	80					
137.00 - 137.50	0.50	pegm.							
137.50 - 141.75	4.25	grå gn.	gr.I biot.musk.rikere bånd noe disthen. Fra 139.45-139.50: gr.hbl.gn. Fra 140.0-140.65 en god del pegm.	85					
141.75 - 142.50	0.75	pegm.							
142.50 - 143.85	1.35	hbl.biot.gn.	fin mlk.Gr.,py-impr. En del musk.	85					
143.85 - 146.25	2.40	Amf.	Litt gr.Tynlaminert. Mørk,tett.Litt hbl. gn-aktig av og til. Lokalt grønliggullen skarn.	80-85					
146.25 - 146.60	0.35	pegm.							
146.60 - 149.60	3.00	Amf.	Gr.	80					
149.60 - 150.90	1.30	hbl.gn.	Gr.Noie biot.Noie bånd- det.Mot slutten mer biot.	80					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8217

Helling/stigning:

Høyde :

side 5

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
89.50 - 91.85	2.35	grå gn.b.d. Lys,gr.	65-70						
91.85 - 92.75	0.90	grå gn.med brede bånd hbl.biot.gn. Litt gr.Mot slutten:	65 80						
92.75 - 106.90	14.15	grå gn.b.d. Vekslende gr.S avtak- ende og fra 94.0M: Ved 94.5 m igjen: Noe båndet(biot.) Fink.Lys. I de biot. rikeste bånd olivengrønn skarn og kanskje litt hbl.	55 75 (70-80)						
106.90-115.25	8.30	grå gn. Delvis en god del musk.Noie gr.Lys,fink.	75						
115.25-115.50	0.25	hbl.biot.gn. Noe gr.	80						
115.50-118.75	3.25	grå gn.b.d. Lys,litt gr.Noie bånd hbl.biot.gn.	75-80						
118.75-121.40	2.65	hbl.gn. Noe gr.Noie bånd grå gn.En del biot.oliven skarn.	75-80						
121.40-125.80	4.40	grå gn.b.d. Noe gr.og musk,litt båndet(biot.)	75						
125.80-129.15	3.35	hbl.gn. Gr.Noie biot.Oliven skarn,fin mlk.	75-80						
129.15-129.65	0.50	grå gn.	75						
129.65-131.80	2.15	avv.hbl.biot.gn.og grå gn.Tildels gr.rik.	70						
131.80-132.05	0.25	pegm.							

Lokalitet:

Borehull: 8217

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
64.55 - 65.30	0.75	grå gn.	Lys.	75-80					
65.30 - 66.30	1.00	grå gn.b.d.	Mørkere, litt etter hvert litt hbl.	80					
66.30 - 68.25	1.95	hbl.gn.	fin mlk., små gr. En del biot. Noe båndet, spesielt mot slutten, og der avtagende hbl.	85					
68.25 - 68.75	0.50	grå gn.	Spredt litt gr.lys.	85					
68.75 - 69.00	0.25	grå gn.	middels grå, gl. rikere	80-85					
69.00 - 71.00	2.00	grå gn.	lys. Fra 70.25 biot. rikere og noe gr.	75-80					
71.00 - 80.30	9.30	gr.amf.	Delvis rel.lys, fink. Delvis finlaminert med m.granatrikellaminæ. Delvis karb.rike laminae. Fra 74.0-77.7 større åpne folder, større grå, en god del grålig skarn og biot., noe karb. Fra 77.7 mmer hbl.gn.-aktig og: Noen bånd grå gn.	80-55					
80.30 - 81.20	0.90	grå gn.b.d.	gr.	55					
81.20 - 85.95	4.75	avv.grå gn. og hbl.biot.gn.	Gr.	55					
85.95 - 89.50	3.55	grå gn.	gr. Litt grovere og noe mer gl. Mellom 86.5 og 87.0 øker S hurtig til:	55					
				75					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 8217

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
45.45 - 46.00	0.55	hbl.biot.gn. Gr.Grågn-aktig.Mot grensene en b.d.mid- delsgrå grågn.	70						
46.00 - 46.85	0.85	Grå gn.	75						
46.85 - 49.80	2.95	hbl.biot.gn. Gr.I starten grå gn.-85-75 bånd.	85-75						
49.80 - 51.75	1.95	grå gn.b.d. Gr.Lys-middelsgrå, ofte m.fink.	70						
51.75 - 54.20	2.45	gr.amf.+ grå gn. Rel.lys,fink.men ofte store gr.Båndet med lyse og mørkere grå gn.+hbl.,og karb. førende bånd.Delvis noe stictolittisk og slirete.En god del fink.biot.og oliven skarn.	70						
54.20 - 56.80	2.60	gr.amf. Avv.lysere og mørkere Delvis noe stictolitt- slirete,vekselvis m. fink.-fin mlk.Oliven skarn.	70						
56.80 - 58.90	2.10	gr.amf. Fin mlk.Gr.skarn,Noe. hbl.gn.-aktig,noe biot	75-80						
58.90 - 59.75	0.85	grå gn.	80-75						
59.75 - 64.55	4.80	hbl.gn. Fin mlk.Gr.Delvis gr. amf.og amfibolittisk. Noe båndet(opptil ca. 0.5 cm tynne bånd). En del biot.Noel oliven grålig skarn.	75						

Borehull: 3217

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
21.80 - 34.20	12.40	grå gn.-aktig amfibolitt eller amfibolittaktig grå gn.med hbl. Lys mellomgrå, meget fink.derfor ofte vanskelig å avgjøre om, og hvor mye,m.fink. svart hbl.foreligger. Mange steder sikker hbl-identifikasjon, og sanns.rel.mye hbl. Delvis finlaminert. Fra 27.0 m : Fra 28.8 spisse småfolder(åpningsvinkel ca.20°)med akseplan 70°.Jevnt over rel. mye fink.olivengullig skarn.Mot slutten grovere, skarnrik, delvis store gr., mørkere, grønnligsvart hbl.og mer hbl.gn.-aktig.	75 70						
34.20 - 36.75	2.55	grå gn.	Lys, fink. Noe gr.	70					
36.75 - 38.20	1.45	hbl.biot.gn.	Gr.Fink.oliven skarn.	70					
38.20 - 41.15	2.95	Grå gn.	Lys.Noe gr.Gradvis overgang til:	70					
41.15 - 44.15	3.00	hbl.biot.gn.	Gr.Grå gn-aktig, men mørkere.	70-75					
44.15 - 45.45	1.30	grå gn.	Noen smale sv.gullige karbonatbånd.Noe gr.	70					

Lokalitet: ILDGRUBEN

Borehull: 8217

Dato : des. 82 - feb. 83.
 Koordinater : ca. 925.465X, 51.192Y
 Retning : syd
 Helling/stigning: 77° avviksmålt
 Høyde : ca + 135 m.
 Lengde : 296.05 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	jord							
1.60 - 8.05	6.45	hbl.gn. Cr.Jevnt smalt båndet, båndene noen mm tykke I påsettet: Ellers også.Fin mlk., En del fink.biot.Noen bredere bånd granat- førende grå gn.I hbl. gn.mye olivengrønn skarn(ca.1 mm lange kryst.)Foldeombøyning Åpen fold fra 6.50- 8.00.	60° 60 (55-65) v						
8.05 - 8.90	0.85	grå gn.							
8.90 - 11.75	2.85	hbl.gn.							
11.75 - 21.80	10.05	Amf. Fink.Mørk.Gr.Som ofte- st fint laminert. I starten: Fra 12.00-13.5 mer flekket,uklar S,men åpne småfolder: Fra 13.5-14.2 laminert spisse småfolder og små parasittiske fol- der som ligger riktig i.f.t.storfolden. Fra 14.2-16.5 m: Fra 16.5-17.5 m: Fra 17.5 m.	60 v 70-80 70-75 60 65-70 (60-80)						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8155

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
33.65 - 40.35	6.70	musk.biot.gn. Tildels ganske rik på små gr.	55-60						
40.35 - 40.90	0.55	grå gn. Fink.små gr.tys.	60						
40.90 - 43.55	2.65	biot.musk.gn. Litt gr.Grå gneis-aktig.	60						
43.35 - 50.00	6.65	amf. Overveiende mørk og tett med små gr. Delvis middelsk.gr. I starten noen bånd med biot.musk.gn.	60-50						
		10.10.81. A. Kruse							

Lokalitet: KJEMPHEIA

Dato : oktober 1981.

Koordinater : ca.50.240Y, ca. 925.300X

Retning :

Helling/stigning: lodd

Høyde : ca. 125 m.o.h.

Lengde : 50 m

Borehull: 8155

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.20	2.20	jord							
2.20 - 11.00	8.80	amf. Gr.rik.Gyllen skarn Detaljfoldet mellom 4.20 og 4.80.Fra 6.50	40-50 ^o 50 ^o						
11.00 - 12.05	1.05	hbl.biot.gn. Gr.	55						
12.05 - 15.60	3.55	amf. Tildels gr.rik. Tildels tett og mørk og da uten gr.No breksjert mellom 14.00 og 14.25.	45-55						
15.60 - 16.10	0.05	biot.gn. Rel.lys,grågneis- aktig,men med store gr.	55						
16.10 - 20.05	3.95	amf. Tildels gr.rik,tildels mørk og tett.I star- ten og fra 19.20 til hvite øyer(feltsp.) Av og til noen tette småfolder.	45-55						
20.05 - 21.00	0.95	biot.gn. Gr. Noe hbl.	40						
21.00 - 21.75	0.75	amf. Rik på grønnlig skarn Litt gr.							
21.75 - 32.70	10.95	amf. Tildels lyse øyer, tildels rik på gyllen skarn,tildels gr.rik. Fra 27.50-27.90: Deretter:	45-55 15 40-55						
32.70 - 33.45	0.75	biot.musk.gn. Spor py.	55						
33.45 - 33.65	0.20	amf. Litt gr.	55						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8154

Helling/stigning:

Høyde :

side 3

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
47.80 - 70.00	22.20	Amf. Små gr. Delvis rik på gyllen skarn, ofte i smale og brede bånd. Gr. rik, småfoldet mel- lom 56.20-56.60, ditto fra 56.20-63.00 (lette folder) og 64.30-64.80. okt. 1981. A. Kruse	70-80						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8154

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
18.05 - 18.70	0.65	musk.gn. Rik på små gr.Noë biot. <u>Sv.py-impr.</u>	70-75						
18.70 - 24.85	6.15	biot.gn. Noë hbl.Rik på små gr. <u>Py-impr.</u> Tildels rel.musk.rik.Py-impr.avtar hurtig.	75						
24.85 - 26.30	1.45	hbl.biot.gn. Rik på små-middels-store gr. <u>Sv.py-impr.</u> Litt gyllen skarn.	70-75						
26.30 - 26.75	0.45	musk.biot.gn. Rik på små gr.	75						
26.75 - 29.20	2.45	hbl.biot.gn. Noë båndet(musk)rik på små gr. <u>Sv.py-impr.</u>	75						
29.20 - 30.00	1.40	amf. Gr.Noë båndet.	70-80						
30.00 - 30.75	0.15	grå gn.bd. Noë gr.	75						
30.75 - 33.40	2.65	hbl.biot.gn. Gr.	70-80						
33.40 - 33.80	0.40	musk.biot.gn. Små gr. Spor py	75						
33.80 - 34.90	1.10	amf. Gr.biot.	80						
34.90 - 35.90	1.00	hbl.biot.gn. Gr.	75						
35.90 - 43.30	7.40	amf. Små gr.Noë biot. Gyllen skarn.Noë gr.skarnrike bånd.	75-80						
43.30 - 46.35	3.05	biot.gn. Båndet(musk rik), delvis m.gr.rik.	75						
46.35 - 47.30	0.95	amf. Gr.gyllen skarn.							
47.30 - 47.80	0.50	biot.musk.gn. Gr.	75-80						

Lokalitet: KJEMPHEIA

Dato : okt. 81.

Koordinater : ca. 49.306Y, ca. 925.320X

Retning :

Helling/stigning: lodd

Høyde : ca. 191 m.o.h.

Borehull: 8154

Lengde : 70 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.30	1.30	jord					g/t Ag		
1.30 - 2.20	0.90	jordboringskjerner: hbl.biot.gn. Rel.rik på lyse mineraler.Gr.rik.	75°						
2.20 - 4.55	2.30	hbl.biot.gn. Noe båndet, som ovenf.	70-80						
4.55 - 4.95	0.40	biot.musk.gn. Middelsk., vel.gl.rik Noe gr.	70						
4.95 - 7.35	2.40	gr.amf. Spor py+po.No. biot.	75						
7.35 - 7.90	0.55	hbl.biot.gn. Gr.rik.	75						
7.90 - 10.95	3.05	gr.amf. Som før.No. biot. Gyllen skarn.	70						
10.95 - 11.25	0.30	hbl.biot.gn. Cr.Rel.kraftig py+po-impr.	65	0.01	0.01	0.04	1.6	5.5	
11.25 - 11.45	0.20	musk.gn. Kraftig py-impr.	70	0.01	0.01	0.02	1.2	6.7	
11.45 - 11.80	0.35	musk.biot.gn. Noe gr. py-impr.	75	<0.01	0.01	0.03	1.4	4.8	
11.80 - 12.15	0.35	biot.gn. Gr.							
12.15 - 13.80	1.65	hbl.biot.gn. Gr.Spredte m.svake py-impr.Amf.-aktig. Noe båndet.Gyllen skarn.	75						
13.80 - 14.70	0.90	gr.amf.	75						
14.70 - 15.45	0.75	hbl.biot.gn. Båndet gr.	75						
15.45 - 16.85	1.40	biot.gn. Middelsk., gr., mot slutten mindre biot. og mer musk.	75						
16.85 - 18.05	1.20	hbl.biot.gn. Noe båndet(musk)rik på små gr.Tildels kraftig py-impr.	75	0.01	0.01	0.05	1.2	5.7	

Borehull: 8153

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
38.00 - 39.00	1.00	ditto, mere båndet. (større fold) tilslutt S økende til	0 75						
39.00 - 40.00	1.00	amf. Cr. rik. Mørk.	75						
		2.10.81. A. Kruse							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8153

Helling/stigning:

Høyde :

side 2

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15.35 - 16.80	1.45	hbl.biot.gn. Gr.rik, disthen, gyllen skarn, spredte py-impr.	75						
16.80 - 17.00	0.20	musk.gn. Noe biot. og små gr. sv.py-impr.							
17.00 - 18.45	1.45	musk.biot.gn. Små gr., spredte py-impr.	75						
18.45 - 20.00	1.55	hbl.biot.gn. Gr. disthen, noe båndet (musk.biot.gn.) Sv.py-impr. I starten noen spisse folder med akseplan 75°.	75						
20.00 - 21.20	1.20	musk.biot.gn. Rik på små gr.	80						
21.20 - 24.55	3.35	hbl.biot.gn. Rel.fink.men med større gr.spor py. Noe musk.	80-65						
24.55 - 24.90	0.35	Kvarts.							
24.90 - 29.70	4.80	hbl.gn.+hbl. biot.gn.+amf. Mørk, Gr. rik. 25.35-23.65 mørk, tett fink.amf.med noe gr.	75-65						
29.70 - 29.90	0.20	musk.biot.gn. Gr.							
29.90 - 30.30	0.40	hbl.biot.gn. Gr.							
30.30 - 30.50	0.20	musk.biot.gn. Gr.							
30.50 - 37.50	7.00	hbl.biot.gn.+amf. Gr.rik litt gyllen skarn, Fold på 35.90.	75-60						
37.50 - 38.00	0.50	amf. Rel.lys, meget rik på gyllen skarn. S avtakende. Til 0 (større fold)	55-0						

Lokalitet: KJEMPHEIA

Dato : okt. 81.

Koordinater : ca. 49.309Y, 925.260X

Retning :

Helling/stigning: lodd

Høyde : ca. 200 m. o.h.

Lengde : 40m

Borehull: 8153

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	jordboring					g/t Ag		
2.00 - 3.40	1.40	hbl.biot.gn. Gr.rik.	70 ⁰						
3.40 - 4.35	0.95	grå gn., b.d. Gr.rik	75						
4.35 - 7.70	3.35	hbl.biot.gn. Gr.rik-gyllen skarn	75-80						
7.70 - 7.95	0.25	musk.gn. Noe biot. og noen små gr. Tildels kraftig py-impr.	70						
7.95 - 8.15	0.20	hbl.biot.gn. Gr.rik.		0.01	0.01	0.06	1.2	6.5	
8.15 - 8.40	0.25	musk.biot.gn. Disthen. Noen små gr. Tildels kraftig py-impr. og 1 stripe på 1 mm. Noe po.	70						
8.40 - 11.15	2.75	musk.biot.gn. Disthen + gr. Delvis musk. rik. Svake py+ po. impr. + noen få mm småle str. Hbl. førende (til hbl. rik) på 8.45-8.55; 9.40-9.45; 10.48-10.52. Mot slutten litt hbl. og gyllen skarn.	70	0.01	0.01	0.05	1.2	4.7	
11.15 - 11.30	0.65	hbl.biot.gn. Gyllen skarn, gr-rik.	75						
11.80 - 12.90	1.10	gr.amf. Grovk. mørk. Gyllen skarn.	80						
12.90 - 15.35	2.45	musk.biot.gn. Gr.rik. Disthen, spor py. Vekslede musk/ biot. forhold.	75-80						

Lokalitet:

Borehull: 8152

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15.75 - 16.60	0.85	hbl.gl.gn. Gr.Noë båndet, gyllen skarn, Både biot. og musk. Sv.py-impr.	75						
16.60 - 18.35	1.75	hbl.førende gl.gn. Rel.gl.rik, Cyllen skarn. Spredte m. svake py-impr.Gr.	70-75						
18.35 - 19.30	0.95	Grå gn.m.d. Gl.rik, små gr.	70						
19.30 - 19.85	0.55	hbl.førende gl.gn. Rel.gr.rik, rel.gl. rik. Båndet (hbl.førende bånd og musk rike bånd).	70						
19.85 - 20.50	0.65	hbl.gl.gn. Som før.	65-70						
20.50 - 21.00	0.50	grå gn. fink., avvekslende b.d, vanlig, og md. Tildels gr.rik.	60						
21.00 - 26.55	5.55	biot.gn. middelsk., grågrønnlig skarn, gr.rik. Spredt noe hbl.	75-80						
26.55 - 26.85	0.30	amf. mørk.	75-80						
26.85 - 29.00	2.15	biot.gn. fin-mlk., gr.rik. grågrønnlig skarn.	70-80						
29.00 - 30.00	1.00	pegm.							

A. Kruse

Lokalitet: KJEMPHEIA

Dato : sept.81.

Koordinater : ca.48.960Y, ca. 925.190X

Retning :

Helling/stigning: lodd

Høyde : ca. 225 m.o.h.

Lengde : 30 m

Borehull: 8152

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	jord							
0.80 - 1.95	1.15	jordboringskjerner							
		grå gn.b.d. Små gr.fink.	65°						
1.95 - 3.10	1.15	grå gn.b.d. Små gr.fink	70						
		På 2.90 en detaljfold med sjenkler 80 og 45° motsatt vei, Akseplan 75°.							
3.10 - 3.20	0.10	Kvarts.							
3.20 - 3.70	0.50	hbl.biot.gn. Litt gr.Sv.py-impr.	60						
3.70 - 4.60	0.90	grå gneis Avvekslende med hbl. biot.gn.Noë gr.	75						
4.60 - 7.00	2.40	grå gn. Cr.rik,rel.gl.rik Rel.fink.	75						
7.00 - 8.90	1.90	hbl.gl.gn. Rel.lite hbl.,rel. gl.rik.Gr.rik.Noë båndet med grå gn. Sv.py-impr.Gyllen skarn.	75						
8.90 - 10.70	1.80	grå gn. Små gr.fink.,rel. gl.rik.	75						
10.70 - 13.15	2.45	hbl.gl.gn. Gr.Noë båndet,gyllen skarn,sv.py-impr. Både biot.og musk.	75						
13.15 - 14.80	1.65	gr.amf. Store gr.Mørk.	75						
14.80 - 15.05	0.25	grå gn.m.d. musk.rik,sterk py-impr.Små gr.	75						
15.05 - 15.75	0.70	grå gn.m.d. py-impr. Små gr.	75						

Lokalitet:

Borehull: 8151

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
24.65 - 28.30	3.65	grå gn. Cr. rik, båndet, Noen hbl-førende/rike bånd. Spredt litt <u>py-impr.</u>	70-80						
28.30 - 31.75	3.45	gr.amf. I begynnelsen noen bånd grå gn. Mørke grønn grå.	75						
		N.B. Grå gneisene er biot.dominerte, rel.mørke, rel.gl.rike og ofte meget gr.rike. (Ofte amfibolitt preg)							
		24.9.81.							
		A. Kruse							

Lokalitet: KJEMPHEIA

Dato : sept. 81.

Koordinater : ca. 48.966Y, ca. 925.175X

Borehull: 8151

Retning :

Helling/stigning: 90° lodd

Høyde : ca. 225 m.o.h.

side 1

Lengde : 31.75 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	jord							
0.70 - 1.90	1.20	jordkjerner gr.biot.gn.	Store gr.Rel.mørk.	70°					
1.90 - 5.70	3.80	grå gn.	Gr.rik.Blandet med biot.rike band.	70					
5.70 - 6.00	0.30	Kvarts.							
6.00 - 10.20	4.20	grå gn.	Middels grå.Rel.fink Tildels rel.gr.rik. med små gr.Sterkt py-impr.mellom 8.70- 8.75.	70					
10.20 - 11.50	1.30	gr.hbl.biot.gn.		75					
11.50 - 19.90	8.40	grå gn.	Meget gr.rik,rel. biot.+musk.rik.I starten sv.py-impr. Ellers noen spredte og m.svake py-impr. i de biot.rikere bånd.Båndet.Mot slut- ten spredt noe hbl.	70- 75					
19.90 - 21.00	1.10	gr.hbl.biot.gn.	Gr.rik.Spredt sv. py-impr.	70					
21.00 - 21.50	0.50	grå gn.b.d.	Gr.rik.	70					
21.50 - 23.65	2.15	gr.hbl.biot.gn.	Noe båndet,gr.rik, spredte py-impr.	70-80					
23.65 - 24.65	1.00	amf.	Rel. fink.,rik på grønnlig skarn.	70-80					

Lokalitet:

Borehull: 8005

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 9 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
302.00 - 303.00	1.00	0.70m Kjernetap. gr.amf. rundt	0						
303.00 - 304.00	1.00	0.30m Kjernetap. 0.15m grå gn. + 0.55m gr. amf. Foldet.	0-70						
304.00 - 305.00	1.00	0.45m Kjernetap. 0.20m gr. amf. + 0.35m grå gn. Foldet	0-80						
305.00 - 306.00	1.00	0.40m Kjernetap. 0.50m grå gn. + 0.10m gr. amf.	80						
306.00 - 307.00	1.00	0.60m kjernetap. 0.37m grå gn. + 0.03m gr. biot. gn.	75						
307.00 - 308.00	1.00	0.30m Kjernetap. 0.40m grå gn. + 0.30m gr. hbl. gn.	0-80						
308.00 - 309.00	1.00	0.10m Kjernetap. Båndet gr. hbl. gn. + grå gn. Åpne folder							
309.00 - 310.00	1.00	0.35m Kjernetap. grå gn. De siste 10m (310-320m) var ikke merket. Rekkefølgen derfor muligens omvendt.	60-80						
310.00 - 310.80	0.80	gr. amf. Åpne folder							
310.80 - 319.55	8.75	grå gn. Spredt noe gr. Åpne små- folder.	v						
319.55 - 320.00	0.45	pegm.							
relogget Januar 1982. A.K. <i>Karl Vause</i>									

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8005

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 8 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
280.15 - 281.00	0.85	grå gn.b.d.	Fink. middelsgrå, rel. biot.rik.	80					
281.00 - 283.55	2.55	amf.	Som før, med py-impr.bånd gr.biot.hbl.gn.	70					
283.55 - 285.70	2.15	musk.biot.gn.	I starten hbl.og lite musk.Fra 284.75-275.00 musk.gn.Py-impr.Noë gr. Tiltakende hbl.mot slutten	75-80					
285.70 - 289.40	3.70	amf.	som før.Delvis noe grov-ere(mlk).Lokalt gyllen grønnlig skarn.Noë foldet fra 287.	70-65					
289.40 - 290.40	1.00	Kjernetap	biter amf. og biot.gn.						
290.40 - 290.85	0.45	biot.gn.	Fink. Noë hbl.spor py	80					
290.85 - 296.00	5.15	amf.	som før.Noë biot.Åpne folder fra 292.	80-65					
296.00 - 298.20	2.20	biot.hbl.gn. +gr.hbl.gn.	Gr.Åpne småfolder Gyllen skarn.						
298.20 - 300.00	1.80	musk.gn.	Litt biot.Spredt litt gr. Fra 298.55-299.10.Båndet gr.hbl.biot.gn.Ditto fra 299.35-299.40	80					
300.00 - 301.00	1.00	Kjernetap							
301.00 - 302.00	1.00	0.70m Kjernetap.	Grå gn.+gr.amf.	70					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8005

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 7 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
248.00 - 254.15	6.15	grå gn. Spredt noe gr. åpne små- folder. Fra 250 S vanskelig v? men delvis småfoldet.	v						
254.15 - 258.95	4.80	grå gn.m.p.-m.d. S vanskelig å se, men delvis småfoldet (254.5, 255, 256, 257.5, 258) Ellers mye :	v 0-65? 65						
258.95 - 263.30	4.35	grå gn. Spredt noe gr. Spredt litt grønlig skarn S - vanskelig å se: foldet?	70? v ?						
263.30 - 271.70	8.40	musk gn. Noe gr. Litt grå gn. aktig Fin-mlk. Rel. gl-rik En del biot. Fra 270 Fra 271-272: 0.70 m tap	75 60-75 70						
271.70 - 274.70	3.00	Amf. Fink. Noe gr. (store) Mellomgrå.	75-80						
274.70 - 275.05	0.35	musk. gn. En del biot. Noe gr.							
275.05 - 276.85	1.30	amf. Som før.	75-85						
276.85 - 277.00	0.15	grå gn.	70						
277.00 - 279.15	2.15	amf. Som før, med py-impr. bånd gr. biot. hbl. gn. På 277.70 2 cm py. S økende til :	65 75						
279.15 - 279.60	0.45	musk. biot. gn. <u>Py-impr.</u>	65-75						
279.60 - 280.15	0.55	Kjernetap.							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8005

Helling/stigning:

Høyde :

- 6 -

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
181.10 - 209.00	27.90	biot.musk.gn. Spredd litt gr.Hvit gl-aktig min.(elter disthen?) Spredd litt Py-impr. Fra 185-186 Åpne småfolder. Fra 186 S ubestemmelig. Fra 190 og tildels gl-rik. Gneisen inneholder grovk-partier med grovt gneis-tekstur og rel.mye lyst materiale. Fra 206.2-206.9 Noen bånd gr.hbl. biot.gn.+gr. amf. Gradvis overgang til	80-85 75 (65-85)						
209.00 - 215.70	6.70	grå gn. Noe gr. Hbl.biot.gn.fra 210.15-210.45. Fra 211 : Tildels en god del musk.	75 (60-80) 65						
215.70 - 220.00	4.30	grå gn.m.d. Noe biot. Spredd litt gr. Fra 217 - 218 : Fra 218 - 219 : Fra 219	60-55 45 55-65 65						
220.00 - 242.25	22.25	grå gn. Noe gr.Åpne småfolder. For det meste rundt Delvis også spisst foldet	v, (0-70) 0						
242.25 - 244.00	1.75	grå gn.m.p.-m.d. Spredd litt gr.	? ?						
244.00 - 245.45	1.45	grå gn.b.p.-b.d.	?						
245.45 - 248.00	2.55	grå gn.m.d. Spredd litt gr. I starten Senere foldet ?	25-80 v ?						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8005

Helling/stigning:

Høyde :

- 5 -

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
142.60 - 146.55	3.95	grå gn.b.p.-b.d.	Gr. Åpne småfolder. Fra 43.85-144.05 gr.hbl.gn.	v(0-70)					
146.55 - 148.20	1.65	gr.amf.	som før. Noen åpne småfolder.	60-75 v					
148.20 - 164.20	16.00	grå gn.	Gr. Vanlig-b.p., delvis m.d. Noen åpne småfolder Fra 150-154: Åpne småfolder Fra 154-158: Noe smfoldet mye Fra 158 Fra 159.65 noen smale bånd gr.hbl.(biot).gn. og biot.gn. Fra 161.30 litt pegmatittisk.	75-60 v v(0-80) 60-70 70 (60-80)					
164.20 - 170.30	6.10	hbl.biot.gn.	Gr. Spor py.	75-80					
170.30 - 171.15	0.85	biot.musk.gn.	Noe gr. Py-impr. Tildels grå gn.-aktig.	75					
171.15 - 174.05	2.90	Pegm.	biot + musk.						
174.05 - 176.35	2.30	pegmatittisk biot.gn.	En del musk. Grovk. Noe py-impr. Spredt litt gr.	60-70					
176.35 - 177.90	1.55	biot.musk.gn.	Noe gr. litt grå gn.-aktig	80					
177.90 - 179.55	1.65	biot.gn.	Tildels musk.gn. gr. sv. py- impr. litt Kyanitt						
179.55 - 181.10	1.55	hbl.biot.gn.	Gr. Py-impr. Disthen	80					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8005

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 4 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
116.60 - 119.40	2.80	grå gn.b.d. Gr.rik.Noen bånd gr.hbl. gn. Litt småfoldet. Mye	50						
119.40 - 120.70	1.30	gr.amf.	30						
120.70 - 123.00	2.30	grå gn.b.d. Gr-rik. Åpne småfolder rundt 0							
123.00 - 128.70	5.70	gr.amf. Rel.fink. Tildels rel. store gr. Overterskende mørk og tett.Åpne småfolder rundt	0 (0-50)						
128.70 - 130.00	1.30	hbl.gn. Båndet(biot.og gr.amf.) grønnlig gyllen til lyse olivengrønn skarn. Noe småfoldet	v (50-70)						
130.00 - 130.85	0.85	grå gn. Spredt litt gr.	80-65						
130.85 - 131.25	0.40	gr.amf. Åpne småfolder	v,0-80						
131.25 - 132.05	0.80	grå gn. Spisse småfolder	70						
132.05 - 133.75	1.70	hbl.gn. Vekslende gr.førnig. Grønnlig gyllen skarn Noe småfoldet,men mye :	v 75						
133.75 - 136.90	3.15	amf. litt gr.Noe hbl.gn.som før. Åpne småfolder	v (0-75)						
136.90 - 140.70	3.80	gr.biot.hbl.gn. Åpne småfolder rundt Fra 140	0 45						
140.70 - 142.60	1.90	gr.hbl.gn. Noe biot.Noe amfibolittisk.	65						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8005

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 3 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
61.60 - 78.95	17.35	gr.amf. Grønnlig grå.Noë båndet. Fin-mlk.Massiv,Småfold 62.5-63.5 Ellers fra 63.5-65.0 : Fra 65.0-67.6:Åpne folder Fra 67.6-69.5 m : Fra 69.5-76.7 Åpne folder Fra 76.7	65 70-75 rundt0 80-50 rundt0 30-60						Fold på 69.60-69.90, refoldet i åpne folder etter ca.horisontal akseplan. Begge folder har ca. horisontale parallelle (V-Ø-) akser. 
78.95 - 81.60	2.65	grå gn.+gr.hbl.gn. i bånd. Foldet fra 79.8-80.2 m Så:	45-55 70						
81.60 - 82.40	0.80	pegm.							
82.40 - 88.60	6.20	amf. Vekslede gr.innhold.Noë grålig skarn.Noë båndet. Spisse og åpne småfolder. Akseplan 85-90	v (0-70)						
88.60 - 91.45	2.85	grå gn. Gr.Småfoldet,S ofte vanskelig å se							
91.45 - 102.20	10.75	gr.amf. Som før.Litt småfoldet men mye : Fra 97.5 : Åpne folder fra 99.25-99.65 m Så : med åpne småfolder	v 70-60 75 65-0						
102.20 - 106.90	4.70	gr-rik grå gn.+gr.amf. i avveksling p.g.a. åpne småfolder.							
106.90 - 116.60	9.70	gr.amf. Som før,delvis gr.hbl.gn. Åpne småfolder,mye rundt 0 Fra 113.5 :	0 70-35						
		og mye :	60						

Lokalitet:

Borehull: 8005

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
17.55 - 17.85	0.30	pegm.							
17.85 - 50.00	32.15	grå gn. Gr. Åpne småfolder. Mye rundt 0 Fra 21.5 m : 30-40 Fra 23.0 : 30 Fra 26.0-44.0 m foldet rundt 0 Stictolittisk fra 38 Fra 44 Åpne folder v, 0-75 men fortsatt mye rundt 0							
50.00 - 52.00	2.00	Kjernetap							
52.00 - 52.55	0.55	grå gn.	Gr. Åpne småfolder v						
52.55 - 57.00	4.45	gr.amf.	Grønnlig grå, mlk. Åpne småfolder. Mye rundt v, 0-75 Lokalt litt biot.						
7.00 - 58.00	1.00	Kjernetap							
58.00 - 58.60	0.60	gr.amf.	Som før						
58.60 - 58.95	0.35	pegm.							
58.95 - 59.00	0.05	gr.hbl.gn.	Noe biot.						
59.00 - 60.00	1.00	Kjernetap							
60.00 - 61.60	1.60	grå gn.	Åpne småfolder. Gr. v, 0-60						

Lokalitet: Mofjellet skistua

Borehull: 8005

Dato : Nov. 1980
 Koordinater : ca. 925.559 X, ca. 45.270 Y
 Retning :
 Helling/stigning: lodd
 Høyde : ca. 180 m.o.h.
 Lengde : 320 m

Dybde	L	Bergart -	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.35	1.35	jord							
1.35 - 2.00	0.65	grå gn. Båndet(m.d.,vanlig,b.d.). Spredt litt gr.Kjernetap 0.35 m.	75 ^o						
2.00 - 3.00	1.00	grå gn. Kjernetap 0.50 m							
3.00 - 4.00	1.00	grå gn. Kjernetap 0.65 m	40						
4.00 - 5.00	1.00	grå gn. Kjernetap 0.65 m	75						
5.00 - 6.00	1.00	grå gn. Kjernetap 0.65 m småfold- et. 0.05 m gr.amf.							
6.00 - 7.00	1.00	grå gn. Kjernetap 0.80 m.Foldet							
7.00 - 8.00	1.00	grå gn. Kjernetap 0.50 m	45						
8.00 - 9.00	1.00	grå gn. Kjernetap 0.70 m.5cm gr. biot.gn.	80-55						
9.00 - 10.00	1.00	grå gn. Kjernetap 0.40 m	65-45						
10.00 -14.35	4.35	grå gn. Vekselvis b.d.,vanlig,m. d. Spredt litt gr.Åpne småfolder fra 11.50-12.00 Deretter :	70-30 55-35						
14.35 - 14.75	0.40	gr.amf.	55-45						
14.75 - 17.55	2.80	grå gn. Som før Åpne småfolder fra 16 m:	40-30 v						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8004

Helling/stigning:

Høyde :

- 13 -

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
333.85 - 334.70	0.85	grå gn.	Noe gr.Gr.hbl.biot.gn. i starten.	75-90					
334.70 - 335.00	0.30	amf.	Noe gr.Som før.	80-85					
335.00 - 336.45	1.45	grå gn.	Noe gr.Noen bånd gr.(hbl) biot.gn.og hr.hbl.gn.	70-90					
336.45 - 340.20	3.75	gr.amf.	Fin-mlk.Opptil 0.5cm store gr.Grågrønn Massiv delvis tett.Lokalt noe lyse olivengrønn skarn.	85-90					
340.20 - 340.90	0.70	grå gn.b.d.	Gr.	80					
340.90 - 341.40	0.50	gr.amf.	Noe foldet						
341.40 - 344.60	3.20	grå gn.	Gr.stiktolittisk. Åpne folder.Gr.amf.+gr.hbl. gn.fra 341.95-342.30.Herfra: Spredd litt hbl.til 344.60	80					
344.60 - 350.00	5.40	Amf.	Som før,vekslende gr- innhold.Noen bånd grå gn	80					
relogget jan.82. A.K. <i>Paul Kause</i>									

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8004

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 12 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m g/t
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
308.55 - 309.70	1.15	biot.hbl.gn.	Gr.Rel.lys,Fin-mlk. <u>Py.-impr.</u>						Ag/Au
309.70 - 310.00	0.30	gr.amf.	Lys, Fin-mlk.						< 0,1 / < 0,1
310.00 - 310.25	0.25	hbl.biot.gn.	Som ovenfor						310,00-
310.25 - 311.00	0.75	grå gn.	Noe gr.						313,00
311.00 - 317.00	6.00	biot.hbl.gn.	Gr.l starten litt <u>Py-impr.</u> Fin-mlk.Vekslende hbl-innhold.Noen bånd biot.gn.,grå gn. I starten litt foldet.Ellers						0,8 / < 0,1
317.00 - 321.10	4.10	grå gn.b.p.	Noe gr.Noen bånd <u>py-impr</u> gr.hbl.biot.gn.til 320.00						85-65
321.10 - 321.50	0.40	pegm.							
321.50 - 325.15	3.65	grå gn.m.d.	Spredt litt gr.Noen bånd gr.biot. (hbl.)gn.Delvis mest litt foldet.						65-85
325.15 - 326.70	1.55	grå gn.	Noe gr.						80
326.70 - 331.00	4.30	grå gn.b.p.-b.d.	Noe gr.Noen bånd pegm. Litt hbl.på 330.5						80-75
331.00 - 333.20	2.20	grå gn.	Noe gr.Noe gl-rikere						80-85
333.20 - 333.85	0.65	gr.amf.	fink.Opptil 0.5cm store gr.Rel.mørk.Tett, massiv Grågrønn.						85-80
									85-90

Lokalitet:

Borehull: 8004

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 11 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
292.65 - 294.15	1.50	grå gn. Spredt litt gr. Åpne småfolder	v, 0-70						g/t Ag/Au
294.15 - 294.70	0.55	Sv.malmimpr. i musk.biot.gn.	75-80	0.34	0.24	1.16	4.96	5.4	11.8/0,1
294.70 - 294.90	0.20	2x 1-2cm malmimpr. i musk.biot.gn.							2,5/0,1
294.90 - 297.10	2.20	musk.gn. litt biot.Spredt litt gr. Grå gn.-aktig	60-85						
297.10 - 298.00	0.90	spredte malmimpr. i biot.holdig musk.gn.	80-85	0.29	0.11	0.86	2.83	3.6	10.7/0,1
298.00 - 299.45	1.45	spor malm og musk biot.gn.Grå-		0.01	0.01	0.05	0.35	2.0	0.5/0,1
299.45 - 300.50	1.05	ditto gn.-aktig, lyse sl.							
300.50 - 301.25	0.75	Sv.malmimpr. ditto	75-80	0.34	0.09	0.77	3.01	3.0	11.4/0,1
301.25 - 301.60	0.35	ditto ditto				0.79			7,6/0,3
301.60 - 302.00	0.40	musk.gn. En del biot.Py-impr.							302,00-
302.00 - 305.90	3.90	musk.gn. En del biot.Noë gr.Grå eller gn.-aktig.Åpne småfolder v grå gn.m.d. til 303. Deretter:	75-85						305,00: 0,5/0,1
305.90 - 306.90	1.00	musk.biot.gn. Gr.Båndet (musk.) Litt hbl.på slutten	80						305,00- 306,90: 1,5/0,1
306.90 - 307.40	0.50	malmimpr. i musk.biot.gn.lyse sl.	75-80	0.22	0.12	0.96	3.78	4.9	8.3/
307.40 - 308.00	0.60	musk.biot.gn. Litt gr.Grå gn.-aktig. Fin-mlk.	80						2,3/ 0,1
308.00 - 308.55	0.55	pegm.							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8004

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 10 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
273.00 - 277.50	4.50	hbl.biot.gn. Noe gr.Py-impr.Fra 274.3-274.7 åpne småfolder Noen bånd gr.amf.og gr. hbl.gn.Tildels hvit gl-aktig min.	70-85 v,0-75 80						g/t Ag/Au 273,00 275,00: 0,4/ 0,1 277,50: 0,5/ 0,1 18.8/0,2
277.50 - 280.15	2.65	malm impr. I musk.gn.med noe biot. og musk.biot.gn.	60-80	0.62	0.16	1.90	5.63	5.4	18.8/0,2
280.15 - 280.30	0.15	pegm.		0.25	0.06	0.52	1.42	1.7	18.8/0,4
280.30 - 281.10	0.80	musk.gn. Spredt litt gr.Spor malm + py.	75-70						
281.10 - 282.60	1.50	spredte malmimpr. I musk.gn.	70-75	0.63	0.22	1.58	5.35	5.0	22.9/0,9
282.60 - 282.80	0.20	malm I musk.gn. Noe biot.	55	0.62	0.14	5.10	9.46	6.6	20.8/0,2
282.80 - 283.30	0.50	malmimpr. I musk.gn.Litt biot.	55-75	0.40	0.11	0.81	4.80	4.0	18.1/0,5
283.30 - 284.15	0.85	grå gn.m.d. Tildels rel. musk.rik. Litt gr. Litt foldet	80						0,1/0,1
284.15 - 284.70	0.55	grå gn.m.p. Litt gr.	75						
284.70 - 287.10	2.40	grå gn. Litt gr.Litt foldet	v,40-70						0,5/0,1
287.10 - 290.00	2.90	grå gn. Spredt litt gr.	70-85						
290.00 - 292.35	2.35	grå gn. Spredt litt gr.Åpne småfolder	v 0-80						290,00- 294,15:
292.35 - 292.65	0.30	pegm.							0,7/0,1

Lokalitet: MOFJELLET SKISTUA

Profil 45.270

Borehull: 8004

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 9 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m g/t Ag/Au
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
238.85 - 242.95	4.10	Kjernetap							
242.95 - 245.00	2.05	biot.gn.	Gr.Litt hbl.Åpne småfolder 0						
245.00 - 252.00	7.00	hbl.biot.gn.	Hbl.gn.Fra 245.00-245.50 og fra 245.90-246.15.Gr. Fortsatt litt foldet,men mye.Fra 247.20 åpne folder: Mellom 249.95-250.70 en del grå gn. og : Fra 250.8 åpne småfolder: Delvis : v,0-45 60 v,0-40 0-60						
252.00 - 259.40	7.40	biot.gn.	Noe gr.Mye lyse oliven- grønn skarn.Noie musk. Åpne småfolder . mye rundt. Av og til litt hbl.(liten)? forkastning parallell Kjernen på 258.10-258.55 fylt opp med kalkspet+ Kvarts+noe py og po(0,5cm) v,0-60 0						
259.40 - 267.65	8.25	hbl.biot.gn.	Noe gr.Vekselvis 80° og åpne småfolder rundt 0 Fra 260-262.3 : Fra 262.3 åpne folder : Noen hbl.gn.bånd og gr. biot.gn.bånd.Fra 266.4: v 0-80 65-85 v 75						
267.65 - 273.00	5.35	amf.	Noe gr.Fin-mlk.Noie grå gn.Mellom 269.15-269.60 Blågrønnlig grå. Fra 271.3-272.3 åpne småfolder 75-85 v,0-80						270,00 - 273,00: 0,1/40,1

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8004

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 8 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
203.10 - 204.50	1.40	biot.gn. Noe musk.og.gr.Spredt litt hbl.Grå gn.-aktig. <u>Py-impr.</u>	75						
204.50 - 207.60	3.10	hbl.biot.gn. Fin-mlk.Gr.Py-impr.Fra 206 rel.lite hbl.og noe hvit gl.aktig min.	80						
207.60 - 212.40	4.30	musk.biot.gn. Spredt litt gr. <u>Py-impr.</u> Fra 210, ingen py og:	80 70 (60-75)						
212.40 - 218.20	5.80	musk.gn. Noe biot.Spredt litt gr. Gl-rik. Lokalt: Fra 215.20-215.25. hbl. biot.gn.Herfra: På slutten avtakende gl.og	80 60-70 75 50						
218.20 - 218.90	0.70	biot.gn. Gr.Noë musk.	70-75						
218.90 - 222.65	3.75	musk.gn. Fin-mlk.Rel.gl.rik.Noë biot.Spredt litt gr.	70-75						
222.65 - 224.65	2.00	musk.biot.gn. Gr. Py-impr.	60-75						
224.65 - 238.85	14.40	hbl.biot.gn. Gr.Varierende tildels lite hbl.-innhold.I starten 15 cm gr.hbl.gn.Avtakende Py-impr.Fra 229.40-233.3 v åpne småfolder,litt pegm. og lokalt litt lyse oliv engrønn skarn,og lite eller ingen py Fra 233.3-236.0. Fra 236 åpne små- folder	70-75 65-55 v(0-65)						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8004

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 7 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
180.20 - 185.50	5.30	biot.hbl.gn. Gr.Noë båndet.Spor py. Noen bånd gr.hbl.gn.og gr.biot.(musk)gn.Py-impr. fra 183.80-184.90 og har delvis biot.musk.gn. Avtakende hbl.	85						
185.50 - 185.90	0.40	pegm.							
185.90 - 187.00	1.10	grå gn.-aktig biot.gn.og gr.hbl.gn.i avveksling	80						
187.00 - 188.30	1.30	grå gn.b.d. Rel.biot.rik.Middelsgrå Noë gr.	80 70-85						
188.30 - 192.30	4.00	grå gn.b.d. Noë gr. Fra 191.3-191.6 småfolder	80-75						
192.30 - 198.05	5.75	grå gn.vanlig-m.p. Spredt litt gr.Enkelte partier musk.rik.Åpne småfolder.	v						
198.05 - 199.70	1.65	musk.gn. Noë biot.Litt grå gn.- aktig.mlk.Spredt litt gr. Åpne og spisse småfolder Fra 199:	v 80						
199.70 - 200.30	0.60	hbl.biot.gn. Noë gr.og hbl.St.py-impr	80						
200.30 - 200.60	0.30	grå gn. Gr.							
200.60 - 200.90	0.30	gr.hbl.gn. Noë biot.	80						
200.90 - 203.10	2.20	grå gn. Gr.I starten litt foldet Spredt litt hbl.	80						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8004

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 6 -

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
159.50 - 160.25	0.75	biot.gn.	Gr.	55-70						
160.25 - 162.20	1.95	hbl.gn.og amf.	Noe biot.,gr.og lyse olivengrønn skarn. Fra 161.00-161.30 biot.musk. gn.Spisse småfolder fra 161.50-161.80: (sjenklene 65 og 80)	65 65-80						
162.20 - 162.90	0.70	biot.gn.	Gr. Noe musk.mlk-grovk.	70						
162.90 - 163.65	0.75	amf.	Middels grågrønn Fin-mlk	85						
163.65 - 164.40	0.75	gr.hbl.gn.	Noe biot.	75						
164.40 - 168.05	3.65	gr.amf.	I starten litt gr.hbl.gn. aktig.Grågrønn, fin-mlk. små gr.	- 70-75 (80-60)						
168.05 - 169.95	1.90	grå gn.b.d.	Stiktolittisk,og derfor småbåndet	80 (70-85)						
169.95 - 174.45	4.50	gr.amf.	Fin-mlk.Grågrønn, små gr. Rel.tett.Grå gn.fra 170. 20-170.25 og fra 171.30- 171.80 Fra 172.0-172.6 opptil 1 cm store gr.	80						
174.45 - 179.60	5.15	grå gn.b.d.-b.p.	Gr.Tildels tynt båndet (biot.)	80-85						
179.60 - 180.20	0.60	gr.hbl.gn.	På 179.8 grå gn.(5 cm).	80-85						

Lokalitet:

Borehull: 8004

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 5 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
137.80 - 139.40	1.60	hbl.biot.gn.	Gr. Fra 138.6 .svake åpne folder:						
139.40 - 140.00	0.60	grå gn.	rundt 0						
140.00 - 140.75	0.75	biot.gn.	Gr.Noe musk.l starten Økende til:						
140.75 - 149.90	9.15	gr.amf.	Middels grågrønn Fin-mlk. Gr.vanligvis små Noen bånd grå gn. i starten Lokalt åpne folder(141.0- 141.3, 143.2-143.5) Tildels massiv.Åpne små- folder fra 145.7: Fra 149.3-149.9 foldet	0-30					
149.90 - 154.55	4.65	hbl.gn.	Båndet hbl.gn.eller amf. med lyse bånd rike på grønnlig skarn. Fra 152.9-154.1 Åpne småfolder, mye tundt Fra 154.1	55-75					
154.55 - 157.60	3.05	amf.	Som ovenfor.Vekslende gr.-innhold.Tildels litt båndet.Åpne småfolder fra 155.6 - 156.4 Deretter:	50-55					
157.60 - 157.85	0.25	grå gn.	Små gr.	30-80					
157.85 - 159.15	1.30	amf.	Som ovenfor	80-65					
159.15 - 159.50	0.35	grå gn.	Spredt litt gr.	65-55					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8004

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 4 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
112.45 - 128.80	16.35	gr.amf. Som forrige.Til 113: Fra 113-115 S usynlig Fra 115 noe båndet: Fra 117-119 : Fra 119 hurtig avtakende til og amf.mer som den fra 53.95 - 64.70 Fra 120 åpne småfolder delvis rundt 0,delvis rundt 40-50, Fra 125: mye rundt	65 65-55 65-75 15 0-65 0 (0-30)						
128.80 - 133.00	4.20	grå gn.b.p.-vanlig Noe gr. Fra 130: Noen smale bånd gr.hbl. biot.gn.(130.85-130.95, 132.50 - 132.65).	0-30 40						
133.00 - 133.40	0.40	gr.hbl.gn.	45-60						
133.40 - 133.95	0.55	gr.biot.gn. Noe hbl.	60						
133.95 - 134.60	0.65	gr.hbl.gn.	60						
134.60 - 136.55	1.95	grå gn. Gr. Fra 135.0-135.6 åpen fold Herfra hurtig økende til og bånd med gr.hbl.gn.	55-65 40-30 45-65						
136.55 - 137.00	0.45	gr.biot.Klor(?) .gn. Lysegrønn Kloritt?	65-45						
137.00 - 137.80	0.80	grå gn.+gr.biot.musk.gn.	65						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8004

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 3 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
65.40 - 76.25	10.85	gr.amf. Som før. Åpne småfolder Tildels : Fra 73 svake åpne folder Mot slutten :	v, 0-65 40-65 rundt 0 30						
76.25 - 77.00	0.75	grå gn.b.d. Gr.Middelsgrå Åpne småf- older	v, 0-60						
77.00 - 77.60	0.60	Båndet grønn amf. og svart biot.hbl.gn. Åpne småfolder	v.						
77.60 - 83.20	5.60	grå gn.b.d. Gr.Åpne småfolder rundt Noe hbl.fra 81.25-81.35	0 10-75						
83.20 - 86.70	3.50	gr.amf. Fin-mlk.Frågrønn, Delvis tett og massiv.Åpne små- folder	v (0-70)						
86.70 - 87.70	1.00	grå gn.b.d. Gr.							
87.70 - 88.70	1.00	gr.amf. Som forrige.Litt småfoldet	60-70						
88.70 - 90.00	1.30	grå gn.avvekslende med gr.hbl.(biot)gn. i noen dm brede bånd.	60-70						
90.00 - 94.15	4.15	gr.hbl.gn.+gr.amf.Noen bånd grå gn.(91.40- 91.80, 92.60-92.85) Åpne småfolder	v, 0-70						
94.15 - 112.45	18.30	grå gn.b.d. Gr.Svake åpne småfolder rundt til 109. Fra 109 avtakende folding Fra 110 Fra 111 stiktolittisk og	rundt 0 (0-30) 40-65 65						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8004

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
31.20 - 31.60	0.40	pegm.							
31.60 - 33.20	1.60	gr.amf.	Som før. Åpne folder.	v					
33.20 - 35.80	2.60	grå gn.	Spredt litt gr. Fra 33.30- 33.70 gr. hbl. biot. gn. Åpne småfolder, men mye rundt:	v(0-55) 0					
35.80 - 44.65	8.85	gr.amf.	Som før. Åpne småfolder Tildels store gr. Mye rundt S mot slutten økende til:	v(0-50) 0 60-70					
44.65 - 44.95	0.30	grå gn.	Gr.	70-60					
44.95 - 45.70	0.75	gr.amf.	Som før. Åpne småfolder fra 45.00 - 45.30 Deretter:	v, 0-55 55-70					
45.70 - 53.95	8.25	grå gn.	Gr. Åpne småfolder. Tildels rel. gl. rik. Fra 50.3	v, 0-70 65 (55-75)					
53.95 - 64.70	10.75	gr.amf.	mlk. Ofte store gr. Mørke grønnsvert. Delvis noe båndet (mørkere/lysere). Fra 55.2-58.3 Åpne folder Tildels noe biot. og lyse olivengrønn skarn Fra 58.3 - 59.6: Fra 59.6 åpne folder ofte rundt.	60 v, 0-60 60-75 v, 0-80 0					
64.70 - 65.40	0.70	grå gn.	Gr. Åpne folder	v, 0-70					

Lokalitet: Mofjellet skistua

Dato : Okt. 1980

Koordinater : ca.925.524 X, ca.45.270 Y.

Retning :

Helling/stigning: lodd

Høyde : ca.190 m.o.h.

Lengde : 350 m

Borehull: 8004

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	jord							
2.50 - 15.00	12.50	grå gn. Noe gr.Åpne småfolder Mye rundt Fra 6.00 - 7.00 Fra 7.00 - 8.50 Fra 8.50 Småfoldet Fra 9.05 - 9.20 hbl.gn. Fortsatt småfoldet,men mye:	v,0-60 0 60-70 55-45 v 60 (55-70)						
15.00 - 18.00	3.00	grå gn.m.d. Småfoldet(åpent)Spredt litt gr.S delvis vanske- lig å se.	v						
18.00 - 20.30	2.30	grå gn. Gr.Åpne småfolder Mye rundt Fra 19.70-19.85:gr.hbl. biot.gn. og 40°.	0						
20.30 - 20.90	0.60	hbl.biot.gn. Gr.	55-40						
20.90 - 24.20	3.30	gr.amf. Åpne småfolder Mye :	v(0-75) 40-50						
24.20 - 26.20	2.00	hbl.biot.gn. Gr.Spisse og åpne små- folder, delvis mye:	v(0-80) 65						
26.20 - 31.20	5.00	gr.amf. Tildels noe gr.hbl.biot. gn.Tildels litt gr.hbl. gn-aktig.Småfoldet,tildels mye rundt.Tildels noe gyllen-grønnlig til lyse olivengrønn skarn.Fin- mlk.Grønnlig,mørk.	s v(0-65) 0						

Lokalitet:

Borehull: 8003

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 13 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
343.20 - 350.00	6.80	grå gn.b.p.-b.d. Gr.-rik. Mellom 345.80 - 346.20 gr.amf. Stictolittisk fra 346.20- 347.80 Relogget jan. 82. A.K. <i>Lail Kruse</i>	85						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8003

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 12 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
308.80 - 310.00	1.20	biot.musk.gn. Gl.rik.Spredt litt gr. St.py-impr.I starten litt hbl.	80						
310.00 - 311.25	1.25	musk.gn. Gl.rik,noe biot.St.py-impr.Spredt litt gr.	80						
311.25 - 324.80	13.55	hbl.biot.gn. Noe gr.hvit gl.,Py-impr. Noen bånd gr.amf.og Py-impr.biot.musk.gn.	75-85						
324.80 - 325.20	0.40	pegm.							
325.20 - 327.20	2.00	hbl.biot.gn. Noe gr.Hvit gl.Py-impr.	70-80						
327.20 - 334.25	7.05	gr.hbl.gn. Lyse ^{lc} øvegrønnlig skarn Lokalt litt biot.	70-85						
334.25 - 334.95	0.70	hbl.biot.gn. Noe gr.	80						
334.95 - 336.30	1.35	grå gn.m.d.	85-90						
336.30 - 336.70	0.40	gr.amf. Noen vånd grå gn.	85						
336.70 - 338.80	2.10	grå gn.m.d.-m.p. Spredt litt gr.Noen få smale bånd gr.amf.	85-90						
338.80 - 339.90	1.10	gr.gn.b.p. Spredt litt gr.	85						
339.90 - 343.20	3.30	gr.amf. grå grønn,massev,mlk.rel store gr.Mot slutten gradvis mere grå gn.	85-90						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8003

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 10 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
273.25 - 275.35	2.10	hbl.biot.gn.	Gr. Py-impr. Noen smale bånd gr.amf.	80					
275.35 - 277.50	2.15	gr.amf							
277.50 - 296.90	19.40	grå gn.b.p.	Gr.Litt stictolittisk Fra 278.40-278.65. Så: Fra 280.45-280.70 : gr.hbl.gn. Fra 281.6:	80-85 75 80					
296.90 - 297.50	0.60	biot.gn.	Gr. mlk-fink.	70					
297.50 - 302.00	4.50	grå gn.	(lokalt 70).Spredd litt gr. Spredd noen smale bånd mel fin-mlk.gr.biot. gn.og gr.hbl.biot.gn. Fold på 299.10. Fra 300:	80 60					
302.00 - 304.50	2.50	biot.hbl.gn.	Gr. Py-impr.Hvit gl.	60-70					
304.50 - 305.15	0.65	grå gn.m.d.	Spredd litt gr.	80					
305.15 - 305.60	0.45	gr.amf.	I starten litt gr.hbl. biot.gn.	60					
305.60 - 306.70	1.10	biot.hbl.gn.	Gr. Py-impr.Noë disthen og hvit gl.						
306.70 - 307.60	0.90	musk.biot.gn.	gl.-rik-meget gl.rik. St.py-impr.Mere musk.enn biot.	80-75					
307.60 - 308.80	1.20	gr.amf.	Bånd med gr.hbl.biot.gn. + py-impr.	70-80					

Lokalitet:

Borehull: 8003

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 9 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
253.30 - 253.40	0.10	pegm.							
253.40 - 260.00	6.60	amf. Vekslende gr.innhold. Delvis hbl.gn. Mest: Rel.fink(-mlk), tett, rel. mørk. Sprekk parallell kjernen. Fra 255.5-256.3 med Kv.+litt py. Fra 257.7-258.0 hbl.biot.gn. +py-impr. Fra 258.7- 259.45 grå gn+Py-impr.+ noe hbl.	65-85 80						
260.00 - 260.85	0.85	grå gn. Kv.rik, litt gr., spredt litt hbl. Py-impr.	85-80						
260.85 - 261.20	0.35	hbl.biot.gn. Py-impr.							
261.20 - 262.00	0.80	biot.musk.gn. Gr.rik, spor py. Litt grå gn.-aktig	80						
262.00 - 265.50	3.50	hbl.gn. Rel.lys, mlk-grovk. rik på hvit gl. Noe biot. St.py- impr. Smale bånd gr.amf.	80						
265.50 - 269.65	4.15	gr.amf. Med py-impr.gr.(biot.) (klor.). hbl.gn.bånd og noen få grå gn.bånd.	80-85						
269.65 - 271.30	1.65	gr.hbl.gn.	85						
271.30 - 271.70	0.40	(biot).hbl.gn. Gr. Py - impr.	85						
271.70 - 273.25	1.55	gr.hbl.gn. Noen py-impr.gr.(biot). hbl.gn.-bånd.	80						

Lokalitet:

Borehull: 8003

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 8 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
223.75 - 223.95	0.20	pegm.							
223.95 - 225.30	1.35	gr.hbl.gn. Noen bånd grå gn. Mest:	65-40 45						
225.30 - 225.75	0.45	grå gn. Gr.	45						
225.75 - 226.30	0.55	gr.hbl.gn.	45-40						
226.30 - 226.80	0.50	biot.gn. Gr.Noe hbl.og hvit gl. Py-impr.	40						
226.80 - 228.75	1.95	gr.hbl.gn. Bånd grå gn.Noe foldet, mye:	40-65						
228.75 - 229.70	0.95	grå gn.b.p.-b.d. Gr.	65						
229.70 - 230.05	0.35	gr.hbl.gn. Foldet Mye:	50						
230.05 - 230.40	0.35	grå gn. Gr.							
230.40 - 231.85	1.45	gr.hbl.gn.	50-60						
231.85 - 253.30	1.45	gr.amf. Som før.Lokalt noe lyse olivengrønn skarn.Noen få bånd gr-rik,grå gn. Fra 239 - 240.7 : Fra 240.7 - 241 : grå gn. Fra 241 : Tildels gr.hbl.gn.Åpen fold på 248.2 Fra 249.35 lysere og mere fink. Til 250.15.Fra 250 Lokalt litt foldet	60 60-75 60-70 75-85						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull:

Helling/stigning:

8003

Høyde :

- 7 -

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
167.75 - 179.35	11.60	gr.amf.	mlk,mørk,tett Noen bånd gr.hbl.gn.Fra 170.5- 171.1:rel.lys fink.amf. med mlk-grovk. gr.	65-85 nye 80					
179.35 - 181.20	1.85	gr.hbl.gn.	Noe grønnlig og grønnlig gyllen skarn.Åpen fold på 180.60 - 181.20	75-60					
181.20 - 220.65	39.45	gr.amf.	Som før.I starten litt gn-aktig med grønnlig og grønnlig gyllen skarn. Noe småfoldet(åpent)og Ingen bånd med hbl.biot.gn. Lokalt gyllen grønnlig skarn.Fra 188.6-190.4: avtakende til(på 190.4): pga. Åpen fold.Deretter åpne småfolder.Akseplan 80-85, Gr-rik til vekslende, (lokaltingen)Gr.-inhold. Fra 196-197.6. Deretter åpne småfolder Mye: Fra 208.85-210.75 rel.lys gr.amf,fink.,med grovk. gr.Deretter åpne småfolder Delvis mye rundt Fra 219 mere hbl.gn.-aktig.	65-75 da v. 70 0 v v 50-0 v(60-0) 0 0-50					
220.65 - 220.95	0.30	grå gn.	Noe gr.	55-45					
220.95 - 223.75	2.80	gr.amf.	Delvis litt hbl.gn.-aktig Åpne småfolder.Mye rundt Ellers :	0 0-50					

Lokalitet:

Borehull: 8003

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 6 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
151.70 - 158.35	6.65	hbl.biot.gn. mlk-grovk.Sterkt py-impr Åpne småfolder rundt.Noe 0 gr.Disthen og hvit gl. Fra 153.5 - 154 : Noen bånd gr.hbl.gn. og gr.amf. Fra 154 - 156 : Fra 156 : Fra 157 :	60-70 80 20 - ? 80						
158.35 - 160.80	2.45	gr.hbl.gn. Noen py-impr.gr.biot.gn. bånd.Lokalt litt småfoldet.	80-75						
160.80 - 162.15	1.35	hbl.biot.gn. Som før	70-80						
162.15 - 162.75	0.60	biot.gn. Gr.Noë musk.Rel.fink.	75						
162.75 - 163.20	0.45	gr.hbl.gn.	80						
163.20 - 164.15	0.95	hbl.biot.gn. Som før	80						
164.15 - 165.10	0.95	amf. Litt gr.Rel.fink.Mørk. tett	75						
165.10 - 167.05	1.95	gr.hbl.gn. Noen py-impr.hbl.biot.gn. bånd og amf. bånd.	70-75						
167.05 - 167.30	0.25	grå gn. Gr.	75						
167.30 - 167.60	0.30	gr.hbl.gn.	75						
167.60 - 167.75	0.15	grå gn.	65-70						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8003

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 5 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
121.00 - 127.00	6.00	gr.hbl.gn. Noen bånd gr.biot.(hbl) gn. Kjernetap : 0.3 m fra 123 - 124 0.65m " 124 - 125 0.5 m " 125 - 126 0.4 m " 126 - 127							
127.00 - 128.00	1.00	hbl.biot.gn. Gr. 0.2 m Kjernetap							
128.00 - 136.00	8.00	grå gn.b.p.-b.d. Noe gr.åpne småfolder. Noe hbl.fra 132.45-132.50 Delvis spisse folder (133.8 - 134) Fra 134.9 - 136 spredt noe hbl.							
136.00 - 142.75	6.75	grå gn. Fortsatt åpne småfolder Fra 139 b.d. Mye Fra 141.40-141.70 m.p.	v 45-75						
142.75 - 144.90	2.15	gr.hbl.gn. mlk.Fra 144 noe lysere og fink-mlk.	60-70						
144.90 - 146.95	2.05	grå gn.b.p. Noe hbl.fra 146.20-146.30	60						
146.95 - 151.70	4.75	biot.gn. Gr.Rel.lys, mlk, spredt noe hbl.,som oftest i smale bånd.Spor py.-sv. py-impr.Litt grå gn.-aktig Fra 150.0-150.5 : Deretter :	70-80 30 30-50						

Lokalitet:

Borehull: 8003

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 4 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
94.00 - 94.65	0.65	hbl.gn. Noen bånd biot.gn.og pegm. Åpne småfolder	v						
94.65 - 100.40	5.75	Grå gn.m.p. Åpne småfolder? Fra 99.5 v?35? åpne småfolder spredt litt gr.	v						
100.40 - 101.90	1.50	hbl.biot.gn. Gr. Noe småfoldet	v,50						
101.90 - 102.65	0.75	Kvarts							
102.65 - 111.20	8.55	grå gn. Noe småfoldet.No. gr. I starten m.d.,så vanlig Noen bånd biot.gn.og biot.hbl.gn. Litt foldet	75-60 v						
111.20 - 113.10	1.90	grå gn.b.d. Rel.mørk.Gr.rik Mye rundt Søkende til	0 60						
113.10 - 113.40	0.30	gr.amf.							
113.40 - 113.85	0.45	grå gn. Gr. Åpne småfolder	v						
113.85 - 114.75	0.90	gr.hbl.gn.+gr.biot.gn. Småfoldet ?	v?40?						
114.75 - 117.75	3.00	grå gn.m.d.-m.p. Åpne småfolder. Mye rundt	0						
117.75 - 119.80	2.05	grå gn. Litt gr.Åpne småfolder men mye :	v 60-75						
119.80 - 121.00	1.20	hbl.biot.gn. Gr. Noen bånd grå gn. Åpne småfolder,mye rundt	v 0						

Lokalitet:

Borehull: 8003

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 3 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
61.10 - 63.95	2.85	musk.biot.gn.	Gr.Noë disthen.st.py-impr. v Åpne småfolder. Fra 63.40-63.50 hbl.gn.						
63.95 - 64.55	0.60	gr.amf.	mlk.mørk, tett						
64.55 - 65.00	0.45	musk.biot.gn.	Gr. Py-impr. Foldet v						
65.00 - 67.80	2.80	musk.gn.	Noë biot.og gr.Sv.Py-impr. Småfoldet Fra 66.10- 66.35 Py-impr.grovk.hbl. fels.Ditto fra 67.00- 67.50 med åpne folder.						
67.80 - 75.70	7.90	musk.biot.gn.	Gr.Py-impr. Noë hbl.i v starten.Småfolder.Py-impr.(0-70) grovk.hbl-fels fra 69.45- 69.65 spredt noë hbl. Fra 71.90 spredt Py-impr.v(0-50)						
75.70 - 76.20	0.50	kvarts							
76.20 - 83.95	7.75	biot.musk.gn.	Veksl.gr.Sv.py-impr. Fra 78-79 mye : 0 Fra 79-80 30-50 Fra 80.5 åpne folder v(0-70)						
83.95 - 86.00	2.05	hbl.biot.gn.	Gr.Py-impr.Hvit gl etter disthen. Åpne småfolder v(0-80)						
86.00 - 87.40	1.40	hbl.gn.	Gr.Noë hvit gl.Spor py. 40-60						
87.40 - 94.00	6.60	musk.biot.gn.	Som før. I starten spredt v litt hbl.Noë foldet (0-80) Fra 90 Åpne småfolder rundt0						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8003

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
34.15 - 45.25	11.10	grå gn. Gr.Middels grå (rel.gl-rik).Fra 36 åpne småfolder v Delvis rundt Fra 38.5 lysere(mindre gl.) Mye : Fra 41.70-42.00 gr.hbl.gn. v	65-50 0 0-50						
45.25 - 51.65	6.40	grå gn.m.d. Åpne og tildels også spisse småfolder.Rel.gl.rik.Noe biot.litt gr. Fra 49 mye :	v 50-60						
51.65 - 52.50	.85	biot.gn. En del musk.Sv.py-impr.							
52.50 - 55.85	3.35	biot.musk.gn. Spisse og åpne småfolder v Spredt litt gr.og py. Vekslede musk/biot. Fra 55 mere gr. og py og disthen. Småfoldet	v v(0-60)						
55.85 - 57.00	1.15	musk.gn. En del biot.Spisse og åpne småfolder.	v						
57.00 - 57.70	0.70	hbl.fels. grovk.Py-impr.Grønnlig-grå skarn.							
57.70 - 61.10	3.40	musk.gn. En del biot.Sv.py-impr. småfoldet hbl.(grov)og py på 58.90-59.00. Fra 59:åpne og spisse folder. Noe mere biot.mot slutten.	70 v v(0-70)						

Lokalitet: Mofjellet Skistua

Dato : sept./okt. 1980

Koordinater : ca. 925.444 X, ca. 45.270 Y

Retning :

Helling/stigning: lodd

Høyde : ca. 203 m.o.h.

Lengde : 350 m

Borehull: 8003

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	jord							
2.50 - 6.00	3.50	grå gn. Noe gr. Åpne småfolder	v(0-50)						
6.00 - 6.70	0.70	pegm.							
6.70 - 11.50	4.80	grå gn. Noe gr. Åpne småfolder	v(0-50)						
11.50 - 21.00	9.50	grå gn.b.d. Noe mørkere(mere gl.) Noe gr.Åpne småfolder Fra ca. 19m :	v(0-50) 65						
21.00 - 25.05	4.05	grå gn. Gr.(ofte store)	65						
25.05 - 25.65	0.60	pegm.							
25.65 - 29.60	3.95	grå gn. Gr.	50-55						
29.60 - 30.20	0.60	hbl.biot.gn. mlk-grovk. Gr-rik Åpne småfolder	v						
30.20 - 30.50	0.30	grå gn. Gr.							
30.50 - 31.20	0.70	gr.amf. mlk.Gr.hbl.biot.gn. fra 30.90 - 31.00	60						
31.20 - 33.90	2.70	biot.gn. Gr.Åpne folder i staren. Lokalt noe hbl.Noen grå gn.bånd.Spor py.	55						
33.90 - 34.15	0.25	pegm.							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8002

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 14 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
381.75 - 382.80	1.05	gr.amf.	Som før.	80					
382.80 - 384.70	1.90	gr.hbl.gn.	Som før. Noen bånd med mlk-grovk.lys hbl.gn. Fra 384.3:50 ⁰ , økende til	80 (70-85) 75					
384.70 - 400.00	15.30	hbl.gn.	Vekslede Gr.mlk.Båndet Noen bånd gr.hbl.biot.gn. og gr.rik grå gn. Fra 386.30 - 387 småfoldet Fra 389.0 - 389.5 småfoldet Fra 389 partier med mlk- grovk.lys hbl.gn.til hbl. fels Fra 391 : Delvis noe småfoldet Fra ca.393-398. Fra 390:	80 (65-90) 75 (40-80) 80					
		relogget januar:1980. A.K. <i>Karl Kause</i>							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8002

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 13 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
349.30 - 352.70	3.40	hbl.biot.gn. Middels grå,gr.,Bånd med gr.hbl.gn.og gr.biot.gn. Rel.fink.	80						
352.70 - 353.00	0.30	pegm.							
353.00 - 353.60	0.60	hbl.biot.gn. Rel.fink. Gr.							
353.60 - 354.00	0.40	hbl.gn. Gr. Fink.							
354.00 - 355.30	1.30	hbl.biot.gn. Gr.Rel.fink.Noen bånd hbl.gn.Fint laminert Rik på små gr.På slutten sprekk med kvarts	85-90						
355.30 - 369.00	13.70	gr.amf. Fink.Små gr.Grønnlig gråsvart,tett,massiv.Fra 359 noe lysere og: Fra 361 noe foldet?Fra 361.3: Fold på 362.0 Fra 362.70 noen bånd gr. hbl.biot.gn.Fink. Fra 365 : Fra 367 :	85-90 70 85 80 70 80						
369.00 - 372.00	3.00	gr.hbl.gn. Fink.	80-85						
372.00 - 379.20	7.20	gr.amf. Som før.Tildels litt hbl.gn.-aktig.Noen få smale bånd middelsgrå gr-rik grå gn.(amf.-aktig)og fink.gr.hbl.biot.gn.	85-90						
379.20 - 381.75	2.55	gr.hbl.gn. Fin-mlk.Båndet Noen band gr.biot.hbl.gn.	80						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8002

Helling/stigning:

Høyde :

- 12 -

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
317.45 - 318.80	1.35	hbl.biot.gn.	Båndet.No gr.Spredte Py - impr.	80					
318.80 - 322.20	3.40	musk.gn.	Litt biot.I starten py- impr.Mellom 320 og 321 noen hbl.gn.bånd.	75-80	0.43	0.11	1.24		319.10-319,20
322.20 - 328.00	5.80	hbl.biot.gn.	Noe gr. Fra 322.5-322.9 : Så Fra 323.5-324:åpne folder Deretter: Fra 324.60 st.py-impr.og noe desthen, og :	75 60 75 75-80 80					
328.00 - 330.80	2.80	gr.hbl.gn.	Rel kv.(+feltsp?) rik	80					
330.80 - 331.05	0.25	pegm.							
331.05 - 332.60	1.55	hbl.gn.	Som før.Vekslede gr.- innhold.	85					
332.60 - 334.35	1.75	hbl.biot.gn.	Gr. Noe båndet	85					
334.35 - 335.60	0.25	pegm.							
335.60 - 336.85	1.25	grå gn.m.d.	Noe gr.	85					
336.85 - 342.90	6.05	grå gn.	Gr.Mellomgrå Lokalt litt båndet(biot.)Mot slutten mere musk.	85 (75-90)					
342.90 - 349.30	6.40	gr.amf.	Fink.,ofte små gr.,tett massiv,mørkegrå større åpen fold på 348.30	75-85					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8002

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 11 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
303.80 - 305.80	2.00	musk.biot.gn. Båndet (musk/musk+biot/ biot/biot. +hbl./hbl.) Spredte py-impr.Fra 305, 30-305,60 åpne folder Fra 305.60 :	60-80 60						
305.80 - 307.35	1.55	biot.hbl.gn. Noe gr.Py-impr.	80						
307.35 - 308.70	1.35	<u>malm impr.</u> Lyse sl+py i musk.biot. gn. Litt ga.	70-80	0.91 0.08 1.26	0.27 0.12 0.14	2.12 0.04 1.69			307,35-307,4 307,45-308,3 308,30-308,7
308.70 - 308.85	0.15	musk.gn.	80						
308.85 - 311.30	2.45	grå gn.vanlig+m.d.Spredt litt gr.Spredt noen åpne småfolder i starten.Malmstripe på 0.5cm på 310.02 og 310.18 Musk.biot.gn.+malm impr. mellom 310.27-310.36.	85						
311.30 - 313.05	1.75	grå gn.vanlig+b.p.Noie gr.Py-impr.hbl.biot. gn.mellom 312.80-313.05	75						
315.05 - 315.80	2.75	biot.musk.gn. Båndet (musk/musk+biot./ biot.)Litt gr.Noie nmp- smale malmstr.mellom 313.15-313.25 sl+py-impr på 315.53 (2 cm)	50-80 mest 80						
315.80 - 316.80	1.00	hbl.gn.+hbl.biot.gn. Noe gr.Spredte Py-impr.	75						
316.80 - 317.30	0.50	musk.gn. En del biot.							
317.30 - 317.45	0.15	pegm.							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8002

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 10 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
281.80 - 282.70	0.90	hbl.biot.gn.	Delvis noe musk.	80-65					
282.70 - 285.00	2.30	biot.musk.gn.	Py-impr.Noen få smale hbl.gn.og gr.amf.bånd.gr.	75-80					
285.00 - 287.45	2.45	grå gn.med bånd	py-impr.gr.musk.biot.gn. Åpne småfolder						
287.45 - 295.00	7.55	musk.biot.gn.	Disthen,gr.Py-impr.Åpne småfolder Fra 289: men fortsatt litt foldet.	75					
295.00 - 296.30	1.30	gr.hbl.gn.	Rel.lys.grønnlig grå mlk.	75					
296.30 - 296.95	0.65	hbl.biot.gn.	Noe gr.Sv.py-impr.	80					
296.95 - 299.85	2.90	gr.hbl.gn.	Åpne småfolder.Rel.lys. Noen bånd py-impr.biot. gn. Fra 299:	80					
299.85 - 300.40	0.55	musk.gn.	Noe biot.	85					
300.40 - 301.00	0.60	<u>malm impr.</u>	lyse sl+py i musk.biot. gn. Noe foldet						
301.00 - 302.30	1.30	hbl.biot.gn.	Gr.Båndet(hbl/biot.) Spredte py-impr. Foldet						
302.30 - 303.80	1.50	gr.hbl.gn.	middels grønnlig grå Åpne Småfolder						

Lokalitet:

Borehull: 8002

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 9 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
247.90 - 255.50	7.60	hbl.biot.gn.	Gr.Vekslende py-impr. S litt varierende(ned til 25)Fra 250-251: Så hurtig økende til: Noen gr.amf.bånd.Fra 253: Fra 254 litt foldet rundt	60 0 60 45 0					
255.50 - 258.35	2.85	gr.amf.	Som før.Rundt.Noen bånd hbl.biot.gn.med py-impr.	0					
258.35 - 263.25	4.85	hbl.biot.gn.	Gr.Vekslende py-impr.Gr. amf.bånd.Fra 259-261 : Fra 261 Generelt lite eller ikke py-impr.	35 ca.0 45-60					
264.25 - 266.90	3.65	gr.amf.	Fin-mlk.Tildels rel.Store gr.Mørk,grønnlig gråsvart, tett. massiv.	55					
266.90 - 267.95	1.05	grå gn.	Gr-rik	50-80					
267.95 - 269.25	1.30	gr.amf.	Noe grønnlig grå skarn Noen grå gn.bånd mot slutten.	30-50					
269.25 - 281.80	12.55	grå gn. vanlig+m.p.	Spredt litt gr.Noie små- foldet(åpent)i starten. Litt smalt båndet(biot.) Noen bånd gr.biot.(hbl.) gn.mellom 272.45-272.70, 73.70-273.80,275.65-275.90. Gyllen grønn skarn+litt hbl.mellom 280.75-280.80	80-65 mest75					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8002

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 8 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
216.10 - 216.90	0.80	biot.gn. Noe musk.l starten litt hbl.Ellers gr.sv.py-impr.	45						
216.90 - 218.95	2.05	musk.biot.gn. Noe gr. Py.-impr.	50						
218.95 - 221.25	2.30	biot.hbl.gn.+hbl.gn. Spredt litt gr. Litt gyllen skarn	55-65						
221.25 - 224.90	3.65	grå gn.(b.p.) Tynt båndet (mest kv.)	60 (50-65)						
224.90 - 227.15	2.25	biot.gn. Noe musk.Gr. Spor py	50-65						
227.15 - 227.55	0.40	musk.biot.gn. Rel.gl.rik. St.py-impr.	45-65						
227.55 - 242.95	15.40	Grå gn. I starten musk.gn.med litt biot.Spredt litt gr Tildels rel.gl.rik(musk+ noe biot.)og derfor litt (biot)musk.gn.-aktig. Lokalt tynt båndet(Kverts, av og til biot.)Litt fle- ksurfoldet mellom 240og 241m.Gr.biot.gn. mellom 241.25 - 241.45	60-70						
242.95 - 247.90	4.95	gr.amf. Mørk,grønnlig gråsvart, tett,massiv,fink.Mest små gr.Fra 243.10-243.25 grå gn.med gr.Fra 243.25- 243.90 mlk.-grovk.amf. med skarn og uten gr.	55-60						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8002

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 7 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
186.20 - 186.80	0.60	grå gn.b.d.	Gr.-rik	85					
186.80 - 187.70	0.90	gr.amf.	Som før						
187.70 - 189.20	1.50	grå gn.b.d.	Gr. Middels grå	70					
189.20 - 189.50	0.30	hbl.gn.		70					
189.50 - 194.50	5.00	grå gn.b.d.	Lys, Fra 191m middelsgrå gr.	80					
194.50 - 198.00	3.50	hbl.gn.	Noe småfoldet i starten Delvis noe gr.og biot.	80					
198.00 - 200.00	2.00	biot.gn.	Gr.Noë musk.i starten Noë hbl.						
200.00 - 202.00	2.00	biot.hbl.gn.	Gr. S Økende til :	25 80					
202.00 - 207.00	5.00	musk.biot.gn.	Gr.Spredt litt hbl. Fra 205.50 sv.py-impr.	80					
207.00 - 209.60	2.60	musk.gn.	Litt biot.Spredt litt gr. Noe småfoldet fra 209.0	65 rundt0					
209.60 - 209.70	0.10	Øyegneis							
209.70 - 212.00	2.30	grå gn.	Småfoldet(åpent) rundt Spredd litt gr.Mot slutten	0 50					
212.00 - 212.70	0.70	biot.gn.	Spredd litt hbl.	45					
212.70 - 216.10	3.40	musk.gn.	Litt biot.I starten noe mere biot.+litt py.litt gr.	55					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8002

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 6 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
163.90 - 164.40	0.50	pegm.							
164.40 - 165.00	0.60	gr.amf.							
165.00 - 165.40	0.40	biot.hbl.gn. Noe gr.	80						
165.40 - 165.95	0.55	grå gn. Noe gr.	85						
165.95 - 166.95	1.00	gr.hbl.gn.bånd + grå gn.bånd	Større åpen fold på 166.70						
166.95 - 168.15	1.20	gr.amf.	85-60						
168.15 - 168.60	0.45	gr.hbl.gn. Noe biot.	80-70						
168.60 - 168.95	0.35	biot.gn. Gr.							
168.95 - 171.40	2.45	biot.hbl.gn. Gr. Band hbl.gn.	80-60						
171.40 - 184.65	13.25	gr.amf. Grønnlig grå og grå. Rel fink.Tett, massif på 173. 60 m:40°, øker fort igjen Her fra delvis litt hbl. gn.-aktig Fra 181m igjen gr.amf.og	80 (70-90) 75						
184.65 - 185.10	0.45	sprekk ca.parallell kj-akse. kv.+biot.i amf.							
185.10 - 185.25	0.15	gr.amf.							
185.25 - 185.65	0.40	grå gn.b.d. Gr.-rik	75-80						
185.65 - 186.20	0.55	gr.amf. Grønnlig grå til grå.Fink tett, massif.	85						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8002

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 5 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
139.00 - 144.60	5.60	biot.hbl.gn. Gr.Py-impr.Disthen Fra 141.6-142.4 rundt så	55-65 0 65-75						
144.60 - 145.20	0.60	gr.amf.	75-80						
145.20 - 148.40	3.20	hbl.gn. Med filtret musk.Py-impr. Noe gr.Senere mere gr.+ noe disthen og mindre musk., og:	85-25 80						
148.40 - 151.95	3.55	grå gn. Noe gr. Fra 149.5 noe småfoldet(åpent) Fra 151m	75-80 80						
151.95 - 152.50	0.55	hbl.biot.gn. Båndet.No gr.Litt py-impr.	85						
152.50 - 152.85	0.35	hbl.gn. gr.,py-impr.							
152.85 - 156.10	3.25	biot.hbl.gn. gr.disthen,py-impr.Delvis filtret musk.og da lite biot.	75						
156.10 - 156.55	0.45	oppsprukket i hbl.gn. Sprekker ca.20°.Vinkel med S ca. 50 S ca. 75							
156.55 - 158.55	2.00	hbl.gn. Gr.No biot.Py-impr.Til- dels filtret musk.No en bånd gr.amf.	75-85						
158.55 - 161.65	3.10	gr.amf. Massiv.No biot.Litt hbl gn.-aktig.	85-80						
161.65 - 163.90	2.25	biot.hbl.gn. Gr.Py-impr.No disthen	80						

Lokalitet:

Borehull: 8002

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 4 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
125.70 - 125.90	0.20	hbl.gn. Gr.	30						
125.90 - 126.05	0.15	pegm.							
126.05 - 127.00	0.95	hbl.biot.gn. Py-impr.	25-15						
127.00 - 128.05	1.05	biot.gn. Py-impr.Spredt litt hbl og gr. Disthen.	25-15						
128.05 - 129.00	0.95	gr.amf.	15-40						
129.00 - 132.95	3.95	grå gn. Gr.(mellom 129.05-129.30 gr.hbl.gn.)Mest rundt Fra 131m økende til: (mellom 132.75-132.85 gr. hbl.gn.)	0-20 0 60						
132.95 - 134.70	1.75	amf. Grågrønn. Noe gr. Mest:	70-0 60-70						
134.70 - 136.55	1.85	biot.gn. Gr. En del musk.Mellom 135.35-135.90 sprekk med kvarts og py.	45-80						
136.55 - 136.75	0.20	hbl.biot.gn. Gr.,Py.-impr.	80						
136.75 - 137.20	0.45	gr.amf.							
137.20 - 138.35	1.15	biot.gn. Gr.disthen, Py-impr. Litt musk.	50-60						
138.35 - 139.00	0.65	amf.+hbl.gn. Gr.	60-25						

Lokalitet:

Borehull: 8002

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 3 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
66.60 - 76.65	10.05	grå gn.m.d. Litt biot.Spredt litt gr. Fra 70m småfoldet rundt (åpent)	60 0						
76.65 - 76.90	0.25	Kvart.							
76.90 - 79.70	2.80	grå gn. Noen bånd biot.gn.	35-20						
79.70 - 104.20	24.50	grå gn.mer og mer b.d.No gr.Småfoldet? (åpent)Fra 84m: Mellom 89.35-89.55 hbl.biot.gn. (småfoldet).Fra 90m små- foldet(åpent) Fra ca.94m rundt. Fra 97-99m: Fra 99: rundt	0-45 60? 0-60 30-60 0						
104.20 - 104.35	0.15	Kvarts							
104.35 - 115.00	10.65	grå gn.mest b.d. Noe gr.Småfoldet(åpent) Fra 107m-108m:Fra 108m- 110.5m:åpent foldet rundt Fra 115.5m: Senere S vanskelig å se.	0 60 0 75						
115.00 - 115.90	0.90	gr.amf. Grønnlig grå, massiv rel. fink.	75						
115.90 - 116.95	1.05	hbl.biot.gn. Gr. Rel. fink.	75-60						
116.95 - 118.90	1.95	grå gn.b.d. Gr.S vanskelig å se.Fink	75-55						
118.90 - 125.70	6.80	grå gn. Litt gr. Fra 120 - 121 m: Fra 121 - 122 m: Fra 122 Småfoldet	65 0-20 35 0-50						

Lokalitet:

Borehull: 8002

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
32.60 - 33.00	0.40	musk.biot.gn. py-impr.	50	0.31	0.14	1.80			
33.00 - 34.00	1.00	spredt sl.-impr. I musk.biot.gn.og biot.gn.st.py-impr.	50						
34.00 - 34.60	0.60	sl.-impr. som ovenfor							
34.60 - 34.90	0.30	pegm.							
34.90 - 35.80	0.90	spredte sl-impr. i biot.gn.Litt hbl.st.py-impr.							
35.80 - 37.35	1.55	musk.biot.gn. Noe gr.Py-impr.	60-70						
37.35 - 42.00	4.65	musk.gn. Noe biot.Spredt litt gr. Småfoldet(åpent)Delvis noe spist foldet.	0-55						
42.00 - 43.95	1.95	biot.gn. Gr.Tildels en god del hbl.Py-impr.Noë disthen. Småfoldet(åpent)Fra 43m:	60						
43.95 - 45.40	1.45	musk.gn. Noe biot.og gr.Småfoldet							
45.40 - 46.90	1.50	musk.gn.+biot.gn. som ovenfor Småfoldet (åpent)	0-65						
46.90 - 51.50	4.60	musk gn. Noe biot.Spredt litt gr. Småfoldet(åpent) rundt	0						
51.50 - 52.45	0.95	biot.gn. Gr.Py-impr.Småfoldet rundt	0						
52.45 - 66.60	14.15	hbl.biot.gn. Gr.Py-impr.Småfolder(åpent)en god del rundt.Noë disthen. Fra 64m:	0-70 0 60-75						

Lokalitet: Mofjellet skistua

Dato : sept. 1980

Koordinater : ca. 925.474X, ca. 45.270 Y

Retning : Nord

Helling/stigning: 83°

Høyde : ca. 203 m.o.h.

Lengde : 400 m

Borehull: 8002

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	jord							
1.00 - 23.40	22.40	biot.musk.gn. Litt gr.mlk. rundt Sv.foldet (åpent) Fra 13m: Vekslede musk/biot.for- hold. Spor Py.Fra 13m sv. py.-impr. Fra 18.75-18.85 Kraftig sl.(+py)impr.i folde-ombøyning. Akseplan ca.80° Musk. overhersker.	0° ca.0 (0-60)						
23.40 - 24.75	1.35	malmstr.+impr. py+sl i musk.biot.gn.	40-50	0.60	0.38	3.03			23.40-23.80
24.75 - 24.95	0.20	pegm.		0.08	0.07	0.25			23.80-24.20
24.95 - 25.90	0.95	musk.biot.gn. sv.py.impr.	50	0.21	0.26	1.45			24.20-24.75
25.90 - 26.20	0.30	m.spredte sl.impr.I musk.giot.gn.,py-impr.	50-60						
26.20 - 26.50	0.30	sl+py-impr. i musk.biot.gn.							
26.50 - 27.25	0.75	musk.biot.gn. sv.py-impr. Litt gr.	50						
27.25 - 27.50	0.25	sl+py-impr. I musk.biot.gn. Litt små foldet (åpent)		0.08	0.25	0.58			
27.50 - 28.10	0.60	musk.gn. En del biot. Litt gr. sv. py.-impr.	55						
28.10 - 28.15	0.05	sv.sl+py-impr. i musk.biot.gn.	55						
28.15 - 32.60	4.45	musk.gn. Noe biot.Litt gr.Fra 29m småfoldet (åpent) Fra 31m: Fra 32.10 py-impr.og:	40-60 40 50						

Lokalitet:

Borehull: 8001

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 14 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
364.70 - 365.30	0.60	grå gn.+pegm.							
365.30 - 371.50	6.20	gr.amf. Som før	85-75						
371.50 - 371.75	0.25	grå gn.	85						
371.75 - 380.00	8.25	gr.amf. Som før.Ofte uten gr. Grønnlig skarn.særlig fra 375m, og derfra foldet til 377.20. Derfra	85-80 50						
380.00 - 380.50	0.50	Oppknusningssone i amf.							
380.50 - 387.30	6.80	gr.amf. Som før.Fint båndet Grønnlig skarn. Mest	70-90 80-85						
387.30 - 387.90	0.60	Kv.rik grå gn.med gr. sterkt oppknust.							
387.90 - 396.10	8.20	musk.gn. I starten en god del biot.+gr. mlk.Ellers også tildels mye gr.Åpne småfolder mlk. Mye rundt	0-80 0						
396.10 - 397.80	1.70	biot.hbl.gn. mlk.rel.lys.Lite biot.gr	80						
397.80 - 398.20	0.40	grå gn.							
398.20 - 400.00	1.80	hbl.gn. lys, fink.	80						
Relogget Januar 1982 A.K.									
Paul Kruse									

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8001

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 13 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
335.00 - 336.10	1.10	grå gn.+hbl.biot.gn. Noe gr.	85						
336.10 - 336.80	0.70	musk.biot.gn. Lys,litt grå gn.-aktig mlk.Noe gr.Noen spredte tynne hbl.biot.gn.-bånd	85-80						
336.80 - 337.60	0.80	hbl.gn. Rel.lys Gr.Massiv,litt litt amf.aktig,men rel. fink.Noen bånd grå gn.	85-75						
337.60 - 340.95	3.35	Grå gn. Gr.	85						
340.95 - 341.50	0.55	amf. Gr. Fin-mlk.	85						
341.50 - 342.30	0.80	biot.hbl.gn.+hbl.gn. Fink. Gr.	85						
342.30 - 343.00	0.70	gr.amf. Store gr.mlk.tett	85						
343.00 - 343.95	0.95	hbl.gn.+biot.hbl.gn. Fink.små gr.(uten py)	85						
343.95 - 346.20	2.25	Gr.amf. Fin-mlk.Rel.store gr.	85						
346.20 - 346.65	0.45	hbl.biot.gn. Fink.gr.-rik.Båndet (hbl.gn.-grå gneis)	85						
346.65 - 352.60	5.95	Grå gn.b.d. Gr.-rik.Fink.Fra 348.95- 349.10:gr.amf.Fra 350.70- 350.80:gr.hbl.biot.gn.	80						
352.60 - 357.20	4.60	gr.amf. Rel.fink.Tett,massiv Middels grønnlig grå-mørk.	80						
357.20 - 357.75	0.55	pegm.							
357.75 - 364.70	6.95	gr.amf. Som før.Delvis finbåndet Senere:	75-85 85						

Lokalitet:

Borehull: 8001

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 12 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
308.75 - 309.65	0.90	hbl.biot.gn. Rel.lys Båndet py-impr. Litt foldet	60						
309.65 - 311.45	1.80	musk.gn. Rel.gl.rik.Noe biot.mlk.	75						
311.45 - 313.05	1.60	biot.hbl.gn. Gr. Båndet. Py-impr.	80-70						
313.05 - 315.85	2.80	biot.gn. En del musk.Gr.Py-impr. Vekslende hbl.innhold. Disthen	75-60						
315.85 - 316.15	0.30	pegm.							
316.15 - 320.00	3.85	hbl.biot.gn. Gr.En del musk.Vekslende hbl.-innhold,Sprede py- impr.Bånd med hbl.gn.og musk.biot.gn.	85-75						
320.00 - 321.70	1.70	hbl.gn. Gr. (uten py.-impr.)	70-80						
321.70 - 324.30	2.60	hbl.biot.gn. Gr.Noe båndet med hbl.gn. +hbl.gn. og hbl.musk.biot.gn. Vekslende py-impr.	75						
324.30 - 330.10	5.80	hbl.gn. Grønnlig grå skarn.Noe gr.Til dels rel.lys. (uten py)	75-80						
330.10 - 333.70	3.60	biot.hbl.gn. Rel.lys, rel.fink lyse +hbl.gn. grønngrå skarn.Vekslende gr.-innhold.(uten py-impr)	75-85						
333.70 - 335.00	1.30	grå gn. Litt gr.litt biot.musk. gn-aktig. mlk.	80						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8001

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 11 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
289.00 - 290.05	1.05	(biot)hbl.gn.	Tildels mye grønnlig skarn.Gr.Lite biot. Sv.py.-impr.	70-80					
290.05 - 290.95	0.90	hbl.biot.gn.	Rel.lys grå gn.-aktig Gr.(Uten py). Fink.	80					
290.95 - 291.20	0.25	hbl.biot.gn.	mlk.gr. Py-impr.	80					
291.20 - 293.80	2.60	amf.	Lokalt noen grønne skarn bånd.Gr. Spredt litt Py.-impr. Ofte rel-kv-rik, massiv	80-70					
293.80 - 297.70	3.90	biot.hbl.gn.	Rel.kv.rik,ofte massiv. Gr.Py-impr.Spredt noen bånd amf.og grønnlig skarn,kv.og py-innhold	80-70					
297.70 - 298.00	0.30	kv.pegm.							
298.00 - 299.30	1.30	biot.hbl.gn.	Massiv,rik på grønnlig skarn.Noen kv.bånd Delvis kv.rik. Vekslede py-impr.Litt amf.	80-70					
299.30 - 304.95	5.65	hbl.biot.gn.	Gr.musk.Py-impr.En del grønnlig gyllen skarn. Delvis noe disthen.Noen bånd mørk amf. Mot slutten noen bånd grå gn.	75-80 65 80					
304.95 - 308.75	2.80	grå gn.	Noe gr.	70					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8001

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 10 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
258.50 - 261.10	2.60	grå gn.b.d.	fink.Spredt litt gr.	80-70					
261.10 - 267.35	6.25	hbl.gn.	Mørk mlk.Tildels rel. mye grønnlig skarn Veks- lende gr.innhold.Noen bånd grå gn.(mellom 265.00-265.10 py-impr. Ditto 265.50-265.55).	70-85					
267.35 - 268.45	1.10	grå gn.b.d.	Gr.						
268.45 - 268.80	0.35	hbl.gn.	Gr.mye skarn	80-70					
268.80 - 278.80	10.00	grå gn.	(vanlig type).Litt gr. Fra 269: elvis litt båndet (biot/ musk/kv.)Biot.hbl.gn.På 275.50-275.70	65-80 80					
278.80 - 281.25	2.45	hbl.gn.	Rel.lys,mlk.Mye grønnlig skarn. Noe biot+gr.	75-85					
281.25 - 281.70	0.45	grå gn.		80-70					
281.70 - 283.50	1.80	hbl.gn.	Som før,men mindre skarn Åpen fold på 282.80	80					
283.50 - 283.90	0.40	amf.	Gr.	80					
283.90 - 287.25	3.35	hbl.biot.gn.	Gr. Tildels musk.Py-impr. Disthen	75					
287.25 - 289.00	1.75	amf.	Gr.(store).Noe bandet (biot.+litt py.)Tilslutt S	75-80 60					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8001

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 9 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
218.80 - 225.85	7.05	grå gn.	65-50						
225.85 - 232.50	6.65	gr.amf. Mørk, massiv, fin-mlk. Fleksurfold på 228.30- 228.50 Båndet overgang til:	65						
232.50 - 234.35	1.85	biot.hbl.gn. Gr Noe båndet(biot.) Py.-impr.	60						
234.35 - 235.85	1.50	gr.amf. Mørk, tett, tildels store gr. Avtagende stil	60 35						
235.85 - 237.05	1.20	biot.gn. Gr.rik, rel.lys, fin-mlk. Økende S til	45 50						
237.05 - 245.80	8.75	amf. Delvis gr.Delvis grønnlig grå skarn+gr.Noie folder (åpent)Pegm.fra 238.95- 239.20. Søkende til: (ved 240m) Deretter åpne småfolder.Vekslende mørk til grønn.Fra 242.5 : S avtagende til	55-65 30 60 35						
245.80 - 246.85	1.05	grå gn. Med striper biot.hbl.gn. (+gr+skarn). Noe foldet.	35						
246.85 - 258.50	11.65	amf. Som før.Vekslende mørk til tydelig grønn.S ofte vanskelig å se.Den mørke massive type rel.fink. Fra 254.5-257m:Deretter avtakende til:Åpne fold- er til slutt.	55 80 60						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8001

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 8 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
193.80 - 194.00	0.20	(biot.)hbl.gn. Mørk, fin - mlk.	50-15						
194.00 - 194.35	0.35	grå gn.+pegm.							
194.35 - 194.60	0.25	(biot.)hbl.gn. som før	55						
194.60 - 197.70	3.10	grå gn.b.d. Noen bånd(biot)hbl.gn. I starten litt foldet (åpent)Sv.po.-impr. fra 196.10-196.70. Noe pegm. innblandet fra 195.70-196.10.	65-80						
197.70 - 200.60	2.90	biot.hbl.gn. Som før.Noen foldete band med grålig grønn skarn i starten. Mot slutten:	80-0 foldet 50						
200.60 - 201.80	1.20	grå gn.+biot.hbl.gn. i avveksling p.g.å. åpen folding							
201.80 - 202.75	0.95	grå gn. Åpne småfolder m/akseplan 80°							
202.75 - 203.10	0.35	biot.hbl.gn. som før,Åpne småfolder							
203.10 - 218.05	14.95	grå gn. Spredt litt gr. Fra 207 m : Fra 210.50 båndet med mm-cm-brede Kv (kv-feltsp)bånd (som kan virke isokl. foldet):	45-60 70-60 60						
218.05 - 218.80	0.75	grå gn.+(gr)hbl.gn. Som før	60						

Lokalitet:

Borehull: 8001

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 7 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
171.10 - 172.75	1.65	hbl.gn. Rel.massiv.Noë gr. Bånd med gyllen sjarn.Litt amfibolittisk.	75						
172.50 - 176.00	3.50	amf. Mørk,litt hbl.gn.-aktig Spredt litt gr.	80-75						
176.00 - 177.40	1.40	hbl.biot.gn. Med bånd biot.gn.gr.	75-90						
177.40 - 179.00	1.60	gr.amf. Mørk,tett	85						
179.00 - 180.10	1.10	hbl.biot.gn. Gr.Rel.lys, litt grå gn.aktig.	85-60						
180.10 - 181.35	1.25	Gr.amf. massiv	80						
181.35 - 182.05	0.70	hbl.biot.gn. Gr.							
182.05 - 183.60	1.55	biot.gn. Gr.-rik,rel.fink og grå gn.-aktig,rel. mørk.	75						
183.60 - 188.70	5.10	gr.amf. I åpen fold på 183.65 ellers: Mørk,tett.Avtakende til. Fra 187.95 med pegn.bånd.	85 70						
188.70 - 189.35	0.65	pegn.							
189.35 - 193.80	4.45	grå gn.b.d. Gr.Noë foldet. Fra 190 m: Fra 192 m enkelte smale band(biot.)hbl.gn. og :	40-65 80 70-50						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8001

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 6 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
144.70 - 146.00	1.30	gr.amf.	Mørk, tett Noe foldet Noen bånd med grønnliggrå skarn	55					
146.00 - 146.15	0.15	Kv.							
146.15 - 147.80	1.65	hbl.biot.gn.	Py-impr. (tildels sterkt) Disthen. Gr. Mlk.	60 (40-70)					
147.80 - 151.40	3.60	hbl.biot.gn.	I starten store gr. Ingen py, mellom grå	75					
151.40 - 152.50	1.10	hbl.biot.gn.	Gr. Py.-impr. Disthen	75					
152.50 - 154.15	1.65	hbl.biot.gn.	Gr.	80					
154.15 - 157.30	3.15	hbl.biot.gn.	Gr. Py.-impr. Disthen	75					
157.30 - 158.40	1.10	Gr.amf.	Åpne folder rundt. Str. med grønnlig grønn skarn	0					
158.40 - 164.35	5.95	hbl.biot.gn.	Gr. Rel. massiv Fra 160.40 : og m. sv. py-impr. Avveksle- nde med gr. biot. (musk) gn.	80 60					
164.35 - 169.00	4.65	gr.amf.	Mørk, tett. Bånd med grønn- nlig grå skarn. Også bånd med biot. gn.	75					
169.00 - 171.10	2.10	hbl.biot.gn. + hbl.gn.	Noe gr. Rel. fink. mellom grå. Rel. massiv	75-80					

Lokalitet:

Borehull: 8001

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 5 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
113.25 - 117.15	3.90	gr.amf.	Noe foldet (åpent)	30-40					
117.15 - 117.40	0.25	Kvarts							
117.40 - 118.00	0.60	gr.amf.	Går fra 118.00 gradvis over i :						
118.00 - 118.75	0.75	hbl.biot.gn.	Gr.Grønnlig grå skarn	30-40					
118.75 - 129.10	10.35	grå gn.	Gr.Fink. rundt. Noe små- foldet(åpent) Fortsatt foldet fra 123m fra 126. 90-129.10 spredt noe hbl? +skarn.	0 0-55					
129.10 - 134.95	5.35	hbl.biot.gn.	Gr.Fink.sv.foldet. Delvis rundt.	35 0					
134.95 - 136.05	1.10	gr.amf.	Mørk, tett, store gr.						
136.05 - 137.85	1.80	hbl.biot.gn.	Gr.Fink.Grønnlig grå skarn Økende til: (fra 136.50) Tilslutt avtakende hbl.	35 50 80					
137.85 - 142.45	4.60	grå gn.	Gr.Fink.Noefoldet fra 140.0-140.5 Så:	80-45 60					
142.45 - 142.70	0.25	pegm.							
142.70 - 144.70	2.00	hbl.biot.gn.	Gr.Fink.Grønnlig-fra karn.Fra 143.0-143.7: så	45 0 45-30					

Lokalitet:

Borehull: 8001

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 4 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
69.70 - 84.00	14.30	grå gn. Fink.Noë småfoldet(åpent) fra 70-73.0m Noë gr. Fra 73.0: Fra 76.6m: rundt med svake åpne folder. Mot slutten mere b.d. og mere gr.	75 ?(0?) 0						
84.00 - 85.50	1.50	grå gn.b.d.	Noen bånd med hbl.						
85.50 - 88.15	2.65	hbl.biot.gn.	Gr. Lokalt grå grønnlig skarn.						
88.15 - 92.60	4.45	grå gn.b.d.	Gr. Åpne småfolder Noë hbl.fra 90.00-90.35						
92.60 - 93.10	0.50	hbl.biot.gn.	Gr. Åpne småfolder Til- dels lite hbl.						
93.10 - 111.20	18.10	grå gn.b.d.	Gr.Rel.fink.Åpne småfol- der. Mye rundt. Noë hbl. + skarn fra 101.05-102.40 Fra 101m Fra 102m 2 tynne striper med hbl. fra 104.60-104.70 Fra 105.50 Fra 107.00 Åpne folder fra 110 rundt	0-70 0 40 rundt 50-65 70 0					
111.20 - 113.25	2.05	hbl.biot.gn.	Gr.Åpne folder rundt Fra 112.50 Noë grågrønnlig skarn	0 50					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8001

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 3 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
41.00 - 41.55	0.55	hbl.gn.	som bånd i gl.gn.	60					
41.55 - 47.45	5.90	musk.biot.gn.	Gr.Åpne småfolder sv.py. (0-) impr.Sterkere py-impr. fra 44.10-47.45, og der også noe distlen.	70					
47.45 - 51.55	4.10	grå gn.	I starten litt musk.biot. gn.-aktig.Åpne folder ellom 50-51 s ofte utyd- elig.	70					
51.55 - 54.30	2.75	musk.biot.gn.	Mlk. noe gr.og disthen Åpne folder mellom 52-53 sv.py.-impr.	70					
54.30 - 59.00	4.70	hbl.biot.gn.	Gr.Py.-impr.Disthen loka- lt Åpne småfolder. (56-57)	65- 80					
59.00 - 60.00	1.00	biot.gn.	Noe gr.sv.py-impr.	75					
60.00 - 63.45	3.45	hbl.biot.gn.	Gr.py-impr.Disthen S av- takende til på 62.5m så tiltakende til på 63.5m fra 65m -66m Åpne folder. Så:	75 0 55 80					
63.45 - 69.45	1.00	grå gn.	Kv.rik til 69.00 Noe gr. Fra 69.00: m.d.	75					
69.45 - 69.70	0.25	Kvart							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 8001

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
22.80 - 24.25	1.45	musk.biot.gn. m.sv.py-impr.Åpne småfol- der, Akseplan ca.80 ⁰	0-65						
24.25 - 26.60	2.35	musk.gn. Noe biot.-mlk.Åpne små- folder rundt kjerneaksen							
26.60 - 27.90	1.30	biot.gn. Noe musk.biot.gn.sv.py- impr.	55						
27.90 - 29.50	1.60	musk.biot.gn. Åpne småfolder spredt litt gr.sv.py.-impr.	0-60						
29.50 - 29.80	0.30	pegm.							
29.80 - 32.35	2.55	grå gn. Noe gr.Åpne småfolder Fin-mlk.Litt musk.biot. gn.-aktig. senere	60						
32.35 - 33.90	0.55	biot.gn. Noe musk.sv.py-impr.En del gr.Åpne småfolder	0-60						
33.90 - 37.85	3.95	musk.biot.gn.-musk.gn.med noe biot.Delvis litt grå gn.-aktig Delvis åpne folder	0-70						
37.85 - 39.00	1.15	musk.biot.gn.-biot.gn.Noe gr.Noe musk. sv. py.-impr.Lokalt åpne fol- der	0-70						
39.00 - 39.95	0.95	musk.biot.gn.- musk.gn.Åpne folder.Noe gr.							
39.95 - 41.00	1.05	biot.gn.-musk.biot.gn.Noe gr.sv.py-impr. Åpne folder.	0-70						

Lokalitet: Mofjellet Skistua

Dato : sept. 1980

Koordinater : ca. 925.474X, ca. 45.270Y

Retning :

Borehull: 8001

Helling/stigning: lodd

Høyde : ca. 230 m.o.h.

Lengde : 400 m

- 1 - (a)

Dybde	L	Bergart	S°	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 13.20	13.20	Grå gn. Litt gr.Fin-mlk. Noe små- foldet (åpent) Foldespeil rundt ca.patallell Kjerneaksen.0 Delvis spisse folder. Akseplan ca.80° på 12.30m 1 cm. <u>malm</u> .							
13.20 - 14.10	0.90	<u>Malm</u> py,sl,ga, i biot.førende musk.gn. Fin-mlk.Småfol- det. Åpne småfolder.	0-40	1,01	0,21	5,73			
14.10 - 16.00	1.90	<u>Spredte malm impr.</u> i biot.musk.gn.Fin-mlk. Litt grå gn.-aktig. Åpne småfolder.	0-50	0,39	0,14	1,50			
16.00 - 18.00	2.00	biot.musk.gn. Fin-mlk.Litt grå gn.- aktig, Åpne småfolder	0-50	0,02	0,05	0,14			
18.00 - 19.30	1.30	<u>malm impr.+str.</u> Ditto	0-50	0,34	0,31	2,33			
19.30 - 19.55	0.25	musk.biot.gn							
19.55 - 19.80	0.25	pegm.		0,05	0,12	0,27			
19.80 - 20.00	0.20	biot.musk.gn. Sv.py-impr. Lokalt litt sl. Spredt litt gr.	60-70						
20.00 - 20.60	0.60	<u>spredte malm impr.</u> I biot.musk.gn.	60-70	0,31	0,25	2,47			
20.60 - 21.00	0.40	musk.gn. Noe biot.		0,06	0,06	0,75			
21.00 - 22.80	1.80	<u>malm impr.</u> I biot.musk.gn.Noe små- foldet. (åpent)	40-60	0,58	0,15	1,80			

Lokalitet: KJEMPHEIA

Dato : okt. 1978
 Koordinater : ca.925.400X, ca. 49.200Y
 Retning : syd
 Helling/stigning: 65°
 Høyde : ca. 185 m.o.h.
 Lengde : 96 m

Borehull: 7811

- 1 -

Dybde	L	Bergart	S°	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.40	1.40	Jord							
1.40 - 3.40	7.00	Grå gn.	Vekslende gl.-innhold og mengde. Spredt litt gr. Lokalt litt foldet.	75-60°					
8.40 - 8.70	0.30	Pefm.							
8.70 - 9.50	1.80	Grå gn.	Som før. Litt etterhvert litt hbl.	65-70					
9.50 - 20.00	10.50	hbl.biot.gn.	Gr.mlk.varierer fra gr. (musk)biot.gn.til gr. biot.gn.til gr.biot.hbl. gn.til gr.hbl.gn.mest gr. rik. Svart biot.	50-75 mest ca.70					
20.00 - 20.20	0.20	pefm.							
20.20 - 29.05	8.85	Biot.gn.	Gr.mlk.Delvis noe musk. Delvis noe hbl.(22.60-23.20, 23.75-24.65,og mot slutten.)	65-80					
29.05 - 30.80	1.75	grå gn.	Spredt litt gr.	70					
30.80 - 33.95	3.15	grå gn.	Med biot.rikere og hbl. biot.førende bånd. Spredt noe gr.Mot slutten musk. rik.	70-80					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7811

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
33.95 - 36.25	2.30	hbl.biot.gn. Noe gr.Båndet (uten hbl. +lite biot.til hbl.-rik)	80						
36.25 - 36.75	1.50	Grå gn.	80						
36.75 - 40.00	3.25	hbl.biot.gn. Gr.Py-impr.Fin-mlk.Vari- erende hbl.innhold.Noen bånd grå gn.	75-70						
40.00 - 40.45	0.45	Grå gn.m.d.							
40.45 - 42.50	2.05	musk.biot.gn.	70-75						
42.50 - 45.50	3.00	biot.gn. Gr.Svart biot.Fin-mlk. Laminert og noe båndet. Lokalt noe hbl.	75-70						
45.50 - 46.80	1.30	Grå gn.m.p. Spredt litt gr.Noen bånd biot.musk.gn.	65						
46.80 - 48.00	1.20	Grå gn.og musk.biot.gn.i avveksling Spredt litt gr.	70 (55-75)						
48.00 - 50.60	2.60	Biot.gn. Som før. Noe musk.Spredt litt gr. Mørkegrå.	75						
50.60 - 51.00	0.40	musk.gn. Fin-mlk. litt biot.grå gn.aktig. Rel.musk.rik.	75						
51.00 - 51.30	0.30	biot.gn.	75						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7811

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 3 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
51.30 - 55.00	3.70	hbl.gn. Vekslende gr.innhold Åpen fold på 52.25. Noe biot. i starten. Fink. Grønnliggrå fold på 53.0- 53.4 så: Åpne småfolder på 54.8- 55.0. Mot slutten mere biot.	70-65 80-60						
55.00 - 56.50	1.50	biot.gn. Som før.	70						
56.50 - 57.60	1.10	grå gn. Spredt litt gr.	65						
57.60 - 58.75	1.15	biot.musk.gn. Grå gn. akteg, men gl. rik- ere. Små og større gr.	75						
58.75 - 60.00	1.25	biot.gn. Som før.	75-70						
60.00 - 62.25	2.25	musk.gn. Vekslende biot. og gr.- innhold. mlk.	70 (65-80)						
62.25 - 63.95	1.70	biot.gn. Som før	70-60						
63.95 - 64.75	0.80	musk.gn. Litt grå gn.-aktig men musk. rikere. Litt biot.	55-60						

Lokalitet:

Borehull: 7811

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :


Lengde :

- 4 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
64.75 - 86.30	21.55	gr.amf. Delvis litt gr.hbl.gn.- aktig. Spisse småfolder på 65.5. Fink. Mørke grønnlig-grå. Tett. Fra 67.0-67.4: åpne små- folder, deretter: Noe båndet. Fra 71.2-71.6: åpne små- folder. Deretter: Spisse småfolder fra 80.0-80.6. og 82.4-82.9.	75-60 65-75 80-70						
86.30 - 87.00	0.70	grå gn	80						
87.00 - 89.60	2.60	gr.hbl.gn.+gr.amf.+grå gn. i avveksling Foldet på 88.8	75-65						
89.60 - 96.00	6.40	gr.amf. Som før. Fra 93.2-93.5 åpne små- folder. Deretter:	65-75 70-80						

jan. 1982

A. Kruse



Boret meter	Bergart	Kjerne- mangel	Skitrighet	Bergart prøve
90.70	Grå gneiss med granat 1 mm.			
93.40	Biotit-gneiss med varierende granat- innhold og størrelse fra 1-10 mm.		80	
94.10	Grå gneiss, lagdelt.		80	
100.00	Grå gneiss med granat 1-2 mm.		90	

Kjerneobservasjoner.

Borhull nr. 7810 Profil
 Koordinator: Y 925.430 X 48.150
 Påsatt i høyde 137. m.
 i retning 08
 med helning 80°
 Borhullets lengde 100.00 m

Boret meter	Bergart	Kjerne- mangel	Skiffrighet	Bergart prove
0- 2.00	Overdekke			
3.20	Mørk amfibolitt med granat. 1-2 mm.		60	
9.80	Mørk amfibolitt med noe karbonat.		70	
12.30	Mørk amfibolitt med granat 1-2 mm.		Foldet	
13.20	Toglimmer-gneiss dominans av biot., noe granat.		90	
18.20	Toglimmer-gneiss, granatholdig (lite).		Foldet	
22.10	Toglimmer-gneiss, med granat 1-2 mm.		Foldet	
24.40	Toglimmer-gneiss, med granat 4-5 mm.		Foldet	
24.60	Toglimmer-gneiss, med granat 1-2 mm.		(Steavis	
28.00	Toglimmer-gneiss, med granat 3-5 mm.		(foldet	
28.90	Toglimmer-gneiss, med granat 1-2 mm.			
30.20	Toglimmer-gneiss, granatholdig (lite).			
30.80	Toglimmer-gneiss, mest musk. granat 1-2 mm.		45	
32.50	Toglimmer-gneiss, mest biotit, granat 2-4 mm.			
34.60	Grå gneiss med granat 2-5 mm.		56	
35.60	Grå gneiss med granat 1-2 mm.		90	
38.20	Grå gneiss med granat 1 mm.		50-80	
40.20	Grå gneiss i veksling med toglimmer-gneiss med granat 2-5 mm.		Foldet	
42.30	Grå gneiss med granat 1-2 mm.			
42.60	Biotit-gneiss med granat 2-5 mm.			
44.90	Grå gneiss med granat 1-5 mm.			
50.10	Biotit-gneiss, småfoldet, med granat 3-5 mm.			
51.10	Biotit-gneiss, vekslende granatinhold.		65	
51.70	Grå gneiss med noe granat.			
54.40	Biotit-gneiss med granat 3-5 mm.			
58.10	Veksling biotit-gneiss og grå gneiss.			
79.30	Biotit-gneiss, noe lys, med granat 1-4 mm.		80	
	Virker meget massiv og tett i 71.00-79.30 m.			
79.80	Biotit-gneiss med avtakende granatinhold.			
81.30	Veksling mellom biotit-gneiss med granat og grå gneiss med granat.			
83.90	Biotit-gneiss med granat 2-5 mm.			
86.00	Biotit-gneiss med granat 1-3 mm.			
87.60	Grå gneiss med PY.			
	86.40-86.55 PY-skikt 90° med borretning.			

Boret meter	Bergart	Kjerne- mangel	Skårighet	Bergart prove
125.80-128.50	Maf.biot.gn.m.gr., stedvis m. litt grå gneiss preg.			
129.00	Maf.biot.gn.? med små granataggregat. Noe foliert.			
130.20			24	
132.60			27	
133.10	To glimmergneiss.			
136.60	Som 123.01-124.30 m			
137.50	Grå gneiss, musk.gneiss.		31	
139.00	Som 117.98-123.01 m			
142.70			13	
144.00	Maf.biot.gneiss.			
144.50			23	
145.00	Som 117.98-123.01 m			
145.40	To glimmer gneiss med små granatagg.			
147.20	Amfibolitt, mørk.		33	
150.00	Maf.gneiss, noe lysere nærmest gråfarget		12	

Lokalitet: Mofjellet

Dato : 3./10. 1978

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7809

Helling/stigning: 53 syd

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
115.80 - 115.87	0.07	Skarn i do.							
115.87 - 116.42	0.55	Maf.biot.gn., som 108.24 - 115.80 m	25						
116.42 - 117.98	1.56	Grå gn. b.d., mørk m.spredt gr., lidt skarn.	13						
117.98 - 123.01	5.03	Grå gn. b.d., mafisk præget m.mere maf.indslag, fink., rig på ærtestore gr.	35 40,22						
123.01 - 124.30	1.29	Maf.biot.gn., spredt gr., lidt skarn	29						
124.30 - 125.80	1.50	Grå gn. b.d., ret mørk, fink.m.spredt gr., nederst m.maf.bånd, lidt skarn	26 25						
125.80 - (126.30)	(0.50)	Maf.biot.gn. m.gr., stedvis m.lidt grå gn. præg.	18						
Sidste del af kernen blev logget under meget dårlige vejr- og lysforhold. Da denne del tillige har lille kontrast mellem bjergarterne, skal beskrivelsen fra ca.100 m og nedefter betragtes som foreløbig. Da kernerne var våde under logningen, kan evt. spor af ZnS være overset, eller forvekslet med staurolit (D-type gnejserne, 55.72 - 78.39 m, og de pyrit disseminerede muskovitgnejser derunder). Boringen var endnu ikke afsluttet ved 126.30 m.									
København den 12./10. 1978 <i>Hagen Marker</i> Hagen Marker									

Lokalitet: Mafjellet

Dato : 3./10. 1978

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7809

Helling/stigning: 53 syd

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
98.50 - 100.00	1.50	Grå gn. b.d., gr. rig m. 2-4 mm store gr., ret mørk (lidt mafisk præg).	28 20						
100.00 - 101.30	1.30	Maf. biot. gn. m. gr. og skarn, stedvis m. grå gn. præg.	fold.?						
101.30 - 101.44	0.14	Grå gn. b.d.	16						
101.44 - 102.00	0.56	Maf. biot. gn. m. skarn, grå gn. præg.							
102.00 - 102.27	0.27	Grå gn. b.p., spredt gr.	39						
102.27 - 103.00	0.73	Grå gn. b.d., delvis maf., rig på ærtest. gr.	36						
103.00 - 103.11	0.11	Mu. gn., fink., py. diss.	17						
103.11 - 103.40	0.29	Grå gn. b.p., m. 1 mm store gr.							
103.40 - 104.10	0.70	Grå gn. b.d., delvis maf., rig på ærtest. gr.	22						
104.10 - 104.22	0.12	Maf. biot. gn.							
104.22 - 104.49	0.27	Grå gn. b.p., ret mørk m. ep. skarn	27						
104.49 - 104.65	0.16	Maf. biot. gn., m. skarn, sv. py. diss.							
104.65 - 104.86	0.21	Mu. gn., fink., py. diss.	22						
104.86 - 105.53	0.67	Grå gn. b.p., små gr.	18						
105.53 - 105.58	0.05	Massiv py.							
105.58 - 105.64	0.06	Grå gn. b.p.							
105.64 - 106.17	0.53	Grå gn. alm. type, fink., gl. rig, mu. gn. præg, py. diss.	30						
106.17 - 107.31	1.14	Grå gn. b.p., ret maf., rig på ærtest. gr.	17						
107.31 - 107.92	0.61	Mu. gn., fink., gl. rig, m. grå gn. præg, py. diss.	7						
107.92 - 108.24	0.32	Grå gn. b.p., inhom. og ret maf., rig på gr.							
108.24 - 115.80	7.56	Maf. biot. gn. m. spredt gr., grå gn. præg, stedvis grå gn. b.p. lign. (som ovenfor), gullig ep. skarn.	28 14, 16 25, 25						

Lokalitet: Mofjellet

Dato : 3./10. 1978

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7809

Helling/stigning: 53 syd

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
87.76 - 88.50	0.74	Grå gn. alm.type,ret inhom.m.maf.indslag,py.diss.	åbent fold.						
88.50 - 90.97	2.47	Grå gn.(b.d.?) m.talrige maf.indslag,gr.,skarnrig m.skarn i bånd,sv.py.diss.	åbent fold.						
90.97 - 91.40	0.43	Maf.biot.gn.,spredt gr.,grå gn.præg.	23						
91.40 - 91.54	0.14	Grå gn. b.p.,sv.py.diss.	24						
91.54 - 91.90	0.36	Maf.biot.gn./amf.,grå gn.præg,spredt gr.,rig på skarn i striber.	51						
91.90 - 92.04	0.14	Grå gn. b.d., gr.rig.							
92.04 - 92.62	0.58	Maf.biot.gn./amf.,grå gn.præg,spredt gr.,rig på skarn i striber.	52						
92.62 - 93.29	0.67	Grå gn. b.d.,meget inhom.,delvis mafisk,spredt py.diss.	43						
93.29 - 93.49	0.20	Meget skarnrig grå gn.							
93.49 - 93.72	0.23	Kvarts							
93.72 - 94.45	0.73	Grå gn.,inhom.m.flere maf.indslag,delvis ret mafisk,sv.py.diss.	37						
94.45 - 94.80	0.35	Maf.biot.gn. m.2 mm store gr.,delvis ret lys m.grå gn.præg.	fold.						
94.80 - 96.03	1.23	Mu.gn.,fin-mlk.,gl.rig,få gr.,py.diss.(of-te rigt)	16						
96.03 - 97.15	1.12	Grå gn. b.d.,meget gr.rig m.ærtestore gr.,skarn,stedvis lidt hbl.	fold.?						
97.15 - 97.48	0.33	Mu.gn., som 94.80 - 96.03 m.							
97.48 - 97.87	0.39	Grå gn. b.d.,meget gr.rig m.ærtestore gr.,skarn,stedvis lidt hbl.							
97.87 - 98.50	0.63	Mu.gn.,som 94.80 - 96.03 m.	20						

Lokalitet: Mofjellet

Dato : 3./10. 1978

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7809

Helling/stigning: 53 syd

Højde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
78.39 - 80.91	2.52	Grå gn. b.d., rig på 1 mm store gr., hom., meget mafisk (amf.præg), stedvis anelse hbl., fink.	fold. 29						
80.91 - 80.98	0.07	Kvarts m.skarn							
80.98 - 81.58	1.60	Som 78.39 - 80.91 m, lidt py.nederst.	13						
81.58 - 82.19	0.61	Mu.gn., fin-mlk., gl.rig, mest u.gr., py.diss., øverst 4 cm m skarn	15						
82.19 - 83.28	1.09	Grå gn. b.d., mørk, inhom.m.skarn, hele stykket er med glideflader (små vinkler m. kerneaksen), stedvis py.diss.							
83.28 - 83.53	0.25	Grå gn. alm.type/mu.gn., rig på små gr., py.diss.	fold.						
83.53 - 83.71	0.18	Maf.biot.gn., rig på gr., sv.py.diss.	26						
83.71 - 83.82	0.11	Mu.gn.fink., py.diss.							
83.82 - 84.14	0.32	Kvarts-gennemvævet grå gn.(?) m.skarn, py.diss.							
84.14 - 84.46	0.32	Grå gn. alm.type.	fold.						
84.46 - 84.73	0.27	Kvarts, pletter af py.i randen.							
84.73 - 85.10	0.37	Grå gn.(?), Kvarts-åre gennemvævet m.skarn.							
85.10 - 85.26	0.16	Grå gn. b.d., m.gr., mafisk, py.diss.							
85.26 - 85.52	0.26	Kvarts-gennemvævet grå gn(?) m.hbl. og pletter af py.							
85.52 - 85.87	0.35	Maf.biot.gn., m.skarn i kvarts	36						
85.87 - 86.99	1.12	Grå gn. alm.type, lys m.få gr., lidt skarn, py.diss.	25 fold.?						
86.99 - 87.76	0.77	Maf.biot.gn., rig på 1-3 mm store gr., enkelte skarnbånd. (indfoldet ?)	fold.						

Lokalitet: Mofjellet

Dato : 3./10. 1978

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7809

Helling/stigning: 53 syd

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
59.45 - 60.46	1.01	Biot./mu.gn.,mlk.,gl.rig m.br.biot., py.diss.,D-type gn.	fold. 9,11						
60.46 - 61.81	1.35	Mu./biot.gn.,grov-mlk.til grovk.,gl.rig m. br.biot.,spredt gr.(mindre end 1 mm store) py.diss.(delvis rigt),D-type gn.	12 13						
61.81 - 67.56	5.75	Biot.gn. m.uordn.mu.,mlk.til grovk.,spred- te mindre end 1 mm store gr.,spredt staur. kyanit,py.diss.(delvis rigt),py.i tern., br.biot.,D-type gn.	13, fold. 14,21, 12,20, fold.						
67.56 - 68.91	1.35	Biot.gn.,grovk.,få gr.,br.biot.,kyanit- rig(optil 5 mm lange prismer),spredt (del- vis rig på) staur.,py.diss.,D-type gn.	19						
68.91 - 69.95	1.04	Biot.gn./hbl.gn.,lys,rig på små gr.,br. biot.,py.diss.,D-type gn.	fold.						
69.95 - 72.20	2.25	Biot.gn.,mlk. til fin-mlk.,rig på mindre end 1 mm store gr.,stedvis lidt hbl.,br. biot.,py.diss.,D-type gn.	21 7						
72.20 - 72.43	0.23	Pegm.							
72.43 - 73.49	1.06	Som 69.95 - 72.20 m	15						
73.49 - 74.73	1.24	Hbl.gn.,m.uordn.lag af biot.gn.,rig på 1- 2 mm store gr.,py.diss.,D-type gn.	10, spidst fold.						
74.73 - 77.64	2.91	Biot.gn.,mlk.,br.biot.,ret rig på 1 mm store gr.,py.diss.,D-type gn.	12, spidst fold.						
77.64 - 77.89	0.25	Biot.gn. m.uordn.mu.,ret lys,fin-mlk.,br. biot.,py.diss.,D-type gn.	26						
77.89 - 78.39	0.50	Biot.gn.,mlk.,br.biot.,ret rig på 1 mm store gr.,py.diss.,D-type gn.	27						

Lokalitet: Mofjellet

Dato : 1./10. 1978

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7809

Helling/stigning: 53 syd

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
33.14 - 36.90	3.76	Maf.biot.gn./amf.,fink.m.spredte gr., skarn førende,stedvis anelse py.	38,38, fold.						
36.90 - 37.78	0.88	Hbl.gn. m.amf.præg,spættet,stedvis kvartsrig m.skarn,anelse py.diss.							
37.78 - 37.88	0.10	Maf.biot.gn.							
37.88 - 37.99	0.11	Pegm.							
37.99 - 39.00	1.01	Maf.biot.gn.,ret massiv,få gr.	fold. 28						
39.00 - 40.25	1.25	Maf.biot.gn./amf.,anelse hbl.gn.præget, spredt gr.,anelse skarn,sv.py.diss.	35 46						
40.25 - 41.95	1.70	Hbl.gn.,fink.,ret lys,spredt gr.,især nederst grå gn.præget,py.diss.	47						
41.95 - 45.20	3.25	Amf./maf.biot.gn.,spredt gr.,anelse skarn, nederst lidt grå gn.præget.	32,29, 30						
45.20 - 45.33	0.13	Pegm.							
45.33 - 50.50	5.17	Maf.biot.gn./amf.,spredt gr.,et par steder m.skarn, noget grå gn.præget nederst m.en anelse py. et par steder	fold. fold. 31						
50.50 - 50.81	0.31	Grå gn. b.d.	(indfoldet)						
50.81 - 51.27	0.46	Maf.biot.gn. m.små gr.,anelse py.	39						
51.27 - 52.21	0.94	Biot.gn.,fink.,grå gn.præg,sv.py.diss.							
52.21 - 54.15	1.94	Maf.biot.gn.,grå gn.præg,små gr.,lidt skarn,anelse py.diss.	31						
54.15 - 55.72	1.57	Grå gn. b.d.,biot.gn.præg,skarn,sv.py.diss.	fold.? 40						
55.72 - 55.93	0.21	Biot.gn.,fink.,grå gn.præg,sv.py.diss.							
55.93 - 59.45	3.52	Biot.gn.,ret mafisk øverst,fink.,små gr.,br.biot.,lidt skarn,sv.py.diss.	20, fold. 16						

Lokalitet: Mofjellet

Dato : 1./10. 1978

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7809

Helling/stigning: 53 syd

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
23.13 - 23.53	0.40	Maf.biot.gn., spredt gr.	fold.						
23.53 - 24.00	0.47	Grå gn.(b.p.), maf.præg.	fold.						
24.00 - 24.23	0.23	Maf.biot.gn., lidt spredt gr.	fold.						
24.23 - 24.31	0.08	Pegm.							
24.31 - 24.76	0.45	Maf.biot.gn., lidt spredt gr.	fold.						
24.76 - 25.19	0.43	Grå gn. alm.type/b.p., mere maf.nedadtil, spor af py.	fold.						
25.19 - 25.82	0.63	Maf.biot.gn., lidt gr., lidt ep.skarn, spor af py.	49						
25.82 - 26.00	0.18	Grå gn. b.p., inhom., ret mafisk præget.	fold.						
26.00 - 27.85	1.85	Maf.biot.gn., ret massiv, små gr., stedvis m. skarn, sv.py.diss., nederst lidt præg af grå gn.	fold. 36 fold.						
27.85 - 28.95	1.10	Grå gn. alm.type/b.p., meget inhomogen, ret maf.m.flere maf.indslag, stedvis m.skarn, sv.py.diss.	fold.						
28.95 - 29.32	0.37	Maf.biot.gn., små gr.	fold.						
29.32 - 30.27	0.95	Grå gn. alm.type/b.p., meget inhom., ret maf.m.flere maf.indslag, stedvis anelse py.	fold.						
30.27 - 30.86	0.59	Grå gn. alm.type.	fold.						
30.86 - 31.07	0.21	Maf.biot.gn., delvis m.grå gn.præg,+mu.	fold. 43						
31.07 - 32.38	1.31	Grå gn. alm.type/b.p., få gr., maf.præget m. åbent et par u.ordn.maf.indslag, stedvis lidt py.	åbent fold.						
32,38 - 32.73	0.35	Maf.biot.gn., delvis m.grå gn.præg,+mu.	57 fold						
32.73 - 33.14	0.41	Grå gn. b.p./alm.type.	35						

Lokalitet: Mafjället

Dato : 1./10 1978

Koordinater : 66°57'50"N 18°11'57"E

Retning :

Borehull: 7809

Helling/stigning: 53 syd

Høyde : ca 179 m

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.05	2.05	Jordboring							
2.05 - 3.80	1.75	Amf./maf.biot.gn., ret massiv, ret rig på gr.							
3.80 - 4.01	0.21	Amf., massiv, u.gr.							
4.01 - 4.15	0.14	Biot.gn., fin-mlk., py.diss.							
4.15 - 7.60	3.45	Amf., sort fink., ret massiv, få gr.	fold.? flade h?						
7.60 - 8.71	1.11	Amf.m.anelse biot., massiv, spredte gr.	fold. flade h.						
8.71 - 12.82	4.11	Amf., sort fink., ret massiv, få gr., lidt u. ordn.biot., stedvis lidt gullig ep.skarn.	fold., 48, åbent foldet, 45						
12.82 - 13.43	0.61	Grå gn. alm.type.	fold., stejle h.						
13.43 - 14.53	1.10	Amf.m.u.ordn.biot., sort fink., få gr., lidt skarn.	fold., stejle h.						
14.53 - 15.56	1.03	Maf.biot.gn.m.gr., +hbl., lidt skarn.	fold., 20.						
15.56 - 16.35	0.79	Grå gn. b.p., stedvis lidt ep., stedvis sv.py.diss.	42 23						
16.35 - 17.93	1.58	Maf.biot.gn., +hbl., få gr., lidt ep.skarn, undertiden lidt præg af grå gn., stedvis sv.py.diss.	fold. 27						
17.93 - 20.00	2.07	Grå gn.(b.p.), ret mafisk præget, ofte lidt inhom.m.tynde mere maf.lag., få gr., spredt skarn, anelse py.diss.	fold., 25						
20.00 - 22.10	2.10	Grå gn. b.p., få gr., stedvis lidt mørk.	kraftigt foldet, 45.						
22.10 - 23.13	1.03	Grå gn.(b.p.), delvis ret maf.præget, noget inhom.m.mere maf.lag, få gr., lidt skarn, stedvis anelse py.	kraftigt foldet						

Lokalitet: Mofjellet

Borehull: 7808

Dato : 25./9. 1978


Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: 70 syd

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
180.29-183.70	3.41	Amf. fink.ret massiv, rig på 1-3 mm store gr.	10, fold.? flade h. 30,26						
183.70-185.00	1.30	Grå gn.b.p. m.et par tynde maf. lag, sidste ca.20 cm ret mørk.	25,22						
185.00-185.51	0.51	Amf. fink. få gr.(1 mm store).	15.						
Boring afsluttet ved 185.51 m									
Mo i Rana 25.sept.1978									
 Mogens Marker									

Lokalitet: Mofjellet

Borehull: 7808

Dato : 25./9. 1978

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: 70 syd

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
159.69-160.37	0.68	Grå gn.b.d. fink.lidt mørk, meget rig på mindre end 1 mm store gr.	20						
160.37-163.13	2.76	Gr.amf. fink.sort, rig på gr. stedvis en anelse biot.	24,11 fold.åbent 15 fold.spidst?						
163.13-163.26	0.13	5 cm bred zone m.kvarts + feldsp. m.amfibol. Bevægelseszone?							
163.26-166.02	2.76	Gr.amf. sort, 1-3 mm store gr.	25,18 17,19						
166.02-166.11	0.09	Fink.skarn båndet m. amf.							
166.11-168.02	1.91	Gr.amf.m. 1-3 mm store gr. lidt u.ordn.biot.nedetter, et par tyn- de skarnbånd.	11,5						
168.02-168.27	0.25	- do.- m.skarn i kvarts	fold						
168.27-170.03	1.76	Gr.amf.m.u.ordn.biot. et par tyn- de skarnbånd, anelse py.et par steder.	12,18 13						
170.03-171.35	1.32	Grå gn.b.d. rig på 1-2 mm store gr. flere tynde maf.bånd.	fold.						
171.35-176.42	5.07	Amf. fink.m. 1 mm store gr. ret båndet, mere massiv nedetter, øverst lidt u.ordn.biot.	26, fold. 18,37 fold.52 fold.åbent 13,11,						
176.42-177.81	1.39	Grå gn.b.d. lys, rig på gr.	14,11						
177.81-180.17	2.36	Amf. fink.sort m. 1-3 mm store gr. lidt u.ordn.biot.nedetter.	13						
180.17-180.29	0.12	Grå gn.b.d. m.gr.	10						

Lokalitet: Mofjellet

Dato : 22./9. 1978

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7808

Helling/stigning: 70 syd

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
141.64-143.05	1.41	Amf. m.u.ordn.biot. lidt spredt gr.	12,13						
143.05-143.13	0.08	Pegm.							
143.13-148.42	5.29	Amf. øverst m.lidt u.ordn.biot. rig på 1 mm store gr.(især nederst)	15,20 23 30,24						
148.42-148.62	0.20	Grå gn.b.d. m.gr.	40						
148.62-148.89	0.27	Maf.biot.gn. m.gr.							
148.89-149.07	0.18	Kvarts m.gr.og pletter af hbl. glideflade?							
149.07-149.22	0.15	Amf. meget mørk m.gr.							
149.22-149.79	0.57	Kvarts, ren.							
149.79-155.58	5.69	Amf. mørk, rig på 1-4 mm store gr. et par steder lidt skarn.	22,40 37,24 32,41						
155.58-155.86	0.28	Grå gn.b.d. fink.lidt mørk, rig på mindre end 1 mm store gr.	19						
155.86-157.43	1.57	Amf. rig på 1-4 mm store gr. fink. sort.	27,27 fold.						
157.43-157.74	0.31	Grå gn.b.d. fink.lidt mørk, rig på mindre end 1 mm store gr.	11						
157.74-157.93	0.19	Amf. fink. få gr.	17						
157.93-158.03	0.10	Pegm.							
158.03-159.39	1.36	Amf. fink.sort, rig på 1-2 mm gr.	15,15						
159.39-159.63	0.24	Grå gn.b.d. fink.lidt mørk, meget rig på mindre end 1 mm store gr.	18						
159.63-159.69	0.06	Amf. mørk. Glideflade?							

Lokalitet: Mofjellet

Dato : 22./9. 1978

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7808

Helling/stigning: 70 syd

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
119.25-123.20	3.95	Maf.biot.gn. +hbl. spredte 1 mm store gr.	10,13 13						
123.20-123.52	0.32	Amf.m.u.ordn.biot. enkelte ærte-store gr.	24						
123.52-123.66	0.14	Grå gn.b.p.							
123.66-123.72	0.06	Maf.biot.gn.							
123.72-125.65	1.93	Mu.gn. fink.massiv, lidt keratophyrisk præg.	15,37 fold.?						
125.65-126.45	0.80	Grå gn. alm.type/b.p. få gr.	13						
126.45-127.00	0.55	Maf.biot.gn. m.et par tynde lag grå gn.	12						
127.00-127.09	0.09	Grå gn.							
127.09-129.10	2.01	Maf.biot.gn./amf. spredte 1 mm store gr.	19,16						
129.10-129.57	0.47	Grå gn.b.p. flere tynde maf.lag	20						
129.57-134.08	4.51	Amf. fink. få gr.	17,14,26						
134.08-134.42	0.34	- do.- m.skarn							
134.42-139.86	5.44	Amf./maf.biot.gn. +hbl., få gr. nedefter lidt hbl.gn.-agtig m.br. biot.	15,20 fold. 25,16 15,25						
139.86-140.22	0.36	Grå gn.b.d. meget lys, rig på 1 mm store gr.	27						
140.22-141.46	1.24	Amf. m.u.ordn.biot. delvis rig på 1-3 mm store gr.	16,21						
141.46-141.64	0.18	Grå gn. alm.type, rig på 1 mm store gr.	27						

Lokalitet: Mofjellet

Dato : 15/9-1978

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: 70 syd

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7808

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
94.45-95.80	1.35	Maf.biot.gn + hbl. gr.rig, stedvis sv.py.diss.	fold? 10-15						
95.80-99.20	3.40	Grå gn. lidt mørk(biot.gn.præg) ret rig på 1 mm store gr. sv.py. diss.	5-10 fold. 15-30						
99.20-99.60	0.40	Maf.biot.gn. gr.rig							
99.60-99.75	0.15	som 95.80-99.20							
99.75-100.00	0.25	Maf.biot.gn. gr.rig	15						
100.00-100.55	0.55	som 95.80-99.20	10-15						
100.55-100.70	0.15	Maf.biot.gn.							
100.70-101.00	0.30	som 95.80-99.20	fold.						
101.00-104.50	3.50	Amf/maf.biot.gn. m.gr. skarn	fold. 10-45						
104.50-105.10	0.60	Mu.gn. m.u.ordn.biot. grovk. (D-type) rigt py.diss. et par tynde lag af maf.biot.gn.	10 fold.						
105.10-109.75	4.65	Amf. fink. sort, spredt gr.	11,10,20						
109.75-110.20	0.45	Grå gn. b.p.	15						
110.20-113.80	3.60	Maf.biot.gn. forhv.lys, +hbl. spredt gr. stedvis lidt py.	15,10,15						
113.80-116.61	2.81	Grå gn. b.p./d. flere maf.lag, ret inhomogen	10-15 10						
116.61-116.80	0.19	Maf.biot.gn.	7						
116.80-118.48	2.68	Grå gn.b.p. m.enkelte tynde maf. lag.	6						
118.48-118.99	0.51	Maf.biot.gn. få gr.	8						
118.99-119.25	0.26	Grå gn.b.d. lidt mørk.							

Lokalitet: Mofjellet

Dato : 15/9-1978

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7808

Helling/stigning: 70 syd

Højde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
77.22-77.60	0.38	rig py.diss. Mu.gn.som ovenstående m.lag af maf.biot.gn.	15-20						
77.60-80.05	2.45	Mu.gn. mlk. til grov-mlk. nederst en del br.biot. rig py.diss.	10-15						
80.05-81.10	1.05	Hbl.gn. fink. m.en del br.biot. grå gn.lign. py.diss.	10-15						
81.10-83.00	1.90	Maf.biot.gn. m.hbl. gr. stedvis anelse py.diss.							
83.00-85.30	2.30	Gr.amf. m.u.ordn.biot.	10-15						
85.30-85.70	0.40	Grå gn. alm.type py.diss.	15						
85.70-87.00	1.30	Maf.biot.gn. gr. br.biot. stedvis sv.py.diss.							
87.00-87.35	0.35	Biot.gn. fin-mlk. til fink. rel. mørk br.biot. sv.py.diss. lidt pyrrhotit i kvarts ved 87.25	20-30						
87.35-89.65	2.30	- do. - m.maf. lag og skarn, biot.gn.m.py.diss.	fold. 30						
89.65-90.65	1.00	Maf.biot.gn. stedvis biot.gn.agtig, sv.py.diss.							
90.65-90.80	0.15	Grå gn.	45						
90.80-93.95	3.15	Grå gn. b.d. præg af maf.biot.gn. rig på små gr. sv.py.diss.(stedvis kraftigere)	fold. 20-45						
93.95-94.45	0.50	Grå gn. ret mørk, py.diss.(ikke kraftig)							

Lokalitet: Mofjellet

Dato : 15/9-1978

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7808

Helling/stigning: 70 syd

Højde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
44.97-45.02	0.05	Pegm.							
45.02-50.00	4.98	Maf.biot.gn. lidt hbl. forhv.gr. rig, stedvis tynde striber m. skarn enkelte steder sv.py.diss.	21 fold. 45						
50.00-52.95	2.95	Maf.biot.gn. m.hbl. stedvis næsten amf. lidt gr.	28 36						
52.95-53.08	0.13	Maf.biot.gn. sv.py.diss.	44						
53.08-53.65	0.47	Grå gn. b.p. sv.py.diss.							
53.65-54.21	0.56	Amf. biot.rig, gr.fattig	36						
54.21-54.62	0.41	Grå gn. b.p. sv.py.diss.(indfold.?)	19						
54.62-56.46	1.82	Maf.biot.gn./amf. mest fink.massiv rel.få og små gr.	fold.?						
56.46-60.50	4.04	Maf.biot.gn. delv. rig på gr.	mest 30						
60.50-65.30	4.80	Biot.gn. ret mørk, fin-mlk. færre gr. br.biot. lidt hbl. sv.py.diss. der tiltager nedeft	fold. ca.20?						
65.30-68.40	3.10	Gr.amf. m.u.ordn.biot.							
68.40-71.15	2.75	Biot.gn. fin-mlk. ret mørk, br. biot. stedvis lidt hbl. Py.diss.(delv.ret sv.)	15-20						
71.15-72.85	1.70	Hbl.gn. lidt br.biot. sv.py.diss.	15						
72.85-73.60	0.75	Grå gn., gl.rig, mu.rig, sv.py.di.	15 fold.						
73.60-75.05	1.45	Mu.gn. grov-mlk. gl.rig rig py.di.	15-20						
75.05-75.50	0.45	- do. - m.lag af maf.biot.gn.	15-20						
75.50-77.22	1.72	Mu.gn. grov-mlk. til grovk. gl.rig							

Lokalitet: Mofjellet

Dato : 15./9. 1978

Borehull: 7808

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: 70 syd

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
21.80-21.98	0.18	Grå gn.alm.type, gl.rig, mørk, m.ret sv.py.diss.	15 fold?						
21.98-22.18	0.20	Maf.biot.gn. lidt grå gn.lign.							
22.18-22.36	0.18	Grå gn.alm.type, gl.rig, mørk, ret mafisk, rel.sv.py.diss.	22						
22.36-23.85	1.49	Amf.m.u.ordn.biot. spredt gr.	fold.						
23.85-23.93	0.08	Skarn i kvarts.							
23.93-29.22	5.29	Amf. m.u.ordn.biot. delvis massiv, fink.m.spredt gr.	18,18 fold.35.						
29.22-29.43	0.21	Grå gn. alm.type, mlk.ret mørk, py.diss.	fold.						
29.43-33.60	4.17	Amf. m.en del biot. gr.rig, ret massiv.	18, foldet, 33,41.						
33.60-35.37	1.77	Maf.biot.gn. gr.rig m. samme struktur som ovenfor, lidt spredt py. +hbl. præg af grå gn.	24						
35.37-35.55	0.18	Grå gn. b.d. ret mørk.	28						
35.55-39.95	4.40	Maf.biot.gn. som ovenfor, nederst lidt grå gn.lign. ret massiv, +hbl. anelse skarn, spredt py.diss. (delvis svag).	36 45						
39.95-40.18	0.23	Grå gn. b.d. ret mørk, lidt spredt py.							
40.18-40.24	0.06	Pegm.							
40.24-44.97	4.73	Grå gn. b.d. ret mafisk (+hbl.), gr.rig. nedadtil endnu mere mafisk og maf.biot.gn.lign. men med samme struktur, amf.lign.nederst. spredt py.diss.	28,28 33, i det mindste foldet ned- adtil.						

Lokalitet: Mofjellet

Dato : 15./9. 1978

Koordinater : ca 925.450 X, 48.115 Y

Retning : syd

Helling/stigning: -70 syd

Høyde : ca 179 m

Lengde :

Borehull: 7808

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00- 1.74	1.74	Jordboring							
1.74- 4.75	3.01	Gr.amf. sort fink.m.lidt biot.	20						
4.75- 6.68	1.93	- do.-, delv.ret biot.rig. en del gullig ep.skarn, massiv.							
6.68-10.00	3.32	Amf. sort, massiv, gr.fattig. stedvis spor af py.	fold. (27)						
10.00-11.16	1.16	- do.-, stedvis lidt biot.	16, fold.						
11.16-11.37	0.21	Grå gn. mørk, biot.gn.præg.	15						
11.37-11.80	0.43	Gr.amf. u.ordn.biot.	fold.						
11.80-12.18	0.38	Grå gn. lys, fink. massiv, få gr.	12						
12.18-12.68	0.50	Gr.amf. u.ordn.biot.	fold.						
12.68-12.82	0.14	Grå gn. b.p. (som lag)							
12.82-13.49	0.67	Gr.amf. en del biot. (stedvis spor af py.).	fold.						
13.49-13.69	0.20	Grå.gn. b.p.	25						
13.69-15.64	1.95	Amf. gr.fattig, var.biot.indh. stedvis anelse ep.skarn, en anelse py.et par steder.	20 fold.						
15.64-15.70	0.06	Kvarts m.skarn.							
15.70-18.31	2.61	Amf. ret biot.rig, små gr. stedvis lidt spredt py.	29 fold.						
18.31-18.44	0.13	Grå gn. mørk	fold.						
18.44-20.88	2.44	Amf. ret biot.rig, lidt gr. anelse ep.skarn, stedvis sv.py.diss.	fold.						
20.88-20.92	0.04	Grå gn. b.p. mørk.							
20.92-21.80	0.88	Maf.biot.gn. m.hbl. stedvis sv.py.	fold. 13						

Lokalitet:

Dato : 8/9. 1978

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7807

Helling/stigning: 48 syd

Foreløbig beskrivelse

Højde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00-10.00	10.00	grå gn. Ned.halvdel ret mørk m. lidt gullig ep.skarn.	fold.						
10.00-11.00	1.00	grå gn.	fold.						
11.00-12.80	1.80	grå gn. mu.rig.	45						
12.80-15.20	2.40	grå gn. mu.rig. Py.diss.(delt.rig)							
15.20-20.00	4.80	amf./maf.biot.gn. Ret massiv m.gr.	fold.?						
20.00-23.00	2.00	amf. stedvis lidt lys, gr.	fold.						
23.00-24.00	1.00	mu.gn. grå gn.lign. Py.diss.	30						
24.00-25.00	1.00	mu.gn. delv.ret grovk. delv.mere grå.gn.lign. Rigt py.diss.(D.type)	20? fold.?						
25.00-30.00	5.00	amf. gr. var.biot.indh. skarn. spor af py.	fold.						
30.00-32.00	2.00	hbl.gn./amf. rel.lys m.skarn	fold.stejle h.						
32.00-40.00	8.00	amf. gr. lidt skarn.	ca.45. fold.?						
40.00-42.60	2.60	amf. gr. lidt skarn, var.biot.indh.	30-40 fold.?						
42.60-42.90	0.30	mu.gn. py.diss.							
42.90-46.80	3.90	amf. gr. lidt skarn. var.biot.indh.	ca.45						
46.80-48.10	1.30	maf.biot.gn. grå gn.lign. lidt hbl.	40-45						
48.10-50.40	2.30	amf./maf.biot.gn. gr.	45						
50.40-50.50	0.10	mu.gn. Py.diss.	45						
50.50-57.70	7.20	amf./maf.biot.gn. gr.	fold. 45 alm.						
57.70-57.95	0.25	grå gn. mørk							
57.95-69.40	11.45	amf./maf.biot.gn.	45 alm. stedvis foldet						
Boring afsluttet ved 69.40 m.									

Mo i Rana 8.sept.1978


Mogens Marker

Lokalitet: Fageråsen

Borehull: 7806

Dato : 1978

Koordinater : ca 925.191 X, ca 40.844 Y

Retning :

Helling/stigning: 1000

Høyde : ca 79 m.o.h.

Lengde : 113,70 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	Jord							
0.50 - 1.40	0.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.-fink. kv.rik svak impr. Py	65°						
1.40 - 4.55	3.15	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl. og gr. (1-3 mm) førende, vekslende m/1-3 dm brede band 2 gl. gn. alm. Svak impr. Py	50° 60°						
4.55 - 8.30	3.75	" " Rel.mørk,mlk. hbl. og gr. (0,5-2 mm) førende Svak impr. Py.	40° 70°						
8.30 - 9.10	0.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-grovk. tildels b.d. Spr. diffuse gr.1-5mm svak impr. Py	70°						
9.10 - 11.70	2.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende, tildels hbl.gn. og gr.rik 1-3 mm. impr. Py	70°						
11.70 - 13.25	1.55	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-grovk. veksl. m/cm-dm-brede bld.hbl.gn. band. spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py.	70°						
13.25 - 22.70	9.35	Hbl.gn. Mørk,mlk.spr.gr. tildels rik 1-3 mm. Svak-impr. Py	70°						
22.70 - 23.00	0.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spr. gr.1-4mm							
23.00 - 29.40	6.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. Hbl.- førende tildels hbl.gn., Spr. gr. tildels rik 1-3 mm. Impr. Py.	70°						
29.40 - 30.60	1.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.spr. hbl. Spr. gr.1-3mm, impr. py	70°						

Lokalitet:

Borehull: 7806

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
30.60 - 30.80	0.20	Pegm.							
30.80 - 35.20	4.40	Hbl.gn. Mørk, mlk. vekslende m/rel. små parti 2 gl.gn.hbl. førende, Spr. gr. 1-3 mm tildels rik, svak impr. Py	70 ^o 80 ^o						
35.20 - 38.70	3.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk-grovk. veksl. m/ cm-dm-brede band hbl. gn. biot(sk) og pegm. Impr. Py, Po.	70 ^o 80 ^o						
38.70 - 67.90	29.20	2 gl.gn.alm. Rel. lys, mlk. vekslende m/ cm-dm. brede band 2 gl.gn. b.d. m/tildels spor hbl. Spr. gr. 0,5-5 mm. fortr. i 2 gl.gn.b.d. Svak impr. Py	60 ^o 80 ^o						
67.90 - 80.00	12.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. tildels hbl. førende. spr. gr. 1-3mm Svak impr. Py.	70 ^o 80 ^o						
80.00 - 82.40	2.40	Hbl.gn. Mørk, mlk. spr. gr. 1-5 mm	80 ^o						
82.40 - 89.60	7.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. hbl. førende veksl. m/dm brede pegm. band. spr. gr. 1-3 mm Impr. Py	70 ^o 80 ^o						
89.60 - 89.85	0.25	Musk.gn. Lys, mlk. svak impr. Py							
89.85 - 91.10	1.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. tildels hbl. førende, spr. gr. 0,5-2 mm Impr. Py	80 ^o						

Lokalitet:

Borehull: 7806

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
91.10 - 95.10	4.00	Hbl.gn. Mørk, mlk. spr. gr. 1-3 mm Svak impr. Py	80°						
95.10 - 99.80	4.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. hbl.førende vekslende m/cm-dm-brede band hbl.gn. spr. gr. tildels rik 1-3 mm. Svak impr. Py.	70°						
99.80 - 100.60	0.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk-fink. veksł. m/cm-brede band 2 gl.gn.bd m/hbl. spr. gr. 0.5-2 mm.							
100.60 - 110.10	9.50	Hbl.gn. Mørk, mlk-fink. gr.førende 0,5-2 mm.	70° 80°						
110.10 - 111.80	1.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk. veksłende m/ cm-dm-brede band 2 gl.gn. b.d. Spr. gr. 0,5-2 mm.	70° 80°						
111.80 - 112.40	0.60	Hbl.gn. Mørk, mlk. veksłende m/cm- dm-brede band 2 gl.gn.alm og pegm. spr.gr. 1-3 mm	70° 80°						
112.40 - 113.20	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. hbl.førende, spr. gr. 1-3 mm. impr. Py							
113.20 - 113.70	0.50	Hbl.gn. Mørk, mlk. gr.førende 1-3mm							

21.5. 1980

H. Pantdalali

Lokalitet: Fageråsen

Borehull: 7805

Dato : 1978

Koordinater : ca 925.250X, ca 40.820Y

Retning : S

Helling/stigning: 55°

Høyde : ca 41 m.o.h.

Lengde : 83,25 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe % Ag	
0.00 - 9.35	9.35	Jord							
9.35 - 30.10	20.75	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.vekslende m/ cm-dm-brede biot.d. og pegm.band. Band som er biot.d. fører fortrinnsvis spr. gr. 0,5-2 mm. Svak impr. Py.	50° 60°	0.02 0.05 0.01	0.01 0.03 0.01	0.03 0.08 0.01		1.3 0.3 0.5	25,00-27,00 27,00-28,50 28,50-39,10
30.10 - 31.80	1.70	" " Rel.lys,mlk. impr. Py m/ svake spor Sl.	55°	0.09	0.18	0.22		4.5	
31.80 - 32.60	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. impr. Sl,Cu, Py,Po		0.80	0.32	2.86		18,7	
32.60 - 33.90	1.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk. spr. gr.0,5- 2 mm. tildels m/cm-dm- brede Py,Po,førende band.	55°	0.05	0.07	0.09		1.5	
33.90 - 34.90	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 0,5-2mm. tildels m/impr. Py,Po.	55°	0.02	0.03	0.05		1.8	
34.90 - 44.15	9.75	" " Rel.mørk,mlk. hbl.førende, Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	55°	0.02	0.03	0.05		2,1	34,90-37,00
44.15 - 44.75	0.60	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. tildels rik 1-3 mm.		0.01	0.02	0.04		0.9	
44.75 - 45.10	0.35	Biot.gn.(sk) Mørk,grovk-mlk. hbl.førende impr. Sl,Cp,Py,Po		0.44	0.27	2.70		11.9	
45.10 - 45.20	0.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.spor gr. svak impr. Py		0.35	0.02	0.72		3.8	

Lokalitet:

Borehull: 7805

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
45.20 - 45.90	0.70	Hbl.gn. Mørk, mlk, veksl. m/2 gl.gn.bd. spr.gr. tildels rik 1-3 mm.	60°	0.02	0.03	0.12		1.8	
45.90 - 47.10	1.20	Biot.-hbl.gn. Mørk, mlk-grovk. veksl. spr gr. 1-3 mm i hbl.gn. Tildels dm.brede musk.d. band. biot.gn. tildels som sk(råttason) Ondulerende. Impr. Sl, Cp, Py, Po fortr.vis i biot.rike parti.		0.23	0.15	0.79		6.9	
47.10 - 47.30	0.20	Pegm.		0.02	0.03	0.10		1.7	
47.30 - 54.30	7.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. tildels hbl. førende (hbl.gn.) spr. gr. 1-3 mm. impr. Py Fra 48.20-48.30 spor Sl.		0.09	0.06	0.19		3.1	47.30-49.30
54.30 - 54.70	0.40	Hbl.gn. Mørk, mlk. spr. gr. 1-3mm.							
54.70 - 56.60	1.90	Biot.hbl.gn. Mørk, mlk-grovk. gr. rik 1-3 mm. Impr. Py							
56.60 - 58.10	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. spor hbl. Spr. gr. 0,5-2 mm. Impr. Py	55°						
58.10 - 58.50	0.40	Musk.gn. Lys, mlk. svak impr. Py							
58.50 - 58.90	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. veksl. m/cm-dm-brede musk.gn.brede band, hbl. og gr i 2 gl. gn.b.d. Impr. Py.	55°						
58.90 - 61.65	2.75	2 gl.gn.alm. Rel. lys, mlk. Spr.gr. 0,5-2 mm	55° 50°						
61.65 - 61.80	0.15	Hbl.gn. Mørk, mlk. spr. gr. 1-5 mm.							

Lokalitet:

Borehull: 7805

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
61.80 - 62.10	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr.gr. 0,5-2 mm.	50°						
62.10 - 62.70	0.60	Hbl.gn. Mørk,mlk.spr.gr. 1-3 mm							
62.70 - 63.10	0.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-brede hbl.gn.band. Spr. gr. 0,5-3 mm.							
63.10 - 72.10	9.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/spr. dm-brede pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm.	45°						
72.10 - 74.10	2.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/hbl.førende parti, Svak impr. Py. Spr. gr. 1-3 mm.	50°						
74.10 - 74.40	0.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spr. gr. 0,4- 2 mm. Stichtolitisk.							
74.40 - 80.50	6.10	Hbl.gn. Mørk,mlk. veksl. m/spr. dm-brede pegm.band. Gr.førende 1-3 mm.	50°						
80.50 - 81.70	1.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ biot.d. striper og band. Spr. gr. 1-3 mm.							
81.70 - 83.00	1.30	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-5 mm	50°						
83.00 - 83.25	0.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl., spr. gr. 0,5-1 mm. Impr. Py							

27/2 1980
Holger Pantdalsli

Lokalitet: Fageråsen

Borehull: 7804

Dato : - 78

Koordinater : Y: 40.828 X: 925.250

Retning : Lodd

Helling/stigning:

Høyde : ca 42 m.o.h.

Lengde : 75,0 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 16.65	16.65	Jord							
16.65 - 23.70	7.05	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede biot.d. band. spor gr. impr. Py	40° 60°	0.07 0.06 0.07	0.04 0.02 0.06	0.30 0.22 0.36	2.9 2.5 2.8		16.65-18.70 18.70-20.70 20.70-22.70
23.70 - 24.60	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. impr. Sl,Cp, Gn,Py,Po.		1.20	0.31	1.82	35.6		
24.60 - 26.90	2.30	" Rel.mørk,mlk. spor hbl. og gr. knuse-sone fra 26.00-26.20 ved 25.40 spor Sl. Impr. Py	60° 70°	0.09	0.15	0.22	6.0		
26.90 - 28.55	1.65	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 0,5-3mm Svak impr. Py	60°	0.01	0.02	0.02	0.7		
28.55 - 30.50	1.95	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl-førende. spr. gr. 0,5-2 mm impr. Py.	70°	0.01	0.03	0.04	0.6		
30.50 - 30.65	0.15	Pegm.							
30.65 - 33.70	3.05	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/enkelte små striper og band hbl.gn. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	70°						
33.70 - 34.40	0.70	Biot.gn.(sk.) mørk,grovk. tildels m/spr. gr. 1-3 mm, impr.Py,Po	70°						
34.70 - 42.00	7.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/små striper og bånd hbl. gn. og pegm. spr. gr.1-3mm impr. Py.	70°						
42.00 - 43.50	1.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-5 mm.	70°						
43.50 - 45.50	2.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/enkelte små pegm.band. Spr.gr. 0,5-2 mm.	70°						

Lokalitet:

Borehull: 7804

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
45.50 - 45.75	0,25	Hbl.gn. Mørk,mlk.spr. gr. 1-3 mm.							
45.75 - 46.50	0.75	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ små parti hbl.gn. fortrinns- vis m/gr. 1-3 mm.							
46.50 - 46.75	0.25	Pegm.							
46.75 - 47.30	0.55	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende spor gr. impr. py	70°						
47.30 - 50.20	2.90	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-3mm	50,60°						
50.20 - 51.35	1.15	Pegm.							
51.35 - 52.40	1.05	Hbl.gn. Mørk,mlk.spr.gr. 1-3 mm.							
52.40 - 53.20	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl.- førende, spr. gr. 0,5-2mm	60°						
53.20 - 54.30	1.10	Pegm.							
54.30 - 54.70	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl, Spr. gr. 0,5 - 2 mm							
54.70 - 61.30	6.60	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/cm-dm- brede 2 gl.gn.b.d. band. Spr. gr. 1-3 mm.	60°						
61.30 - 61.65	0.35	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr.gr. 0,5-2mm							
61.65 - 69.50	7.85	Hbl.gn. Mørk,mlk. veksl. m/cm-dm- brede 2 gl.gn.b.d. band. Spr. gr. tildels rik 0,5-3 mm	60° 70°						
69.50 - 69.80	0.30	2 gl.gn.aln. Rel.lys,mlk-fink. spr.gr. 0,5-1 mm.							
69.80 - 75.00	5.20	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. tildels rik 1-3 mm.	60° 70°						

Lokalitet: FAGERÅSEN MOFJELL GRUBEFELT

Dato : juni/juli 1978

Koordinater :

Retning : syd

Helling/stigning: - 65°

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7803 profil

side 1

Dybde	L	Bergart	S ^g	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 1,60	1,60	overdekning							
1,60 - 3,10	1,50	biot. gn. D.	mlk-gravk. Med gr. lill hbl. Py-impr.	60,50 75,65					
3,10 - 4,20	1,10	hbl biot. gn. D	Med gr. Py-impr.	70,50					
4,20 - 4,75	0,55	biot. gn. D	D-rik. Med hbl.	50,70					
4,75 - 7,05	2,30	hbl biot. gn.	Delvis amf. Med gr. og D. sv. py-impr. Folde ombygning 60-0-80 på 5,4-5,8 m. Bånds, 8 m	70,60 80,90 65,35, 80					
7,05 - 8,25	1,20	amf.	med gr. Næsmåfollet	85,60 80					
8,25 - 9,20	0,95	hbl biot. gn.	D, gr. Næsmåfollet Py-impr	80,40					
9,20 - 10,50	1,30	amf.	Gr. Næbiot. Steilt follet	40,0, 65,70					
10,50 - 13,10	2,60	hbl biot. gn.	D, gr. Delvis D-rik. Py-impr. Båndet berg- art (værl. hbl. innh.) Biot. gn. rikst på D.	65,55 50,70,					

Lokalitet: Fageråsen

Borehull: 7803

Dato : - 78
 Koordinater : ca Y: 41.058 X: 925.268
 Retning : S
 Helling/stigning: - 65°
 Høyde : ca 60 m.o.h.
 Lengde : 104.10 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	Jord							
1.50 - 3.00	1.50	Biot.gn. Mørk, grovk.-mlk, spor hbl. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	50°						
3.00 - 4.70	1.70	Biot.-hbl.gn. Mørk, grovk.-mlk, spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	50°						
4.70 - 21.70	17.00	Hbl.gn. Mørk, mlk. vekslende m/ cm-dm brede biot.gn.band. enkelte små pegm.band. Spr. gr. tildels rik 0.5 - 3 mm impr. Py	40° 60°						
21.70 - 23.75	2.05	2 gl.gn.b.d. Rel. mørk, mlk. hbl.førende vekslende m/cm-dm-brede pegm.band. spr. gr. 0,5 - 2 mm. impr. Py	60°						
23.75 - 24.00	0.25	TAP							
24.00 - 24.70	0.70	2 gl.gn.b.d. rel.lys, mlk. vekslende m/and musk gn. spor gr. impr. Py	50°						
24.70 - 27.20	2.50	Musk gn. lys, mlk. vekslende m/små parti 2 gl.gn.b.d. fortrinnsvis m/hbl. og spr. gr. 0,5-2 mm. Impr. Py	50°						
27.20 - 27.35	0.15	Biot.sk. Mørk, grovk. impr. Py							
27.35 - 29.60	2.25	Musk gn. lys, mlk-grovk. vekslende m/rel. små b.d. parti. ved 27.50 5 cm kompakt Py band. Impr. Py	60°						

Lokalitet:

Borehull: 7803

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29.60 - 30.90	1.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. spor gr. impr. Py.	55°					
30.90 - 31.70	0.80	Biot.gn.	Mørk, mlk-grovk, gr.førende 1-3 mm. Impr. Py	55°					
31.70 - 32.80	1.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. svakt ondulerende, spor gr. Impr. Py.	50°					
32.80 - 33.60	0.80	Musk.gn.	Lys,mlk-grovk. impr. Py.	50°					
33.60 - 34.40	0.80	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. impr. Py	50°					
34.40 - 36.80	2.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. spr. dm.brede pegm.band. impr. Py.	50°					
36.80 - 36.95	0.15	Musk.gn.	Lys, mlk, med spor <u>Gn,Sl</u> , Py	50°					
36.95 - 37.20	0.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. impr. <u>Sl</u> , <u>Gn, Py</u> .	50°					
37.20 - 37.75	0.55	Musk.gn.	Lys,mlk. vekslende med b.d. striper og band, spor gr., svak impr. Py	80°					
37.75 - 38.00	0.25	Pegm.	god impr. Py						
38.00 - 38.70	0.70	Musk.gn.	Lys,mlk. vekslende med dm-brede band 2 gl.gn.b.d. Spor gr. impr. Py	60° 70°					
38.70 - 42.00	3.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. enkelte spr. gr. 1-3 mm.	60°					
42.00 - 44.70	2.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-4 mm.	60°					

Lokalitet:

Borehull: 7803

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% Fe	% Fe	
44.70 - 45.10	0.40	Hbl.gn. Mørk, grovk. spor gr.							
45.10 - 62.20	17.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende med cm-dm-brede band 2 gl.gn.b.d. Spr. gr. 1-3 mm.	60°						
62.20 - 64.60	2.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. Spr. gr. 0,5-2mm	60°						
64.60 - 65.20	0.60	Biot.gn. Mørk, grovk-mlk. spor gr.							
65.20 - 66.10	0.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spr. gr. 0,5-2 mm	50°						
66.10 - 67.20	1.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende med parti 2 gl.gn.alm. spr. gr. 1-3 mm.	60°						
67.20 - 71.00	3.80	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spr. gr. 0,5-2 mm.	60°						
71.00 - 71.40	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. vekslende m/ små parti kv. og biot.rike band. spor gr.		0.05	0.06	0.21	2.3		
71.40 - 71.70	0.30	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. spor hbl. gr. Impr. Py, Po	60°	0.01	0.02	0.06	0.9		
71.70 - 71.95	0.25	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spor gr.		0.01	0.01	0.04	0.1		
71.95 - 75.75	3.80	Biot.gn(sk). Mørk, grovk. vekslende m/spr. pegm.band, hbl.førende tild. rik. God impr. Py, Po, spor Cp	60°	0.01	0.11	0.06	0.8		11.95-15.00
75.75 - 77.15	1.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk, spr. gr. 0,5-3mm		0.01	0.16	0.08	2.1		15.00-75.75
77.15 - 78.15	1.00	" Rel.mørk,mlk. tildels hbl.- førende, spr. gr. 0,5-3 mm impr. Py	60°	0.02	0.05	0.05	1.5		
78.15 - 79.05	0.90	" Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/biot.rike hbl.førende parti, god impr. Sl, Cp, Py	50° 60°	1.81	0.33	5.40	32.8		

Lokalitet:

Borehull: 7803

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

4.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	g/g Py	% Fe	
79.05 - 80.00	0.95	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 0,5-3 mm. impr. Py	50°	0.15	0.05	0.05	3.5		
80.00 - 80.75	0.75	Hbl.gn. Mørk,mlk. veksl. m/stiper og band pegm. tildels gr. rik 1-3 mm. Svak impr. Py	50°	0.01	0.02	0.02	1.3		
80.75 - 80.90	0.15	Pegm.		0.02	0.02	0.01	1.6		
80.90 - 82.50	1.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. Spr. gr. 1-3 mm. impr. Py	50° 60°	0.00	0.04	0.03	2.8		
82.50 - 82.70	0.20	Pegm.		0.10	0.06	0.01	3.0		
82.70 - 83.10	0.40	Musk.gn. Lys,mlk. vekslende m/dm- brede biot.rike band, for- trinnsvis m/impr. Sl,Cp,Py	60°	0.63	0.23	2.83	12.8		
83.10 - 83.35	0.25	Pegm. Spor Gn		0.24	0.06	0.62	5.2		
83.35 - 84.00	0.65	Musk.gn. Lys,mlk.-grovk. veksl. m/ biot.rike perti, svak impr. Sl,Gn,Cp,Py	60°	0.20	0.12	0.61	5.7		
84.00 - 84.50	0.50	Pegm. Spor Gn.		0.21	0.04	0.21	6.5		
84.50 - 84.65	0.15	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. god impr. Sl,Gn,Cp,Py		1.15	0.10	8.56	28.4		
84.65 - 86.40	1.75	" Rel.mørk,mlk. tildels hbl. førende. spr. gr. 1-3 mm. impr. Py. Fra 85.80-85.90 impr. Sl	60°	0.14	0.07	0.72	5.3		
86.40 - 87.20	0.80	Biot.hbl.gn. Mørk,grovk.ondulerende, spor gr., impr. Sl,Gn,Cp,Py		0.46	0.08	2.07	14.2		
87.20 - 92.00	4.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl- førende, veksl. m/cm-dm- brede band pegm. Spr.gr. 1-3 mm. Impr. Py	60°	2.03	0.03	0.10	12.7		87.20-92.00
				0.00	0.03	0.20	0.5		87.00-92.00

Lokalitet:

Borehull: 7803

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

5.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	g/g Ag	% Fe	
92.00 - 93.15	1.15	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. tildels hbl og skarnførende, veksl. m/biot.sk. og pegm.band. svak impr. og striper <u>Sl</u> , <u>Gn,Cp,Py</u>	50° 60°	0.28	0.06	1.36	3.8		
93.15 - 94.40	1.25	" Rel.mørk,mlk. vekslende m/ små pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>	50°	0.00	0.03	0.06	0.6		
94.40 - 94.70	0.30	Hbl.gn. mørk,mlk. gr.førende 1-3mm		0.00	0.02	0.05	0.0		
94.70 - 102.95	8.25	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk. hbl.førende, veksl m 1-3 dm brede hbl.gn.band spr. gr. 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>	60°	0.00	0.02	0.01	0.0		94.70-96.70
				0.00	0.02	0.02	0.0		96.70-98.70
				0.00	0.02	0.02	0.2		98.70-100.70
				0.00	0.02	0.01	0.0		100.70-102.70
102.95 - 103.65	0.70	Pegm.							
103.65 - 103.75	0.10	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm.							
103.75 - 103.85	0.10	Musk.gn. Lys,mlk-grovk.							
103.85 - 104.00	0.15	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.	60°						
104.00 - 104.10	0.10	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk. spr. gr. 0,5-2 mm							

21/2 1980

H. Pantdalsli

Lokalitet: *Fageråsen*

Dato : 1978

Koordinater : X 925.268, Y 41.058 ca

Retning :

Helling/stigning: lodret

Høyde : ca +60 m.o.h.

Lengde : 82,00 m

Borehull: 7802

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser				Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% Fe	
0.00 - 2.20	2.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.tildels hbl. førende, spr. gr. 0,5-2mm impr. Py	70° 80°					
2.20 - 4.90	2.70	Hbl.gn. Mørk,mlk,vekslende m/cm-dm- brede 2 gl.gn.b.d. band Spr. gr. 0,5-2 mm. Impr.Py	75°					
4.90 - 11.70	6.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.vekslende m/ cm-dm-brede hbl.gn.band Spr. gr. 0,5-2 mm. Impr.Py	75°					
11.70 - 14.00	2.30	Hbl.gn. Mørk,mlk.stichtolitisk, gr.rik 1-5 mm. Sbak impr. Py.	30° 70°					
14.00 - 15.30	1.30	Hbl.gn. Mørk,mlk.veksl.m/2 gl.gn. b.d. Spr. gr. 0,5-2 mm. Impr. Py	70° 80°					
15.30 - 16.00	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl., Spr. gr. 0,5-2 mm. Impr.Py	60°					
16.00 - 19.95	3.95	" " Rel.mørk,mlk. veksl. m/cm- dm-brede lyse musk. d.band Spr. gr. 0,5-2 mm. Ved 19.50 spor Sl,Gn, Impr. Py	70°					
19.95 - 20.30	0.35	Pegm.						
20.30 - 22.10	1.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. veksl. m/ 1-3 dm-brede biot.gn.band. tildels m/hbl.,impr. Py,Po fortrinnsvis i biot.gn. spor gr.	70°					
22.10 - 24.40	2.30	" " Lys,mlk. impr. Py	75°	0.04	0.10	0.28	2.6	
				0.12	0.09	0.26	2.9	

Lokalitet:

Borehull: 7802

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	9/2 Ag	% Fe	
24.40 - 27.90	3.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/1-3 dm brede biot.d. band, fortrinnsvis m/impr. Sl,Cp,Gn,Py, tildels spor Po.	75°	0.40	0.24	1.00	11.6		
27.90 - 28.50	0.60	Musk.gn. Lys,mlk. god impr. Py	70°	0.07	0.04	0.18	3.6		
28.50 - 43.25	14.75	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.vekslende m/spr. dm.brede biot.d. band, fortrinnsvis m/enkelte gr. 0,5-3 mm. Svak impr.Py	60°	0.04	0.03	0.13	1.6		28.50-30.50
43.25 - 43.80	0.55	TAP							
43.80 - 61.50	17.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. vekslende m/spr. dm-brede biot.d.band. fortrinnsvis m/enkelte gr. 0,5 - 3 mm. Svak impr. Py	60°						
61.50 - 63.30	1.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.-grovk. veksl. m/biot. gn. (sk). band m/spor hbl. Fra 62.20 - 62.30 spor Sl. Impr. Py	60°	0.15	0.18	0.64	5.3		
63.30 - 64.50	1.20	Biot.gn.(sk) Mørk,grovk-mlk. spor hbl. impr. Sl,Cp,Py,Po	60°	0.36	0.32	1.03	12.7		
64.50 - 70.30	5.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende spr. gr. 0,5-3 mm impr. Py	60°	0.03	0.02	0.10	1.9		64.50-65.50
70.30 - 70.70	0.40	Pegm.							
70.70 - 77.50	6.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende vekslende m/cm-dm-brede hbl. og pegm.band, spr. gr. 0,5-3 mm. Impr. Py.	60°						

Lokalitet:

Borehull: 7802

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
77.50 - 78.10	0.60	Hbl.gn. Mørk,mlk.-grovk. spr. gr. 1-5 mm.	60°						
78.10 - 79.10	1.00	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spor gr. rel. massiv.							
79.10 - 81.50	2.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. veksl. m/cm-dm-brede 2 gl.gn.alm. Hbl.gn. og pegm.band, Spr. gr. 1-5 mm.							
81.50 - 82.00	0.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.rik 1-10 mm.							
26/2 1980 H. Pantdalsli									

Lokalitet: Fageråsen

Borehull: 7801

Dato : 1978
Koordinater : ca 925.339 X, ca 41.043 Y
Retning :
Helling/stigning: 1000
Høyde : ca 37 m.o.h.
Lengde : 10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
hullet ble stoppet etter over 10 m jord									

Lokalitet: Fageråsen

Borehull: 7710

Dato : Nov. 72.
 Koordinator : X: 925.273 Y: 41.252
 Retning : -90°
 Helling/stigning: -90°
 Høyde : ca 85m
 Lengde : 113,20m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	Overdekket.							
1.50 - 2.30	0.80	Musk.gn. Lys,mlk. sv.impr. Py.							
2.30 - 7.70	5.40	2 gl.gn.b.p. Noe mørk,mlk. Rel.hom. Enkelte kv.str., rik på gr. 1-3 mm. Spor amf. rel. jevnt impr. Py.		0.30	0.21	0.09		5.88	7.00-7.70
7.70 - 7.80	0.10	Pegm. Kv.rik med god impr. Gn,Cp, Py.		1.06	0.37	0.03		5.40	
7.80 - 9.60	1.80	2 gl.gn.b.p. Noe mørk,mlk. noe kv. partier med stichtolitisk preg. rik på diffus gr. 1-4 mm. hom. spor amf. sv. impr. Py.		0.25	0.20	0.03		5.63	7.80-8.80
9.60 - 9.87	0.27	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk.kv.rik. Rik på små gr. 1-3 mm. Spor amf. sv. impr. Gn,Py.		1.42	0.14	0.06		4.57	
9.87 - 13.95	4.08	2 gl.gn.b.p. Mørk,mlk-grov,mlk. Småte soner med hbl.gn. Hbl. rel. jevnt ford. små kv. rand med spor Gn, Py rik på gr. 1-4 mm.		0.04	0.04	0.03		6.20	9.87-11.00
13.95 - 14.60	0.65	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk. Stichtolitisk. Svak spor Py.							
14.60 - 18.70	4.10	hbl.gn. Mlk-grov mlk. Noe vekslende med 2 gl.gn.b.d. Rik på gr. 1-3 mm. I øvrigt spredte spor gr. sv. spor Py.							
18.70 - 22.50	3.80	2 gl.gn.alm. Noe mørk,mlk. med biot. rike partier, spor hbl. noe gr.	70						
22.50 - 22.70	0.20	Pegm.							
22.70 - 27.00	4.30	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. Musk-rike partier og biot. d. partier rik på gr. i I øvrigt spor gr. sv. spor Py.	70 80						

Alitet:

Borehull: 7710

Dato :
Koordinator :
Retning :
Helling/stigning :
Høyde :
Lengde :

side 2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
27.00 - 50.60	23.60	hbl.gn. Mørk,mlk.til grovmlk. Noe veksling med biot.gn. med hbl. og rel. rik på gr.1-3 mm.No. kv.band svak impr. <u>Py</u> spor <u>cl</u>	70 80						
50.60 - 53.90	3.20	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk-grovmlk. band grov musk. Smale pegn.str.rel rik på små diffuse gr. spr. hbl.	80						
53.90 - 54.20	0.30	Pegn. Med smale musk.band.							
54.20 - 54.60	0.40	2 gl.gn.alm. lys,mlk. spor <u>cl</u>	85						
54.60 - 55.00	0.40	Pegn. grov med musk.band.							
55.00 - 56.65	1.65	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.svak impr. <u>py</u> 56.65 stripe med spor <u>sl.gn</u>	85						
56.65 - 58.00	1.35	2 gl.gn.b.d. Noe mørk mlk.-grov mlk. Musk.rikere partier rik på små gr. 1-3 mm.	85						
58.00 - 59.90	1.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. svak impr. <u>py</u>	85						
59.90 - 61.90	2.00	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.pegm.str. spor hbl. rel. massiv.							
61.90 - 63.30	1.40	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.biot.rike striper Svak impr. <u>sl. gn. py.</u>	50 80	0.09	0.20	0.40		5.31	
63.30 - 63.50	0.20	Pegn. rel. grov, spor <u>Py.</u>		0.01	0.05	0.10		1.48	
63.50 - 63.65	0.15	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.spor små gr. 1-2 mm svak impr. <u>sl. cp. py.</u>		0.47	0.59	0.16		7.08	
63.65 - 65.45	1.80	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk. str. musk. rel. jevnt små gr. 1-2 mm Svak impr. <u>py. po.</u> spor hbl.	50 80	0.07	0.13	0.21		6.79	

alitet:

Borehull: 7710

side 3

Dato :
Koordinator :
Retning :
Helling/stigning :
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
65.45 - 69.40	3.95	2 gl.gn.alm. lys,fin-mlk-mlk. noe kv. biot.str. svak impr. sl, gn cp, py, po.	60	0.09	0.21	0.24		5.46	148-152
69.40 - 70.70	1.30	2 gl.gn.b.p. lys,fin-mlk-mlk. biot-rike str. rel. massiv spor skarn svak impr. py, po.		0.29	0.20	0.50			152-156
70.70 - 70.80	0.10	Amf. Skarn amf. jevnt fordelt skarn. spor gr.							
70.80 - 78.35	7.55	2 gl.gn.b.d. lys,med mørkere band biot-rik mlk. noe kv. rel. små kornig biot.enkelte gr.rik striper 2-5 mm. massiv spor py, po							
78.35 - 82.30	3.95	2 gl.gn.b.d. lys,grov-mlk-mlk. noe biot. striper. endel kv. enkelte gr. i biot.str. 1-1 mm. rel. massiv.							
82.30 - 82.75	0.45	hbl.gn. Noe lys,grovk. kv.rik.Rel jevnt ford. skarn.spor gr. 2-3 mm. spor py.							
82.75 - 83.85	1.05	Pegm. lys,fink.med biot.rik str. med spor gr. en del oppklist med spor cl.							
83.85 - 85.00	1.15	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.kv.rik med biot. striper.spredte gr. 2-5 mm Spor skarn. Rel. massiv.							
85.00 - 87.35	2.35	2 gl.gn.b.p. lys,mlk.smale peg.str. Rel.jevnt fordelt gr. 2-4 mm. Spor skarn.	80						

alitet:

Borehull: 7710

Dato :
Koordinator :
Retning :
Helling/stigning :
Høyde :
Lengde :

Side 4.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
87.35 - 90.85	3.50	2 gl.gn.b.d. Lys,grov-mik.-mik. noe kv. biot.stripe,rel.jevnt ford. gr. 2-5 mm. spor hbl.							
90.85 - 91.40	0.55	2 gl.gn.alm. Lys,mik.Noe kvarts. Spor gr. rel. massiv.							
91.40 - 92.75	1.35	biot.gn. Noe mørk,mik.spor hbl.og cl. D.	80 85						
92.75 - 95.00	2.25	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,grov-mik.-mik. Enkelte biot.str. og smale part. med 2 gl.gn.alm. s st. smale pegm.str. spor hbl. svake spor sl, gn,py.	80						
95.00 - 96.30	1.30	hbl.gn. Noe mørk,grov mik-mik. med grovk. biot. noe kv.striper noe små gr. 2-4 mm. svak impr. sl,gn,cp,py,po.	75 80						
96.30 - 97.75	1.45	2 gl.gn.b.p. Lys,mik.grovk. biot.str. enkelte striper hbl. spor cl spredte små gr. 1-2 mm. svak impr. Py. 97.60 kalk-spattfylt sprekke.							
97.75 - 99.20	1.45	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mik. spor hbl. stripe av pegm.	75 80						
99.20 - 102.50	3.30	hbl.gn. Noe mørk,mik. partier rik på gr. 2-4 mm. rel.jevn impr. py.							
102.50 - 105.40	2.90	hbl.biot.gn. Noe mørk,grov-mik-mik.med hbl.gn.band. noe biot.rik stripe.Spredt små gr. rel. massiv.Porøst utseende. Noe peg.str. spor D.							

Titel:

Borehull: 7710

Side 5.

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/sligning:
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
105.40 - 106.50	1.10	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, grov-mlk-mlk. pegm.str. god spor hbl. spredt gr. 2-4 mm. Spor D. Svak impr. Py.	70						
106.50 - 107.20	0.70	Pegm. lys, grovk. med smale gl.band. med spor hbl.							
107.20 - 109.05	1.85	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, grovmlk-mlk. Enkelte striper hbl.rik. Pegm.str. biot.rik band.							
109.05 - 109.10	0.10	hbl.gn. lys, fink.rik på gr. 2-4 mm. Stichtolitisk.							
109.10 - 112.10	3.00	hbl.gn. Mørk, fink. med enkelte band med amf. pegm.str. rik på gr. 2-4 mm.	75						
112.10 - 113.70	1.60	2 gl.gn.b.d. Lys, fink. rel. massiv. Noe pegm.striper.							

25/1 1978

Kjell Stenmark.

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning

Høyde

Lengde

Borehull: 7707

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
37.15 - 38.15	1.00	hbl.gn. Noc mørk, mlk. noe kv. spr. små gr. 1-3 mm. svak impr PY.							
38.15 - 38.60	0.45	2 gl.gn.b.d. Mørk, mlk. en del hbl. rik på gr. 1-4 mm	45						
38.60 - 45.00	6.40	amf. Mørk, mlk. litt grø, mlk. noe kv. striper og hbl. spor gr. Rel. jevnt ford. skarn.	45- 50						

23/1 1978

Kjell Stenmark

Lokalitet:

Borehull: 7707

Side 2

Dato :
 Koordinator :
 Retning :
 Helling/stigning:
 Høyde :
 Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
26.40 - 27.10	0.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.spor <u>Py</u> , po	45						
27.10 - 27.20	0.10	Pegm. Spor <u>py</u>							
27.20 - 27.55	0.35	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.		0.05	0.13	0.21		3.83	26.40-27.55
27.55 - 28.25	0.70	malm Kompakt sl,ep, py,po grovk. biot. litt hbl.		0.0	0.75	2.34		37.58	
28.25 - 32.10	3.85	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.rik på biot. partier med hbl.gn. i øvrigt spor hbl. rik på gr. svak impr. py.		0.0	0.10	0.11		7.88	28.25-32.10
				0.02	0.03	0.04		7.80	32.10-32.10
32.10 - 32.85	0.75	hbl.gn. Noe mørk,mlk,noe kv. spr. små gr. 1-3 biot.rike part. sv. impr. py.	50	0.04	0.12	0.05		7.88	
32.85 - 33.40	0.55	2 gl.gn.alm. Noe lys,mlk. musk.rike part. med spor hbl. sv.impr. sl,py	50	0.18	0.12	0.22		6.75	
33.40 - 33.55	0.15	Musk.gn. Noe mørk,mlk.med spor hbl. noe kv. god impr. sl,gn,ep,py		2.22	0.48	3.35		8.55	
33.55 - 33.75	0.20	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,noe kv.spor hbl. sv. impr. py.	50						
33.75 - 35.50	1.75	2 gl.gn.alm. Noe mørk,mlk.med biot.rike partier.lysere part. 2 gl. gn.alm. delvis spor hbl. svak impr. sl,gn,ep,py		0.96	0.40	1.12		7.42	33.55-34.50
				0.10	0.07	0.15			34.50-35.50
35.50 - 35.85	0.35	2 gl.gn.b.d. Mik.Stichtolotisk gr.rik 1-4 mm. en del hbl.							
35.85 - 36.10	0.25	hbl.gn. Noe mørk,mlk.med en del biot. homogen, spor <u>Py</u>							
36.10 - 37.15	1.05	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.ender hbl. rik på små gr. 1-2 mm.hom.rel. jevn impr. py							

Lokalitet:

Borehull: 7707

Dato:

Koordinater:

Retning:

Helling/stigning:

Høyde:

Lengde:

1977 Nov 1977

x: 925.390

y: 41.300

112V 191 S

- 55°

45 m

Tatt fra Kartet

39 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	% Pb	% Cu	Analysert % Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 4.90		Overdekke							
4.90 - 15.85	10.95	2 gl.gn.b.d. Lys, til meget lys, fin mlk, til mlk, enkelte lysere part, rel. massiv, kv. rik, enkelte små biot, str. Pagn, str. 11.35 - 11.50. Rel. jevnt ford. gr. 1-5 mm.	40 50						
15.85 - 18.70	2.85	2 gl.gn.b.d. Lys, fin, rel. homogen med stichrolitisk preg. Jevnt fordelt graunt 1-5 mm.							
18.70 - 20.05	1.35	Biot.gn. Lys, med enkelte mørkere part. mlk, enkelte part. kv. rik. Rik på gr. 1-3 mm.	55						
20.05 - 21.45	2.35	2 gl.gn.b.d. Lys, med mørkere partier mlk, med gl. rik str. en del kv. rel. jevnt ford. gr. 1-3 mm.							
21.45 - 21.85	0.40	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk, med rik str. av biot, med jevnt ford. Skarn. En del gr. 1-3 mm.	65 70						
21.85 - 21.90	0.05	Pagn.							
21.90 - 22.40	0.50	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk, biot, str. amf. ved 21.93. Rel. jevnt gr. 1-3 mm.	70						
22.40 - 25.25	2.85	2 gl.gn.alm. Lys, mlk, med enkelte biot, str. partier rikt på musk, enkelte små gr. 1-2 mm, spor Py, sl		0.04	0.07	0.16		2.14	24.00-25.25
25.25 - 25.30	0.05	malm Rel. komp. Py, sl med hbl.		0.07	0.18	5.56		11.25	
25.30 - 25.55	0.25	Musk.gn. Lys, mlk, en del kv. spor sl, Py.	60	0.08	0.26	1.60		3.38	
25.55 - 26.40	0.85	malm Str. malm, med hbl, biot, kv. sl, gn, Py, Cp.		0.84	0.35	4.82		10.50	

Borehull. 7706

Dato	:
Koordinator	:
Retning	:
Helling/stigning	:
Høyde	:
Lengde	:

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
22.65 - 23.75	1.85	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk. rel.jevnt ford. gr. 1-3 mm. Spor av hbl. svak impr. av <u>Py</u> <u>Peg. ved 23.75 - 24.20</u>	65	0.05	0.05	0.17		5.46	
23.75 - 24.20	0.45	Pegm.							
24.20 - 25.35	0.85	Biot.gn. mlk. med spor musk. og hbl. Endel gr. 1-4 mm. God impr. <u>Py</u>	75 80						
25.35 - 25.55	0.20	Pegmatitt Svakhetsone. Kalkspatt og hbl. i kjerne ca: 10 cm. Pegm. på begge sider.							
22.55 - 28.00	5.45	Biot.gn. mlk. spor musk. med endel gr. 1-3 mm. Endel hbl. jevnt svak impr. <u>py</u> .	70						
28.00 - 30.00	2.00	amf. mlk. spredte små gr.1-3mm rel.jevnt ford. skarn.							
18.1. 1978 Kjell Stenmark									
19,90-21,35	1,45							14,53	
18,50-22,65	4,15							6,11	

Lokalitet: Fageråsen
PROFIL 41.300

Borehull: 7706

Dato : 04. 1977

Koordinater : x : 925.390 Y: 41.300

Retning :

Helling/stigning: $\div 90^\circ$

Høyde : 39 m

Lengde : 26.77 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.30	4.30	Overdekket							
4.20 - 10.35	6.05	2 gl.gn.alm. lys,fink. med enkelte smale biot.. band. Rel.jevnt ford. gr. 7-3 mm. m m funn Py Stripe ved 8.80 m.	80						
10.35 - 18.50	8.15	2 gl.gn.b.p. mlk. enkelt, part. rikere på biot og gr. Rel. jevnt ford. gr. 1-4 mm. 16.10 - 16.20 kv.	75 80						
18.50 - 18.75	0.25	malm Meget god impr. <u>Sl,Cp,Py</u> i hbl. förande ba.	75	0.05	0.06	0.08		3.06	17.00 - 18.50
18.75 - 19.05	0.30	2 gl.gn.alm. Lys,fink. kv.rik med spor gr. God impr. Py.		1.03	2.27	8.35		20.99	
19.05 - 19.10	0.05	malm Rik impr. i grovk. biot. sk. spor hbl.	85	0.09	0.06	0.11		3.94	
19.10 - 19.90	0.80	biot.gn. mlk. til grovk. kv.rik spor hbl. og gr. 1-3 mm sv. impr. py.	85	0.06	0.87	8.52		18.21	
19.90 - 20.05	0.15	biot.gn. mlk. sterk impr. av <u>Py</u> , <u>Cp</u> , <u>Sl</u> , <u>Gn</u>		0.04	0.24	0.14		7.28	
20.05 - 20.60	0.55	2 gl.gn.b.p. mlk. noe lys, spor hbl.God impr. <u>Sl</u> , <u>Py</u> , <u>Gn</u> .	80	2.76	1.27	6.25		11.78	
20.60 - 21.35	0.75	Malm Kompr. malm med kv. biot. hbl.		1.56	0.57	1.98		7.71	
21.35 - 22.65	1.30	2 gl.gn.alm. mlk. lys med noen part. enk. kv.str. <u>Sl</u> -stripe 21.73 ekstr. spor <u>Sl,Cp</u>		3.83	0.18	25.39		17.14	
				0.37	0.26	1.25		4.33	

Lokalitet: Mofjellet
 Profil 44.410

Borehull: 7604

Dato : Nov. 1976
 Koordinater : X:925.482.5 Y:44.398.2
 Retning : S
 Helling/stigning: - 85
 Høyde : 189.7 m
 Lengde : 273.45 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.85	0.85	Jordboring							
0.85 - 1.10	0.25	Hbl.gn. Rel. lys, mlk-fk. Noe biot. Sv. impr. py.							
1.10 - 4.60	3.50	2 gl.gn.alm. lys, mlk. Enkelte tynne biot-rike partier. Noen kv.linser. Stedvis spor py, po, sl. 1.50-1.65: Sv. impr: sl, py.	70°						
4.60 - 11.70	7.10	2 gl.gn.b.d./ Noe mørk, mlk-fk. Gradvis overganger mellom 2 gl.gn.b.d. biot.gn. og nesten ren biot.gn. Stedvis flokker av hbl. Enkelte kv.linser. Jevnt impr. py. Stedvis spor gr. 1-2 mm.	70°						
11.70 - 18.30	6.60	Hbl.gn. Noe mørk, mlk.-fk. Mye biot. Hbl. også som rel. grove korn. Endel kv.linser. Endel gr. 1-3mm. Enkelte steder tydelig stichtolitisk. Jevnt impr. py.							
18.30 - 19.00	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel. lys-fk. Tett. Et par striper 2-3 cm. amf. Meget tett besatt gr. 1-3 mm. Sv. impr. py.							
19.00 - 24.00	5.00	Hbl.gn. Samme hbl.gn. som over. Stedvis gr. 5-10 mm.	70-80						
24.00 - 60.60	36.60	Hbl.gn. Hbl.gn. som over, men endel mørkere p.g.a. øket biot-innhold. mlk-fk. Kan minne noe om amf. Endel kv.-striper. Gul-grønn skarn, både i forb. med kv, og finford. i b-arten. Noe ujevnt besatt gr. 1-3mm. Delvis impr. py. Enkelte str. 3-5cm. amf på							

38-39 m og 55-60m. Gr-innh. øker fra

Lokalitet: Mofjellet
 Profil 44.410

Borehull: 7004

Date : Nov. 1976
 Koordinater : X:925.482.5 Y:44.398.2
 Retning : S
 Helling/stigning: - 05
 Høyde : 109.7 m
 Lengde : 271.45 m

Dybde	L	Bergart	S	% Pb	% Cu	Analysert % Zn	% S	% Fe	Prove m
61.00 - 62.30	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel. lys, mik-ik. Enkelte ekstra biot-rike striper. Sv. impr. py.	70°						
62.30 - 64.00	0.70	2 gl.gn.alm. Lys, -mik. tett. Spredte gr. 1-2 mm.							
64.00 - 64.30	2.30	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mik-ik. Enkelte kv-linser. Sv. impr. py.							
64.30 - 87.05	22.75	2 gl.gn.alm. Lys, ik-mik. tett. Stedvis tynne ekstra biotrike bånd. Enkelte kv.linser							
87.05 - 87.25	0.20	amf. Mørk, ik., tett. Mye gr. 2-4 mm.							
87.25 - 88.40	1.15	2 gl.gn.alm. Samme karakteristikk som over. En del ekstra biot-rike str. med gr. 2-4 mm.	60-70°						
88.40 - 88.70	0.30	amf. Samme amf. som over.							
88.70 - 92.00	3.30	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn. som tidligere							
92.00 - 95.65	3.65	2 gl.gn.b.d. Noe lys, mik-ik. Noe tett. Jevnt ford. gr. 2-4 mm.							
95.65 - 97.10	1.45	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn. som tidligere.							
97.10 - 97.40	0.30	biot.gn. Mørk, mik. Noen få tynne str. 2 gl.gn.alm. Tett besatt gr. 1-3 mm.							
97.40 - 103.90	6.50	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn.alm. som tidl. Stedvis ujevnt besatt gr. 1-2 mm.							
103.90 - 104.80	0.90	2 gl.gn.b.p. Rel. lys, mik. Enkelte kv.-linser Rel. jevnt besatt gr. 1-3 mm.							
104.80 - 104.90	0.10	amf. Mørk, ik-mik. tett. Tett besatt gr. 2-4 mm.							

Lokalitet: Mofjellet
 Profil 44.410

Borehull: 7604

Dato : Nov. 1976
 Koordinater : X:925.482.5 Y:44.398.2
 Retning : S
 Helling/stigning: ~ 85
 Høyde : 127.9 m
 Lengde : 27.24 m

3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
104.90 - 105.20	0.30	2 gl.qn.alm. lys, fk.-mlk.tett. Noe kv.-linser.Rel. jevnt besatt gr. 1-2 mm.							
105.20 - 105.80	0.60	amf. Mørk, fk.-mlk. Tett. Meger oppsprukket. Ser nesten ut som om det har vært en indre sprengning, eller trykkavlastn. av oppsprukket b.art under stort trykk. Tett besatt gr. 2-4 mm.							
105.80 - 108.20	2.40	2 gl.qn.b.p. Noe lys, mlk-fk. Enkelte kv.-linser.Rel. jevnt besatt gr. 1-3 mm.							
108.20 - 108.35	0.15	pegm.							
108.35 - 111.05	2.70	2 gl.qn.b.p. Rel. lys,mlk-fk. Enkelte ekstra biot-rike partier. Flekk med blå-skarn på 109.90. Stedvis gr. 1-2 mm.							
111.05 - 112.35	1.30	2 gl.qn.b.d. Noe mørkere, mlk. Endel kv.-linser. Spredte gr. 1-2 mm.							
112.35 - 112.95	0.60	2 gl.qn.b.p. Rel. lys mlk-fk. Noe tett. Stedvis spor gr. 1-2 mm.							
112.95 - 113.00	0.05	pegm. grovk.							
113.00 - 116.35	3.35	2 gl.qn.b.p. Rel. lys,mlk-fk. Noe tett. Enkelte ekstra biot-rike partier.Stedvis spor gr.1-2mm							
116.35 - 116.60	0.25	Pegm. grovk.							
116.60 - 130.40	13.80	2 gl.qn.b.p. Samme 2 gl.qn.b.p. som over. Enkelte smale, 10-15 cm partier med 2 gl.qn.b.d.							

Lokalitet: **Mofjellet**
Profil 44.410

Borehull: **7604**

Dato : **Nov. 1976**
Koordinater : **X:925.482.5 Y:44.398.2**
Retning : **5**
Helling/stigning: **- 36**
Høyde : **109.7 m**
Lengde : **77.43 m**

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Po	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
130.40 - 136.65	6.25	amf.	Mørk, fk.-mlk. Noe tett. Virker noe "uren", med en del biot. iblandet. En del kv. linser og "ussvøttinger". Tett besatt gr. 2-10 mm.						
136.65 - 140.00	3.35	2 gl.gn.b.p.	Rel. lys, mlk-fk. Endel ekstra biot-rike partier. Enkelte skarn-flekke i forb. med kv-linser. Rel. jevnt besatt gr. 1-3 mm.						
140.00 - 140.60	0.60	2 gl.gn.b.d.	Noe mørk, fk.-mlk. Noe tett. kvartsrik. Jevnt besatt gr. 1-3 mm.						
140.60 - 143.00	2.40	2 gl.gn.b.p.	Lys, mlk-fk. Tett. Endel kv.-linser. Rel. tett besatt gr. 1-2 mm.						
143.00 - 152.00	9.00	2 gl.gn.b.d.	Rel. lys, fk.-mlk. Tett. Endel partier 15-20 mm som er b.p. Endel kv. linser. Tett besatt gr. 1-3 mm. markant at feldittisk						
152.00 - 171.00	19.00	2 gl.gn.b.d.	Litt mørkere, fk.-mlk. tett. Endel kv.-pegm-linser. Enkelte flekker gul-grønn skarn i med kv. Tett besatt gr. 1-3 mm						60-70 ^o
171.00 - 172.20	1.20	2 gl.gn.b.d.	Samme b. art som over, men granatene er her markant at feldittisk.						
172.20 - 174.10	1.90	kv-gr-b.a.	Bergart bestående av omtrent bare kv. og gr. 1-3 mm. Litt biot. fk. tett.						

Lokalitet: Morfjellet
 Profid 44.410
 Borehull: 7001

Dato: Nov. 1976
 Koordinater: X:925.467.5 Y:44.398.2
 Retning: S
 Helling/stigning: - 15
 Høyde: 117.5
 Lengde: 1000 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
174.10 - 174.25	0.15	gr.b.e.							
174.25 - 174.55	0.30	2 gl.m.b.d.							
174.55 - 179.70	5.15	2 gl.gn.b.p.							
179.70 - 179.95	0.25	biot.gn.							
179.95 - 184.85	4.90	2 gl.gn.b.p.							
184.85 - 185.35	0.50	amf.							
185.35 - 185.50	0.15	2 gl.gn.b.p.							
185.50 - 186.15	0.65	amf.							
186.15 - 188.05	1.90	biot/hbl.gn.							

Lokalitet: Mofjellet
Profil 44.410

Borehull: 7604

Dato : Nov. 1976
Koordinater : X:925.482.5, Y:44.398.2
Retning : S
Heiling/stigning: - 85
Høyde : 189.7 m
Lengde : 273.45 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
188.05 - 188.45	0.45	hbl.gn.	Mørk, mlk. Ekstra hbl.-rikt parti. Noe biot. Endel kv-linser, og gul-grønn skarn i forb. med disse. Ujevnt besatt gr. 1-3 mm.						
188.45 - 189.80	1.35	Biot/hbl.gn.	Samme biot/hbl.gn. som over						
188.90 - 190.40	0.50	2 gl.gn.b.p.	Lys, fk-mlk. Tett. Jevnt besatt gr. 1-2 mm.						
190.40 - 190.90	0.50	amf.	Mørk, mlk-fk. Spor hbl. Jevnt fordelt gulgrønn skarn. Noe biot. Ujevnt fordelt gr. 1-3 mm.						
190.90 - 193.25	2.35	2 gl.gn.b.p.	Lys, mlk-fk. noe tett. Enkelte ekstra biot-rike partier. Stedvis spor skarn i forb. med kv.linser. Jevnt besatt gr. 2-6 mm.						
193.25 - 193.80	0.55	amf.	Mørk mlk.-fk. noe tett. Jevnt ford. gr. 2-4 mm.						
193.80 - 197.80	4.00	2 gl.gn.b.p.	Lys, mlk-fk. noe tett. Stedvis ekstra biot-rike partier. Rt par flekker amf. Rel. tett besatt gr. 2-4 mm, delvis stichtolotisk.						
197.80 - 204.50	10.70	2 gl.gn.alm.	Lys, mlk. Endel kv.linser. Av og til kalksp. og skarn i forb. med disse. Stedvis spor gr. 1-3 mm. Stedvis tynde (5 cm) strimler biot. gr. og på 204.5-204.7 amf.						

Lokalitet: Mofjellet
Profil 44.410

Borehull: 7604

7.

Dato : Nov. 1976
Koordinater : X:925.482.5, Y:44.398.2
Retning : S
Helling/stigning: - 95
Høyde : 189.7 m
Lengde : 273.45 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
208.50 - 209.00	0.50	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk-fk.noe tett. rel. jevnt fordelt gul-grønn skarn Små flekker hbl.					3/4 Ag		
209.00 - 209.45	0.45	2 gl.gn.alm. Lys, fk-mlk noe tett. Stedvis spor gn. 1-3 mm.							
209.45 - 209.90	0.45	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn.b.p. med skarn som over.							
209.90 - 210.15	0.25	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fk.Noe tett. Spor gr. 1-2 mm.							
210.15 - 211.45	1.30	2 gl.gn.b.p. Rel. lys mlk-grovk. Enkelte ekstra biot-rike partier. Noen kv.linser. Delvis meget godt impr. py.							
211.45 - 214.65	3.20	hbl.gn. Noe mørk,mlk. Enkelte flekker grov hbl. Stedvis små skarn-flekker. Rel. mye biot. Tett besatt gr. 0.5-2m Stedvis impr. py.	60°						
214.65 - 215.95	1.30	amf. mørk,fk-mlk. Tett. Jevnt ford. gul-grønn skarn.Endel kv.linser							
215.95 - 219.50	3.55	hbl.gn. Noe mørk mlk-fk. Endel biot. jevnt fordelt gr. 1-3 mm. Jevnt impr. py.							
219.50 - 219.65	0.15	pegm. grovk.							
219.65 - 222.60	2.95	hbl.gn. Samme hbl.gn. som over.		0.02	0.03	0.09	1,2	6.11	221.00 - 222.6
222.60 - 223.70	1.10	2 gl.gn.b.p. Noe mørk,mlk-grovk. Endel små flekker hbl. Noe ujevn ford. gr. 1-3 mm.Jevnt impr. py.		0.00	0.01	0.03	0,8	7.87	

Lokalitet: Noffjellet
Profil 44.410

Borehull: 7004

Dato : Nov. 1976
Koordinater X:925.482.5, Y:44.398.2
Retning : S
Helling/stigning: - 85
Hoyde : 105.7 m
Lengde : 273.45 m

8.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
223.70 - 224.30	0.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fk. Noen kv.linser. Impr. py,po,sl, spor gn.		0.30	0.07	0.45	7.2	7.55	
224.30 - 224.80	0.50	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.-grovk. Stedvis ekstra biot-rike partier. Spor gr. 0,5-1 mm. Rel godt impr. sl, noe py.		0.80	0.03	1.58	14,1	6.75	
224.80 - 239.90	15.10	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk-fk.Noie tett. Noen ekstra biot-rike partier. Endel kv.linser.Kalksp. og litt hbl. i forb. med disse. Av og til gr. 1-3 mm.		0.07	0.01	0.22	1,8	2.09	224.80 - 226.00
239.90 - 242.00	2.10	2 gl.gn.b.d. Noe lys,mlk. Endel ekstra rike biot-striper.Noie kv.- innblanding. Sv. impr. py. Rel. mass py-stripe på 240.96 - 241.00.	60-65°						
242.00 - 242.80	0.80	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk.Enkelte biot.flekke. Noen kv.striper.Sv. spor py.	60-65						
242.80 - 245.40	2.60	hbl.gn. Litt mørk,mlk.Enkelte noe større flekker hbl. i forb.m. kv.striper. Her også noe gul- grønn skarn.Sv. spor py.	65	0.01	0.01	0.05	0,9	4.98	244.00 - 245.40
245.40 - 246.00	0.60	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk-fk.Noie kv.str. Spredte gr. 1-2 mm.		0.00	0.01	0.03	0,9	3.70	
246.00 - 247.15	1.15	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk.Enkelte biot-str. Impr. sl, py, gn. cp.	45-50	0.65	0.25	1.52	48,4	8.87	
247.15 - 250.40	3.25	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk.-fk. Virker noe "tett" Enkelte biot-rike partier. Noen kv.linser.Stedvis spor gr. 0.5-1 mm		0.00	0.00	0.03	0,3	2.48	247.15 - 249.00
				0.00	0.02	0.03	0,8	2.61	249.00 - 250.40

Lokalitet: Hofjellet
Profil 44.410

Borehull: 7604

Dato : Nov. 1976
Koordinater : X:925.482.5, Y:44.398.2
Retning : S
Helling/stigning: - 85
Hoyde : 110.7 m
Lengde : 373.45 m

9.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
250.40 - 250.70	0.30	2 gl.gn.b.p. Noe Lys,mlk. Litt kv. Noen biot-striper.Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>po</u> , <u>cp</u>		0.54	0.43	2.70	14,-	6.78	
250.70 - 250.95	0.25	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. Spredte gn. 0,5-2 mm		0.00	0.08	0.14	0,8	3.13	
250.95 - 251.25	0.30	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Endel grovk. biot. iblandet.Impr. <u>sl</u> , <u>py</u>		0.06	0.42	1.08	5,2	9.39	
251.25 - 252.30	1.05	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Endel kv. og kv.linser.Spredte gr. 1-2 mm Sv. impr. <u>py</u> .	60-65	0.00	0.04	0.07	1,4	6.00	
252.30 - 252.70	0.40	biot.sk+kv. Mørk,grovk.Kv-linser iblandet biot. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>noe po</u> , <u>cp</u> .		0.31	0.29	2.28	10,3	12.00	
252.70 - 253.00	0.30	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Endel kv.linser Impr. <u>py</u> , <u>cp</u> .		0.04	0.42	0.29	10,6	8.22	
253.00 - 254.25	1.25	biot.sk. mørk,grovk. Endel kv.iblandet Rel. godt impr. <u>py</u> , <u>sl</u> , <u>po</u> , <u>cp</u> .	60-65	0.17	0.37	3.16	15,1	14.47	
254.25 - 254.75	0.50	Malm Rel.mass. <u>Sl</u> -malm. Noe kv. iblandet.Også hbl.		2.89	0.05	13,23	18,1	16.04	
254.75 - 256.20	1.45	biot.sk. Mørk,grovk.Endel kv. iblandet Også et par tynne striper 2 gl.gn.b.p. Impr. <u>py</u> , <u>sl</u> , <u>po</u> , <u>cp</u>	60-65	0.27	0.53	2.33	16,5	13.95	
256.20 - 256.70	0.50	Hbl.gn. Noe mørk,mlk-fk.Noie kv.Endel gulgrønn skarn.Sv.impr. <u>py</u> .		0.00	0.05	2.25	1,2	2.61	
256.70 - 257.00	0.30	biot.sk. Mørk,grovk.Noie kv. iblandet. impr. <u>py</u> , <u>po</u> , Noie <u>cp</u> .	65-70	0.31	0.46	0.19	14,3	17.34	
257.00 - 257.40	0.40	hbl.gn. Noie mørk,mlk.Enkelte kv.str. Stedvis spor gr.1-2 mm.Spor <u>py</u> .		0.03	0.09	0.22	2,7	7.69	

Lokalitet: Hofjellet
Profil 44.410

Borehull: 7004

10.

Dato : Nov. 1970
 Koordinater : X:225.482.5, Y:44.398.2
 Retning : S
 Helling/stigning: - 85
 Høyde : 110.7
 Lengde : 1.27

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
257.40 - 257.75	0.35	biot.sk. Mørk, grovk. Endel kv. iblandet Noe hbl. Impr. <u>py, po, sl.</u>	55-60	0,10	0,15	1,70	5,3	13,42	
257.75 - 262.00	4.25	hbl.gn.m/sk. Noe mørk, mlk.-fk. Jevnt besatt gulgrønn skarn. Rel. jevnt besatt gr. 2-4 mm.	60-65	0,00	0,10	0,04	2,3	5,05	257.75 - 259.00
262.00 - 262.50	0.50	2 gl.gn.b.p. Litt mørk, mlk-fk. Endel hbl. iblandet. Noe kv. Sv. spor gr. 0.5 mm. Spor <u>py.</u>		0,00	0,05	0,04	1,7	7,42	
262.50 - 263.10	0.60	biot.sk. Mørk, grovk. Endel kv. iblandet. Spor hbl. Impr. <u>py, po.</u>	60-65	0,00	0,17	0,38	5,4	15,00	
263.10 - 264.85	1.75	hbl.gn. Noe mørk, mlk.-fk. Rel. jevnt besatt gr. 2-3 mm. Sv. impr. <u>py</u> Enkelte pegm.-striper.	60-65	0,00	0,02	0,01	1,9	7,90	263.10 - 264.00
				0,02	0,04	0,09	2,3	6,47	264.00 - 264.85
264.85 - 265.10	0.25	hbl.gn. Samme hbl.gn. som over. Impr. <u>py, sl.</u>		0,39	0,13	2,43	7,6	9,32	
265.10 - 266.25	1.15	Biot.sk. Mørk, grovk. Endel kv. og kv.-striper. Spor hbl. Impr. <u>py, po, spor sl, cp.</u>		0,00	0,13	0,55	3,5	12,95	
266.25 - 267.00	0.75	hbl.gn. Noe mørk, mlk-fk. Noen striper kv. og flekker ren hbl. spor <u>py.</u>	65-70	0,00	0,04	0,05	2,1	6,79	
267.00 - 267.35	0.35	biot. sk. Mørk, grovk. Noe kv. Endel hbl. Impr. <u>sl, py, po.</u>		0,17	0,15	2,15	3,5	15,79	
267.35 - 268.75	1.40	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. Endel kv. og biot-str. Spor hbl. Spredte gr. 1-2 mm. Sv. impr. <u>py, po</u> Noe <u>cp, sl.</u>	65-70	0,00	0,13	0,83	6,0	5,84	
268.75 - 270.80	2.05	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk. Enkelte kv. str. Flekker av gulgrønn skarn. Spredte gr. 1-2 mm. Spor hbl.	65-70	0,00	0,01	0,04	<0,1	3,16	268.75 - 270.00

Lokalitet: Mofjellet
Profil 44.410

Borehull: 7604

Dato : Nov. 1976
Koordinater : X: 925.482.5, Y: 44.398.2
Retning : S
Helling/stigning: - 85
Høyde : 189.7 m
Lengde : 273.45 m

11.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
270.80 - 271.30	0.50	2 gl.gn.alm. lys,mlk. Spor gr. 0.5-1 m	65-70						
271.30 - 273.45	2.15	2 gl.gn.b.p. lys,mlk. Enkelte biot-rike striper. Noe kv. Spor gr. 0.5 - 1 m.	65-70						
4/2 1977 K.M. Helgum									

Lokalitet: Mofjellet
Profil 44.410 Y

Borehull: 7603

Dato : Sept/okt. -76
Koordinater : 925.482.5 X 44.398.2 Y
Retning :
Helling/stigning : - 90° (fodd) *Avviksmålt*
Høyde : 189.7 m
Lengde : 338.10

1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.65	0.65	Jordboring							
0.65 - 3.05	2.40	2 gl.gn.alm. lys,mlk-fk. Enkelte litt mere biot-rike part.Stedvis sv. impr. py, sl.	45°						
3.05 - 6.10	3.05	2 gl.gn.b.p. rel.lys,mlk. Endel gr.1-3mm flekkvis fordelt.Enkelte mere biot-rike partier.							
6.10 - 6.70	0.60	biot.gn. rel.mørk mlk-fk. Noe kv.og musk.Impr.finfordelt py							
6.70 - 7.75	1.05	2 gl.gn.b.p. rel.lys mlk.-fk.Enkelte striper biot.Jevnt fordelt gr.1-3 mm,enkelte noe stichtolitisk.	40-50						
7.75 - 10.95	3.20	2 gl.gn.b.p. rel.lys,fk-mlk.Enkelte mere biot-gn-rike partier.Noen kv.linser med flekker av hbl.Jevnt impr.finford. py							
10.95 - 11.00	0.05	hbl.gn. mørk, grovk.							
11.00 - 11.50	0.50	2 gl.gn.b.d. mørk,mlk.endel kv.linser spor hbl. gr. 0.5-1 mm Impr. py.							
11.50 - 13.00	1.50	hbl. gn. rel.lys, mlk. Endel biot. Endel gr. 1-2 mm. Jevnt impr. py.							
13.00 - 13.70	0.70	hbl. gn. rel. lys mlk.Endel biot. tett besatt gr. 1-4 mm stichtolitisk.Impr. py.							

Lokalitet: Mofjellet
 Profil 44.410 Y

Borehull: 7603

2

Dato : Sept/okt. -76
 Koordinater : 925.482.5 X 44.398.2 Y
 Retning :
 Helling/stigning : - 90°
 Høyde : 139.7 m
 Lengde : 333.10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.70 - 20.50	6.80	hbl.gn. rel.lys,mlk-fk.Endel biot.- rike partier. Enkelte kv.- linser.Rel.jevnt besatt gr. 70-75 2-10 mm. De største tydelig stichtolistiske.Jevnt impr. <u>py.</u>							
20.50 - 22.10	1.60	2 gl.gn.b.p. rel.lys mlk-fk.Tett besatt gr.1-2 mm.Sv impr. <u>py</u>							
22.10 - 29.50	7.40	hbl.gn. rel.mørk mlk-fk.Noe biot. og amf.Endel jevnt fordelt skarn.Noen kv.linser plygm. foldet.Jevnt ford.gr.1-3mm Enkelte flekker gr. 3-5 mm.							
29.50 - 32.50	3.00	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk.Stedvis spor hbl.Enkelte flekker skarn Tett besatt gr 1-3 mm.Jevnt svakt impr. <u>py.</u>							
32.50 - 52.60	20.10	hbl.gn. rel.mørk,mlk.Endel biot. Endel kv.linser Noe amf. Endel gr.1-4 mm.Jevnt ford. 60-70 skarn,med anrikn.ved kv. linser.Jevnt,sv.impr. <u>py</u> til ca. 40.30.							
52.60 - 57.50	4.90	biot.gn. rel.mørk,mlk-fk.Endel hbl. Stedvis nesten hbl. over tynne partier.Jevnt ford. gr.1-3 mm.Noen større gr. 1-3 mm er tydelig Stichto- listisk. Jevnt, rel svakt impr. <u>py.</u>							

Lokalitet: **Mofjellet**
Profil 44.410 Y

Borehull: 7603

3

Dato : Sept/okt. -76
Koordinater : 925.402.5 X 44.398.2 Y
Retning :
Helling/stigning : - 90°
Høyde : 100.7 m
Lengde : 330.10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
57.50 - 58.25	0.75	hbl.gn. Samme karak. som over.	60°						
58.25 - 60.85	2.60	biot.gn/ rel.lys,mlk.-fk. musk-innh. 2 gl.gn.b.d. veksler.Partier med mye hbl. Gr.1-3 mm.Jevnt fordelt Sv. impr. py.							
60.85 - 62.95	2.10	2 gl.gn.b.d. rel.lys mlk.-fk. Sv. impr.py							
62.95 - 81.50	18.55	2 gl.gn.alm. rel.lys,fk-mlk.,tett enkelte tynne partier mlk.- grovk. biot-gn. Disse har spor av skarn,og gr.1-3 mm	60-70						
81.50 - 81.80	0.30	amf. mørk,fk-mlk. tett. Tett besatt gr. 2-4 mm skarn-flekke.							
81.80 - 82.30	0.50	2 gl.gn.alm. Samme b.art som over							
82.30 - 82.40	0.10	amf. Samme amf. som over.							
82.40 - 83.20	0.80	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn. som over							
83.20 - 106.00	22.80	2 gl.gn.b.p. Rel.lys,mlk-fk. tett. Enkelte biot.-rike partier Disse har skarnflekke. Jevnt besatt gr. 1-3 mm. Impr. py : 93.60 - 94.00							
106.00 - 106.40	0.40	Pegm.	60-70						
106.40 - 109.80	3.40	2 gl.gn.b.p. Samme b.art som over							
109.80 - 112.50	2.70	Amf. mørk,mlk. Noen skarnflekke Tett besatt gr. 2-4 mm.							

Lokalitet: Mofjellet
Profil 44.410 Y

Borehull: 7603

Dato : Sept/okt. -76
Koordinater : 925.482.5 X 44.398.2 Y
Retning :
Helling/stigning : - 90°
Høyde : 130.7 m
Lengde : 330.10

4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
112.50 - 118.40	5.90	gr.b.a. Rel.lys.fk. tett. Består av gr.kv,litt biot.og amf. gr. 2-5 mm. Samtlige meget stichtolitisk. B.arten er lysest på midten og noe mørkere mot endene.							
118.40 - 121.55	3.15	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk-fk. tett,enkelte kv.linser.Jevnt besatt gr. 1-3 mm.	70°						
121.55 - 122.00	0.45	pegm.							
122.00 - 122.85	0.65	2 gl.gn.b.p. rel.lys,fk. tett. Tett besatt gr. 1-2 mm, strichtolitisk							
122.85 - 123.30	0.45	pegm.							
123.30 - 133.50	10.20	2 gl.gn.b.p. rel.lys,fk.tett. Meget tett besatt gr. 1-3 mm, strichtolitisk.							
133.50 - 155.30	21.80	gr.b.art gr.b.art som består av gr., kv,biot. Enkelte partier er rene kv.linser.Andre er biot. gn-liknende,atter andre har kvartsittisk preg. Det hele er meget tett besatt med gr. 1-6 mm og meget utpreget stichtolitisk.Enkelte flekker av ren hbl. og biot. i forb.m. kv.linser. Endel stikktilm. kjernens lengde-akse (s=+ 0) på 152.70 - 153.50.							

Lokalitet: Mofjellet
Profil 44.410 v

Borehull: 7603

Dato : Sept./okt. -76
Koordinater : 925.482.5 X 44.398.2 Y
Retning :
Helling/stigning : - 90°
Høyde : 189.7 m
Lengde : 338.10

5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
155.30 - 161.60	6.30	2 gl.gn.b.d. rel.lys fk.-mlk tett Jevnt fordelt, tett besatt gr. 1-3 mm. Alle har stichtolitisk preg.	70						
161.60 - 163.90	2.30	amf. mørk fk.-mlk., rel. tett Endel skarn-rike partier Enkelte partier med hbl. gr. noe spredt 1-2 mm.							
163.90 - 165.25	1.35	hbl.gn. rel.lys mlk-fk. Endel biot. stedvis spor skarn. Noe gr. 1-2 mm. Jevnt, sv. impr.py.							
165.25 - 170.30	5.05	amf. mørk, fk-mlk. rel. tett Enkelte biot-rike partier sv. py-impr.her.Rel. jevnt besatt gr. 1-4 mm.							
170.30 - 172.10	1.80	hbl.gn. Rel.lys mlk.-fk. Noe biot. Noen amf.-rike tynne part. Enkelte skarn-flekke. Jevnt besatt gr. 1-4 mm. Sv. impr. py.							
172.10 - 174.25	2.15	2 gl.gn.b.d. Rel. lys, mlk-fk. tett. Noen få skarn-flekke.Jevnt tett besatt gr. 1-3 mm, stichtolitisk.							
174.25 - 180.40	1.45	amf. mørk, mlk.-fk. Endel kv.linser stedvis skarn i forb. med disse. Rel. jevnt besatt gr. 2-5 mm.							

Lokalitet: **Kofjellet**
Profil 14.410 Y

Borehull: 7503

Dato : Sept./okt. -76
 Koordinater : 925.482.5 x 44.398.2 Y
 Retning :
 Helling/stigning : - 90°
 Høyde : 199.7 m
 Lengde : 318.10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
180.40 - 182.50	2.10	2 gl.gn.b.p.	Rel.lys, fk.-mlk., tett. Enkelte kv.linser. Stedvis spor skarn. Jevnt besatt gr. 1-3 mm til 190 m.						
182.50 - 182.70	0.20	Amf.	Samme amf. som over						
182.70 - 201.50	18.80	2 gl.gn.b.p.	Samme 2 gl.gn. som over. Enkelte ekstra biot-rike striper. Noen få <u>tynne</u> partier amf. gr. hovedsak- elig i ekstra biot-rike partier. Her også stedvis skarn.						60
201.50 - 203.80	2.30	hbl.gn.	Rel.lys, mlk-fk. Jevnt fin- fordelt skarn. Endel biot. Stedvis gr. 1-2 mm.						
203.80 - 207.00	3.20	2 gl.gn.b.p.	Rel. lys, mlk-fk. noe tett. Stedvis noe hbl. og skarn Jevnt fordelt gr. 1-3 mm Sv. impr. py.						
207.00 - 208.45	1.45	h-l.gn.	Samme h.art som over. Sv. impr. py.						
208.45 - 209.15	0.70	Amf.	mørk, fk.-mlk. tett. Enkelte skarn-lag. Tett besatt gr. 2-5 mm.						
209.15 - 210.00	0.85	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys, mlk.-fk. Stedvis spor hbl., og flekker av skarn. Jevnt besatt gr. 1-3 mm. Sv. impr. py.						70-80

Lokalitet: Hofjellet
 Profil 44.410 Y

Borehull: 7603

Dato : Sept./okt. -76
 Koordinater : 925.482.5 X 44.398.2 Y
 Retning :
 Helling/stigning : - 90°
 Høyde : 189.7 m
 Lengde : 338.10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
210.00 - 216.30	6.30	hbl.gn. rel. lys, mlk-fk. Vekslede lag med 2 gl.gn.b.d. Endel skarn-flekke. Enkelte kv.-linser. Jevnt fordelt gr. 1-5 mm. De største i de mest hbl.-rike partier. Jevnt impr. py	70-80°						
216.30 - 219.40	3.10	biot.gn. rel. lys mlk-grovk. Vekslede lag med nesten ren musk.gn. Andre partier nesten ren biot. Spredte gn. 1-3 mm Godt impr. py	70-80	0.17	0.03	0.11		6.83	218.00 219.40
219.40 - 219.60	0.20	musk.gn. lys, grovk.-mlk. Godt impr. sl, py noe cp spor po.		1.94	0.47	5.07		8.67	
219.60 - 220.35	0.75	musk.gn. lys, grovk.-mlk. rel. lite biot.		0.04	0.03	0.31		2.23	
220.35 - 220.60	0.25	biot.gn. rel. lys, grovk.-mlk. Noe kv. og musk. Godt impr. py spor sl		1.62	0.13	1.28		9.85	
220.60 - 236.95	16.35	2 gl.gn. alm/ 2 gl.gn.b.p. rel. lys mlk. Veksling mellom biot.rike og musk.rike lag. Endel kv.linser. Stedvis skarn i forb. med disse. Spredte gr. 1-3 mm. hovedsakelig i ekstra biot-rike lag.	80-85	0.00	0.04	0.13		3.55	220.60 222.00
236.95 - 237.30	0.35	biot.gn. rel. mørk mlk. Endel amf. Tett besatt gr. 2-5 mm.							
237.30 - 239.80	2.50	2 gl.gn.alm/ 2 gl.gn.b.p. Samme gl.gn. som over							

Lokalitet: Mofjellet
 Profil 44.410 Y

Borehull: 7503

8

Dato : Sept./okt. -76
 Koordinater : 925.482.5 X 44.398.2 Y
 Retning :
 Helling/stigning : - 90°
 Høyde : 189.7 m
 Lengde : 3 m, 10


Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
239.80 - 240.70	0.90	biot.gn.	rel.lys,mlk.-fk. Tett besatt gr. 1-3 mm. spor amf.						
240.70 - 249.10	8.40	2 gl.gn.b.p.	rel.lys,mlk-grovk. Endel striper ren biot. Endel kv.linser. Stedvis skarn-flekke. Spredte gr. 1-3 mm, mest i biot-rike partier						
249.10 - 252.45	3.35	biot.gn./ biot. b.art.	grovk.biot. i veksling med kv. Noe hbl.enkelte steder Noe gr. 1-3 mm. uregelmessig fordelt. Sv.impr. py,po, Enkelte, smale "mellom-partier" med 2 gl.gn.b.d. fk.-mlk.	0.05	0.02	0.08		5.51	251.00 - 252.45
252.45 - 253.60	1.15	biot.gn./ biot. b.art.	Samme grovk.b.art som over rel. godt impr. sl.py.Noce po og Cp.	0.03	0.16	0.94		9.45	
253.60 - 254.35	0.75	2 gl.gn.b.d.	rel. lys, fk.-mlk. tett endel kv. Spredte gr. 1-2mm	0.03	0.01	0.01		2.49	
254.35 - 254.55	0.20	biot.gn/	Samme grovk. biot.b.art som over. Godt impr. sl,py,po, litt cp.	0.11	0.13	2.76		12.60	
254.55 - 280.00	25.45	2 gl.gn.alm./ 2 gl.gn.b.p.	rel.lys,mlk-fk. tett. Endel kv.linser og ekstra biot.rike partier.Spredte gr. 1-3 mm. Enkelte flekker skarn.	0.01	0.01	0.04		2.76	254.55 256.00
280.00 - 288.20	8.20	hbl.gn.	rel.lys,mlk-fk. Endel biot-gn-striper. Noen kv.linser Jevnt fordelt gr.1-4mm. Impr. py						

Lokalitet: Hofjellet
Profil 44.410 Y

Borehull: 7203

Dato : Sept./okt. -76
Koordinater : 925.482.5 X 44.398.2 Y
Retning :
Helling/stigning : -55°
Høyde : 109.7 m
Lengde : 333.10

9

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
288.20 - 289.35	1.15	hbl.gn. rel.mørk, mlk.-fk. tett. Hbl. av en mørkere og tettere type enn over. Minner noe om amf. Noe kv.linser, og grovk.hbl. i forb.med disse. Tett besatt gr. 2-4 mm, delvis stichtolitisk							
289.35 - 294.60	5.25	hbl.gn. rel.mørk, mlk. Flekker ren hbl. i forb. med kv.linser rel.mye skarn, jevnt ford. Spredte gr. 1-4 mm. Sv. impr. py							
294.60 - 295.60	1.00	pegm.							
295.60 - 303.20	7.60	hbl.gn. Samme hbl.gn. som over							
303.20 - 304.00	0.80	pegm.							
304.00 - 312.80	8.80	2 gl.gr.b.p. lys, mlk-fk.tett. Endel striper (2-10cm) amf. Disse tett besatt gr. 1-5 mm.	60-70						
312.80 - 323.40	10.60	amf. mørk, mlk-fk. rel.tett, noe biot. Enkelte kv.linser, tett besatt gr. 1-3 mm.							
323.40 - 324.70	1.30	2 gl.gr.b.p. rel.lys, mlk-fk. noe tett endel amf.som tynne striper tett besatt gr.resten 1-3mm							
324.70 - 325.60	0.90	amf. Samme amf. som over							
325.60 - 328.00	2.70	2 gl.gr.b.p. Samme 2 gl.gr. som over							
328.00 - 338.10	10.10	amf. Samme amf. som over. Virker kanskje litt tettere.							

No. 19/11 1976
Kåre M. Hegrum
Geolog

Lokalitet: Mofjellet

Dato : Sept. 1976

Koordinater : X: 925.566,55 Y: 44.878,30

Borehull: 7602

Retning :

Helling/stigning : - 90° (loedd) Arviksmålt

Høyde : + 175,84

Lengde : 334,35

1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	Jordboring							
1.00 - 1.60	0.60	2 gl.gn.b.p.	ca. 70°						
		mellomk., noe musk., m.sv. py-impr.							
1.60 - 2.05	0.45	skarn.b.a.							
		lys, mellomk. en god del skarn? noen anhydritt-flekke? diopsid?							
2.05 - 3.25	0.80	bio.gr.med amtpreg.							
		mørk, mellomk. endel hornbl. stedvis gr. 1-6 mm, skarn							
3.25 - 4.00	0.75	bio.gr.m/amt-preg.							
		noe lysere enn over, noe gn, 1 mm, mellomk. D?, m.sv.py-impr.							
4.00 - 5.85	1.85	hornbl.gn.	60-70°						
		mørk, mellom-fink., gn. 1-3 mm. noe hornbl.epidotsoner							
5.85 - 6.30	0.45	2 gl.gn.b.d.							
		fink. gr. 1-10 mm lys, skarn							
6.30 - 9.40	3.10	hornbl.gn.							
		fin-mellomk.epidot-rike partier. bandet, avtar mot slutten.							
9.40 - 12.15	2.75	2 gl.gn., alm.							
		fin-mellomk. homogen, lys litt spredd gn.							
12.15 - 26.00	13.85	" " "							
		fin-mellom. homogen, lys litt gr. 1-2 mm. noen få 5 cm. mørk bio.gn.							
26.00 - 36.65	10.65	2 gl.gn.b.p.							
		mellomk.-fink., gr. 1-10 mm noe skarn.							
36.65 - 40.00	3.35	2 gl.gn.b.d.							
		fink, noe hbl., gr. 1-2 mm skarn							
40.00 - 42.30	2.30	hbl.gn.							
		mørk, mellomk., litt gn, noe spredd 1-3 mm, skarn litt pv. i forh. med kv. stripe på 42.25							

Lokalitet: Mofjellet

Dato : Sept. 1976

Koordinater : X: 925.566,55 Y: 44.878,30

Borehull: 7602

Retning :

Helling/stigning : - 90°

Høyde : + 175,84

Lengde : 334,35

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
42.30 - 53.05	10.75	Amf.	mørk, fin-mellomk., endel kv.striper som virker plyomatisk foldet, enkelte steder også kalksp.striper 42.30-47.00: gr. jevnt fordelt 1-2 mm, 47.00 - 53.05: større vekslng i gr.størrelsen, 2-15mm stedvis flekker av hbl. og skarn.						
53.05 - 53.50	0.45	kvarts b.art	endel biotitt, og spredte gn. 1-2 mm. Flekk med amf. som går 1/3 gjennom kjer- nen på 53.35						
53.50 - 69.80	16.30	amf.	samme amf. som over med samme karakteristiske størrelsen på gn. avtar fra ca. 62.50 til 1-3 mm.						
69.80 - 71.25	1.45	2 gl.gn.b.d.	lys, fin-mellomk. homogen tett besatt gr. 1-3 mm						
71.25 - 77.25	6.00	amf.	mørk, fink-mellomk. endel kv.striper, av og til med kalksp. gr. jevnt fordelt 1-3 mm, stedvis flekker av skarn. Enkelte tynne striper med 2 gl.gn.						
77.25 - 80.90	3.65	2 gl.gn.b.d.	rel. lys, tett, fink. enkelte tynne striper amf. til å begynne med. Peprer med gr. 0.5-2 mm.						
80.90 - 81.35	0.45	pegm.	m. grovk.						

Lokalitet: Mofjellet

Dato : Sept. 1976

Koordinater : X: 925.566,55 Y: 44.878,30

Retning :

Borehull: 7602

3

Helling/stigning : - 90°

Høyde : + 175,84

Lengde : 334,35

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
81.35 - 81.55	0.20	2 gl.gn.b.d. tett, fink- gr. 1-2 mm							
81.55 - 81.90	0.35	Pegm.b.art. grovk. Endel biotitt m. sv. spor av po.							
81.90 - 82.95	1.05	2 gl.gn.b.d. lys, fink.tett, gr. jevnt fordelt 1-3 mm.							
82.95 - 83.50	0.55	biot.gn. striper av kv. endel hbl. og skarn i forb.med disse jevnt fordelt gr. 1-2 mm							
83.50 - 84.60	1.10	amf. mørk, fink.litt hbl. i forb med kv.striper jevnt ford. gr. 1-3 mm.	60°						
84.60 - 90.00	5.40	2 gl.gn.b.p. lys, fin-mellomk. jevnt ford. gr.1-3 mm.Enkelte steder skarn.	60°						
90.00 - 100.00	10.00	Ved et uhell er denne kasse blitt veltet og kjernene ramlet ut. De er lagt tilbake igjen, men rekkefølgen er helt omstokket. Bergarten som opptar hele kassen ser ut til å være den samme som over, nemlig en 2 gl.gn.b.p., med jevnt fordelte gr. 1-3 mm.							
100.00 - 110.00	10.00	2 gl.gn.b.p. Samme karakteristikk som over.							
110.00 - 130.00	20.00	Også disse kasser er blitt veltet og kjernene ramlet. Men kjernene er kommet tilbake i riktige kasser, selv om rekkefølgen er stokket helt om. Bergarten ser ut til å være den samme som tidligere, nemlig 2 gl.gn.b.p. med jevnt fordelte gr.1-3 mm, og enkelte flekker skarn. I kassen 120.00-130.00 ser det dog ut til							

å være litt mere kvarts-striper/pegm. enn tidligere.

Lokalitet: **Mofjellet**Dato : **Sept. 1976**Koordinater : **X: 925.566,55 Y: 44.878,30**

Retning :

Helling/stigning : **- 90°**Høyde : **+ 175,84**Lengde : **334,35**Borehull: **7602**

4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
130.00 - 131.60	1.60	2 gl.gn.b.p.	Samme karakteristikk som over.						
131.60 - 133.80	2.20	2 gl.gn.alm.	lys, mellom-fink. Enkelte steder kalksp. og skarn i forb. med kv.striper. gr. sporadisk 1-2 mm. 132.75-132.90 blanding av 2 gl.gn.alm. grovk.biot.gn. og kv.						
133.80 - 136.35	2.55	2 gl.gn.alm.+ biot.gn.	skillet mellom disse b.a. går omtrent langs kjernen. foldet biot.gn. er mørk fin-mellomk. og er jevnt fordelt med gr. 1-3 mm. Har også en god del skarn. 2 gl.gn. er lys fin-mellomk. tett. Fører ikke gr.						
136.35 - 137.70	1.35	2 gl.gn.alm.	lys, fin-mellomk. tett, stedvis gr. 0.5-2 mm.						
137.70 - 137.90	0.20	2 gl.gn.alm.+ biot.gn.	opptreden som tidligere nevnt, med skille langs kjernen.						
137.90 - 147.10	9.20	2 gl.gn.alm.	lys, fin-mellomk. tett sporadisk opptr. av biot.gn. flekker helt til å begynne med sporadisk gn. 1-3 mm.						
147.10 - 147.25	0.15	Pegm.	m. grovk.						
147.25 - 155.75	8.50	2 gl.gn.alm.	Samme karakteristikk som over.						

75-80°

Lokalitet: Mofjellet

Borehull: 7602

5

Dato : Sept. 1976

Koordinater : X: 925.566,55 Y: 44.878,30

Retning :

Helling/stigning : - 90°

Høyde : + 175,84

Lengde : 334,35

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
155.75 - 156.65	0.90	biot.gn. mørk, mellomk. svært mye skarn.							
156.65 - 160.30	3.65	2 gl.gn.alm. lys, fin-mellomk.tett sporadisk opptr.av gn.1-2m noen få tynnere(1-2cm) striper mørk biot.gn.							
160.30 - 167.00	6.70	hbl.gn. mørk, mellom-fink.biot.rik partier med nærmest biot.gn. jevnt fordelt tett besatt gr. 1-2 mm,sv.impr.py.							
167.00 - 167.30	0.30	kv.linse endel biot. gr. 1-2 mm litt hbl.							
167.30 - 179.00	11.70	hbl.gn. mørk, med biot.gn.-rike partier. Tett besatt gr. 1-2 mm, enkelte steder opptil 4 mm. impr. py. store gn.(3-15 mm)i området 171.80-173.20.							
179.90 - 182.20	3.20	2 gl.gn.b.p. rel.lys mellomk. Endel hbl.gr. 1-2 mm. impr. py enkelte biot.rike lag.	60						
182.20 - 185.00	2.80	2 gl.gn.alm. lys,mellomk. Enkelte b.d. lag sv. impr. py. Enkelte gr. 1-2 mm. kj.tap 184.00-184.75							
185.00 - 194.30	9.30	2 gl.gn.b.p. rel.lys fin-mellomk. flekk med hbl.,gr. 5-7 mm, skarn og kv.på 185.00-185.05 spredte gr. 1mm. rel smale biot.rike partier med gr. 2-5 mm.							

Lokalitet: **Mofjellet**Dato : **Sept. 1976**Koordinater : **X: 925.566,55 Y: 44.878,30**Borehull: **7602**

Retning :

Helling/stigning : **- 90°**Hoyde : **+ 175,84**Lengde : **334,35**

6

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
194.30 - 206.05	11.75	2 gl.gn.b.d. rel. lys,fin-mellomk. Stedvis tynne hbl.-rike partier tett besatt gr. 1-3 mm sv. impr. py.	60-70°						
206.05 - 208.50	2.45	2 gl.gn.alm. lys-mellomk. tett besatt gr. 1-3 mm. enkelte meget biot-rike striper, som er impr. py.							
208.50 - 227.55	19.05	2 gl.gn.b.d. litt veksling med 2 gl.gn. alm. helt til å begynne med. mellomk. tett besatt gr. 1-3 mm. Jevnt, noe svakt impr. py. sterkere ved biot.-rike partier							
227.55 - 229.55	2.00	Kjernetap							
229.55 - 231.30	1.75	2 gl.gn.b.d. Samme b.art. som over, med samme karakteristikk							
231.30 - 233.50	2.20	Kjernetap							
233.50 - 236.60	3.10	2 gl.gn.b.d. Samme b.a. som over, med samme karakteristikk							
236.60 - 240.00	3.40	2 gl.gn.b.gr. re.lys. mellomk. gr.jevnt fordelt 1-3 mm.Enkelte mere biot.rike partier							
240.00 - 248.60	8.60	2 gl.gr.b.d. rel.mørk mellomk. gr.1-5 mm. jevnt fordelt. Stedvis svake spor av py. Enkelte flekker med hbl.	60-70°						
248.60 - 250.20	1.60	musk.gn. lys,mellomk.hoveds. muskovitt,men enkelte biot.-rike partier.Disse har litt granater 1-1.5 mm.							

Lokalitet: Mofjellet

Dato : Sept. 1976

Koordinater : X:925.566,55 Y:44.878,30

Retning :

Borehull: 7602

7

Helling/stigning : $\rightarrow 90^{\circ}$

Høyde : + 175,84

Lengde : 334,35

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
250.20 - 261.60	11.40	2 gl.gn.b.p.	rel. lys, mellom-fink. stedvis partier som er mere biot eller musk.- rikere. Rel. jevnt fordelt gr. 1-3 mm.						
261.60 - 264.50	2.90	2 gl.gn.alm.	lys, mellom-fink. Av og til gr. 1-3 mm.						
264.50 - 268.90	4.40	amf.	mørk, fin-mellomk. En del tynne kv.fylte stikk med S=ca.20°. Enkelte kv.str. Litt tykkere med S=ca.80- 90°. Stedvis gr. 1-3 mm.						
268.90 - 271.60	2.70	2 gl.gn.b.p.	rel. lys, fin-mellomk. stedvis gn. 0.5-1 mm. jevnt impr. py.						ca. 70°
271.60 - 273.35	0.95	hbl.gn.	rel.mørk, fin-mellomk. tett besatt gn. 1-2 mm.						
273.35 - 276.00	3.45	2 gl.gn.b.p.	rel. lys, fin-mellomk. Enkelte hbl.-rike partier Jevnt besatt gr. 1-3 mm. Jevnt impr. py.						
276.00 - 278.35	2.35	hbl.gn.	rel.mørk, fin-mellomk. Enkelte partier med 2 gl. gn.b.p. Disse er py-impr. Jevnt besatt gn. 2-4 mm						
278.35 - 281.25	2.90	hbl.-biot.gn.	rel.mørk, fin-mellomk. En god del skarn, delvis jevnt fordelt. Noe spredte gr. 1-3 mm.						

Lokalitet: **Mofjellet**Borehull: **7602**

8

Dato : **Sept. 1976**Koordinater : **X:925.566,55 Y:44.878,30**

Retning :

Helling/stigning : **- 90°**Hoyde : **+ 175,84**Lengde : **334,35**

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
281.25 - 283.10	1.85	2 gl.gn.b.p.	Tett, fin-mellomk. Jevnt fordelt gr. 1-3 mm.						
283.10 - 289.60	6.50	hbl.-biot.gn.	Rel.mørk, fin-mellomk. En god del skarn, delvis i "klumper" Tett besatt gr. 1-3 mm.	ca. 70°					
289.60 - 290.00	0.40	2 gl.gn.alm.	rel.lys, mellomk.endel biot.-rike partier. Jevnt besatt gr. 1-3 mm.						
290.00 - 298.05	8.05	hbl.gn.	Rel.mørk, fin-mellomk. Endel partier med biot-gn. Jevnt fordelt skarn, samt også i "klumper" Jevnt tett besatt gr. 1-4 mm.						
298.05 - 301.00	2.95	2 gl.gn.alm.	lys, fin-mellomk. tett sporadisk gr. 1-2 mm.						
301.00 - 301.20	0.20	amf.	mørk. fink. Enkelte små-flekker skarn. Tett besatt gr. 2-5 mm.						
301.20 - 304.90	3.70	2 gl.gn.alm.	Samme b.art som over. Enkelte tynde striper hbl. gn. med skarn.						
304.90 - 305.10	0.20	amf.	Samme som over.						
305.10 - 307.80	2.70	2 gl.gn.alm.	Samme b.art som over.						
307.80 - 308.10	0.30	amf.	Samme b.art som over.						

Lokalitet: **Mofjellet**Dato : **Sept. 1976**Koordinater : **X:925.566,55 Y:44.878,30**Borehull: **7602**

Retning :

Helling/stigning : **- 90°**Hoyde : **+ 175,84**Lengde : **334,35**

9

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
308.10 - 317.20	9.10	2 gl.gn.b.p. lys, mellomk. Likner meget på 2 gl.gn.alm. over, men noe mere biot. Enkelte biot. gn-rike partier. Disse tett besatt gr. 1-3 mm. Ellers bare spredte gr. 1 mm i b.-arten. Mellom 315.20 og 317.20 en del smale (5-10cm) striper amf., som tidligere beskrevet.	70-80°						
317.20 - 322.00	4.80	2 gl.gn.b.d. rel. lys, fin-mellomk. Endel spredte gr. 1-3 mm. Stedvis småflekker skarn.							
322.00 - 326.05	4.05	amf. mørk, fink. rel. tett. Tett besatt gr. 2-4 mm.							
326.05 - 328.45	2.40	2 gl.gn.b.d. Rel. lys, mellom-fink. Enkelte skarnflekker. Tett besatt gr. 2-4 mm.							
328.45 - 330.10	1.65	biot.gn. mørk, fin-mellomk. Endel amf. Noen kv. linser. Tett besatt gr. 1-2 mm.							
330.10 - 331.20	1.10	2 gl.gn.b.d. rel. lys, fin-mellomk. Tett besatt gr. 1-3 mm.							
331.20 - 332.20	1.00	hbl.gn. mørk, fin-mellomk. Endel biot. Noen linser (10cm) kv. Tett besatt gr. 1-2 mm.							
332.20 - 333.00	0.80	2 gl.gn.b.d. Samme b. art som over							
333.00 - 334.35	1.35	hbl.gn. mørk, fin-mellomk. Endel biot. Noen kv. linser, og partier med ren hbl. Tett besatt gr. 1-2 mm.							

Fortegnelse over forkortelser og udtryk i borekernebeskrivelserne for hull 7502, 7504 og 7601:

Vigtigste bjergartsforkortelser: bjergartsenheder som i Mofjell rapporterne 1974-1976.

2 gl. gn., alm.	to-glimmergnejs, almindelig type, med nogenlunde lige meget biotit og muskovit
2 gl. gn., b.p.	to-glimmergnejs, biotit præget type, hvor biotit dominerer over muskovit indholdet
2 gl. gn., b.d.	to-glimmergnejs, biotit domineret type, næsten udelukkende med biotit. Muskovit oftest kun til stede som discordant muskovit.
biot. gn.	biotit gnejs
mask. gn.	muskovit gnejs
hbl. gn.	hornblende gnejs
amf.	amfibolit
pegm.	pegmatit
D. gn. type	disthængnejs type
Kärv gn.	Kärv gnejs, gnejs med prismatisk amfibol af brunsort farve

Strukturelle udtryk:

Steilt foldet, vertikalt foldet, lodret foldet,
foldet om lodret, foldet om vertikal.

angiver denne foldestil



Spidst foldet, flad foldet.

angiver denne foldestil



PbS, ZnS: er understregede i beskrivelserne

Forkortelser:

alm.	almindelig
baryt (?)	formodet baryt
biot.	biotit
br.	brun
cl.	chlorit
c.p.	chalcopirit
D	disthen
D?	disthen, usikker identifikation
(D)	bleg grønlig Mg-chlorit, fra Omdannet disthengnejs
delv.	delvis
discord.	diskordant
fink.	finkornet
gl.	glimmer
gn.	gnejs
gr.	granat
grovk.	grovkornet
hbl.	hornblende
hom.	homogen

hor.	horisont
impr.	imprægation, imprægneret
incl.	inklüsiv
indh.	indhold
lign.	lignende
m.	med
maf.	mafisk
mlk	melleinkornet
musk.	muskovit
omd.	omdannet
py.	pyrit
rel.	relativ
stign.	stigende
sv.	svag
tern.	terninger
u.	uden
u. ordn.	underordnet, underordnede
var.	varierende

Lokalitet: Mofjellet

Dato : 1976

Koordinater : ~~X = 501.40, Y = 872.60~~ X = 925.501.40, Y = 44.872.60

Retning :

Borehull: 7601

Helling/stigning : lodd.

avviksmålt

Høyde : 193,70 m

Lengde : 325,30 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
1-2	2,00	Les jord							
2-4	4,15	2 gl.gn lign. hol.gn.	mørk, en del hbl., sv.py.impr.	50°					
4-5			lidt gr, spredt nåle av gullig skarn	33°					
5-6,15				30°					
6,15-6,25	0,10	Pegm.							
6,25-7	2,75	hbl.-biot.gn	Sv.py.impr.	14°					
7-8			mlk. Sv.py.impr. tiltagende hbl.insh.	55°					
8-9			nedeffer m. gullig skarn insh.	55°					
9-10	2,00	biot.gn, D-gn.type	mlk, sv.py.impr., med hbl., brün.biot.	45°					
11-12	1,00	hbl.gn, m.biot.gn.	rel.lys, mlk, sv.py.impr., hbl.gn og biot.gn vekster i lag. lidt karr.gn.	52°					
12-13	3,40	biot.gn, D-gn.type	mlk, sv.py.impr., rel.lys, brün.biot.	28°					
13-15,40			lidt hbl. nedeffer	24°					
15,40-16,70		Hbl.gn. næsten m.	mlk, sv.py.impr., ofte rel.stort	12°					
16,70-17,55	0,85	ly af biot.gn (D.gn)	indh. af jævnt fordelt gullig epidotskarn	16°					
17,55-17,80	0,25	2 gl.gn., b.d-bp	lys, fink., anelse py.impr., få gr.	15°					
17,80-19,00	1,20	2 gl.gn., b.d	mørk.						
19,00-20,00	1,00	2 gl.gn., bp	lys, fink., anelse py.impr., få gr.						
20,00-21,50	1,50	biot.gn, båndet	flere bånd nige på hbl., rel.lys, mlk.	21°					
		2 gl.gn., b.d.	minder lidt om biot.gn., 2 cm tynde amfibol nige lag nederst	12°					
21,50-22,65	1,15	biot.gn., D-gn.type	mlk, brün biot., sv.py.impr.	foldet					
22,65-22,75	0,10	Pegm.							
22,75-23,20	0,45	2 gl.gn. n.d	jævn overgang til biot.gn. overover						
23,20-24,60	1,40	biot.gn.	stærkt ret 2. gl.gn. lign	15°					
24,60-27,35	2,75	2 gl.gn., alm.type	lys, næsten u. gr., inat på et par 2 og 4 cm biot.nige lag	20°					

Lokalitet:

Borehull: 7601

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Hoyde :

Lengde :

side 2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
27,35 - 28,80	1,45	2 gl. gn., b.p.	lys, næsten u. gr.						
28,80 - 28,81	0,01	Kalkspat m. py.							
28,81 - 30,00	1,19	2 gl. gn.	fin-mik., lidt D. gn. lign., py. impr.						foldet
30,00 - 30,50	0,50	2 gl. gn., b.p.	lys, anelse py. impr.						foldet
30,50 - 30,55	0,05	kvarts							
30,55 - 32,00		2 gl. gn., b.p.	lys						33°
32,00 - 33,00		2 gl. gn., alm. - b.p.	Jævne overgange						43°
33,00 - 33,90	3,35	2 gl. gn., b.d.	et par 2 cm amf. lag						29°
33,90 - 34,00	0,10	Pegm.							
34,00 - 34,50	0,50	2 gl. gn., b.d.	delvis lidt biot. gn. lign., gr., lidt (D)						25°
34,50 - 34,75	0,25	Pegm.							
34,75 - 36,25	1,50	2 gl. gn., b.d.	Stictolitisk, gr. ng						23
36,25 - 38,00	1,75	2 gl. gn., b.p. - b.d.	lidt gr., enkelte mm tykke Chlorit førende lag						31
38,00 - 41,00	3,00	2 gl. gn., b.p. - b.d.	noget få 1 cm tykke foldede mørke lag						Kraftig småfoldet, 45°
41,00 - 43,00	2,00	2 gl. gn., b.d.	homogen med stigende gr. nedefter						foldet 33°
43,00 - 46,00	3,00	2 gl. gn., b.p. - alm.	midt på u. gr., nederst spredt gr.						Stærkt småfoldet
46,00 - 49,00	3,00	2 gl. gn., alm.	u. gr.						Småfoldet, 22°
49,00 - 54,95	5,95	2 gl. gn.	anelse gr., massiv, hom., fra 53,00 -						Kraftig småfoldet, 18, 21°
54,95 - 54,98	0,03	Pegm.	53,65 m: tynde foldede biot. rige lag						
54,98 - 55,10	0,12	2 gl. gn., alm.	u. gr.						foldet
55,10 - 55,15	0,05	Pegm.							
55,15 - 57,00	1,85	2 gl. gn., alm. - b.p.	lidt gr. nedefter, rel. mørk nederst						foldet 25°, 5°, 17°
57,00 - 58,00	1,00	2 gl. gn., b.p. - b.d.	lidt gr.						Småfoldet
58,00 - 59,50	1,50	2 gl. gn., b.p.	Spredt gr., lys.						- u - 18°
59,50 - 61,00	1,50	2 gl. gn., b.p.	stictolitisk, massiv.						Strejt foldet
61,00 - 61,90	0,90	2 gl. gn., alm.	delvis stictolitisk						- " -
61,90 - 62,00	0,10	Pegm.							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7601

Helling/stigning :

Hoyde :

Lengde :

Side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
62,00 - 63,00	6,30	2 gl. gn., b.p.	øverste lys, stictolitic, nederst mørk						
63,00 - 65,00		2 gl. gn., alm.	lys, homogen, delvis stictolitic						
65,00 - 67,00		2 gl. gn., b.d.-b.p.	lys, stictolitic						
67,00 - 68,30		2 gl. gn., b.d.-b.p.	lys, spredt gr.						
68,30 - 68,31	0,01	2 gl. gn., b.d.	anelse FeS						
68,31 - 70,00	1,69	2 gl. gn., b.d.	massiv, stictolitic						
70,00 - 72,00	1,00	2 gl. gn., b.d.	rel. mørk, lidt gr., spor af py?						
72,00 - 73,00	1,00	2 gl. gn., alm.-b.p.	rel. mørk, lidt gr., spor af FeS (s. Py?)						
73,00 - 73,65	0,65	2 gl. gn., b.p.-b.d.	rel. mørk, lidt gr.						
73,65 - 73,80	0,15	Pegm.							
73,80 - 75,00	1,20	2 gl. gn., b.d.	rel. mørk, gr., incl. 5 cm maf. biot.						
75,00 - 76,00	3,20	2 gl. gn., b.p.-b.d.	ret massiv, få gr.						
76,00 - 78,00		2 gl. gn., alm.-b.p.	næsten u. gr.						
78,00 - 78,20		2 gl. gn., alm.-b.p.	spredt gr., spor af py?						
78,20 - 78,35		Pegm.							
78,35 - 80,90	2,55	2 gl. gn., alm.	lys, næsten u. gr.						
80,90 - 81,00	0,10	Pegm.							
81,00 - 83,20	2,20	2 gl. gn., alm.	lys, massiv, næsten u. gr.						
83,20 - 83,45	0,25	Pegm.							
83,45 - 86,55	3,10	2 gl. gn., alm. (-b.p.)	lys, massiv, næsten u. gr.						

Lokalitet:

Borehull: 7601

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Højde :

Længde :

Side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
86,55 - 86,60	0,05	Pegm.							
86,60 - 87,50	0,90	2 gl. gn., alm.	ā. gr., øverst spor af py.						
87,50 - 90,00	2,50	2 gl. gn., bp.	homogen, stictolitisk						
90,00 - 91,90	1,90	2 gl. gn., b.d. (-b.p)	gr.						
91,90 - 92,50	0,60	Amf.	rig på gr., underordn. biot.						
92,50 - 92,60	0,10	Pegm.							
92,60 - 93,00	0,40	Amfibolit	rig på gr., underordn. biot.						
93,00 - 93,40	0,40	2 gl. gn., b.d.	rig på gr., massiv						
93,40 - 95,50	2,10	Amfibolit	rig på gr. (ofte 1 cm store), underordn. biot. (størst nederst)						
95,50 - 96,00	0,50	2 gl. gn., b.d.	gr.						
96,00 - 106,60	10,60	2 gl. gn., b.d.	rig på små gr., massiv, delvis stictolitisk						
106,60 - 107,10	0,50	Amfibolit	fink., foldelækning.						
107,10 - 110,60	3,50	2 gl. gn., b.d.	rig på gr., massiv, mest stictolitisk						
110,60 - 111,10	0,50	Amf. / 2 gl. gn. b.d.	Amf. og 2 gl. gn. danner hver sin halvdel af kernen						
111,10 - 112,80	1,70	2 gl. gn., b.d.	øverste halvdel lys, rig på 1-2 mm gr.						
112,80 - 113,00	0,20	2 gl. gn., b.d.	amfibolitisk præg						
113,00 - 114,00	1,00	2 gl. gn. b.d.	rig på gr., med tynde maf. lag						
114,00 - 115,20	1,20	2 gl. gn. b.d.	massiv, små gr., stictolitisk						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7601

Side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
115,20 - 115,30	0,10	Pegm.							
115,30 - 117,00	8,45	2 gl. gn., b.d.	massiv, små gr., stictolitisk	?					
117,00 - 118,00		— do. —	— do. —	?, 47°					
118,00 - 119,00		— do. —	— do. —	70°					
119,00 - 120,00		— do. —	— do. — anelse skarn nedent	82°					
120,00 - 121,00		— do. —	— do. —, lidt mørk	80°					
121,00 - 123,75		— do. —	— do. —, større gr.	?					
123,75 - 124,20	0,45	2 gl. gn., b.d.	massiv, lys, stictolitisk, rig på små gr.	48°?					
124,20 - 125,75	1,55	2 gl. gn., b.d.	massiv, stictolitisk, tynde maf. lag nedent	57°					
125,75 - 128,00	2,25	Amf./ (maf. biot gn)	gr, størst indh. af biot. øverst	foldet? 17°, 36°					
128,00 - 131,00	3,00	Amfibolit	gr, underordn. biot.	foldet - stejl foldet					
131,00 - 133,05	2,05	mafisk biot gn/Amf	rig på gr., hol. førende, sv. py-Fes impr.	?					
133,05 - 133,80	0,75	Amfibolit	gr.	foldet, 46°					
133,80 - 136,00	2,20	2 gl. gn., b.d.	massiv, ret lys, få små gr.	Stejl?					
136,00 - 137,00	8,45	Amfibolit	rig på gr., hbl./biot stiger nedent	49°					
137,00 - 138,00		— do. —	små gr., lidt bi	vertikalt foldet, 63°					
138,00 - 139,70		— do. —	ret massiv, rig på 1-2 mm gr.	33°					
139,70 - 141,50		— do. —	fink, ret få gr., biot. færdig	30°, 28°					
141,50 - 143,00		— do. —	massiv, ret få gr., incl. 4 stk. 5-10 cm Pegm.	14°-7°					
143,00 - 144,45		— do. —	massiv, små gr.	foldet					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7601

Side 6

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
144,5 - 144,80	0,35	Amfibolit	ret biot. rig, sv. py. impr.	foldet, 11°, 40°					
144,80 - 146,00	4,35	Amfibolit	spredt gr., lidt biot.	22°					
146,00 - 149,15		— do. —	fink., massiv, rig på små gr., lidt biot.	?					
149,15 - 149,25	0,10	Pegm.							
149,25 - 150,70	14,50	Amfibolit	ret massiv, stigende gr. indh. nederst	34°, 33°					
150,70 - 151,55		— do. —	gr. rig, rel. stort biot. indh.	37°					
151,55 - 154,00		— do. —	gr. rig, lidt biot.	foldet, 29°, 35°					
154,00 - 156,00		— do. —	små gr., lidt biot.	foldet, 45°, 40°					
156,00 - 157,00		— do. —	gr. rig (nederst 2-5 mm store) lidt biot.	foldet, 37°					
157,00 - 158,00		— do. —	gr. rig, lidt biot.	57, foldet					
158,00 - 159,00		— do. —	gr., massiv	53					
159,00 - 160,00		— do. —	gr. rig (2-7 mm store), ret massiv	52					
160,00 - 161,00		— do. —	gr. rig (mindre gr.), ret massiv	steilt foldet, 82°					
161,00 - 163,00		— do. —	gr., ret massiv.	41°, 7°					
163,00 - 163,75		— do. —	små gr. ret massiv.	32°					
163,75 - 163,85	0,10	2 gl. gn., b. d.							
163,85 - 163,95	0,10	Amfibolit							
163,95 - 164,15	0,20	2 gl. gn., b. d.	ret lys, små gr.						
164,15 - 165,00	0,85	Amfibolit	fink. mlk., gr., lys, nistret	26°					
165,00 - 166,35	1,35	Biot. gn., ret mørk	fink., små gr., sv. py. impr., spor af (D) stign. indh. nederst	30					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7601

Side 7

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
166,35 - 170,00	9,25	Amfibolit	små gr., underordn. biot., spor af (D), Spor-meget svag py. impr.	20°, 27°					
170,00 - 171,00		Amfibolit	gr., lidt biot	foldet 32°					
171,00 - 172,00		— do —	små gr., lidt biot.	35°					
172,00 - 173,00		— do —	rig på små gr., en del biot., sv. py. og fcs	39°, 30°					
173,00 - 174,00		— do. —	små gr., stedsvis lidt biot. sv. py. impr.	foldet 37°					
174,00 - 175,60	0,03	— do. —	små gr., ret massiv, delvis spor af py.	35°					
175,60 - 175,63		Skarn	grå grøn, py. impr.						
175,63 - 178,00	4,02	Amfibolit	rig på 1-2 mm gr., ret massiv, lidt biot.	seglet foldet, 30°?					
178,00 - 179,65		— do. —	ret massiv, rig på 1-2 mm gr.	?, 22°					
179,65 - 184,00	17,48	2 gl. gr. b.d.	fin, homogen, massiv, Stictolitisisk	8°, 13°, 8°					
184,00 - 187,00		— do. —	— do. —	?, (fladt)					
187,00 - 188,00		— do. —	— do. —	6°?					
188,00 - 191,00		— do. —	— do. —	?					
191,00 - 192,00		— do. —	— do. —	39°?					
192,00 - 193,00		— do. —	— do. —	fladt?					
193,00 - 195,00		— do. —	— do. —	fladt?					
195,00 - 196,00		— do. —	— do. —	ret skel?					
196,00 - 197,13		— do. —	— do. —	foldet 41°, 8°					
197,13 - 198,01	0,88	Amfibolit	massiv, gr., lidt biot. næsten	20°					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7601

Side 8

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
198,01 - 198,80	0,79	2 gl. gn, b.d.	fin mlk., gr.	46°						
198,80 - 199,55	0,75	2 gl. gn, b.d.	fin mlk., gr., lidt mørkere, øverst lidt	foldet, ret stejt						
199,55 - 200,15	0,60	2 gl. gn, alm.	lidt gr., anelse cl.							
200,15 - 201,37	0,22	2 gl. gn, b.d.	fin mlk, gr., discord. mnsk.	26°						
201,37 - 201,40	0,03	Mafisk biot. gn	mlk.	22°						
201,40 - 202,00	0,60	2 gl. gn, b.d.	fin mlk., gr., lidt mnsk., nederst 3 mafiske biot. gn. lag (1-1-4 cm)							
202,00 - 202,78	0,78	2 gl. gn, alm-b.p.	fin mlk., enkelte små gr.	18°						
202,78 - 202,93	0,15	Amfibolit	biot. ng, gr.	34°						
202,93 - 203,64	0,71	2 gl. gn, b.d.	fin mlk, næsten u. gr.	30°						
203,64 - 203,66	0,02	Skarn	grøngrå							
203,66 - 203,84	0,18	2 gl. gn, b.p.								
203,84 - 203,88	0,04	Mafisk biot. gn	mørk, mlk., hbl. førende	15°						
203,88 - 203,98	0,10	2 gl. gn, b.p.	u. gr.							
203,98 - 204,02	0,04	Mafisk biot. gn	mørk, mlk, hbl. førende							
204,02 - 205,00	0,98	2 gl. gn, b.d.	lys, få gr.	11°						
205,00 - 205,88	0,88	2 gl. gn, b.p-b.d.	lys, få gr.	15°						
205,88 - 206,02	0,14	Amfibolit	biot. rig							
206,02 - 206,78	0,76	biot. gn	meget mørk, sv. py. impr., incl. tynde lag 2. gl. gn, alm.	12°						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7601

Side 9

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
206,78 - 208,47	1,69	Amf. (-hbl. gn.)	ret mørk, mest biotitrig, rig på jævnt fordelt gullig skarn. Incl. et par tynde skarnlag						
208,47 - 208,54	0,07	Skarn	grågrøn						
208,54 - 209,00	0,46	Amf. (-hbl. gn.)	mørk, gr., en del biot., rig på jævnt fordelt gullig skarn.						
209,00 - 209,67	0,67	hbl.-biot. gn.	mlk., mørk, små gr., sv. py. impr.						
209,67 - 209,75	0,08	Pegm.							
209,75 - 209,82	0,07	hbl.-biot. gn.	mlk., mørk, små gr., sv. py. impr.						
209,82 - 209,98	0,16	Pegm.							
209,98 - 210,25	0,27	hbl.-biot. gn.	mlk., mørk, små gr., biot. rig, py. impr.						
210,25 - 210,55	0,30	musk. rig gn.	mlk., gl. rig, få gr., br. biot., rigt py. impr.						
210,55 - 210,89	0,34	biot. gn.	mlk., br. biot., py. impr., 2 hbl. gn. lag						
210,89 - 211,00	0,11	musk. rig gn.	mlk., spor gr., gl. rig, br. bi., py. impr.						
211,00 - 211,55	0,55	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., få gr., litt musk., D. py. impr.						
211,55 - 212,05	0,50	musk. rig gn.	mlk., gl. rig, rel. rig på br. biot. som aftager nedetter, u. gr., py. impr.						
212,05 - 212,82	0,77	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., gl. rig, en del musk., Py. impr.						
212,82 - 214,68	1,86	2 gl. gn., alm.	få gr., øverst rel. mlk og musk. rig, Py. ?						
214,68 - 214,92	0,24	Pegm.							
214,92 - 215,38	0,46	2 gl. gn., b.p.	fink., sort biot., få gr.						

Lokalitet:

Borehull: 7601

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

side 10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
215,38 - 215,71	0,33	2 gl. gn., b.p.	Flere 1-4cm tykke lag af maf. mk. biot. gn. foliet						
215,71 - 217,00	4,25	2 gl. gn., alm	lidt gr., enkelte mere biot. rige hor.						16°
217,00 - 218,00		— do. —	lidt gr., enkelte mere biot. rige hor., spor af py.						7°
218,00 - 219,00		— do. —	lidt gr., mere m. sk. rig, spor af py.						11°
219,00 - 219,96		— do. —	lidt gr., mere m. sk. rig, lidt py., lidt (D)						6°
219,96 - 221,29	1,33	2 gl. gn., alm. (-b.p.)	Spor af py., nederst noget chlorit omd.						17°
221,29 - 221,98	0,69	biot. gn., D. gn. type	mk., br. biot., D. rig på 1-4mm gr., py. impr.						5°
221,98 - 222,06	0,08	Skarn	grovk. m. calcit, py. impr (rig)						
222,06 - 223,67	1,61	biot. gn., D. gn. type	mk. - grov mk., br. biot., rig på 1-4mm gr., u. ordn. tynde hbl. gn. hor., py. impr.						15°
223,67 - 223,98	0,31	Pegm.							
223,98 - 225,80	1,82	biot. gn., D. gn. type	mk., - grov mk., br. biot., rig på 1-4mm gr., D, py. impr. (ofte rig), få u. ordn. hbl. gn. hor.						9° 7°
225,80 - 229,00	3,20	biot. gn., D. gn. type	mk., rel. lys, rig på små gr., D, lidt m. sk., u. ordn. hbl. mest som kær, oftest med en del (D), Py. impr. (ofte rig)						20° 20°
229,00 - 230,55	1,55	biot. gn., omd. D. gn. type	mk., grønlig filtet, rig på små gr., rigt py. impr., py. ofte i terninger, Skær, lidt kær tilfældige ned efter						15° 17°
230,55 - 231,60	1,05	kær gn./biot. gn., omd. D. gn. type	mk., kær, ellers som ovenfor						16°
231,60 - 233,05	1,45	biot. gn., D. gn. type	mk., br. biot., rig på små gr., lidt hbl., D, lidt (D), py. impr. delvis i terninger						15°

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Hoyde :

Lengde :

Borehull: 7601

Side 11

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
233,05 - 233,14	0,09	Pegm							
233,14 - 234,30	1,16	Biot. gn	mlk.-fin mlk., rig på gr., stedsvis lidt hbl., øverst ret rig på msk., sv. py impr.						26°
234,30 - 235,00	0,70	2 gl. gn., bp	biot. gn. præg, stedsvis ret gl. rig, jævn overgang til ret mørk 2 gl. gn. bp, spor py.						27° foldet
235,00 - 236,45	1,45	2 gl. gn., alm.	fin mlk., gr., ret gl. rig, spor af py.						foldet
236,45 - 237,40	0,95	— do. —	— do. —, Chloritiseret om sprække på langs						
237,40 - 240,00	6,80	2 gl. gn., alm. (-bp)	fin mlk., gr., stedsvis ret gl. rig, sv. py. impr.						35° foldet
240,00 - 242,00		— do. —	fin mlk., ret mørk, spredt gr., sv. py. impr.						36° foldet
242,00 - 244,20		2 gl. gn., alm.	fin mlk., lidt gr., spor af py., øverst mere b.d. og mørkere						17° 21°
244,20 - 244,57	0,37	2 gl. gn.	m. mørk grovk. diffus afgr. biot. gn. m. lidt py.						
244,57 - 245,65	1,08	2 gl. gn., b.p.	fin mlk., rel. mørk, spredt gr., spor af py.						27°
245,65 - 247,22	1,57	2 gl. gn., alm.-bp	spor af py., øverst chloritiseret om sprække						20°
247,22 - 248,06	0,84	2 gl. gn., b.d.	rel. mørk, spor af py.						22°
248,06 - 250,00	3,18	2 gl. gn., b.d.-bp	massiv, spredte små gr., et par u. ordn. mørkere lag, ved 249,34 m. lidt FeS						42° foldet?
250,00 - 251,24		2 gl. gn. b.p.	lys, massiv, få og små gr.						
251,24 - 252,05	0,81	2 gl. gn., alm.	m. enkelte tynde, diffuse biot. rig. hor.						32° foldet
252,05 - 252,45	0,40	biot.-msk. gn., Dgn?	grov mlk., gl. rig, msk. rig, py. impr.						

Lokalitet: Mofjellet
 Profil 44.880 y

Borehull: 7601

Dato :
 Koordinater :
 Retning :
 Helling/stigning :
 Høyde :
 Lengde :

Side 12

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
252,45 - 253,80	1,35	biot. gn., D. gn. type	mlk., få gr., br. biot., lidt hbl., py. impr. rig	12°, 32°					
253,80 - 254,83	1,03	hbl. gn./biot. gn., D. gn.	py. impr., foldet ind i hiwandem	62°, stejlt foldet					
254,83 - 257,00	3,07	biot. gn., D. gn. type	mlk., hom., få gr., br. biot., lidt hbl., py. impr. ofte rigt, et 3 cm lag hbl. gn.	foldet					
257,00 - 257,90		biot. gn., D. gn. type	mlk., hom., gr., br. biot., lidt hbl., py. impr.	foldet, 21°					
257,90 - 258,35	0,45	Omd. D. gn./hbl. gn.	mlk., br. biot., (D), delv m. kær, py. impr.						
258,35 - 260,00	7,15	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., lidt hbl., py. impr. ofte rigt	foldet 2					
260,00 - 263,00		— do. —	— do. — få gr., D	2°, 28°					
263,00 - 265,50		— do. —	— do. —	11°, 13°, foldet					
			Stigende hbl. indh. nedad, et partynede hbl. på lag						
265,50 - 266,98	1,48	hbl. gn.	u. ordn. m. biot. gn., små gr., rigt py. impr.	25°					
266,98 - 267,51	0,53	hbl. gn.?, leucokrat	stictolitisk, rig på gr., hbl., py. impr.						
267,51 - 270,00	3,21	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., få gr., D?, u. ordn. hbl., stigevis m. musk. indh. nedad, rigt py. impr.	41°, 27, 22° foldet, 24°					
270,00 - 270,72		— do. —	— do. —	D, 11°					
270,72 - 270,83	0,11	hbl. gn.	gr., sv. py. impr.						
270,83 - 271,15	0,32	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., lidt gr., hbl. og musk., D, rigt py. impr.						
271,15 - 271,36	0,21	hbl. gn.	rig på gr., var. indh. af br. biot.						
271,36 - 272,12	0,76	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., lidt gr., musk. og D, rigt py. impr., 2 u. ordn. lag hbl. gn. (13 og 5 cm) køn	14°					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7601

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Side 13

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
272,12 - 272,32	0,20	hbl. gn.	gr., noget stictolithisk, lidt br. biot., sv. impr.	17°					
272,32 - 272,54	0,22	biot. gn., D gn. type	incl. 2 tynde lag hbl. gn., py. impr.	22°					272,55 -
272,54 - 272,60	0,06	biot.-musk. gn. (D gn.)	ZnS holdig, enkel korn., py. impr.						272,84 =
272,60 - 272,68	0,08	biot. gn., D gn. type	py. impr.						0,29 m
272,68 - 272,81	0,13	hbl. gn.	sv. py. impr.	0,32	0,10	1,02	9,8	6,08	
272,81 - 273,03	0,22	musk. rig gn. m. biot.	mlk., gl. rig, domineret af musk., m. 1-3 cm tykke lag rige på br. biot., py. impr., spredt ZnS i striber og enkeltkorn	18°					272,84 -
273,03 - 273,04	0,01	Skarn	grågrøn m. ZnS						273,44 =
273,04 - 273,46	0,42	musk. rig gn. m. biot.	mlk., gl. rig, dom. af musk., m. 1-3 cm tykke lag rige på br. biot., py. impr., spredt ZnS i striber og enkeltkorn	0,78	0,18	1,76	16,3	5,59	0,60 m
273,46 - 273,61	0,15	biot. gn., D gn. type	mlk., br. biot., py. impr.	17°					
273,61 - 274,06	0,45	musk. rig gn. m. biot.	mlk., gl. rig, br. biot. i mm tynde u. ordn. lag, lidt ZnS jævnt fordelt i var. mængde, py. impr.	19°					273,44 -
274,06 - 274,12	0,06	Skarn	grågrøn						275,75 =
274,12 - 275,40	1,28	musk. rig gn. m. biot.	mlk., gl. rig, br. biot. i mm tynde u. ordn. lag, lidt ZnS jævnt fordelt i var. mængde, py. impr.	0,26	0,08	0,45	9,6	3,16	2,31 m
275,40 - 275,43	0,03	Skarn	grågrøn	10°					
275,43 - 276,74	1,31	musk. rig gn. m. biot.	mlk., gl. rig, br. biot. i mm tynde u. ordn. lag, lidt ZnS jævnt fordelt i var. mængde, py. i mor.	0°					275,75 -
276,74 - 276,83	0,09	Pegm.		0,96	0,25	2,87	28,5	6,32	276,08 =
									0,33 m

Lokalitet:

Borehull: 7601

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Side 14

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
276,83 - 277,25	0,42	musk. rig gn. m. biot. mlk, gl. ng, br. biot. i mm tynde u. ordn. lag, lidt spredt <u>ZnS</u> , Py. impr.	7°	0,18	0,11	0,48	5,1	4,38	276,88 - 277,25 = 1,17 m
277,25 - 277,80	0,55	musk. -biot. gn.	7°						
277,80 - 279,00	1,20	musk. ng gn (2 gl. gn.) biot. i åbne spredte nisser, lidt gr, sp. py.	46°, 27°						
279,00 - 279,90	0,90	musk. ng gn. især nederst endel br. biot., py. impr. (delvis ng), lidt spredt <u>ZnS</u>	11° var.	0,22	0,09	0,57	7,1	6,32	
279,90 - 280,00	0,10	pegm.							
280,00 - 280,10	0,10	biot. gn.							
280,10 - 280,84	0,74	musk. rig gn. mlk, rel. mørk, py. impr.	15° var. foldet	0,18	0,09	0,45	6,5	5,59	
280,84 - 280,92	0,08	Skarn	grågrøn						
280,92 - 282,30	1,33	musk. rig gn. mlk, gl. rig, u. ordn. br. biot., py. impr. Stedvis sv. <u>ZnS</u> impr.	foldet 10°						
282,30 - 283,00	0,70	musk. rig gn. mlk, gl. ng, u. ordn. br. biot., sv. py. impr.	9°						
283,00 - 284,00	3,12	2 gl. gn., alm.	11° foldet?						
284,00 - 285,00		2 gl. gn., b.p.	7°						
285,00 - 286,12		2 gl. gn., bp. (b.d.)	foldet?						
286,12 - 286,85	0,73	2 gl. gn., alm.	delvis ret rig på musk., næsten u. gr. flad, foldet						
286,85 - 287,93	1,08	2 gl. gn., b.p.	fink.-fin mlk, spredt gr., tynde musk. nylg.						
287,93 - 288,14	0,21	biot. -hbl. gn. br. biot., lidt grågrøn skarn, Py. impr.	16°?						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Hoyde :

Lengde :

Borehull: 7601

Side 15

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
288,14 - 288,31	0,17	skarn	grågrøn, mlk.					Alt Ag		
288,31 - 288,35	0,04	biot.-hbl. gn.	br. biot., py. impr.							
288,35 - 289,30	0,95	2 gl. gn., b.p.	finn., spredt gr., delvis spættet af lidt grovere biot.	6° foldet						
289,30 - 290,00	3,50	2 gl. gn., alm.	domineres mest af m. sk., biot. delv. br., lidt gr. Spor af py.	foldet						
290,00 - 291,00		— do. —	få gr., spor af py.	41° foldet						
291,00 - 292,00		— do. —	— do. —, delv. m. sk. rig	24° foldet						
292,00 - 292,80		— do. —	— do. —	20°, 22°						
292,80 - 292,85	0,05	Pegm.								
292,85 - 293,91	1,06	2 gl. gn., alm.	lidt gr., delvis m. sk. rig	17°						
293,91 - 293,97	0,06	Pegm.								
293,97 - 294,46	0,49	2 gl. gn., alm.	lidt gr., delvis m. sk. rig	22°						
294,46 - 294,54	0,08	biot. gn.	grovk., gr., py., FeS og cp. impr.							
294,54 - 296,50	1,96	2 gl. gn., alm.	lidt gr., spor af py.	24°, 22°						
296,50 - 298,70	2,20	2 gl. gn., b.p. (alm.)	lidt gr.	52° foldet, 21°						
298,70 - 299,16	0,46	2 gl. gn., alm.	lidt gr., spor af py.	?						
299,16 - 299,17	0,01	Calcit								
299,17 - 299,60	0,43	m. sk. rig gn.	u. ordn. br. biot., rigt py. impr., spor af ZnS	23°						
299,60 - 300,00	0,40	m. sk. rig gn.	u. ordn. br. biot., py. impr., spredt ZnS og PbS impr.	?	0,52	0,16	1,61	13,4	3,16	

Lokalitet:

Borehull: 7601

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Side 16

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
300,00 - 300,20	0,20	2 gl. gn., alm.	ofte rig på m ₂ sk., py. impr., <u>ZnS</u> som impr. og striber.	0,39	0,08	0,81	9,9	4,62	
300,20 - 301,00	0,80	2 gl. gn., alm.	få gr., ofte rig på m ₂ sk., sv. py. impr.						
301,00 - 301,20	0,20	2 gl. gn., alm.	stg. indh. af biot. nedad, py. impr., sv. <u>ZnS</u> impr.						
301,20 - 301,43	0,23	biot. gn.	mlk-grav mlk., lidt m ₂ sk., rigt py. impr.						
301,43 - 301,86	0,43	musk. rig gn.	mlk, lidt br. biot., py. impr., lidt <u>ZnS</u> impr.						
301,86 - 301,90	0,04	biot. rig gn.	mlk., m ₂ sk. holdig, py. impr., <u>ZnS</u> som impr. og striber.						
301,90 - 302,14	0,24	2 gl. gn., b.d.	biot. gn. lign., små gr., sv. py. impr.	27,49, foldet					
302,14 - 302,20	0,06	Skarn							
302,20 - 302,55	0,35	2 gl. gn., b.d.	biot. gn. lign., små gr., sv. py. impr.						
302,55 - 304,30	1,75	2 gl. gn. alm.	ret lys, få gr., øverst spor af py.						
304,30 - 304,58	0,28	2 gl. gn., b.p.	ret lys, få gr.						
304,58 - 304,79	0,21	2 gl. gn., b.p.	m. gravh. biot., py. impr.						
304,79 - 306,00	3,66	2 gl. gn., b.p.	fink., massiv, lidt spredt gr.						
306,00 - 308,00		— do. —	— do. —						
308,00 - 308,45		— do. —	— do. —						
308,45 - 308,60	0,15	Skarn	m. foldet lag af ren biot. (1 og 6 cm)						
308,60 - 309,38	0,78	2 gl. gn., alm.	massiv, lidt spredt gr.						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7601

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Side 17

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	g/g	% Fe	
309,38 - 309,72	0,34	Pegm.					8/t Ag		
309,72 - 310,45	0,73	2 gl. gn., alm.	massiv, lidt spredt gr.						
310,45 - 310,88	0,43	2 gl. gn., alm.	lys, gl. ng, ofte mæsk. ng, mest sv. py. impr., lidt spredt <u>ZnS</u> impr.						
310,88 - 310,90	0,02	Skarn		0,32	0,12	0,72	10,-	3,89	
310,90 - 312,50	1,60	2 gl. gn., alm.	lys, gl. ng, ofte mæsk. ng, mest sv. py. impr., br. biot., lidt spredt <u>ZnS</u> impr.						
312,50 - 313,35	0,85	biot. gn., D. gn. type	mlk., gl. ng, lidt mæsk., br. biot., py. impr.						
313,35 - 313,55	0,20	Skarn	grøvk., grågrøn, skarnbelle?						
313,55 - 314,02	0,47	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., små gr., D. gl. ng, py. impr.						
314,02 - 314,60	0,58	mæsk. ng gn.	mlk., gl. ng, py. impr., spredt <u>ZnS</u> impr.						
314,60 - 315,40	2,08	biot. gn., D. gn. type	mlk., mørk, br. biot., D ₂ , py. impr.	0,04	0,03	0,06	2,1	4,38	
315,40 - 316,68		do.	mlk., hom., mørk, br. biot., D ₂ , ng på gr., u. ordn. hbl. indh.						
316,68 - 318,00	2,57	hbl. gn.	ng på små gr., u. ordn. br. biot., sv. py. impr.						
318,00 - 319,25		hbl. gn.	ng på små gr., en del br. biot., py. impr.						
319,25 - 319,37	0,12	kvarts							
319,37 - 320,00	1,48	hbl. gn.	ng på små gr., u. ordn. br. biot., sv. py. impr.						
320,00 - 320,85		hbl. gn.	gr. ng, stictolitisk, ret massiv, sv. py. impr.						
320,85 - 321,60		biot. gn., D. gn. type	mlk., gl. ng, br. biot., små gr., D, Py. impr.						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7601

side 18

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
321,60 - 324,00	3,50	hbl. gn.	ret amfibolitisk, lidt br. biot., små gr. overalt ng på gullig skarn, sv. py. impr.						45° foldet 35° foldet
324,00 - 325,10		hbl. gn.	øverst amfibolitisk, midtpå ng på biot. spor af. py.						18°
325,10 - 325,15	0,05	Skarn	grovk., grågrøn						8°
325,15 - 325,30	0,15	hbl. gn.							
Hullet blev afsluttet på 325,30 m.									
Beskrivelse udført i Mo i Rana, August 1976									
<i>Mogens Markku</i>									
NB! Gradinadelling: 0-360°									

Lokalitet: Mofjellet

Dato : 1976

Koordinater : X = 925,378,50 Y = 44,887,00

Retning :

Helling/stigning: lodd avviksmålt

Borehull: 7504

Høyde : 216,20 m

Lengde : 334,57 m

Side 1

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 1,43	1,43	Løs jord								
1,43 - 2,15	0,72	maf. (2 gl.) gn.	fin mlk., tet mørk biot.-musk. gn., biot. lidt brünlig, sv. py og FeS impr.	26°						
2,15 - 2,67	0,52	maf. biot. gn.	mlk., mørk amfibolitisk, lysere ned- efter, lidt gr, biot. sort - sv. brünlig, spor af py. og FeS	31°						
2,67 - 4,91	2,24	musk. gn.	fin mlk., stedvis lidt br. biot., sv. (py.) FeS impr.	31°, 32°						
4,91 - 7,80	2,89	2 gl. gn., b.p. - b.d.	fin - fin mlk., lys, hom., nedeftter lidt gr, øverst et par tynde u. ordn. musk. gn. lag	17°, 14° 20°						
7,80 - 8,58	0,78	2 gl. gn., alm.	fin mlk., lys, delvis musk. rig, et par steder spor af py. og FeS	23°						
8,58 - 8,62	0,04	biot. bergart	sort grovk., monomineralisk							
8,62 - 10,16	1,54	2 gl. gn., alm. - b.p.	fin mlk., lys, u. gr., delvis musk. rig, ofteft br. biot., lidt skarn, et par steder spor af py. og FeS	26° 23°						
10,16 - 12,90	2,74	musk. gn. / musk. rig gn.	fin mlk., lys, varierende indh. af br. biot., sv. FeS (og py.) impr.	16°, 20° 25°						
12,90 - 13,24	0,34	2 gl. gn., b.p.	lys, u. gr.	14°						
13,24 - 13,35	0,11	Skarn	grågrøn							
13,35 - 13,51	0,16	2 gl. gn., b.p.	lys, u. gr., incl. 2 cm skarn							
13,51 - 14,09	0,58	maf. biot. gn.	mlk., delv. sort, lidt hbl., u. gr.							
14,09 - 14,60	0,51	2 gl. gn., b.p.	lys, få gr., biot. rig nedeftter	11°						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7504

side 2.

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
14,60 - 14,67	0,07	Skarn	grågrøn m. hbl. og gr.							
14,67 - 15,07	0,40	maf. biot. gn.	mlk., inhomogen, lidt gr.							
15,07 - 15,38	0,31	2 gl. gn., b.p.	fin mlk., u. gr.	10°?						
15,38 - 15,80	0,42	pegm.								
15,80 - 17,45	1,65	2 gl. gn., alm.	fin mlk., hom., lys, u. gr.	20°						
17,45 - 17,73	0,18	pegm.								
17,73 - 18,63	0,90	2 gl. gn., alm.	fin mlk., hom., lys, u. gr.	7°?						
18,63 - 20,95	2,32	maf. biot. gn.	mlk., mest br. biot., lidt hbl., 2-7 mm gr., meget mørk amf. lign.	foldet						
Herefter var der uorden i borekerne kassen til 27,15 m, mindre længder har kunnet samles, men har ikke kunnet knyttes direkte sammen indbyrdes. Men en efter mit skøn ganske sikker sandsynlig fortsættelse er følgende: <u>længde på 0,31 m:</u> "20,95 - 21,26" <u>længde på 0,48 m:</u> "21,26 - 21,74" <u>længde på 0,08 m:</u> "21,74 - 21,82"										
"20,95 - 21,26"	0,31	maf. biot. gn.	fin mlk., lidt gr., mest br. biot., lidt hbl., amfibolitisk	28°						
"21,26 - 21,74"	0,48	maf. biot. gn.	— do. —, u. ordn. lysere biot. gn. lign.	20°						
"21,74 - 21,82"	0,08	maf. biot. gn.	— do. —, lidt grågrøn skarn							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7504

Side 3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
længde på 1,72 m:									
"21,82 - 22,38"	0,56	mark biot. gn.	delvis ret mafisk m. u. ordn. hbl. indh., br. biot., lidt gr., biot. gn. lign.						foldet
"22,38 - 23,49"	1,11	2 gl. gn., alm.	nedad rel. gl. ng, u. gr., spor af py., midt på strøg m. fink. biot. gn. m. br. biot. og sv. py. impr.						35° foldet 16°, 5°
"23,49 - 23,54"	0,05	biot. gn.	mlk., br. biot., spor af py.						
længde på 0,91 m:									
"23,54 - 23,79"	0,25	2 gl. gn., b.p.	spor af gr.						foldet?
"23,79 - 23,92"	0,13	pegm.							
"23,92 - 24,45"	0,53	2 gl. gn., b.p.	lys, u. gr., flere diffuse pegm. nedad						14°
længde på 2,54 m:									
"24,45 - 24,95"	0,50	2 gl. gn., b.p. - alm.	hom. u. gr.						18°
"24,95 - 25,10"	0,15	pegm.							
"25,10 - 25,20"	0,10	2 gl. gn. alm.							
"25,20 - 25,27"	0,07	pegm.							
"25,27 - 26,99"	1,72	2 gl. gn. alm.	gl. ng, u. gr., u. ordn. m. cm-tynde musk. gn. lag m. sv. py. og FeS impr.						17° 13°
mangler (difference) i kassen	0,16								
fra 27,15 m fortsætter kassen på normal vis.									

Lokalitet:

Borehull: 7504

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 4

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
27,15 - 28,32	1,17	2 gl. gn., b. d.	få gr.	foldet, 18°						
28,32 - 28,49	0,17	pegm.								
28,49 - 29,70	1,21	2 gl. gn., alm. - b.p.	mest ū. gr., stedvis spor af py., ret infiseret m. tynde diffust afgr. pegm.	Spidst foldet, 12°						
29,70 - 30,11	0,41	2 gl. gn., alm.	ū. gr.	Spidst foldet						
30,11 - 30,85	0,74	musk. gn.	ū. gr., hom., sv. py., FeS impr.							
30,85 - 32,30	1,45	2 gl. gn., b. d. - b.p.	inhomogen, lidt gr., stedvis mørk biot. gn. lign., i mørke lag spor af py.	foldet 20°						
32,30 - 34,25	1,95	Amfibolit	spredt 2-7 mm gr., ū. ordn. lidt biot., et par tynde lag grågrøn skarn	Stejlt foldet						
34,25 - 34,59	0,34	biot. gn. / hbl. gn.	mørk, mlk., br. biot., få gr., sv. py. impr., ū. ordn. hbl. gn.	Stejlt foldet						
34,59 - 34,73	0,14	pegm.								
34,73 - 38,00	3,27	hbl. gn. / biot. gn., D. gn. type	fin mlk.-mlk., mørk, hovedsagelig hbl. gn. rig på br. biot., stedvis en del ū. ordn. musk., ofte meget rig på 1 mm gr. hist og her lidt (P), py. impr.-sv. py. impr., et par steder py. i terninger	56° stejlt foldet						
38,00 - 38,95	0,95	biot. gn., omdannet D. gn. type	mlk., meget rig på 1-2 mm gr., py. impr., oftest rig på grønlig chlorit (D),	Stejlt foldet						
38,95 - 40,30	1,35	hbl. gn.	m. få tynde indslag af biot. gn., br. biot., gr. rig, delv. stictolitisk, sv. py. impr.	12° foldet?						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7504

side 5

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
40,30 - 40,50	0,20	biot. gn.	mørk, mlk., rig på lmm gr., sv. py. impr.	10°						
40,50 - 40,62	0,12	pegm.								
40,62 - 42,40	1,78	biot. gn., omdannet D. gn. type	mlk.-gråmlk., rig på 1-2 mm gr. meget rig på grønlig chlorit (D), lidt hbl. nederst, py. impr. (Stedvis i terninger)	35° Stejl foldet						
42,40 - 45,21	2,81	2 gl. gn., b.p.	spredt gr., lidt skarn et par steder	foldet 25°, 46°						
45,21 - 45,30	0,09	maf. biot. gn.	meget mørk, rig på gr.	60°						
45,30 - 45,93	0,63	2 gl. gn., bd.-b.p.	hom., rig på små gr., lidt gullig skarn	foldet						
45,93 - 45,95	0,02	kvarter	m. hbl. og 4 mm store py. korn							
45,95 - 46,28	0,33	2 gl. gn., bd.-b.p.	rig på små gr., lidt gullig skarn	29°						
46,28 - 46,34	0,06	maf. biot. gn.	mørk m. gr.							
46,34 - 48,20	1,86	2 gl. gn., b.p.-alm.	lys, rig på små gr., anelse stictolitisk, spredt lidt gullig skarn	27° 13°						
48,20 - 50,70	2,50	2 gl. gn., alm. (-b.p.)	små gr., lidt gullig skarn, stedvis spor af py.	20°, 13°, 26°						
50,70 - 50,80	0,10	maf. biot. gn.	gr., sv. py. impr.							
50,80 - 52,05	1,25	2 gl. gn., b.p.	små gr., jævnt fordelt gullig skarn, enkelte tynde lag grågrøn skarn, et par tynde amfibolitiske lag, flere steder spor af py.	20°						
52,05 - 52,48	0,43	hbl. gn.	lys, inhomogen m. en del biot., jævnt fordelt grågrøn skarn, py. impr.							
52,48 - 52,72	0,24	2 gl. gn., bd.-b.p.	små gr., jævnt fordelt gullig skarn, spor af py.	18°						
52,72 - 52,82	0,10	maf. biot. gn.	gr., skarnrig, py. impr.	24°						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7504

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 6

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
52,82 - 54,88	2,06	2 gl. gn., b. p.	hom., små gr., lidt jævnt fordelt gullig skarn, flere tynde skarnlag, et par steder lidt py. i skarn						
54,88 - 55,07	0,19	Skarn amfibolit	rig på jævnt fordelt skarn, gr., lidt biot.	21°					
55,07 - 55,75	0,68	2 gl. gn., b. d.	gr., jævnt fordelt gullig skarn	23°					
55,75 - 55,83	0,08	Skarn amfibolit							
55,83 - 59,61	3,78	2 gl. gn., b. d.	små gr., hom., jævnt fordelt gullig skarn	25° 33' 30"					
59,61 - 59,81	0,20	pegm.							
59,81 - 60,23	0,42	2 gl. gn., b. d.	lys, massiv, få gr., spor af py.						
60,23 - 60,55	0,32	maf. skarn biot. gn.	4-8 mm gr., rig på jævnt fordelt gullig skarn	foldet					
60,55 - 60,72	0,17	kvarts	m. lidt lys, massiv 2 gl. gn., b. d.						
60,72 - 61,60	0,88	2 gl. gn., b. d.	hom., 1-2 mm gr., lidt jævnt fordelt gullig skarn, nedefter mørkere og mere skarn rig	64° foldet					
61,60 - 62,00	0,40	pegm.	fører biot., m. diffuse strøg 2 gl. gn., b. d.	vertikalt foldet					
62,00 - 68,60	6,60	Skarn amfibolit / maf. skarn biot. gn.	mest amf., rig på gr., meget rig på of-test jævnt fordelt grågrøn skarn	60°					
68,60 - 69,02	0,42	2 gl. gn., alm.		9°					
69,02 - 69,11	0,09	pegm.							
69,11 - 69,37	0,26	2 gl. gn., alm.	lys, få gr.						
69,37 - 69,47	0,10	pegm.							
69,47 - 69,69	0,22	2 gl. gn., alm.	lys, få gr.	9°					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7504

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 7

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
69,69 - 69,86	0,17	pegm.								
69,86 - 71,52	1,66	2 gl. gn., alm.	lys, få gr., anelse skarn i kvarts	13° foldet?						
71,52 - 71,61	0,09	kvarts	en stribe m. FeS							
71,61 - 71,70	0,09	maf. biot. gn.								
71,70 - 72,58	0,88	2 gl. gn., alm.	lidt gr., et par tynde mørke lag	20°						
72,58 - 72,91	0,33	2 gl. gn., b.d.	fin mik., mørk, biot. gn. lign. gr., jævnt fordelt gyllig skarn							
72,91 - 75,25	2,34	2 gl. gn., alm.	få gr., enkelte tynde mørke lag	27°, 35°						
75,25 - 75,53	0,28	biot. amf. m. skarn	fin mik., m. jævnt fordelt grågrøn skarn	46°						
75,53 - 77,79	2,26	2 gl. gn., b.p.	inhomogen, m. flere tynde mørke lag, få gr., anelse gyllig skarn, et par am-lag skarn	31° 24°						
77,79 - 77,98	0,19	pegm.								
77,98 - 78,50	0,52	2 gl. gn., b.p.	lidt jævnt fordelt gyllig skarn, lidt skarn	36°						
78,50 - 78,66	0,16	maf. biot. gn.	ng på jævnt fordelt skarn							
78,66 - 80,70	2,04	2 gl. gn., b.p.	få gr., en del gyllig skarn, et par tyndeskarmlag	27°						
80,70 - 80,88	0,18	pegm.	m. biot. og m. sk.							
80,88 - 80,98	0,10	2 gl. gn., b.d.								
80,98 - 81,34	0,36	pegm.	nederst rig på biot.							
81,34 - 82,75	1,41	2 gl. gn., b.d.	lys, massiv, få gr.	25°?						
82,75 - 83,30	0,55	2 gl. gn., alm./m. sk. gn.	meget lys, u. ordn. br. biot., u. gr.	32°						

Lokalitet:

Borehull: 7504

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 8

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
83,30 - 83,75	0,45		20°						
83,75 - 84,00	0,25	maf. biot. gn.	mlk., sort biot., lidt gr., lidt py.						
84,00 - 87,13	3,13	2 gl. gn., alm. (-b.p.)	fin mlk., midtpå m. tynde foldede mørke lag, øverst lidt py., FeS impr.	foldet					
			25°						
87,13 - 87,65	0,52	maf. biot. gn.	mlk., sort, amfibolitisk, få cm gr., lidt skarn						
87,65 - 90,21	2,56	2 gl. gn., bp.-b.d.	få gr., stedvis lidt jævnt fordelt gullig skarn, enkelte tynde diffuse mørke lag	foldet					
			17°						
90,21 - 90,25	0,04	Kvarts	rig på FeS						
90,25 - 91,65	1,40	2 gl. gn., b.p.	få gr., anelse skarn, stedvis spor af py.	20° foldet spidst					
91,65 - 93,21	1,56	2 gl. gn., alm.	fin mlk., mest ret mørk, næsten u.gr., lidt spredt skarn	Spidst foldet					
93,21 - 93,31	0,10	Kvarts							
93,31 - 96,65	3,34	2 gl. gn., alm.	mest ret lys, næsten u.gr., hist og her lidt skarn	Kraftig foldet, 30° vertikalt foldet					
96,65 - 97,10	0,45	maf. biot. gn.	2 gl. gn. præg, u.gr., sort biot., anelse skarn, sv. py.	vertikalt foldet					
97,10 - 99,25	2,15	2 gl. gn., bp.-alm.	hom., ret mørk, fin mlk., få gr., stedvis lidt skarn	foldet 32°, 35°					
99,25 - 99,74	0,49	2 gl. gn. bd.-bp., m. skarn	ret mørk, mlk. gn. m. sort biot., u.gr., grågrøn skarn i diffuse legemer.	foldet					
99,74 - 99,80	0,06	Kvarts							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7504

Side 9

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
99,80 - 102,17	2,37	2 gl.gn., alm.	næsten ü.gr., ret lys, horn.	22°, steilt foldet, 22°						
102,17 - 102,80	0,63	Skarn	grovk., grågrøn, ü.ordn. ret lys, fin mlk. biot.gn. m. 2 gl.gn. prag og sort biot. lidt py., ca 1/2 er skarn.	Steilt foldet :						
102,80 - 103,10	0,30	2 gl.gn., alm.	fin mlk., inhomogen, ret mørk, ü.gr.	vertikalt foldet						
103,10 - 104,70	1,60	2 gl.gn., b.d.	horn., lys, få gr., enkelte tynde mørke lag m. spor af py.	vertikalt foldet, incl. 90°						
104,70 - 105,16	0,46	2 gl.gn., b.p.-alm.	næsten ü.gr., alm. type nderfter	vertikalt foldet						
105,16 - 106,10	0,94	hbl.-biot. gn., D.gn. type	mlk., br. biot., få gr., ü.ordn. m. sk., py. impr.	foldet, 55°						
106,10 - 107,75	1,65	biot. gn., D.gn. type	mlk., br. biot., få ret små gr., ü.ordn. hbl. og m. sk., py. impr.	steilt foldet, 45°						
107,75 - 107,88	0,13	pegm.	m. 1/2-1 cm py. og FeS korn, lidt biot. gn.							
107,88 - 108,72	0,84	biot. gn., D.gn. type	mlk., br. biot., få gr., oftest ret lys m. sk. rig, anelse hbl., py. impr.	foldet 32°, 19° (hver sin vej)						
108,72 - 109,02	0,30	m. sk.-biot. gn., D.gn. type	mlk., m. sk. rig, ü.gr., br. biot., py. impr.	25°, foldet						
109,02 - 109,28	0,26	m. sk. gn.	fin mlk., lys, ü.gr., spor af br. biot.							
109,28 - 110,38	1,10	biot.-hbl. gn., D.gn. type	grov mlk., få gr., lidt m. sk., py. impr.	21°, foldet						
110,38 - 111,50	1,12	m. sk. rig gn. / biot. gn., D. gn. type	fin mlk., m. enkelte horisonter mlk. biot. gn., ü.gr., py. impr. (delvis svag)	30°, foldet Steilt						
111,50 - 112,40	0,90	m. sk.-biot. gn., D. gn. type	mlk.-fin mlk., lys, ü.gr., br. biot., anelse hbl., py. impr.	foldet Steilt						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7504

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
112,40 - 114,75	2,35	biot.gn., D.gn. type	mlk., br. biot., lidt gr., øverst lidt msk., D, lidt u. ordn. hbl., py. impr.	28°, 13° foldet					
114,75 - 115,37	0,62	hbl. gn.	mlk., spredt gr., u. ordn. br. biot., sv. py. impr.	27° foldet					
115,37 - 118,20	2,83	hbl. - biot.gn., D.gn. type	mlk., br. biot., få gr., D, lidt msk., py. impr.	25° 30°					
118,20 - 119,40	1,20	biot.gn., D.gn. type	mlk., br. biot., lidt msk., u. ordn. hbl., 2-8 mm gr., py. impr.	foldet					
119,40 - 121,43	2,03	hbl. - biot.gn., D.gn. type	mlk., br. biot., lidt spredt gr., D, biot. gn. dominerer nederst, py. impr.	8° 8°					
121,43 - 121,57	0,14	pegm.							
121,57 - 121,67	0,10	biot.-hbl.gn., D.gn. type	mlk., br. biot., lidt gr., D, py. impr.	7°					
121,67 - 121,84	0,17	kvarts pegm.	m. tynde strøg hbl. gn.						
121,84 - 124,12	2,28	biot.gn., D.gn. type	mlk., br. biot., få gr., u. ordn. hbl., D, staurolit, py. impr., ensartet	11° 13°					
124,12 - 124,26	0,14	kvarts	rande m. 1-1/2 cm hbl. korn, strøg m. hbl. gn.						
124,26 - 125,21	0,95	hbl. - biot.gn., D.gn. type	mlk. - grov mlk., br. biot., lidt gr., py. impr.	6°					
125,21 - 125,31	0,10	kvarts							
125,31 - 125,49	0,18	hbl. gn.	grov mlk., u. ordn. br. biot., få gr., py. impr.						
125,49 - 125,69	0,20	kvarts	tynde strøg hbl. gn., midtpå 3 cm monomineralisk grovk. biot. bergart						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7504

side 11

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
125,69 - 129,27	3,58	hbl.-biot.gn/hbl.gn. D.gn.type	mlk.-grøvmik., br.biot., delvis meget rig på hbl., lidt spredt gr., D, staurolit, midt på lidt D, py impr.	16° foldet stejlt						
129,27 - 129,95	0,68	hbl. gn.	mlk., gr., u. ordn. tyndt foldet lag biot. gn., sv. py. impr.	foldet stejlt, 90°						
129,95 - 131,25	1,30	hbl.-biot.gn/hbl.gn. D.gn.type	mlk., gr., br.biot., tynde foldede hbl. gn. lag, py impr.	foldet stejlt						
131,25 - 133,65	2,40	biot.gn., D.gn.type	mlk., lidt 1-2 mm gr., u. ordn. hbl., D, br. biot., py. impr.	kraftig foldet, 35°						
133,65 - 135,19	1,54	hbl.-biot. gn., D.gn. type	mlk., -grøvmik., lidt gr., br.biot., D, py. impr.	stejlt foldet - foldet						
135,19 - 135,27	0,08	Kvarts								
135,27 - 135,50	0,23	hbl. gn.	gr. rig, stictolitisk, u. ordn. br.biot., sv. py. impr.	32°						
135,50 - 135,80	0,30	biot.gn., D.gn.type	mlk., få 1-2 mm gr., br. biot. (surt nedest), py. impr.	20°						
135,80 - 138,49	2,69	2 gl. gn., b.p.-b.d.	meget lys, hom., næsten u. gr., nedetter b.d.	21°, 34°, 34°						
138,49 - 138,71	0,22	pegm.								
138,71 - 142,30	3,59	2 gl. gn., b. d.	lys, hom., massiv, næsten u. gr., lidt skarn i kvarts, spor af lidt gullig skarn	20° foldet?						
142,30 - 142,60	0,30	2 gl. gn., b. p.	næsten u. gr., lidt skarn	foldet						
142,60 - 142,71	0,11	maf. biot.gn.	sort, lidt gr., jævnt fordelt gullig skarn	42°						
142,71 - 143,69	0,98	2 gl. gn., b. d.	lys, hom. massiv, anelse gr., anelse jævnt fordelt gullig skarn	?, 34°						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7504

side 12

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
143,69 - 143,83	0,14	pegm.	ū. oran. m. tynde 2 gl. gn. horisonter							
143,83 - 143,91	0,08	2 gl. gn., b.d.								
143,91 - 143,98	0,07	kvarts								
143,98 - 144,26	0,28	2 gl. gn., b.d.	lys, massiv, ū. gr.	23°						
144,26 - 144,45	0,19	kvarts	ū. ordn. m. tynde strøg 2 gl. gn., b.d. og tynde lag monomineralisk biot. bergart							
144,45 - 144,91	0,46	2 gl. gn., b.d., mørk	fin mik., inhomogen, sort biot., gr., lidt gullig skum	foldet						
144,91 - 145,12	0,21	2 gl. gn., b.d.	lys, massiv, ū. gr.							
145,12 - 146,90	1,78	2 gl. gn., b.d.	ret inhomogen, ū. gr., m. 5 cm. lag af maf. biot. gn., foldet (et og samme lag?)	Støjt foldet, 29°						
146,90 - 152,09	5,19	2 gl. gn., b.d.	rel. lys, ū. gr. (ell. spor), stedvis lidt jævnt fordelt gullig skum	25°, 12°, 35° spidst foldet?						
152,09 - 152,20	0,11	pegm.								
152,20 - 155,08	2,88	2 gl. gn., b.d.	massiv, lidt gr., stedvis anelse gullig skum	foldet						
155,08 - 156,20	1,12	Amf. / maf. biot. gn.	fin mik., delvis ret lys, sort biot., spredte 3-7 mm gr., amf. ret biot. ng, maf. biot. gn. m. lidt hbl.	foldet						
156,20 - 159,38	3,18	2 gl. gn., b.d.	lys, massiv, næsten ū. gr.	? flad, 11°						
159,38 - 159,80	0,42	2 gl. gn., b.d.	næsten ū. gr., lidt inhomogen m. tynde kvartsrige lag	25°						
159,80 - 161,79	1,99	2 gl. gn., b.d.	lys, massiv, næsten ū. gr.	20°, 13°						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7504

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 13

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
161,79 - 161,89	0,10	maf. biot. gn.	sort, fin mlk., lidt gr.	18°						
161,89 - 162,49	0,60	2 gl. gn., bd.	lys. massiv, få små gr.							
162,49 - 162,58	0,09	Kvarts								
162,58 - 164,00	1,42	2 gl. gn., b.d.	lys. massiv, næsten u. gr.	7°, 17°						
164,00 - 164,02	0,02	Skarn	grågrøn							
164,02 - 164,75	0,73	maf. biot. gn. / (amf.)	sort, fink., lidt hbl., amf. udseende, u. gr., sv. FeS impr., sort biot., flere 3-8 cm pegm.							
164,75 - 164,95	0,20	2 gl. gn., b.d.	lys. massiv	8°						
164,95 - 165,28	0,33	Amfibolit	fin mlk., fint båndet, sort, gr., lidt br. biot.	8°						
165,28 - 165,34	0,06	2 gl. gn., b.d.	lys. massiv	6°						
165,34 - 166,35	1,01	Amfibolit	sort, massiv, 1-2 mm gr., et par 1 cm tynde lag skarn	6°						
166,35 - 168,46	2,11	2 gl. gn., b.d.	anelse biot. gn. præg, fink., lys. massiv, u. gr., øverst sv. brünl. biot., sv. FeS, py. impr.	7° 9°						
168,46 - 168,62	0,16	Amf. / (maf. biot. gn.)	Sort, mlk., m. sort biot., gr.	8°						
168,62 -	0,45	2 gl. gn., b.d.	lys. rel. inhomogen, gr., lidt stictol. tisk, et par tynde maf. lag	4°						
- 169,07		Amfibolit	sort, fin mlk., lidt biot., 1-3 mm gr.	14°						
169,07 - 169,30	0,23	2 gl. gn., b.d.	lys. massiv, lidt gr.							
169,30 - 169,45	0,15	Amf. / maf. biot. gn.	merk, fin mlk., rig på biot., 2-5 mm gr.	8°?						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7504

Side 14

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
169,45 - 170,00	0,55	2 gl. gn., b.d.	lidt inhomogen, lidt gr.						
170,00 - 170,50	0,50	— do. —	fin mlk., mørk, biot. gn. præg, sort biot. gr.						
170,50 - 171,47	0,97	— do. —	massiv, 1-3 mm gr., et par tynde mørke lg						
171,47 - 171,71	0,24	maf. biot. gn.	fin mlk., amf. lign., lidt 5 mm. gr.						foldet?
171,71 - 173,24	1,53	2 gl. gn., b.d.-b.p.	lidt inhomogen, u. gr.						foldet om lodret
173,24 - 173,35	0,11	maf. biot. gn.	fin mlk., meget små gr.						17°
173,35 - 176,50	3,15	2 gl. gn., b.p.	få gr., stedvis spor af FeS, py.						foldet om lodret, 26°
176,50 - 177,58	1,08	2 gl. gn., b.p. / maf. biot. gn.	ca. 1/2 af hver, foldet ind i hinanden, få små gr., maf. biot. gn. delvis sv. py. impr.						20° foldet
177,58 - 180,60	3,02	2 gl. gn., b.p.-b.d.	hom., massiv, u. ell. m. mindre end 1 mm gr. Sort biot., delvis rel. mørk, spor af skarn, meget sv. FeS og py. impr. (ell. spor)						12°? foldet, 15°
180,60 - 181,89	1,29	2 gl. gn., b.p.-b.d.	hom., små gr., spor af skarn						15°
181,89 - 182,39	0,50	maf. biot. gn.	fin mlk., små gr., lidt hbl., jævnt fordelt Skarn, mest amf. lign. m. lys 2 gl. gn. lignende partier.						19°
182,39 - 182,75	0,36	2 gl. gn., b.d.-b.p.	rel. mørk, næsten u. gr., sv. FeS og py. impr.						25°
182,75 - 182,94	0,19	maf. biot. gn. m. skarn	fin mlk.-mlk., få gr., fint fordelt skarn, 2 stk. 3 cm lag af grågrøn skarn						
182,94 - 183,56	0,62	2 gl. gn., b.p.	næsten u. gr., inhomogen m. enkelte tynde foldede maf. lag, spor af py. og FeS						foldet om lodret
183,56 - 183,77	0,21	maf. biot. gn.	mlk., rel. lys, små gr., sort biot., fint fordelt gulgrålig skarn, spor af py. og FeS						19°

Lokalitet:

Borehull: 7504

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 15

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
183,77 - 184,07	0,30	2 gl. gn., b.d.	små gr.							
184,07 - 184,12	0,05	kvarts	M. 5x20mm stort FeS korn							
184,12 - 186,30	2,18	2 gl. gn., b.d. (b.p.)	fin-fin mlk., hom., ret biot. ng, sort biot., små gr. (<1mm)	18° 26°27°						
186,30 - 187,37	1,07	2 gl. gn., b.d., mørk	fin mlk., mørk, biot. gn. lign., sort biot., ret ng på 1 mm gr., meget sv. FeS py. impr.	25°						
187,37 - 189,41	2,04	Amfibolit	sort, hom., 1-2 mm gr., et par 1 cm lag skam, spredt 1 mm prisme af "zoisit"	21° 25°						
189,41 - 189,57	0,16	pegm.								
189,57 - 189,87	0,30	Amfibolit	sort, hom., 1-2 mm gr., små "zoisit"prismer	27°						
189,87 - 189,99	0,12	pegm.								
189,99 - 190,02	0,03	Amfibolit								
190,02 - 190,28	0,26	2 gl. gn., b.d.	1 mm gr., delvis ret mørk	44°						
190,28 - 190,31	0,03	biot. gn., D. gn. type	mlk., py. impr.							
190,31 - 190,41	0,10	kvarts								
190,41 - 191,24	0,83	biot. gn., D. gn. type	fin mlk.-mlk., 1 mm gr., br. biot., anelse hbl. py. impr.	22° 30°						
191,24 - 191,45	0,21	hbl. gn.	lidt br. biot., py. impr.							
191,45 - 192,28	0,83	hbl.-biot. gn., D. gn. type / hbl. gn.	mlk., br. biot., få gr., hbl. rige horisonter ofte ret lyse, py. impr.	22° foldet?						

Lokalitet:

Dato

dybde 202,0 m længde på 14,3 m og 373,27 X

Koordinater

Retning

Borehull: 7504

Helling/stigning:

Højde

Lengde

Side 16

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
192,28 - 193,18	0,90	hbl. gn.	fin mlk.-mlk., u. ordn. br. biot. ofte lys, næsten u. gr., py. impr.						
193,18 - 194,25	1,07	hbl. gn. / hbl.-biot. gn. D. gn. type	vekslende i tynde lag, br. biot., få gr., py. impr.						
194,25 - 195,16	0,91	hbl.-biot. gn. D. gn. type	mlk., br. biot., u. gr., D, py. impr. - rigt py. impr.						
195,16 - 196,12	0,96	biot. gn. / hbl.-biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., u. gr., endel hbl., D, rigt py. impr.						
196,12 - 198,29	2,17	hbl. gn. / hbl.-biot. gn. D. gn. type	mest hbl. gn., delvis ret lys, br. biot., u. gr., py. impr.						
198,29 - 201,20	2,91	hbl.-biot. gn. / hbl. gn. D. gn. type	mlk., br. biot., næsten u. gr., D, hbl. dominerer oftest over biot., mest rigt py. impr.						
201,20 - 201,50	0,30	amfibolit	Hig på små gr., spor af py., akkurat indfoldet						
201,50 - 201,74	0,24	hbl.-biot. gn. D. gn. type	mlk., br. biot., små gr., py. impr.						
201,74 - 201,82	0,08	amfibolit	Hig på små gr., spor af py.						
201,82 - 203,97	2,15	biot. gn. (2 gl. gn. prag) / 2 gl. gn. b.p. (biot. gn. prag) næfter	fin mlk., ret lys, spredt små gr., biot. mest sort-oliven, stedvis lidt mæsk., py. impr. ofte svag.						
203,97 - 205,03	1,06	mlk. 2 gl. gn.?, biot. gn. prag, (ikke alm. b.p.)	homogen, mlk., spredte < 1 mm gr., sort-olivenagtig biot., lidt mæsk., staurolit?, spor - sv. py. impr.						
205,03 - 205,22	0,19	2 gl. gn., b.d.	fin mlk., ret biot. rig, sort biot., rig på små gr.						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7504

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 17

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
205,22 - 206,34 - 206,34	1,12	hbl. gn. m. skarn	meget rig på 1 mm gr., skarn grøgrøn	foldet 18°, 40°						
		2 gl. gn., biot. gn. præg/ biot. gn., 2 gl. gn. præg	fin mlk., rel. lys, biot. gn. lign. grejs, små gr., biot. sort-oliven, sv. py. impr.							
		serien fra 201,82 - 206,35 m danner antagelig en fold, jf. symmetri i bergarter								
206,34 - 206,67	0,33	biot. gn., D. gn. type	mlk., mørk, rig på 1 mm. gr., br. biot., u. Ordn. hbl. indhold, py. impr.	?						
206,67 - 206,88	0,21	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., få små gr., D, py. impr.	?						
206,88 - 207,26	0,38	skarn/lys hbl. gn.	fin mlk., massiv, grøgrøn m. hbl., py. impr.	?						
207,26 - 207,65	0,39	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., lidt hbl., få gr., D, py. impr.	?						
207,65 - 210,12	2,47	hbl.-biot. gn., D. gn. type	mlk., homogen, br. biot., næsten u. gr., py. impr.	?	29° 65°-84°					
210,12 - 210,18	0,06	kvarts								
210,18 - 212,55	2,37	hbl.-biot. gn., D. gn. type	mlk.-fin mlk., ofte lys, br. biot., næsten u. gr., py. impr.	90°-82° meget svagt foldet 68°-40°						
212,55 - 213,65	1,10	biot. gn./hbl.-biot. gn. D. gn. type	mlk., stigende hbl. indh. nede efter, br. biot., u. gr., D, py. impr.	54° 65°						
213,65 - 215,45	1,80	hbl.-biot. gn., D. gn. type/hbl. gn.	mlk., mest hbl. rig m. jævne overgan- ge, u. gr., py. impr., lidt baryt (?)	50° 35°						
215,45 - 216,60	1,15	hbl.-biot. gn./biot. gn. D. gn. type	mlk., mest biot. rig, br. biot., få gr., py. impr.	foldet om lodret						

Lokalitet:

Borehull: 7504

side 18

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Højde :

Lengde :

dybde 232, > differ på -15,9 m og 371,05X

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
216,60 - 216,82	0,22	hbl. gn.	Små gr., sv. py. impr.							
216,82 - 219,22	2,40	hbl.-biot.gn., D.gn.-type	mik., br.-biot., få gr., var. biot./hbl., D. py. impr.	meget stejle						
219,22 - 219,68	0,46	hbl. gn.	små gr., anelse br.-biot., sv. py. impr.	43						
219,68 - 220,22	0,54	hbl.-biot.gn., D.gn.-type	mik., br.-biot., få gr., D. py. impr.	62						
220,22 - 220,95	0,73	hbl. gn.	lys, fink., massiv, få små gr., sv. py. impr.	Stejlt foldet						
220,95 - 224,75	3,80	hbl.-biot.gn., D.gn.-type	fin mlk.-mlk., i regelen m. overvægt af biot., br.-biot., få gr., py. impr.	66° foldet om lodret, 34°						
224,75 - 225,50	0,75	hbl. gn. (ūnormal)	fink., lys, massiv, ū ordn. m. lidt br. biot., næsten ū. gr., sv. py. impr.	34° 23°						
225,50 - 228,38	2,88	hbl.-biot.gn. (ūnormal)	lys, fin - fin mlk., massiv, homogen, få gr. (<1 mm), biot. synes i overvægt, br. biot., præget af D.gn.-type, py. impr.	foldet 50° 34°						
228,38 - 228,39	0,01	Zone m. baryt (?)		7°?						
228,39 - 231,29	2,90	hbl.-biot.gn. (ūnormal)	fin mlk., ret lys, homogen, massiv, få gr. br.-biot., py. impr.	37° Stejlt foldet 69°						
231,29 - 231,63	0,34	hbl. gn. (ūnormal)	fin - fin mlk., ret amphibolitisk ūdseende, få gr., anelse br.-biot., py. impr.							
231,63 - 233,75	2,12	hbl. gn. / hbl.-biot. gn. (ūnormal)	fin mlk. - fink., lys, homogen, massiv, br.-biot., få små gr., hbl. indh. stort og hbl. gn. horisonterne dominerer, py. impr.	meget stejle, foldet, 54°						
233,75 - 234,68	0,93	biot. gn. (ūnormal)	fin mlk., lys, homogen, massiv, br.-biot., ū. ordn. lidt spredt hbl., få små gr., py. impr.	51° foldet om lodret						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7504

Side 19

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
234,68 - 234,81	0,13	hbl. gn.	fin mlk., få gr., lidt br. biot., py. impr.	indfoldet					
234,81 - 239,54	4,73	hbl.-biot.gn./biot.gn.	fin mlk., lys, homogen, massiv, spredte < 1 mm gr., stigende hbl. indh. nedetter, br. biot., Stedvis m. anelse (Φ), py. impr.	50°, 27° foldet om lodret					
239,54 - 240,37	0,83	hbl. gn.	fin - fin mlk., delvis amfibolitisk, få små gr., uordn. lidt br. biot., sv. py. impr.	48°?					
240,37 - 241,06	0,69	biot.gn., D.gn. type	fin mlk., ret lys, homogen, br. biot., få gr., lidt uordn. hbl., py. impr.						
241,06 - 241,57	0,51	hbl. gn.	fin mlk., en del u. ordn. br. biot., få gr., py. impr.	Stejl foldet					
241,57 - 241,78	0,21	biot.gn., D.gn. type	mlk., br. biot., u. gr., py. impr.						
241,78 - 241,86	0,08	pegm.							
241,86 - 244,46	2,60	biot.gn./hbl. gn.	fin mlk.-mlk., heterogen, lys - mørk m. flere dm. tykke lag hbl. gn. m. biot., en del små gr., br. biot., py. impr.	33° foldet 42°					
244,46 - 244,94	0,48	biot.gn., D.gn. type	mlk., br. biot., lidt hbl. og 1 mm gr., py. impr.	foldet					
244,94 - 246,27	1,33	biot.gn./hbl. gn.	fin mlk.-mlk., heterogen, lys - mørk, var. hbl. indh., br. biot., py. impr.	11° 21°					
246,27 - 246,55	0,28	hbl. gn.	fin mlk., spredt < 1 mm gr., sv. py. impr.	48°					
246,55 - 247,30	0,75	hbl.-biot.gn., D.gn. type	mlk.-fin mlk., få < 1 mm gr., br. biot., py. impr.	40°					
247,30 - 247,65	0,35	biot.gn., D.gn. type	mlk., få gr., lidt hbl. nedetter, br. biot., py. impr.	42					
247,65 - 247,75	0,10	hbl. gn.	py. impr.	48					
247,75 - 251,05	3,30	biot.gn., D.gn. type	mlk., ensartet, næsten u. gr., br. biot., lidt hbl., D. py. impr.	46°, 45°					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7504

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 20

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
251,05 - 251,29	0,24	pegm.	midt på m. 2 cm biot. gn.						
251,29 - 251,77	0,48	biot. gn., D. gn. type	mlk., få små gr., br. biot., py. impr.						
251,77 - 252,12	0,35	hbl. gn.	mlk.-fin mlk., 1 mm gr., lidt br. biot., sv. py. impr.	33°					
252,12 - 252,63	0,51	biot. gn. (anelse 2 gl. gn. præg)	rel. lys, fin mlk., lidt små gr., br. (-oliven) biot., sv. py. impr., (antagelig D. gn. type)	45°					
252,63 - 253,13	0,50	pegm.							
253,13 - 253,95	0,82	biot. gn. (2 gl. gn. præg) (anormal)	fin mlk., rig på 1 mm gr., oliven-brün biot., u. ordn. lidt hbl., enkelte tynde foldede hbl. gn. lag, sv. py. impr.	vertikalt foldet					
253,95 - 254,32	0,37	hbl. gn.	mlk., delvis amfibolitisk, rig på 1 mm gr., u. ordn. lidt oliven biot., sv. py. impr.	vertikalt foldet					
254,32 - 254,80	0,48	biot. gn.	fin mlk.-mlk., rig på 1 mm gr., oliven biot., stedvis lidt hbl., sv. py. impr., incl. bred foldet pegm.	40°					
254,80 - 255,88	1,08	biot. gn. (lidt 2 gl. gn. præg), (anomal)	lys, homogen, fin mlk. (-fink.), rig på 1 mm gr., br. (-oliven) biot., sv. py. impr.	foldet om lodret					
255,88 - 256,38	0,50	Amf. / (hbl. gn.)	fin mlk., 1 mm gr., sv. py. impr.	foldet om lodret					
256,38 - 256,85	0,47	hbl.-biot. gn., (anormal)	fin mlk., rig på 1 mm gr., oliven biot., sv. py. impr.	foldet om lodret					
256,85 - 261,80	4,95	biot. gn. (2 gl. gn. præg) (anormal)	fin mlk., lys, homogen, rig på 1 mm gr., oliven biot., stedvis lidt hbl., spor af calcit, stedvis anelse (D), spor af kær (brunsort hbl.), sv. py. impr.	foldet om lodret					

Lokalitet:

Borehull: 7504

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

dybde 27,27 m bryggespd -56,2 m og 368,09 X

Side 21

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
261,80 - 264,08	2,28	biot. gn. (2 gl. gn. præg), (normal)	mlk, rig på 1-2 mm gr., rel. lys, oliven biot., D?, sv. py. impr., (mik. adgave af gn. ovenfor)	30°					foldet om lodret
264,08 - 264,90	0,82	hbl.-biot. gn. (normal)	fin mlk. (-mlk.), meget rig på 1 mm gr. oliven biot., sv. py. impr.	29°					
264,90 - 267,37	2,47	hbl. gn./hbl. biot. gn. D. gn. type	mlk., homogen, få gr., D, biot. oliven - Olivenbrun, py. impr. (delvis rigt)	28° 14°					
267,37 - 267,60	0,23	hbl.-biot. gn.	fink., br. biot., få gr., jernovergang til amf., sv. py. impr.	16°					
267,60 - 268,58	0,98	amfibolit	fink., lidt 1-2 mm gr., lidt jævnt fordelt gullig skarn, øverst lidt u. ordn. biot.	12°					
268,58 - 268,67	0,09	kvarts							
268,67 - 270,00	1,33	amfibolit	fink., lidt jævnt fordelt gullig skarn, lidt 1-2 mm gr., stedvis lidt u. ordn. biot.	2° 14°					
270,00 - 270,22	0,22	kvarts							
270,22 - 273,22	3,00	amfibolit	fink., lidt 1 mm gr., stedvis m. u. ordn. biot., et par steder lidt skarn, et par tynde lag maf. biot. gn.	13° 11°					
273,22 - 274,08	0,86	biot. gn. (D. gn. præg)	fin mlk., br. biot., 1 mm gr., sv. py. impr.	foldet					
274,08 - 277,10	3,02	hbl.-biot. gn./hbl. gn.	fin mlk.-mlk., br. biot., få gr., hbl. synes at dominere over biot., py. impr. (delv. sv.)	foldet 72° steilt foldet					
277,10 - 277,68	0,58	2 gl. gn., b.p. (biot. gn. præg)	fink., fint fordelt gr., oliven biot., sv. py. impr.	26°					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7504

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 22

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
277,68 - 278,10	0,42	amfibolit	fink., 1mm gr., lidt $\bar{u}$. ordn. biot., lidt fint fordelt skarn	foldet					
278,10 - 278,25	0,15	2 gl. gn., b.p.	fink., fint fordelt gr.						
278,25 - 278,90	0,65	amfibolit	fin mlk., rig på 1-2 mm gr., $\bar{u}$. ordn. biot., lidt jævnt fordelt skarn	11°					
278,90 - 279,35	0,45	2 gl. gn., b.d.	fink., homogen, fint fordelt gr., sort-oliven biot., spor af py.						
279,35 - 279,68	0,33	biot. gn., D. gn. type	fin mlk., br. biot., lidt 1mm gr., sv. py. impr.	38°?					
279,68 - 279,73	0,05	2 gl. gn., b.d.	fink., fint fordelt gr., oliven biot., spor af py.						
NB! Fra 279,73 - 300,00 m. var der total $\bar{u}$orden i kasserne. Alle kerne stykker var lagt i $\bar{u}$den sammenhæng. Det blev forsøgt at genordne kasserne. Resultatet blev at 279,73 - 289 m og 292 - 300 m er samlet med fuldstændig sikkerhed og med entydig placering. 289 - 290, 290 - 291 og 291 - 292 m er samlet rigtigt i længder på 1 m hver. De har imidlertid ikke umiddelbart kunnet sættes sammen indbyrdes. De er placeret i den rækkefølge, der ud fra bergarterne skønnedes mest sandsynlig.									
279,73 - 280,49	0,76	2 gl. gn., b.p.	fin mlk., 1mm gr., sort-oliven biot., sv. py. impr.	28°, foldet stejl foldet					
280,49 - 282,20	1,71	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., lidt hbl., næsten $\bar{u}$. gr., D, py. impr.	28° 8°					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7504

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 23

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
282,20 - 282,29	0,09	hbl. gn.	py. impr.							
282,29 - 283,27	0,98	biot. gn., D. gn. type	mlk., hom., br. biot., ū. gr., ū. ordn. hbl., py. impr.	?						
283,27 - 283,51	0,24	pegm.								
283,51 - 284,05	0,54	biot. gn., D. gn. type	mlk., hom., br. biot., næsten ū. gr., D, ū. ordn. hbl., py. impr.	10°?						
284,05 - 287,33	3,28	hbl.-biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., næsten ū. gr., D, py. impr.	25°, 13°, 21°						
287,33 - 287,40	0,07	pegm.								
287,40 - 288,36	0,96	hbl.-biot. gn., D. gn. type	fin mlk., br. biot., få gr., hbl. rig nedefter, py. impr.	7°						
288,36 - 291,10	2,74	2 gl. gn., b.d.	meget fink., stictolittisk, homogen, litt fint fordelt gullig skarn, stedvis litt hbl.	?						
291,10 - 293,45	2,35	2 gl. gn., b.d.	spredt 1-2 mm gr., homogen	5°?						
293,45 - 294,40	0,95	2 gl. gn., alm.	homogen, få gr.	23°?						
294,40 - 295,80	1,40	2 gl. gn., b.p.-b.d.	spredt 1-2 mm gr.	17°, 4°						
295,80 - 296,51	0,71	2 gl. gn., alm.	få gr., delvis tet mask. rig	9°						
296,51 - 296,62	0,11	maf. biot. gn.	mlk., amfibolittisk, ū. gr., spredt gullig skarn	3°						
296,62 - 296,86	0,24	2 gl. gn., alm.	få gr., mere biot. rig nedefter							
296,86 - 297,50	0,64	biot. gn., D. gn. type	mlk., hom., få gr., br. biot., py. impr.	flad?						
297,50 - 300,04	2,54	hbl.-biot. gn., D. gn. type	mlk., homogen, få små gr., br. biot., D?, py. impr.	11°, 28° spidst foldet? 17°, 38°, 26°						

Lokalitet:

Borehull: 7504

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 24

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
300,04 - 300,61	0,57	biot. gn.	fin mlk., lys, br. biot., py. impr.	spidst foldet					
300,61 - 300,95	0,34	hbl. gn.	ret mørk, mlk., lidt biot., py. impr.	18°, 33°					
300,95 - 301,33	0,38	hbl.-biot. gn., D. gn. type	mlk., u. gr., br. biot., py. impr.						
301,33 - 301,43	0,10	Skarn	kvartsnig, gultgrøn, py. impr.						
301,43 - 301,93	0,50	hbl.-biot. gn., D. gn. type	mlk., mest u. gr., br. biot., D., py. impr.	12°					
301,93 - 302,22	0,29	hbl. gn.	mlk., mest u. gr., u. ordn. lidt br. biot., py. impr.	spidst foldet?, 21°					
302,22 - 303,00	0,78	hbl.-biot. gn., D. gn. type	mlk., mest u. gr., br. biot., D., py. impr.	spidst foldet?					
303,00 - 303,40	0,40	biot. gn.	mlk., ret lys, u. gr., br. biot., py. impr.	6°, 13°					
303,40 - 304,60	1,20	biot. gn., 2 gl. gn. præg (især redefter)	fin mlk., lys, br.-oliven biot., få små gr. Stedvis lidt gullig skarn, spor af hbl., py. impr. (delvis svag)	foldet 32°					
304,60 - 305,34	0,74	maf. biot. gn.	mlk., mørk, grønsort biot., enkelte l. mm gr., jævnt fordelt gullig skarn, Stedvis spor af py.	foldet					
305,34 - 306,22	0,88	2 gl. gn., b.d.	fink., lys, homogen, massiv	foldet?					
306,22 - 306,32	0,10	kvarts							
306,32 - 306,83	0,51	2 gl. gn., alm.	lys, massiv, u. gr., delvis ret mæsk. rig, et par steder sv. py. impr.						
306,83 - 307,20	0,37	2 gl. gn., alm.	fin mlk., mest gl. rig, u. gr., sv. py. impr. lidt CaCO ₃ .						
307,20 - 308,20	1,00	2 gl. gn., alm.-b.p.	lys, homogen, u. gr.	16°, 18°					
308,20 - 308,27	0,07	maf. biot. gn.	mlk., sort	12°					
308,27 - 309,74	1,47	2 gl. gn., alm.-b.p.	lys, homogen, u. gr., spor af skarn	12°, 8°					

Lokalitet:

Borehull: 7504

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 25

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
309,74 - 310,00	0,26	2 gl. gn., alm.	fin mlk., gl. rig, spor af py.	6°					
310,00 - 310,17	0,17	2 gl. gn., alm.-bp.	lys, hom., få gr.						
310,17 - 310,56	0,39	2 gl. gn., alm.	fin mlk., rel. gl. rig, lidt fint fordelt skarn, spor af py.	10°					
310,56 - 312,97	2,41	2 gl. gn., alm.	lys, hom., massiv, næsten u. gr.	4°, 14°					
312,97 - 313,55	0,58	maf. biot. gn. (lidt biot. gn. præg)	fin mlk.-mlk., Olivensort biot., lidt 1-3 mm gr., lidt jævnt fordelt gullig skarn, sv. py. impr.	15° 13°					
313,55 - 313,90	0,35	Amfibolit	fin mlk., få 2 mm gr., lidt biot., lidt jævnt fordelt gullig skarn ("zoisit")						
313,90 - 314,40	0,50	hbl.-biot. gn. / biot. gn.	fin mlk., inhomogen, Oliven br. biot., 1-2 mm gr., jævnt fordelt gullig skarn, nede efter en del fink. biot. gn. (2 gl. gn. præg) sv. py. impr.						
314,40 - 315,72	1,32	hbl. gn. / hbl. biot. gn.	mlk., få 1 mm gr., br. biot., spor af (D), spor af gullig skarn, sv. py. impr.	18°, 9° 20°					
315,72 - 316,25	0,53	hbl. gn. (amfibolitisk)	fin mlk., få 1 mm gr., jævnt fordelt gullig skarn, spor af py.	16°					
316,25 - 317,67	1,42	hbl.-biot. gn., D. gn. type	mlk., spredt 1-2 mm gr., py. impr. (delv. sv.)	16°, 4° 12°					
317,67 - 318,17	0,50	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., u. gr., spor af (D), py. impr.						
318,17 - 319,26	1,09	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., få gr., ofte rel. stort indh. af chlorit, mest meget sv. py. impr., vertikal bågret kvartsåre m. lidt skarn, lidt baryt (?) og spredte optil 6 mm store py. korn	10°					

Lokalitet:

Borehull: 7504

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

Side 26

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
319,26 - 319,85	0,59	pegm.	folieret							
319,85 - 320,60	0,75	hbl.-biot.gn., D.gn. type	mlk., hom., næsten ù.gr., br. biot., D. py. impr., et par tynde skarn bånd	11°						
320,60 - 322,75	2,15	biot.gn., D.gn. type	mlk., hom., næsten ù.gr., br. biot., lidt mäs.k., anelse hbl., py. impr.	7° 19°						
322,75 - 324,92	2,17	hbl.-biot.gn., D.gn. type	mlk., hom., næsten ù.gr., br. biot., lidt mäs.k., py. impr.	15°, 17° 21°						
324,92 - 326,13	1,21	2 gl.gn., alm.	homogen, gl. rig, mest let mäs.k. rig, ù.gr.	14°						
326,13 - 326,45	0,32	biot.gn. / mäs.k.gn., D.gn. type	alternerende i tynde lag, grovk., filtet, ù.gr., br. biot., sv. py. impr.							
326,45 - 326,67	0,22	hbl.gn.	2-6 mm gr., lidt skarn, sv. py. impr.	16°						
326,67 - 327,45	0,78	hbl.-biot.gn., D.gn. type	mlk.-grov mlk., hom., br. biot., ù.gr., lidt mäs.k., hbl. ofte dominerende, py. impr., flere tynde årer m. baryt (?)	11° 20°						
327,45 - 329,10	1,65	hbl.gn.	mlk.-grov mlk., ù.gr., lidt mäs.k., ret lys, mäs.krig nedefter, homogen, py. impr., flere tynde årer m. baryt (?)	2° 3°						
329,10 - 330,51	1,41	hbl.-biot.gn.	mlk.-grov mlk., ret lys, få gr., br. biot., lidt mäs.k., py. impr., flere tynde baryt(?) årer	27°, 19° 8°, 8°						
330,51 - 331,62	1,11	biot.-mäs.k.gn., D.gn. type	grovk., m. faltet præg, mäs.k., br. biot., næsten ù.gr., py. impr. (ofte svag)							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7504

side 27

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
331,62 - 334,05	2,43	biot.gn./hbl-biot.gn. D.gn.type	mlk, br. biot., u.gr, lidt msk. øverst, generelt domineret af biot.gn. m. u.orden. hbl., hbl. faltig øverst, py. impr., flere tynde baryt (?) årer	9° 11° 16°					
334,05 - 334,57	0,52	hbl.gn./biot.gn.	fin mlk., br. biot., små gr., hbl.gn. og biot.gn. vekslende i dm. tykke lag m. jævne overgange, lidt gullig skarn, py. impr.	15° 28° 8°					
Hullet blev afsluttet på 334,57 m.									
Beskrivelse udført i Mo i Rana, August 1976									
									
NB! Gradinddeling: 0-360°									

Lokalitet: Mofjellet

Dato : 1975

Koordinater : x = 925 336,80 y = 44 418,60

Retning :

Helling/stigning: 100%

avsmelt

Høyde : 198,50

Lengde : 332,08

Borehull: 7503

side 1

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 1,00	1,00	Lås Jord								
1,00 - 1,57	0,57	Brøt gn.	Mørk Fin-milt gr-holdig sp. cl., sv. gyl. impur	20°						
1,57 - 1,83	0,26	2gl. gn., Alm.	Ret Lys, Fink.	25°						
1,83 - 1,90	0,07	Kvartseit	Py + FeS							
1,90 - 2,00	0,10	2gl. gn., Alm.	Ret Lys, Fink.	25°						
2,00 - 3,50	1,50	2gl. gn., Bp.	Ret mørk, Fink.	25°						
3,50 - 4,04	0,54	2gl. gn., Alm.	Lys Ret Musk-gr.							
4,04 - 4,60	0,56	2gl. gn., Bd.	Ret Lys Fink.	35°						
4,60 - 5,05	0,45	2gl. gn., Alm.	Lys Fink.							
5,05 - 5,50	0,45	2gl. gn., Alm.	Lys Fin-milt. Musk-grøst	35°						
5,50 - 6,00	0,50	2gl. gn., Bd.	Ret Lys, Fink.							
6,00 - 7,24	1,24	2gl. gn., Alm.	Lys Musk.-dominant Cl-holdig							
7,24 - 8,10	0,86	2gl. gn., Alm.	Lys Fink. Musk-grøst, FeSi Kvartseit sp. Clorit							
8,10 - 8,50	0,40	Regn.	Brøt bånd							
8,50 - 9,55	1,05	2gl. gn. Bd.		35°						
9,55 - 9,70	0,15	2gl. gn. Alm.	Musk. dom.	30°						
9,70 - 10,12	0,42	2gl. gn. Bp.		43						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7503

Side 2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
10,12 - 10,50	0,38	2gl. gn. Ain	Musk-projekt						
10,50 - 11,15	0,65	2gl. gn. Bp.							
11,15 - 11,40	0,25	Bakt. gn.	Finmalt f. og py imper.						
11,40 - 11,95	0,55	2gl. gn. Bp.							
11,95 - 12,08	0,13	negra.							
12,08 - 12,95	0,87	2gl. gn. Bp.	Dispersat falkonet, 25mm bånd af Musk.						
12,95 - 13,07	0,12	negra.							
13,07 - 13,75	0,82	2gl. gn. Bp.							
13,75 - 14,05	0,30	negm.							
14,05 - 14,70	2,65	2gl. gn. Bp.							
14,70 - 17,07	0,37	Bakt. gn. Musk. gn.	Finmalt båndet med vekslende lag af Bakt. gn. og Musk. gn.						
17,07 - 18,17	1,10	negra.	FeS						
18,17 - 20,00	1,83	2gl. gn. Albn - Bp.	1cm mægh bånd Musk. dom.						
20,00 - 21,36	1,36	2gl. gn. Bt.	Rel. lvs. Fimb. med 2cm tykt Bakt. gn. bånd uden granat						

Lokalitet:

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7503

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
21,36 - 22,21	0,85	Biot. gn. Mørk Fin-Mlk., gr-holdig sp. af py.	44°						
22,21 - 22,66	0,45	2. gl. gn., b.d. Ret Lys Fink. - gr.							
22,66 - 23,40	0,74	2. gl. gn., Alm.	15°						
23,40 - 24,18	0,78	2. gl. gn., B.d. Mørk Fin-Mlk., py.	steget Foldet						
24,18 - 25,05	0,87	Karatofyr Rys Fink., musk., py.							
25,05 - 25,43	0,38	2. gl. gn., Alm. Ret Lys, Fink., spredt py.							
25,43 - 25,76	0,33	2. gl. gn., b.d. Mørk, Fin-Mlk., spredt py. og pyr.	35°						
25,76 - 30,00	4,24	2. gl. gn., b.p. Ret Lys, Fink., u gr.	40°						
30,00 - 30,35	0,35	Biot. gn. Mørk, Mlk., Cl., (D), lidt py.	Foldet						
30,35 - 32,35	2,00	2. gl. gn., b.p. Ret Lys, Fink., u gr.	30°						
32,35 - 32,40	0,05	Biot. gn. Grovskallet, br. biot.							
32,40 - 33,40	1,00	2. gl. gn., Alm. Ret Lys, Fin-Mlk., u gr.							
33,40 - 34,63	1,23	Biot. gn. Mørk, Mlk., br. biot., gr.							
34,63 - 35,60	0,97	D gn. Tyne Lakune py.							
35,60 - 35,75	0,15	Hurt. gn. Grovskallet, u gr.							
35,75 - 36,90	1,15	2. gl. gn., b.p. Ret Lys, Fink., u gr.							
36,90 - 37,60	0,70	2. gl. gn., Alm.							
37,60 - 40,00	2,40	2. gl. gn., b.p. Ret Lys, Fin-Mlk., spredt gr.	Foldet						

Lokalitet:

Borehull: 75c3

Slide 4

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning:

Hoyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
40,00 - 40,20	0,20	2gl. gn., b.d.	Ret Mørk, Fink., pyg impr.	35°					
40,20 - 41,00	0,80	"	Ret Mørk, Fink.	35°					
41,00 - 44,00	3,00	"	Ret Mørk, Fink., med bånd af Maf. Biot. gn.	Stygt Faldet					
44,00 - 46,90	2,90	"	Ret Mørk, Fink.	30°					
46,90 - 48,25	1,35	2gl. gn., Alm.	Ret Lys, Fink.	13°					
48,25 - 51,50	3,25	Hbl. gn.	Mørk, Fin-Mlk., uheldende indh. af br. biot., skarn, pyg impr.	Mægt Flad					
51,50 - 54,40	2,90	2. gl. gn., b. gn.	Ret Lys, Fink., pyg. i sliver						
54,40 - 56,50	2,10	Biot. gn. D. gn. tyne	Mørk, Mellemkornet, gr.-holdig pyg. impr.						
56,50 - 56,90	0,40	2gl. gn., b.d.	Ret Lys, Fink., pyg. impr.						
56,90 - 59,10	2,20	Biot. gn.	Ret Lys, Fin-Mlk., Kv-nig lidt gr., pyg. impr.	Talstet					
59,10 - 60,10	1,00	2. gl. gn., b. gn.	Lys, Fink., u pyg	34°					
60,10 - 64,70	4,60	2gl. gn., b.d.	Ret Mørk, Fin-Mlk. med en lyst bånd af Maf. Biot. gn. pyg. i sprække.	25°					
64,70 - 66,00	1,30	2. gl. gn. Alm.	Lys, Fin-Mlk.	30°					
66,00 - 67,00	1,00	"	Lys, Fin-Mlk., smid en skarn	Talstet					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7503

Side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
67,00 - 67,95	0,95	2gl. gn., b. gr.	Ret lye, Fink, Skarn						
67,95 - 70,00	2,05	2gl. gn., Alm	Ret lye, Fink, sp. Skarn, py. i sprekker						
70,00 - 71,00	1,00	2gl. gn., b.d.	lye, Fink, sp. Imm. gr., sv. py. impur						Foliet
71,00 - 71,45	1,45	Bakt. gn.	Ret lye, Fin-mtk, py. impur, litt Hbl.						Sprølet Foldet
71,45 - 74,27	2,92	2gl. gn., b. p.	Ret lye, Fin-mtk, litt Hbl.						Foliet?
74,27 - 74,50	0,13	"	Ret lye, Fin-mtk, litt Hbl, litt skarn						(13°) Svagt Foldet
74,50 - 76,85	2,35	2gl. gn., b. p.	Ret lye, Fin-mtk, litt Hbl, m. 3 cm ren bakt bånd midt						(30°)
76,85 - 78,55	1,70	2gl. gn., b.d.	lye, Fink, massiv, sp. gr.						Sprølet Foldet
78,55 - 78,63	0,08	Peg							
78,63 - 80,00	1,37	2gl. gn., b.d.	" , " , " , "						"
80,00 - 81,85	1,85	2gl. gn., Br.	lye, Fink, sp. gr., Mm. lunde lag af Musk						Svagt Foldet
81,85 - 81,99	0,14	Peg							
81,99 - 82,93	0,94	2gl. gn., b.d.	lye, Fink, massiv, sp. gr.						"
82,93 - 83,09	0,16	Peg							

Lokalitet:

Borehull: 7503

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 6.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
83,09 - 83,80	0,71	2gl gn, b.d. Lys, Fink, massiv, sp. gr.							
83,80 - 83,82	0,02	Peg							
83,82 - 87,00	3,18	2gl gn, b.d. Lys, Fink, massiv, sp. gr., Styr inntil af Musk ned etter	Snaght Foldet						
87,00 - 89,88	2,88	2gl gn, b.p. Lys, Fink, massiv sp. gr.	Snaght Foldet						
89,88 - 89,90	0,02	Pg + FeS Bånd							
89,90 - 90,10	0,20	2gl gn, Alm. Ekstrem Lys, Fink, Musk-ryg	30°						
90,10 - 90,86	0,76	2gl gn, Alm. Lys, Fink, massiv, sp. gr.	17°?						
90,86 - 91,01	0,15	Peg							
91,01 - 91,50	0,49	2gl gn, Alm- b.d. Lys, Fink, massiv, sp. gr. afgjende Musk inntil. ned etter	10°?						
91,50 - 92,50	1,50	2gl gn, b.d. Lys, Fink, massiv, sp. gr. ryg i snaght							
92,50 - 93,00	0,50	2gl gn, B.d. Lys, Fink, massiv, sp. gr., - b.p. ry ryg i snaght	28°?						
93,00 - 94,10	1,10	2gl gn, B.d. Lys, Fink, massiv, sp. gr., ryg i vertical snaght							
94,10 - 94,17	0,07	Bånd Bånd ryg.							
94,17 - 96,10	1,93	2gl gn, B.p. Lys, Fink, massiv, sp. gr. - b.d. Tynde Kants slagne foldet om vertical							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7503

Side 7

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
96,10 - 96,70	0,60	brak. gn. Ret Mørk, Fin-milt, sp. gr. Skarn-holdig, sv. py. impr.	Smilt Foldet						
96,70 - 101,47	4,77	2gl. gn, br- b.d. Ret Lys, Fink, massiv, sp. gr.							
101,47 - 101,86	0,34	brak. gn. Ret Mørk, Fin-milt, sp. gr. lidt skarn, sv. py. impr.	Smilt Foldet						
101,86 - 101,93	0,07	Peg.							
101,93 - 102,65	0,72	2gl. gn, B.d - br. Lys, Fink, massiv, sp. gr.							
102,65 - 102,80	0,15	brak. gn. Ret Mørk, Fin-milt, sp. gr. sv. py. impr.	Smilt Foldet						
102,80 - 104,05	1,25	2gl. gn, b.d. Lys, Fink, tynde bånd af Mørk sp. gr.	23°						
104,05 - 104,28	0,23	Peg.							
104,28 - 104,58	0,30	2gl. gn, b.d. Lys, Fink, sp. gr.							
104,58 - 104,65	0,07	Peg.							
104,65 - 104,90	0,25	2gl. gn, b.d. " , " , "	Smilt Foldet						
104,90 - 105,07	0,17	Peg.							
105,07 - 105,51	0,44	2gl. gn, bl. Lys, Fink, massiv, sp. gr.							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7503

Side 8

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
105,51 - 105,63	0,12	brakt gn. Mørk, Fin-milt, -gr, sv py. impur	Horiz?						
105,63 - 106,00	0,27	2gl gn, b.d. Lys, Fink, -gr massiv 10cm mangler a massiv	"						
106,00 - 107,00	1,00	" Lys, Fink, massiv, -gr 10cm mangler a massiv	"						
107,00 - 107,75	0,75	" Lys, Fink, massiv, -gr 2cm brakt gn bånd	"						
107,75 - 108,58	0,83	Mangler							
108,58 - 109,70	1,12	2gl gn, b.d. Lys, Fink, massiv, -gr	"						
109,70 - 110,00	0,30	2gl gn, Alm Lys, Fink, massiv, -gr	30°						
110,00 - 112,85	2,85	2gl gn, Alm Lys, Fink, massiv, -gr - B.p.	12°						
112,85		Forkastning? Hominat Flack med py	78°						
112,85 - 113,36	0,51	2gl gn, B.p. Lys, Fink, massiv, -gr, et 3cm brakt gn. bånd	25°						
113,36 - 113,68	0,32	brakt gn. Ret mørk, Fin-milt, -gr, sv py. impur	11°						
113,68 - 114,46	2,78	2gl gn, b.d. Lys, Fink, massiv, sv gr							
114,46 - 114,70	0,24	2gl gn, b.d. Ret Lys, Fin-Finmilt, py. impur	Faldet						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7503

Heiling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

Side 9.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
116,70 - 117,55	0,85	2 gl. gn, b. p. - Alm	Lys, Fink, massiv, - gr.						
117,55 - 118,50	0,95	2 gl. gn, b. d.	Ret mørk, Fink, sv. pyg. impr.	Faldet					
118,50 - 120,00	1,50	biot. gn. blå D. gn. Type?	Mørk, Mlk., lidt skær, små gr, pyg. impr.	20'					
120,00 - 128,70	4,70	biot. (Hbl) gn. D. gn. Type	Mørk, Fimmet - Mlk., brun biot. var. indh. af Hbl., gr. tilhænger i størrelse ned ad, pyg. impr.	Faldet					
124,70 - 124,99	0,29	biot. gn. D. gn. Type	Mørk, Mlk., små gr., pyg. impr.	Faldet					
124,99 - 125,18	0,14	Reg							
125,13 - 128,05	2,92	Biak. gn. D. gn. Type	Mørk, Fimmet - Mlk., brun biot., sv. gr., pyg. impr., var. indh. af Hbl.	Faldet					
128,05 - 128,60		2 gl. gn, Bd.	Lys, Fink, massiv, rød biot.,						
128,60 - 129,20	1,10	Biak. Reg.							
129,70 - 130,30	0,60	2 gl. gn, Bd.	Lys, Fink, massiv, - gr.	Faldet					
130,30 - 131,15	0,85	biot. gn. D. gn. Type	Mørk, Mlk., båndet, store gr.	Stykt					
131,15 - 133,05	1,90	2 gl. gn, Bd.	Lys, Fink, diat. Faldet, sv. gr.	"					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7503

Side 10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
133,05 - 133,55	0,50	biot-Hbl gn.	Mørk, Mlt, båndet, store gr.	Foliet					
133,55 - 137,00	0,45	2gl gn, Bt	Lys, Fink, med grov skallet bnt aftagende gr.						
134,00 - 134,18	0,18	Bt-Peg	Kvarts med grov skallet bnt						
134,18 - 134,38	0,20	Peg		Kraftig Foldet					
134,38 - 134,62	0,24	biot gn	Mørk, Mlt, store gr.						
134,62 - 134,73	0,11	2gl gn, b.d.	Lys, Fink, dypt fallent, -gr.						
134,73 - 136,12	1,39	biot gn	Mørk, Finmilt-Mlt, Hbl klotig, store gr.						
136,12 - 139,15	3,03	2gl gn, b.d.	Lys, Fink, dypt fallent, mørk sp. gr.						
139,15 - 139,46	0,31	Peg		20°					
139,46 - 142,20	2,74	2gl gn, b.d.	Lys, Inhomogen, luke store mengder Fink og Mlt biot, spredt gr., sp. pyr. impur.						
142,20 - 143,88	1,68	2gl gn, b.d.	Lys, Fink, dypt fallent, sp. gr.						
143,88 - 144,90	1,02	2gl gn, b.d.	Lys, Mlt, Kvarts-rik, en pyr. impur.	23°					
144,90 - 146,60	1,70	2gl gn, b.d.	Lys, Fink-Finmilt, dypt fallent, sp. gr, Malmets dypt bånd med lamm biot.						

Lokalitet:

Borehull: 7503

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 11.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
146,60 - 148,13	1,53	2gl gn, b.d.	Lys, lathomogen, Mlt., sp. gr. Partier med skallet bakt samt pyg						
148,13 - 148,18	0,05	Skønn							
148,18 - 149,24	1,06	2gl gn, b.d.	Lys, Finmkt., litt skønn, sp. gr, 2-5 cm brede bakt bånd med pyg.						
149,24 - 153,25	4,01	2gl gn, b.d.	Lys, Fink, massiv, sp. gr.						
153,25 - 153,40	0,15	Peg	"						
153,40 - 157,37	3,97	2gl. gn, b.d.	"						
157,37 - 157,75	0,38	"	Lys, Fink, massiv, sp. gr. bakt bånd med pyg. viser Fold- ning						
157,75 - 161,45	3,70	2gl gn, b.d.	Lys, Fink, massiv, sp. gr.						
161,45 - 161,87	0,42	bakt gn.	Mørk, Mlt., båndet, sp. gr.						
161,87 - 164,33	2,46	2gl gn, b.d.	Lys, Fin- FinMkt., dissej. fall, sp. gr.						
164,33 - 164,60	0,27	Peg							
164,60 - 166,12	1,52	2gl gn, b.d.	Lys, Finmkt., 1/2 cm st. gr.						
166,12 - 166,84	0,72	2gl gn, b.d.	Mørk, Mlt., båndet, 1 cm st. gr.						
166,84 - 169,10	2,26	Amf.							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7503

Side 12

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
169,10 - 169,55	0,75	2 gl. gn., b. d.	Ret Mørk, Fin-Finnmlk, spe. gr.						
169,55 - 169,95	0,07	Kvarts	Masse Kvarts						
169,95 - 170,00	0,05	Skarn							
170,00 - 171,49	1,49	2 gl. gn., b. d.	Ret Mørk, Fin-Finnmlk, spe. gr.	15°					
171,49 - 171,55	0,06	Peg.							
171,55 - 173,65	2,10	2 gl. gn., b. d.		40°					
173,65 - 173,70	0,05	Peg.							
173,70 - 175,35	1,65	2 gl. gn., b. d.	Ret Mørk, Fin-Finnmlk, sv. stikk- liket	18°					
175,35 - 175,54	0,19	Peg.							
175,54 - 179,65	4,11	2 gl. gn., b. d.	Ret Mørk, Fin-Finnmlk, brändet af 1-2 cm brede bränd. gn. bånd	Faldet					
179,65 - 182,30	2,65	2 gl. gn., b. d.	Ret Mørk, Fink, spe. gr., utel- ke 1 cm bränd. gn. bånd	Spikket Faldet					
182,30 - 182,80	0,50	2 gl. gn., b. d.	Ret Mørk, Finnmlk, store gr.						
182,80 - 186,48	3,68	2 gl. gn., b. d.	Ret Gys, Fink, spe. gr., masse	30°?					
186,48 - 186,98	0,50	Amf.	Mørk, brist-holdig, store gr.	Faldet					
186,98 - 187,18	0,20	2 gl. gn., b. d.	Ret Gys, Fin-Finnmlk, gr.-rig	"					
187,18 - 187,29	0,11	Amf.	Mørk, brist-rig, store gr.	"					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7503

Side 13

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
187,29 - 187,85	0,56	2gl gn, b d	Ret Mørk, Finmilt, gr - holdig	Foldet					
187,85 - 188,00	0,15	liet gn	Mørk, Finmilt, brun og rød liet, sv Hbl, litt skarn, litt Chlorit gr - holdig, sv py smg.	Foldet					
188,00 - 191,90	3,90	2gl gn, b p - b d	Ret Mørk, Finmilt, litt skarn gr - mig, litt Chlorit.	Foldet					
191,90 - 192,61	0,71	2gl gn, b p b d	Lys, Fink, massiv, sv. skic- holdig	"					
192,61 - 192,80	0,19	liet gn	Inhomogen, briklet bånd, Kvarte sliver med Carbonat, litt skarn	Foldet om vertical					
192,80 - 195,95	3,15	2gl gn, b d	Lys, Fink, sv skicholdig	"					
195,95 - 196,05	0,10	Skarn							
196,05 - 198,45	2,40	2gl gn, b d - liet gn	Mørk, Finmilt, rød-brun liet skarn-holdig	"					
198,45 - 200,85	2,40	2gl gn, b d	Ret Mørk, Fink, brun liet, litt skarn	Foldet? 15°?					
200,85 - 202,00	1,15	2gl gn, b d	Ret Lys, Fink, gr holdig	20°					
202,00 - 204,37	2,37	Hbl - liet gn D gn Tyne?	Mørk, Finmilt - Mlt, brun liet gr - mig						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7503

Side 14

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
204,37 - 206,6	2,23	2 gl. gn., b. d. - b. r.	Ret lya, Fink, shor. gr - andukket med etter.						
206,60 - 209,68	3,08	Amf.	Ret Mørk, liat-halshy, nys na shore gr						
209,68 - 210,15	0,47	2 gl. gn., b. d.	Ret lya, Fink, ex gr, Masen						
210,15 - 210,50	0,35	Amf.	Mørk, liat-halshy, gr - nys						
210,50 - 213,50	3,00	2 gl. gn., b. d.	Ret lya, Fink, gr - skistalshyk						Homogen
213,50 - 213,70	0,20	Biot.	Monomineralisk band of liat						
213,70 - 215,08	1,38	2 gl. gn., b. d.	Ret lya, Fink, gr - skistalshyk						"
215,08 - 215,18	0,16	Peg							"
215,18 - 216,70	1,52	2 gl. gn., b. d.	"						"
216,70 - 216,82	0,12	Skarn							"
216,82 - 217,20	0,38	2 gl. gn., b. d.							"
217,20 - 217,50	0,30	liat gn.	Mørk, Fink - Mlt., gr - nys						
217,50 - 218,50	1,00	2 gl. gn., b. d.	Ret lya, Fink, gr - skistalshyk						Homogen
218,50 - 219,00	0,50	Amf.	Mørk, Fink, brunn liat, gr. - nys						Styl
219,00 - 219,33	0,33	2 gl. gn., b. d.	Lya, Fink - Tsch, liat Hbl., vorte - nys, gr - skistalshyk						

Lokalitet:

Borehull: 7503

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

S. de 15

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
219,33 - 220,72	1,39	Amf	Mörk, Finmilt, brun biak, gr - ryg						
220,72 - 220,94	0,22	2gl. gn, b.d.	Lys, Fink, Kraks-ryg, lukt Hbl, gr - ryg	Faldet					
220,94 - 221,40	0,46	brak gn.	Mörk, Fin - Finmilt, brun biak lukt Hbl, gr - ryg						
221,40 - 221,90	0,50	2gl. gn, b.d.	Rel Lys, Fink, massiv, gr - ryg	Homogen					
221,90 - 226,58	4,68	Hbl. gn.	Mörk, Fink, var. mængde brun biak - ryg	Faldet om vertik					
226,58 - 228,44	1,86	2gl. gn, b.p.	Lys, Fink, disp. folieret, sp. gr	Homogen					
228,44 - 229,27	0,83	2gl. gn, b.d. - brak gn.	Mörk, Fink, brun biak, lukt Hbl, sp. gr	Varied					
229,27 - 229,38	0,11	Pxy							
229,38 - 230,00	0,62	2gl. gn, b.d. - biak gn.	Mörk, Fink, lukt Hbl, brun biak, sp. gr, skum lykt hånd mlt, med Hbl og lukt ryg.	50°					
230,00 - 231,10	1,10	2gl. gn, b.d. - b.p.	Rel Lys, Fin - Finmilt, sp. gr						
231,10 - 234,13	3,03	Hbl. gn. / Amf	Mörk, Finmilt, gr - ryg, sv ryg imper	40° Faldet?					

Lokalitet:

Borehull: 7503

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Scale 1:6

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
234,13 - 234,55	0,42	brak gn. D gn Tyre	Ret Mørk, Finmilt, brun brak gr-holdig, pyg impur	Faldet					
234,55 - 234,80	0,25	Hbl gn/Amf	Mørk, Finmilt - Mlk, små gr spør pyg	3 skadet Faldet					
234,80 - 235,15	0,35	2 gl. gn, b-d - brak gn	Ret lys, Fin - Finmilt, små gr sv pyg impur	Homogen					
235,15 - 235,60	0,45	Hbl gn	Mørk, Finmilt, gr-rig, pyg impur	Faldet on vertical					
235,60 - 236,60	1,00	2 gl. gn, b-d - brak gn	Ret Mørk, Finmilt, gr-rig pyg impur - pyg-rig med etter						
236,60 - 236,65	0,05	Amf		4°					
236,65 - 237,10	0,45	brak gn D gn Tyre	Ret Mørk, Finmilt - Mlk, grovskal- let brun brak, lett Hbl, gr-rig pyg impur	Horiz.?					
237,10 - 237,40	0,30	2 gl. gn, b-d	Ret lys, Fin - Finmilt, gr-skatoli- kisk, sv pyg impur	"					
237,40 - 237,56	0,16	brak gn D gn Tyre	Ret Mørk, Finmilt - Mlk, grovskal- let brak, lett Hbl, gr-rig, pyg impur	"					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7503

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

Side 17

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
237,56 - 238,57	1,01	2gl gn., b.d.	Ret Lys, Fin-Finnmlk, gr-schie- holisk, sv py impr.						
238,57 - 241,92	3,35	biot.-Hbl gn. D. gn Type	Ret Mørk, Finnmlk-Mlk, grov- skallet biot, var mangde Hbl, gr-nig, gr-nig, py-nig	20°					
241,92 - 242,20	0,28	2gl gn., b.d.	Ret Lys, Fin-Finnmlk, lilla Hbl, små gr, py impr	Faldet					
242,20 - 243,85	1,65	Hbl-biot gn D. gn Type	Ret Mørk, Finnmlk-Mlk, lise del brun biot og Hbl, gr-nig, py-nig	"					
243,85 - 244,10	0,25	2gl gn., b.d.	Lys, Fink., gr-schieholisk	37°					
244,10 - 245,70	1,60	Hbl-biot gn D. gn Type	Ret Mørk, Finnmlk-Mlk, lise del brun biot og Hbl, gr-nig, py-nig, 4 horisonter 5-10 cm af kvarts med Fink. gr og biot.	15°					
245,70 - 247,00	1,30	Hbl-biot gn D. gn Type	Ret Mørk, Finnmlk-Mlk, brun biot og Hbl, gr-nig, py-nig	Snægt Faldet					
247,00 - 248,00	1,00	"	— " —	Stygt Faldet					
248,00 - 250,40	2,40	"	— " —	10°					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7503

Side 18

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
250,40 - 250,73	0,33	2 gl. gn., b.d.	Ret Lys, Fin - Finmikk, sp. gr. sv. py. impur.						
250,73 - 251,70	0,97	brak. gn.	Mørk, Fin - Finmikk, lett Hbl., sp. gr., sv. py. impur.						5°
251,70 - 253,10	1,40	2 gl. gn., b.d.	Ret Mørk, Fin - Finmikk, sp. gr. sv. py. impur., 2 cm brakt. bånd						Folielikt
253,10 - 253,26	0,16	Peg.							
253,26 - 254,75	1,49	2 gl. gn., b.d.	Ret Lys, Fin - Finmikk, lett skumb., lett Hbl., sp. gr.						
254,75 - 257,00	2,25	2 gl. gn., b.d.	Lys, Fin - Finmikk., gr. - sk. - kalidisk, store gr.						Homogen
257,00 - 260,00	3,00	2 gl. gn., b.d. - b.n.	Lys, Fink., massiv, sp. gr.						"
260,00 - 261,40	1,40	2 gl. gn., b.d. - b.p.	Lys, Fink., tynde braktlag, grønn.						25°
261,40 - 264,10	2,70	Amf.	Mørk, Finmikk, brakt-kalidisk rødt på store gr.						Folielikt
264,10 - 265,17	1,07	2 gl. gn., b.p.	Lys, Fink., massiv, sp. gr.						
265,17 - 265,28	0,11	Peg.							

Lokalitet:

Borehull: 7503

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

Side 19

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
265,28 - 268,00	1,72	2gl. gn., b.d. - b. p.	Lys, Fink, massiv, sp. gr. sp. p. p.	10°?					
267,00 - 268,85	1,85	2gl. gn., b.d.	Lys, Fink, massiv, gr.-sk. foliatisk m. store gr., lidt Chlorit						
268,85 - 268,95	0,10	Pez.							
268,95 - 269,65	0,70	2gl. gn., b.d.	"						
269,65 - 270,75	1,10	2gl. gn., b.d.	Ret. lys, Fin-Finmkt., sp. gr., bånd med grov brist og Hbl	Faldet					
270,75 - 271,60	0,85	2gl. gn., b.d.	Ret. lys, Fin-Finmkt., små gr.	30°					
271,60 - 271,75	0,15	Maf. brist. gn.	Amf. - ligende						
271,75 - 272,20	0,45	2gl. gn., Bp.	Lys, Fin-Finmkt., foliatisk små gr.	30°					
272,20 - 272,37	0,17	Pez.							
272,37 - 274,15	1,78	2gl. gn., Albn - b. p.	Lys, Fink., små gr., m. bånd af Maf. Brist. gn.	35°					
274,15 - 274,45	0,30	2gl. gn., b. p. / Maf. brist. gn.	To horisonter er faldet sammen i kernen	vertikal Faldet					
274,45 - 274,75	0,30	Amf.							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull 75-3

Side 2c

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
274,75 - 276,30	1,55	Lgt gr. Type	25-30°						
276,30 - 279,60	3,30	brak gr., D gr. Type							
		Lys, Fimmlé, Mørk-rig Røt Mørk, Fimmlé, brun brak, var mangde Hbl, py-rig							
279,60 - 279,98	0,38	Peg	20°						
279,98 - 280,60	0,62	brak gr., D gr. Type							
		Amf.							
280,60 - 280,85	0,25		20°						
280,85 - 285,30	4,45	brak gr., D gr. Type							
285,30 - 285,70	0,40	Peg.	2°						
		Med 10cm brak gr. bånd							
285,70 - 287,30	1,60	brak gr. - Hbl gr. D gr. Type							
		Røt Mørk, Fimmlé, brun brak, Hbl. i ca. lige store mengder 2cm store gr., py-rig							
287,30 - 287,04	1,74	brak gr., D gr. Type	4°						
		Røt Mørk, Fimmlé, brun brak, Hbl py-rig, D?, py-rig							

Lokalitet:

Borehull: 7503

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Side 21

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
289,09 - 289,19	0,15	Peg.							
289,19 - 292,70	3,51	biot. gn. D. gn. Type	Ret Mørk, Finmilt, brun biot. var mangde Hbl., gr.-nig, D py-nig	8 ^e					
292,70 - 293,35	0,65	2. gr. gn., Alm	Ret lys, Finmilt, Mørk, brun biot., gr.-holdig, fawn overgang til biot. gn., D. gn. Type, py- impr.	Snick Foldet					
293,35 - 294,40	1,05	biot. gn. D. gn. Type	Ret Mørk, mlt, brun biot, gr.- holdig, py-nig	11					
294,40 - 294,70	0,30	Kvarts	Massiv Kvarts-(gang.)						
294,70 - 295,70	1,00	biot. gn. D. gn. Type	Ret Mørk, mlt, brun biot, gr.- holdig, z, D, py-nig	11					
295,70 - 296,05	0,35	2. gr. gn., Alm	Ret lys, Finmilt, Mørk, brun biot., gr.-holdig, fawn overgang til biot. gn., D. gn. Type, py- impr.						
296,05 - 297,68	1,63	biot. gn. D. gn. Type	Ret mørk, Mlt, brun biot, gr.-holdig, z, D, py-nig	Flake Held- mangr					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

Borehull: 7503

Side 22

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
297,68 - 298,90	1,22	biot. gn. D. gn. Type	Mørk, Finsmilt - Mlk., brun biot., Hbl. i 5 cm brede bånd samt spredt i var. men uorden mængde, Z, D?, py - rig	Flade Hald- ninger					
298,90 - 299,72	0,82	biot. gn. D. gn. Type	Mørk, Finsmilt - Mlk., brun biot., Z, D?, py - rig	"					
299,72 - 300,30	0,58	2. gl. gn., Alm	lys, Fin - Finsmilt, Musko - rig sp. gr.	15°					
300,30 - 302,02	1,72	2. gl. gn., Alm og Biot. gn.	10 - 2 cm brede bånd af 2. gl. gn. vekselvise med 2 - 10 cm bånd af biot. gn. 2. gl. gn.: lys Fink, få gr., + py biot. gn.: Hbl. - holdig, gr., py.	10(?) Spredt Foldet?					
302,02 - 304,60	2,58	biot. gn. D. gn. Type	Ret Mørk, Mlk., brun biot., små gr., enkelte Hbl - rige 2 cm bånd, py - rig						
304,60 - 304,80	0,20	Amf	Mørk, store gr.						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7503

Side 23

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
304,80 - 304,90	0,10	biot. gn. Dgn. Type	Ret Mørk, Mlk, brun biot, små gr, pyg. ryg	Horizont					
304,90 - 305,10	0,20	2 gl. gn. Altn	lys, Finmilk - Fink, få store gr.	"?					
305,10 - 305,18	0,08	Peg							
305,18 - 306,90	1,72	biot. gn. D. gn. Type	Ret Mørk, Mlk, brun biot, Hbl. ivar. men u. ordn. mangde, små gr pyg-ryg	?					
306,90 - 308,85	1,95	Mørk. gn. D. gn. type	Ret lys, Mlk - grov Mlk, brun biot i u. ordn mangde, små gr. pyg-ryg	Flade Haldning					
308,85 - 310,07	1,22	biot. gn. D. gn. Type	Ret Mørk, Mlk - Finmilk, brun biot, små gr, pyg-ryg, Z	"					
310,07 - 310,20	0,13	Peg							
310,20 - 311,00	0,80	biot. gn. D. gn. Type	Ret Mørk, Mlk - Finmilk, brun biot, små gr, pyg. imør af- lagende medelef	Foldet					
311,00 - 313,30	2,30	Amf.							
313,30 - 313,48	0,18	2 gl. gn. Bp.	Ret Mørk, Fink, - gr.						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7503

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

Side 24

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
313,48 - 316,22	2,74	Amf/Hbl.gr	Mørk, Mlk, 1 nkomogen, gul skum, litt brun brist, Flere 2 cm bånd af brist.	20'					
316,22 - 316,45	0,23	Peg							
316,45 - 317,05	0,60	Amf./Hbl.gr	Mørk, Mlk, 1 nkomogen, gul skum, litt Braun brist.	Horizon- tal					
317,05 - 319,08	2,03	2 gl.gr, 6 gr	Ret Lys, Fink, massiv, små gr.	Homogen					
319,08 - 319,15	0,07	Amf.	Mørk, Fink, Fink	10'					
319,15 - 319,33	0,18	2 gl.gr, 6 gr	Ret Lys, Fink, massiv, små gr	Homogen					
319,33 - 319,81	0,48	Peg.							
319,81 - 320,31	0,50	Amf	Mørk, Fink, store gr	13'					
320,31 - 321,06	0,75	"Chloridit"	Monomineralisk lys brist af Chlorid						
321,06 - 324,23	3,17	Amf.	Mørk, Fink, store gr.	11'					
324,23 - 324,77	0,54	Peg i Amf.	Phycmatisk foldet Peg i Amf.						
324,77 - 326,75	1,98	Amf.	Mørk, Fink, små gr	13'					

Lokalitet:

Borehull: 7503

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 25

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
326,75 - 329,15	2,40	2 fl gr, b pr. Rel Lys, Fink, mange små gr, sv gr imp, 2 cm Amp. bånd	Homogen						
329,15 - 329,78	0,63	Amp. Mørk, Fink, rødt på små gr							
329,78 - 330,02	0,24	Peg.							
330,02 - 331,42	1,40	Amp. Mørk, Fink, u. ordn. mengde brak, gr-ris	10'						
331,42 - 331,70	0,28	Peg.							
331,70 - 332,08	0,38	Amp. Mørk, Fink, u. ordn. mengde brak, gr-ris							
332,08		Booringen Afsluttet							
Beskrivelsen utført 2 Mo, August 1976									
F.O. Rasmussen									
NB! 360°'s inndeling.									

Lokalitet: Mofjellet

Dato : 1976

Koordinater : X = 925.430.35 Y = 44.881.00

Retning :

Helling/stigning : lodret avviksmålt

Borehull: 7502

Høyde : 209,60 m

Lengde : 334,53 m

Side 1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0 - 1,55	1,55	løs jord							
1,55 - 3,00	2,60	2 gl. gn., alm.	lys, lidt gr., spor ell. sv. py. impr.	31°					
3,00 - 4,15		— do. —	— do. —	35°					
4,15 - 4,18	0,03	Skarn	grågrøn						
4,18 - 6,00	2,51	2 gl. gn., alm.	lys, få gr., stedvis en del chlort, spor py.	40°					
6,00 - 6,69		— do. —	— do. —	32°					
6,69 - 6,72	0,03	maf. biot. gn.	mlk.						
6,72 - 7,80	1,08	2 gl. gn. alm.	liat gr., sv. py. impr.	26°					
7,80 - 8,18	0,38	2 gl. gn., b.d.	fin mlk., mørk, biot. gn. lgn., gr. py. impr.	27°					
8,18 - 8,29	0,11	2 gl. gn., alm.	rel. gl. rg., få gr., sv. py. impr.	25°					
8,29 - 8,30	0,01	— do. —	— do. —, stribem. <u>ZnS</u>						
8,30 - 8,50	0,20	— do. —	— do. —						
8,50 - 10,00	1,50	2 gl. gn., alm.	fin mlk., få gr., stedvis en anelse skarn faldet, 28°						
10,00 - 10,11	0,11	pegm.							
10,11 - 10,15	0,04	2 gl. gn., alm.							
10,15 - 10,50	0,35	pegm.							
10,50 - 10,62	0,12	2 gl. gn., alm.	spor af py.	31°					
10,62 - 11,12	0,50	pegm.							
11,12 - 11,37	0,25	2 gl. gn. alm.	gl. rg., sv. py. impr., spor af <u>ZnS</u>						
11,37 - 11,63	0,26	pegm.							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7502

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Side 2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
11,63 - 13,00	3,22	2 gl. gn., alm.	anelse skarn, spor af py.	27° 32°					
13,00 - 14,00		2 gl. gn., alm. (-b.p.)	anelse gr., spor af py.	27° foldet					
14,00 - 14,85		2 gl. gn., b.p.	anelse gr.	23° foldet					
14,85 - 15,76	0,91	pegm.							
15,76 - 16,20	0,44	2 gl. gn., b.d.	hom., anelse gr.	23°					
16,20 - 18,00	5,65	2 gl. gn., b.p.	— do. —	foldet					
18,00 - 19,00		— do. —	— do. —, u. ordn. m. m. sk.	16° foldet?					
19,00 - 20,00		2 gl. gn., alm.	— do. —, b.p. nederst	35°					
20,00 - 21,00		— do. —	— do. —	33°					
21,00 - 21,85		— do. —	— do. —	foldet					
21,85 - 21,86	0,01	Skarn							
21,86 - 22,25	0,39	2 gl. gn., alm.	hom., anelse gr.	27°					
22,25 - 24,62	2,37	2 gl. gn. alm.	lys, delvis m. sk. gn., spor af py.	foldet, delvis stejlt					
24,62 - 24,92	0,30	2 gl. gn., m. tynde lag biot. gn.	i forb. m. biot. gn. lag: py. impr. og striber af ZnS	Stejlt foldet					
24,92 - 25,74	0,82	2 gl. gn., b.p.	spor af py	Stejlt foldet					
25,74 - 25,88	0,14	2 gl. gn., m. tynde lag biot. gn.	biot. gn. fører py. impr. og striber af ZnS	foldet					
25,88 - 27,00	4,24	2 gl. gn., b.p. - alm.	lys, spor af py.	foldet					
27,00 - 30,12		2 gl. gn., alm.	lys, et par steder spor af py.	foldet					
30,12 - 30,34	0,22	2 gl. gn., m. tynde lag biot. gn.	danner jævn overgang	38°					
30,34 - 32,39	2,05	hbl. gn./biot. gn., D. gn.	mik. - fin mik., br. biot., biot. gn. u. ordn. men tilføjer nedefter, Py. impr. delv. svag	foldet					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7502

Side 3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
32,39 - 32,46	0,07	biot. gn., D. gn. type	mik., br. biot., py. impr., lidt spredt <u>ZnS</u>						
32,46 - 38,56	6,10	2 gl. gn., alm.	få gr., enkelte m. sk. nge partier						Kraftig foldet, mest stejlt, 47-18°
38,56 - 38,69	0,13	pegm.							
38,69 - 41,45	2,76	2 gl. gn., alm. (-b.p.)	næsten u. gr., lidt py. ved tynde sprækker						Kraftig foldet, 19°
41,45 - 41,76	0,31	biot. gn., D. gn. type	mik., u. gr., br. biot., py. impr.						foldet
41,76 - 41,85	0,09	2 gl. gn., alm.	Lys, u. gr., D ³ , sv. py. impr.						foldet
41,85 - 42,13	0,28	biot. gn., D. gn. type	mik., br. biot., øverst m. lidt 2 gl. gn. nederst lidt hol., sv. <u>ZnS</u> impr.						13° foldet
42,13 - 42,79	0,66	biot. gn., D. gn. type	mik., br. biot., mørk, py. impr.						22° foldet
42,79 - 42,96	0,17	— do —	— do —, sv. <u>ZnS</u> impr.						
42,96 - 44,99	2,03	2 gl. gn., alm.	delv. fin mik., næsten u. gr.						23° kraftig foldet
44,99 - 45,02	0,03	Calcit m. skarn							
45,02 - 45,90	2,83	2 gl. gn., bp (-b.d.)	Lys, få gr.						foldet
45,90 - 47,85		2 gl. gn., bd (-b.p.)	Lys, få gr., spor af py., m. tynd foldet pegm.						foldet
47,85 - 47,93	0,08	pegm.							
47,93 - 49,20	1,27	2 gl. gn., b.p.	få gr.						30° foldet
49,20 - 50,58	1,38	2 gl. gn., alm.-b.p.	få gr., spredte, diffuse tynde mørke bånd						27°
50,58 - 51,03	0,45	2 gl. gn., b.d.	mørk, gr.						37°
51,03 - 52,96	1,93	2 gl. gn., bd.-alm.	Lys, enkelte diffuse tynne, mørkere lag m. lidt skarn						31°

Lokalitet:

Borehull: 7502

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Side 4.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
52,96 - 53,18	0,22	biot. gn. m. skam.	mlk, mørk, næsten m. 2 gl. gn., py. impr.						
53,18 - 53,90	2,62	2 gl. gn., b. d.	få gr., m. lodret 3-10 mm bred kvarts- åre, ryg på 3-7 mm korn af py.	26°					
53,90 - 55,20		2 gl. gn., b.p. - b. d.	få gr., stedvis lidt py. i forb. m. kvarts	?					
55,20 - 55,80		2 gl. gn., b. d.	få gr., lys, m. lodret 1- flere cm bred kvartsåre m. indtil 8 mm korn af py.	foldet					
55,80 - 57,85	2,05	2 gl. gn., b. d. - alm.	lys, få gr., alm. nedefter, spor ell. sv. py. impr., delvis chloritiseret ved sprækker, Calcit i forb. m. sprækker.	2 26°					
57,85 - 60,05	5,09	2 gl. gn., b.p.	lidt gr., nedefter mere 2 gl. gn. alm.	24°					
60,05 - 61,30		2 gl. gn., alm.	næsten u. gr.	25° foldet					
61,30 - 62,05		2 gl. gn. b.p.	ret mørk, spredt gr.	29°					
62,05 - 62,94		2 gl. gn., alm.	lys, få gr.	20° foldet?					
62,94 - 63,04	0,10	biot. gn.	ret lys, py. impr.						
63,04 - 65,00	1,96	2 gl. gn., alm.	få gr.	26° småfol- det nederst					
65,00 - 65,27	0,27	biot. gn., D. gn. type	mlk, smågr., br. biot., lidt hbl., py. impr.						
65,27 - 65,28	0,01	— do. —	do. m. spor af <u>ZnS</u>						
65,28 - 66,05	0,77	— do. —	mlk, smågr., br. biot., lidt hbl., py. impr. (ofte ng)	23°					
66,05 - 66,41	0,36	2 gl. gn., alm.	fin mlk., biot. gn. lign., u. py.						
66,41 - 69,82	3,41	biot. gn., D. gn. type - omd. D. gn. type	mlk., br. biot., små gr., D. lidt staur., u. ordn. lidt hbl., py. impr. (ofte ng), stedvis py. i terninger, nedefter endel (D)	30° foldet? 4°					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7502

Helling/stigning :

Hoyde :

Lengde :

Side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
69,82 - 70,62	0,80	pegm.							
70,62 - 73,65	3,03	biot. gn., D. gn. type	mlk.-grov mlk., br. biot., små gr., D. and- se hbl., Py. impr. ofte rigt og i terninger, et par u. ordn. hbl. gn. horisonter.	24°					foldet?
73,65 - 73,95	0,30	2 gl. gn., b.p.	fin mlk., ret mørk biot. gn. lign., gr., stedvis stictolitisk, sv. py. impr.						
73,95 - 74,27	0,32	2 gl. gn., alm.	lys, lidt gr.	5°					
74,27 - 77,65	3,38	2 gl. gn., b.p. (-alm.)/ biot. gn. (minder end D. gn.)	fin mlk., ofte mlk. og ret mørk med biot. gn. præg, få gr., br. biot., øverst py. impr.	foldet, ofte stejlt, 27°, 29°					
77,65 - 78,37	0,72	biot. gn., D. gn. type	mlk., mørk, br. biot., små gr., u. ordn. lidt hbl. (Kærv?), py. impr. ofte i tern.	23°					
78,37 - 78,49	0,12	2 gl. gn., b.p.							
78,49 - 78,69	0,20	pegm.							
78,69 - 79,32	0,63	2 gl. gn., b.p.	få gr., lys, sort biot.	11°					
79,32 - 79,47	0,15	biot. gn., D. gn. type	mlk., mørk, br. biot., py. impr. ofte i tern.						
79,47 - 79,62	0,15	2 gl. gn., b.p.	lys, få gr., sort biot., 2 tynde pegm.	foldet					
79,62 - 80,70	1,03	biot. gn., D. gn. type	mlk., mørk, br. biot., u. ordn. lidt hbl. (incl. kærv?), små gr., py. impr. ofte i tern.	foldet 14°					
80,70 - 81,86	1,16	biot. gn., D. gn. type	mlk., rel. lys, br. biot., få gr., u. ordn. hbl. gn. partier, py. impr.	19°					
81,86 - 83,32	1,46	2 gl. gn., alm. (-b.p.)	lys, homogen, næsten u. gr.	kraftig foldet					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7502

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Side 6

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
83,32 - 84,18	0,86	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., få gr., lidt musk, lidt karn, py. impr., kraftig foldet m. 2 gl. gn.						kraftig foldet
84,18 - 84,30	0,12	hbl. gn.	lys, py. impr.						
84,30 - 84,94	0,64	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., få gr., py. impr.						42°
84,94 - 85,06	0,12	Skarn	grågrøn m. hbl., py. impr.						
85,06 - 85,26	0,20	biot. gn., D. gn. type	mlk., py. impr.						
85,26 - 86,06	0,80	biot. gn.	lys, inhomogen m. lyse 2 gl. gn. lign. partier og hbl. rige partier, br. biot., py. impr., nederst lys hbl. gn.						10°
86,06 - 90,00	8,14	biot. gn., D. gn. type/ biot.-hbl. gn.	mlk., mørk, br. biot., spredt gr., D, py. impr., u. ordn. hbl., forh. biot./hbl. ca 2/1 - 1/1 i nedre del						22° foldet ofte stejlt
90,00 - 93,00		biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., lidt spredt gr., D, u. ordn. hbl., py. impr.						34° foldet?
93,00 - 94,20		— do. —	— do —, homogen						rel. flad?
94,20 - 94,65		hbl. gn.	u. ordn. biot. gn., py. impr.						?
94,65 - 95,95	1,30	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., lidt gr., py. impr. ofte rigt						28°, 13°
95,95 - 96,69	0,74	biot. gn./hbl. gn.	mlk., hbl. gn. nedefter, 3-4 mm gr., lidt skarn, py. impr.						15°
96,69 - 100,00	6,56	2 gl. gn., b.d. (-b.p.)	hom., u. gr., lysest øverst, jævnt spredt lidt gullig skarn (epidot)						? foldet?
100,00 - 103,25		2 gl. gn., b.d.	lys, hom., massiv, u. gr.						?

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7502

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

side 7

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
103,25 - 104,15	0,90	2 gl. gn., b. d.	hom., lys, u. gr., m. tynde inifoldede lag af maf. biot. gn. m. gr., lidt gullig skarn						
104,15 - 106,35	2,20	2 gl. gn., b. d. (-b.p.)	spor af gr., lidt m. sk.						
106,35 - 107,85	1,50	2 gl. gn., b.p.	lidt gr., m. cm-tynde maf. lag						
107,85 - 111,93	4,08	2 gl. gn., b.p.	lys, hom., massiv, mest u. gr.						
111,93 - 112,03	0,10	Amfibolit	fink., sort, ng på gr.						
112,03 - 113,29	1,26	2 gl. gn., b. d.	lys, hom., massiv, få gr., m. 2 cm gr. amf.						
113,29 - 113,62	0,33	Amfibolit m. skarn	små gr., m. 2 skarnlag (cm tynde)						
113,62 - 115,65	2,03	Amfibolit	fink, sort, ng på små gr., u. ordn. biot.						
115,65 - 115,72	0,07	Skarn	grågrøn						
115,72 - 117,80	2,08	Amfibolit	sort, massiv, lidt gr., enkelte tynde lag m. grågrøn skarn						
117,80 - 118,02	0,22	Kvarts							
118,02 - 120,55	2,53	Amfibolit	sort, massiv, nedefter rel. gr. ng						
120,55 - 120,83	0,28	Skarn	lys. gr., lidt hbl.						
120,83 - 120,89	0,06	Chlorit bergart	monomineralisk, m. blanke harniskflader						
120,89 - 120,98	0,09	Amfibolit	m. chloritiserede flader						
120,98 - 121,12	0,14	Kvarts							
121,12 - 121,40	0,28	maf. biot. gn.	fink, lidt gr., lidt amf. udseende, u. py.						
121,40 - 122,03	0,63	Amfibolit	ng på 3-4 mm. gr.						

Lokalitet:

Dato :

Koordinator :

Retning :

Borehull: 7502

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

side 8

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
122,03 - 122,50	0,47	maf. biot. gn.	rel. fink., lidt gr., amf. udseende	foldet (indfoldet)						
122,50 - 122,90	0,40	biotitng amf.	rel. lys, gr.	foldet						
122,90 - 123,35	0,45	maf. biot. gn.	rel. fink., lidt gr., amf. udseende	foldet (indfoldet)						
123,35 - 123,55	0,20	biot. ng amf. m. skarn	gr., spredt grågrøn skarn							
123,55 - 124,79	1,24	2 gl. gn., b.d.	mørk, biot. gn. præg, små spredte gr.	21°						
124,79 - 126,24	1,45	Amfibolit	fink., sort, lidt biot., små spredte gr.	24						
126,24 - 126,36	0,12	Skarn	fink., grågrøn							
126,36 - 128,50	2,14	Amfibolit	fink., sort m. 2-3 mm gr., stigende biot. indh. opad	11°						
128,50 - 129,80	1,40	maf. biot. gn.	efter jævn overgang mørk amf. ovenfor, fink., mørk amf. udseende, gr., il. oran. hbl.	14°						
129,80 - 132,68	2,88	2 gl. gn., b.d. (-b.p.)	få gr., lys massiv, mørkere nedefter	27, 15° foldet						
132,68 - 132,90	0,22	maf. biot. gn.	skarn holdig							
132,90 - 133,53	0,63	maf. biot. gn.	mlk., sort, amf. udseende, lidt hbl. i, mest il. py., (grønlig) sort biot.	8°						
133,53 - 133,79	0,26	2 gl. gn., b.d.	få gr., lys	17°						
133,79 - 134,76	0,97	maf. biot. gn.	mlk., sort, amf. udseende, stedvis lysere partier, lidt hbl., (grønlig) sort biot., mest il. py., il. ordn. lidt grågrøn skarn	få foldet?						
134,76 - 135,83	1,07	2 gl. gn., b.d.	fink., hom., ret mørk, lidt gr., lidt skarn	11°						
135,83 - 135,89	0,06	Amfibolit	mlk., m. biot., lidt skarn	20°						
135,89 - 138,04	2,15	2 gl. gn., b.d.	fin.-fin mlk., ret hom., lidt gr., ret mørk stedvis biot. gn. præg, anelse skarn	17°						

Lokalitet:

Borehull: 7502

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Højde :

Lengde :

Side 9

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
138,04 - 138,09	0,05	Amfibolit	lys, mik. m. biot.							
138,09 - 140,00	5,29	2 gl. gn. b.d	fin-fin mik., mørk type delv. m. biot. gn. præg, sort biot., lidt gr., anelse grågrøn. Skarn, et par cm-tynde maf. lag.	17° 35° 23°						
140,00 - 142,65		— do. —	fin-fin mik., delv. mørk type, små gr. et par steder spor af py. og FeS i kvarts	foldet 26°, 23°						
142,65 - 143,38		— do. —	fin-fin mik., mørk type delv. m. biot. gn. præg, små gr.	32°						
143,38 - 145,48	6,22	2 gl. gn., b.p.	fin-fin mik., små gr.	foldet 30°, 25°						
145,48 - 146,30		— do. —	— do. — m. mørke indslag	foldet, 29°						
146,30 - 149,60		— do. — b.d.	— do. —	kraftigt stejlt foldet						
149,60 - 150,04	0,44	2 gl. gn., b.p. - b.d	fin mik., ret ng på gr., mørk m. præg af biot. gn.	foldet om verti.						
150,04 - 151,92	1,88	2 gl. gn., b.d. (-b.p.)	små sprede gr., foldet ind i omgiv. bj.	Kal, m. fl. 90° målinger						
151,92 - 154,08	2,16	2 gl. gn., b.d	fin mik., rig på gr., meget mørk m. præg af biot. gn., lidt hbl.	— do. —						
154,08 - 154,16	0,03	Skarn	grågrøn i do.							
154,16 - 155,58	1,42	2 gl. gn., b.d.	hom. sprede små gr.	Kraftigt stejlt foldet						
155,58 - 162,33	6,75	2 gl. gn., b.d. - b.p.	mest fink., gr., delv. ret mørk, enkelte steder lidt spor af FeS og py	Kraftig stejlt foldet flere 90°						
162,33 - 168,31	5,98	Amfibolit	sort, lidt biot, små gr., nederste 40 cm mere biot. ng m. spor af py.	kun foldet øverst, 41°, 48°, 44°						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7502

Side 10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
168,31 - 169,47	1,16	2 gl. gn., bd. (-bp)	ret lys, små gr., ca midtpå m. enkelte maf. indslag, danner lag i amf.	42°					
169,47 - 171,33	1,88	Amfibolit	sort, gr., u. ordn. lidt (stedvis en del) biot., stedvis lidt py., nedeften lidt hbl. gn. lign., ikke foldet.	31° jævnst stig. til 62°					
171,33 - 171,68	0,35	2 gl. gn., b.d	spor af py., lidt grågrøn skarn	foldet					
171,68 - 172,68	1,00	hbl. gn.	fin mlk., -mlk., en del br biot., py. impr. delv. svag, ikke ulig nære del af amf. ovenfor.	Stejlt foldet incl. 90°					
172,68 - 173,54	0,86	2 gl. gn., b.d	sv. py. impr., incl. lidt hbl. gn. indfoldet	Stejlt foldet (indfoldet)					
173,54 - 174,37	0,83	hbl. gn. / Amf.	øverste mlk. hbl. gn. m. lidt biot. og sv. py. impr., nederste gr. amf.	Stejlt foldet					
174,37 - 174,57	0,20	2 gl. gn., bp. - b.d.	spredt små gr., lidt grågrøn skarn						
174,57 - 174,69	0,12	pegm.							
174,69 - 178,50	3,81	biot. gn.	fin mlk., hom., 1-2 mm gr., br. biot., stedvis lidt D og u. ordn. hbl., sv. py. impr., stedvis D. gn. lign., flere chloritiserede sprækker, mm tynde.	10° 36°					
178,50 - 181,75	4,35	biot. gn., D. gn. type	jævn overgang, mlk. (- grov mlk.), 1 mm gr., br. biot., D, lidt jævnt fordelt hbl., stedvis hbl. gn., py. impr. oftest rigt,	34° 42° 15°					
181,75 - 182,85		— do —	mlk., br. biot., D, en del u. ordn. 2-4-10 cm lag af hbl. gn., py. impr.	5° 5°					
182,85 - 183,60	0,75	Amfibolit	fin mlk., sortgrøn, ng på 2-8 mm gr., lidt br. biot., lidt hbl. gn. præg, (spor af py.)	16°					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7502

Helling/stigning :

Hoyde :

Lengde :

Side 11

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
183,60 - 184,98	1,38	biot. gn., D. gn. type	fin mlk., ret lys, delv. mlk. og mørkere, br. biot., py. impr., et par tynde hbl. gn. lag nederst	18°					
184,98 - 185,32	0,34	Amfibolit	fin mlk., sortgrøn, rig på 2-8 mm gr. lidt biot., lidt hbl. gn. præg,	11°					
185,32 - 185,58	0,26	2 gl. gn., alm.	fin mlk., hom., 1 mm gr.						
185,58 - 185,86	0,28	Amfibolit	fin mlk., sortgrøn, rig på 2-8 mm gr., lidt biot., lidt hbl. gn. præg,	11°					
185,86 - 187,56	1,70	2 gl. gn., ka.-b.p.	fink., sort biot., rig på små gr., fint båndet m. u. oran. hbl. ngebånd, stedvis spor af py.	15° folæet 36; 9° hver sin vej					
187,56 - 188,09	0,53	hbl. gn.	fin mlk., -mlk., u. ordn. br. biot., gr. sv. py. impr.	10°					
188,09 - 189,16	1,07	biot. gn., D. gn. type	mest fin mlk., br. bi., u. ordn. hbl., mest sv. py. impr., flere 2-4 cm lag hbl. gn./amf.	12°					
189,16 - 189,48	0,32	hbl. gn.	rel. fink., amfibolitisk, lidt br. biot., sv. py. impr.						
189,48 - 189,71	0,23	biot. gn., D. gn. type	mlk., rigt py. impr.	11°					
189,71 - 190,00	0,29	hbl. gn.	mlk., få gr., en del br. biot., py. impr.	6°					
190,00 - 190,85	1,85	biot. gn., D. gn. type / hbl. gn.	mest mlk., br. biot., u. ordn. lidt hbl., m. tynde lag hbl. gn., rigt py. impr.	11°					
190,85 - 191,85		hbl. gn. / biot. gn., D. gn. type	mlk., hbl. gn., m. u. ordn. biot. gn., br. biot., sv. py. impr., hbl. gn. nedadtil mørk og amfibolitisk.	18°					

Lokalitet:

Borehull: 7502

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

dybde 203,0 m. ligger på 2 + 5,8 m og 423,38X

" 25,12 " " " - 423,1 " " 420,95X

" 206,0 " " " - 96,0 " " 417,95X

Side 12

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
191,85 - 195,60	10,05	Amfibolit	fin mik., grønsort, lidt spredt gr., anelse biot., stedvis lidt skarn, enkelte lysere partier, "zoisit".	20°					
195,60 - 201,90		— do. —	— do. —, mere sort	25°					
201,90 - 202,58	0,68	Amfibolit	fink., gr., rig på biot., "zoisit".	24°					
202,58 - 204,84	2,26	hbl. gn.	fin mik., en del br. biot., små gr., lidt grågrøn skarn, sv. py. impr.	22° 22' 15"					
204,84 - 206,40	1,56	hbl. gn. / biot. gn., D. gn. type	mest hbl. gn., m. u. ordn. partier af biot. gn., små gr., py. impr.	13°, 5°					
206,40 - 207,30	0,90	hbl. gn. / amf.	rel. rig på biot., delv. sv. py. impr.	8°					
207,30 - 209,30	2,00	Amfibolit	fink. - fin mik., gr., u. ordn. m. biot.	16°					
209,30 - 209,86	0,56	biot. gn.	fin mik., br. biot., små gr., spor af py. u. ordn. m. hbl. gn. lag	9°					
209,86 - 210,15	0,29	hbl. gn.	mørk, lidt biot., spor af py.	5°					
210,15 - 213,30	3,15	Amfibolit	fink., gr., lidt skarn, øverst lidt biot.	10°					
213,30 - 213,95	0,65	hbl. gn.	fin mik., u. ordn. en del br. biot., sv. py. impr.	2°, 12°, 9°					
213,95 - 214,95	1,00	Amfibolit	få, små gr., u. ordn. biot., anelse skarn	9°					
214,95 - 215,02	0,07	pegm.		10°					
215,02 - 218,00	4,93	Amfibolit	fink., sort, små gr., u. ordn. biot.	24°, 35°					
218,00 - 219,95		— do. —	— do. —	29°, 29°					
219,95 - 221,10	1,15	2 gl. gn., b.d.	fink., gr., m. amfibolitiske partier	Støjl, foldet					

Lokalitet:

Borehull: 7502

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Side 13

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
221,10 - 222,45	1,35	Amfibolit	sort m gr.	11°						
222,45 - 222,55	0,10	Skarn	grågrøn m. hbl.							
222,55 - 224,55	2,00	Amfibolit	Sort, spredt 2-4mm gr.	foldet steilt?						
224,55 - 224,60	0,05	Skarn	grå grøn.							
224,60 - 224,95	0,35	Amfibolit	2-5 mm gr., anelse biot	Steil, foldet						
224,95 - 225,03	0,08	Skarn	grågrøn m. hbl.							
225,03 - 225,80	0,77	Amfibolit	få gr., lidt biot nedeften	kraftig foldet						
225,80 - 226,62	0,82	pegm.	biot. pegm.							
226,62 - 227,03	0,41	2 gl. gn., b.p.	lys, m. et par tynde mørke lag	steil, foldet						
227,03 - 228,33	1,30	2 gl. gn., b.d.	— do. — få gr.	steil, foldet incl. 90°						
228,33 - 228,53	0,20	pegm.								
228,53 - 230,79	2,26	2 gl. gn., b.d.-b.p.	få gr. øverst, kraftig foldet m. tynde mørke biot. rige lag	Steil foldet, 22°						
230,79 - 231,11	0,32	pegm.	biot. pegm.							
231,11 - 233,45	2,34	Amfibolit	sort, lidt biot, 2-4 mm gr., lidt skarn	41°, 52°						
233,45 - 233,63	0,18	2 gl. gn., b.d.	gr.	51°						
233,63 - 237,12	3,49	Amfibolit	sort, gr., lidt biot., stedvis grågrøn skarn	42°, 36°						
237,12 - 237,25	0,13	Skarn	grågrøn							
237,25 - 238,00	0,75	Amfibolit	sort, gr., stedvis en del skarn	Steil foldet						
238,00 - 238,74	0,74	2 gl. gn., b.d.	lys, små gr., lidt gullig skarn, få mørke lag	48°						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Hoyde :

Lengde :

Borehull: 7502

Side 14

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
238,74 - 238,92	0,18	kvarts	m. hbl.							
238,92 - 239,00	0,08	2 gl. gn., b.d.								
239,00 - 239,19	0,19	Amfibolit	biot. rig, næsten u. gr.	20°						
239,19 - 241,03	1,84	2 gl. gn., b.d.	lys, hom, gr, lidt gullig skarn, et par mørkelg							
241,03 - 241,88	0,85	Amfibolit	sort, gr, nederst 2 2 gl. gn. lag (2 og 5 cm)	30°						
241,88 - 242,30	0,42	2 gl. gn., b.d.	lys, lidt gr.	27°						
242,30 - 243,07	0,77	2 gl. gn., b.d.	fin mik, flammede lyse partier m. lidt skarn, spredt m. striber af FeS							
243,07 - 244,05	0,98	2 gl. gn., b.d.	lys, gr, anelse gullig skarn	23°						
244,05 - 244,98	0,93	Amfibolit	fink., sort, få gr. lidt skarn	27°						
244,98 - 245,11	0,13	2 gl. gn., b.d.	lys, små gr.	27°						
245,11 - 245,90	0,79	Amfibolit	sort, massiv, fink., få gr.	27°						
245,90 - 246,95	1,05	hbl. gn.	fin mik, lidt br. biot., gr. til tages opad, sv. py. impr.	24°						
246,95 - 248,78	1,83	biot. gn., D. gn. type	mik., br. biot., få små gr., u. ordn. jævnt fordelt hbl., py impr. (rigt)	50° (ikke foldet?)						
248,78 - 249,05	0,27	pegm.								
249,05 - 249,09	0,04	biot. gn., D. gn. type	mik., py impr.							
249,09 - 249,22	0,13	pegm.								
249,22 - 249,38	0,16	biot. gn., D. gn. type	mik., py. impr.							
249,38 - 249,60	0,22	pegm.								

Lokalitet:

Dato :

dybde 255, = 45,1 m og 420,93X

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7502

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

side 15

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
249,60 - 249,70	0,10	hbl. gn.	py. impr.						
249,70 - 250,05	0,35	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., 2 mm gr., u. ordn. hbl., py. impr.	35°					
250,05 - 250,75	0,70	hbl. gn.	mlk., små gr., endel br. biot., py. impr.						
250,75 - 251,95	1,20	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., lidt små gr., py. impr.	54°					
251,95 - 252,35	0,40	hbl. gn.	mlk., små gr., u. ordn. br. biot., sv. py. impr.	76°					
252,35 - 252,90	0,55	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., små gr., lidt hbl., py. impr.						
252,90 - 253,90	1,00	hbl. gn. / biot. gn.	mlk., gr., u. ordn. lag af biot. gn., br. biot., D, py. impr.	38°					
253,90 - 256,26	2,36	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., få gr., D, u. ordn. lidt hbl., et par 3-5 cm lag af hbl. gn., py. impr. (rigt)	20°					
256,26 - 257,59	1,33	hbl. gn.	mlk., få gr., u. ordn. en del biot., incl biot. gn. lag, py. impr. (delvis rigt),	8° 4°					
257,59 - 257,74	0,15	Kvarts							
257,74 - 258,28	0,54	hbl. gn.	mlk., mest u. gr., lidt br. biot., py. impr.	15°					
258,28 - 258,32	0,04	Kvarts							
258,32 - 260,89	2,57	hbl. gn.	mlk., mest u. gr., mere gr. nedefter, lidt br. biot., py. impr.	25° 25°					
260,89 - 261,65	0,76	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., få små gr., lidt hbl., py. impr.	22°					
261,65 - 263,81	2,16	Amfibolit	fink., sort, spredte 2-4 mm gr., lidt biot., incl. lidt pegm.	34° 30°					

Lokalitet:

Borehull: 7502

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Side 16

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
263,81 - 265,88	2,07	2 gl. gn. bd. (-bp.)	mest lys og massiv, rig på små gr.	26°					
265,88 - 267,80	1,92	2 gl. gn., b.d.	hom., 2-7 mm gr. stictolitisk, anelse skarn	?, 40°					
267,80 - 269,43	1,63	— do. —	lys m. gr., anelse skarn	57°, 28°					
269,43 - 270,54	1,11	Amfibolit	sort, massiv, spredt 2-4 mm gr.	Stegl foldet					
270,54 - 270,71	0,17	2 gl. gn., b.d.	lys, massiv m. gr., lige akkurat indfoldet	incl 90°					
270,71 - 273,46	2,75	Amfibolit	fin mlk., sort, gr., stedvis endel biot., et par steder tynde lækninger m. 2 gl. bd.	Stegl kraf. foldet					
273,46 - 274,00	0,54	2 gl. gn., alm.	fin mlk., mest lys, u. gr., spor af py.	29°					
274,00 - 274,45	0,45	mangler							
274,45 - 277,00	4,71	2 gl. gn., b.p.	lys, hom., fin mlk. - fink., u. gr., spor af gullig skarn, et par tynde mørke lag	8° 13°, 12°					
277,00 - 279,16		2 gl. gn., bp. - b.d.	lys, hom., fink., u. gr., stedvis lidt gullig skarn (jævn fordelt), stedvis py. spor.	6°					
279,16 - 279,24	0,08	maf. biot. gn.	mlk., lidt "zoisit", amf. udseende	10°					
279,24 - 279,94	0,70	2 gl. gn., b.p.	lys, hom., stedvis m. jævnt fordelt gullig skarn, lidt gr. i forb. m. enkelte mm tynde mørke lag, stedvis lidt py. spor	8°, 14° foldet ?					
279,94 - 281,00	1,06	maf. biot. gn.	mlk., sort, amf. lign., lidt hbl. og "zoisit", sv. py. impr.	10°					
281,00 - 282,95	1,95	2 gl. gn., b.p.	lys, hom., ret rig på 1-2 mm gr., spor af gullig skarn	?, 23°					

Lokalitet:

Borehull: 7502

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Side 17

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
282,95 - 283,25	0,30	pegm.							
283,25 - 283,96	0,71	2 gl.gn., b.p.	lys, hom., ret rig på 1-2 mm gr.	34°	20°				
283,96 - 286,75	2,79	grovk. hbl. gn. (unormal type)	grovk. m. en del br. biot., rel. mørk forh. lyse/mørke min. ca 1/1, ofte am- fibolitisk, flere cm mægtige amf. horisonter, ofte rel. rig på delvis ret Store korn FeS, dertil lidt py., typer er ikke set andre steder.	3,	foldet ?				
286,75 - 287,30	0,55	biot. gn.	fin mlk, lys, u.gr., br. biot., sv. py. impr.	20°					
287,30 - 288,15	0,85	hbl. gn.	mlk, u.gr., ret mørk amfibolitisk, m.py., FeS	28°					
288,15 - 288,70	0,55	2 gl. gn., b.p.	lys, hom., u. gr.						
288,70 - 289,10	0,40	biot gn., D gn. type	mlk., br. biot., delvis en del hbl., py. impr.	23°					
289,10 - 289,70	0,60	lys "kvartsitisk" gn.	fink., meget lys, lidt br. biot., u. gr., sv. py. impr., FeS.						
289,70 - 289,97	0,27	biot. gn., D gn. type	Grovk.-grov mlk., br. biot., FeS-py. impr.	12°					
289,97 - 290,34	0,37	lys "kvartsitisk" gn./ 2 gl. gn. alm.	fink., meget lys, lidt br. biot., u. gr., FeS, sv. py. impr., går nedetter over i 2 gl. gn. alm., u. gr., FeS, sv. py. impr.						
290,34 - 290,72	0,38	Amf./maf. biot. gn.	fin mlk-mlk., u. gr., mørk, sort biot.	21°					
290,72 - 290,84	0,12	Skarn	grågrøn, mlk., py. impr.						
290,84 - 292,04	1,20	maf. biot. gn.	sort mlk., lidt hbl., 2-12 mm gr., amfibolitisk udseende, delv. lidt skarn						
292,04 - 292,30	0,26	musk. rig gn. (2 gl. typ.)	mlk., gl. rig, u. ordn. biot. rige partier						

Lokalitet:

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

dybde måling ligger på -ghim
og 417,95 X

Borehull: 7502

Side 18

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
292,30 - 293,00	0,70	hbl. gn.	mlk., ofte biot. ng, delvis amfibolitisk, gr, enkelte steder spor af py.	10°						
293,00 - 294,40	1,40	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., små gr., D, py impr. (delv. ng), lidt indfoldet hbl. gn.	20°, 35° foldet stejlt?						
294,40 - 296,52	2,12	hbl. gn. / biot. gn.	mlk., gr., u. oran. br. biot., delvis m. tynde biot. gn. lag, py. impr.	10° 22°, 23°						
296,52 - 297,50	0,98	biot. gn., D. gn. type / hbl. gn.	mlk., br. biot., D, lidt gr., stedvis jævn overgang til hbl. gn., py. impr.	15°						
297,50 - 301,03	3,53	biot. gn., D. gn. type / biot. - m. sk. gn.	grov mlk. - grovk., mest rel. m. sk. ng, faltet, br. biot., lidt gr., lidt hbl., py. impr.	42°, 40° 24°						
301,03 - 301,29	0,26	m. sk. gn.	mlk., u. ordn. lidt br. biot., u. gr., sv. py. impr.	18°						
301,29 - 301,95	0,66	m. sk. - biot. gn., D. gn. type	grovk. (grovskællet), m. sk. / biot. = 1/1, få gr., py. impr.	31°						
301,95 - 302,17	0,22	m. sk. gn.	mlk., gl. ng, u. ordn. lidt br. biot., u. gr., sv. py. impr.	19°						
302,17 - 304,92	2,75	m. sk. gn. m. biot. D. gn. type	grov mlk., grovskællet, u. ordn. br. biot., ondulerende foliation, faltet præg, lidt gr., py. impr., enkelte steder lidt baryt(?)	37° 32° 26°						
304,92 - 305,60	0,68	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., lidt gr. og hbl., D, py. impr.	28°						
305,60 - 308,30	2,70	hbl. gn.	mlk., u. ordn. m. br. biot., rig på små gr., py. impr., flere tynde horisonter m. grågrøn skarn, nederst m. tyndelag biot. gn.	25, 36° 30°						
308,30 - 309,42	1,12	2 gl. gn., alm.	fin mlk., næsten u. gr., øverst lidt py.	16° fladt foldet?						

Lokalitet: Mofjellet
 Profil 44.880

Borehull: 7502

Dato :
 Koordinator :
 Retning :
 Helling/stigning :
 Høyde :
 Lengde :

Side 19

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	g/t Ag	% Fe	
309,42 - 309,58	0,16	pegm.								
309,58 - 311,23	1,65	2 gl. gn., alm.	fin mlk., hom., få gr., stedvis rel. gl. ng, et par steder lidt py.	5°, 26°						
311,23 - 311,69	0,46	pegm.								
311,69 - 311,99	0,30	biot. gn.	fin mlk., lidt mūs., br. biot., py. impr., delv. ret 2 gl. gn. lign., en del grågrøn skarn							
311,99 - 312,02	0,03	ZnS rig malm	py. rig, rig på ZnS							
312,02 - 312,07	0,05	biot. gn.	fin mlk., br. biot., py. rig, lidt spredt ZnS impr.							
312,07 - 312,28	0,21	2 gl. gn., alm.	fin mlk., u. gr., biot. andse sort-br., nederst lidt py.	18°						
312,28 - 312,41	0,13	ZnS rig malm	rigt py. impr., lidt skarn, ZnS ofte i flere mm store korn.							
312,41 - 312,67	0,26	mūs. rig gn. (2 gl. gn.)	mūs. rig, u. gr., sort-br. biot.	19°						
312,67 - 312,75	0,08	mūs. gn./biot. gn.	br. biot., lidt skarn, py. impr., spredt ZnS	23°						
312,75 - 312,80	0,05	biot. gn.	fin mlk., lys, br. biot., py. impr.							
312,80 - 312,85	0,05	Skarn, rig på ZnS	grågrøn skarn i lys biot. gn., rig på ZnS		0,35	0,31	0,85	7,2	4,14	
312,85 - 312,90	0,05	biot. gn./mūs. gn.	mūs. rig, br. biot., py. impr.							
312,90 - 312,98	0,08	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., lidt skarn, striber og impr. af ZnS	15°						
312,98 - 313,13	0,15	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., u. ordn. lidt mūs. rig gn., py. impr.	foldet ?						
313,13 - 313,17	0,04	skarn, m. ZnS	grågrøn m. spredt ZnS							

Lokalitet:

Borehull: 7502

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

side 20

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
313,17 - 313,35	0,18	biot.-musk.gn., D.gn.t.	mlk., br. biot., py. impr.				21,8g		
313,35 - 313,42	0,07	— do. — m. skarn	py. impr., mange op til 4 mm. korn <u>ZnS</u>						
313,42 - 314,23	0,81	musk. rig gn. (Zg. alm. type)	fin mlk., rel. lys, hom., u. gr., sort biot. midtpå 8 cm biot. rig gn.						
314,23 - 314,41	0,18	— do. —	brunlig biot., spredte striber og impr. af <u>ZnS</u>						
314,41 - 314,70	0,29	malm rig på <u>ZnS</u> , <u>PbS</u>	ligner biot. gn., lidt skarn?, py. impr., rig på <u>ZnS</u> og <u>PbS</u> .						
314,70 - 315,02	0,32	malm meget rig på <u>ZnS</u> og <u>PbS</u>	i mlk. grågrønlig bergart (skarn?), meget rig på <u>ZnS</u> og <u>PbS</u>	2,84	0,36	7,56	34,-	9,97	
315,02 - 315,17	0,15	malm rig på <u>ZnS</u>	i mlk. biot. gn./hbl. gn. lign. berg-art, rig på <u>ZnS</u>						
315,17 - 315,38	0,21	musk. rig gn., m. biot. gn. - hbl. gn.	veksler i bånd, py. impr.						
315,38 - 315,42	0,04	hbl. gn.	fin mlk., u. gr., spredt en del <u>ZnS</u>						
315,42 - 315,62	0,20	hbl. gn./biot. gn., D. gn. type	biot. gn. mlk. m. br. biot., py. impr.						
315,62 - 315,68	0,06	Skarn?, rig på <u>ZnS</u>	rigt py. impr., rig på <u>ZnS</u> , c.p.?						
315,68 - 315,73	0,05	musk. rig gn.	lys, u. gr., sv. py. impr.	0,39	0,45	0,78	9,6	7,54	
315,73 - 315,76	0,03	Skarn m. hbl., rig på <u>ZnS</u>	py. rig, rig på <u>ZnS</u>						
315,76 - 316,04	0,28	biot.-musk. gn., D. gn. type	mlk. - grå mlk., br. biot., delvis rig på musk., py. impr.						

Lokalitet:

Borehull: 7502

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Højde :

Lengde :

Side 21

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
316,04 - 316,07	0,03	biot.-musk.gn., D.gn.	py.impr., m. spredte striber af <u>ZnS</u>						
316,07 - 316,17	0,10	biot.-musk.gn., D.gn.	mlk., musk. domineret, br. biot., py. impr.						
316,17 - 316,27	0,10	Skarn i biot.gn. m. ZnS	grågrøn mlk., py.impr., rig på <u>ZnS</u>						
316,27 - 316,72	0,45		mlk., u.gr., endel br. biot., py. impr.						
316,72 - 319,70	2,98	2 gl. gn., alm.	fin mlk., hom., næsten u.gr., nederst m. enkelte maf. biot.gn. lag, 3-8 cm tykke, delv. m. lidt py. impr.						
319,70 - 320,19	0,49	biot.gn., D.gn. type	mlk., br. biot., u.gr., py. impr.						
320,19 - 320,37	0,18	2 gl. gn., alm.	gl. rig, lidt gr.						
320,37 - 322,30	1,93	biot.gn., D.gn. type / hbl. gn.	ca 1/2 af hver, alternerende m. diffu. se grænser, mlk., br. biot., få gr., py. impr.						
322,30 - 323,97	1,67	biot.gn., D.gn. type	mlk., br. biot., få gr., u. ordn. lidt hbl., py. impr., flere diffuse lag hbl. gn.						
323,97 - 324,21	0,24	pegm.	grov mlk., folieret.						
324,21 - 324,41	0,20	hbl. gn.	mlk., lidt br. biot., sv. py. impr.						
324,41 - 325,05	0,64	biot.gn., D.gn. type	mlk.-fin mlk., vekslende tynde lag af biot.gn. m. br. biot. og musk. rige lag, lidt hbl. gn., sv. py. impr.						
325,05 - 325,66	0,61	biot.gn., D.gn. type	mlk., br. biot., få gr., py. impr.						
325,66 - 326,03	0,37	pegm.							
326,03 - 326,24	0,21	musk.gn. (D.gn. type)	grovk.-grov mlk., grovskallet, u. gr., py. impr., m. baryt (?)						

Lokalitet:

Borehull: 7502

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 22

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
326,24 - 326,49	0,25	biot.-musk. gn., D. gn. type	grov mlk., $\bar{u}$. gr., delvis musk. rig, Py. impr.	18°						
326,49 - 326,98	0,49	2 gl. gn., alm.	fin mlk., hom., $\bar{u}$. gr., stedvis spor af py.	2°						
326,98 - 327,00	0,02	biot.-musk. gn.	mlk., rigt py. impr., spor af <u>ZnS</u>	1°						
327,00 - 327,92	0,92	2 gl. gn., alm.	fin mlk., lys, hom., spor af gr.	3°?						
327,92 - 328,10	0,18	malm, meget rig på <u>ZnS</u>	mlk., m. hbl. og lidt skam, py. impr. meget rig på <u>ZnS</u> , FeS, cp?							
328,10 - 328,29	0,19	2 gl. gn. alm.	fin mlk., py. impr., m. striber og impr. af <u>ZnS</u> , biot. delvis brønlig (biot. gn. lign?)	5°						
328,29 - 328,92	0,63	musk. og gn./2. gl. gn. alm.	fin mlk., hom., $\bar{u}$. gr., sort biot.	8°						
328,92 - 328,93	0,01	stribet m. <u>ZnS</u>	<u>ZnS</u>	3°						
328,93 - 329,19	0,26	hbl. gn.	$\bar{u}$. ordn. m. br. biot., små gr., sv. py. impr.	3°						
329,19 - 329,42	0,23	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., lidt gr., D. py. impr., mest rigt.							
329,42 - 329,51	0,09	hbl. gn.	2-4 mm. gr., sv. py. impr.	4°						
329,51 - 330,00	3,63	biot. gn., D. gn. type	mlk., br. biot., lidt gr., $\bar{u}$. ordn. hbl., py. impr., ofte rigt, 10 cm lag hbl. gn.	5°, 27° foldet						
330,00 - 333,14		biot. gn., D. gn. type	mlk.-grov mlk., br. biot., $\bar{u}$. gr., py. impr., mest rigt, delvis meget rig på D, enkelte tynde striber m. baryt(?)	16°, 11° 6°						

Lokalitet:

Borehull: 7502

Dato :
 Koordinater :
 Retning :
 Helling/stigning:
 Høyde :
 Lengde :

Side 23

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
333,14 - 334,53	1,39	Amfibolit	u. ordn m. biot., Spredt 2-4 mm gr, lidt jævnt fordelt gullig skarn	6°					
Hullet blev afsluttet på 334,53 m. Beskrivelse udført i Mo i Rana, August 1976 <i>Mogens Markes</i> NB! Gradinddeling: 0 - 360°									

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

Borehull: 7501

Side 29

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
334,23 - 338,85	4,62	Amfibolit	Mørk Fin- Finmkt. amfibol- ordnet sort Brak. gr - rø (2 mm) Skarnholty						
			Flad- Hældning varierende retning						
338,85 - 340,00	1,15	do.	do.						
			Stykt Foldet						
340,00		Boringer Afsluttet							
		Beskrivelsen udført i Mo , August 1976 F.O. Rasmussen NB! 360°'s gradinddeling							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

Borehull: 7501

Side 28

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
331,60 - 332,40	0,80	Amphibolit	Mørk Fimmet. underordnet Brun Brak. gr-holdig (1mm) Skarn-holdig	20° 0° 10° Høkket Hældning					
332,40 - 332,85	0,45	2 gl. gr. Bd.	Ret Mørk Fimmet. gr-rig (1cm) underordnet tynde bånd med Hbl.	Hængen					
332,85 - 332,95	0,10	do.	Ret Lys Fimmet. gr-rig (1mm) Aftagende opad og nedad af 1cm tynde Pigm. bånd	do.					
332,95 - 333,03	0,08	do.	Lys Fimmet. kvarts-rig gr-rig (1mm)	do.					
333,03 - 333,15	0,12	do.	Ret Mørk Fimmet. gr-rig (1cm) underordnet Tynde bånd med Hbl	do.					
333,15 - 334,23	1,08	do.	Lys Fimmet. kvarts-rig gr-rig (gjænt stigende Kornstørrelse fra 1mm - 1cm i central del af Horisonten og derefter igen gjænt aftagende nedefter til 1mm) spor py.	do.					

Lokalitet:

Borehull: 7501

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

Side 27

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
319,67 - 322,45	2,78	Amphibolit (Mafisk Biot. gn.)	Mørk Fink. sort Biot a varierende mængde gr.-hol- dig (1 cm)	14°					
322,45 - 322,60	0,15	Pegm.							
322,60 - 323,61	1,01	Amphibolit (Mafisk Biot. gn.)	do.	10°					
323,61 - 324,06	0,45	Pegm.							
324,06 - 325,40	1,34	Amphibolit (Mafisk Biot. gn.)	Mørk Fink. sort Biot gr.-rig (2 mm) + 2 stk 5 og 8 cm brede Skarn bånd						
325,40 - 328,81	3,41	2 gl. gn. Bdt.	Ret lysz sort Biot enkelte flager Brun Biot. øget Kvarke indhold nede for gr.-rig (1-15 mm)	Homogen Flad?					
328,81 - 329,21	0,40	Amphibolit (Mafisk Biot. gn.)	Mørk Fink. sort Biot gr.-rig (2 mm)	11°					
329,21 - 329,55	0,34	2 gl. gn. Bdt.	Ret lysz Fink. Kvarke-rig gr.-rig (1 mm)	13°					
329,55 - 330,47	0,92	Amphibolit	Mørk Fink. sort Biot sort Biot gr.-rig (2 mm)	15°					
330,47 - 331,60	1,13	2 gl. gn. Bdt.	Ret lysz Fink. Kvarke-rig Mørk gr.-rig (2 mm)	15°					

Lokalitet:

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull. 7501

Side 26

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
311,65 - 312,00	0,35	Mafigsk Bakt gn.	Fink Hbl. - holdig							
312,00 - 312,07	0,07	Pegm.								
312,07 - 312,31	0,24	Mafigsk Bakt gn.	dr.	10°?						
312,31	2 mm	Baryt								
312,31 - 313,85	1,54	Amphibolit	Mørk Fink. gr. holdig (1 cm) lidt Skarn (gul)	Flad						
313,85 - 314,49	0,64	Mafigsk Bakt. gn.	Mørk Fink. underordnet Hbl. gr. - holdig (1 mm) Skarn - holdig	10°?						
314,49 - 314,59	0,10	Pegm.								
314,59 - 315,48	0,89	Mafigsk Bakt. gn.	dr.	10°						
315,48 - 317,50	2,02	2gl. gn. Alm. Type	Lys Fink. sort Bakt. spredt gr. (1 mm) + 1 cm Tykke Bakt. rige bånd	15°						
317,50 - 318,80	1,30	2gl. gn. Alm. Type	Lys Fink. sort Bakt. gr. - holdig (1-2 mm)	Homogen						
318,80 - 319,67	0,87	2gl. gn. Bd.	Rik Lys Fin-Finnelt. sort Bakt. spredt gr. (1 mm)	13°						

Lokalitet:

Borehull: 7501

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

Side 25

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
305,61 - 305,63	0,02	Amfibololit	Mørk Fink massiv sv-gr. impr.	15°					
305,63 - 305,94	0,31	Biak gn. Dat gn. Type	Ret Mørk Fimmlk. spredt gr. (1 mm) underordnet Hbl. py. ryg	20°					
305,94 - 306,22	0,28	Hbl. gn - Amfibololit	Mørk Mørk Hbl. - ryg gr. - holdig py. impr.	23°					
306,22 - 308,17	1,95	Hbl. - Biak gn. Dat gn. Type	Ret Mørk Fimmlk Brun Biak. og Hbl. gr. - holdig (1 mm) py. ryg	18°					
308,17 - 308,21	0,04	Pegm.							
308,21 - 308,77	0,56	Biak - Musk. gn. Dat gn. Type	Ret Lys Mlk - Fimmlk Brun Biak. grovkornet Musk. gr. - holdig (1 mm.) py. ryg	15°					
308,77 - 308,79	0,02	Mafisk Biak. gn.							
308,79 - 309,96	1,17	Biak. - Hbl. gn. IKKE Dat. gn. Type	Ret Lys Fin - Fimmlk Brun Biak. / Hbl = 2/1, Massiv ÷ gr. py. ryg	18°					
309,96 - 309,99	0,03	Pegm.							
309,99 - 311,16	1,17	Biak. gn. Dat. gn. Type	Ret Mørk Fin - Fimmlk Brun Biak. gr. - holdig (1 mm) py. ryg Tabrige 1-1½ cm Bæst Horisont	10°					
311,16 - 311,65	0,49	Pegm.							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7501

Side 24

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove n
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
297,89 - 300,60	0,71	Biak - Hbl. gn. Dat. gn. Type	Rd Mørk Mlk Mørkbrun Biak. varierende Hbl. gr - rvg (2 mm - 10 mm) Zaisit sp spor py.	7°					
300,60 - 300,70	0,10	Musk. gn.	lys Mlk grovkornet Musk. light Mlk Biak.	7°					
300,70 - 302,14	1,44	Biak - Hbl. gn. Dat. gn. Type	Rd Mørk Mlk Mørk Brun Biak. varierende Hbl. gr - holdig (1-2 mm) zaisit spor py.	20°					
302,14 - 302,21	0,07	Pygm.							
302,21 - 302,40	0,19	Biak. gn. Dat. gn. Type	Rd Mørk Mlk - Finmlk Brun Biak. gn. falkig py. impr	15°					
302,40 - 303,97	1,57	Musk. gn.	lys Finmlk andvordnet Brun Biak. ÷ gr. spor py.	10° Falkig?					
(303,07 - 303,12)	5 cm	Halm	3 cm massiv Zn S malm Med gressene sprede korn af Zn S, Py. og Kalkstein?	30°					
303,97 - 305,45	1,48	Hbl. - Biak. gn. Dat. gn. Type	Rd Mørk Mlk Mørkbrun Biak varierende Hbl. gr. holdig gr - rvg spor py.	15° Falkig?					
305,45 - 305,58	0,13	Biak. gn. Dat. gn. Type	Rd Mørk Finmlk sprede gr. (1 mm) andvordnet Hbl. py. rvg	15°					
305,58 - 305,61	0,03	Mafisk Biak. - Hbl. gn.	Mørk Grovkornet Chlort Skarv- lit py impr spor Zn S	15°					

Lokalitet:

Borehull: 7501

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

Side 23

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove it
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
294,75-294,80	0,05	Regm.							
294,80-295,55	0,75	Musk.-Biat. gn. Dat. gn. Type	Ret lye Finnerik-Mlk grovkornet let Musk. giver fullet prag gr.-fatty py. med stigende nedeffer						
295,55-296,54	0,99	Hbl.-Biat. gn. Dat. gn. Type	Ret Mørk Mlk. svært båndet Hbl.-holdig varierende mængde Brun Biat. og Musk. py.-holdig						
(296,41-296,46	5cm	da.	Spredte Korn af Zn S						
296,54-298,12	1,58	Musk. gn.	Lye Mlk. underordnet Brun Biat. sv. py. impr. + 5cm bredt Biat. gn. bånd med Skam og py.						
298,12-298,54	0,42	Musk.-Biat. gn. Dat. gn. Type	Ret Mørk grovkornet Brun Biat. sv. py. impr.						
298,54-299,58	1,04	Biat.-Hbl. gn. Dat. gn. Type	Ret Mørk Mlk. Brun Biat. der bliver mindre nedeffer, var- ierende Hbl. indhold Zarsuk gr.-py (2-10 mm) sv. py.						
299,58-299,85	0,27	2gl. gn. alm Type	Ret lye Fink Glommer-py Mørk Biat. + py						
299,85-299,89	0,04	Regm.							

Lokalitet:

Borehull: 7501

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 22

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
290,14 - 290,40	0,26	Kvarts	med Fink Brown Biat.							
290,40 - 290,90	0,50	Biat gn. Dat. gn. Type	Ret Mørk Finkmkk Brown Biat. Dat. ? Zaisit gr.-holdig (1mm) py.-sig	20°						
290,90 - 291,45	0,55	do.	Ret Mørk Finkmkk Brown Biat. Dat. ? Zaisit gr.-holdig (1mm) sv. Hbl. i underordnet mengde sv. py. impr.	21°						
291,45 - 292,41	0,96	do.	Ret Mørk Finkmkk Brown Biat. Dat. ? Zaisit gr.-holdig (1mm) Hbl. i underordnet mengde py.-sig	15°?						
292,41 - 292,65	0,24	Musk-Biat. gn. Dat. gn. Type	Ret byr Finkmkk-Mkk grovklet- let Musk. gn. fullt py. gr. klatte py.-sig	20°						
292,65 - 292,70	0,05	Skam Amphib kalt		25°						
292,70 - 294,75	2,05	Musk-Biat. gn. Dat. gn. Type	do.	10°						
(293,05 - 293,12)	4 cm	Malm	ZnS lund med py. og litt PbS							
(293,75)	1 cm	do.	do.							

Lokalitet:

Borehull: 7501

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 21

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
284,75 - 285,21	C,46	Musk-Biack gn. Dat. gn. Type	Lys Mlk.-Finnmlk. Markte-ry undordnet Brun Biack. 5 cm bult Biackgn. länd sv. py. impr.	20°						
285,21 - 285,90	C,69	Biack. gn. Cnd. Dat. gn. Type	Ret Musk Mlk.-Finnmlk. Brun Biack. Skarvakt Chlorit spredt gr. py.-ry	20°						
285,90 - 286,85	C,95	Musk.-Biack. gn. Cnd. Dat. gn. Type	Ret Lys Mlk. Brun Biack. Chlorit Lys grøn Glimmer (Fuchsig?) py. impr. lett Hbl. bidl. Skarn	25° Svagt Tidst?						
(286,17	4 mm		Zon S strike med lett Pl-S	20°						
286,85 - 287,30	C,45	Hbl.-Biack gn. Dat. gn. Type	Ret Musk Mlk.-Finnmlk. Brun Biack. Hbl. spredt gr. (1 mm) py. impr.	25°						
287,30 - 288,65	1,35	Biack. gn. Dat. gn. Type	Ret Musk Mlk. Brun Biack. undordnet Hbl. gr.-holdig (1 mm) py. ryg	25°						
288,65 - 289,95	1,30	cl.	cl. + Kvarts-rye Lys länd med spredt Brun Biack.	27°						
289,95 - 290,14	C,19	Hbl.-Biack. gn.	Musk Finnmlk. Brun Biack/Hbl. = 1/1, Marer gr.-holdig py. impr.	Høngen						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7501

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

Side 20

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove n
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
(281,15-281,24	0,09								
(281,79-281,86	0,07								
281,86 - 282,00	0,14	Musk. gn.	25°	0,21	0,09	0,42		6,81	281,86 - 1,10 282,90
282,00 - 282,87	0,87	Musk.-Biot. gn.							
(282,00-282,06	0,06								
(282,28	<1cm								
(282,77-282,80	0,03		20°						
(282,85	0,01		10°						
282,87-284,75	1,88	Biot. gn. Dsk. gn. Tyne	15°						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7501

Side 19

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve nr.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
277,60 - 278,62	1,02	2 gl. gr. Bd. (Amphibolit mass)	Rik Mørk Fink. gr. kalcyl (1-2 mm) sv. py. impr.	Homogen					
278,62 - 280,00	1,38	Amphibolit	Mørk Fintalk. Skarn-holdig Brun Biak i undordnet man- gde og i tynde 2 cm bredder bånd	do					
280,00 - 280,01	0,01	2 gl. gr. Bd.	Rik Mørk Fink. massiv Brun Biak.	do					
280,01 - 280,15	0,14	Amphibolit	Mørk Fink Massiv stigende indhold af Brun Biak nedefter	do					
280,15 - 280,78	0,63	Biak gr. Omd. Det. gr. Tyne	Rik Mørk Fintalk. Hlt. unde- ordnet mangde Hlt. litt Skarn spredte gr. (1 mm) py. kalcyl-my	do	0,04	0,02	0,05	7,78	280,10 - 280,75 0,65
280,78 - 281,86	1,08	Musk. - Bact. gr.	Rik bys Grovtekstet ondulerende foliation, fukt grøt Musk. - kalcyl Brun Biak spredt gr (1 mm) Chlorit py - kalcyl scapolit helt afsluttet med 0,5 cm Am metallisk (Fink. py. kalcyl)		0,92	0,20	2,12	6,81	280,75 - 281,20 0,45
(280,78 -	<1 cm	do	Spredte korn <1 mm af ZnS		0,09	0,14	0,12	8,27	281,20 - 281,20 0,60
(280,92 - 281,15	0,23	Malin	Rik disse. ZnS litt PbS Py. my op til 2 cm klumpet. Skarpt øget Ba SO ₄ indhold nedefter	10°					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7501

Side 18

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
263,00 - 263,50	0,50	Musk gn.	Retlys Finmlk. - Mlk. Musk./Bast. = 3/1 gr - ryg	Homogen					
263,50 - 265,00	1,50	Amphibolit (Musk Bast. gn.)	Musk Finmlk skiftende Bast mengde tilhørende neddybte spor py.	do.					
265,00 - 265,72	0,72	Bast-Hbl. gn. Det. gn Type	Musk Finmlk sort og Braun Bast. Bast/Hbl. = 1/1 Musk. - holdig gr - ryg sv. py. impr.	do.					
265,72 - 270,00	4,28	do.	Ret Musk Finmlk - Mlk Braun Bast. varierende Hbl indhold gr - falkig Det - holdig py - ryg	Homogen 15°?					
270,00 - 271,50	1,50	do.	do.	Falisk					
271,50 - 274,33	2,83	Amphibolit	Musk Masser gr holdig sv. py impr.	do					
274,33 - 274,98	0,65	Amphibolit	Skaum - ryg - gr sv py impr	Skjelt Falisk?					
274,98 - 275,18	0,20	Igl. gn Bdt. (Amphibolit Bast. Hbl. - holdig - gr py)	Ret Musk Finmlk sort og Braun Bast. Hbl. - holdig - gr py	60°					
275,18 - 277,60	2,42	Amphibolit	Musk Finmlk. - gr lill Skaum	35°					
277,60 - 278,62		Igl. gn Bdt. (Amphibolit Bast. Hbl. - holdig - gr py)	Ret Musk Finmlk Skaum - holdig sort og Braun Bast i varierende mengde og 2 cm Bånd						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

Borehull: 7501

Side 17

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
245,00 - 246,95	1,95	Amphibololit	gr-holdig (20mm) Brak-mg lunge grensene						
246,95 - 247,15	0,20	2 gl. gn. Bdt.	Rdt Mørk Fink. båndet jamn overgang nedifra til 2 gl. gn. Bgn. (Rdt Lys Fink massiv)						
247,15 - 250,00	2,85	2 gl. gn. Bgn - Alm. Type	Lys Fink. Massiv gr.-falkig						
250,00 - 252,00	2,00	do.	do.						
252,00 - 257,35	5,35	2 gl. gn. Bgn.	do.						
257,35 - 258,58	1,23	do.	Lys Fink. massiv gr.-holdig						
258,58 - 259,12	0,54	Brak. Pegm.?	Pegm. med Skiver af sort grov- skallet Brak.						
259,12 - 259,32	0,20	2 gl. gn. Alm.	Lys Fink. Massiv + gr. lukt Skarn						
259,32 - 260,30	0,98	do.	Lys Fink. Massiv + gr.						
260,30 - 260,46	0,16	do.	Lys Fink. massiv + gr med 4 stk. 1cm brede Brak. gn bånd						
260,46 - 262,25	1,79	do.	Lys Fink massiv + gr.						
262,25 - 263,00	0,75	Amphibololit / Mafisk Brak gn.							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

Borehull: 7501

Side 16

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove ff
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
223,85 - 224,20	0,35	2 gl. gn. Bd. - Bp.	Lys Fink. massiv gr. - holdig (2 mm)	Homogen					
224,20 - 227,55	3,35	Amphibolit	gr - ryg (5 mm)	do.					
227,55 - 228,05	0,50	2 gl. gn. Bd.	Lys Fink - Tæt Kvarts-ryg	Vertical foldet					
228,05 - 228,48	0,43	Amphibolit	med 5 cm bånd af 2 gl. gn. Bd (Lys Fink - Tæt Kvarts-ryg) ind- foldet	do.					
228,48 - 228,94	0,46	Pegm.							
228,94 - 229,82	0,88	2 gl. gn. Bd.	Ret Lys Fink. gr. - holdig	3,4% Foldet					
229,82 - 229,99	0,17	Pegm.							
229,99 - 233,69	3,70	2 gl. gn. Bd.	Ret Lys Fink. massiv gr. - holdig	Homogen					
233,69 - 234,03	0,39	Pegm.							
234,03 - 235,60	1,57	2 gl. Bd.	do	do					
235,60 - 235,85	0,25	Skarn-Bulk?	Ret Bulk chlorit gr. zaisit	?					
235,85 - 236,85	1,00	2 gl. Bd.	Ret Lys Fink. massiv gr. - holdig	Homogen					
236,85 - 237,00	0,15	Kvarts							
237,00 - 238,20	1,20	2 gl. gn. Bd.	do	do					
238,20 - 238,28	0,08	Kvarts	med gr - ryg grense udefter						
238,28 - 242,90	4,62	2 gl. gn. Bd.	Ret Lys Fink. massiv gr. - holdig	Homogen Skyl?					
242,90 - 242,97	0,07	Bulk gn.	Skarnholdig min. bulk ind i kerne						
242,97 - 245,00	2,03	2 gl. gn. Bd.	Lys Fink. Massiv gr. - holdig	Homogen					

Lokalitet:

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7501

Side 15

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
207,65 - 209,30	1,65	2gl. gn. Bd. Amphibolitt masse	Ret Lys Fink. Sott Bakt Hbl. - hal- chig. gr - holdig	2c°					
209,30 - 210,00	0,70	2gl. gn. Bn. - Alm Type	Lys Fink. gr - holdig svag stic.	Slykt Foldet					
210,00 - 210,68	0,68	2gl. gn. Alm. - Bn. Type	Lys Fink. gr - holdig svag stic lett Chlorit	Homogen					
210,68 - 210,90	0,22	Bakt gn.	Skarn - holdig	50°					
210,90 - 211,75	0,85	2gl. gn. Bn.	Lys Fink. gr - holdig svag stic lett Chlorit lett Skarn	Homogen					
211,75 - 212,35	0,60	Amphibolitt	Mørk Amphibolitt med 15 cm bredt bånd af 2gl. gn. Bd. ind- foldet	Slykt Foldet					
212,35 - 213,05	1,30	2gl. gn. Bd.	Ret Lys Fink. gr - holdig (5 mm) lett Skarn	Vinket Foldet					
213,05 - 217,42	3,77	2gl. gn. Bn. - Alm Type	Lys Fink. gr - holdig (5 mm) lett Skarn	Slykt Foldet					
217,42 - 217,65	0,23	Pegm.							
217,65 - 220,00	2,35	2gl. gn. Bn.	do.	do.					
220,00 - 221,52	1,52	2gl. gn. Bn. - Bd.	Lys Fink. masse - gr - holdig (2 mm)	45°					
221,52 - 221,62	0,10	Pegm.							
221,62 - 223,75	2,13	2gl. gn. Bd. - Bn.	Lys Fink. masse - gr - holdig (2 mm) Chlorit i spor	Homogen					
223,75 - 223,85	0,10	Kvarts							

Lokalitet:

Borehull: 7501

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 14

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove nr
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
197,48 - 198,60	1,12	Amfibolitt	Mørk Mørk Fink.						
198,60 - 199,10	0,50	Biot. gn.	Mørk Fimmlk. - mlk. Brun Biot.						
199,10 - 200,00	0,90	Dst. Type Hbl. - Biot. gn. Dat gn. Type	sv. pyg. impr. Mørk Fimmlk. - mlk. Hbl. - holdig Brun Biot. pyg-nig overst aftegende nedst.						
200,00 - 200,60	0,60	Zgl. gn Bp.	lys Fink. massiv gr. fattig						
200,60 - 200,93	0,33	Hbl. gn. - Amfibolitt	Ret lys Fink. massiv gr-nig						
200,93 - 201,44	0,51	Biot gn. Dat gn Type	Ret Mørk Fimmlk. - mlk. Brun Biot. euhedrale gr. spor pyg.						
201,44 - 202,30	0,86	Hbl. - Biot. gn. Dat gn. Type	Mørk Fimmlk. Brun Biot. / Hbl. = 1/1 euhedrale gr. pyg. impr.						
202,30 - 203,00	0,70	do	Mørk Mlk. Brun Biot / Hbl. = 1/1 euhedrale gr. pyg-nig						
203,00 - 204,22	1,22	Amfibolitt	Mørk Skarn-nig						
204,22 - 204,35	0,13	Mafigt Biot gn.							
204,35 - 207,12	2,77	Zgl. gn Bp.	lys Fink. gr-holdig (1-2 mm) 2 alr. 2 cm brede bånd af Biot gn.						
207,12 - 207,31	0,19	Pegm.							
207,31 - 207,49	0,18	Zgl. gn. Bd.	Ret lys Fim-Fimmlk. gr-hol. dig (5 mm)						
207,49 - 207,65	0,16	Pegm.							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Borehull: 750/

Side 13

Dybde	L	Bergart		S	% Pb	% Cu	Analyser		% S	% Fe	Prove m
182,53-183,01	0,48	Biot. gn.	Mørk Finnmlk Brun Biot.	18°							
		Dst. gn. Type	Lidt Hbl. gr.-rig (1-2 mm) spor py.								
183,01-183,14	0,13	Regm.	Mørk Finnmlk Brun Biot. lidt	3½°							
183,14-184,44	1,30	Biot. gn.	Hbl. gr.-rig (1-2 mm) spor py.	Faldet							
		Dst. gn. Type									
184,44-186,10	1,66	Amphibolit - Hbl. gn.	Mørk Finnmlk. med stærkt øget mængde Brun Biot. nedefter.	18°							
186,10-186,23	0,13	Regm.									
186,23-186,96	0,73	Biot. gn.	Mørk Finnmlk. Brun Biot. spor	Flad							
		Dst. gn. Type	py med 10 cm bånd af lys Finb. 2 gl. Bp.								
186,96-188,00	1,04	2 gl. gn. Bp.	Lys Finb. Massiv spædt gr. (1 mm)	Faldet?							
188,00-191,90	3,90	2 gl. gn. Bp.	Lys Fin-Finnmlk. gr.-holdig (0,5-2 cm)	Flade Hældning							
191,90-192,19	0,29	Regm.									
192,19-192,38	0,19	Biot. gn. Mafisk	Mørk Finnmlk. - Mlk. gr.-rig	3½° Faldet							
192,38-193,00	0,62	2 gl. gn. Alm. - Bp. Type	Lys Fin-Finnmlk. gr.-faldig	30°							
193,00-194,00	1,00	do.	do.	25°							
194,00-195,00	1,00	do.	do.	35°							
195,00-197,48	2,48	do.	do.	Faldet							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7501

Side 12

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve nr.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
169,95 - 171,33	1,38	2gl. gn. Bd. Lys Ret Lys Fink Massiv Brun Biat. gr-falldig	Homogen Slegth Foldet?						
171,33 - 171,55	0,22	Biat. gn. Dat. gn. Type Ret Mørk Fin-Finnmlk. Brun Biat. ÷ gr. ÷ py.	Slegth Foldet						
171,55 - 171,95	0,40	Biat.-Hbl. gn. Ret Lys Fink. gr.-rig Brun Biat. mørk Hbl.-holdig svag py. impr.	Slegth Foldet						
171,95 - 174,10	2,15	Biat. gn. Dat. gn. Type Ret Mørk Fin-Finnmlk Brun Biat. Hbl. i varierende men underordnet mengde	Slegth Foldet						
174,10 - 174,45	0,35	Biat. gn. Omd. Ret Mørk Finnmlk-Mlk Brun Biat. Dat. gn. Type Chlorit-holdig lys gr. py. impr.	Slegth Foldet						
174,45 - 174,80	0,35	2gl. gn. Alm. Lys Fink Brun Biat Chlorit Type spætt gr. (<1mm) sv. py. impr.	clor.						
174,80 - 175,40	0,60	Biat. gn. Omd. Ret Mørk Finnmlk-Mlk Brun Biat. Dat. gn. Type Chlorit lidt Hbl. py. impr.	clor.						
175,40 - 177,87	2,47	2gl. gn. Bd. Ret Lys Fink. Brun og Sork Biat. lidt Chlorit lidt Hbl. gr.-falldig spor py.	40°						
177,87 - 180,00	2,13	2gl. gn. Bd. Ret Lys Fink. Sork Biat gr- holdig (0,5cm) lidt Hbl.	Homogen						
180,00 - 180,53	0,53	2gl. gn. Bd. Ret Lys Fink. Massiv Sork Biat. gr.-holdig (5mm)	Homogen						
180,53 - 181,28	0,75	2gl. gn. Bd. Ret Mørk Finnmlk. gr.-rig (1cm)	Homogen						
181,28 - 182,53	1,25	2gl. gn. Bp Lys Fink. gr.-holdig med under- ordnet bånd af 2gl. gn. Bd. Ret Mørk Finnmlk gr.-rig (1cm)							

Lokalitet:

Borehull: 7501

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

Side 11

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
154,60 - 154,80	0,20	2gl. gn. Bp.	Ret Lys Fink. Massiv gr.-holdig						
154,80 - 156,00	1,20	2gl. gn. Bp. - Bd.	Ret Mørk Fink. svagt båndet med små kvarte sliver gr.-holdig						
156,00 - 156,06	0,06	Pegm.							
156,06 - 156,92	0,86	2gl. gn. Bp. - Bd.	Ret Mørk Fink. svagt båndet med små kvarte sliver gr.-holdig						
156,92 - 157,05	0,13	Pegm.							
157,05 - 157,77	0,72	2gl. gn. Bp. / Biot gn.	Ret Mørk Fink. gr.-holdig, foldet sammen med 2-5 cm lag af Biot gn. i Mørk Fink. gr.-reg (1 cm)						
157,77 - 164,37	6,60	2gl. gn. Bd	Ret Mørk Fink. Massiv gr.-holdig (1-2 mm)						
164,37 - 164,90	0,53	2gl. gn. Bd	Ret Mørk Fink. Fannulle gr.-reg (1 cm)						
164,90 - 165,31	0,41	Pegm.							
165,31 - 167,27	1,96	2gl. gn. Bd	Ret Mørk Fink. Fannulle gr.-reg (5 mm)						
167,27 - 167,50	0,23	Pegm.							
167,50 - 168,95	1,45	2gl. gn. Bd / Skarn	Ret Mørk Fink. Fannulle gr.-reg med gr.-reg Skarn horisont, der også florer grøn Biot og Hbl						
168,95 - 169,16	0,21	Skarn	Kvarts- og Skarn-reg gr.-holdig Hbl.-holdig						
169,16 - 169,95	0,79	Biot gn. Det gn Tyne	Mørk Fink. Fannulle svagt båndet Brun Biot - gr. spor af py						

Lokalitet:

Borehull: 7501

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove nr.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
132,05 - 134,85	2,80	2gl. gn. Bd. Ret Lys Fink. Massiv spredt gr. (5mm) svakt Shc.	Spreid Faldet? Faldet?						
134,85 - 135,45	0,60	Bist. gn. 2 gl. gn. Type Mørk Fin-Finmlk. lidt Hbl. Inhomogen med kvarts bånd	Skjult Faldet						
135,45 - 137,75	2,30	2gl. gn. Bd. Ret Lys Fink. Massiv gr. holdig (3mm)	Homogen						
137,75 - 139,00	1,25	2gl. gn. Bd. Ret Lys Fink gr. holdig (3mm) 3 stk 5-10cm brede Kvarts lag med Skarn og calcit	30°?						
139,00 - 141,01	2,01	2gl. gn. Bd. Ret Lys Fink. gr. glomerablaster (15mm)	?						
141,01 - 141,19	0,18	Kvarts Massiv Kvarts (ikke Keratophyr Type)							
141,19 - 144,45	3,26	2gl. gn. Bd. Ret Mørk Fink. Massiv gr. holdig	Homogen						
144,45 - 147,00	2,55	2gl. gn. Bd. Ret Mørk Fink. Massiv gr. holdig. lidt Skarn lidt calcit	Faldet						
147,00 - 148,00	1,00	2gl. gn. Bd. Ret Lys Fink. Massiv f. gr. - Bn.	Faldet						
148,00 - 150,05	2,05	2gl. gn. Bn. Ret Lys Fink. Massiv f. gr.	Faldet						
150,05 - 150,40	0,35	2gl. gn. Bd. Ret Mørk Fin-Finmlk. gr.-sig	Faldet						
150,40 - 154,60	4,20	2gl. gn. Bn. Ret Lys Fink. Massiv gr. holdig	Homogen						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7501

Side 9

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
114,11 - 119,01	4,90	Amphibolit	Mørk massiv underordnet sort Biot. men øget Biot indhold op til grensene gr-nig (1cm) Flere 2-5cm skammige horizon- ter med gyl.	?					
119,01 - 119,99	0,98	2gl. gn. Bn- Alm. Type	Lys Fink. øget Musk indhold medepler af bagenden gr indhold medepler	Homogen					
119,99 - 120,62	0,63	2gl. gn. Bn.	Ret lys Fink gr. falkig (<1mm)	Faldet?					
120,62 - 121,55	1,23	2gl. gn. Bd.	Ret lys Fink. gr. holdig (1-2mm)	Faldet?					
121,55 - 124,55	2,70	2gl. gn. Bd.	Ret lys Fink. gr. falkig (<1mm) 2 stk. 5cm brede Kvarke horizon- ter med skarn	Flad?					
124,55 - 125,57	1,02	2gl. gn. Bd.	Ret lys Fink. spredt gr. Flere tynde bånd af Mafisk Biot. gn. med skarn og Calcit	Spredt Faldet?					
125,57 - 125,61	0,04	Mafisk Biot. gn.	Skarn holdig	15°					
125,61 - 128,00	2,39	2gl. gn. Bd.	Ret lys Fink. spredt gr.	Flad?					
128,00 - 129,92	1,92	2gl. gn. Bd.	Ret lys Fink. spredt gr. lalnige 5cm brede Kvarke bånd med Skarn	Faldet Haldning gr?					
129,92 - 130,90	0,98	2gl. gn. Bd.	Ret Mørk Fink-Finnitk. spredt gr.	Flad?					
130,90 - 132,05	1,15	2gl. gn. Bd- Biot gn.	Ret Mørk Fink-Finnitk. spredt gr. (1cm) Flere Kvarke bånd med skarn og Hbl.	2°					

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7501

Side 8

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve nr.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
107,08 - 110,0	0,92	2 gl. gn. Alm.-Muskp.	Lys Fin-Finnmlk. Musk-nig ÷ gr. ÷ py.						
110,0 - 110,90	0,90	2 gl. gn. Alm-Bn / 2 gl. gn. Alm-Muskp.	Vertical laggenreise i kornen 2 gl. gn. Alm-Bn: Ret Mørk Fin-Finnmlk. gr-nig ÷ py litt skarn 2 gl. gn. Alm-Muskp.: Lys Fin-Finnmlk. ÷ gr. ÷ py. Musk-nig						
110,90 - 111,51	0,61	2 gl. gn. Alm-Muskp.	Lys Fin-Finnmlk. ÷ gr. ÷ py.						
111,51 - 111,95	0,44	2 gl. gn. Bn.	Ret lys Fink på gr. ÷ py.						
111,95 - 112,25	0,30	2 gl. gn. Alm-Muskp.	Lys Fink massiv spredt gr.						
112,25 - 112,67	0,43	2 gl. gn. Bn.	Ret lys Fink massiv spredt gr.						
112,67 - 112,74	0,07	Mørsk Brak gn.	Litt FeS store gr.						
112,74 - 113,05	0,31	Pegm.							
113,05 - 113,20	0,15	2 gl. gn. Alm-Muskp.	Lys Fink massiv spredt gr.						
113,20 - 113,55	0,35	2 gl. gn. Bn. / Amphibolit	5-10 cm Amphibolit bånd indfoldet i 2 gl. gn.						
113,55 - 113,85	0,30	Amphibolit / Mørsk Brak gn.	Mørsk Brak-nig Amphibolit						
113,85 - 114,11	0,26	Pegm.							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7501

Side 7

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove III
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
102,44 - 103,30	0,86	Mafisk Biot. gn. / 2 gl. gn. Bd.	Mafisk Biot. gn. : Mørk Mellemkornet Grovkornet med skarn samtlige lag af 2 gl. gn. (1/2 Fin. Bd.) ÷ gr ÷ pyg.	Faldet					
103,30 - 103,65	0,35	2 gl. gn. Alm. Type	Ret 1/2 Fin-Finmilt. gr.-mig (10 mm) ÷ pyg.						
103,65 - 103,80	0,15	Mafisk Biot. gn.	Skarn-holdig						
103,80 - 104,52	0,72	2 gl. gn. Alm. Type	1/2 Fin-Finmilt Mørk-mig ÷ gr. ÷ pyg.	Spaltet Faldet					
104,52 - 105,14	0,62	2 gl. gn. Bn	Ret Mørk Fin-Finmilt gr.-mig (2 mm - 2 cm) + pyg. Gul skarn, calcet	Verktet Faldet					
105,14 - 105,85	0,71	Pegmat.							
105,85 - 106,05	0,20	2 gl. gn. Bn	Ret Mørk Fin-Finmilt gr.-mig (2 mm - 2 cm) - pyg.	Verktet Faldet					
106,05 - 106,12	0,07	Amphibolit	Mørk Fink ÷ gr.	"					
106,12 - 107,65	1,53	2 gl. gn. Bn	Ret Mørk Fin-Finmilt. gr.-mig (2 mm - 2 cm) - pyg.	"					
107,65 - 108,50	0,85	2 gl. gn. Alm. Type	1/2 Fin-Finmilt med mørk-mig meget få gr. - pyg.	"					
108,50 - 109,08	0,58	2 gl. gn. Alm.-Bn. Type	Ret Mørk Fin-Finmilt gr.-mig (2 mm) - pyg. Løst skarn	"					

Lokalitet:

Borehull: 7501

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 6

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
83,64 - 87,45	3,81	Bact. gn. Dat. gn. Type/ Musk. gn.	Mørk Mlk. Brun Bact. andordnet andfoldet Lys kvarts-ryg Musk. gn. 1 mm Musk. bånd i Bact. gn. gr. holdig (1 mm - 2 cm) pyg. holdig	Faldet om vertical						
87,45 - 89,22	1,77	Bact. - Hbl. gn. Dat. gn. Type	Mørk Mlk. Brun Bact. Hbl. holdig cgr. - holdig (1 mm) pyg. - ryg	10°						
89,22 - 90,07	0,85	Bact. gn. Dat. gn. Type	Mørk Mlk. Brun Bact. gr. holdig (1 mm) pyg. holdig							
90,07 - 91,50	1,43	Bact. gn. 2 gl. gn. Type	Mørk Finmlk - Mlk. Sørk Bact. gr ryg (2 mm - 2 cm) litt Musk. nedeløst litt skarn	Slykt Faldet?						
91,50 - 93,70	2,20	2 gl. gn. Bd. - Alm. Type	Mørk Finmlk - mlk. Sørk Bact. stukt vanskelig å mangde Musk. gr ryg (2 mm - 2 cm) Lysner og overløst Dat. gn. ÷ pyg	Vertical - Slykt Faldet						
93,70 - 99,63	5,93	2 gl. gn. Bd.	Mørk Finmlk - mlk. Sørk Bact. gr ryg (2 mm - 2 cm) litt skarn nedeløst	Slykt Faldet						
99,63 - 100,55	0,92	2 gl. gn. Bd. - Alm. Type / Mafisk Bact. gn.	2 gl. gn. : Lys Fink. Mafisk Mafisk Bact. gn. : Mørk Båndet skarn-holdig	Vertical Faldet						
100,55 - 100,60	0,05	Mafisk Bact. Lag	Mørk Skarn-holdig							
100,60 - 102,44	1,84	2 gl. gn. Alm. - Mf.	Lys Fin - Finmlk. Musk-ryg + gr + pyg. Tydelig lag med sørt Bact.	15° Faldet?						

Lokalitet:

Borehull: 7501

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

Side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
65,03 - 67,46	2,43	Bakt gn Dak. gn. Type	Ret Mørk Mlk.-Finnmlk. Brun Bakt. gr.-rig (2 mm) Dak.-holdig 1 mm Tynde underordnede lag med Musk. py. rig	20° Foldet?					
67,46 - 67,65	0,19	Kvarts	Marain Kvarts (alk. koralophyr- type)						
67,65 - 67,75	0,10	Bakt gn. Dak. gn. Type	Ret Mørk Mlk.-Finnmlk. Brun Bakt. gr. rig (2 mm) Dak.-holdig py. rig	10°					
67,75 - 68,75	1,00	Hbl. gn.	Mørk Mørk Amphibolitisk udseende gr. holdig (10-20 mm) underordnet Brun Bakt. gavnovergang til Bakt. gn. nedefter lidt py.	Foldet					
68,75 - 69,84	0,09	Bakt. gn. Dak. gn. Type	Ret Mørk Mlk.-Finnmlk. Brun Bakt. gr. rig (2 mm) Dak.-holdig py. rig underordnet Hbl.	Horiz?					
69,84 - 69,95	0,11	Amphibolit	Søst Fink underordnet Brun Bakt. gr. spor py.						
69,95 - 80,00	10,05	Bakt. - Hbl. - Dak. gn.	Mørk Mlk. jævnt varierende mængde Brun Bakt. og Hbl. normal forhold 1:1 Dak.-holdig gr.-holdig (1-2 mm) py. rig	?					
80,00 - 81,35	1,35	Bakt. gn. Dak. type	Mørk Mlk. Brun Bakt. underordnet mængde hbl. gr. holdig (< 1 mm) py. rig Dak. holdig	?					
81,35 - 83,64	2,29	Bakt. - Hbl. gn. Dak. gn. Type	Mørk Mlk. Brun Bakt. Hbl.-holdig gr. holdig (< 1 mm) Dak. holdig py. rig	Glyst Foldet					

Lokalitet:

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7501

Side 4

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
50,95 - 52,02	1,07	2gl. gn. Alm. Type	Lys Fink. Musk. rig gr. falkig	5°						
52,02 - 52,12	0,10	2gl. gn. Bdt. - Biot. gn.	Mørk grovskallet sort Biot. py. rig							
52,12 - 58,80	6,68	2gl. gn. Alm. Type	Lys Fink. Musk. domminerende bånd Biot. mengde stigende med økende spor af py.	Foldet						
58,80 - 59,64	0,84	Kvarts	Massiv Kvarts (ikke Karakofsky- Type)							
59,64 - 59,79	0,15	Mafisk Biot. gn.								
59,79 - 59,91	0,12	Kvarts	Massiv Kvarts (ikke Karakofsky- Type)							
59,91 - 60,43	0,52	2gl. gn. Alm. Type	Lys Fink. Massiv sparselt gr. (2 mm)	Homogen						
60,43 - 60,48	0,05	Amfibolit								
60,48 - 60,72		Biot. gn. Dak. gn. Type	Rel							
60,48 - 64,20	3,72	2gl. gn. Alm. Type	Lys Fink. Massiv sparselt gr. (2 mm)	Steglt Foldet						
64,20 - 64,72	0,52	Biot. gn. Dak. gn. Type	Rel. Mørk Mkt. Binn. Biot. gr. rig py. - rig	Sprødt Foldet						
64,72 - 65,03	0,31	2gl. gn. Alm. Type	Rel. Lys Fink. Mkt. gr. holdig (2 til 5 mm) sv. py.	Foldet						

Lokalitet:

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7501

Side 3

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove n
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
36,00 - 36,95	0,95	Amphibolit	gr-holdig (10-20 mm) py. + klumper (10-20 mm)	?						
36,95 - 37,22	0,27	2gl. gn. Bp.	Ret Lys Fink gr-holdig (2 mm) Massiv	Homogen						
37,22 - 37,34	0,12	Amphibolit	gr-holdig (10-20 mm) py. + klumper (10-20 mm)	?						
37,34 - 37,35	0,01	2gl. gn. Alm. Type	Lys Fink. Massiv gr-holdig (2 mm)	Homogen						
37,35 - 37,55	0,20	Pegm.								
37,55 - 40,00	2,45	2gl. gn. Alm. Type	Lys Fink Massiv gr-holdig (2 mm) litt Chlorit	Homogen						
40,00 - 42,85	2,85	2gl. gn. Alm. Type	Lys Fink. Musk. og Chlorit- holdig	Spredt Foldet						
42,85 - 43,05	0,20	2gl. gn. Bp.	Ret Lys Fink gr. og (2 mm) sv. py.	Vertical Foldet						
43,05 - 48,90	5,35	2gl. gn. Bp. Alm.	Ret Lys Fink. gr og (2 mm) sv. chlorit sv. py.	Foldet Dominerende helling 25°						
48,90 - 50,59	1,69	Musk. gn. 2gl. gn. Type	Lys Fink massiv gr-faltig	Homogen						
50,59 - 50,95	0,36	2gl. gn. Bp.	Ret Lys Fink gr-holdig (2 mm)	Fidd Spredt Foldet?						

Borehull: 7501

Dato

Koordinator : x = 925 422 40 y = 44 404,20

Retning

Helling/stigning:

Hoyde

Lengde

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15,70 - 15,80	0,10	Pegm.							
15,80 - 16,33	0,53	2 gl. gn. Bp	Lys Fink. Marsur gr.-holdig (2mm)						
16,33 - 20,00	3,67	2 gl. gn. Bp	Ret Lys Fink. gr.-holdig (5mm) sv. shc.						Homogen
20,00 - 20,90	0,90	2 gl. gn. Bp	Ret Lys Fink. gr.-holdig (5mm) sv. shc. Py. i sprakke						Svagt Foldet?
20,90 - 21,98	1,08	2 gl. gn. Bd.-Bp.	Ret Mørk Fink. gr.-holdig (10-15mm)						Horizon- tal?
21,98 - 22,85	0,87	2 gl. gn. Bp.-Alu.	Ret Lys Fink.-Finnvik. gr.-holdig (2mm)						Skjelt Foldet?
22,85 - 25,27	2,42	2 gl. gn. Bp.	Ret Lys Fink.-Finnvik. gr.-holdig (2mm)						Vertical Foldet
25,27 - 25,61	0,34	Pegm.							Foldet
25,61 - 29,95	4,34	2 gl. gn. Bp.	Ret Lys Fink.-Finnvik. gr.-holdig (2mm) spor af sv. brunt k. lagende k. sv. py. imp. ned- eftr.						Vertical Foldet
29,95 - 36,60	6,65	2 gl. gn. Bp.-Bd.	Ret Lys Fink.-Finnvik. gr.-holdig sv. py. imp.						35

Lokalitet: Mofjellet

Borehull: 7501

Dato : 1975

Koordinater : x = 925 422.40 y = 44 404.20

Retning :

Helling/stigning: 10dd.

avviksmålt

Høyde : 202,50

Lengde : 340,00

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 0,70	0,70	løs jord							
0,70 - 1,07	0,37	2gl. gn. Alm. Type	Lys Fink. Gort Bakt fä gr. (1mm) Diaperst folliert	20°					
1,07 - 1,90	0,83	2gl. gn. Bn.	Lys Fin-Finmilt. gr.-holdig (2mm) Diaperst Folliert	20°					
1,90 - 7,22	5,32	2gl. gn. Bn - Alm Type	Retlys Finmilt. sort Bakt. gr.-holdig (2mm) ldt Chlorit sv. py. impur.	20°					
7,22 - 9,08	1,86	2gl. gn. Alm Type	Lys Fin-Finmilt fä gr. (1mm)	15°					
9,08 - 11,33	2,25	2gl. gn. Alm Type	Retlys Finmilt. Diaperst folli- ert gr.-holdig (1mm)	15°					
11,33 - 11,55	0,22	Kvarts	Massiv Kvarts						
11,55 - 13,45	1,90	2gl. gn. Alm Type	Retlys Finmilt fä gr. (1mm)						
13,45 - 13,80	0,35	Chlorit lys	Mørk Chlorit domineret med tynde 2gl. gn. bånd	Hor					
13,80 - 15,70	1,90	2gl. gn. Bn.	Retlys Fin-Finmilt sv. bakt. ldt gr.-holdig (op. til 5mm) et 5cm bredt grovkornet Bakt bånd	Feldt?					

Lokalitet: **MOFJELL GRUBEFELT**

Profil ca 43.910 Y

Dato : 1971

Koordinator : 2468 Ø, 171 S. 925.408,25 X / 43.900,55 Y

Retning :

Helling/stigning : loddhull avviksmålt

Høyde : + 207,7 m.o.h. i f.d. gruben. 211, 14 m o.h.

Lengde : 330,95 m Gjennomsnitt gruben: - 75,5 m.o.h.
925.381,70 X / 43.914,60 Y

Borehull: 7101

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 14,30	14,30	gr.gl.gn. veksler mellom gr. biot.(musk.)gn.til gr.biot.musk.gn. til gr.musk.(biot.) gn. Middelsgrå, rel. gr.-rik. Fra 11 m: lys.	75 ⁰						
14,30 - 14,75	0,45	m. sv. malm-impr.:	75						
14,75 - 15,20	0,45	gr.gl.gn. lys, rel. gl.rik	75						
15,20 - 15,75	0,55	m. sv. malm-impr.:	75						
15,75 - 15,90	0,15	gr.gl.gn.							
15,90 - 16,00	0,10	m. sv. malm-impr.							
16,00 - 16,90	0,90	gr.gl.gn. lys, rel. gl.rik							
16,90 - 17,40	0,50	pegm.							
17,40 - 19,20	1,80	gr.gl.gn. lys, sv. båndet, rel. gl.rik	65						
19,20 - 20,80	1,60	gr.gl.gn. middelsgrå, rel. gl.rik. Noe båndet	70						
20,80 - 20,95	0,15	pegm.							
20,95 - 23,45	2,50	gr.gl.gn. middelsgrå, noe båndet. Noe hbl. på 22,66-22,68	65-75						
23,45 - 23,55	0,10	pegm.							

Lokalitet: MOFJELL GRUBEFELT

Borehull: 7101

Dato : 1971
 Koordinator : 2468 Ø, 171 S
 Retning :
 Helling/stigning : loddhull
 Høyde : + 207,7 m.o.h.
 Lengde : 330,95

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
23,55 - 23,65	0,10	gr.gl.gn. lys							
23,65 - 23,85	0,20	musk.gn. (pegmatittisk?) hvit							
23,85 - 24,25	0,40	gr.gl.gn. middelsgrå							
24,25 - 24,40	0,15	pegm.musk.gn.							
24,40 - 24,50	0,10	gr.gl.gn.	75						
24,50 - 24,90	0,40	(pegm.?)musk.gn. hvit							
24,90 - 25,50	0,60	gr.musk.(biot.)-gn.	60						
25,50 - 28,90	3,40	gr.gl.gn. sv. båndet	70						
28,90 - 30,00	1,10	gr.musk.(biot.)-gn. granatrik. Mørke Mørke biot.hbl.-bånd på 29,48 - 29,52, 29,87 - 29,90	70						
30,00 - 31,50	1,50	gr.gl.gn.	65						
31,50 - 31,85	0,35	pegm.							
31,85 - 32,30	0,45	gr.gl.gn.	65						
32,30 - 32,50	0,20	pegm.							
32,50 - 34,80	2,30	gr.gl.gn. rel. lys.	65-70						
34,80 - 35,25	0,45	musk.(biot.)gn.							
35,25 - 38,00	2,75	gr.gl.gn. rel. lys	70						
38,00 - 38,80	0,80	gr.musk.(biot.)-gn.							
38,80 - 43,00	4,20	gr.gl.gn. lys	65						

Lokalitet: MOFJELL GRUBEFELT

Dato : 1971
 Koordinater : 2468 Ø, 171 S
 Retning :
 Helling/stigning : loddhull
 Høyde : + 207,7 m.o.h.
 Lengde : 330,95 m

Borehull: 7101

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
43,00 - 44,75	1,75	ditto	gr.rik, middels grå, noe økende biot.innhold	60 40					
44,75 - 46,80	1,05	gr.biot.(musk.)- gn.	gr.-rik, småfol- det	V,60					
46,80 - 56,60	9,80	gr.gl.gn.	granatrik. På 54,85-54,90 Noe kalksilikat (zoisitt, hbl.). Småfoldet	60-40 50 senere ca. 0					
56,60 - 56,90	0,30	gr.biot.gn.	Noe kloritt. Fol- deombøyning	35 30					
56,90 - 65,40	8,50	gr.gl.gn.	gr.rik. Småfoldet (akseplan ca. 60)	ca.0					
65,40 - 71,00	4,60	gr.biot.(musk.)- gn. + gr.gl.gn.	middelsgrå. I be- gynnelsen ca. 0, senere	65					
71,00 - 73,25	2,25	gr.gl.gn.	gr.rik. Lys-mid- delsgrå	V, 55					
73,25 - 73,30	0,05	diopsidfels (el- ler hbl.fels)	middelsgrønn	60					
73,30 - 75,55	2,25	gr.gl.gn.	gr.rik. Middelsgrå Småfoldet rundt 0 grader, akseplan ca. 60	V, 0-60					
75,55 - 75,85	0,30	pegm.							
75,85 - 79,35	3,50	gr.biot.(musk.)- gn.	gr.rik, middelsgrå, delvis noe gr.gl.-						

Lokalitet: MOFJELL GRUBEFELT

Dato : 1971

Koordinater : 2468 Ø, 171 S

Retning :

Helling/stigning : loddhull

Høyde : + 207,7 m.o.h.

Lengde : 330,95 m

Borehull: 7101

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		gn. Småfoldet (åpne folder) (akseplan ca. 75)	rundt 0						
79,35 - 79,45	0,10	gr.biot.(hbl.)- gn.							
79,45 - 79,55	0,10	biot.(musk.)gn.							
79,55 - 80,90	1,35	diopsid-biotitt- Små hulrom diop- gn. sid-hedenbergitt	75						80,4
80,90 - 81,70	0,80	biot.gn.	75						
81,70 - 83,00	1,30	(gr.)gl.gn. middelsgrå. M. sv. py.-impr.	75						
83,00 - 84,00	1,00	ditto med sprekk ca. parallell kjer- neaksen og ca. lodd- rett strøket. Opp- fylling fink., lyse- grønn, 1 mm tykk							
84,00 - 86,70	2,70	(gr.)gl.gn. spredt noe hbl. (diopsid?). Spor py.-impr.	75-80						
86,70 - 88,30	1,60	gr.hbl.gl.gn. (og/eller diopsid?)	75						87,8
88,30 - 88,35	0,05	hbl.(biot.)fels (eller diops.?)							
88,35 - 88,70	0,35	gr.biot.(musk.- spor kis hbl.)gn.	75						
88,70 - 89,05	0,35	gr.biot.(musk.)- spor kis gn.							
89,05 - 90,50	1,45	gr.gl.gn.	75						

Lokalitet: MOFJELL GRUBEFELT

Dato : 1971

Koordinater : 2468 Ø, 171 S

Retning :

Helling/stigning : loddhull

Høyde : + 207,7 m.o.h.

Lengde : 330,95 m

Borehull: 7101

side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
90,50 - 93,00	2,50	gr.(hbl.)gl.gn. Båndet (biot.-musk.-hbl.). M. sv. kis-impr.	75						
93,00 - 95,65	2,65	ingen kjerne (hulrom i fjellet)							
95,65 - 97,40	1,75	gr.hbl.biot.gn. sv. py.-impr., rel. mørk	70						
97,40 - 97,45	0,05	gr.biot.hbl.sk. Mørk							
97,45 - 97,55	0,10	amf.	70						
97,55 - 97,57	0,02	biot.sk. svart							
97,57 - 97,85	0,28	pegm.							
97,85 - 98,80	0,95	biot. (musk.)- sv. py.-impr. gn.							
98,80 - 100,00	1,20	gr.biot.sk./gn. Mørk, sv. py.impr.	80						
100,00 - 100,45	0,45	(gr.)biot.gn. middelsgrå	75						
100,45 - 100,75	0,30	hbl.biot.gn. mørk	85						
100,75 - 101,35	0,60	gr.biot.gn. spredt py.-impr.	75						
101,35 - 101,95	0,60	gr.hbl.biot.gn. mørk	80						
101,95 - 102,95	1,00	hbl.biot.gn. mørk	70-80						
102,95 - 104,25	1,30	gr.hbl.biot.gn. mørk	75						
104,25 - 105,40	1,15	(gr.)biot.- båndet, middelsgrå (musk.)gn.	80						
105,40 - 110,35	4,95	gl.gn. lys, spredt noe gr. Litt småfoldet. Akseplan 80	80						
110,35 - 112,35	2,00	ditto Noen smale bånd gr.-							

Lokalitet: MOFJELL GRUBEFELT

Dato : 1971

Koordinater : 2468 Ø, 171 S

Retning :

Helling/stigning : loddhull

Høyde : + 207,7 m.o.h.

Borehull: 7101

Lengde : 330,95 m

side 6

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		biot.gn. på 110,35, 110,50, 110,95, 112,00 m. Småfoldet							
112,35 - 112,50	0,15	gr.hbl.biot.gn. Småfoldet. Akse- plan 80							
112,50 - 113,15	0,65	(gr.)gl.gn. lys							
113,15 - 113,60	0,45	gr.hbl.biot.gn. mørk	80						
113,60 - 114,00	0,40	(gr.)gl.gn. lys							
114,00 - 115,75	1,75	gr.amf. middels grønn- grå, litt små- foldet	70-80						
115,75 - 115,90	0,15	gr.gl.gn. lys							
115,90 - 116,05	0,15	gr.amf.	75						
116,05 - 116,50	0,45	(gr.)gl.gn. rel. lys	80						
116,50 - 117,70	1,20	gr.amf. middels grønngrå	80						
117,70 - 145,10	27,40	gr.gl.gn. lys, til 120 m: 80 grader, så av- takende. Fra 130 m: sterkt små- foldet, omkring 0 grader (akse- plan ca. 80 gra- der). Fra 130- 134 m: 65 grader. Fra 134-140 m noe småfoldet, men mest 65 grader. Fra 140-144 m:							

Lokalitet: MOFJELL GRUBEFELT

Dato : 1971
 Koordinator : 2468 Ø, 171 S
 Retning :
 Helling/stigning : loddhull
 Høyde : + 207,7 m.o.h.
 Lengde : 330 m

Borehull: 7101

side 7

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		småfoldet, ca. 0°. Fra 144 - 145,10 m 60 grader							
145,10 - 145,40	0,30	pegm.	ca. konkordant						
145,40 - 145,65	0,25	gr.gl.gn.	småfoldet rundt 0°						
145,65 - 146,00	0,35	pegm.	småfoldet. rundt 0° Ca. konkordant. Samme pegm. kommer antakelig flere ganger igjen.						
146,00 - 146,40	0,40	gr.gl.gn.	noe småfoldet 60						
146,40 - 146,60	0,20	pegm.	ca. konkordant						
146,60 - 150,00	3,40	gr.gl.gn.	lys. Spredt ca. 5 cm. tykke pegm.band. Ant. ofte samme pegm. som kommer flere ganger igjen p.g.a. småfolding: På 146,80 m, 147,35 m, 147,50 m, 147,65 m, 147,90 m, 149,30 m, 149,40 m. Mye småfoldet rundt 0 grader, ellers mye 60 grader.						
150,00 - 163,10	13,10	(gr.)gl.gn.	lys, småfoldet, rundt 0° (akseplan ca. 75 gr.) Avtakende gr.innh.						
163,10 - 163,35	0,25	biot.(hbl.)gn.	Småfoldet						
163,35 - 164,15	0,80	gl.gn.	lys, spredt noe rundt 0° gr.						

Lokalitet: MOFJELL GRUBEFELT

Dato : 1971
Koordinater : 2468 Ø, 171 S

Borehull: 7101

Retning :
Helling/stigning : loddhull
Høyde : + 207,7 m.o.h.
Lengde : 330 m

side 8

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
164,15 - 164,55	0,40	hbl.biot.gn. spredt noe gr.							
164,55 - 164,60	0,05	kv.pegm.							
164,60 - 164,70	0,10	biot.diops.gn. noe karb	65						
164,70 - 167,60	2,90	gr.gl.gn. lys. Noe småfoldet ellers	60-75						
167,60 - 168,10	0,50	gr.hbl.biot.gn. Småfoldet, mye	60°						
168,10 - 168,20	0,10	gr.gl.gn. lys, småfold.	"						
168,20 - 168,45	0,25	gr.hbl.biot.gn. Småfoldet,	"						
168,45 - 168,90	0,45	gr.gl.gn. lys, småfold.	"						
168,90 - 169,45	0,55	gr.hbl.biot.gn. Småfoldet,	"						
169,45 - 169,70	0,25	gr.gl.gn. -"-	"						
169,70 - 169,85	0,15	pegm.							
169,85 - 170,80	0,95	gr.amf. + noe gr.hbl.- (biot.)gn., mid- dels grågrønn - mørk	V,50						
170,80 - 170,95	0,15	gr.hbl.(gl.)gn. Lys	45						
170,95 - 171,05	0,10	gr.hbl.biot.gn. Mørk, båndet	45						
171,05 - 171,50	0,45	gr.hbl.gn. + gr.hbl.(gl.)gn. Lys, småfoldet							
171,50 - 171,65	0,15	gr.hbl.gl.gn. lys	50						
171,65 - 173,00	1,35	gr.(hbl.)gl.gn. Lys,- middelsgrå. Småfoldet. (akse- plan ca. 75 gr., omhyllende har 25 gr. i motsatt retn.)							

Lokalitet: MOFJELL GRUBEFELT

Dato : 1971
 Koordinator : 2468 Ø, 171 S
 Retning :
 Helling/stigning : loddhull
 Høyde : + 207,7 m, o.h.
 Lengde : 330 m

Borehull: 7101

side 9

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
173,00 - 175,35	2,35	gr.gl.gn. (mer biot. enn musk.). Lys, middelsgrå, småfoldet							
175,35 - 175,60	0,25	kvarts							
175,60 - 176,55	0,95	gr.gl.gn. lys, middels grå, småfoldet. (Akseplan ca. 75 gr., omhyllende ca. 25 gr. i motsatt retning)							
176,55 - 177,45	0,90	båndet hbl.biot.-Lyse gl.gn.band i gn. hbl.biot.gn. Småfoldet							
177,45 - 177,60	0,15	gr.gl.gn.							
177,60 - 178,00	0,40	gr.hbl.biot.gn. noe båndet, småfoldet	V,75						
178,00 - 179,70	1,70	gr.gl.gn. mer biot. enn musk. Lys-middelsgrå	V						
179,70 - 180,00	0,30	gr.hbl.gl.gn. lys, småfoldet	V						
180,00 - 180,30	0,30	gr.gl.gn. -"-	V						
180,30 - 180,50	0,20	gr.hbl.gl.gn. -"-	V						
180,50 - 180,90	0,40	gr.gl.gn. " middelsgrå	60						
180,90 - 181,60	0,70	hbl.biot.gn. småfoldet. Akseplan 80°	V						
181,60 - 182,50	0,90	gr.gl.gn. 3 cm. amf. på 181,85 m. Småfoldet	V						

Lokalitet: MOFJELL GRUBEFELT

Dato : 1971

Koordinater : 2468 0, 171 S

Retning :

Helling/stigning : 10ddhull

Høyde : + 207,7 m.o.h.

Borehull: 7101

Lengde : 330 m

side 10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
182,50 - 184,15	1,65	båndet gr.hbl.biot.-gn.	V						
184,15 - 184,75	0,60	gr.gl.gn. Lys, middels-grå	V						
184,75 - 185,40	0,65	gr.hbl.biot.gn.	V,60						
185,40 - 188,50	3,10	gr.gl.gn. lys (like mye biot. som musk.) Småfoldet	V, 0						
188,50 - 188,85	0,35	gr.hbl.gl.gn.							
188,85 - 190,45	1,60	gr.amf. mørk. Rel. fin-kornig, men store gr.($\frac{1}{2}$ cm) Småfoldet. Akseplan 75-80							
190,45 - 193,50	3,05	gl.gn. lys. Spredt litt gr.	60-70						
193,50 - 197,50	4,00	(gr.)gl.gn. Lys. Noe småfoldet	60						
197,50 - 197,65	0,15	gr.biot.(musk.)gn. gr.-rik							
197,65 - 198,20	0,55	gr.musk.(biot.)gn. + gr.gl.gn., lys							
198,20 - 200,00	1,20	ditto, men med mange smale forkastninger og sprekker, for det meste ca. parallell kjerneaksen. Serisittering-muskovittisering.							
200,00 - 200,70	0,70	gr.gl.gn. lys, småfoldet							

Lokalitet: MOFJELL GRUBEFELT

Borehull: 7101

Dato : 1971
Koordinater : 2468 Ø, 171 S
Retning :
Helling/stigning : loddhull
Høyde : + 207,7 m.o.h.
Lengde : 330 m

side 11

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
200,70 - 200,85	0,15	smal forkastning (noen mm) i gr.- gl.gn. og ca. 10° ned kjerneaksen							
200,85 - 202,20	1,35	gr.gl.gn. lys, noe småfol- det	V,70						
202,20 - 202,25	0,05	ditto med smal forkastning (noen mm) 30 gr. med kjerneaksen, S=50° i motsatt retn. Spranget antake- lig lite							
202,25 - 205,50	2,75	gr.gl.gn. Rel. gr.rik. Små- foldet, rundt	0°						
205,50 - 212,85	7,35	gr.gl.gn. lys. Av og til noensmale sprek- ker (fork.) ca. parallell kjerne- aksen, med zeo- litt og idiobl. py. Endel sprek- ker (fork.) også med 35 gr.	V						
212,85 - 212,95	0,10	gr.hbl.biot.gn.							
212,95 - 214,25	1,30	gr.biot.(musk.)gn. Spredt noe hbl.	V						
214,25 - 215,15	0,90	gr.hbl.biot.gn. Mørk	50						
215,15 - 220,20	5,05	gr.gl.gn. Rel. gr.rik. Spredt noe klo- ritt. Fortsatt							

Lokalitet: MOFJELL GRUBEFELT

Dato : 1971
 Koordinater : 2468 Ø, 171 S
 Retning :
 Helling/stigning : loddhull
 Høyde : + 207,7 m.o.h.
 Lengde : 330 m

Borehull: 7101

side 12

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		spredt noen sprekker (fork.) med 0-50 gr. med kjerneaksen, oppfylt med bl.a. zeositt. Småfoldet	V,50						
220,20 - 220,45	0,25	gr.hbl.biot.gn.							
220,45 - 221,60	1,15	gr.gl.gn.	75						
221,60 - 221,75	0,15	gr.hbl.biot.gn.	65						
221,75 - 222,30	0,55	gr.gl.gn. Liten forkastn(30°) på 221,85 m							
222,30 - 223,25	0,95	gr.amf. + gr.hbl.(biot.)gn. Mørk. Noen småforkastninger og sprekker (35 gr.)	70						
223,25 - 225,50	2,25	gr.biot.(musk)-gn. middelsgrå, småfoldet	V						
225,50 - 226,05	0,55	gr.biot.(hbl.)-gn. spor py., middelsgrå							
226,05 - 226,55	0,50	gr.hbl.gl.gn. middelsgrå, sv. py. impr.	70						
226,55 - 226,85	0,30	gr.gl.gn.							
226,85 - 228,40	1,55	gr.amf. + noe gr.hbl.(gl.)-gn. Fink., gr.rik. M. sv. py.-impr.	rundt 0						
228,40 - 228,80	0,40	gr.gl.gn.	20						
228,80 - 230,35	1,55	gr.amf. + noe gr.hbl.gl.gn. Ellers som før	30						

Lokalitet: MØFJELL GRUBEFELT

Dato : 1971

Koordinater : 2468 Ø, 171 S

Retning :

Helling/stigning : loddhull

Høyde : + 207,7 m.o.h.

Lengde : 330 m

Borehull: 7101

side 13

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
230,35 - 232,10	1,75	gr.biot.(musk).- gn. Spredt noe hbl. Sv. py.impr. Småfoldet	V,60						
232,10 - 232,40	0,30	gr.amf. som før	V						
232,40 - 233,65	1,05	gr.gl.gn. middelsgrå (mer biot. enn musk.)	70-80						
233,65 - 235,05	1,40	gr.biot.(hbl.)gn. Middels grå	70						
235,05 - 235,25	0,20	gr.hbl.(biot.)gn.							
235,25 - 235,85	0,60	gr.gl.gn.	V,70						
235,85 - 236,20	0,35	gr.hbl.gl.gn.	60						
236,20 - 237,25	1,05	gr.gl.gn. lys	75						
237,25 - 238,90	1,65	gr.biot.(musk.)gn. Middelsgrå. Noe småfoldet	70						
238,90 - 239,15	0,25	gr.hbl.biot.gn.	65						
239,15 - 242,35	3,20	gr.biot.(musk.)gn. Middelsgrå	70						
242,35 - 244,00	1,65	gr.gl.gn. lys	V						
244,00 - 244,35	0,35	pegm.							
244,35 - 244,90	0,55	gr.gl.gn. lys	70						
244,90 - 245,05	0,15	gr.biot.gn. mørk	70-80						
245,05 - 247,35	2,30	gr.gl.gn. lys. Noen smale gr.biot.bånd på 246,00 m, 246,30 m	70-80						
247,35 - 247,45	0,10	gr.hbl.biot.gn.	70-90						
247,45 - 247,80	0,35	gr.biot.(musk.)gn.	60-90						

Lokalitet: MOFJELL GRUBEFELT

Dato : 1971

Koordinater : 2468 Ø, 171 S

Retning :

Helling/stigning : loddhull

Høyde : + 207,7 m.o.h.

Borehull: 7101

Lengde : 330 m

side 14

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
247,80 - 248,05	0,25	gr.hbl.biot.gn.	80						
248,05 - 248,25	0,20	gr.biot.(musk.)-gn.							
248,25 - 248,45	0,20	gr.hbl.biot.gn.	75						
248,45 - 248,60	0,15	gr.gl.gn. lys							
248,60 - 249,60	1,00	(gr.)musk.(biot.)-gn.	75						
249,60 - 252,00	2,40	gr.gl.gn. lys, noe småfol- det	55						
252,00 - 252,10	0,10	gr.hbl.biot.gn.	55						
252,10 - 256,25	4,15	(gr.)gl.gn. lys, sterkt fol- det	rundt 0						
256,25 - 256,35	0,10	(gr.)biot.hbl.gn.	55						
256,35 - 258,35	2,00	(gr.)gl.gn. lys	55						
258,35 - 260,00	1,65	gr.amf. + gr.hbl.Middels grågrønn. (gl.)gn. Noe båndet, sv. py.impr.	70						
260,00 - 261,40	1,40	(gr.)hbl.biot.gn. Py.impr. Vekslen- de hbl.innh.	75						
261,40 - 261,90	0,50	(gr.)amf. + (gr.)-Sv. py.impr. hbl.(gl.)gn.	70						
261,90 - 262,20	0,30	gr.hbl.gl.gn.							
262,20 - 262,90	0,70	gr.gl.gn. noe båndet (musk) Stauroliitt? Sv. py.impr.	70-75						
262,90 - 264,60	1,70	gr.(hbl.)gl.gn. Sv. py.-impr. Småfoldet	V						

Lokalitet: MOFJELL GRUBEFELT

Dato : 1971
 Koordinator : 2468 Ø, 171 S
 Retning :
 Helling/stigning : loddhull
 Høyde : + 207,7 m.o.h.
 Lengde : 330 m

Borehull: 7101

side 15

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
264,60 - 266,80	2,20	(gr.)stauro litt- gl.gn.	gl.rik, delvis musk.rik, py.- impr. Enkelte spredte striper med malmimpr. (mest sf.)	70					
266,80 - 266,90	0,10	pegm.							
266,90 - 267,15	0,25	gr.gl.gn.	sv. py.impr.						
267,15 - 267,35	0,20	pegm.							
267,35 - 268,80	1,45	gr.hbl.gl.gn.	sv. py.impr.						
268,80 - 268,90	0,10	pegm.							
268,90 - 269,25	0,35	(gr.)gl.gn.	gl.rik, sv. py.- impr. Spor cp.	0,21	0,48	1,11	5,97		
269,25 - 269,50	0,25	god malm	py., prh., sf., cp.(-) i vanlig gangart (med grøn- ne kalksilikater) Foldet (tynn)						
269,50 - 269,90	0,40	hbl.gl.gn.	stripet, m. sv. py.impr.						
269,90 - 271,00	1,10	god, stripet malm	i vanl. gangart med lysegrønne kalksilikater						
271,00 - 271,90	0,90	noen spredte malmstriper	i lys gl.gn., no-						

Lokalitet: MOFJELL GRUBEFELT

Dato : 1971
 Koordinator : 2468 Ø, 171 S
 Retning :
 Helling/stigning : loddhull
 Høyde : + 207,7 m
 Lengde : 330 m

Borehull: 7101

side 16

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
271,90 - 272,50	0,60	malmimpr.	en få smale bånd amf. i (hbl.)gl.gn., foldet	V	0,72	0,44	2,30	5,19	
272,50 - 274,60	2,10	god, stripet malm	i vanl. lys gang- bergart (lys gl.- gn.) med litt kalksilikater (ly- segrønn)	50- 75	1,76	0,13	7,81	7,49	
274,60 - 275,75	1,15	noen spredte malmimpr.	i lys musk.(biot)- og lys gl.gn. Gl.- rik						
275,75 - 275,90	0,15	sprekk (0,5 cm. tykk)	oppfylt med lys materiale og kal- zitt. I gl.gn.	15 ⁰	0,49	0,62	1,29	4,83	
275,90 - 277,50	1,60	spredte prh.cp.- impr.	i lys gl.gn. Del- vis også py. og sf.	60	0,32	0,58	1,09	3,98	
277,50 - 278,05	0,55	middels malm	i lys gl.gn. med en oppfylt 0,5 cm tykk sprekk. S for sprekken = 5 gr.		0,35	0,29	2,72	4,47	
278,05 - 278,75	0,70	gl.gn.	gl.rik, lys (musk. rik), fortsettel- sen av sprekken (forkastning, 0,5 cm. sprang)						

Lokalitet: **MOFJELL GRUBEFELT**

Dato : 1971

Koordinator : 2468 Ø, 171 S

Retning :

Helling/stigning : loddhull

Høyde : + 207,7 m.o.h.

Lengde : 330,95 m

Borehull: 7101

side 17

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
278,75 - 280,00	1,25	god, stripet malm	(god p.g.a. cp.), 60-70) i gl.rik gn.	0,93	0,89	5,02		8,09	
280,00 - 280,45	0,45	gl.gn.	lys						
280,45 - 280,75	0,30	spredte malm- striper	i lys gl.gn.						
280,75 - 281,05	0,30	m. god malm	tildels mye cp., noe prh. i hbl.- (kalksilikat)gn.	0,25	0,48	3,21		5,97	
281,05 - 281,30	0,25	malmimpr.	i lys gl.gn.						
281,30 - 283,60	2,30	gl.gn.	lys, delv. litt gr.						
283,60 - 283,85	0,25	pegm.							
283,85 - 284,00	0,15	gl.gn.							
284,00 - 285,20	1,20	spredte malm- impr. og stri- per	i lys gl.gn. Noen bånd med hbl.	60					
285,20 - 285,55	0,35	biot.gn.	sv. py.-impr. Noe sf.	60					
285,55 - 286,30	0,75	spredte malmstr.	i lys gl.gn.	65					
286,30 - 286,95	0,65	god malm	Rel. py.rik, en- del prh. i vanl.	0,69	0,32	2,24		8,33	

Lokalitet: MOFJELL GRUBEFELT

Dato : 1971
 Koordinator : 2468 Ø, 171 S
 Retning :
 Helling/stigning : loddhull
 Høyde : + 207,7 m.o.h.
 Lengde : 330,95 m

Borehull:

side 18

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
			lysegrønn gang- art.							
286,95 - 288,35	1,40	musk.biot.gn.	spredt noen gr.	60						
288,35 - 290,00	1,65	middels god stri- pet malm	i hbl.gl.gn.	60	}	0,79	0,34	3,51	6,09	
290,00 - 291,55	1,55	m. spredte svake malm-impr.	i gl.gn. Tildels noe graf.							
291,55 - 292,90	1,35	god malm	i vanl., lyse- grønn gangberg- art							
292,90 - 293,50	0,60	middels malmimpr.	i vanl., lyse- grønn gangberg- art							
293,50 - 294,05	0,55	god malm	i vanl., lyse- grønn gangberg- art med hbl.							
294,05 - 294,80	0,75	spredte malmstri- per	i gl.rik gn.		}					
294,80 - 295,05	0,25	god malm	i vanl., lyse- grønn gangberg+							

Lokalitet: MOFJELL GRUBEFELT

Dato : 1971
Koordinater : 2468 Ø, 171 S

Borehull: 7101

Retning :
Helling/stigning : loddhull
Høyde : + 207,7 m.o.h.
Lengde : 330,95 m

side 19

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				0/0 Pb	0/0 Cu	0/0 Zn	0/0 S	0/0 Fe	
		art		0,65	0,36	1,82		6,21	
295,05 - 295,55	0,50	spredte malmimpr. i gl.gn. med noen hbl.band.							
295,55 - 295,70	0,15	middels malm i gl.rik gn., middelsgrå							
295,70 - 296,30	0,60	spredte malmimpr. i gl.rik gn., middelsgrå	80						
296,30 - 298,60	2,30	(gr.)gl.gn. lys, noe småfoldet							
298,60 - 299,10	0,50	(gr.)gl.gn. lys, noe båndet. På 298,60 amf. (3 cm.)	75						
299,10 - 299,25	0,15	kvarts							
299,25 - 299,55	0,30	(gr.)gl.gn. lys							
299,55 - 300,40	0,95	gr.hbl.biot.gn. middels grønn-grå, sv. py.impr.	70						
300,40 - 300,60	0,20	gr.amf.							
300,60 - 301,50	0,90	gr.(hbl.)gl.gn. Noe grafitt? Middelsgrå, sv. py.-impr.	70						300,7
301,50 - 302,35	0,85	gr.gl.gn. sv. py.impr. Noe hbl. (spor graf?) Gl.rik. Noe småfoldet	65						
302,35 - 302,65	0,30	gr.musk.gn.	75						
302,65 - 303,10	0,45	gr.gl.gn. gl.rik.	75						

Lokalitet: MOFJELL GRUBEFELT

Dato : 1971

Koordinater : 2468 Ø, 171 S

Retning :

Helling/stigning : loddhull

Høyde : + 207,7 m.o.h.

Borehull: 7101

Lengde : 330,95 m

side 20

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
303,10 - 303,25	0,15	pegm.							
303,25 - 304,50	1,25	(gr.)biot.- (musk.)gn.	gl.rik, båndet, sv. py.-impr.	75					
304,50 - 304,75	0,25	musk.gn.		75					
304,75 - 305,00	0,25	sv. malm-impr.	lyse sf., py., i gl.rikgn.	75					
305,00 - 305,45	0,45	musk.(biot.)- sk./gn.	m. sv. py.-impr.	80					
305,45 - 305,90	0,45	gr.gl.gn.	gl.rik. Sv. py.- impr.	80					
305,90 - 307,70	1,80	gr.hbl.gl.gn.	middels grønngrå, sv. py.-impr.	70					
307,70 - 308,40	0,70	gr.amf.	lyse grå-grønn	75					
308,40 - 309,20	0,80	gr.gl.gn.	middelsgrå	70					
309,20 - 310,00	0,80	gr.amf.	middels grønngrå. Delvis noe gr.hbl. gl.gn.						
310,00 - 314,60	4,60	gr.amf.	middels mørkegrå- grønn, fink. Noe epid.-zoisitt. In- gen granat hvor amf. er epid.zoi- sitt-rik.	75-80					
314,60 - 314,75	0,15	biot.gn.	middels grå						
314,75 - 319,30	4,55	gr.gl.gn.	lys, noe båndet	80					
319,30 - 319,35	0,05	gr.amf.							
319,35 - 319,60	0,25	gr.gl.gn.	lys	80					

Lokalitet: MOFJELL GRUBEFELT

Borehull: 7101

Dato : 1971
 Koordinator : 2468 Ø, 171 S
 Retning :
 Helling/stigning : loddhull
 Høyde : 207,7 m.o.h.
 Lengde : 330,95 m

side 21

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
319,60 - 327,85	8,25	gr.amf.	mørk, tett, fin- kornet (untatt gr.) Fra 320,20 - 320,60 Noe kloritt (75-85)	80					
327,85 - 330,95	3,10	gr.gl.gn.	gl.rik. Middels grå	85					

1971/72
 A. K.

Lokalitet: Mofjell Grube

Dato : 1970

Koordinater : 72 Ø, 255,5 S

Borehull: 7001

Retning :

Hellingstigning: 90° (lodd)

Høyde : + 80.0 m.o.h.

Lengde : 124.60 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	pegm. med noen str. malmf. gl.gn.	)	0.69	0.61	3.11		6.69	
0.30 - 3.00	2.70	stripet malm i gl.gn.	60)						
3.00 - 3.70	0.70	gl.gn.	60						
3.70 - 12.20	8.50	gr.gl.gn. litt bandet (gr.biot.)	60						
12.20 - 16.40	4.20	gr.musk.(biot).gn. litt småfoldet	55						
16.40 - 16.70	0.30	pegm.							
16.70 - 17.50	0.80	gr.biot.(musk.)gn.	60						
17.50 - 20.70	3.20	gr.musk.(biot).gn.	70						
20.70 - 32.65	11.95	bandet gr.gl.gn.: overveiende gr.gl.gn. med lysere (musk.) og mørkere (biot) band, mot slutten noe mere biot. og	60-80 70 80°						
32.65 - 32.66	0.01	malm sf., py., prh. i biot.sk.	80						
32.66 - 34.70	2.04	biot.(musk.)gn. m. spredt noe prh. Litt pegmatittisk	80-75						
34.70 - 35.70	1.00	gr.gl.gn.	80						
35.70 - 37.30	1.60	biot.(musk.)gn. litt pegmatit-	80						

Lokalitet: Mofjell Grube

Dato : 1970

Koordinater : 72 °, 255,5 S

Retning :

Helling/styring: 90° (lodd)

Borehull: 7001

Høyde : + 80 m.o.h.

Lengde : 124.50 m

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		tisk. M. spredt noe sulfid-impr., delvis også sf., ga., cp. på 36.45							
37.30 - 41.00	3.70	biot.(musk.)- gn. noen pegm.band, del- vis litt gr. og gr.- gl.gn.	50-70						
41.00 - 42.00	1.00	gl.gn.							
42.00 - 42.50	0.50	gr.(hbl.)biot. musk.gn.	30-70						
42.50 - 44.15	1.65	(gr.)gl.gn. vekslende musk./- biot.-innhold	50-60						
44.15 - 44.40	0.25	(gr.)biot.- (musk.)gn. m. sv. py.-impr.	60-80						
44.40 - 45.90	1.50	gl.gn.	60-80						
45.90 - 48.20	2.30	gr.gl.gn. vekslende biot./- musk.innh., delvis gr.biot.(musk.)gn.	60-70						
48.20 - 48.27	0.07	cp., sf(÷)- striper i biot.gn.							
48.27 - 51.40	3.13	gl.gn.+ biot.- (musk.)gn.	60-80						
51.40 - 55.90	4.50	(gr.)gl.gn. veksl. biot./musk.- innhold	60-80						
55.90 - 56.90	1.00	m.spredte malmstriper i biot.(musk.)gn.	V						
56.90 - 58.25	1.35	biot.(musk.)gn.	60						

Lokalitet: Mofjell Grube

Dato : 1970
 Koordinater : 72 0, 255,5 S
 Retning :
 Helling/stigning : 90° (lodd)
 Høyde : + 80 m.o.h.
 Lengde : 124.60 M

Borehull: 7001

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
58.25 - 59.00	0.75	biot.gn. biot.rik, m. sv. prh.-impr.	70						
59.00 - 59.70	0.70	(gr.)biot.(musk) gn.	70						
59.70 - 61.90	2.20	gr.gl.gn.	70						
61.90 - 65.85	3.95	biot.(musk.)gn. m. spredt noe prh- py.-impr.	70						
65.85 - 68.00	2.15	gr.gl.gn.	V						
68.00 - 68.60	0.60	biot.(musk)gn. m. sv. prh.-impr.	70						
68.60 - 69.90	1.30	gr.gl.gn.	75						
69.90 - 70.45	0.55	biot.(musk.)gn. m. sv. prh.(cp.)- impr.							
70.45 - 70.46	0.01	sv. malm-impr.							
70.46 - 73.40	2.96	(gr.)gl.gn.	70						
73.40 - 73.45	0.05	hbl.biot.sk.							
73.45 - 76.10	2.65	biot.(musk.)gn.	75						
76.10 - 92.00	15.90	gr.gl.gn. litt bandet (biot) tildels gr.rik.	70-80						
92.00 - 92.80	0.80	prh., py(÷) og cp(÷)-impr.		0.05	0.36	0.09		9.97	
92.80 - 93.45	0.65	malm sf., py., prh(÷) i biot.gn.	))	0.30	0.49	4.87		11.79	
93.45 - 93.90	0.45	malm i gl.gn.	65)						

Lokalitet: Mofjell Grube

Dato : 1970
 Koordinater : 72 0, 255,5 S
 Retning :
 Helling/stigning : 90° (lodd)
 Høyde : + 80 m.o.h.
 Lengde : 124.60 m

Borehull: 7001

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
93.90 - 95.00	1.10	uregelm. malm-impr.	py., sf., cp., prh.(÷) i gl.gn.	65	0.14	0.60	11.63	8.57	
95.00 - 95.55	0.55	malm	i gl.gn. Py., sf., prh.(÷)	65					
95.55 - 95.80	0.25	god malm	py(+),sf(+), i hbl.gl.gn.		0.14	0.95	3.78	13.62	
95.80 - 96.40	0.60	malm-impr.	i gl.gn. Py.,sf(÷)	60-70	0.02	0.22	0.19	8.28	
96.40 - 97.10	0.70	gr.hbl.gl.gn.		75					
97.10 - 97.40	0.30	pegm.							
97.40 - 98.20	0.80	gr.biot.(musk).gn.		75					
98.20 - 98.55	0.35	gr.amf.							
98.55 - 98.80	0.25	uren marmor		70					
98.80 - 101.00	2.20	gr.hbl.gl.gn.		60-70					
101.00 - 101.10	0.10	malm-impr.	sf., py. i musk. sk.						
101.10 - 101.30	0.20	gr.biot.(musk)gn.							
101.30 - 104.25	2.95	gr.amf.	gr.rik, fin-mid-delsk.	60-80					
104.25 - 104.60	0.35	gr.gl.gn.		60					
104.60 - 105.35	0.75	gr.hbl.biot.gn.		70					
105.35 - 105.75	0.40	gl.gn.		V					
105.75 - 106.05	0.30	hbl.biot.sk/gn.	st.prh.impr.,spor	V					

Lokalitet: Mofjell Grube

Dato : 1970

Koordinater : 72 0, 255.5 S

Retning :

Borehull: 7001

Helling/stigning: 90° (lodd)

Høyde : + 80 m.o.h.

side 5

Lengde : 124.60 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		cp. Småfoldet, mørk.							
106.05 - 106.35	0.30	gr.hbl.gl.gn.	75						
106.35 - 106.80	0.45	hbl.biot.sk/gn. st. prh.-py.- impr. Mørk	75						
106.80 - 107.20	0.40	gr.amf.	80						
107.20 - 107.50	0.30	hbl.gl.gn.							
107.50 - 108.40	0.90	hbl.(biot.)gn. mørk, delvis noe gr.	80						
108.40 - 120.40	12.00	gr.gn. lys, rel.homogen 70-90 og fink., delv. noe gr.og noen få band gr.biot.(musk) gn. Mest	70-90 85						
120.40 - 120.75	0.35	gr.hbl.gl.gn. båndet	75						
120.75 - 121.05	0.30	gr.amf. mørk	75						
121.05 - 121.25	0.20	gr.gl.gn.							
121.25 - 121.70	0.45	gr.amf. mørk	80						
121.70 - 122.80	1.10	gr.gl.gn. rel. gr.rik	80						
122.80 - 123.00	0.20	gr.amf. " " " , mørk							
123.00 - 123.30	0.30	gr.(hbl.)gl.gn. bandet, rel.gr.rik	80						
123.30 - 123.50	0.20	gr.amf. rel.gr.rik. Mørk							
123.50 - 124.50	1.00	gr.hbl.gl.gn. bandet, rel. gr.rik							
124.50 - 124.60	0.10	gr.amf. mørk	80						

5. februar 1971
A.K.

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Dato : 1970
 Koordinator : 72 Ø, 256 S
 Retning : rett syd
 Helling/Retning : 50° S
 Høyde : + 80.0 m.o.h.
 Lengde : 49.40 m

Borehull: 7002

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.25	0.25	tap							
0.25 - 0.45	0.20	pegm.							
0.45 - 2.45	2.00	uregelm. malm-impr.	i bandet gl.gn., gl.rik, vekslende biot.- og musk.- innh. Noe småfoldet, mest 45° py., sf., ga., cp.	0.81	0.58	1.71		4.81	
2.45 - 4.45	2.00	god impr.malm	i gl.rik gl.gn., (biot.musk.gn.) py(+), sf(+), ga, V cp(+), småfoldet 0-45)	1.04	0.59	6.02		11.25	3.5
4.45 - 6.45	2.00	uregelm., av. malm-impr.	i gl.rik (gr.)gl.gn. 40-20 avtakende S, fra 6.00 m 15-0	0.45	0.18	1.34		6.61	6.3
6.45 - 8.50	2.05	ditto	i begynnelsen noe 0-15) cp. og prh., til- takende S, fra 7.00 m 15-40)	0.35	0.29	1.53		7.15	
8.50 - 20.25	11.75	gr.gl.gn.	lys, delvis musk. 30-40 (biot.)gn. Veksl. V gr.innhold. Fra 11.00-20.25 m ca. 0						9.7 15.0 20.0

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Dato : 1970
 Koordinater : 72 Ø, 256 S
 Retning : rett syd
 Helling/stigning : 50° S
 Høyde : + 80.0 m.o.h.
 Lengde : 49.40 m

Borehull: 7002

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
20.25 - 20.35	0.10	st. malm-impr. i gl.gn.	30)	0.57	0.15	1.71		4.20	
20.35 - 21.80	1.45	noen spredte malmstr. og impr. i gl.gn. Gl.ri-kere mot slutten Småfoldet, mye	30-50)						
21.80 - 22.85	1.05	god malm py., sf., ga.(÷), cp.(÷), prh.(÷), i hbl.gl.gn. St. småfoldet	V,) 30?)	1.22	2.59	8.20		11.25	22.5
22.85 - 25.00	2.15	gr.gl.gn. og gr. biot.(musk.)gn. foldebøynning på 24-50 m (0). Et-terpå	30 20						
25.00 - 25.15	0.15	kvarts		1.15	0.66	5.88		6.42	25.0
25.15 - 25.55	0.40	malm i pegm.gneis og biot.(musk.)gn. Ligg-grense	70)						
25.55 - 27.35	1.80	gr.gl.gn. lys	60						27.3
27.35 - 27.75	0.40	kvarts på 27.50 - 27.55 noe ga., py. og sf.							
27.75 - 31.80	4.05	gr.gl.gn. rel. lys mest	55-70 60						32.5
31.80 - 34.25	2.45	gr.hbl.gl.gn. litt bandet:gr. amf.band i gr.hbl.							

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Dato : 1970
 Koordinator : 72 Ø, 256 S
 Retning : rett syd
 Helling/stokk : 50° S
 Høyde : + 80.0 m.o.h.
 Lengde : 49.40 m

Borehull: 7002

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		gl.gn. Sv. py.impr. Til 33.00 m 50-70 Fra 33.00-34.25 30-45							
34.25 - 35.00	0.75	gr.musk.(biot).- gn.	45						34.5
35.00 - 35.05	0.05	god malmstripe							35.0
35.05 - 37.65	2.60	gr.gl.gn. veksl. musk.biot. 55-70 innh.							
37.65 - 37.90	0.25	sv. malm-impr. i gl.gn.	V						37.7
37.90 - 39.20	1.30	gr.biot.gn. sv. py.-impr. Noen V få hbl.rike band. Småfoldet							37.9
39.20 - 40.20	1.00	gr.amf. mest	ca.0						39.9
40.20 - 41.00	0.80	gr.biot.gn. tildels litt hbl. Sv. py.impr. S ø- kende til	10 45						
41.00 - 41.35	0.35	m. sv. malm-impr. i biot.gn.	45-60)						
41.35 - 42.15	0.80	gr.biot.gn. småfoldet	V)						
42.15 - 42.35	0.20	m. sv.malm-impr. i gl.gn.	55)	0.46	0.21	0.25		5.90	
42.35 - 43.20	0.85	gr.biot.(musk.)- gn. lokalt noe hbl. Py.impr. Lokalt noe spredte malm- impr.	65)))))						
43.20 - 44.50	1.30	gr.biot.gn. sv. py.impr. Folde-							44.0

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Borehull: 7002

Dato : 1970
 Koordinator : 72 0, 256 S
 Retning : rett syd
 Helling/stigning : ~~XXXX~~ 50° S
 Høyde : + 80.0 m.o.h.
 Lengde : 49.40 m

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		ombøyning på 44.10 deretter 50 grader, så motsatt 70 gra- der på 44.80 m	0						
44.50 - 47.05	2.55	gr.hbl.biot.gn. Sv. py.-impr.	60-75						45.4
47.05 - 47.25	0.20	pegm.							
47.25 - 49.00	1.75	gr.hbl.(biot.)- Avveksl. gr.hbl.gl.- gn. og gr.amf. Sv. py.-impr. Litt småfoldet	65						47.6
49.00 - 49.40	0.40	gr.biot.gn. litt småfoldet	25-55						

januar 1971

A. K.

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Dato : 1970
 Koordinater : 72 Ø, 255,5 S
 Retning : rett syd
 Helling ~~retning~~ : 75° S
 Høyde : + 80.0 m.o.h.
 Lengde : 89.25 m

Borehull: 7003

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	tap							
0.40 - 1.50	1.10	spredte malm- i biot.gn. str. og impr.	50°	0.90	0.67	1.84		6.53	
1.50 - 2.50	1.00	god impr.malm i biot.(musk).gn.	50						
2.50 - 2.75	0.25	pegm.	)						
2.75 - 3.00	0.25	sv. malm-impr. i biot.(musk.)gn.	)						
3.00 - 3.20	0.20	pegm.	)	0.56	0.19	1.84		5.84	
3.20 - 3.60	0.40	m. sv. malmimpr. i biot.(musk.)- gn. Py.impr.	60						
3.60 - 3.70	0.10	god, stripet i biot.(musk.)gn. malm Ligg	40						
3.70 - 4.80	1.10	gr.musk.(biot)- gn.	60						4.5
4.80 - 10.30	5.50	gr.gl.gn. veksl. musk.- og biot.innh.	40						7.5
10.30 - 10.75	0.45	kvartsittisk (eller pegm.) musk.gn.							10.5
10.75 - 11.20	0.45	gr.musk.(biot)- gn.	60						
11.20 - 12.25	1.05	bandet gr.gl.gn. Litt småfoldet	50						

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Dato : 1970
 Koordinator : 72 Ø, 255,5 S
 Retning : rett syd
 Helling ~~avgang~~ : 75° S
 Høyde : + 80 m.o.h.
 Lengde : 89.25 m

Borehull: 7003

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
12.25 - 14.35	2.10	gr.musk.(biot)-gn.	noen få mørkere biot.rikere band	30-50					12.5
14.35 - 17.75	3.40	gr.gl.gn.	rel. lys. småfoldet	40-60					15.0
17.75 - 18.05	0.30	pegm.							18.5
18.05 - 26.90	8.85	gr.gl.gn.	rel. lys, småfoldet, til 24 m. Fra 24 m	70-80					20.0 22.5 25.0
26.90 - 30.00	3.10	ujevnt malmimpr.	(middelsmalm) i biot.(musk.)gn., lokalt noe gr.og hbl. Rel. gl.rik	80)))	0.34	0.27	2.44	8.77	27.7
30.00 - 32.00	2.00	ujevnt malmimpr.	i biot.(musk)gn. Delvis noe prh. og cp. Noe gr.og hbl. Delvis litt småfoldet. Rel. gl.rik.	80-90) så) 70-80)))	0.27	0.48	1.84	8.36	
32.00 - 34.00	2.00	gr.biot.(musk.)-gn.	Sv. py.-impr., spor malm av og til	80-90))	0.18	0.17	0.24	6.71	
34.00 - 40.00	6.00	gr.biot.(musk.)-gn.	Sv. py.impr. Går over i mye	V, 60-90 80					35.0 37.6 40.0

Lokalitet: **Mofjell Grubefelt vest**

Dato : 1970
 Koordinator : 72 0, 255,5 S
 Retning : rett syd
 Helling/storning : 75° S
 Høyde : + 80 m.o.h.
 Lengde : 89.25 m

Borehull: 7003

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
40.00 - 42.75	2.75	(gr.)gl.gn. rel. gl.rik. Sv. py. impr.							40.5
42.75 - 43.00	0.25	gl.gn. gl.fattigere							
43.00 - 43.05	0.05	uregelm. malm-i gl.gn. impr.							43.0
43.05 - 47.40	4.35	gr.gl.gn. lys, småfoldet.Mye	60-70						45.0
47.40 - 47.45	0.05	py.-impr. i biot.gn.	)						
47.45 - 48.00	0.55	gr.gl.gn.	80)	0.27	0.06	0.37		5.49	
48.00 - 48.80	0.80	py.-impr. + spor malm i gl.gn. Sterkt småfoldet	)						
48.80 - 49.45	0.65	gr.gl.gn. hornblenderik stripe (noen mm). Småfoldet							
49.45 - 52.00	2.55	gl.gn.+ biot- Sv. py.impr. (musk.)gn.	V						49.6
52.00 - 52.70	0.70	gr.gl.gn.							
52.70 - 56.00	3.30	musk.(biot.) gn.	65						
56.00 - 57.60	1.60	gl.gn. tildels sv. py.impr.	65						
57.60 - 58.75	1.15	malmimpr. i gl.gn.	70-80	1.08	0.22	2.12		3.42	
58.75 - 59.25	0.50	gl.gn. tildels noe py.	80						

Lokalitet: Mofjell Grubefelt

Dato : 1970
 Koordinater : 72 0, 255,5 S
 Retning : rett syd
 Helling/~~stigning~~ : 75° S
 Høyde : + 80 m.o.h.
 Lengde : 89.25 m

Borehull: 7003

side 4

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
59.25 - 59.75	0.50	biot.gn.	sv.py.impr.							
59.75 - 62.40	2.65	gl.gn.	lys. M. sv. py.- impr.	70						60.0 62.0
62.40 - 63.00	0.60	m. sv. malmimpr.	i gl.gn.	)						
63.00 - 63.60	0.60	musk.(biot.)gn.		)	0.34	0.22	0.60		3.95	
63.60 - 63.90	0.30	m. sv. malmimpr.	i gl.gn.	)						
63.90 - 66.60	2.70	gl.gn.	delv. litt små- foldet. På 65.85: tynn stripe py., ga. Delvis musk- (biot.)gn.	70-80						65.8
66.60 - 71.70	5.10	biot.(musk.)gn.	gl.rik, delvis biot.musk.gn.Sv. py.impr. Litt småf. Akseplan ca.	70						67.5 70.0
71.70 - 72.30	0.60	pegm.								
72.30 - 76.60	4.30 0	biot.(musk.)gn.	gl.rik, delv. biot.musk.gn.Sv. py., prh.impr. Tildels sp. cp.	70						72.6 75.0
76.60 - 79.15	2.55	(gr.)musk.(biot.)- gn.	gl.rik, delvis musk.biot.gn. Litt småfoldet	70						77.5
79.15 - 82.38	3.23	biot.(musk.)gn.	M. sv. prh.- impr., tildels spor cp. Delvis	75-85						80.0

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Dato : 1970
 Koordinater : 72 °, 255,5 S
 Retning : rett syd
 Helling/storng : 75° S
 Høyde : + 80 m.o.h.
 Lengde : 89.25 m

Borehull: 7003

side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		noe py. og gr. Noe hbl. fra 81.45 - 82.00 m							
82.38 - 82.40	0.02	malmstripe							82.4
82.40 - 82.90	0.50	gr.biot.(musk.)- gn.	80-90						
82.90 - 84.50	1.60	gl.gn.	ca.80						84.4
84.50 - 84.65	0.15	biot.gn.							
84.65 - 85.00	0.35	sv. prh. og ga.- i rel. lys amf. impr.							
85.00 - 85.45	0.45	biot.gn.	80	0.67	0.16	0.37		4.57	
85.45 - 85.60	0.15	sf., py., prh.- impr.	80						
85.60 - 86.00	0.40	biot.gn.	sv. py.impr., spor cp .						
86.00 - 86.20	0.20	kvarts	noe biot. og hbl.	0.11	0.11	0.21		4.11	
86.20 - 86.70	0.50	biot.gn.	sv. py., prh.impr. 80-90 spor cp.						
86.70 - 87.30	0.60	gr.biot.gn.	litt småfoldet						
87.30 - 89.25	1.95	gr.gl.gn.	rel. lys, litt småfoldet. Mot slutten noe biot.- rikere						87.5 89.2

januar 1971
 A. K.

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Dato : 1970
 Koordinator : 72 Ø, 255,5 S
 Retning : rett nord
 Helling/~~retning~~ : 80° N
 Høyde : + 80 m.o.h.
 Lengde : 77.45 m

Borehull: 7004

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.60	2.60	stripet malm	i gl.rik sf., py. 60-70 ga.(+)	0.57	0.29	3.78		8.28	2.7
2.60 - 15.20	12.60	gr.gl.gn.	delv. litt bandet (biot.rikere (60-75) band), lys						5.0
15.20 - 15.90	0.70	gl.gn.	gl.rik, rel. lys. Småfoldet						7.5
15.90 - 20.00	4.10	gr.gl.gn.	rel. lys (55-70)						10.0
20.00 - 20.25	0.25	pegm.							12.5
20.25 - 30.50	10.25	gr.gl.gn.	rel. gl.rik. På 24.30: tynt pegm-bånd + noe prh. og cp. Vekslede musk./biot.innh.						15.7
30.50 - 31.55	1.05	pegmatittisk biot.gn.	31.20-31.25: litt sf. og py.						17.5
31.55 - 33.10	1.55	gr.gl.gn.							19.9
33.10 - 34.70	1.60	(gr.)gl.gn.+(gr.)-biot.(musk.)gn.	M. sv. prh.impr. Spor py. og cp.						22.7
34.70 - 34.85	0.15	stripet malm	sf., prh., py., cp. i hbl.gl.gn. + noe kalksilikat						25.0
34.85 - 36.25	1.40	(gr.)gl.gn.	litt bandet (biot)						27.5
36.25 - 36.34	0.09	malm	sf., py., cp(+) i biot.gn.						30.0

Lokalitet: **Mofjell Grubefelt vest**

Dato : 1970
 Koordinater : 72 0, 255,5 S
 Retning : rett nord
 Helling/~~retning~~ : 80° N
 Høyde : + 80 m.o.h.
 Lengde : 77.45 m

Borehull: 7004

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
36.34 - 37.65	1.31	(gr.)gl.gn.	60						37.2
37.65 - 37.75	0.10	kvarts							
36.75 - 38.00	0.25	biot.(musk.)gn. m. sv.prh.cp.- impr.	60						37.9
38.00 - 38.20	0.20	m. god malm sf(+), py, cp(+)	60						38.0
38.20 - 38.35	0.15	malmimpr. sf., py., prh(+), cp(+) i kalksili- katfels.	65						38.2
38.35 - 44.80	6.45	gr.gl.gn. noe bandet (gr.- biot.gn.-band) (60-80)	65						42.6
44.80 - 44.85	0.05	sv. malm-impr. i gr.biot.gn.							44.8
44.85 - 45.40	0.55	gr.biot.(musk.)- gn.	50						
45.40 - 45.65	0.25	noen malmstr. i biot.gn., sf., py.							45.5
45.65 - 55.10	9.45	gr.gl.gn. litt bandet p.g. a. biotittrikere band med spor sul- fider (overveien- de prh). Str. med sf., py. på 52.28, 54.54, 55.05 m	55-75						47.5
55.10 - 56.75	1.65	gr.gl.gn. rel. gl.rik	75						50.6 52.3 54.1 54.5 55.0
56.75 - 58.00	1.25	gl.gn. litt bandet p.g. a.biot. med spor sulfider	75))	0.05	0.09	0.19		3.16	56.5 57.5

Lokalitet: **Mofjell Grubefelt vest**

Dato : 1970
 Koordinator : 72 Ø, 255,5 S
 Retning : rett nord
 Helling ~~Angitt~~ : 80° N
 Høyde : + 80 m.o.h.
 Lengde : 77.45 m

Borehull: 7004

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
58.00 - 58.35	0.35	impr.av py., prh., i biot.rik gn. cp.	)	0.02	0.52	0.35		7.86	
58.35 - 59.20	0.85	m. sv. prh.cp.impr. i gl.rik gn. 65-80	)						
59.20 - 63.50	4.30	gl.gn. vekslende biot/ musk.innh., litt bandet	70						60.0 62.5
63.50 - 64.10	0.60	gl.gn. rel.gl.rik, sv. py.impr.	70						63.5
64.10 - 64.50	0.40	gl.gn.							
64.50 - 75.05	10.55	gr.biot.(musk.)gn. Noen meget spre- dte, meget sv. py.prh.impr. Del- vis noe (gr.)- gl.gn. S avtak- ende til	70 60						65.0 67.6 70.0 72.5
75.05 - 75.15	0.10	malm-impr. sf., py. i biot.(musk).gn.	60						75.1
75.15 - 77.45	2.30	gr.gl.gn. + gr.- biot.(musk.)gn. litt bandet	60-70						77.2

5. februar 1971
 A. K.

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Borehull: 7005

Dato : 1970
 Koordinater : 72 Ø, 255 S
 Retning : rett nord
 Hellingning : 70° N
 Høyde : + 80.00 m.o.h.
 Lengde : 103.00 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.20	2.20	malm	i biot.(musk.)gn. 80-90						
2.20 - 12.00	9.80	gr.gl.gn.	noen smale, mørke band med gr.biot.-gn., delvis også gr.musk.(biot.)gn.						75
12.00 - 12.15	0.15	gr.amf.							
12.15 - 16.00	3.85	gr.gl.gn.	delvis noe bandet						70-80
16.00 - 22.90	6.90	gr.gl.gn.	gl.rikere enn før. Lys						60
22.90 - 23.20	0.30	pegm.							
23.20 - 25.60	2.40	gr.biot.(musk.) gn.	Rel.gl.rik. Delvis gr.gl.gn.						45
25.60 - 30.00	4.40	gr.gl.gn.	Rel. lys. På 28.20 -28.25: sv. impr. py., prh., cp.						45
30.00 - 36.00	6.00	kjernetap, bare 1 m bevart, hvorav:	0.30 biot.gn., py-impr. og 0.70 gr.-gl.gn.						70
36.00 - 36.25	0.25	malm-impr.	i biot.gn.						80
36.25 - 37.15	0.90	gr.gl.gn.							80
37.15 - 37.35	0.20	prh.cp.impr.	i biot.gn.						60
37.35 - 38.75	1.40	gr.(biot.)musk.-gn.							65
38.75 - 40.80	2.05	gr.gl.gn.							60

Lokalitet: **Mofjell Grubefelt vest**

Dato : 1970
 Koordinator : 72 0, 255 S
 Retning : rett N
 Helling/stigning : 70° N
 Høyde : + 80.00 m
 Lengde : 103.00 m

Borehull: 7005

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
40.80 - 40.90	0.10	malmimpr. prh., sf., cp. i biot.gn.	70						
40.90 - 41.30	0.40	gr.gl.gn.							
41.30 - 42.00	0.70	bandet biot.- (musk.)gn. bandene varierer fra musk.(biot.)- gn. til biot.gn.	60						
42.00 - 42.30	0.30	spredte malmimpr. i ditto. Bandet gr.biot.(musk.)- gn.: prh., sf., cp.	65)						
42.30 - 42.80	0.50	bandet do., gr.- biot.(musk.)gn.	)						
42.80 - 42.84	0.04	gode malmstriper i ditto gn.: sf., prh., cp.	70)	0.11	0.16	0.67		3.77	
42.84 - 43.20	0.36	bandet do. gn.	80)						
43.20 - 43.60	0.40	malmimpr. i do. gn.: sf., prh., cp., py.	)						
43.60 - 45.00	1.40	bandet do. gn.	70	0.07	0.04	0.26		3.08	
45.00 - 45.12	0.12	spredte malmimpr. i do. gn.	)						
45.12 - 45.22	0.10	stripet god malm i do. gn.: sf, py.	70)	0.04	0.15	2.44		5.15	
45.22 - 45.60	0.38	spredte malmimpr. i do. gn.: sf, prh.	)						

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Dato : 1970

Koordinater : 72 Ø, 255 S

Retning : rett N

Borehull: 7005

Helling/~~stigning~~ : 70° N

Høyde : + 80.00 m.o.h.

Lengde : 103.00 m

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
45.60 - 49.20	3.60	bandet gr.biot.- (musk.)gn. ytterst spredt lokalt noe sf., prh.	65)))	0.04	0.8	0.35		3.00	
49.20 - 50.00	0.80	gr.gl.gn.	65						
50.00 - 50.05	0.05	prh.impr. i gl.gn.							
50.05 - 50.90	0.85	gr.gl.gn.							
50.90 - 51.10	0.20	sv. prh.cp.-impr. i biot.gn.							
51.10 - 52.30	1.20	(gr.)gl.gn.	65						
52.30 - 52.55	0.25	god malm i marmor sf(+), py, cp(+)	70)	0.18	0.42	8.69		6.53	
52.55 - 52.85	0.30	malm i lys gn.	70)						
52.85 - 53.48	0.63	(gr.)gl.gn. lys	65						
53.48 - 53.50	0.02	sf., py.-impr.							
53.50 - 60.00	6.50	gr.gl.gn. litt båndet. Til- dels gr.biot.- (musk.)gn.	65						
60.00 - 60.06	0.06	god malm i gl.gn.	)						
60.06 - 60.37	0.31	(gr.)gl.gn.	80.)						

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Dato : 1970
 Koordinator : 72 0, 255 S
 Retning : rett N
 Helling/~~stigning~~ : 70° N
 Høyde : + 80.00 m.o.h.
 Lengde : 103.00 m

Borehull: 7005

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
60.37 - 60.48	0.11	god malm i gl.gn.	75)						
60.48 - 60.75	0.27	gl.gn.	85)						
60.75 - 60.85	0.10	god, stripet malm i gl.gn.	75)						
60.85 - 61.03	0.18	gl.gn.	75)	0.56	0.09	1.84		3.36	
61.03 - 61.16	0.13	malmstr.+ impr. i gl.gn.	)						
61.16 - 61.90	0.74	gl.gn. delvis biot.(musk) gn.	70)						
61.90 - 61.93	0.03	massiv sf.(+), py., prh.	)						
61.93 - 65.30	3.37	gr.biot.(musk)- Delvis gr.biot.- gn. musk.gn.	70						
65.30 - 76.60	11.30	(gr.)gl.gn. veksl. biot.innh., delv. gr.biot.- (musk.)gn., mid- delsgrå	70						
76.60 - 76.65	0.05	sv. malmimpr. i biot.(musk.)gn.							
76.65 - 91.00	14.35	gr.gl.gn. rel.lys, tildels litt båndet p.g.a. biotittrikere bånd	75						
91.00 - 94.00	3.00	(gr.)musk.(biot)-lys gn.	80						
94.00 - 94.70	0.70	malmimpr. sf., py., prh., cp. i gl.gn.	60)	0.66	0.62	0.99		6.69	

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Dato : 1970

Koordinater : 72 Ø, 255 S

Retning : rett N

Helling/stigning : 70° N

Høyde : + 80.00 m.o.h.

Lengde : 103.00 m

Borehull: 7005

side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
94.70 - 95.50	0.80	malm py., sf., cp. i biot.(musk.)gn.	60)	0.04	0.48	2.44		13.69	
95.50 - 96.40	0.90	malm i hbl.gl.gn., rel. lys py., lys sf.	65)	0.34	0.67	4.14		10.40	
96.40 - 96.70	0.30	malm i mørk hbl.biot.gn., py., mørk sf.	)	0.18	0.69	5.79		17.12	
96.70 - 97.05	0.35	gr.gl.gn.	70						
97.05 - 97.83	0.78	gr.hbl.gl.gn.	70-80						
97.83 - 97.85	0.02	malmstripe							
97.85 - 98.00	0.15	gr.gl.gn.							
98.00 - 98.02	0.02	malmstripe							
98.02 - 98.90	0.88	gr.hbl.gl.gn.	85						
98.90 - 99.20	0.30	malm i gl.gn.							
99.20 - 100.00	0.80	gr.hbl.gl.gn. bandet	70						
100.00 - 100.45	0.45	gr.amf. rel. lys, middels- kornet	75						
100.45 - 101.40	0.95	(gr.)amf. mørk, tett, finkor- net	80						
101.40 - 102.00	0.60	gr.hbl.gl.gn.	80						
102.00 - 103.00	1.00	gr.biot.- rel. lys, store gr. (musk.)gn.	70						

januar 1971.

A. K.

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Dato : 1970
 Koordinater : 72 0, 255.0 S
 Retning : rett nord
 Helling ~~tilsvarende~~ : 55° N
 Høyde : + 80.0 m.o.h.
 Lengde : 84.20 m

Borehull: 7006

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	jord limonittisk							
2.00 - 2.15	0.15	sv. malm-impr. i gl.gn.	60°						2.5
2.15 - 8.00	5.85	gr.gl.gn. rel. gl.rik	60-70						5.0
8.00 - 9.85	1.85	gr.musk.(biot.)-gn.	75						7.4
9.85 - 13.70	3.85	gr.gl.gn. rel. lys, delvis litt bandet	70						9.7
13.70 - 14.40	0.70	gr.biot.(musk)-gn.	70						12.5
14.40 - 17.00	2.60	gr.gl.gn.	70						13.9
17.00 - 20.00	3.00	gr.musk.(biot)- småfoldet gn.							16.8
20.00 - 22.45	2.45	gr.gl.gn. foldet							19.5
22.45 - 23.80	1.35	gr.musk.(biot)- gn.							21.4
23.80 - 25.50	1.70	gr.gl.gn. foldet, litt bandet	lite						23.6
25.50 - 27.00	1.50	gr.musk.(biot)- foldet gn.	lite						25.6
27.00 - 30.00	3.00	gr.gl.gn. gl.rik, litt bandet, tildels musk. rik. Småfoldet	30?						28.2
30.00 - 30.45	0.45	(gr.)musk.gn.	40						30.2
30.45 - 37.10	6.65	gr.gl.gn. sv. bandet (biot/musk.)	30-60						32.6
									35.0

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Borehull: 7006

Dato : 1970
 Koordinator : 72 Ø, 255.0 S
 Retning : rett nord
 Helling/storning : 55° N
 Høyde : + 80.00 m.o.h.
 Lengde : 84.20 m

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
37.10 - 38.14	1.04	ditto sv. prh.-, cp.- py.- impr. i de mørkere band	50	0.02	0.14	0.17		3.06	37.0
38.14 - 38.17	0.03	sv. py.Impr. i biot.sk.	60						
38.17 - 38.40	0.23	pegmatittisk gneis		0.63	0.23	3.78		6.87	
38.40 - 38.55	0.15	stripet malm i biot.(musk)gn.	50						
38.55 - 39.60	1.05	pegmatittisk i gl.gn. biot. (musk.)							38.8
39.60 - 40.05	0.45	gl.gn. gl.rik., sv. sulf.- impr.	55	0.23	0.36	0.80		5.18	
40.05 - 40.50	0.45	malm-impr. i biot.gn.	50-60						
40.50 - 40.90	0.40	pegmatittisk sp. sulfider biot.(musk)gn.	55						
40.90 - 41.50	0.60	gr.gl.gn.	55	0.23	0.06	0.34		2.46	
41.50 - 43.00	1.50	m. spredte tyn- biot.(musk.)gn. ne malmstr. i	50-70						
43.00 - 44.40	1.40	gr.gl.gn. litt bandet. Noen m. spredte, m. sv. impr. på 43.25 (2 mm), 43.55 og 43.57 (2 mm), 44.35 - 44.40	50	0.05	0.05	0.26		2.46	

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Dato : 1970
 Koordinater : 72 0, 255 S
 Retning : rett nord
 Helling/Signing : ~~55 grader nord~~
 Høyde : + 80.00 m.o.h.
 Lengde : 84.20 m

Borehull: 7006

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
44.40 - 45.85	1.45	gr.gl.gn.	50-80						
45.85 - 46.00	0.15	sv. malmimpr. i biot.gn.							45.9
46.00 - 52.05	6.05	gr.gl.gn. litt bandet	45-65						40.7
52.05 - 53.30	1.25	(gr.)musk.gn. + (gr.)musk.(biot)gn.	45-55						50.7
53.30 - 53.50	0.20	gr.biot.(musk)-gn. m. sv. py-sf.-impr.	45						52.5
53.50 - 63.95	10.45	gr.gl.gn. litt bandet fra 58.0-60.0 m fra 60 m	55 40 45						53.4
63.95 - 64.35	0.40	gl.gn.	40-55						55.5
64.35 - 64.45	0.10	malmstripe py., sf. i biot.gn.	-55)	0.11	0.04	0.90		2.18	
64.45 - 65.00	0.55	gr.gl.gn. litt småfoldet	)						
65.00 - 66.00	1.00	(gr.)gl.gn. delv. litt sulfidimpr. Noe småfoldet	V 60)	0.05	0.12	0.21		2.81	
66.00 - 66.15	0.15	dårlig stripet malm i gl.gn. Py., sf	60)						
66.15 - 66.27	0.12	massiv malm prh.(+), sf., cp. kalkspat	)	0.23	0.69	4.25		10.39	
66.27 - 66.39	0.12	dårlig stripet malm i gl.gn. Py., sf.	)						

Lokalitet: **Mofjell Grubefelt vest**

Dato : 1970
 Koordinator : 72 Ø, 255 S
 Retning : rett nord
 Helling/stigning: ~~1111~~ 55° N
 Høyde : + 80.0 m.o.h.
 Lengde : 84.20 m

Borehull: **7006**

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
66.39 - 66.54	0.15	rel. massiv malm prh.(+), sf., cp. i gl.gn.	)						
66.54 - 66.64	0.10	dårlig stripet malm i gl.gn.	)						
66.64 - 66.86	0.22	dårl. malmimpr. i marmor: sf., py., ga	)						
66.86 - 67.00	0.14	god malm i kalksilikat- gl.gn.	)						
67.00 - 67.40	0.40	god stripet malm i gl.gn.	55)						
67.40 - 67.80	0.40	biot.(musk.)gn. meget sv. prh.- impr.	60)						
67.80 - 68.75	0.95	gr.gl.gn.	65)	0.07	0.08	0.22		3.23	
68.75 - 68.80	0.05	sv. prh.-cp.impr. i biot.(musk.)- gn.	)						
68.80 - 78.80	10.00	gr.gl.gn. delvis noe ban-40-70 det, delvis litt småfoldet. Mye ca.60.							70.2 72.5 75.0
78.80 - 80.00	1.20	m. spredte impr. med prh.-cp. og delv. sf.-py.- striper i biot.- (musk.)gn.	55)	0.02	0.12	0.07		3.51	77.4
80.00 - 84.20	4.20	gr.gl.gn. litt småfoldet							80.0 82.5 84.2

10. februar 1971
 A. K.

Lokalitet: **Mofjell Grubefelt vest**

Dato : 1970
 Koordinator : 22 V, 232 S
 Retning :
 Helling ~~Angitt~~ : 90° (lodd)
 Høyde : + 63.0 m.o.h.
 Lengde : 53.00 m

Borehull: **7007****side 1**

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.20	4.20	gr.gl.gn. lys. Noe bandet: i begynnelsen med gr. biot.(musk.)gn., senere med gr.musk.-(biot.)gn. I starten 45° tiltakende til 60							
4.20 - 4.50	0.30	pegm.							
4.50 - 8.10	3.60	gr.musk.(biot.) lys. Noe småfoldet gn.	45-60						
8.10 - 14.35	6.25	gr.gl.gn. delvis litt bandet (småle biot.rikere band). Tildels noe småfoldet	50						
14.35 - 15.30	0.95	biot.(musk.)gn. Middelsgrå, m. sv. prh.-py.-impr.							
15.30 - 18.00	2.70	gr.biot.(musk.) Middelsgrå, delvis gn. gr.gl.gn.	70						
18.00 - 22.20	4.20	gr.gl.gn. rel. lys. Delvis noe bandet (biot.) 1 mm prh.py. på 21.68 m. Mot slutten	70						
22.20 - 22.50	0.30	gr.biot.gn. mørk	80						
22.50 - 23.00	0.50	gr. biot(musk).-gn.	75						
23.00 - 23.70	0.70	sv. prh.-py.impr.i biot.(musk.)gn.	80						
23.70 - 25.30	1.60	(gr.)biot.(musk)-Delvis noe (gr.)-gn. gl.gn.	80						

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Dato : 1970
 Koordinater : 22 V, 232 S
 Retning :
 Helling/~~Retning~~ : 90° (lodd)
 Høyde : + 63.0 m.o.h.
 Lengde : 53.00 m

Borehull: 7007

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
25.30 - 26.00	0.70	kjernetap							
26.00 - 26.45	0.45	sv. prh.-py.- i biot.(musk.)gn. (cp.)-impr.	80						
26.45 - 27.05	0.60	(gr.)biot.(musk.)Sprede, m. sv.prh- gn. impr.	80						
27.05 - 31.00	2.95	gr.gl.gn. lys, middelsgrå, S avtakende til ..	80 65						
31.00 - 33.30	2.30	(gr.)biot.- middelsgrå. Meget (musk.)gn. spredte, meget sv. prh.impr. Delvis noe kalksilik.(zoi- sitt?)	70						
33.30 - 35.00	1.70	gr.gl.gn. lys, middelsgrå	75						
35.00 - 35.40	0.40	bandet gr.biot- (musk.)(hbl.)gn.	70						
35.40 - 36.20	0.80	gr.musk.(biot.)- gn.	75						
36.20 - 37.50	1.30	gr.gl.gn.	70						
37.50 - 39.30	1.80	gr.biot.(musk)- Sprede, m.sv.prh. gn. py.-cp.-impr.	70						
39.30 - 41.35	2.05	gr.gl.gn.	70-80						
41.35 - 41.85	0.50	gr.musk.(biot.)- gn.	80						
41.85 - 42.50	0.65	gr.gl.gn. lys	80						
42.50 - 42.85	0.35	gr.musk.(biot.)- gn.	80						

Lokalitet: **Mofjell Grubefelt vest**

Dato : 1970
 Koordinater : 22 V, 232 S
 Retning :
 Helling/~~sign~~ : 90° (lodd)
 Hoyde : + 63.0 m.o.h.
 Lengde : 53.00 m

Borehull: 7007

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
42.85 - 44.10	1.25	gr.gl.gn.	rel. lys						
44.10 - 49.00	4.90	gr.gl.gn.	middelsgrå, litt bandet (biot./- musk.), gr.rik. Tildels noe kalk- silik. (zoisitt?) Noe småfoldet, mye						80
49.00 - 49.15	0.15	kvarts							
49.15 - 49.25	0.10	detalj-fold	i gr.rik biot. (musk.)gn., med i kjernen pegm. + prh., cp						
49.25 - 52.00	2.75	gr.gl.gn.	middelsgrå, veks- lende biot.innh.						80
52.00 - 53.00	1.00	gr.musk.(biot.)- gn.							75

17. februar 1971
 A. K.

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Dato : 1970
 Koordinator : 22 V, 232 S
 Retning : rett N
 Hellingning : 70° N
 Høyde : + 63.0 m.o.h.
 Lengde : 52.50 m

Borehull: 7008

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.25	1.25	jord							
1.25 - 6.45	5.20	grlgl.gn. lys, delv. litt småfoldet	40°						1.7 5.0
6.45 - 6.90	0.45	pegm.							6.7
6.90 - 8.20	1.30	gr.musk.(biot.)-gn.	40						7.5
8.20 - 9.20	1.00	(gr.)musk.gn.	45						8.5
9.20 - 10.00	0.80	gr.musk.(biot.)-gn.							
10.00 - 11.70	1.70	gr.gl.gn. sv. bandet p.g.a. avveksling (gr.)-(biot.)gn. og gr. gl.gn. lys, litt småfoldet	V 35						10.5
11.70 - 11.72	0.02	sv. ga.cp.impr. i gl.gn.							11.7
11.72 - 18.00	8.28	gr.gl.gn. lys, mye	40-60 60						12.5 15.0
18.00 - 20.20	2.20	gr.biot.(musk.)-Rel. lys gn.	60						17.3 19.9
20.20 - 23.00	2.80	(gr.)biot.gn. middels grå	60						22.8
23.00 - 23.50	0.50	gr.biot.(musk.)-gn.	70						
23.50 - 24.60	1.10	gr.gl.gn.	65						
24.60 - 26.25	1.65	gr.biot.(musk.)-gn.	70						25.3
26.25 - 27.75	1.50	(gr.)biot.gn. middels grå, spredte m. sv. prh.impr.	65						27.5

Lokalitet: **Mofjell Grubefelt vest**

Dato : 1970

Koordinater : 22 V, 232 S

Retning : rett N

Borehull: 7008

Helling/stigning: 70° N

Høyde : + 63.0 m.o.h.

Lengde : 52.50 m

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
27.75 - 29.80	2.05	(gr.)biot.(musk.)- gn. Middelsgr,spredte sv. prh.impr. (med delv. spor cp.)	65						29.4
29.80 - 31.35	1.55	gr.gl.gn.							
31.35 - 31.75	0.40	bandet gr.biot.- (musk.)gn.	45						
31.75 - 32.20	0.45	gr.hbl.biot.gn.	40-55						
32.20 - 33.30	1.10	gr.biot.(musk.)gn.	V						32.5
33.30 - 39.00	5.70	gr.biot.(musk.)gn.	V						35.0
39.00 - 40.40	1.40	gl.gn.	50-60						37.5
40.40 - 46.80	6.40	(gr.)gl.gn.	55-65						40.0
46.80 - 47.70	0.90	gr.musk.(biot.)gn.	70						42.8
47.70 - 52.10	4.40	gr.gl.gn.	70						45.2
52.10 - 52.50	0.40	gr.gl.gn.	75						47.2
									50.0

10. februar 1971
A. K.

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Dato : 1970
 Koordinator : 22 V, 232 S
 Retning : rett syd
 Helling ~~tiltning~~ : 70° S
 Høyde : + 63 m.o.h.
 Lengde : 50.00 m

Borehull: 7009

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.45	1.45	gr.gl.gn.	lys						
1.45 - 2.95	1.50	kjernetap							
2.95 - 3.35	0.40	pegm.							3.3
3.35 - 4.30	0.95	gr.gl.gn.	lys						
4.30 - 8.05	3.75	gr.gl.gn.	litt bandet (små- le biot.rikere band. På 7.40 m: 2 cm med noe hbl og kalksilikat.	60 (55-75)					5.0 7.4
8.05 - 8.10	0.05	stripet malm	sf.(+),cp., prh.	75)					
8.10 - 8.95	0.85	gl.gn.		75)					
8.95 - 9.37	0.42	spredt prh.-cp.- impr.	i biot.gn.	)					
9.37 - 9.41	0.04	malm	py., sf. i biot.- gn.	)					
9.41 - 9.65	0.24	biot.(musk.)gn.	noen spredte prh.- cp.impr.	)	0.02	0.27	0.96		4.54
9.65 - 9.85	0.20	stripet malm	py.+ sf i biot.- (musk.)gn.	)					
9.85 - 10.45	0.60	biot.gn.	noen spredte prh. impr., middelsgrå	70)					
10.45 - 10.60	0.15	god malm	i biot.gn.	)					
10.60 - 10.95	0.35	middels gode malm-impr.?	sf., py., ga.(+) spor prh. og cp i	)					

Lokalitet: **Mofjell Grubefelt vest**

Dato : 1970
 Koordinater : 22 V, 232 S
 Retning : rett syd
 Helling/stigning : ~~70°~~ 70° S
 Høyde : + 63 m.o.h.
 Lengde : 50.00 m

Borehull: **7009**

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		i uren marmor (baritt?)							
10.95 - 11.15	0.20	gl.gn.	75						
11.15 - 11.40	0.25	god, stripet malm							
11.40 - 12.10	0.70	noen spredte malm-impr. i biot.(musk.)gn.		0.81	0.40	4.06		8.28	
12.10 - 12.30	0.20	middels god, stripet malm: sf., py., ga.(+), spor prh. og cp. i gl.gn.	60						
12.30 - 20.15	7.85	gr.biot.(musk.)- gn. middelsgrå, delv. noe gr.biot.gn. På 20.15 noen mm prh., cp.	65-70						12.5 15.0 17.5 20.15
20.15 - 25.40	5.25	gr.gl.gn. rel. lys. På 21.15 noe mm prh., cp. Noe kalkspat mellom 21.50 - 21.80 (sideritt). På 22.70: gr.rik med noe prh., cp.	55-80						22.7 25.0
25.40 - 29.00	3.60	gr.biot.(musk.)- gn. + noe gr.gl.gn.	65 (55-75)						27.5
29.00 - 30.10	1.10	gr.gl.gn.	70-80						30.0
30.10 - 30.65	0.55	gr.biot.(musk.)- gn.							
30.65 - 50.00	19.35	gr.gl.gn. litt bandet med gr.	70						

Lokalitet: **Mofjell Grubefelt**

Borehull: **7009**

Dato : 1970
Koordinater : 22 V, 232 S
Retning : rett syd
Helling/~~stigning~~ : 70°S
Høyde : + 63 m.o.h.
Lengde : 50.00 m

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
30.65 - 50.00 forts.		biot.(musk.)gn., men gr.gl.gn. overhersker							32.5
									35.0
									37.4
									40.0
									42.5
									45.3
									47.5
									50.0

11. februar 1970
A. K.

Lokalitet: **Mofjell Grubefelt vest**

Dato : 1970
 Koordinater : 22 V, 232 S
 Retning : rett syd
 Helling/~~stigning~~ : 55° syd
 Høyde : + 63.0 m.o.h.
 Lengde : 60.00 m

Borehull: 7010

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.75	2.75	gr.gl.gn. lys	80						0.8
2.75 - 3.10	0.35	pegm.							
3.10 - 5.30	2.20	gr.gl.gn. lys	75						3.5
5.30 - 7.95	2.65	gr.gl.gn. middels grå, noe biot.rikere	70						7.3
7.95 - 8.35	0.40	biot.(musk.)gn.	65						8.3
8.35 - 10.20	1.85	gr.gl.gn. middelsgrå, litt båndet (biot.-rikere bånd)	75						10.2
10.20 - 10.85	0.65	gl.gn. spredte, m. sv. impr. av prh., py. sf. Litt småfoldet	60)	0.00	0.13	0.16		4.61	
10.85 - 12.25	1.40	stripet malm i gl.gn.:sf., py. cp., ga.(-)	55-70)	0.78	0.42	4.92		6.77	
12.25 - 12.75	0.50	gl.gn. spredte, m. sv. impr. av prh., sf.	)	0.02	0.09	0.28		2.82	
12.75 - 15.15	2.40	gr.gl.gn. rel. lys	60						13.0
15.15 - 15.75	0.60	gl.gn. middels grå, litt pegmatittisk. Litt biot.-rikere	70						15.6
15.75 - 21.30	5.55	gr.gl.gn. rel. lys	70-80						18.6
21.30 - 21.85	0.55	kjernetap							

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Dato : 1970

Koordinater : 22 V, 232 S

Retning : rett syd

Borehull: 7010

Helling/engning: 55° S

Høyde : + 63.0 m.o.h.

Lengde : 60.00 m

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
21.85 - 23.90	2.05	gr.gl.gn.	litt bandet (biot.- 70 rikere)						22.0
23.90 - 24.90	1.00	gl.gn.	delv. biot.(musk.) 60-70 gn. Spredte, m. sv. prh.impr. med spor cp.						24.6
24.90 - 35.15	10.25	gr.gl.gn.	noe bandet: gr.- 65-75 musk.(biot.)gn. Noen tynne str. kalksp. på 26.95, 27.95, 28.40						28.0 30.8 33.8
35.15 - 35.55	0.40	(gr.)biot.- (musk.)gn.	sv. prh.- og py.- impr., spor cp.						35.5
35.55 - 39.40	3.85	gr.gl.gn.	bandet (vekslende 65-75 musk./biot.-innh.)						37.6
39.40 - 40.60	1.20	gr.musk.(biot)- gn.							
40.60 - 42.80	2.20	biot.(musk.)gn.	lokalt noen hbl.- band. Delvis noe grafitt? Litt småfoldet. Sv. py.-impr.						41.5
42.80 - 46.60	3.80	hbl.gl.gn.	lysegrønn hbl. Sv. py.-impr. Delvis V(60) noe prh. Lokalt noe sf. (43.60 - 43.65, 44.28 - 44.34)						43.6
46.60 - 47.70	1.10	(gr.)gl.gn.	gl.rik. M.sv. py.- impr.						55
47.70 - 48.60	0.90	gr.(biot.)- (musk.)gn.	gl.rik. Noe grafitt(?). m. sv. py-						60 48.3

Lokalitet: **Mofjell Grubefelt vest**

Dato : 1970
 Koordinator : 22 V, 232 S
 Retning : rett syd
 Helling/stigning : 55° S
 Høyde : + 63.00 m.o.h.
 Lengde : 60.00 m

Borehull: 7010

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
48.60 - 49.40	0.80	gr.gl.gn. m. sv. py.-impr.	V(70)						49.9
49.40 - 50.05	0.65	gr.musk.(biot.)-gn.							
50.05 - 54.90	4.85	hbl.biot.(musk.)-M.sv. py.impr. gn. Litt småfoldet							52.5
54.90 - 55.50	0.60	biot.(musk.)gn. rel. lys, noe pegmatittisk. Sv. prh.-impr.							55.4
55.50 - 56.00	0.50	hbl.biot.(musk.)-gn.							
56.00 - 56.85	0.85	gl.gn. rel. gl.rik. Litt småfoldet	V (60?)						
56.85 - 57.05	0.20	hbl.gl.gn.							
57.05 - 58.80	1.75	biot.(musk.)gn. delvis gl.gn. Rel. gl.rik., m. sv. py.-impr. Noe gra- fitt? Småfoldet							57.5
58.80 - 60.00	1.20	gl.gn. gl.rik. Middels- grå, m. sv. py.- impr. Noe graf.?							59.6

15. febr. 1971. A.K.

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Dato : 1970
 Koordinator : 22 V, 232 S
 Retning : rett syd
 Helling/stigning : ~~xxxxx~~ 40°
 Høyde : + 63.00 m.o.h.
 Lengde : 76.10 m

Borehull: 7011

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.55	2.55	gr.gl.gn. lys, litt bandet. gr.musk.(biot.)gn.	55-70						
2.55 - 2.95	0.40	pegm.							
2.95 - 3.15	0.20	gr.gl.gn. lys	70						
3.15 - 3.45	0.30	gr.musk.(biot.)- gn.	75						
3.45 - 4.90	1.45	gr.gl.gn. lys	50-70						
4.90 - 5.70	0.80	gr.biot.(musk)-middelsgrå gn.	80						
5.70 - 7.00	1.30	biot.(musk).gn.Middelsgrå, m. sv. og spredte prh.- py.-impr.	V						
7.00 - 8.00	1.00	gr.biot.(musk)- gn.	70						
8.00 - 9.00	1.00	biot.(musk.)gn.Middelsgrå, spredte og m. sv. prh.-py.- impr.	55						
9.00 - 10.00	1.00	gr.biot.(musk)- gn.							
10.00 - 15.55	5.55	biot.(musk.)gn.Spredte og m. sv. + gl.gn. prh.-py.-impr. Del- vis noe gr. Småfol- det. Mye	35-50						
15.55 - 15.65	0.10	stripet malm sf., prh., py. i biot.(musk.)gn.							
15.65 - 19.00	3.35	gr.gl.gn. + middelsgrå, noe gr.biot.(musk)-Noe småfoldet gn.	25-40						

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Dato : 1970
Koordinater : 22 V, 232 S

Borehull: 7011

Retning : rett syd
Helling/streik : 40°
Høyde : + 63.00 m.o.h.
Lengde : 76,10 m

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19.00 - 20.00	1.00	(gr.)biot.(musk.)- gn.	35						
20.00 - 21.50	1.50	(gr.)gl.gn. middelsgrå. S økende til	80						
21.50 - 21.60	0.10	sv. malm-impr. mørk sf., py. i gl.gn.							
21.60 - 24.30	2.70	gl.gn. delv. musk.- (biot.)gn. Til- dels m. sv. py- impr.	45-60						
24.30 - 28.75	4.45	gr.gl.gn. litt bandet (biot/ musk.)	45						
28.75 - 29.10	0.35	(gr.)biot.gn. mørkegrå	45						
29.10 - 30.40	1.30	gr.gl.gn.	45-70						
30.40 - 31.20	0.80	kjernetap							
31.20 - 37.10	5.90	(gr.)gl.gn. middelsgrå, litt småfoldet	45-80						
37.10 - 37.20	0.10	sv. malm-impr. py., mørk sf. i gl.gn. Småfoldet							
37.20 - 37.45	0.25	biot.(musk.)gn. sv. py.-impr.	V						
37.45 - 39.15	1.70	hbl.gl.gn. lysegrønn hbl., sv. py.-impr. Sf., småfoldet	V						
39.15 - 39.40	0.25	sv. malm-impr. i diops.gn.							
39.40 - 40.90	1.50	gl.gn. m. sv. py.-impr.	V						
40.90 - 41.30	0.40	sv. malm-impr. i gl.gn.+ noe kalksilik. (di-							

Lokalitet: Mofjell Grubefelt vest

Borehull: 7011

Dato : 1970
 Koordinator : 22 V, 232 S
 Retning : rett syd
 Helling/~~stigning~~ : 40°
 Høyde : + 63.00 m.o.h.
 Lengde : 76.10 m

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
41.30 - 42.45	1.15	biot.gn. opsid?) middels gråbrun, noe graf.?Småfoldet, mye m. sv. py.-impr.	V,70						
42.45 - 50.00	7.55	gl.gn. delvis noe gr., litt bandet (musk./biot.) M. sv. py.impr. Rel. gl.rik. Foldet fra 46 m. foldet, mye	Lite 60						
50.00 - 50.65	0.65	musk.(biot.)gn. Rel. gl.rik	40						
50.65 - 51.25	0.60	gl.gn. rel. gl.rik, m. sv. py.impr.	30						
51.25 - 52.65	1.40	musk.(biot.)gn. Rel. rik	30						
52.65 - 53.50	0.85	gl.gn. " " m. sv. py.- impr.	V						
53.50 - 55.00	1.50	musk.(biot.)gn. rel. gl.rik	25-35						
55.00 - 55.80	0.80	gl.gn. rel. gl.rik, m. sv. py.-impr.	10-30						
55.80 - 56.90	1.10	musk.(biot.)gn. rel. gl.rik.	25-40						
56.90 - 58.85	1.95	gl.gn. gl.rik	30-55						
58.85 - 59.70	0.85	musk.(biot.)gn. Rel. gl.rik	40-50						
59.70 - 60.40	0.70	gl.gn.	50						
60.40 - 61.85	1.45	musk.(biot.)gn. Tildels noe gl.rik, som før. Småfoldet							
61.85 - 65.50	3.65	gl.gn. tildels noe musk.- (biot.)gn. M. sv. py.-prh.-impr.	30-40						

Lokalitet: **Mofjell Grubefelt vest**

Dato : 1970
 Koordinater : 22 V, 232 S
 Retning : rett syd
 Helling/stigning : 40°
 Høyde : + 63 m.o.h.
 Lengde : 76.10 m

Borehull: 7011

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
65.50 - 65.55	0.05	m. sv. malm-impr.							
65.55 - 66.50	0.95	musk.(biot.gn. Småfoldet	V						
66.50 - 67.10	0.60	gl.gn. som før	35-60						
67.10 - 67.85	0.75	malmstripe (1 mm i musk.(biot.)- sf., py., cp.) på gn. 67.28 og 67.60 m	40-50						
67.85 - 68.40	0.55	gl.gn. som før	40						
68.40 - 68.80	0.40	pegm.							
68.80 - 69.85	1.05	musk.(biot.)gn. tildels noe gl.-	40-50						
69.85 - 76.10	6.25	(gr.)-gl.gn. noe bandet, til- dels (gr.)biot.- (musk.)gn., til- dels m. sv. py.- impr.	40-55						

3. mars 1971
 A. K.

Lokalitet: Mofjell Grube

Dato : 1970

Koordinater : 22 0, 273 S

Retning :

Helling/~~stigning~~ : lodd

Høyde : + 88.6 m.o.h.

Lengde : 31.35 m

Borehull: 207 A - Paksack

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.70	2.70	gr.gl.gn. middelsgrå, delvis sv. py.impr.	V						
2.70 - 2.75	0.05	py., ga.striper i gl.gn.							
2.75 - 3.10	0.35	gr.gl.gn. som ovenfor	80						
3.10 - 3.30	0.20	gl.gn. gl.rik., sv. py.-impr.(graf.?)	80-90						
3.30 - 5.45	2.15	god stripet malm i gl.gn. Gl.rik	80	0.92	0.44	6.16		7.15	
5.45 - 5.60	0.15	gr.musk.(biot.)-gn.	80-90						
5.60 - 6.70	1.10	gl.gn. m. spredt litt malm-impr. Gl.rik	80-90	0.05	0.26	0.43		6.61	
6.70 - 9.30	2.60	gr.gl.gn.	70-80						
9.30 - 10.35	1.05	m. sv. malmimpr. i gl.rik gl.gn., py.-impr., delvis litt gr.	75	0.23	0.18	0.52		7.15	
10.35 - 10.75	0.40	kjernetap							
10.75 - 12.10	1.35	gr.gl.gn. py.impr.Spredt hbl	75	0.20	0.21	0.47		6.08	

Lokalitet: **Mofjell Grube**Dato : 1970
Koordinator : 22 Ø, 273 SBorehull: **207 A - Packsack**Retning :
Helling/~~Stigning~~ : lodd
Høyde : + 88.6 m.o.h.
Lengde : 31.35 m

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
12.10 - 12.35	0.25	malm-impr. i(gl.)gl.gn.(stau-rolitt?)	75	0.46	0.24	0.93		5.36	
12.35 - 13.10	0.75	gr.(hbl.)gl.gn. Spredt malmimpr.	75						
13.10 - 13.30	0.20	god malm i gl.gn. Gl.rik							
13.30 - 13.80	0.50	gr.gl.gn. sv. py.-impr. Litt småfoldet	V						
13.80 - 16.10	2.30	Stripet malm + malmimpr. Litt småfoldet	60	1.95	0.35	6.16		6.25	
16.10 - 18.50	2.40	Spredte malmimpr. Foldet. I starten 60 grader, fra 18.0-18.5 m: 0 grader i gl.gn.		0.41	0.34	1.71		6.08	
18.50- 18.85	0.35	god malm i gl.gn., gl.rik i starten 0 grader, mot slutten 60 grader og glideplan	60°	0.92	0.28	3.19		6.79	
18.85- 19.15	0.30	spredte malm-impr. i gl.-rik gl.gn.	60						
19.15 - 19.20	0.05	sf., cp., prh., i gl.gn. ga.							
19.20 - 20.10	0.90	gl.gn. småfoldet, først 60 grader, fra 19.5 m rundt D	0						
20.10 - 20.50	0.40	malmstripe + impr. i gl.gn. På 21.85 liten glideplan. Småfoldet	V 0-60)						

Lokalitet: **Mofjell Grube**

Dato : 1970
 Koordinator : 22 Ø, 273 S
 Retning :
 Helling/~~stigning~~: lodd
 Høyde : + 88.6 m.o.h.
 Lengde : 31.35 m

Borehull: 207 A - Packsack

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
20.50 - 22.50	2.00	ditto	mye rundt 0°	V	0.85	0.21	3.19	6.79	21.8
22.50 - 24.50	2.00	ditto	mye rundt 0°	V	0.50	0.25	4.59	8.69	24.5
24.50 - 26.50	2.00	ditto	1 hbl.gl.gn. Små- foldet rundt 0 gra- der, mot slutten	V) 40°)	0.50	0.38	4.40	10.11	25.4
26.50 - 27.40	0.90	(gr.)gl.gn.	tynn malmstripe (noen mm) på 27 m	40)	0.21	0.28	0.12	4.27	
27.40 - 27.55	0.15	malmstripe		75)					
27.55 - 29.00	1.45	gl.gn.	rel. lys. Småfol- det, litt gr. lok- alt	0-70					28.0
29.00 - 29.30	0.30	kjernetap							
29.30 - 29.40	0.10	gr.hbl.gl.gn.	rel. lys	30					29.3
29.40 - 30.20	0.80	gl.gn.	lok. litt gr. Del- vis sv. py.-impr.	V, 30-50					30.0
30.20 - 30.30	0.10	malm-impr	1 gl.gn.	60-80					30.2
30.30 - 31.35	1.05	gr. gl. gn.	rel. lys	60-80					31.0

januar 1971
 A. K.

Lokalitet: **Mofjell Grube**Dato : **1970**Koordinater : **22 Ø, 278.5 S**

Retning :

Borehull: **207 B - Packsack**Helling ~~210 gr~~: **lodd**Høyde : **+ 92.6 m.o.h.**Lengde : **38.40 m**

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.95	0.95	gr.gl.gn. rel. lys og gr.-rik	65-70						0.2
0.95 - 1.30	0.35	kjernetap							
1.30 - 1.70	0.40	gr.gl.gn. som før	70						
1.70 - 3.00	1.30	gr.hbl.gl.gn. noe båndet fra gr-(hbl.)gl.gn. til gr.amf. Sv. py.-impr.	80						2.7
3.00 - 4.50	1.50	gr.gl.gn. gl.rik., delvis gr.rik. Sv. py.-impr. Rel. mørk	70-60						
4.50 - 4.75	0.25	malm-impr. i(gr.)(hbl.)biot.-gn.	60	1.06	0.35	1.23		6.84	
4.75 - 6.20	1.45	gr.hbl.gl.gn. sv. py.-impr.	80						
6.20 - 7.45	1.25	gr.gl.gn. gl.rik., rel. mørk M. sv. py.-impr.	80						5.1 7.2
7.45 - 8.45	1.00	sv. malm-impr. i biot.gn. Tildels litt gr	70-50						
8.45 - 8.55	0.10	god malm							
8.55 - 9.00	0.45	gr.biot.(musk)-gn.	75	1.06	0.38	1.23		6.84	
9.00 - 9.35	0.35	spredte malmimpr. i biot.(musk.)gn	75						
9.35 - 9.80	0.45	kjernetap							

Lokalitet: Mofjell Grube

Dato : 1970
 Koordinator : 22 Ø, 278.5 S
 Retning :
 Helling/Signering : ~~XXXX~~ lodd
 Høyde : + 92.6 m.o.h.
 Lengde : 38.40 m

Borehull: 207 B - Paksack

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
9.80 - 10.85	1.05	malm-impr.og striper	1 gl.rik gl.gn. 80-90)	0.36	0.25	1.56		4.99	
10.85 - 13.00	2.15	gr.gl.gn.	rel. gl.rik 75-85						10.9
13.00 - 13.20	0.20	gr.(hbl.)biot.- gn.	85						12.5
13.20 - 19.35	6.15	gr.gl.gn.	rel. gl.rik. Til 14.40 rel. lys, så mørkere. Lokalt noe py. Litt graf 80						15.0
19.35 - 19.85	0.50	stripet malm	småfoldet, i gl.- gn. Litt graf.? V)	0.36	0.17	3.45		6.93	
19.85 - 20.85	1.00	gr.gl.gn.	gl.rik., sv. py.- impr. Noe sf. på 20.70 m. Litt graf.? 60-85)						20.1
20.85 - 21.15	0.30	pegm.	)	0.11	0.16	0.31		6.16	
21.15 - 22.40	1.25	gr.gl.gn.	gl.rik. Noe sf. på 21.30 m., py.-impr. Noe sf. på 22.00 m- 22.10 m. Litt graf? 70-85)						
22.40 - 22.55	0.15	kjernetap	)						
22.55 - 23.70	1.15	gr.hbl.gl.gn.	sv. py.-impr. Små- foldet V)	0.11	0.16	0.31		5.96	22.8
									23.03

Lokalitet: Mofjell Grube

Dato : 1970

Koordinater : 22 Ø, 278,5 S

Borehull: 207 B - Paksack

Retning :

Helling ~~avgraving~~: lodd

Høyde : + 92,6 m.o.h.

Lengde : 38.40 m

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
23.70 - 25.15	1.45	stripet malm på 24.40: 3 cm st-ripe rik på cp. og prh. Litt graf.?	75?)	0.47	1.18	1.99		6.55	24.2
25.15 - 28.45	3.30	gr.gl.gn. m. sv. py.-impr. Småfoldet, gl.rik. Litt graf.?	V						25.2
28.45 - 28.85	0.40	sv.malmimpr. i (gr.)gl.gn., gl.-rik. Småfoldet. Litt graf.?	V)	0.12	0.13	0.38		6.15	
28.85 - 30.20	1.35	gr.gl.gn. gl.rik. Litt graf.?	V						29.9
30.20 - 32.05	1.85	gr.gl.gn. litt bnadet, gl.-rik, ofte musk.rik. Lokalt litt py.-impr.	80						
32.05 - 32.25	0.20	cp., prh., ga.- i kv.feltsp.(kalk-silik?). Grovkor-net gn.	)						
32.25 - 32.55	0.30	kjernetap	)	2.10	2.11	0.19		5.96	
32.55 - 32.65	0.10	cp., prh., ga.- som ovenfor impr.	)						
32.65 - 32.80	0.15	gr.gl.gn. lys	V)						
32.80 - 32.90	0.10	cp., ga., prh.- i gl.gn. impr.	)						

Lokalitet: Mofjell Grube

Dato : 1970
 Koordinator : 22 Ø, 278,5 3
 Retning :
 Helling/stigning : ~~lodd~~ lodd
 Høyde : + 92.6 m.o.h.
 Lengde : 38.40 m

Borehull: 207 B - Paksack

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
32.90 - 33.90	1.00	musk.(biot.)gn.	70)	0.23	0.21	0.49		4.62	
33.90 - 33.95	0.05	malmstripe i biot.gn.	75)						
33.95 - 35.20	1.25	gl.rik	80)						
		gl.rik, rel. mørk	)						
		(graf.?). Sv. py.-	)						
		impr. Småfoldet.	)						
		Malmstripe på no-	)						
		en få mm på 34.60	)						
35.20 - 37.75	2.55	do, noen mm malm- str.på 36.80-37.40	)	0.11	0.17	0.22		3.45	
37.75 - 37.95	0.20	cp., ga., prh.- impr.	)	1.64	0.69	0.49		6.46	
37.95 - 38.40	0.45	gl.gn.	80)	0.46	0.33	0.07		5.00	
		gl.rik, py.-impr.	)						
		mot slutten litt	)						
		malm-impr.	)						

januar 1971
 A.K.

Lokalitet: **Mofjell Grube**

Dato : 1970

Koordinater : **ca. 0 Ø, 280 S**

Retning :

Helling/~~stening~~ : loddHøyde : **ca. + 92.6 m.o.h.**

Lengde : 32.85 m

Borehull: 208 **Packsack****side 1**

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	gr.gl.gn.							
0.40 - 0.80	0.40	(gr.)biot.(musk.)- Sv. py.-impr. gn.							
0.80 - 1.20	0.40	gr.gl.gn.	50°						
1.20 - 1.45	0.25	kjernetap							
1.45 - 2.40	0.95	(gr.)gl.gn. gl.rik	50-60						
2.40 - 2.75	0.35	kvarts							
2.75 - 3.15	0.40	gr.gl.gn.							
3.15 - 3.40	0.25	kjernetap							
3.40 - 4.80	1.40	(gr.)gl.gn. gl.rik. Litt småfoldet	V, 50						
4.80 - 6.05	1.25	middels malm	malm-impr. og striper i gl.gn.						
6.05 - 6.25	0.20	(gr.)gl.gn.							
6.25 - 7.30	1.05	biot.(musk.)gn. st.py.-impr.	70-80						
7.30 - 11.10	3.80	(gr.)gl.gn. veksl. biot.-, musk.- og gr.-innh.	90						
11.10 - 11.35	0.25	kjernetap							
11.35 - 12.80	1.45	(gr.)gl.gn. som før. Av og til sv. py.impr. Litt småfoldet	V						

Lokalitet: Mofjell Grube

Dato : 1970

Koordinater : ca. 0 0, 280 S

Retning :

Borehull: 208 Packsack

Helling/Retning : lodd

Hoyde : ca.+92.6 m.o.h.

Lengde : 32.85 m

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
12.80 - 14.40	1.60	sv.malm-impr. py., sf.(+), cp.(+) i gl.gn. Noe pegm. mellom 13.30-13.70m	V						14.9
14.40 - 17.20	2.80	(gr.)gl.gn. py.-impr., delvis noen striper sf., småfoldet	V,70						
17.20 - 17.35	0.15	pegm.							
17.35 - 17.80	0.45	kjernetap							
17.80 - 17.90	0.10	pegm.							18.2
17.90 - 20.00	2.10	middels malm i gl.gn. Delvis litt hbl.	V						
20.00 - 20.25	0.25	gr.biot.- (musk.)gn. sv. py.-impr.	65)						
20.25 - 20.35	0.10	pegm.	)	0.02	0.30	0.12		5.69	
20.35 - 20.65	0.30	gr.biot.- (musk.)gn. sv. py.-impr.	70)						22.3
20.65 - 21.30	0.65	malm-impr. i biot.(musk.)gn., bra cp.	70)	0.02	1.15	1.70		11.21	
21.30 - 24.40	3.10	gr.biot.- (musk.)gn. sv. py.impr. Lokalt noe staurositt? og hbl.	65-75)	0.0	0.39	0.11		6.65	
			)						

Lokalitet: Mofjell Grube

Dato : 1970
 Koordinator : ca. 0 0, 280 S
 Retning :
 Helling ~~signing~~: lodd
 Høyde : + 92.6 m.o.h.
 Lengde : 32.85 m

Borehull: 208 Packsack

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
24.40 - 24.50	0.10	malm-impr. i (gr.)biot.(musk.) gn.	75)	0.11	0.46	0.24	7.41	25.0	
24.50 - 24.75	0.15	gr.(hbl.)biot.- sv. py.impr. gn.	80)						
24.75 - 25.50	0.75	gr.hbl.biot.gn. Sv. py.impr.	80)						
25.50 - 25.70	0.20	gr.(hbl.)biot.- Sv. py.impr., av- gn. takende hbl.	50)						
25.70 - 25.80	0.10	malm-impr. i (gr.)biot.(musk) gn.	70)	0.00	0.42	0.18	6.27		
25.80 - 26.50	0.70	spredt malm- i (gr.)biot.(musk) impr. gn.	70)						
26.50 - 28.90	2.40	god malm, stri- i biot.hbl.(musk)- V, pet gn. Delvis kalksi-0-90 lik.?	0-90)	0.23	0.75	2.96	10.76	27.5	
28.90 - 29.40	0.50	gl.gn. gl.rik V,0?)							
29.40 - 30.00	0.60	gr.gl.gn. gl.rik V, ca.0)		0.11	0.17	0.10	4.56	30.0	
30.00 - 31.00	1.00	stripet malm i gl.rik gl.gn. V,ca0 mot slutten 80)							
31.00 - 31.65	0.65	gr.gl.gn. gl.rik 70		0.05	0.09	0.09	3.21		
31.65 - 32.85	1.20	malm-impr. i biot.gn. Små-fol-V,0? det, mye rundomkr.0)							
NB. Prøvene 4.80 - 6.05m, 6.05 -									

Lokalitet: **Mofjell Grube**

Borehull: **208 Packsack**

Dato : **1970**
Koordinater : **ca. 0 Ø, 280 S**
Retning :
Helling/stigning : **steile lodd**
Høyde : **+ 92.6 m.o.h.**
Lengde : **32.85 m**

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		7.30 m, 12.80 - 17.20 m, 17.90 - 20.00 m er kommet på avveie (foreløpig).							

Januar 1971

A. K.

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater : ca. 270 Ø, 210 S

Retning : rett N

Helling/stigning: 60 grader

Høyde : 95 m.o.h.

Lengde : 46,05 m

Borhull : 69 - A1

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.35	0.35	kjernetap							
0.35 - 4.70	4.35	gr.hbl.(gl)- py-impr. gn.+hbl.gn.	70-80°						
4.70 - 5.00	0.30	kvarts							
5.00 - 6.50	1.50	gr.hbl.gl.gn. py-impr.							
6.50 - 7.10	0.60	gr.gl.gn. py-impr.							
7.10 - 10.00	2.90	kjernetap							
10.00 - 11.50	1.50	(gr).hbl.gl.- py-impr. gn.	70						
11.50 - 12.00	0.50	gr.amf.							
12.00 - 17.20	5.20	gr.hbl.gl.- py-impr, småfå- gn. det	v-60						
17.20 - 19.80	2.60	gr.(hbl.gl)- py-impr. 18.30- gn. i gr.amf. 18.40:hbl.epid.gn.	V						
19.80 - 20.75	0.95	gr.biot.(musk)-lys, sv.py-impr. gn.	V						
20.75 - 21.25	0.50	malm-impr. småle striper py, sf i biot(musk)(kalk- silikat)gn. Kalksilik. lysegrønn (trem-akt ev. diops.)	80)	0.39	0.21	1.96	7.03		
21.25 - 22.15	0.90	musk(kalksili- py-impr. kat)gn.	)	0.39	0.21	1.96	7.03		

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: 60° N

Høyde :

Lengde : 46.05 m

Borhull : 69 - A 1

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
22.15 - 22.45	0.30	st. malmimpr. lys sf.+ py.i (kalk) gl.gn.	70)						
22.45 - 27.05	4.60	uregelm. malm-Py, lys sf, (ga, cap) impr. i (kalk)gl.gn. Karb-innh. vekslende fra 0 til mye, sv. grønnl.	V) 60-80)	0.28	0.48	1.91	11.45		
27.05 - 27.20	0.15	massiv malm-stripe py(+), sf	)						
27.20 - 29.00	1.80	m. spredt malmimpr. i musk.(biot)gn, sp. karb.	V	0.33	0.22	0.81	3.15		
29.00 - 30.65	1.65	(gr)musk. lys, av og til sp.karb (biot)gn.	70						
30.65 - 30.90	0.25	pegm.							
30.90 - 31.25	0.35	malm-impr. i hbl.gl.gn.	V)						
31.25 - 31.35	0.10	pegm.	)						
31.35 - 32.60	1.25	malm-impr. i striper i musk.- (biot.)gn., litt ka. i malmstriper	)))	1.47	0.33	1.25	5.22		
32.60 - 32.90	0.30	pegm.	)						

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Borhull : 69 - A 1

Helling/stigning : 60 N

Høyde :

Side 3

Lengde : 46.05 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
32.90 - 34.30	1.1.40	St. malm-impr.	i striper og bånd, i musk.(biot)gn. 5 cm tykk, massiv malm på slutten. Litt ka. i malmstr.	80	1.59	0.39	4.98	7.43	
34.30 - 36.90	2.60	(gr)musk.- (biot)gn.		70					
36.90 - 36.95	0.05	malmstriper	i gl.gn.	)					
36.95 - 37.40	0.45	(gr)musk.- (biot).gn.		)					
37.40 - 37.85	0.45	m. st. malm-impr.	py., mørk sf., ga. i gl.gn. Litt ka.	70-) 60)	1.28	0.28	6.05	7.95	
37.85 - 40.00	2.15	(gr.)musk.- (biot).gn.	lys	50					
40.00 - 41.50	1.50	gr.musk.- (biot).gn.		70					
41.50 - 41.60	0.10	st. malm-impr.	py., mørk sf, ga.						
41.60 - 42.15	0.55	lys gl.gn.	enkelte mm.tynne str. med py., sf. (41.78-41.80)(41.98, 42.13 m)						
42.15 - 46.05	3.90	gr.musk.- (biot).gn.	(litt hbl. på 45.3m)	70					

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinator :

Retning :

Helling/sigining : 60° N

Høyde :

Lengde : 46.05 m

Borhull : 69 - A 1

side 4

[illegible]

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - A 2

Dato : 1969

Koordinater : ca. 270 Ø, 210 S

Retning :

Helling/vindretning : 90° (lodd)

Høyde : ca. 95 m.o.h.

Lengde : 30 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.15	3.15	(gr)hbl.(gl.) gn. py-impr.	70°						
3.15 - 4.00	0.85	gr.hbl.gn. store gr. med hvit søm av kv._feltsp.							
4.00 - 7.60	3.60	gr.hbl.gl.- gn. py-impr.	60-70						
7.60 - 10.00	2.40	gr.biot.(musk).-Gl.rik, av og til litt hbl. gn.							
10.00 - 10.50	0.50	gr.hbl.gl.gn. py-impr.	60-70						
10.50 - 10.70	0.20	gr.amf.							
10.70 - 11.95	1.25	gr.hbl.(gl)- gn. py-impr.	60						
11.95 - 12.20	0.25	gr.hbl.gn. gr. + (kv.)feltsp.- rik	80						
12.20 - 13.00	0.80	hbl.(gl.)gn. py-impr., av og til litt gr.	60°						
13.00 - 14.00	1.00	kjernetap							
14.00 - 15.75	1.75	hbl.gn py-impr.	70°						
15.75 - 18.25	2.50	gr.amf.+ gr.- hbl.gl.gn. py-impr.	70						
18.75 - 20.05	1.80	(gr).(hbl).- gl.gn. lys							
20.05 - 20.80	0.75	gr.hbl.gn. py-impr.							
20.80 - 20.90	0.10	malm-impr. py-sf i hbl.gl.gn.	80)						

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Borhull : 69 - A 2

Helling/stigning: 90° (lodd)

Høyde :

Lengde : 30 m

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
20.90 - 21.50	0.60	hbl.gl.gn.	)						
21.50 - 21.85	0.35	sterkt malm- py, sf, ga, cp(÷) i impr. hbl.gl.gn.	)	0.46	0.19	2.14	6.47		
21.85 - 22.30	0.45	musk.gn. lys, sv. py-impr.	80.)						
22.30 - 22.70	0.40	kjernetap							
22.70 - 24.20	1.50	musk.gn. lys, py-impr.	80)	0.04	0.16	0.51	4.97		
24.20 - 25.45	1.25	kjernetap							
25.45 - 26.70	1.25	sv. malmimpr. tildels meget lys sf, py i lys musk. (biot, lys amfibol)gn.	)))	0.16	0.28	1.37	9.49		
26.70 - 26.90	0.20	sterk malm- py, lys sf, ga i lys impr. musk (biot, lys amfi- bol)gn.	)))						
26.90 - 27.60	0.70	musk.(biot). lys, py-impr. gn.	))						
27.60 - 30.00	2.40	kjernetap p.g.a. gjennomslag med gruben ved 30 m.							
				→					

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		fra 20.80 m - 27.60 m = 6.80 m gj.sn.gehalter regnet ut for 6.80 m - kjernetap		0.21	0.22	1.34	7.29		A. K.

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - A 3

Dato : 1969

Koordinater : ca. 270 0, 210 s

Retning : rett syd

Helling/stigning : 70°

Høyde : ca. 95 m.o.h.

Lengde : 31.30 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.05	4.05	gr.hbl.gl.gn. avvekslende innhold av gr, hbl., gl. Delvis nokså lys, (kv.feltsp.rik), py-impr.	50°						
4.05 - 6.00	1.95	(gr)musk, (biot)gn. py-impr	50						
6.00 - 7.40	1.40	gr.hbl.gl.gn. py-impr	50						
7.00 - 8.20	1.20	gr.hbl.gn. sv. py-impr.							
8.20 - 13.30	5.10	gr.hbl.gn. + noen bånd gr.-hbl.gn. Py-inpr., småfoldet	50-75						
13.30 - 14.20	1.10	gr.amf.	70						
14.20 - 19.00	4.80	gr.hbl.(gl.)- gn. py-impr., litt kl.	75						
19.00 - 20.80	1.80	gr.amf. sv. py-impr.	70-50						
20.80 - 22.70	1.90	gr.biot.musk.- (hbl)gn. py-impr.	45						
22.70 - 26.00	3.30	gr.hbl.gl.gn. delvis litt båndet, py-impr.	50-80						
26.00 - 26.10	0.10	st. malmimpr. sf(+), py, ga i hbl. gl.gn.	60)						
26.10 - 27.15	1.05	gr.hbl.gl.gn. py-impr.	)						

Dato : 1969

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde : 31.30 m

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
27.15 - 27.30	0.15	stripet malm	i hbl.gn., sf, py, 50-70 ga	)0.65	0.26	1.21	4.63		
27.30 - 27.65	0.35	malm-impr.	i hbl.gl.gn., småfoldet med aksefall ca. 70 grader.						
27.65 - 28.20	0.55	(gr)gl.gn.	småfoldet, py-impr.	V					
28.20 - 28.60	0.40	pegm.							
28.60 - 29.00	0.40	gl.gn.							
29.00 - 31.30	2.30	(gr)hbl.gl.gn.	småfoldet, py-impr.	V					
A. K.									

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - B 1^a

Dato : 1969
 Koordinater : ca. 360 Ø, 195 S
 Retning : rett nord
 Helling/stigning : 70° N
 Høyde : ca. 100 m.o.h.
 Lengde : 45.50 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.75	5.75	gr.biot.(hbl)- tynne bånd hbl.gn. i gn. gr.biot.gn.	V 60-70						
5.75 - 6.15	0.40	gr.hbl.biot.- litt py-impr. gn.	70						
6.15 - 8.75	2.60	gr.amf. (gr.hbl.gn), litt py-impr.	70						
8.75 - 9.75	1.00	gr.hbl.biot.- gn.+gr.hbl.- (biot)gn., bånd- det.							
9.75 - 10.50	0.75	gr.hbl.(biot)- sv. py-impr. gn.+ gr.amf.							
10.50 - 13.90	3.40	gr.biot.gn. sv. py-impr., småfol- det	V, 70						
13.90 - 17.75	3.85	gr.hbl.gl.gn. sv. py-impr., småfol- + gr.amf. det							
17.75 - 19.10	1.35	gr.biot.(musk)-småfoldet gn.							
19.10 - 20.80	1.70	gr.amf. (+ noen band gr.biot- gn). Sv. py-impr.	V						
20.80 - 22.00	1.20	gr.biot.gn. rel.lys, py-impr.	v,50						
22.00 - 22.50	0.50	gr.hbl.biot.- py-impr. gn.							
22.50 - 27.15	4.65	gr.amf. + amf. noen bånd gr.biot.- hbl.gn., py-impr.	V, 60-80						
27.15 - 27.40	0.25	gr.biot.(hbl)- sv. py-impr. gn.							
27.40 - 27.75.	0.35	musk.gn.							

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Borhull : 69 - B 1^a

Helling/stigning: 70°N

Høyde :

Lengde : 45.50 m

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
27.75 - 28.50	0.75	sv. <u>malm</u> impr. py, lys sf, ga i m. spredte små kluser	80-90						
28.50 - 29.55	1.55	musk.gn. sv. py-impr., spor karb.							
29.55 - 30.05	0.50	musk.(kalksilikat)gn. Litt karb., hbl.gn.-stripe på 29.55-29.57 m, vidre noe aktinolit(?), noen mm-tynn stripe lys sf, ga, cp, prh på 29.70m							
30.05 - 31.00	0.95	middels malm uregelm. og spredte impr. av py, lys sf, ga, cp(+), prh(+), karb. i lys musk, (kalksilikat)gn., (zoisitt, aktinolit)	V) 80-90))))))						
31.00 - 32.00	1.00	dårlig malm uregelm. og spredte impr. i sv. lysegrønn musk.(kalksilikat)gn. Litt karb.	80-90))))	0.29	0.25	1.99	6.12		
32.00 - 32.60	0.60	middels malm do.	80-90)						
32.60 - 33.00	0.40	dårlig malm do.	)						
33.00 - 34.30	1.40	(gr.)musk.- (biot)gn.	70-90	0.06	0.10	0.35	1.13		

Borhull : 69 - B1^a2

Dato : 1969

Koordinator :

Retning :

Helling : 70°N

Høyde :

Lengde : 45.50 m

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
34.30 - 35.35	1.05	dårlig-middels malm	do., som ovenfor	80-90	0.35	0.37	1.98	6.82	
35.35 - 37.50	2.15	god malm	do., men karb.rikere: ka(kalksilikat) gl.gn. Hvor sf. er sammen med cp. og prh er sf. mørk	V	0.36	0.52	4.22	11.77	
37.50 - 38.25	0.75	kjernetap	.						
38.25 - 38.80	0.55	dårlig malm	impr. i musk.gn., spor karb.	80)					
38.80 - 39.55	0.75	god stripet malm	do. som før, mørk sf.	V)	0.96	0.59	3.17	8.48	
39.55 - 39.95	0.40	dårlig malm	impr. i musk.gn., spor karb.	80)					
39.95 - 40.20	0.25	pegm.							
40.20 - 40.65	0.45	m.sv. malm	impr. i musk.gn.	80					
40.65 - 44.40	3.75	(gr)musk.(biot) gn.		80					
44.40 - 44.40	0.10	malm	impr. i musk.gn.						
44.50 - 45.50	1.00	(gr)musk.(biot) gn.		80					

se s. 4

Borhull : 69 - B 1^a

Dato : 1969
Koordinater :
Retning :
Helling/~~veining~~ : 70°N
Høyde :
Lengde : 45.50 m

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		fra 34.30 - 39.95 m = 5.65 m		0.57	0.51	3.38	9.57		
		" 35.35 - 39.95 m = 4.60 m		0.63	0.55	3.76	10.32		
		" 30.05 - 39.95 m = 9.90 m		0.40	0.37	2.50	7.25		
		Kjernetapet fra 37.50 - 38.25 m = 0.75 m, er regnet som malm med samme gehalter som intervallet (35.35-37.50m) + (38.25-39.95m) og (30.09-35.35m) + (38.25- 39.95m)resp.							A. K.

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - B 2

Dato : 1969

Koordinater : Ca 360 Ø, 195 S

Retning : rett syd

Helling/krøning : 70°S

Høyde : ca. + 100 m.o.h.

Lengde : 46.00 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	gr.hbl.gl.gn.							
0.90 - 2.60	1.70	gr.biot.gn. py-impr.	60°						
2.60 - 4.40	1.80	gr.hbl.(gl)-gn. py-impr.	60						
4.40 - 6.00	1.60	gr.(hbl).gl.-gn. py-impr.	60						
6.00 - 8.50	1.50	gr.amf. + gr.-hbl.(gl.)gn. sv. py-impr.	60						
8.50 - 9.05	0.55	gr.biot.gn. py-impr.	60						
9.05 - 11.10	2.05	gr.amf. gr.rik, store hvite sømmer rundt gr.(gr.amf. øye-gneis).	80						
11.10 - 13.00	1.90	gr.amf.	60-70						
13.00 - 14.80	1.80	gr.biot(hbl)-gn. py-impr.	80-90						
14.80 - 16.60	1.80	gr.amf. noen bånd gr.-hbl.(gl.)gn., sv. py-impr., småfoldet.	60-70						
16.60 - 16.75	0.15	Kvarts							
16.75 - 17.20	0.45	gr.hbl.biot.-gn. py-impr, småfoldet							
17.20 - 17.60	0.40	kjernetap							
17.60 - 19.80	2.20	gr.amf. noen bånd py-førende gr.biot.hbl.gn., småfoldet	V						

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Borhull : 69 - B2

Helling/~~stigning~~: 70° S

Høyde :

Lengde : 46.00 m

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19.80 - 21.90	2.10	gr.amf. (gr.amf.øyegneis, gr.rik, hvite søn-mer rundt granatene). Småfoldet	V						
21.90 - 22.50	0.60	gr.biot.gn. py-impr.							
22.50 - 22.70	0.20	gr.hbl.gn. småfoldet, py-impr.	V						
22.70 - 23.70	1.00	gr.amf.							
23.70 - 24.90	1.20	gr.hbl.biot.- py-impr. gn.	V						
24.90 - 25.15	0.25	pegm.							
25.15 - 25.45	0.30	gr.biot.gn. py-impr.							
25.45 - 25.75	0.30	gr.amf.							
25.75 - 26.70	0.95	gr.biot.gn. py-impr., litt hbl.							
26.70 - 27.00	0.30	lys gr.hbl. gl.gn.							
27.00 - 27.50	0.50	gr.hbl.gn. vel lys, småfoldet							
27.50 - 29.10	1.60	gr.musk.(biot)småfoldet, lys gn.	V,60						
29.10 - 31.90	2.80	gr.biot.musk.-py-impr., småfoldet gn.	V,60						
31.90 - 32.10	0.20	sv. <u>malmimpr.</u> py, sf. i biot.(hbl)-gn.							
32.10 - 32.40	0.30	pegm.							

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Borhull : 69 - B 2

Helling/signering: ~~XXXXX~~ 70°S

Høyde :

Lengde : 46.00 m

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
32.40 - 33.50	1.10	biot.(hbl).gn. py-impr.	V,70						
33.50 - 33.90	0.40	sv. malmimpr. i biot.hbl.gn.	V,70						
33.90 - 34.80	0.90	gr.hbl.gl.gn.							
34.80 - 38.30	3.50	gr.gl.gn. litt py-impr., småfoldet							
38.30 - 40.00	1.70	gr.hbl.gl.gn. py-impr., småfoldet.							
40.00 - 40.85	0.85	gr.amf.	V						
40.85 - 40.90	0.05	gr.gn.							
40.90 - 41.05	0.15	massiv malm py, sf, ga	)						
41.05 - 41.75	0.70	gl.gn., småfoldet	V)						
41.75 - 42.05	0.30	massiv malm py, mørk sf, ga.	)						
42.05 - 42.22	0.17	gl.gn.	)	0.89	0.45	2.98	8.94		
42.22 - 42.30	0.08	malm	)						
42.30 - 43.05	0.65	gl.gn. sterkt småfoldet	)						
43.05 - 43.10	0.05	malmstripe antakelig kommer en og samme stripe iggjgen p.g.a. småfoldingen	)						
43.10 - 43.80	0.70	sv. malmimpr. Py, sf, cp., prh i hbl.gl.gn.	)						
43.80 - 46.00	2.20	gl.gn. py-impr.					A.K.		

Lokalitet : Mofjell felt, liggende strosse Oskar

Dato : 1969
 Koordinater : ca. 170 0, 245 S
 Retning :
 Helling/styring : 90° (lodd)
 Høyde : ca. + 75
 Lengde : 32.20 m

Borhull : 69 - D

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	musk.(biot)-gn.	70°						
0.40 - 0.05	0.05	<u>malmimpr.</u> py, sf, i musk.gn.							
0.45 - 2.55	2.10	musk.(biot)-gn.	70°						
2.55 - 2.80	0.25	sv. <u>malmimpr.</u> i musk(biot.)gn., på 2.80m amf.stripe	70)	0.33	0.18	1.02	5.24		
2.80 - 3.50	0.70	biot.musk.gn.	70)						
3.50 - 4.20	0.70	sv. <u>malmimpr.</u> i biot.musk.gn.	70)						
4.20 - 4.55	0.35	god malm py, lys sf, ga(÷) i musk.(biot).gn	60)	0.56	0.19	2.95	7.92		
4.55 - 6.40	1.85	spredt <u>malmimpr.</u> i musk. (biot)gn.	40-70)						
6.40 - 7.25	0.85	dårlig-middels i musk(biot)gn. <u>malmimpr.</u>	V)						
7.25 - 7.45	0.10	god malm <u>impr.</u> i musk.(biot)-gn.	60)	0.71	0.26	2.96	10.74		
7.45 - 7.85	0.40	<u>malmimpr.</u> prh., py, cp, sf(÷) i biot(musk., hbl.)gn.	60-70)						
7.85 - 8.00	0.15	god malm py, sf, ga-impr. i musk.(biot)gn.	)						

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 D

Dato : 1969

Koordinator :

Retning :

Helling/~~Kugling~~: 90° (lodd)

Høyde :

Lengde : 32.20 m

side 2

[illegible]

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater : ca. 145 Ø, 260 S

Retning :

Hellingssvingning : 90° (lodd)

Høyde : ca. 95 m.o.h.

Lengde : 40.70 m

Borhull : 69 - E 1

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.50	5.50	gr.hbl.gl.gn.+ Delvis småfoldet, gr.amf. py-impr.	60-90						
5.50 - 7.50	2.00	gr.biot.(hbl)- py-impr. gn.	V						
7.50 - 10.00	2.50	gr.hbl.biot.gn. Py-impr.	V, 80						
10.00 - 12.10	2.10	(gr)hbl.(biot)- Py-impr gn.	70-80						
12.10 - 13.50	1.40	(gr)musk.biot- Lys gn.	70-80						
13.50 - 14.80	1.30	gr.biot.(musk)- Relativt mørk gn.	80-90						
14.80 - 17.20	2.40	gr.biot.gn. i Py-impr. gr.hbl.gn. +(gr) biot.hbl.gn i avveksling.	V						
17.20 - 17.65	0.45	gr.amf.	80-90						
17.65 - 22.65	5.00	gr.hbl.biot.gn. Noen bånd gr.amf. Py-impr.	60-70						
22.65 - 23.15	0.50	gr.gl.gn.							
23.15 - 23.20	0.05	st. py+prh.- I gl.gn. impr.							
23.20 - 24.25	1.05	gr.musk.(biot). Py+prh.impr. gn. + bånd med (gr).biot.(musk) gn.	70-80						
24.25 - 27.45	3.20	(gr)musk.(biot)-Lys gn.	70						
27.45 - 31.00	3.55	Gr.biot(musk)gn. Rel. mørk, sv.py+	70-80						

Borhull : 69 - E 1

Dato : 1969
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning: 90° (lodd)
Høyde :
Lengde : 40.70 m

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
31.00 - 32.90	1.90	prh.impr. (gr)musk., lys (biot)gn.	70-80						
32.90 - 35.70	2.80	gr.musk.biot- mellomgrå gn.	80						
35.70 - 36.65	0.95	gr.biot.(musk) Sv. py-impr. gn.	80						
36.65 - 36.66	0.01	py+_sf.impr.							
36.66 - 36.80	0.14	gr.biot.- sv. py-impr. (musk).gn.							
36.80 - 36.98	0.18	m._sv._py+sf. i biot.(musk)gn. impr.							
36.98 - 37.00	0.02	st. py+sf.impr.							
37.00 - 37.97	0.97	gr.gl.gn. båndet, avveksl. gr. V musk.(biot).gn. og 70-80 gr.biot.(musk)gn., siste m sv. py-impr.	70-80						
37.97 - 38.04	0.07	st. malm-impr.							
38.04 - 38.20	0.16	sv. malm-impr. i gl.rik gn.							
38.20 - 39.25	1.05	(gr)musk. lys (biot)gn.	V, 60						
39.25 - 40.00	0.75	(gr)musk. mellomgrå, sv. py- V, 70 (biot)gn. impr., småfoldet, med glimmer, para- lell akseplanen.	70						
40.00 - 40.70	0.70	(gr)musk.- lysegrå biot.gn.	80						

A.K.

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - E 2

Dato : 1969
 Koordinater : ca 145 0, 260 S
 Retning : rett syd
 Helling/stigning : 70°
 Høyde : ca 95 m.o.h.
 Lengde : 52.00 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.95	0.95	gr.hbl.gn. + gr.hbl.(gl.) gn.	60°						
0.95 - 5.00	4.05	gr.biot.(hbl) Rel. mørk, py-impr. gn.							
5.00 - 5.10	0.10	gr.hbl.gn.	60-70						
5.10 - 6.60	1.50	gr.hbl.gl.- py-impr. gn.							
6.60 - 7.40 -	0.80	gr.hbl.gn.+ gr.hbl.(gl)gn.							
7.40 - 10.55	3.15	gr.hbl.gl.gn. Noen smale bånd. gr. V,70 amf. Py-impr.							
10.55 - 10.80	0.25	gr.biot.sk. biot.rik, svart, py- 70 impr.							
10.80 - 11.70	0.90	gr.biot.gn.+ gr.hbl.gn. i avveksling							
11.70 - 14.20	2.50	gr. biot.- mellomgrå, sv. py- 60-70 (musk)gn. impr.							
14.20 - 14.30	0.10	gr.hbl.gl. py-impr. gn.							
14.30 - 14.90	0.60	gr.hbl.gn.	70						
14.90 - 14.91	0.01	<u>malmstripe</u> py, ga i pegm.hbl.- feltsp.gn							
14.91 - 15.15	0.24	gr.hbl.gn. sv. py, prh.impr.							
15.15 - 16.10	0.95	gr.biot.musk. sv. py-impr. gn.							

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - E 2

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: 70° S

Høyde :

Lengde : 52.00 m

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
16.10 - 16.40	0.30	gr.hbl.(gl.)- gn. + gr.amf.							
16.40 - 16.80	0.20	gr.hbl.gl.gn. py-impr., småfoldet	V						
16.80 - 18.80	2.00	gr.biot.(hbl). py-impr. gn.	V						
18.80 - 21.05	2.25	gr.biot.- py-impr., mellomgrå (musk).gn.							
21.05 - 23.25	2.20	gr.hbl.gl.- py-impr. gn.	V, 20						
23.25 - 25.70	2.45	gr.hbl.(gl)- py-impr. gn.	60						
25.70 - 26.80	1.10	gr.gl.gn. båndet, avveksl. gr. biot.(musk)gn. og gr.musk.(biot)gn. Py- impr.	60						
26.80 - 27.25	0.45	gr.amf. py-impr.	60						
27.25 - 27.60	0.35	gr.(hbl)- py-impr. biot.gn.	60						
27.60 - 30.05	2.45	gr.musk.(biot) småfoldet gn.	V						
30.05 - 30.80	0.75	pegm.							
30.80 - 32.30	1.50	gr.musk.(biot)- gn.							
32.30 - 32.75	0.45	gr.biot.(hbl).- mørk gn.	70						
32.75 - 33.05	0.30	pegm.							
33.05 - 33.55	0.50	gr.(hbl.)gl.gn.	70						

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinator :

Retning :

Borhull : 69 - E 2

Helling/Helling: 70°S

Høyde :

Lengde : 52.00 m

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				0/0 Pb	0/0 Cu	0/0 Zn	0/0 S	0/0 Fe	
33.55 - 37.00	3.45	gr.musk.(biot)- gn.+py-f. gr.- biot.(musk).gn.	V,70						
37.00 - 37.80	0.80	gr.hbl.biot.gn. py-impr. + gr.amf.							
37.80 - 40.70	2.90	(gr.)musk.- (biot).gn.	70						
40.70 - 41.05	0.35	gr.biot.(musk)- (hbl)gn.	70						
41.05 - 45.40	4.35	(gr.)musk.- (biot).gn.	noen band gr.biot.70-90 (musk).gn. med litt py.						
45.40 - 49.25	3.85	(gr)hbl.(gl)- gn.+ gr.amf.	sv. py-impr.						
49.25 - 50.50	1.25	amf.	py-impr.						
50.50 - 50.70	0.20	gr.hbl.gl.gn.	80						
50.70 - 51.35	0.65	gr.gl.gn.	50						
51.35 - 52.00	0.65	gr.hbl.gl.gn. sv. py-impr.	80						
A.K.									

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater : ca. 170 Ø, 330 S

Retning : rett nord

Borhull : 69 - F 1

Hellingssign : 40°

Høyde : ca. 135 m.o.h.

Lengde : 80.00 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.25	3.25	gr.gl.gn. rel. lysegrå, litt båndet. Senere	50-60 50-40						
3.25 - 3.80	0.55	kjernetap							
3.80 - 5.85	2.05	gr.gl.gn. rel. lys (lysegrå) Småfoldet	V						
5.85 - 7.65	1.80	musk.gn. m. sv. py.-impr. samt noen få, noen mm tykke striper py(spor prh), på 7.50 - 7.53 m: py. + prh.-stripe	50						
7.65 - 9.20	1.55	musk.(biot.)-gn. st. småfoldet	V						
9.20 - 11.40	2.20	(gr.)gl.gn. lokalt litt hbl., tildels musk.rik.	50						
11.40 - 12.25	0.85	gr.biot.(hbl.-musk.)gn.	50						
12.25 - 12.60	0.35	kjernetap							
12.60 - 13.80	1.20	gl.gn. spor kis-impr., spor grafitt?	60						
13.80 - 14.60	0.80	gr.gl.gn.	60						
14.60 - 14.70	0.10	py.-stripe							
14.70 - 18.50	3.80	gl.gn. rel. gl.rik, m. sv. impr. med py. og prh.	V, 60						
18.50 - 19.00	0.50	gr.biot.hbl.gn.	V						

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - F 1

Dato : 1969
 Koordinater : ca. 170 Ø, 330 S
 Retning : rett nord
 Helling/stigning : 40°
 Høyde : ca. 135 m.o.h.
 Lengde : 80.00 m

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19.00 - 19.50	0.50	kjernetap							
19.50 - 20.45	0.95	gr.hbl.biot.gn.	50						
20.45 - 21.65	1.20	gr.hbl.(biot).-gn.	50-60						
21.65 - 22.05	0.40	gr.biot.(hbl).-gn.							
22.05 - 22.35	0.30	kjernetap							
22.35 - 23.60	1.25	gr.hbl.biot.gn. småfoldet, sv. py.-impr.	V						
23.60 - 25.70	2.10	gr.biot.gn. py.impr., avtaker de gr., tiltakende musk.	50						
25.70 - 26.00	0.30	pegm.							
26.00 - 26.25	0.25	gr.hbl.biot.gn.							
26.25 - 26.75	0.50	kjernetap							
26.75 - 27.65	0.90	(gr.)gl.gn. m. sv. py.-impr.	40-50						
27.65 - 27.80	0.15	(gr.)gl.gn. py.-impr.	50						
27.80 - 30.00	2.20	(hbl.)gl.gn. middelsmørk, lys hbl., m. sv. py.-og prh.impr.	50						
30.00 - 31.60	1.60	(gr.)gl.gn.	60						
31.60 - 32.20	0.60	kjernetap							
32.20 - 36.40	4.20	gl.gn. lokalt lite gr., tildels m. sv. py.-prh.impr.	50						
36.40 - 37.25	0.85	gr.biot.gn. litt hbl.	60						

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater : ca. 170 Ø, 330 S

Retning : rett nord

Helling/stigning : 40°

Høyde : ca. 135 m.o.h.

Borhull : 69 - F 1

Lengde : 80.00 m

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
37.25 - 37.65	0.40	gr.amf. mørk							
37.65 - 38.40	0.75	gr.biot. (musk)-gn.							
38.40 - 39.70	1.30	kjernetap							
39.70 - 44.10	4.40	gr.gl.gn. båndet, mot slutten biot.rikere	30-60 45						
44.10 - 50.35	6.25	gr.hbl.biot.gn. vekslende gr.innhold, sv. py.-impr. Småfoldet	40?						
50.35 - 53.30	2.95	gr.biot.(hbl.)-gn. sv. py.-impr.	60						
53.30 - 61.80	8.50	gr.hbl.biot.gn. sv. py.impr. Småfoldet	V						
61.80 - 62.10	0.30	pegm.							
62.10 - 63.00	0.90	gr.hbl.biot.gn. sv. py.-impr.	V						
63.00 - 65.70	2.70	gr.gl.gn.	V						
65.70 - 69.05	3.35	gr.hbl.biot.gn. noen gr.hbl.gn.-striper. Sv. py.-impr.	V 30-50?						
69.05 - 69.40	0.35	hbl.gn.	30-40						
69.40 - 70.50	1.10	gr.hbl.biot.gn. sv. py.-impr.	50						
70.50 - 71.10	0.60	gl.gn.	50						
71.10 - 71.80	0.70	god malm sf(+), py(+), ga, cp(+), prh.(+) i (karb.)-kalksili-	50						
							17.90		

Lokalitet : Morfjell felt

Borhull : 69 - F 1

Dato : 1969
Koordinater : ca. 170 Ø, 330 S
Retning : rett nord
Helling/steining : ~~XXXXX~~ 40°
Høyde : ca. 135 m.o.h.
Lengde : 80.00 m

Side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
71.80 - 80.00	8.20	gr.gl.gn. kat-gneiss	50						A.K.
		rel. lite gr., mot slutten rel. mye musk.							

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater : ca. 170 Ø, 330 S

Retning : rett nord

Borhull : 69 - F 2

Helling/stigning: 58°

Høyde : 135 m.o.h.

Lengde : 80.00 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.25	0.25	jord							
0.25 - 5.90	5.65	gr.gl.gn. rel. lys. I starten senere ..	70° 70-60						
5.90 - 6.00	0.10	py.-striper i gl.gn.	50						
6.00 - 7.90	1.90	gl.gn. litt (bred)båndet	50						
7.90 - 8.95	1.05	(gr.)gl.gn. avtakende gr.	50						
8.95 - 11.10	2.15	biot.gn. sv. py.-impr., mid- dels mørk	50						
11.10 - 17.15	6.05	gl.gn. lokalt litt py.-impr., småbandet: musk.(biot).gn./biot.(musk).gn./gl.-gn.	V, sene- re 60-70						
17.15 - 17.70	0.55	hbl.gl.gn. noen hbl.gn.-bånd i gl.gn.							
17.70 - 18.45	0.75	gr.gl.gn.	70						
18.45 - 19.70	1.25	gr.hbl.biot.gn. Sv. py.impr.	70						
19.70 - 24.40	4.70	(gr.)biot.- (musk.)gn. avtakende gr.	70						
24.40 - 32.60	8.20	gl.gn. sv. py.-(prh.)-impr. Rel. gl.rik.	50-60						
32.60 - 35.90	3.20	(gr.)gl.gn. ennå litt gl.gn. med sv. py.-impr. Mot slutten mer biot.	60						
35.90 - 38.30	4.40	gr.gl.gn. rel. middels mørk,	70						

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - F 2

Dato : 1969

Koordinater : ca. 170 Ø, 330 S

Retning : rett nord

Helling's sign : 58°

Høyde : ca. 135 m.o.h.

Lengde : 80.00 m

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		rel. biot.-rik, sv. py.impr. No- en smale bånd gr.amf.							
38.30 - 38.60	0.30	gr.amf.							
38.60 - 41.25	2.65	gr.gl.gn.	som ovenfor	80-90					
41.25 - 43.25	2.00	gr.musk.gn.	lokalt litt biot.	70					
43.25 - 45.30	2.05	gr.gl.gn.	rel. biot.rik. Sv. py.-impr.	70					
45.30 - 56.40	11.10	gr.hbl.biot.gn.	sv. py.impr. Små- foldet						
56.40 - 58.65	2.25	gr.biot.gn.	Sv. py.impr.						
58.65 - 59.95	1.30	(gr.)musk.gn.	i starten litt biot.						
59.95 - 66.50	6.55	gr.hbl.biot.gn. + gr.hbl.(biot.) gn.	Sv. py.-impr.	60-70					
66.50 - 68.70	2.20	gr.gl.gn.	rel.gl rik, rel. lys	80					
68.70 - 68.85	0.15	sv. malmimpr.	i gl.gn.						
68.85 - 74.24	5.39	gr.gl.gn.	rel. gl.rik.	70					
74.24 - 74.28	0.04	sv. malm-impr.	i gl.gn.						
74.28 - 80.00	5.72	gr.gl.gn.	veksl. biot.innh. Lokalt litt py.- impr.	V					
							A. K.		

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 G

Dato : 1969
 Koordinater : ca. 360 Ø, 290 S
 Retning : rett nord
 Helling ~~XXXX~~ : 50° N
 Høyde : ca. 165 m.o.h.
 Lengde : 60 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	jord (casing)							
0.70 - 8.65	7.95	(gr.)gl.gn. lys, b = m	30°						
8.65 - 10.25	1.60	(gr.)biot.- (musk).gn. middels grå-mørk, rel. gl.rik. Små- foldet							
10.25 - 16.50	6.25	(gr.)gl.gn. småfoldet, litt båndet	30						
16.50 - 20.10	3.60	musk.(biot)- gn. av og til litt gr., lys	40						
20.10 - 30.00	9.90	gl.gn. litt gr., av og til. Vekslede musk.- og biot.- innh.	30-40						
30.00 - 42.30	12.30	do. småfoldet slik at V, S = ca. paralell ca. 0 kjerneakse							
42.30 - 42.90	0.60	hbl.gl.gn. småfoldet, i gjen- nomsnitt	10						
42.90 - 43.10	0.20	m. sv. malm- impr. i gl.gn.							
43.10 - 46.20	3.10	gr.biot.- (musk.)gn. mørk	V, 50-80						
46.20 - 46.35	0.15	(gr.)amf rel. lys	V						
46.35 - 48.20	1.85	gr.biot.- (musk.)gn. rel. mørk, sv. py- impr., småfoldet	V						
48.20 - 48.50	0.30	(gr.)musk.(biot)- gn.	70						

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Borhull : 69 - G

Helling/synings : 50° N

Høyde :

Lengde : 60 m

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
48.50 - 49.70	1.20	gr.amf. mørk, små gr., noen bånd gr.hbl.gl.gn., sv. py-impr., småfollet.	V, 70						
49.70 - 50.00	0.30	(gr.)gl.- gl.rik, py-impr. gn.	70						
50.00 - 50.15	0.15	amf.							
50.15 - 50.85	0.70	gr.biot.- sv. py-impr. (musk)gn.							
50.85 - 51.15	0.30	pegm.							
51.15 - 53.50	2.35	gr.biot.- av og til litt hbl., (musk).gn. py-impr.	V, 60						
53.50 - 54.35	0.85	kvarts							
54.35 - 56.00	1.65	gr.gl.gn. gl.rik., amf.striper på 54.70 - 54.75 m, py- impr.							
56.00 - 56.40	0.40	kjernetap							
56.40 - 56.95	0.55	(gr.)gl.gn sv.båndet: (gr.)biot. gn. + (gr.)musk.gn.	50-60						
56.95 - 57.40	0.45	gr.hbl.gl. st. båndet, py-impr. gn.	50						
57.40 - 58.65	1.25	gr.gl.gn. st. båndet	50-70						
58.65 - 59.25	0.60	gr.amf.							
59.25 - 59.70	0.45	gr.biot.- sv. py-impr. (musk).gn.	70						
59.70 - 59.95	0.25	gr.musk.(biot).gn.	70						
59.95 - 60.00	0.05	gr.amf. båndet					A.K.		

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater : ca. 650 Ø, 240 S

Retning : rett nord

Hellingssving : 40° N

Høyde : ca 150 m.o.h.

Lengde : 118.80 m.

Borhull : 69 - H 1

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	casing							
0.30 - 2.00	1.70	(gr.)gl.gn.	v, 20°						
2.00 - 2.20	0.20	kjernetap							
2.20 - 9.60	7.40	gr.gl.gn. litt småfoldet	v, 20°						
9.60 - 10.85	1.25	pegm.							
10.85 - 11.40	0.55	(gr).biot.- (musk)gn.	30-40						
11.40 - 12.40	1.00	god malm sf, ga, py i gl.gn. S=L, sann mektighet lite	10-20						
12.40 - 12.45	0.05	gl.gn.	30						
12.45 - 13.25	0.80	pegm.							
13.25 - 14.80	1.55	(gr)gl.gn. 1 cm malmimpr. på 13.38 (L=40 grader)	20						
14.80 - 18.50	3.70	(gr)musk.- (biot)gn.	10-20						
18.50 - 18.70	0.20	(gr)gl.gn. py-impr.							
18.70 - 18.80	0.10	malm-impr. i gl.gn. L=S=	10						
18.80 - 20.00	1.20	gr.gl.(hbl)- gn. sv. Py-impr.							
20.00 - 26.40	6.40	gr.hbl.gl.gn. rel. lys, sv. py- impr.	10-40						
26.40 - 26.95	0.45	gr.hbl.gn. rel. lysegrønn	20						
26.95 - 34.70	7.75	gr.hbl.gl.gn. sv. py-impr.	20						

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning : 40° N

Høyde :

Lengde : 118.80 m

Borhull : 69 - H 1

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
34.70 - 35.20	0.50	gr.amf. rel. lys hbl., sv. py-impr.	V, 20						
35.20 - 38.50	3.30	gr.hbl.gl.- sv. py-impr. gn.	V, 20						
38.50 - 40.00	1.50	hbl. gl.gn.- py-impr. (sterkere + hbl.(gl)gn.impr. enn før), rel. lysegrønn hbl.	V, 20						
40.00 - 41.50	1.50	gr.hbl.gl.gn.sv. py-impr.	V, 20						
41.50 - 47.20	6.30	gr.hbl.(gl.) sv. py-impr. gn.	V 20-80						
47.20 - 48.50	1.30	gr.kl.gn. lysegrønn, lokalt litt hbl. og biot.	60-70						
48.50 - 55.00	6.50	gr.hbl.gl.- (delvis gr.hbl.(gl)- gn.), py-impr.	V, 30 ⁰						
55.00 - 59.25	4.25	gr.amf. delvis noe kl. Sv. py- impr.	V						
59.25 - 60.00	0.75	gr.hbl.(gl.) py-impr. gn.	70						
60.00 - 61.60	1.60	gr.amf.+ gr.-sv. py-impr. hbl.(gl.)gn.	60						
61.60 - 67.20	5.60	gr.hbl.gl.gn.Py-impr., noen bånd gr.amf.	40						
67.20 - 68.60	1.40	gr.hbl.(gl)- py-impr. gn.+gr.amf.	V, 40						
68.60 - 70.80	2.20	gr.hbl.gl.gn. py-impr.	V						

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Hellingssvingning : 40° N

Høyde :

Lengde : 118.80 m

Borhull : 69 - H 1

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
70.80 - 74.00	3.20	gr.hbl.(gl.)- py-impr. gn.	V, 40-60						
74.00 - 74.50	0.50	(gr.)musk.- gl.rik, sv. py- (biot).gn. impr.	60						
74.50 - 74.90	0.40	(gr)(hbl.)- sv. py-impr. gl.gn.	60						
74.90 - 78.50	3.60	gr.amf. gr.rik, segregering i smale gr.kv.felt- sp.bånd og hbl.- (-feltsp.)bånd.	60						
78.50 - 85.40	6.90	gr.amf.+gr.hbl.py-impr., litt et- gl.gn.+ gr.hbl.ter hvert mørkere. (gl.)gn.	50-60						
85.40 - 87.05	1.65	gr.amf. store gr.- og gr.- aggregater							
87.05 - 87.50	0.45	epid.amf.							
87.50 - 87.60	0.10	gr.amf.							
87.60 - 88.05	0.45	epid.amf.							
88.05 - 89.30	1.25	gr.amf.							
89.30 - 92.50	3.20	gr.hbl.(gl.)- py-impr. gn.+ gr.amf.- bånd	80-90						
92.50 - 93.00	0.50	gr.hbl.gl.gn. py-impr.	70						
93.00 - 93.35	0.35	(gr.)gl.gn. py-impr.	60						
93.35 - 93.37	0.02	malmstriper mørk. sf, ga, py	70						
93.37 - 94.00	0.63	(gr.)gl.gn. py-impr., gl.rik	70						

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Borhull : 69 - H 1

Helling/strekk: 40° N

Høyde :

Lengde : 118.80 m

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
94.00 - 94.20	0.20	gr.hbl.(gl)-gn.	60						
94.20 - 95.50	1.30	(gr.)gl.(graf)-gn. Delvis litt graf.-førende	V						
95.50 - 98.20	2.70	spor_malmimpr. i musk.(biot)gn.	60-90	0.73	0.25	1.38		5.06	
98.20 - 98.70	0.50	sv. uregelm. malmimpr. py, prh, sf, cp, ga i uren kalkmarmor	)						
98.70 - 100.00	1.30	malmimpr. uregelm. impr. i musk.(biot)gn.	60	0.27	0.33	1.68		5.60	
100.00 - 100.15	0.15	god malm py, mørk sf, ga i gl.gn.	)						
100.15 - 100.25	0.10	malmimpr. i musk.gn.	)						
100.25 - 101.00	0.75	kjernetap							
101.00 - 101.55	0.55	malmimpr. i musk.(biot)gn.	)						
101.55 - 101.80	0.25	malm i uren kalk	)						
101.80 - 102.80	1.00	malmimpr. i musk.gn. (noen pegm.bånd.)	70	0.51	0.30	2.47		5.47	
102.80 - 103.05	0.25	st.malmimpr. i kalksilikat-gl.-gn.	)						

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Borhull : 69 - H 1

Helling, ~~40° N~~ : 40° N

Høyde :

Lengde : 118.80 m

side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
103.05 - 104.80	1.75	gr.musk.(biot)- gn.	V, 70						
104.80 - 105.00	0.20	malmimpr. py, prh, sf, cp i (ka, kalksilikat) gl.gn.							
105.00 - 105.80	0.80	musk.(biot)- gn.	V						
105.80 - 106.20	0.40	st. malmimpr. prh, cp, py, sf, ga	50-60						
106.20 - 107.00	0.80	(gr)musk.(biot) gn.	50						
107.00 - 107.25	0.25	m. sv. prh, cp- i gl.gn. (samme impr. stripe som lenger oppe?)							
107.25 - 112.80	5.55	(gr)musk.- litt båndet (biot)gn.	50-60						
112.80 - 113.15	0.25	malmimpr. i musk.gn.	50						
113.15 - 114.20	1.05	musk.biot.gn.	50						
114.20 - 114.25	0.05	st. malmimpr. i gl.gn.							
114.25 - 118.45	4.20	gr.musk.(biot) Lett båndet, små- gn. foldet	V, 60-70						
118.45 - 118.50	0.05	gr.amf.							
118.50 - 118.80	0.30	gr.musk(biot).gn.	70						
		fra 95.50 - 100.25 m = 4.75 m							
	+	" 98.20 - 103.05 m = 4.85 m							
	+	" 95.50 - 103.05 m = 7.55 m							
		+ kjernetapet tatt som gjennomsnitt av							

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - H 1

Dato : 1969

Koordinator :

Retning :

Helling/aligning: 40°N

Høyde :

Lengde : 118.80 m

Side 6

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		(98.20 - 100.25) + (101.00 - 103.05) og (95.50 - 100.25) + (101.00 - 103.05) resp.							A. K.

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969
 Koordinater : ca. 650 Ø, 240 S
 Retning : rett nord
 Helling/stigning : 79°N
 Høyde : ca. 150 m.o.h.
 Lengde : 86.50 m

Borhull : 69 - H 2

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.25	0.25	casing							
0.25 - 1.25	1.00	gl.gn.	50°						
1.25 - 8.50	7.25	gr.musk.(biot)- litt båndet gn.	50-60						
8.50 - 8.75	0.25	<u>malmimpr.</u> i biot.(musk.)gn.	50						
8.75 - 10.30	1.55	gr.gl.gn. avveksl. gr.musk. (biot)gn. og gr.-biot.(musk.)gn.	50						
10.30 - 10.75	0.45	gr.hbl.gl.gn. sv. py-impr., små foldet	V 50°						
10.75 - 11.30	0.55	gr.biot.(musk)-gn.							
11.30 - 15.35	4.05	(gr.)musk.(biot) Py-striper (0.5 cm) på 12-38 gn.	50						
15.35 - 15.40	0.05	sv. malmimpr. i musk.(biot).gn.							
15.40 - 15.80	0.40	(gr.)musk.(biot)-gn.							
15.80 - 16.15	0.35	sv. malmimpr. i gl.gn. sf, gn	50						
16.15 - 16.25	0.10	st. malmimpr. py, mørk sf, ga	50						
16.25 - 16.75	0.50	(gr.)musk.- (biot.)gn.							
16.75 - 18.40	1.65	(gr.)biot.- sv. py-impr. (musk)gn.	50-70						
18.40 - 18.50	0.10	musk.(biot)gn.	80						
18.50 - 18.70	0.20	pegm.							
18.70 - 19.10	0.40	(gr)biot.(musk)-gn.							

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Borhull : 69 - H 2

Hellingssving : 79°N

Høyde :

Lengde : 86.50 m

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19.10 - 19.20	0.10	pegm.							
19.20 - 24.50	5.30	(gr.)biot.- sp. hbl., sv. py- (musk.)gn. impr., småfoldet							
24.50 - 26.50	2.00	gr.hbl.gl.gn.	60						
26.50 - 28.65	2.15	gr.biot.(musk)Sv. py-impr. gn.	60						
28.65 - 29.20	0.55	gr.hbl.(gl.)- gn.							
29.20 - 30.40	1.20	gr.musk.(biot)- lys gn.	V						
30.40 - 31.00	0.60	pegm.							
31.00 - 31.70	0.70	gr.musk.(biot)- gn.	60-80						
31.70 - 32.80	1.10	gr.biot.(musk)- litt hbl. mot slut- gn. ten	80-90						
32.80 - 33.00	0.20	pegm.							
33.00 - 33.90	0.90	gr.hbl.gl.gn. småfoldet, sv. py- impr.	70						
33.90 - 34.15	0.25	pegm.							
34.15 - 39.90	5.55	gr.hbl.gl.gn. sv. py-impr., små- foldet							
39.70 - 40.30	0.60	gr.amf. segregering av gr. + kv + feltsp. i bånd, og hbl. + feltsp. i bånd	V						

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Borhull : 69 - H 2

Helling/~~stigning~~ : 79°N

Høyde :

Side 3

Lengde : 86.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
40.30 - 40.70	0.40	gr.hbl.gl.gn. sv. py-impr.	V						
40.70 - 41.05	0.35	gr.amf. gr.rik, rel. lys, se- gregering.	V						
41.05 - 46.25	5.20	gr.hbl.gl.gn. sv. py-impr., små- foldet	V, 60						
46.25 - 47.30	1.05	gr.amf. mørk, tett, store gr.	60-70						
47.30 - 49.40	2.10	gr.hbl.gl.gn. sv. py-impr.	70-80						
49.40 - 49.65	0.25	pegm. litt py, ga på 49.60							
49.65 - 50.90	1.25	gr.hbl.gl.gn. avtakende hbl.	80						
50.90 - 51.00	0.10	kvarts							
51.00 - 52.50	1.50	gr.gl.gn.	80						
52.50 - 52.60	0.10	kvarts							
52.60 - 54.05	1.45	gr.gl.gn. småfoldet	V						
54.05 - 54.20	0.15	kvarts							
54.20 - 56.05	1.85	gr.gl.gn. småfoldet	50-80						
56.05 - 56.85	0.80	gr.amf. rel.lys							
56.85 - 59.65	2.80	gr.hbl.gl.gn. py-impr., småfoldet	80						
59.65 - 59.85	0.20	pegm.							
59.85 - 61.40	1.55	gr.hbl.(gl.)- py-impr. gn.	V						
61.40 - 65.70	4.30	gr.hbl.gl.gn. py-impr.	80						
65.70 - 66.00	0.30	tap							

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning : 79° N

Høyde :

Lengde : 86.50 m

Borhull : 69 - H 2

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
66.00 - 67.00	1.00	tap, bare 7 cm. gr.hbl.gl.gn., py-impr.							
67.00 - 68.00	1.00	tap, bare 18 cm. gr.hbl., py-impr.							
68.00 - 73.55	5.55	gr.hbl.gl.gn. py-impr.	70						
73.55 - 74.00	0.45	hbl.kl.epid- gn. py-impr., bleking og klorittisering p.g.a. sprekk (for- kastning?), vin- kel 10 gr.kjerne- akse							
74.00 - 76.70	2.70	gr.amf. mørk, småfoldet	V,80						
76.70 - 78.10	1.40	gr.hbl.gl.gn. båndet	80						
78.10 - 78.60	0.50	gr.amf.							
78.60 - 80.35	1.75	gr.hbl.gl.gn. båndet	50-60						
80.35 - 81.40	1.05	gr.biot.(musk)- gn. py-impr.	60						
81.40 - 81.80	0.40	pegm.							
81.80 - 82.10	0.30	gr.hbl.gl.gn.							
82.10 - 82.75	0.65	gr.amf. mørk	60						
82.75 - 85.05	2.30	gr.hbl.gl.gn.	70						
85.05 - 85.50	0.45	gr.amf. noe biot.	70						
85.50 - 85.80	0.30	gr.hbl.gl.gn.	70						
85.80 - 86.30	0.50	hbl.kl.epid.- (pseufobreksje) bleking og for- vandling p.g.a. sprekk (forkast- ning?), vinkel							

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Borhull : 69 - H 2

Helling/stigning : 79° N

Høyde :

Lengde : 86.50 m

side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
86.30 - 86.50	0.20	gr.amf. med kjerneakse 30 - 0	70						A.K

magnetiske og elektro-magnetiske indikationer


 magnetisch maximum } tall: 8
 " minimum

meget svak	elektromagnetisk induksjon			
svak		11	11	11 NG
sterk		11	11	11 196

område mält magnetisk
" " elektro-magnetisk.

malmskjerp
malmutgåenl

A. v.



Lokalitet : Mofjell Felt

Dato : 1969

Koordinater : ca. 2965 0, 55 S

Retning : rett S

Borhull : 69 - 2

Helling/retning : 35°

Høyde : ca. 185 m.o.h.

Lengde : 93.00 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.85	0.85	jord							
0.85 - 2.00	1.15	gr.hbl.gn.	50-60°						
2.00 - 4.50	2.50	gr.gl.gn. båndet, gl.rik	50						
4.50 - 4.85	0.35	pegm.							
4.85 - 8.05	3.20	gr.gl.gn. delvis båndet, gl.rik	60						
8.05 - 8.30	0.15	impr. i musk.-gn. noen smale striper og uregelm. impr. av prh. + litt cp. + spor sf., ga.	60						
8.30 - 9.00	0.70	musk.gn. spor prh.	60-70						
9.00 - 9.07	0.07	stripet malm sf, py, ga, cp(+), prh(+) i musk.gn.							
9.07 - 9.23	0.16	musk.gn. spor prh.							
9.23 - 9.31	0.08	impr. i musk.gn. Noen uregelm. impr. av prh. og cp(+) i musk.gn.							
9.31 - 9.90	0.59	musk.(biot.)-gn. spor prh.	70						
9.90 - 10.00	0.10	biot.(musk).gn. m. sv. py.-impr.							
10.00 - 11.20	1.20	gl.gn. m. gl.rik, sp. py	60						
11.20 - 13.30	2.10	gl.gn. litt gr., lys	60						
13.30 - 15.25	1.95	gl.gn. m. gl.rik, sv. py-impr., middels grå	60						
15.25 - 16.50	12.5	(gr.)gl.gn. m. gl.rik, sv. py-impr.	40-50						

Lokalitet : Mofjell Felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde : 93.00 m

Borhull : 69 - 2

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
16.50 - 16.70	0.20	gr.hbl.(gl.)- gn.	gr.rik	40					
16.70 - 18.00	1.30	gr.biot.(musk)- gn.	gl.rik, sv. py.- impr.	40-50					
18.00 - 18.30	0.30	gr.hbl.gn.	lett py.-impr.	40-50					
18.30 - 19.00	0.70	gr.gl.gn.	sv. py.-impr. Rel. gl.rik	50-60					
19.00 - 20.65	1.65	gr.(hbl.)gl.- gn.	sv. py.-impr., middels grå	60					
20.65 - 21.70	1.05	(gr.)gl.gn.	gl.rik, sv. py.- impr.	60					
21.70 - 22.15	0.45	hbl.-biot.gn.							
22.15 - 22.75	0.60	gr.hbl.gl.gn.		50					
22.75 - 22.90	0.15	sprekk	noen mm. tykk, fylt opp med et hvitt mineral + kloritt	10					
22.90 - 24.40	1.50	(gr)hbl.gl.- gn.	sv. py.-impr.	V					
24.40 - 24.70	0.30	sprekk (forkast- ning?)	2 cm. tykk, fylt opp med kvarts, kl.	10					
24.70 - 31.80	7.10	gr.hbl.gl.gn.	sv. py-impr. Fol- det	V 0-60					
31.80 - 37.40	5.60	gr.amf.	mørk, tett, veksl. lende biot.-innh. Foldet	V 0-60					

Lokalitet : Mofjell Felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde : 93.00 m

Borhull : 69 - 2

Side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
37.40 - 40.00	2.60	gr.hbl.biot.- gn.	småfoldet V						
40.00 - 45.30	5.30	gr.amf.	-- V						
45.30 - 50.00	4.70	gr.hbl.biot.gn.	-- V						
50.00 - 62.10	12.10	gr.amf	mørk, tett, foldet til slutt 0-80 70-80						
62.10 - 63.75	1.65	gr.hbl.biot.- gn.							
63.75 - 73.50	9.75	gr.amf.	mørk, tett, til- dels store gr. 70						
73.50 - 75.60	2.10	gr.hbl.biot.- gn.	70						
75.60 - 78.30	2.70	gr.gl.gn.	avveksl. gr.biot.- gn., gr.gl.gn., gr. musk.gn. Noen små py.-striper mellom 77.00-77.20 m 70						
78.30 - 78.80	0.50	gr.amf.	70						
78.80 - 92.70	3.90	lys gl.gn.	rel. kv.rik, lok- alb litt gr., små- foldet V						
92.70 - 92.90	0.20	gr.biot.(hbl.)- gn.	mørk, tett						
92.90 - 93.00	0.10	lys gl.gn.							A. K.

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - 6

Dato : 1969
 Koordinater : 3155 Ø, 80 S
 Retning : Syd
 Hellingning : 35°
 Høyde : 185 m.o.h.
 Lengde : 52.10 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.75	2.75	Gr.hbl.gl.gn. Py-impr.	40-60°						
2.75 - 3.35	0.60	gr.amf. gr.aggregater i kv.-feltsp.øyer, rel. lysegrønn	50°						
3.35 - 4.00	0.65	gr.(hbl.)gl.gn.	50°						
4.00 - 5.00	1.00	gr.musk.(biot)Gr. og gl.rik gn.	V						
5.00 - 9.00	4.00	gr.amf.	V(30)						
9.00 - 10.80	1.80	gr.amf. + gr. I avveksl. sv. py-hbl.epid.gn. impr.	40-70						
10.80 - 18.40	7.60	gr.amf. Sterkt småfoldet, skilfrighet antakelig	50						
18.40 - 21.30	2.90	gr.(hbl) biot.gn. middels fink.	60						
21.30 - 22.30	1.00	gr.amf.	70						
22.30 - 24.00	1.70	gr.hbl.gl.gn.	70						
24.00 - 25.60	1.60	gr.amf.	V						
25.60 - 29.70	4.10	gr.hbl.gl.gn. Avvekslende gr.hbl. gl.gn.+ gr.biot. (musk) gn. + gr.amf. Litt py	60						
29.70 - 32.40	2.70	gr.amf.	60-70						
32.40 - 39.70	7.30	gr.hbl.gl.gn. Avvekslende gr.hbl.gl.gn. + gr.amf. + gr.bio (musk)gn., litt småfoldet.	60-70						

A. K.

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater : 3155 Ø, 80 S

Borhull : 69 - 7

Retning :

Helling/Retning : Loddhull

Høyde : 185 m.o.h.

Lengde : 62.70 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	Gr.hbl.gl.gn.	py-impr.						
0.60 - 3.20	2.60	Gr.hbl.gl.gn. + gr.amf.	spor py						
3.20 - 4.30	1.10	(gr) (hbl.kl. epid)gl.gn.	py-impr., lyse- grønn gra.						
4.30 - 5.10	0.80	Gr.hbl.gl.gn.	sv. py-impr.						
5.10 - 5.70	0.60	(pseudo?)amf. breksje, mørk	Flekket p.g.a. av- vekslende amf. og lysegrønn kv.epid. fels. og finkorn. lysegulgrønn fels.						V
5.70 - 8.90	3.20	Gr. hbl. epid. gn.	De lyse epid.ri- kere partier rel. sterkt py-impr.						V
8.90 - 11.10	2.20	(pseudo?) brek- sje	Blekgrønn sv. py- impr. (kl.musk.- gn.), (bleket amf?)						
11.10 - 11.50	0.40	Breksje							
11.50 - 11.70	0.20	Bleket amf.	Hbl. (epid.kl.) gn.						
11.70 - 13.70	2.00	Hbl. epid. kl. gn.	(bleket amf?) sprekker ca. pa- ralell kjerneak- se.						
13.70 - 15.60	1.90	(gr.)hbl.epid. gl.gn.	Småfoldet						
15.60 - 19.00	3.40	kv.feltsp.gn. (eller uren kvart- sitt)	(kv (+), feltsp. musk.(÷), biot(÷)						

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinator :

Retning :

Helling/~~signing~~: Loddhull

Høyde :

Lengde : 62.70 m

Borhull : 69 - 7

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19.00 - 25.80	6.80	musk.(biot.) gn. Lys, sjelden litt gr.	50-70 V						
25.80 - 26.70	0.90	biot. (musk.) gn.	50						
26.70 - 33.40	6.70	gr. hbl. gl.gn. Litt småfoldet	V, 60°						
33.40 - 40.40	7.00	musk.(biot.) gn. Lys, kv.rik, av og til litt gr.	V 60						
40.40 - 46.00	5.60	gr.hbl.gl.gn.	40						
46.00 - 46.40	0.40	musk.gn. gl.rik, sv. py-impr							
46.40 - 47.80	1.40	gr.gl.gn. lys	70						
47.80 - 49.20	1.40	gl.gn. sv. py + prh.impr.	70						
49.20 - 50.00	0.80	(gr).biot. musk.gn.							
50.00 - 53.50	3.50	gr.biot.musk. gn. båndet, noen smale bånd amf.							
53.50 - 54.50	1.00	gr.hbl.gl.gn.	60						
54.50 - 62.50	8.00	gl.gn. lys, av og til noen mørkere biot.rike bånd	70						
62.50 - 62.70	0.20	gr.amf.	80?						

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - 8

Dato : 1969

Koordinater : ca. 3635 Ø, 45 N

Retning : rett syd

Helling/stigning: 35°

Høyde : ca. 170 m.o.h.

Lengde : 46.00 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.45	0.45	jord							
0.45 - 15.30	14.85	agr.biot.gn. lokalt litt hbl., lokalt litt py.- impr., lokalt litt kl. (de første 4 m) først 70 senere småfoldet, 50-60 fra 10.00 m 70							
15.30 - 17.30	2.00	gr.gl.gn. delvis musk.rik	70						
17.30 - 18.70	1.40	gr.biot.(musk)- gn.	70						
18.70 - 24.05	5.35	(gr.)gl.gn.	70						
24.05 - 26.35	2.25	(gr.)musk.- (biot.)gn.	60-50						
26.35 - 26.50	0.15	hbl.gl.gn.							
26.50 - 27.20	0.70	musk.gn.	40-50						
27.20 - 28.65	1.45	spor malm musk.gn., sv. py.- impr., spor sf. Litt hbl. mot slutten	60	0.13	0.12	0.41		4.67	
28.65 - 33.60	4.95	amf. rel. mørk, tett, rel. fink.	V, 70						
33.60 - 35.60	2.00	(gr.)gl.gn. sv. py.impr. Små- foldet	50-60						
35.60 - 37.00	1.40	gr.biot.(hbl.)- gn.	V						

Borhull : 69 - 8

Dato : 1969
Koordinater : ca. 3635 Ø, 45 N
Retning : rett syd
Helling/stigning : 35°
Høyde : ca. 170 m.o.h.
Lengde : 46.00 m

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
37.00 - 40.10	3.10	gr.(biot.)amf.							
40.10 - 41.15	1.05	(gr.)gl.gn.	50-70						
41.15 - 41.35	0.20	(gr.)hbl.gn.							
41.35 - 42.35	1.00	(gr)gl.gn. småfoldet	V						
42.35 - 42.60	0.25	gr.hbl.biot.gn. --	70?						
42.60 - 44.00	1.40	gr.biot.(hbl.)-gn.							
44.00 - 46.00	2.00	gl.gn. lys, lokalt litt gr., kb.-feltsp.-rik, rel. finkornet	V						
						A.K.			

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - 9

Dato : 1969
Koordinater : ca. 3635 0, 45 N
Retning : rett syd
Hellingssvingning : 70°
Høyde : ca. 170 m.o.h.
Lengde : 53.65 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.35	0.35	jord							
0.35 - 1.85	1.50	gr.hbl.biot.gn. sv. py.-impr.	70°						
1.85 - 3.10	1.25	gr.biot.gn. " " -"							
3.10 - 8.00	4.90	gr.biot.(hbl.)- lokalt litt kl. gn.	70-80						
8.00 - 13.15	5.15	gr.biot.(musk)- finbåndet gn.	70-80						
13.15 - 13.40	0.25	gr.amf. mørk, småfoldet	70						
13.40 - 13.95	0.55	gr.biot.(musk)- gn.							
13.95 - 14.15	0.20	gr.amf. småfoldet	70-80						
14.15 - 14.60	0.45	gr.biot.musk.- gn.	70-80						
14.60 - 18.70	4.10	gr.gl.gn. delvis (gr.)musk.- (biot.)gn.	70-80						
18.70 - 19.65	0.95	gr.hbl.gn. rel. feltsp.-kv.-rik	70-80						
19.65 - 21.10	1.45	gr.gl.gn.	70						
21.10 - 21.35	0.25	gr.amf. noe biot., mørk, tett							
21.35 - 23.50	2.15	gr.(hbl.)biot.- mørk, hbl.rikere partier. Småfoldet. gn.	60-70						
23.50 - 25.10	1.60	gr.amf. litt biot.	70						
25.10 - 26.00	0.90	gr.hbl.biot.gn.							

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - 9

Dato : 1969
Koordinater : ca. 3635 Ø, 45 N
Retning : rett syd
Helling/stigning : 70°
Høyde : ca. 170 m.o.h.
Lengde : 53.65 m

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
26.00 - 26.90	0.90	gr.gl.gn.	småfoldet						
26.90 - 27.20	0.30	hbl.(gl.)gn.	lys, kv.feltsp.rik	70					
27.20 - 29.70	2.50	amf.	noen biot.rike bånd	V					
29.70 - 30.00	0.30	kvarts							
30.00 - 31.15	1.15	gr.hbl.biot.gn.	foldet						
31.15 - 31.55	0.40	zoisit? (hbl.)- gn.							31.2
31.55 - 32.00	0.45	(gr.)hbl.biot.- gn.		70					
32.00 - 32.60	0.60	(gr.)gl.gn.							
32.60 - 32.75	0.15	kvarts							
32.75 - 34.65	1.90	(ka.)gl.sk/gn.	spor graf. Småfol- det.	V					
34.65 - 37.10	2.45	gr.amf.	småfoldet	V					
37.10 - 40.15	3.05	gr.hbl.biot.gn.							
40.15 - 49.95	9.80	gr.amf.	mørk, tett, delvis noe gr.hbl.gn. Mot slutten mer biot. småfoldet	V, 60					
49.95 - 53.65	3.70	gr.(biot.)amf.	mørk, tett, små- foldet	V, 60					

A.K.

Lokalitet : Mofjell Felt

Borhull : 69 - 10

Dato : 1969
Koordinater : ca. 3665 N, 0
Retning : rett N
Helling/stigning: 35°
Høyde : 175 m.o.h.
Lengde : 42.10 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	jord							
0.60 - 8.50	7.90	lys gl.gn. rel. kv.-rik, rel. fink., litt småfol	20°						
8.50 - 22.60	14.10	ditto litt gr., (små)fol- det ved 13 m i 0 grader	V mest 20°						
22.60 - 23.90	1.30	gl.gn. gl.rik, middels grå	rundt 0						
23.90 - 25.00	1.10	gr.biot.(hbl)-gn.	V 20						
25.00 - 27.55	2.55	gr.hbl.gl.gn. lok. rik på en lysførst skitten oliven- grønn mineral (zo- isit?)	0, så 75						25.5
27.55 - 28.00	0.45	gl.gn. rel. gl.rik							
28.00 - 28.85	0.85	amf. mørk, tett							
28.85 - 29.30	0.45	biot.(hbl.-musk.)gn.							
29.30 - 31.00	1.70	hbl.gl.gn. rel. lys (kv.felt-sp.-rik) i begynnelsen	40-50						
31.00 - 42.10	11.10	hbl.gn. rel. lys, feltsp.-rik, tildels noen tynne karb.bånd	20-40 V						

A. K.

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater : ca. 3610 0, 100 S

Retning : rett S

Helling/stigning : 35°

Høyde : ca. 200 m.o.h.

Lengde : 63.80 m

Borhull : 69 - 13

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 15.85	15.85	gl.gn. lys. 0 - 6 m 6 - 10.5m lokalt litt gr. og litt båndet (gr.- biot.gn.) Fra 10.5m	30-40° rundt 0 gr. V						
15.85 - 16.00	0.15	gr.biot.(hbl)- gn. mørk, tett							
16.00 - 17.30	1.30	båndet gr.gl.gn.(biot.rikere parti- er). St. småfoldet	V						
17.30 - 24.40	7.10	gl.gn. lys, lokalt litt gr. Småfoldet. Til ca. 23.5 m fra 13.5 m	V 70						
24.40 - 25.10	0.70	(gr.)biot.gn. sv. py.-impr. I starten litt hbl.							
25.10 - 26.00	0.90	gr.hbl.(biot.)- gn.	50-60						
26.00 - 27.75	1.75	gr.hbl.biot.- (musk).gn. avtakende hbl. og. gr., tiltakende musk. Sv. py.-impr. Småfoldet	V						
27.75 - 28.15	0.40	god malm py(+), sf(+), ga i hbl.gl.gn.	))						
28.15 - 28.45	0.30	pegm.	)						
28.45 - 29.30	0.85	god malm som før, i hbl.gl. gn., rel. lys sf	))	2.92	0.12	8.78		5.74	
29.30 - 29.60	0.30	kvarts	)						

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - 13

Dato : 1969

Koordinater : ca. 3610 Ø, 100 S

Retning : rett S

Helling/stigning : 35°

Høyde : ca. 200 m.o.h.

Lengde : 63.80

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29.60 - 29.65	0.05	god malm	i gl.gn.						
29.65		glideplan	(speil) i malmlig- gen skjærer gjen- nom den lokale lagdelingen, som her er 10 grader. Strøkforskjell ca. 30 grader						
29.65 - 30.05	0.40	gr.biot.gn.							
30.05 - 30.50	0.45	pegm.							
30.50 - 30.55	0.05	sv. malmimpr.	i gl.(hbl.)gn.						
30.55 - 30.70	0.15	skapolit(?)- biot.gn.	sv. py.-impr.						
30.70 - 31.50	0.80	(gr.)hbl.gl.- gn.	rel. lys, sv. py.- impr.						
31.50 - 33.30	1.80	gl.gn.	py.-impr., rel. gl.rik						V, 35?
33.30 - 40.60	7.30	(gr.)hbl.gl.- gn.	rel. lys (musk., feltsp., kv.), va- rierer mellom gr.- hbl.gl.gn. og gr.- hbl.(gl.)gn, med og uten gr.						50-60
40.60 - 41.70	1.10	gr.biot.(musk)- gn.							V, 60
41.70 - 47.60	5.90	gr.gk.gn.	lys, litt båndet						50-70

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - 13

Dato : 1969

Koordinater : ca. 3610 Ø, 100 S

Retning : rett S

Hellingssving : 35°

Høyde : ca. 200 m.o.h.

Lengde : 63.80 m

Side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
47.60 - 47.70	0.10	malmstripe	(musk./biot.), litt småfoldet 50-70						
47.70 - 48.80	1.10	gr.gl.gn.	py., sf., i biot.gn. 40 småfoldet, lys 50-70						
48.80 - 49.45	0.65	god malm	i biot.gn.: py., sf ga(÷) 50-70	1.67	0.18	4.75		5.98	
49.45 - 50.00	0.55	musk.gn.	lokalt litt gr. 50						
50.00 - 50.55	0.55	god malm	som før, i biot.gn. 0-70 Småfoldet	2.44	0.08	6.41		8.17	
50.55 - 51.15	0.60	gl.gn.	litt båndet, (musk/biot.)	0.35	0.19	1.05		5.00	
51.15 - 52.70	1.55	spredte malm-impr. og striper,	særlig i de biot.-rikere deler av den bandede gl.gn. 50-70 Småfoldet	0.35	0.19	1.05		5.00	
52.70 - 54.85	2.15	do	"-"	0.21	0.11	0.59		5.00	
54.85 - 58.30	3.45	gr.gl.gn.	båndet (musk./biot.) 50-70						

Lokalitet : Mofjell Felt

Borhull : 69 - 13

Dato : 1969

Koordinater : ca. 3610 Ø, 100 S

Retning : rett S

Helling/stigning : 35°

Høyde : ca. 200 m.o.h.

Lengde : 63.80 m

Side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
58.30 - 62.20	3.90	gr.musk.gn. Noen biot.rikere bånd	50-60						
62.20 - 63.80	1.60	gr.biot.(musk)-Middels grå gn.	50-70						

Lokalitet : Mofjell Felt

Dato : 1969

Koordinater : ca. 3610 Ø, 100 S

Retning : rett S

Helling/stigning : 70°

Høyde : ca. 200 m.o.h.

Borhull : 69 - 14

Lengde : 80.00 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.15	0.15	jord							
0.15 - 2.80	2.65	gl.gn. lys, lokalt litt gr. Rel. kv.rik	80-90						
2.80 - 3.10	0.30	pegm.							
3.10 - 5.00	1.80	båndet gl.gn. Vekslede biot.innh. Småfoldet	V						
5.00 - 30.25	25.25	gl.gn. lys, som før. Noen pegm.bånd mellom 6-7 m, forøvrig smale pegm. bånd mer spredt. Små- foldet. Fra ca. 20 m overveiende Noen smale (gr.)biot.- rike bånd	V, 50 60-90						
30.25 - 30.40	0.15	gr.hbl.(biot) mørk, tett gn.	60						
30.40 - 40.80	10.40	gl.gn. lys som før, lokalt litt gr. Småfoldet. Sprekk (noen mm tykk) fra 39.10-39.70 m, oppfylt med noe kv, biot, (py), 0-10	60-80?						
40.80 - 41.70	0.90	kvarts							
41.70 - 46.55	4.85	gl.gn. lys, som før. Små- foldet	60-80						
46.55 - 48.70	2.15	gr.biot.(hbl)-småfoldet gn.	V						
48.70 - 49.05	0.35	gr.kl.(biot.)-Kl.(biot).rik gn.	V,70						

Lokalitet : Mofjell Felt

Borhull : 69 - 14

Dato : 1969
 Koordinater : 3610 Ø, 100 S
 Retning : rett S
 Helling/signering : 70°
 Høyde : ca. 200 m.o.h.
 Lengde : 80.00 m

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
49.05 - 49.75	0.70	gr.hbl.gl.gn. avtakende hbl.							
49.75 - 49.95	0.20	pegm.							
49.95 - 55.40	5.85	gr.hbl.biot.gn. Småfoldet, sv. py-impr.	V, 70						
55.40 - 56.60	1.20	(gr.)hbl.- sv. py.-impr. Småfoldet (biot).gn.							
56.60 - 60.00	3.40	hbl.biot.gn. lokalt litt gr., sv. py.-impr.	V						
60.00 - 61.00	1.00	gr.biot.gn. rel. lys, delvis litt hbl., sv. py-impr.	80						
61.00 - 64.80	3.80	gr.hbl.biot.- Noen hbl.gn.bånd, småfoldet. Sv. py.-gn. impr.	V						
64.80 - 66.55	1.75	gr.gl.gn. båndet p.g.a. variasjon i biot.-innh. Rel. gl.rik. Småfoldet	80-90						
66.55 - 66.80	0.25	pegm.							
66.80 - 74.30	7.50	gr.hbl.biot.- båndet gr.amf./gr. hbl.biot.gn./gr.-gn. Småfoldet	V, 60?						
74.30 - 76.00	1.70	gr.biot.gn. Småfoldet	V 40-60						
76.00 - 76.75	0.75	gr.musk.gn. kv.rik. Småfoldet	V						
76.75 - 79.00	2.25	gr.biot.(hbl.)-Sterkt båndet p.g.a. avveksling med lys gn.	V						

Borhull : 69 - 14

Dato : 1969
Koordinater : ca. 3610 Ø, 100 S
Retning : rett S
Hellingstigning : 70°
Høyde : ca. 200 m.o.h.
Lengde : 80.00 m

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
79.00 - 79.90	0.90	gr.biot.gn.	biot.gn. og musk.- gn. Sterkt småfol- det.						
79.90 - 80.00	0.10	(gr.)musk.- (biot.)gn.	båndet(musk.gn.), sterkt småfoldet. lys, kv.-rik						

Lokalitet : Mofjell Felte

Dato : 1969

Koordinater : 3565 Ø, 60 N

Retning : rett S

Helling/stigning: 35° S

Høyde : 170 m.o.h.

Lengde : 50.45 m

Borhull : 69 - 15

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	gr. hbl. gl.gn.	50°						
1.00 - 3.00	2.00	gr. biot., (musk.)gn. mellomgrå	60°						
3.00 - 4.70	1.70	clitto, m.sv., py.impr.	60°						
4.70 - 5.10	0.40	pagm. feltspat.kv. musk							
5.10 - 6.40	1.30	gr.biot., kl.hbl., musk.gn. sv. py.impr.	60°						
6.40 - 6.60	0.20	pagm.							
6.60 - 9.00	2.40	gr. biot., (musk.)gn. py-impr.	60						
9.00 - 10.70	1.70	gr. hbl. gl.gn. py-impr.	70						
10.70 - 13.80	3.10	gr.musk.biot. (kl.)gn. sv. py.impr.	60-70						
13.80 - 15.50	1.70	gr. kl. gl. (hbl.)gn. py-impr.	60-70						
15.50 - 19.30	3.80	gr.biot. (musk)gn. m. sv. py- impr., mell- omgrå	60-70						
19.30 - 27.65	8.35	gr.musk. (biot.)- gn. delvis kv.- rik og gr.- fattig, sv. båndet, lys- grå	70-80						
27.65 - 28.10		musk.biot. sv. py-impr., sp. ga, litt	60°						
28.10 - 28.90	0.80	gr.biot.gn. karb.	60						

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde : 50.45 m

Borhull : 69.15

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
28.90 - 29.80	0.90	amf.	60-40						
29.80 - 30.30	0.50	hbl. feltsp.gn. lys, fink.	40.30						
30.30 - 35.05	4.75	amf. fink. og relativt lys, delvis mør- kere og middelsk. (60) Småfoldet							
35.05 - 35.85	0.80	hbl., zoisit- fels. epidot = sanns. zoisit							
35.85 - 36.85	1.00	amf. småfoldet	40-60						
36.85 - 37.30	0.45	gr.amf.							
37.30 - 39.20	1.90	(gr).(hbl). gr.gn. lys	50-60						
39.20 - 40.10	0.90	gr.hbl., gl.gn mørk, litt kl.	60						
40.10 - 46.20	6.10	amf.	60						
46.20 - 50.45		gr.amf	60						

A.K.

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater : 3565 Ø, 60 N

Retning :

Borhull : 69 - 16

Helling/~~stigning~~: loddhull

Høyde : 170 m.o.h.

Lengde : 60.60 m

Side 1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	gr.hbl. gl.gn. py-impr.	60 ⁰						
0.90 - 2.20	1.30	gr.gl.gn. gl.rik, musk.-rike bånd vekslers med biot.rike bånd	60						
2.20 - 2.90	0.70	ditto litt py.	60						
2.90 - 3.20	0.40	pegm.							
3.20 - 4.10	0.90	gr. (hbl.), gl.gn. lokalt litt py.	60						
4.10 - 6.80	2.70	gr., kl., (hbl) sv. py.-impr., kl-rik. Lokalt sideritt? (f.eks. 6.20-6.40).	60-70						
6.80 - 7.50	0.70	gr.(hbl) gl.gn. sv. py-impr.							
7.50 - 8.00	0.50	gr.musk. (biot.)-gn							
8.00 - 8.70	0.70	gr.hbl. gl.gn. m. sv. py-impr.	60						
8.70 - 12.40	3.70	gr.biot. (musk)-gn. py-impr.	60						
12.40 - 15.00	2.60	gr. hbl., biot. (musk.)gn. py-impr.	60						
15.00 - 21.00	6.00	gr.biot. (musk).-Tildels mye gl., gn. lokalt litt sideritt? (18.90-19.10)	60						
21.00 - 21.80	0.80	gr. hbl. gl.gn. gr.- og feltspat-rik, lys (relativt lite hbl. og gl.). M. sv. py-impr.							

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Borhull : 69 - 16

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
21.80 - 27.60	5.80	gr.gl.gn. (meget) gr.rik, sv. kisimpr., lokalt mye sideritt (?), f.eks. 22.50-22.90 (kanskje omvandlet granat, også 26.50-27.00.	60						
27.60 - 30.20	2.60	gr. kl. gl.-gn. gr.rik, lys, kl.-ri-kerelag veksler med kl.fattigere lag. Sv. py-impr., litt sideritt (?).	50-70						
30.20 - 37.40	7.20	gr.gl.gn. gr.rik, lys, litt py-impr., lokalt litt sideritt (?)	50-80						
37.40 - 40.60	3.20	gr. gl. gn. mye mindre gr., svakt py.impr., lokalt litt hbl.							
40.60 - 45.20	4.60	gr.biot. (musk)gn. sv. py.-impr., gr.-rik, skiffrighet vanskelig å bedømme, småfoldet?							
45.20 - 51.40	6.20	kv.rik (gr). musk, (biot)-gn., gr.biot. (musk)gn. avvekslende p.g.a. sterk småfolding.							
51.40 - 52.95	1.55	gr.gl.gn. gr.rik, lys, sv. py-impr., lokalt sideritt, småfoldet.							
52.95 - 53.20	0.25	gr.amf.							

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Borhull : 69 - 16

Side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
53.20 - 55.75	2.55	gr.biotitt, (musk.)gn.	gr.rik, sv. py-impr. småfoldet						
55.75 - 56.80	1.05	(gr.)musk., (biot.)gn.	lys, musk.rik, små- foldet.						
56.80 - 59.00	2.20	gr.biot., musk. gn.	Småfoldet, sv. py- impr.						
59.00 - 60.60	1.60	gr.kl.gl.gn.	gr.rik, småfoldet sv. kisimpr.						

70°

A.K.

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - 17

Dato : 1969

Koordinater : ca. 3995 Ø, 70 S

Retning : rett syd

Helling/svinging : 35°

Høyde : ca. 193 m.o.h.

Lengde : 60.00 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	jord							
0.40 - 7.60	7.20	gr.amf. mørk, tett, tildels store gr. Noen epid. riek band og noen tynne karb.band	60°						
7.60 - 8.00	0.40	kjernetap							
8.00 - 12.70	4.70	gr.amf. mørk, tett, store gr., særlig mellom 8.5 og 9.5 m (gr. over 1 cm.)	70-80						
12.70 - 14.40	1.40	gr.gl.gn. varierende biot.-innhold	70						
14.40 - 14.50	0.10	hbl.gn.							
14.50 - 21.40	6.90	gr.gl.gn. veksl. gr.biot., musk.innh. Foldet. Fra 14.5-19.0 m " 19.0-20.0 " " 20.0 m	60-40 0 50-60						
21.40 - 22.00	0.60	do. med noen 2-10 cm tykke gr.biot.gn.-band (mørk, tett).	50-60						
22.00 - 23.60	1.60	gr.gl.gn.	60-30						
23.60 - 25.00	1.40	gr.biot.(hbl.)-gn.							
25.00 - 26.30	1.30	gr.hbl.biot.gn.Sv. py.-impr.	70-80						
26.30 - 26.55	0.25	pegm.							
26.55 - 31.50	4.95	gr.hbl.gl.gn. Veksl. innh. av gr., biot.(musk). Noen band gr.hbl.gn.	70-80						

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - 17

Dato : 1969
 Koordinater : ca. 3995 Ø, 70 S
 Retning : rett S
 Helling/stigning: 35°
 Høyde : ca. 193 m.o.h.
 Lengde : 60.00 m

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
31.50 - 32.00	0.50	(gr.)biot.gn.	rel. lys	60-70					
32.00 - 39.00	7.00	gr.hbl.gl.gn.	rel. lys (kv.felt-sp.), vekslende gr. og biot.- (musk).- innh. Delvis gr.-hbl.(gl.)gn. Sv. py-impr.	60-70					
39.00 - 39.60	0.60	(gr.)biot.- (graf)gn.	bandet, også noen band gr.hbl.gn.	V					
39.60 - 40.55	0.95	(graf)gl.gn.							
40.55 - 40.75	0.20	<u>malmimpr.</u>	py, sf, ga(÷) i biot.gn.	80					
40.75 - 41.75	1.00	gl.gn.	antakelig litt graf.	V					
41.75 - 43.70	1.95	(gr.)gl.gn.	lys	60-80					
43.70		0.5 cm py + prh.							
43.70 - 43.95	0.25	kvarts							
43.95 - 46.70	2.75	gl.gn.	lokalt litt gr.gl.-rik. Småfoldet	40?					
46.70 - 46.75	0.05	m. sv. malm-impr.	py., sf. i biot.gn.						
46.75 - 47.00	0.25	gr.biot.gn.	sv. pu.-impr.						
47.00 - 48.40	1.40	gr.hbl. gl.gn.	Rel. kv.-feltsp.-rik, sv. py.-impr.						
48.40 - 49.40	1.00	gr.biot.(graf.)-gn.							
49.40 - 55.50	6.10	gr.hbl.gl.gn.	som før, + gr.hbl.(gl.)gn.	V					

Borhull : 69 - 17

Dato : 1969
Koordinater : 3995 0, 70 S
Retning : rett S
Helling/skråning: 35°
Høyde : ca. 193 m.o.h.
Lengde : 60.00 m

Side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
55.50 - 57.75	2.25	gr.hbl.gl. Øyegneis	lys, store gr. i hvite kv.(-feltsp.)- øyer. Kv.rik, lite hbl. og gl.	V						
57.75 - 60.00	2.25	gr.hbl.gl.- gn.	som før							
			</							

Lokalitet : Morfjell felt

Borhull : 69 - 21

Dato : 1969
 Koordinater : ca. 1740 Ø, 75 N
 Retning : rett nord
 Helling/stigning : 35°
 Høyde : ca. 147 m.o.h.
 Lengde : 72.25 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.40	2.40	jord							
2.40 - 3.60	1.20	hbl.biot.gn. sv. py.-impr.	0-10						4.2
3.60 - 6.10	2.50	gr.biot.gn. middelsmørk. Gul-brund mineral(?), forvitring av gr? Sv. py.impr.	10-30						
6.10 - 7.90	1.80	biot.(hbl.)gn. Middelsmørk, do?-min. Sv. py.-impr.	20						
7.90 - 10.40	2.50	gr.biot.gn. sv. py.impr. Do?-min.	0-20						12.6
10.40 - 11.75	1.35	gr.amf. mørk, tett, små-foldet	0-50						
11.75 - 13.00	1.25	blekgrønn, bleket (breksjert?) kv.feltsp.rik bergart i f. m. 2 sprekker (forkastninger?) med fall 10 grader							
13.00 - 16.10	3.10	gr.hbl.gn. rel. lys	15						
16.10 - 24.15	8.05	gr.amf. mørk, tett, gr.-rik, litt småfoldet	50-70						
24.15 - 25.20	1.05	gr.gl."øye"-gneis lys, gr. i kv.feltsp.rike øyer eller uregelm. bånd							
25.20 - 26.05	0.85	gr.hbl."øye"-gneis do							

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - 21

Dato : 1969

Koordinater : ca. 1740 Ø, 75 N

Retning : rett nord

Helling/støtning : 35°

Høyde : ca. 147 m.o.h.

Lengde : 72.25 m

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
26.05 - 26.50	0.45	musk.gn.	70						
26.50 - 26.90	0.40	gr.hbl.gl.gn.							
26.90 - 27.30	0.40	gr.musk.(biot.)- gn.	60						
27.30 - 29.50	2.20	gr.gl.gn. foldet	0-90						
29.50 - 30.95	1.45	musk.gn. lokalt litt gr.	70						
30.95 - 33.35	2.40	gr.gl.gn. rel.gr.rik. Små- le gr.amf.striper	70						
33.35 - 37.25	3.90	(gr.)gl.gn.	70						
37.25 - 37.50	0.25	gr.hbl.gn. lys							
37.50 - 39.60	2.10	gr.gl.gn. rel. gr.- og gl. rik.	70						
39.60 - 40.75	1.15	gr.hbl.gl.gn. rel. lys	60-70						
40.75 - 41.40	0.65	gr.amf. mørk							
41.40 - 44.60	3.20	(gr.)gl.gn. avtakende gr.- innh., delvis musk.rik. Små- foldet	V						
44.60 - 50.00	5.40	gr.hbl.gn. (ca. "øye"gneis). noen mørke gr.- amf.bånd. M. gr. rik.	60-70						
50.00 - 52.05	2.05	gr.gl.gn. i starten litt hbl. Lokalt litt grafitt	50-70						
52.05 - 52.70	0.65	musk.gn.							

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - 21

Dato : 1969

Koordinater : ca. 1740 Ø, 75 N

Retning : rett nord

Helling ~~av bunn~~ : 35°

Høyde : ca. 147 m.o.h.

Lengde : 72.25 m

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
52.70 - 53.70	1.00	gr.gl.gn.	40						
53.70 - 54.20	0.50	graf.sk.							
54.20 - 55.50	1.30	båndet graf.gl.- sk.	Avvekslende graf.- V						
			sk. og gl.sk.						
			Småfoldet						
55.50 - 56.00	0.50	gr.amf.	mørk, tett						
56.00 - 64.95	8.95	gr.gl.gn.	småfoldet. Senere						
64.95 - 67.60	2.65	gr.biot.(musk).- gn.	Avveksl. av brede mørke gr.biot.gn. bånd med lyse (gr.)musk.(biot.)- gn.bånd						
67.60 - 72.25	4.65	gr.gl.gn.	ennå litt båndet. Småfoldet.						

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - 22

Dato : 1969

Koordinater : ca 1740 Ø, 75 N.

Retning :

Helling/spring : 90° (1 odd)

Høyde : ca. 147 m.o.h.

Lengde : 49.00 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	jord							
0.80 - 5.20	4.40	gr.biot.(hbl.)- gn.	m sv. py.impr. 70-80°						
5.20 - 6.60	1.40	gr.hbl.epidot- gn.	noe karb. Gr.epid.- rik						
6.60 - 6.85	0.25	pegm.							
6.85 - 7.95	1.10	(gr.)gl.gn.	middelsmørk V						
7.95 - 9.95	2.00	gr.hbl.epidot.- gn.	noe karb., gr.- epid.rik V						
9.95 - 14.35	4.40	gr.gl.gn.	vekslende gr.gl.-V, 40? innh. Småfoldet						
14.35 - 15.95	1.60	gr.biot.gn.	V						
15.95 - 19.20	3.25	gr.amf. + gr.- hbl.(epid.)gn.	foldet mye rundt 0°						
19.20 - 21.25	2.05	gr.gl.gn.	småfoldet V						
21.25 - 21.60	0.35	pegm.							
21.60 - 23.20	1.60	gr.gl.gn.							
23.20 - 33.50	10.30	gr.hbl.gn. + gr.- epidot.hbl.gn.	40-50						
33.50 - 49.00	16.50	gr.musk.(biot).- gn.	Rel.gr.rik., små-60, V foldet fra ca. 40.00 m. Gr.amf.- striper på 45.40- 45.55 m						

A.K.

Borhull : 69 - 23

Dato : 1969
Koordinater : ca. 1790 Ø, 125 N
Retning : rett syd
Helling/stigning : 60°
Høyde : ca. 133 m.o.h.
Lengde : 50.00 m

NB! Kjernekasene er mrk. 69 - 23^b

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	jord							
0.30 - 2.05	1.75	gr.hbl.("øye")- gn.	Rel. lys, meget gr.rik. Karb.- holdig	40					
2.05 - 2.35	0.30	gl.gn.							
2.35 - 2.65	0.30	graf.sk.	graf.rik	40					
2.65 - 5.35	2.70	musk.(biot.)- gn.	sv. prh.impr.						
5.35 - 13.15	7.80	gr.karb.hbl.- ("øye")gn.	rel. lys, m. gr.- rik, tildels be- tydelig karb. (40 cm. tap mellom 10 og 11 m)	V,40?					
13.15 - 28.75	15.60	gr.gl.gn.	rel. lite granat i starten, mer gr. fra 19.70 M. Små- foldet, fra 20 m	V,70 50					
28.75 - 30.00	1.25	gr.musk.gn.		50					
30.00 - 45.25	15.25	gr.gl.gn.	rel. lys, småfoldet Mot slutten	V,50? 70-80?					
45.25 - 46.50	1.25	musk.gn.							
46.50 - 50.00	3.50	gr.gl.gn. + (gr.)- musk.(biot.)gn.	Småfoldet	60?					

A.K.

Lokalitet : Mofjell Felt

Dato : 1969

Koordinater : ca. 2000 Ø, 115 N

Retning : rett nord

Hellingssvingning : 60°

Høyde : ca. 150 m.o.h.

Lengde : 54.30 m

Borhull : 69 - 24

NB! Kjernekasene er merket
med 69 - 23 a

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	jord	V rundt 0°						
0.80 - 3.00	2.20	gr.biot.gn.							
3.00 - 3.30	0.30	gr.hbl.gn.							
3.30 - 3.80	0.50	gr.biot.(hbl.)- Fold gn.							
3.80 - 4.00	0.20	gr.hbl.gn.							
4.00 - 4.80	0.80	gr.biot.(hbl.)- gn.	50-60						
4.80 - 5.60	0.80	gr.musk.gn.	50-60						
5.60 - 11.60	6.00	gr.gl.gn. gulbrunt mineral(?)	40-60						
11.60 - 12.00	0.40	sprekk (15°) i bleket sone med litt kl.							
12.00 - 18.15	6.15	(gr.)gl.gn. gul-brunt mine- ral(?), py.-impr.	V				0.32		16.5
							analyse av en liten prøve som var rel. rik på det gulbrune mineral		
18.15 - 18.25	0.10	(pseudo)breksje og sprekker på 40°, bleket (blekgrønn)							
18.25 - 21.10	2.85	(gr.)gl.gn. gulbrunt mineral (?). Sv. py-impr.							
21.10 - 22.15	1.05	gr.amf.	V						
22.15 - 22.55	0.40	gr.gl.gn. lys	V						

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - 24

Dato : 1969
 Koordinater : ca. 2000 Ø, 115 N
 Retning : rett nord
 Helling : 60°
 Høyde : ca. 150 m.o.h.
 Lengde : 54.30 m

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
22.55 - 28.55	6.00	gr.amf. + gr.- I starten noen band hbl.epidot.gn. gr.gl.gn. Småfoldet	V						
28.55 - 29.05	0.50	gr.musk."øye"- gneis							
29.05 - 30.00	0.95	gr.hbl.gl.- ("øye")gn.							
30.00 - 32.00	2.00	gr.musk.(biot)- Litt kl. gn.							
32.00 - 35.00	3.00	gr.hbl.epidot- I starten litt gn. biot.	80						
35.00 - 37.20	2.20	gr.gl.gn. Lys, gr.-rik. Fol- det							
37.20 - 37.60	0.40	gr.hbl.(epidot) Kv.-feltsp.rik gn.							
37.60 - 47.00	9.40	gr.gl.gn. Lys, delvis gr.- musk.(biot.)gn. Mot slutten litt kl.	80						
47.00 - 54.30	7.30	gr.musk.(biot)- tildels noe hbl. gn. og gr.gl.gn.							

A. K.

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater : ca. 2150 Ø, 110 N

Retning : rett nord

Hellingssignering : 30°

Høyde : ca. 150 m.o.h.

Lengde : 53.75 m

Borhull : 69 - 25

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.50	3.50	jord							
3.50 - 4.50	1.00	gr.amf.	30°						
4.50 - 4.90	0.40	kjernetap							
4.90 - 5.70	0.80	gr.amf. mørk, tett, småfoldet	30°, V						
5.70 - 6.95	1.25	gr.biot.(musk). Gr.-rik, gr. i kv.-øyegneis feltsp.-øyer og bånd	30						
6.95 - 19.50	12.55	gr.hbl.gn. tildels m. gr.rik, småfoldet, noe karb. (metamorf ka.gl.gn?) Olivengrønn epidot.-mineral	V 20						10.8
19.50 - 20.30	0.80	gr.gl.gn.							
20.30 - 21.35	1.05	pegm.							
21.35 - 25.85	4.50	gr.hbl.gn. gr.rik, som før Også her mye av en lys olivengrønn epid.min.	V 70°						
25.85 - 27.20	1.35	gr.gl.gn. I starten ennå litt hbl. Småfoldet	V						
27.20 - 32.15	4.55	(gr.)musk.- (biot.)gn. sv. py.-impr., lokalt m. sv. malm-impr. (ga.sf.cp.) på 29.5 m. Småfoldet, mye	0°						
32.15 - 32.50	0.35	prh.+ py-stri-per i gl.gn.	20						

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater : ca. 2150 Ø, 110 N

Retning : rett nord

Helling/signing : 30°

Høyde : ca. 150 m.o.h.

Lengde : 53.75 m

Borhull : 69 - 25

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
32.50 - 34.40	1.90	gr.gl.gn. til 33.30 m fra 33.30 m 50-90	0						
34.40 - 35.20	0.80	kjernetap							
35.20 - 38.00	2.80	gr.gl.gn. foldet til 36.20 m: 70° til 38.00 m: rundt 10 grader	V						
38.00 - 38.70	0.70	kvarts							
38.70 - 40.10	1.40	gr.hbl.gl.gn. rel. lys og finkorn- et, gr.rik, kv.- feltsp.rik. Sv. prh. impr.	V, 70						39.6
40.10 - 41.17	1.07	gr.gl.gn. do. som forrige, men uten hbl. Små- foldet	V						
41.17 - 41.22	0.05	prh.+py.-stri- per							
41.22 - 41.65	0.43	gr.gl.gn. som ovenfor	20						
41.65 - 43.45	1.80	do. litt hbl. av og til, foldet							
43.45 - 43.55	0.10	prh.striper i hbl.gn.	20						
43.55 - 44.25	0.70	gr.musk.(biot)- relativt finkornet gn. og gr.rik							
44.25 - 45.40	1.15	(gr.)musk.- småfoldet, rundt (biot.)gn.	0-10°						
45.40 - 45.80	0.40	1 cm. tynn stripe prh. + litt cp., sf., ga. i gl.gn.	0-5						
45.80 - 47.20	1.40	musk.gn. rundt	0						

Borhull : 69 - 25

Lengde : 53.75 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
47.20 - 49.50	2.30	uregelm. malm- kluser i stri- per	etter lagdelingen prh.(+), sf., py. En rel. tynn stri- pe som p.g.a. ava- ke bølger i lagde- lingen stadig kom- mer tilbake	0-5					
49.50 - 50.20	0.70	musk.gn.							
50.20 - 50.35	0.15	gr.gl.gn.							
50.35 - 50.45	0.10	kryst.kalksten	70						
50.45 - 51.00	0.55	musk.(biot.)gn. sv. prh.impr.	V, 70						
51.00 - 52.70	1.70	gr.gl.gn. rel. fink. Prh.- stripe på 51.6 m	V						
52.70 - 53.75	1.05	gr.hbl.gn. gr.rik	20-30						

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - 26

Dato : 1969

Koordinater : ca. 2150 Ø, 110 N

Retning : rett nord

Helling/syningsvinkel : 60°

Høyde : 150 m.o.h.

Lengde : 52.45 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.75	0.75	kjernetap							
0.75 - 4.80	4.05	gr.amf. gr.rik, mørk	V,60?						
4.80 - 6.00	1.20	gr.hbl.gl.gn. lys, rel.finkornet							
6.00 - 7.50	1.50	gr.gl.(epid.)-gn. " " -"-	V						
7.50 - 10.10	2.60	gr.amf. mørk, gr.rik	V,40?						
10.10 - 13.15	3.05	gr.biot.gn. sv. py.-impr	V						
13.15 - 18.15	5.00	gr.amf. + gr.-hbl.epidot.gn.	V						
18.15 - 19.50	1.35	gr.hbl.biot.- epid.gn. småfoldet	V						
19.50 - 29.00	9.50	gr.amf. + gr.-hbl.epid.gn. Litt gr.gl.gn.	V 60-80						
19.00 - 32.10	13.10	gr.gl.gn. småfoldet, tilslutt runt	0						
32.10 - 32.70	0.60	kvarts							
32.70 - 35.10	2.40	gr.gl.gn. småfoldet, mye rundt	0						
35.10 - 35.40	0.30	kjernetap							
35.40 - 39.10	3.70	gr.musk.(biot.)-Tiltakende gr. gn.							
39.10 - 39.40	0.30	kjernetap							
39.40 - 39.75	0.35	kjernetap							
39.75 - 47.85	8.10	gr.gl.gn. delvis "øye"gneis	V						

Borhull : 69 - 26

Dato : 1969
Koordinater : ca. 2150 Ø, 110 N
Retning : rett nord
Hellingsskråning : 60°
Høyde : ca. 150 m.o.h.
Lengde : 52.45 m

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m.
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
47.85 - 49.25	1.40	musk.gn.							
49.25 - 52.45	3.20	gr.gl.gn.							A.K.

Lokalitet : Mofjell Felt

Borhull : 69 - 30

Dato : 1969

Koordinater : ca. 2375 0, 60 N

Retning :

Hellingssvingning : 90° (lodd)

Høyde : ca. + 140 m.o.h.

Lengde : 141.85 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.00	3.00	jord							
3.00 - 3.15	0.15	gr.amf.							
3.15 - 3.30	0.15	pegm.							
3.30 - 4.15	0.85	ingen kjerne							
4.15 - 7.65	3.50	gr.amf. mørk, tett, vekslende gr.-innh., noen karb.-bånd	60-80						
7.65 - 7.90	0.25	pegm. biot. + gr.							
7.90 - 8.60	0.70	gr.amf. som før, småfoldet							
8.60 - 9.00	0.40	gr.hbl.biot.-gn.							
9.00 - 10.70	1.70	gr.biot.gn. småfoldet							
10.70 - 14.80	4.10	musk.gn. (litt boit. lokalt)	80?						
14.80 - 15.50	0.70	kjernetap							
15.50 - 17.75	2.25	musk.gn. lokalt litt biot. + gr.	75						
17.75 - 18.40	0.65	gr.biot.(musk) gn.	"						
18.40 - 21.00	2.60	musk.gn. lokalt litt biot. + gr.	75-80						
21.00 - 26.80	5.80	gr.biot.gn. i begynnelsen litt hbl.	60-80						
26.80 - 27.60	0.80	gr.amf. veksl. biot.innhold.	V						
27.60 - 29.90	2.30	gr.hbl.biot.gn.	70-80						
29.90 - 30.10	0.20	kjernetap							

Lokalitet : Mofjell Felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Borhull : 69 - 30

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde : 141.45 m

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
30.10 - 32.45	2.35	gr.hbl.biot.gn. avtakende hbl.innh.	70-80						
32.45 - 34.50	2.05	gr.biot.gn. lys, gr.rik, delv. litt hbl.	70-80						
34.50 - 39.05	4.55	musk.gn. lokalt litt biot. og gr.	V 60-80						
39.05 - 40.00	0.95	gr.amf.							
40.00 - 40.25	0.25	gr.gl.gn.							
40.25 - 40.45	0.20	gr.biot.hbl.gn.							
40.45 - 41.10	0.65	musk.gn.	70-80						
41.10 - 43.40	2.30	gr.biot.(hbl)- lys, gr.rik, lys hbl.	V 50-60						
43.40 - 46.40	3.00	gr.amf. mørk, tett, foldet og småfoldet							
46.40 - 60.00	13.60	gr.hbl.gn. lys, gr.-feltsp.-rik, foldet og småfoldet	rundt Ogr.						
60.00 - 61.50	1.50	gr.hbl.gn. middels grågrønn	V,30						
61.50 - 62.90	1.40	pegm.							
62.90 - 68.75	5.85	gr.hbl.gn. + gr.amf. foldet, + småfoldet	V						
68.75 - 69.85	1.10	kv.musk.gn. litt biot.	75						
69.85 - 73.20	3.35	gr.hbl.gn. overv. lys, tildels m. gr.rik, noe gr.-biot.gn. Foldet	V						
73.20 - 78.00	4.80	gr.amf. overv. mørk, store	V						

Lokalitet : Mofjell Felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde : 141.45

Borhull : 69 - 30

Side 3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		gr., tildels m. gr.-rik. Foldet, ofte rundt	00						
78.00 - 85.45	7.45	gr.gl.gn. gr.rik, rel. lys	V						
85.45 - 86.00	0.55	pegm.							
86.00 - 91.60	5.60	gr.gl.gn. gr.rik, rel. lys	V						
91.60 - 92.15	0.55	kjernetap							
92.15 - 105.60	13.45	gr.gl.gn. (små)foldet, gr.rik rel. lys	V						
105.60 - 106.10	0.50	gr.amf. rel. lys							
106.10 - 106.70	0.60	gr.biot.gn.							
106.70 - 110.35	3.65	gr.gl.gn. rel. lys, gr.rik, litt båndet p.g.a. variasjon i biot.-innhold	V						
110.35 - 116.20	5.85	(gr.)musk.gn.	V,70						
116.20 - 118.50	2.30	gr.gl.gn. som før, (små)fold.	V						
118.50 - 119.60	1.10	(gr.)musk.(biot) gn.							
119.60 - 120.70	1.10	gr.biot.hbl.gn. (små)foldet	V						
120.70 - 122.30	1.60	gr.gl.gn.							
122.30 - 122.60	0.30	kjernetap							
122.60 - 123.30	0.70	(graf.?) (gr.) musk.(biot)gn.							
123.30 - 125.70	2.40	(gr.)musk.(biot). gn.	70						

Borhull : 69 - 30

Dato : 1969
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning :
Høyde :
Lengde : 141.85

Side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				0/0 Pb	0/0 Cu	0/0 Zn	0/0 S	0/0 Fe	
125.70 - 128.00	2.30	båndet gr.gl.gn. musk.gn/biot.gn.							
128.00 - 129.50	1.50	boret bort							
129.50 - 132.00	2.50	(gr.)musk.(biot)- gn. lys; delvis fin- korn., sv. impr. med prh (+spor finfordelt gra- fitt?)							
132.00 - 136.10	4.10	gr.musk.gn.	V						
136.10 - 137.35	1.25	gr.hbl.biot.gn. småfoldet							
137.35 - 137.80	0.45	gr.hbl.gn. rel.lys, gr.rik							
137.80 - 140.00	2.20	gr.gl.gn. avveksl. gr.musk. V gn. og gr.biot.- gn.							
140.00 - 140.60	0.60	gr.amf.	30-40						
140.60 - 141.00	0.40	gr.biot.gn.	70						
141.00 - 141.85	0.85	gr.musk.(biot)gn. småfoldet	70						

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1969

Koordinater : ca. 2365 0, 20 S

Borhull : 69 - 31

Retning :

Hellingssving : 90° (lodd)

Høyde : ca. + 170 m.o.h.

Lengde : 240.80 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.25	0.25	jord							
0.25 - 0.40	0.15	gr.gl.gn. småfoldet	V						
0.40 - 0.70	0.30	pegm.							
0.70 - 2.90	2.20	gr.gl.gn.							
2.90 - 3.65	0.75	gr.hbl.gl.gn. Båndet gneiss	50-70						
3.65 - 10.25	6.60	gr.biot.(musk)Middels grå, små- gn. foldet	V,60						
10.25 - 15.95	5.70	gr.gl.gn. (musk.= ca.biot)	V,60						
15.95 - 16.80	0.85	pegm.							
16.80 - 19.80	3.00	gr.biot.- middels grå, fold på V,60 (musk)gn. 17.20-17.80m, sv. py- 0 impr.							
19.80 - 21.50	0.70	gr.amfibol- lysegrønn (kv.felt- gn. sp.rik), litt gl.							
21.50 - 25.00	3.50	gr.amfibol- lys, veksl. biot.- gl.gn. innh., m. gr.rik. Småfoldet.	V						23.8
25.00 - 39.15	14.15	gr.amf. mørk, tett, fin- middelsk., delvis gr.rik. Småfoldet, smale bånd med ren kryst.kalksten fo- rekommer	V 60						
39.15 - 39.70	0.55	pegm.							
39.70 - 44.00	4.30	gr.amf. som før	70						
44.00 - 44.50	0.50	gr.biot.hbl.- gn.	70						

Lokalitet : Mofjell Felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde : 240.80m

Borhull : 69 - 31

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
44.50 - 45.65	1.15	gr.hbl.gl.gn. Båndet p.g.a. veksl. hbl., biot., musk.- innhold	70						
45.60 - 48.70	3.10	gr.hbl.gn. gr.rik, middels grønngrå	70						
48.70 - 50.20	1.50	gr.biot.- (musk.)gn. middels grå	70						
50.20 - 54.00	3.80	gr.gl.gn. lys, gr.rik	60						
54.00 - 56.50	2.50	båndet gneis avvekslende musk.gn. og gr.biot.(musk).gn	70						
56.50 - 57.90	1.40	gr.biot.- (musk).gn. middels grå, ennå litt båndet. Stripe prh. på 57.25 m	70-80						
57.90 - 59.60	1.70	gr.hbl.biot.- Småfoldet gn.	70						
59.60 - 60.00	0.40	gr.amf.							
60.00 - 64.40	4.40	gr.hbl.gl.gn. Båndet p.g.a. veksl. i hbl. og biot.- innh. Gr.rik	70-80						
64.40 - 67.10	2.70	gr.biot.- (musk.)gn. middelsgrå, gr.-rik	V						
67.10 - 68.00	0.90	gr.gl.gn. lys, mindre gr., sv. py.-impr.	V						
68.00 - 70.30	2.30	gr.biot.- (musk).gn. middels grå, gr.- rik, noen hbl.rike bånd, m. sv. py- impr.	70						
70.30 - 87.25	16.95	gr.gl.gn. lys, litt båndet p. g.a. noen biot.rik-	70-60						

Lokalitet : Mofjell Felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde : 240.80 m

Borhull : 69 - 31

Side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		ere band. Litt små- foldet.							
87.25 - 87.75	0.50	gr.biot.gn.							
87.75 - 87.95	0.20	amf. (+ gr.biot.gn.)	80						
87.95 - 89.00	1.05	gr.gl.gn. båndet (musk/biot)	70-80						
89.00 - 90.10	1.10	gr.hbl.gl.gn. båndet (biot/hbl). Småfoldet							
90.10 - 101.25	11.15	gr.gl.gn. lys, litt båndet p.g.a. noen biot.- rikere bånd. Småf. Avtakende gr. på de sidste par meter.	70						
101.25 - 101.40	0.15	pegm.							
101.40 - 103.50	2.10	gr.hbl.biot.gn. båndet: gr.amf.- bånd avveks. med gr.biot.gn. og gr. (hbl)gl.gn. Gr.rik, m. sv. py-impr. Småfoldet.	V						
103.50 - 105.40	1.90	gr.biot.gn. m. sv. py-impr., småfoldet	V						
105.40 - 106.00	0.60	gr.hbl.biot.gn. Som før							
106.00 - 109.00	3.00	gr.gl.gn. båndet p.g.a. veks- lende biot.innh. M. sv. py-impr.(spor)							
109.00 - 111.30	2.30	(gr.)musk.- (biot)gn. spor py	70						
111.30 - 114.50	3.20	gr.gl.gn. veksl. mellom (gr.)	V						

Lokalitet : Mofjell Felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde : 240.80 m

Borhull : 69 - 31

Side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
114.50 - 115.60	1.10	musk.(biot).gn. og og gr.biot.(musk)gn. gr.hbl.gl.gn. gr.amf./gr.biot.gm. som før	V,70						
115.60 - 117.60	2.00	gr.gl.gn. småfoldet							
117.60 - 119.05	1.45	gr.hbl.biot.- gn. som før							
119.05 - 122.80	3.75	gr.biot.(musk)-småfoldet gn.	V,60						
122.80 - 123.90	1.10	gr.(hbl.)gl.gn. Noen smale gr.amf.- bånd.							
123.90 - 125.90	2.00	gr.gl.gn. båndet	70						
125.90 - 129.60	3.70	gr.hbl.gl.gn. båndet som før	V,70						
129.60 - 130.50	0.90	gr.hbl.gn. gr.feltsp.-øyer og bånd.							
130.50 - 133.00	2.50	gr.biot.- (små)foldet. Noen (musk)gn. få tynne amf.bånd	V,60						
133.00 - 135.15	2.15	gr.hbl.gl.gn. båndet som før. (små)foldet	V						
135.15 - 136.25	1.10	gr.amf. mørk, tett, store	gr.80						
136.25 - 138.00	1.75	gr.hbl.gl.gn. sv. py-impr.	80						
138.00 - 139.40	1.40	gr.amf. + noen gr.hbl.gl.gn.							
139.40 - 140.00	0.60	gr.biot.(musk)- gn.							
140.00 - 146.20	6.20	gr.hbl.gl.gn. båndet som før. Småfoldet, gr.rik	70-80						
146.20 - 146.90	0.70	gr.biot.- (musk)gn. gr.rik							

Lokalitet : Mofjell Felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Borhull : 69 - 31

Lengde : 240.80 m

Side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
146.90 - 147.25	0.35	kvarts							
147.25 - 150.20	2.95	gr.hbl.gl.gn. Båndet som før. Sv. py.-impr. Gr.-rik sprekke (noen cm. bred, litt oppkjust) på 148.70, 10-20 gr)							
150.20 - 154.00	3.80	gr.biot.- (musk)gn. tildels meget gr.-rik							
154.00 - 154.20	0.20	pegm.							
154.20 - 155.00	0.80	gr.hbl.gl.gn. småfoldet							
155.00 - 160.40	5.40	gr.biot.- (musk)gn. tildels ennå noen V gr.amf./gr.hbl.gn.-70-80 bånd. Gr.rik.							
160.40 - 160.90	0.50	gr.biot.- (musk).gn.							
160.90 - 163.60	2.70	musk.biot.gn. rel. gl.rik. V,80?							
163.60 - 170.85	7.25	gr.biot.- (musk)gn. sv. py.-impr. Av V og til lokalt litt 50-80 hbl.							
170.85 - 180.00	9.15	gr.biot.- (hbl.)gn. m. sv. py-impr. 70-90							
180.00 - 189.40	9.40	gr.biot.gn. av og til lokalt 70-90 litt hbl. eller tynne amf.bånd. M. sv. py.-impr.							
189.40 - 191.75	2.35	gr.biot.- (hbl.)gn.							
191.75 - 195.40	3.65	gr.biot.gn.	80						

Lokalitet : Mofjell Felt

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde : 240.80 m

Borhull : 69.- 31

Side 6

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
195.40 - 195.90	0.50	gr.hbl.biot.gn.							
195.90 - 199.80	3.90	gr.biot.(hbl).- gn.	80						
199.80 - 200.00	0.20	kvarts							
200.00 - 200.40	0.40	gr.hbl.(biot.)- gn.							
200.40 - 202.20	1.80	gr.hbl.biot.gn. Båndet som før	V, 50-70						
202.20 - 205.25	3.05	(gr.)biot.gn. rel. lys, veksl. gr.innhold	80						
205.25 - 205.60	0.35	gr.amf. mørk, tett	80						
205.60 - 207.10	1.50	gr.biot.(hbl.)- gn.	80						
207.10 - 208.90	1.80	gr.gl.gn.	V, 80						
208.90 - 209.55	0.65	pegm. + noen bånd gr.- biot.gn.							
209.55 - 210.10	0.55	gr.biot.(musk)- gn.							
210.10 - 211.60	1.50	gr.gl.gn. rel.gl.-rik	V, 60-80						
211.60 - 215.50	3.90	gr.biot.- (musk)gn. tildels litt hbl.	60-80						
215.50 - 217.65	2.15	gr.musk.- (biot.)gn.	60-80						
217.65 - 223.00	5.35	amf. mørk, tett, lokalt med granat og noen tynne karb.bånd	70-80						
223.00 - 226.30	3.30	gr.hbl.biot.- gn.	60-70						

Lokalitet : Morjell Felt

Borhull : 69 - 31

Dato : 1969

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde : 240.80 m

Side 7

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
226.30 - 229.25	2.95	(gr)amf. veksl. gr.innh.Fold på 227.50 m (0 grad)	V 60-70						
229.25 - 232.00	2.75	gr.hbl.biot.- gn. småfoldet, båndet	60						
232.00 - 232.90	0.90	(gr.)gl.gn.	60-70						
232.90 - 234.35	1.45	gr.amf. mørk, tett	V 60-90						
234.35 - 235.80	1.45	gr.hbl.biot.- gn. båndet	V,80						
235.80 - 240.80	5.00	amf. lokalt med granat og biot.	70-90						

A.K.

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - 43

Dato : 1969
 Koordinater : 3165 Ø, 135 S
 Retning : Rett S
 Helling/stigning : 35° S
 Høyde : 190 m.o.h.
 Lengde : 16.00 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	gr.amf. sv. py-impr.	50°						
1.20 - 2.65	1.45	(gr) hbl. py-impr. (kl.) gn.	V						
2.65 - 3.00	0.35	gr. (hbl), m. sv. py-impr. kl.gn.							
3.00 - 3.20	0.20	sammenvokset oppknusningssone: kl. og epid.rik							
3.20 - 4.00	0.80	gr. (hbl.) m. sv. py-impr gl.gn.	V						
4.00 - 5.05	1.05	gr.amf. båndet, m. sv. py-imp.	V						
5.05 - 5.80	0.75	gr. (hbl), sv. py-impr. gl.gn.	V-30°						
5.80 - 6.90	1.10	gr.hbl. gl. sv. py-impr. gn.	V-30						
6.90 - 7.70	0.80	gr. hbl. (e- M. sv. py.impr. pid?), gn.							
7.70 - 8.70	1.00	sammenvokst knusningssone, blek gulgrønn (som vanl.), ca. parallell kjerneaksen, litt py.impr., kv.rik							
8.70 - 9.40	0.75	bleket hbl, py-impr. kl. gl.gn.							

Borhull : 69 - 43

Dato : 1969

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde : 16.00 m

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
9.40 - 10.25	0.65	musk. (kl)gn. sv. malmimpr.: py, honninggul sf., ga, cp	30-40 V	0.24	0.41	0.56	4.28		
10.25 - 11.25	1.00	malm: py, honninggul sf, ga, litt cp, i hbl (kl)gl.gn, litt karb.	V	0.90	0.52	6.20	11.02		
11.25 - 11.45	0.20	kv.biot.gn. py + cp.impr.							
11.45 - 12.05	0.60	hbl. gl.gn. py-impr.	V						
12.05 - 13.75	1.70	gr.hbl. (gl)- gn. sv. py-impr.	60						
13.75 - 14.25	0.50	hbl. gl.gn. -"- -"	60						
14.25 - 14.26	0.01	litt lys sf, ga, py	70						
14.26 - 14.40	0.14	(gr.) gl.gn							
14.40 - 14.90	0.50	musk. (birt)gn. M. sv. py.impr.	60						
14.90 - 15.40	0.50	kv.biot.(musk) gn. Lys, m. sv. py-impr.							
15.40 - 16.00	0.60	gr.gl.gn. Lys, kv.rik.	60					A.K.	

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - 44

Dato : 1969

Koordinater : ca. 2945 Ø, 115 S

Retning : rett sør

Helling/høyde : 35°

Høyde : ca. 195 m.o.h.

Lengde : 20.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 10.00	10.00	mangler							
10.00 - 11.20	1.20	gl.gn. båndet, litt gr. og hbl. lokalt	50-60						
11.20 - 13.50	2.30	m. av. malm.-impr. i musk.(biot.)-gn. med bånd lys hbl.gn. og biot.-gn., særlig hbl.-gn. er impr.	60-70	0.17	0.14	0.33		3.27	
13.50 - 13.85	0.35	lys hbl.gn.	30						
13.85 - 15.00	1.15	gl.gn. lokalt noe gr. og lys hbl.gn. I hbl.gn. m. sv. malmimpr.	50-70						
15.00 - 16.15	1.15	gr.biot.(musk.-hbl.)gn. sv. py.-impr.							
16.15 - 20.00	3.85	gr.hbl.biot.gn. sv. py.-impr. Avveksl. gr.amf., gr.biot. og gr.-gr.hbl.gl.gn.	50-70						
20.00 - 31.70		mangler							

A. K.

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - 45

Dato : 1969
Koordinater : ca. 2940 0, 150 S
Retning : rett nord
Helling/stigning : ~~XXXXXX~~ 35°
Høyde : ca. 200 m.o.h.
Lengde : 20.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 10.00	10.00	mangler							
10.00 - 10.40	0.40	kvarts							
10.40 - 15.55	5.15	gr.gl.gn. Lys, litt småfoldet runt	0°						
15.55 - 16.80	1.25	m. sv. malm- i gl.gn. impr.	0-50	0.21	0.21	0.39		4.34	
16.80 - 17.90	1.10	pegm.							
17.90 - 20.00	2.10	gr.hbl.gl.gn. sv. py.-impr.							
20.00 - 27.10	7.10	mangler							

A. K.

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - 46

Dato : 1969

Koordinater : ca. 3620 Ø, 165 S

Retning : rett nord

Helling/stigning : 60°

Høyde : ca. 202 m.o.h.

Lengde : 96.40 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	jord							
0.20 - 4.00	3.80	gr.gl.gn. rel. lys, lokalt kl.	40-60						
4.00 - 15.00	11.00	(gr.)musk.- (biot.)gn. lokalt litt kl., småfoldet	V						
15.00 - 22.40	7.40	gr.gl.gn. småfoldet							
22.40 - 24.50	2.10	gr.hbl.gl.gn. vekslende hbl.innhold	V, 60						
24.50 - 24.85	0.35	gl.gn.							
24.85 - 27.15	2.30	do., m. svake malmimpr. småfoldet rundt (en eller få 1 mm tynne malmstriper kommer stadig tilbake). Noen bånd (gr.)biot.gn.	0°	0.17	0.09	0.58			4.34
27.15 - 29.20	2.05	sv. malmimpr. i gl.gn. Noen bånd (gr.)biot.gn. S tiltar fra 30 til 60 grader	30-60	0.24	0.12	1.92			4.74
29.20 - 30.00	0.70	gl.gn.	60						
30.00 - 38.85	8.85	(gr.)musk.- (biot.)gn. vekslende gr.- og biot.-innhold							
38.85 - 39.75	0.90	gr.biot.(musk)-gn.	V						
39.75 - 41.10	1.35	musk.(biot.)gn.							
41.10 - 41.40	0.30	m. sv. malmimpr. i gl.gn.	50						

Lokalitet : Mofjell felt

Borhull : 69 - 46

Dato : 1969
 Koordinater : ca. 3620 Ø, 165 S
 Retning : rett nord
 Helling/stigning : 60°
 Høyde : ca. 202 m.o.h.
 Lengde : 96.40 m

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
41.40 - 53.80	12.40	gr.gl.gn. lys, veksl. gr.- innh. fra 42.30-42.60m	50-60 80-90						
53.80 - 54.60	0.80	gr.biot.(musk)- gn.	50						
54.60 - 55.00	0.40	gr.hbl.biot.gn.							
55.00 - 56.20	1.20	gr.biot.gn.							
56.20 - 57.85	1.65	gr.hbl.gl.gn. båndet gr.hbl.gn.- bånd i gr.biot.- (hbl.)gn. Småfoldet	V,70						
57.85 - 60.00	2.15	gr.biot.gn. småfoldet							
60.00 - 76.70	16.70	gr.hbl.biot.- gn. vekslende hbl.innh. Noen gr.biot.gn.- bånd og gr.hbl.gn.- bånd. Småfoldet	V 40-90 50-60?						
76.70 - 78.25	1.55	(gr.)hbl.gn.+ lys hbl.gn.	70						
78.25 - 79.30	1.05	hbl.biot.gn.	V, 60-80						
79.30 - 80.75	1.45	avveksl. (gr.)- musk.(biot.)gn. og gr.biot.gn.							
80.75 - 83.85	3.10	(gr.)musk.(biot)- gn. Ennå noen smale bånd gr.biot.gn. Småfoldet	V						
83.85 - 86.15	2.30	gr.biot.gn.	V,30?						
86.15 - 90.40	4.25	(gr.)gl.gn. Båndet: musk.(biot) gn. (gr.)gl.gn. og	V						

Borhull : 69 - 46

Dato : 1969
Koordinater : ca. 3620 Ø, 165 S
Retning : rett nord
Hellingstigning : 60°
Høyde : ca. 202 m.o.h.
Lengde : 96.40 m

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		gr.biot.gn. Småfol- det.							
90.40 - 90.60	0.20	(gr.)amf. mørk							
90.60 - 90.85	0.25	gr.gl.gn.							
90.85 - 90.95	0.10	amf. mørk, tett, litt gr.	70-80						
90.95 - 92.20	1.25	gr.gl.gn.	V, 70-80						
92.20 - 96.40	4.20	gr.amf. mørk, tett, småfol- det	60-80?						
		fra 24.85 m - 29.20 m = 4.35 m							

Lokalitet : Mofjell Felt

Borhull : 69 - 47

Dato : 1969
 Koordinater : ca. 3995 Ø, 130 S
 Retning : rett nord
 Hellingssving : 70°
 Høyde : ca. 205 m.o.h.
 Lengde : 64.50 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	jord							
1.10 - 11.00	9.90	(gr.)gl.gn. lys, delvis litt båndet, småfoldet. Ofte 40°	40°						
11.00 - 12.30	1.30	musk.gn. lokalt litt gr. Småfoldet	V						
12.30 - 16.70	4.40	(gr.)gl.gn. båndet, delvis brede bånd gr.- biot(musk).gn. avveksl. med musk. gn. og musk.(biot) gn. Småfoldet	V 40-60						
16.70 - 16.85	0.15	malm py, sf, ga(÷) i biot.gn.	40						
16.85 - 17.45	0.60	gr.(hbl.)gl.gn.	40						
17.45 - 17.95	0.50	gl.gn.							
17.95 - 18.10	0.15	hbl.gn. på 18.10 m noe sf., py.							
18.10 - 18.80	0.70	gr.biot.(musk)- gn båndet (musk./- biot).	V, 30						
18.80 - 20.05	1.25	(gr.)gl.gn. lys							
20.05 - 20.75	0.70	gr.biot.(musk)- gn.	V						
20.75 - 21.80	1.05	gr.biot.(hbl)gn.							
21.80 - 26.60	4.80	gr.hbl.biot.gn. sv. py.-impr.	V, 50?						
26.60 - 27.00	0.40	musk.gn. litt gr.	50						
27.00 - 27.50	0.50	gr.biot.(hbl).gn.							

Lokalitet : Mofjell Felt

Borhull : 69 - 47

Dato : 1969
 Koordinater : ca. 3995 Ø, 130 S
 Retning : rett nord
 Helling, retning : 70°
 Høyde : ca. 205 m.o.h.
 Lengde : 64.50 m

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
27.50 - 28.50	1.00	gr.hbl.biot.gn.	50						
28.50 - 29.00	0.50	gr.biot.(hbl.)gn.	50						
29.00 - 36.40	7.40	(gr.)gl.gn. rel. lys	50						
36.40 - 41.00	4.60	gr.biot.(musk).gn.	50-70						
41.00 - 41.50	0.50	(gr.)gl.gn.	70-80						
41.50 - 42.25	0.75	m. sv. malmimpr. i biot.gn.	70-80)	0.51	0.15	2.27		6.13	
42.25 - 42.65	0.40	stripet malm py, sf, ga(÷), cp(÷) i gl.gn. + biot.gn.	80)						
42.65 - 45.75	3.10	gl.gn. lys, lokalt litt gr.	V, 80?						
45.75 - 46.20	0.45	gr.hbl.(biot).- gn.	70-80						
46.20 - 48.10	1.90	gr.hbl.biot.gn. sv. py-impr.	70-80						
48.10 - 49.00	0.90	(gr.)hbl.(gl.)- gn. rel. mørk og tett Sv. py.-impr.	80						
49.00 - 50.60	1.60	gr.hbl. øye- gneis re. lys, avveksl. av uregelm. gr.- kv.-feltsp.øyer og band med hbl.- feltsp.-rike band							
50.60 - 53.20	2.60	gr.hbl.biot.- gn. Sv. py.-impr.	80						

Borhull : 69 - 47

Dato : 1969
Koordinater : ca. 3995 Ø, 130 S
Retning : rett nord
Helling/høyning : 70°
Høyde : ca. 205 m.o.h.
Lengde : 64.50 m

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
53.20 - 54.45	1.25	gr.amf. rel. mørk og tett							
54.45 - 56.00	1.55	gr.biot.(hbl.) sv. py.-impr. gn.							
56.00 - 58.20	2.20	gr.gl.gn. rel. gl.rik, sv. py.-impr.	V						
58.20 - 59.10	0.90	gr.gl.(hbl)gn. litt båndet							
59.10 - 63.80	4.70	(gr.)gl.gn. lys, noen bånd (gr.) biot.gn.	80						
63.80 - 64.50	0.70	gr.biot.hbl.- mørk, tett gn.	80						

A. K.

Lokalitet : Mofjell Felt

Borhull : 69 - 48

Dato : 1969
 Koordinater : ca. 3995 Ø, 160 S
 Retning : rett nord
 Hellingssvingning : 70°
 Høyde : ca. 205 m.o.h.
 Lengde : 90.00 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.10	0.10	jord							
0.10 - 1.50	1.40	(gr.)gl.gn. lys, litt båndet	40						
1.50 - 4.40	2.90	gr.hbl.biot.gn. Noen bånd gr.amf. Småfoldet	V						
4.40 - 5.95	1.55	gr.biot.gn. rel. mørk, lokalt litt kl. og hbl.	V						
5.95 - 6.20	0.25	gr.hbl.gn.							
6.20 - 10.30	4.10	gr.biot.gn. gr.rik, rel. mørk, lokalt litt hbl. Småfoldet	30						
10.30 - 11.50	1.20	gr.gl.gn. rel. lys	40						
11.50 - 11.65	0.15	gr.hbl.biot.gn. Rel. lys							
11.65 - 14.00	2.35	gr.biot.gn.	30-10						
14.00 - 14.40	0.40	kjernetap							
14.40 - 14.75	0.35	gr.biot.gn.	40-25						
14.75 - 15.05	0.30	gr.hbl.gn. lys	25						
15.05 - 15.33	0.28	gr.gl.gn.							
15.33 - 15.35	0.02	<u>cp.impr.</u> prh., py., cp.(-) i gl.gn.	50						
15.35 - 16.05	0.70	gr.gl.gn. gr.-gl.rik	V						
16.05 - 16.29	0.24	gr.hbl.gn.							
16.29 - 16.30	0.01	<u>stripe py.</u>	35						
16.30 - 18.00	1.70	gr.gl.gn. middels mørk, gr.-rik	30-50						
18.00 - 19.00	1.00	gr.biot.gn. mørk, gr.-rik	40-50						

Lokalitet : Mofjell Felt

Dato : 1969

Koordinater : ca. 3995 Ø, 160 S

Retning : rett nord

Helling/streiking : 70°

Høyde : ca. 205 m.o.h.

Lengde : 90.00 m

Borhull : 69 - 48

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19.00 - 19.70	0.70	gr.hbl.gl.gn. rel. lys							
19.70 - 20.00	0.30	kjernetap							
20.00 - 20.70	0.70	gr.hbl.(gl.)gn.Lys, kv.-feltsp.rik							
20.70 - 21.20	0.50	gr.biot.(hbl.)-gn.							
21.20 - 24.50	3.30	gr.?gn. gr.- og ?rik, tynn- prism., fiberliknen- de mineral, høytglan- sende, rel. hardt, o- livengrå, tverravson- dring (cyanit?, sil- limanit?, turmalin?)	V,30						23.7
24.50 - 27.05	2.55	gr.amf. mørk, tett	40-50						
27.05 - 30.50	3.45	musk.(biot).- gn. spor kis	40-50						
30.50 - 31.30	0.80	gr.amf. mørk, tett	30-20						
31.30 - 31.55	0.25	musk(biot).gn.							
31.55 - 31.85	0.30	gr.hbl.biot.- gn. mørk, tett	30						
31.85 - 32.10	0.25	musk.(biot.)- gn.							
32.10 - 32.40	0.30	gr.amf.							
32.40 - 32.60	0.20	(gr.)musk.biot.- gn. + gr.biot.- (musk.)gn. + gr.amf.	30						
32.60 - 33.30	0.70	gr.amf. mørk, tett	30-50						
33.30 - 35.40	2.10	gr.?(hbl.)gn. som mellom 21.20-							

Lokalitet : Mofjell Felt

Borhull : 69 - 48

Dato : 1969
 Koordinater : ca. 3995 Ø, 160 S
 Retning : rett Nord
 Helling/stigning : 70°
 Høyde : ca. 205 m.o.h.
 Lengde : 90.00 m

Side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		24.50 m, men med litt hbl. og litt gr.amf.	50-80						
35.40 - 44.50	9.10	gr.gl.gn. Småfoldet, rel. lys, gr.rik	V						
44.50 - 45.00	0.50	hbl.biot.gn.	70?						
45.00 - 46.80	1.80	musk.(biot.)gn.	70-80						
46.80 - 50.00	3.20	gr.gl.gn.	V						
50.00 - 52.40	2.40	gl.gn. lokalt litt gr. St. småfoldet	V						
52.40 - 55.30	2.90	musk.(biot.)- gn. lokalt litt gr. St. småfoldet	V						
55.30 - 55.95	0.65	(gr.)gl.gn.							
55.95 - 56.35	0.40	gr.hbl.gl.gn. sv. py.-impr.							
56.35 - 57.00	0.65	(gr.)gl.gn. sv. py.-impr.	80						
57.00 - 57.50	0.50	gr.hbl.gl.gn. sv. py.-impr.							
57.50 - 59.60	2.10	gr.gl.gn. spor grafitt	70-80						
59.60 - 60.00	0.40	(gr.)musk.- (biot.)gn.							
60.00 - 66.30	6.30	(gr.)gl.gn. tildels litt gra- fitt	60-80						64.6
66.30 - 66.95	0.65	gr.hbl.gl.gn.	70-80						
66.95 - 72.50	5.55	gr.hbl.biot.gn. småfoldet, sv.py- impr.	V						

Lokalitet : Mofjell Felt

Borhull : 69 - 48

Dato : 1969
Koordinater : ca. 3995 0, 160 S
Retning : rett nord
Helling, ~~avvik~~ : 70
Høyde : ca. 205 m.o.h.
Lengde : 90.00 m

Side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				0/0 Pb	0/0 Cu	0/0 Zn	0/0 S	0/0 Fe	
72.50 - 74.50	2.00	gr.biot.(hbl.)- gn.	sv. py.-impr.	50					
74.50 - 82.25	7.75	gr.hbl.biot.gn.	småfoldet, sv. py-impr.	V					
82.25 - 83.50	1.25	gr.biot.gn.		70-60					
83.50 - 84.40	0.90	gl.gn.	lys						
84.40 - 85.05	0.65	gl.gn.	middels grå, lysebrunt (mineral?)						
85.05 - 86.00	0.95	(gr.)hbl.biot.- gn.	rel. mye av et lysebrunt mineral						
86.00 - 87.70	1.70	gr.biot.gn.	lokalt litt hbl., lokalt samme mineral som ovenfor	V					
87.70 - 90.00	2.30	gl.gn.	lys, delvis litt gr.	V					

A. K.

Lokalitet : Mofjell felt

Borehull : GM 2

Kontrollmålt 1971

23754,9155
+ 194 m.o.h.

avviksmålt 1971

Dato : 1961
Koordinater : 2365 Ø, 1105 (GM's nett: 12440, 4705)
Retning : rett nord
Hellingssvingning : 80°
Høyde : +205 m.o.h. (barometrisk måling)
Lengde : 306.00 m

ny beregning 1970
måling 1976
Kokart :
925.476,0 X,
43.790,0 Y,
195 m.o.h.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	kjernetap							
0.80 - 1.20	0.40	gr.hbl.gl.gn.							
1.20 - 5.00	3.80	gr.biot.gn. rel. lys, gr.rik, noen få smale, hbl. førende striper	60-70°						
5.00 - 8.40	3.40	gr.musk.gn. lys, litt biot.	60						
8.40 - 21.30	12.90	gr.biot.gn. rel. lys, gr.rik, småfoldet i starten. Senere tildels m. sv. kisimpr. Mot slutten litt mere kis	V 70°						
21.30 - 29.40	8.10	gr.musk.gn. litt biot. I starten småfoldet, senere	V 50-60						
29.40 - 30.00	0.60	sv. impr. smale striper med py., prh., spor cp. og sf.	60-70						
30.00 - 31.55	1.55	gl.gn. lys, litt gr.							
31.55 - 32.20	0.65	pegm.							
32.20 - 36.00	3.80	gl.gn. lys, musk.rik, delvissv. py., prh.-impr. Litt småfoldet							
36.00 - 37.10	1.10	pegm.							
37.10 - 41.50	4.40	gr.biot.gn. rel. lys, sv. båndet. Småfoldet	70-90						
41.40 - 45.00	3.50	gr.musk.gn. lys, lite gr., småfoldet	70						

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1961

Koordinater : 23650, 110S

Retning : rett N

Borehull : GM2

Helling/~~signatur~~ 80°

Høyde :

Lengde : 306.00 m.

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
45.00 - 47.45	2.45	gr.biot.gn.	70						
47.45 - 47.80	0.35	striper med py., småfoldet cp., spor sf	70-30						
47.80 - 52.25	4.45	gl.gn. lys, gl.rik., sv. py.impr., småfol- det og litt båndet (gl.gn. avvekslen- de med musk.gn.)							
52.25 - 52.50	0.25	svovelkis i lys gl.gn.							
52.50 - 57.25	4.75	gl.gn. lys, gl.rik, litt båndet (gl.gn., avveksl. med musk- gn.). Småfoldet, sv. py.impr. (noe sterkere py.impr. på 53.55-53.65 og 54.40-54.50 m).							
57.25 - 58.60	1.35	musk.gn.	80-90						
58.60 - 58.90	0.30	m. sv. malmimpr. i gl.gn.							
58.90 - 60.65	1.75	gl.gn. gl.rik, båndet (gl.gn.+ musk.gn.) Småfoldet	V, 70-80						
60.65 - 60.75	0.10	m. sv. malmimpr. i gl.gn.							
60.75 - 66.20	5.45	gl.gn. småfoldet, litt båndet (gl.gn. + musk.gn.), litt gr., m. sv. py.- impr. (noe ster-							

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1961
 Koordinater : 2365 Ø, 110 S
 Retning : rett nord
 Helling/stigning : 80°
 Høyde :
 Lengde : 306.00 m.

Borehull : GM 2

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
		kere på 62.70 - 64.25 m).							
66.20 - 66.65	0.45	klor, hbl.gn.							
66.65 - 70.70	4.05	gl.gn.	60-70						
		båndet (gl.gn.+ musk.gn. + biot.gn.), litt gr.							
70.70 - 70.72	0.02	svovelkis							
70.72 - 73.55	2.83	gl.gn.							
73.55 - 73.70	0.15	m. sv. malmimpr.	75						
73.70 - 74.35	0.65	kjernetap							
74.35 - 74.70	0.35	m. sv. malmimpr.							
74.70 - 75.35	0.65	gl.gn.							
		noen amf.striper + litt klor							
75.35 - 76.80	1.45	pegm.							
76.80 - 77.75	0.95	amf.							
77.75 - 78.00	0.25	pegm.							
78.00 - 89.50	11.50	(gr.)gl.gn.	60-80						
		lys, homogen, sjelden noen mørkere bånd							
89.50 - 90.00	0.50	biot.gn.							
		båndet med meget biot.rike bånd							
90.00 - 103.00	13.00	gr.gl.gn.							
		lys, homogen, lite gr.							
103.00 - 105.00	2.00	båndet, gr.biot.-gn.	70						
		gr., (mørk gr.-biot.gn. og lys musk.gn.)							

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1961
 Koordinater : 2365 Ø, 110 S
 Retning : rett nord
 Helling/svingning : 80°
 Høyde :
 Lengde : 306.00 m

Borehull : GM 2

side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				0/0 Pb	0/0 Cu	0/0 Zn	0/0 S	0/0 Fe	
105.00 - 107.20	2.20	gr.hbl.biot.gn. småfoldet	50						
107.20 - 113.00	5.80	gr.amf. (+gr.-hbl.(biot.)gn.) småfoldet							
113.00 - 114.70	1.70	gr.biot.gn. småfoldet							
114.70 - 144.30	29.60	gr.hbl.(gl.)gn. småfoldet							
144.30 - 154.30	10.00	(gr.)gl.gn. lys, småfoldet, homogen							
154.30 - 155.50	1.20	kjernetap	70						
155.50 - 157.50	2.00	gr.gl.gn. lys, homogen, relativt lite gr.							
157.50 - 158.50	1.00	ka.gl.gn. lys, rel. lite karb.							
158.50 - 161.25	2.75	gr.gl.gn. lys, homogen, relativt lite gr.	70						
161.25 - 161.70	0.45	gl.gn. gl.rik, middels grå	V						
161.70 - 164.40	2.70	kjernetap	V, 70						
164.40 - 171.30	6.90	gr.hbl.gl.gn. rel. lys, gr.rik, delvis litt kisimpr.							
171.30 - 178.80	7.50	gr.gl.gn. rel. gl.rik, delvis noe hbl. Jevnt sv. py.impr. S avtar fra 70 til 0 grader (på 177.5 m) og tiltar deretter igjen (større fold?)							

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1961

Koordinater : 2365 Ø, 110 S

Retning : rett nord

Borehull : GM 2

Helling/signering : 80°

Høyde :

Lengde : 306.00 m

side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
178.80 - 180.10	1.30	gr.hbl.gl.gn. rel. lys, gr.rik. S=60 grader på 179.40 m							
180.10 - 180.70	0.60	gr.amf. rel. lys							
180.70 - 184.40	3.70	gr.hbl.gl.gn. rel. lys, sv. py- impr. Småfoldet rundt 0 grader	V, 0						
184.40 - 190.00	5.60	gr.biot.gn. sv. py.impr., lokalt litt hbl. Småfoldet							
190.00 - 191.35	1.35	gr.gl.gn.							
191.35 - 192.45	1.10	gr.hbl.gl.gn. båndet (gr.amf. + gr.gl.gn.). Sv. py- impr.	80						
192.45 - 195.00	2.55	gr.gl.gn. m. sv. py.impr.	80						
195.00 - 196.25	1.25	gr.amf.							
196.25 - 196.90	0.65	m. sv. malmimpr.i gl.gn. Litt små- foldet		0.01	0.10	0.26	4.59	10.51	
196.90 - 198.95	2.05	gl.gn. lys, litt gr.	80						
198.95 - 199.10	0.15	gl.gn. sv. kisimpr.							
199.10 - 199.60	0.50	malmimpr. py., sf.(mørk), prh.(÷), cp., ga(+)		0.16	0.60	1.59	5.63	14.40	

Lokalitet : Mofjell felt

Borehull : GM 2

Dato : 1961
 Koordinater : 2365 Ø, 110 S
 Retning : rett nord
 Helling/slagning : 80°
 Høyde :
 Lengde : 306.00 m

side 6

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
199.60 - 200.10	0.50	m. sv. malm-impr.	70-80	sp.	0.05	0.29	3.02	8.05	
200.10 - 200.30	0.20	(gr.)gl.gn. lys							
200.30 - 200.90	0.60	gr.hbl.gl.gn. m. sv. py.impr.							
200.90 - 206.80	5.90	gr.gl.gn. i starten m. sv. py.impr.							
206.80 - 207.00	0.20	m. sv. malm-impr.	)						
207.00 - 207.35	0.35	musk.gn.		0.10	0.12	0.55	2.86	?	
207.35 - 207.90	0.55	m. sv. malm.-impr.							
207.90 - 210.75	2.85	musk.gn. litt gr.							
210.75 - 210.80	0.05	m. sv. malm-impr.	)						
210.80 - 211.25	0.45	gr.gl.gn. lys							
211.25 - 211.45	0.20	m. sv. malm-impr.							
211.45 - 212.00	0.55	gl.gn. noen smale striper med kis.							
212.00 - 212.15	0.15	svovelkisrik litt sf. og cp	)						

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1961

Koordinater : 2365 Ø, 110 S

Borehull : GM 2

Retning : rett nord

Hellingssigning : 80°

Høyde :

Lengde : 306.00 m

side 7

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
212.15 - 213.00	0.85	m. sv. malm- impr.	i gl.gn. Småfol- det	) sp.	0.10	0.54	9.90	9.69	
213.00 - 213.10	0.10	pegm.		)					
213.10 - 213.30	0.20	gl.gn.		)					
213.30 - 213.60	0.30	sv. malmimpr.	i gl.gn. Småfol- det	)	0.10	0.12	0.48	3.54	5.80
213.60 - 214.00	0.40	gl.gn.		)					
214.00 - 214.10	0.10	m. sv. malmimpr.	i gl.gn.						
214.10 - 215.10	1.00	gl.gn.	litt gr.						
215.10 - 215.20	0.10	m. sv. malmimpr.							
215.20 - 215.40	0.20	gl.gn.							
215.40 - 215.50	0.10	py. og prh.rik	litt sf. og cp.						
215.50 - 215.65	0.15	m. sv. malmimpr.							
215.65 - 217.30	1.65	gl.gn.	litt gr., m. sv. py.-impr.						
217.30 - 217.60	0.30	biot.gn.	litt gr., litt hbl.						
217.60 - 217.80	0.20	malmimpr.		0.47	0.32	0.88	2.98	6.00	
217.80 - 217.90	0.10	gl.gn.	m. sv. py.impr.						
217.90 - 218.15	0.25	kvarts							
218.15 - 219.55	1.40	gr.gl.gn.							
219.55 - 220.05	0.50	malm	i kv.rik gn., noen hbl.striper	0.69	0.30	1.23	10.03	7.70	

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1961

Koordinater : 2365 Ø, 110 S

Retning : rett nord

Borehull : GM 2

Hellingssvingning : 80°

Høyde :

Lengde : 306.00 m

side 8

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
220.05 - 220.65	0.60	biot.gn. sv. py.impr.							
220.65 - 220.75	0.10	god malm							
220.75 - 220.85	0.10	malm-impr.		1.98	0.10	6.07	7.41	6.58	
220.85 - 221.10	0.25	biot.gn.							
221.10 - 221.20	0.10	malm							
221.20 - 221.65	0.45	gr.gl.gn.							
221.65 - 222.00	0.35	sv. malm-impr.		0.26	0.44	0.32	4.47	10.40	
222.00 - 223.10	1.10	gr.gl.gn.							
223.10 - 223.45	0.35	malm-impr. py., sf.							
223.45 - 223.80	0.35	malm-impr. ga., py., sf., cp., litt hbl.		0.78	0.68	0.40	4.80	12.80	
223.80 - 225.25	1.45	(gr.)gl.gn.							
225.25 -		sf., cp., prh.(+), på kontakten ga.							
225.25 - 225.65	0.40	kvarts							
225.65 - 230.15	4.50	gr.gl.gn. noen smale striper gr.biot.gn. på 228.35-228.40 m og 229.75-229.80 m.							

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1961

Koordinater : 2365 Ø, 110 S

Retning : rett nord

Borehull : GM2

Helling/stigning : 80°

Høyde :

Lengde : 306.00 m

side 9

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
230.15 - 230.25	0.10	kvarts							
230.25 - 234.60	4.35	gr.gl.gn. lys, homogen, småfoldet	60						
234.60 - 237.50	2.90	gr.biot.gn. bandet, småfoldet							
237.50 - 251.90	14.40	gr.gl.gn. lys, homogen, rel. lite gr., delvis litt bandet, småfoldet	70						
251.90 - 252.50	0.60	pegm.							
252.50 - 253.10	0.60	gr.gl.gn. lys							
253.10 - 253.40	0.30	gr.biot.gn. småfoldet, mørk							
253.40 - 256.30	2.90	gr.gl.gn. lys, småfoldet	70						
256.30 - 256.70	0.40	pegm.							
256.70 - 260.40	3.70	gr.gl.gn. lys, småfoldet	70						
260.40 - 260.75	0.35	gr.biot.gn.							
260.75 - 262.35	1.60	gr.hbl.gl.gn. rel. lys	70						
262.35 - 264.60	2.25	gr.gl.gn. spredt karb.holdig, lys							
264.60 - 265.60	1.00	gr.biot.gn. middelsgrå, m. sv. py.impr.	70						
265.60 - 266.14	0.54	sv. malmimpr. i biot.gn.		0.16	0.07	0.38	2.83	8.66	
266.14 - 266.60	0.46	ditto		0.12	0.10	0.66	2.81	9.79	

Lokalitet : Mofjell felt

Dato : 1961

Koordinater : 2365 Ø, 110 S

Retning : rett nord

Borehull : GM 2

Helling/stigning : 80°

Høyde :

Lengde : 306.00 m

side 10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
266.60 - 267.80	1.20	malm i gl.gn.	70	1.15	0.21	3.07	5.57	8.39	
267.80 - 268.10	0.30	sv. py.impr. i gl.gn., delvis musk.rik.		sp.	0.12	0.24	5.89	6.20	
268.10 - 269.60	1.50	gr.gl.gn. m. sv. py.impr.							
269.60 - 269.90	0.30	gr.amf. rel. lys.	70						
269.90 - 275.50	5.60	gr.hbl.gl.gn. småfoldet, rel.lys							
275.50 - 277.40	1.90	gr.hbl., "augen-gneiss" lys, gr.amf. med hvite render rundt granat. Småfoldet							
277.40 - 277.90	0.50	biot.gn.							
277.90 - 280.00	2.10	gr.amf. (+ gr.- rel. lys hbl.(gl.)gn.)							
280.00 - 282.40	2.40	gr.hbl.biot.gn. (+ gr.biot.(hbl.)- gn.). Småfoldet							
282.40 - 287.05	4.65	gr.gl.gn. lys	75						
287.05 - 287.25	0.20	gr.hbl.biot.gn. Mørk.	75						
287.25 - 292.65	5.40	gr.gl.gn. lys, litt småfoldet. Noen smale band gr.hbl.gl.gn. på 290.65-290.75 m, 291.65-291.75 m og 291.95-292.05 m	70						
292.65 - 292.85	0.20	gr.amf. mørk	70-80						
292.85 - 295.25	2.40	gr.gl.gn.	70-80						
295.25 - 295.50	0.25	gr.amf.							

Lokalitet : Mofjell felt

Borehull : GM 2

Dato : 1961
Koordinater : 2365 Ø, 110 S
Retning : rett nord
Helling/skilling : 80°
Høyde :
Lengde : 306.00 m

side 11

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
295.50 - 303.45	7.95	gr.gl.gn. lys, litt båndet p. g.a. noen smale band gr.hbl.gl.gn. Litt småfoldet	80						
303.45 - 306.00	2.55	gr.biot.gn. rel. lys, småfoldet Noe karb.holdig.	80						
N.B. Kassene fra 190.00 til 230.00 m manglet. Beskrivelsene for dette intervall ble tatt etter den opprinnelige beskrivelsen fra 1961.									
A. K. 1970									

GM hull 2

2365 Ø. 110 S

(G.M.S. nett: 12440, 4705) Pb Cu Zn S

M = +205 m.o.h.

Helning 80° mot N.

Höjdemåling barometrisk

ØkoKoord. 925.476,0 X / 43.790,0 Y / 195 m.o.h.

0.02 0.02 0.02 Ki. tap

2.02 2.65 1.83 gr. fl. pr.

Alle (gr) fl. pr. klipp mellem sk. og pr.

2.65 5.15 2.50 gr. fl. pr.

nuen auf. rids. striga. hiel. mull.

5.15 8.05 2.90 gr. mm. k. pr.

8.05 9.45 1.40 gr. fl. pr.

meget sv. Ki. impr.

9.45 9.77 0.34

+ lgs. fulbrun mineral

9.77 10.20 0.51 p. fl. pr.

0-10 m: 20-80

10.20 10.57 0.37

+ lgs. fulbrun mineral. b.m.

10.57 11.00 0.43 p. fl. pr.

+ lgs. fulbrun mineral. b.m.

meget sv. Ki. impr.

11.00 11.60 0.60

meget sv. Fels. impr. b.m.

11.60 11.77 0.17 pefm.

11.77 12.43 0.66 p. fl. pr.

meget sv. Fels. impr. b.m.

12.43 12.55 0.12 p. birl. pr.

Kis impr. litt. ang.

12.55 14.80 2.25 p. fl. pr.

delvis sv. Fels. impr. b.m.

14.80 14.90 0.10 pefm.

14.90 16.33 1.43 p. fl. pr.

16.33 16.87 0.54 p. fl. pr.

+ lgs. fulbrun mineral. litt. ang.

16.87 18.06 1.19 p. fl. pr.

b.m.

18.06 18.45 0.39

+ lgs. fulbrun mineral. Fels.

18.45 21.41 2.96 p. birl. pr.

meget sv. Ki. impr.

21.41 21.56 0.16 pefm.

21.56 22.20 0.64 p. fl. pr.

20-20 m: 100-1000 m. p.m.

22.20 22.26 0.06

+ lgs. brunful mineral

22.26 22.76 0.50 p. fl. pr.

litt. fl.

22.76 23.00 0.24 p. fl. pr. ang. f.m.

skarpfaldet b.m.

23.00 23.00 0.00 lgs. gr. fl. pr.

lgs. anordnende med
med Kien pr.

GM 2.

Höhe	pro	A:1	metr		Pb	Cu	Zn	S
29.40	29.97	0.57	FeS + FeS ₂ -impr. i gl. m. Lymp.					
29.97	30.00	0.63	FeS + FeS ₂ + mörke Zul + Cu-Kis-impr. men bist.					
	30.97	0.37	fl. m.	bzm				
	31.17	0.20	pepm.					
31.17	31.24	0.07	litt Zul i gl. m.					
31.24	31.57	0.33	fl. m.	bzm				
31.57	32.01	0.44	pepm.	30-40m: jö-ö				
32.01	32.59	0.60	fl. m.					
32.59	32.83	0.24	litt Cu-Kis, litt Zul i gl. m.					
32.83	33.37	0.54	sv. FeS, FeS ₂ , Cu-Kis-impr. i gl. m. mörkspädd					
33.37	33.97	0.60	fl. m.					
33.97	34.15	0.18	sv. Cu-Kis + Zul impr.					
34.15	36.00	1.85	fl. m.	gr. Kornet				
36.00	37.15	1.15	pepm.					
37.15	38.16	1.00	fr. fl. m.					
38.16	39.50	0.34	fr. bitl. m.					
39.50	40.00	1.50	fr. fl. m.					
40.00	41.45	1.45	fr. frände fl. m.	mittelfr, bzm, dehl/folkes				
41.45	41.58	0.13	pepm.	40-50m: dehl/folkes				
41.58	46.97	5.41	fr. frände fl. m.	m = b.				
46.97	47.32	0.35	sv. impr. m. Cu-Kis, FeS ₂ , litt Zul i bist + vidare fl. sk.					
47.32	47.44	0.12	fl. sk.	lymp.				
	47.77	0.33	FeS ₂ , Zul - litt Cu-Kis frände.	bist. riken.				
47.77	50.84	3.07	mörk sk.	sv. Kis-impr.				
50.84	51.77	0.93	rik i FeS + FeS ₂					
51.77	52.16	1.39	fl. sk., gånsett i r	m = b				
52.16	52.60	0.44	rik i FeS + FeS ₂	50-60m: stark dehl/folkes gl. smitt. eller: 70.00				
52.60	52.90	0.30	fl. m.	m = b				
52.90	52.93	0.17	FeS ₂ FeS-impr.					

Ex 100 100 100 100

52.00 53.50 0.50 gl. fm.

53.50 55.65 0.12 FeS₂ + FeS - impr

55.65 57.27 0.62 fl. fm.

57.27 59.36 0.09 FeS₂ + FeS - impr.

59.36 61.25 0.89 fl. fm.

61.25 63.26 1.11 musk. fm.

63.26 65.00 0.64 impr. m. m. x 2.5, lett Cu - dr., FeS.

65.00 67.66 1.66 fl. fm.

67.66 69.72 0.06. traige m. 2.5

69.72 71.02 0.30. St. impr. m. 2.5

71.02 73.20 2.18 gr. fr. en de fl. fm. met 1 FeS + FeS₂ - traige (67.70-68.70)

73.20 75.00 2.80 fl. fm.

75.00 76.22 0.22 auf fr. en de fl. fm.

76.22 77.60 0.38 auf b. litt

77.60 79.00 0.40 fl. fm.

79.00 80.79 1.79 musk. fm.

80.79 82.30 2.51 fl. fm.

x 82.30 84.88 0.58 FeS + FeS₂ - impr

84.88 87.55 1.67 fl. fm.

x 87.55 90.67 0.12 impr. m. FeS₂ 2.5

x 90.67 92.36 0.69

x 92.36 94.68 0.32 2.5 - traige

94.68 97.35 0.67 fl. fm.

97.35 100.78 1.43 p. fm.

100.78 103.75 0.97 gr. fr. en de auf fl. fm.

103.75 106.00 0.25 p. fm.

106.00 108.51 0.51 p. fl. fm. auf fr. en

108.51 110.74 0.23 fl. fm.

p. f. a. detail, foldampr.

50-100: del. 2.5 del. 1.5

allens ca 70°

del. 1.5 litt gr. fr. en de

gr. fr. en

p. k., seamm, p. k. p. k.,

lyse - mittel, p. m.

litt gr.

litt gr.

fl. fm.

70-80, 70-80

nen auf fr. en de traige, lett klant.

lyse 2

Gm. 2.

Kt. +	d:1	vekt		80-90m: 70-70'	Ph	Ca	Zn	S
78.76	81.92	0.18	pepm.	lett gr. frænd, lyxprå				
78.76	80.60	1.68	fl. m.	lett amf. frænd, mikk				
80.75	80.75	0.15	birk sk.	lett gr., lyxprå				
89.75	89.75	9.00	fl. m.	nødd, delvis detali, foldet				
89.85	89.85	0.10	amf. birk sk.	lett pr., lyxprå, monst				
94.85	94.80	4.95	fl. m.	90-100m: 65-80'				
94.85	94.93	0.13	pepm.	små p. frænd, monst				
102.92	103.07	8.14	fl. m.					
103.17	103.19	0.12	amf. b. lett					
103.19	103.67	0.42	fl. m.	monst b. sk. pr.				
103.67	103.90	0.23	pr. b. sk. m.	lett amf. frænd				
103.90	104.35	0.45	fl. m.	p. frænd				
104.35	104.80	0.45	pr. b. sk. m.	lett amf.				
104.80	105.2	2.20	fl. m.	nær b. sk. m. sk. pr.				
105.2	108.10	3.10	amf. o. pr. frænd fl. m. o. pr. amf. b. lett. detalj, foldet					
108.10	108.77	0.67	amf. b. lett.	100-110m: 60-80'				
108.77	110.24	1.23	pr. amf. b. lett					
110.24	112.50	1.50		detalj, foldet				
112.50	112.78	1.28	amf. b. lett	110-120m: detalj p.				
112.78	121.10	8.32	pr. fl. m., amf. frænd	b. sk. m. m. d.				
121.10	125.00	1.90	amf. frænd fl. m.					
125.00	123.13	0.13	pepm.	120-130m: stærk detalj, foldet				
123.13	123.57	0.44	pr. frænd amf. fl. m.	gf. m. sk. eller ca 70'				
123.57	125.64	0.07	svarte birk m.					
125.64	125.80	0.00	fl. m.	lyxprå				
125.80	137.08	13.18	gr. frænd fl. m. delvis amf. frænd alle m.					
			amf. sk. pr., b. sk. Som bestemt p. i sk. amf.					
			frænd fl. m. ap. sk. frænd (fl. m. - 2 m. d.)					
137.08	144.33	2.29	amf. fl. m.	130-140m: b. sk. amf. fl. m.				
				4 m. sk. p. b. sk. m. d.				

L. nr	pr	til	medt		Til
140.37	141.94	1.47	p. fl. m.		delv. anf. pr. de. m. l. l. g. p.
141.84	141.97	0.13	Kvalitet		130-140 m. delv. l. l. g. p.
141.97	142.66	0.69	gr. anf. pr. de. fl. m.		
142.66	142.77	0.11	p. fl. m.		170-180 m. delv. l. l. g. p.
142.77	144.27	1.50	p. pr. de. fl. m.		delv. anf. pr. de. m. l. l. g. p.
144.27	144.80	0.52	p. pr. de. fl. m.		l. l. g. p.
144.80	144.95	0.15	anf. pr. de. pr. fl. m.		(b. m.)
144.95	145.50	0.55	fl. m.		m. l. l. g. p.
145.50	146.20	0.70	K. vid. fl. m.		l. l. g. p.
146.20	148.58	2.38	p. pr. de. fl. m.		K. vid.
148.58	148.68	0.10	p. b. l. m.		
148.68	153.70	5.02	fl. m.		K. vid. anf. l. l. g. p.
153.70	153.72	0.02	b. l. id. vand. ex. 2 pr. de.		land, i. l. l. g. p.
153.72	154.12	0.40	fl. m.		
1.33	154.12	1.53	K. m. l. p. p. l. l. g. p.		forl. l. l. g. p.
			de samme herde pr. de.		
155.45	155.70	0.25	fl. m.		100-120 m. l. l. g. p.
155.70	155.72	0.02	b. l. id. vand. ex. 2 pr. de.		land, i. l. l. g. p.
155.72	160.73	5.01	fl. m.		l. l. g. p.
160.73	161.20	0.47	dit.		l. l. g. p.
161.20	161.63	0.43	fl. m.		l. l. g. p.
2.74	161.63	164.37	2.74	K. m. l. p. p. l. l. g. p.	
164.37	165.76	1.39	p. fl. m.		l. l. g. p.
165.76	165.90	0.14	p. fl. m.		100-120 m. l. l. g. p.
165.90	167.13	1.23	p. fl. m.		l. l. g. p.
167.13	169.70	2.57	p. pr. de. anf. fl. m.		st. l. l. g. p.
169.70	170.34	0.64	p. anf. b. l. l. g. p.		
170.34	170.62	0.28	p. pr. de. fl. m.		st. l. l. g. p.

GM 2.

				Pb	Cu	Zn	S
170.62	171.21	0.54	gr. amf. f. m.	sv. limmpu			
170.78	171.23	0.42	gr. amf. f. m.	" 170-180m: sand detef.			
171.23	171.44	0.21	gr. amf. f. m.	"			
171.47	171.58	0.11	gr. amf. f. m.	mss			
171.58	172.00	0.42	gr. f. m.	sv. limmpu litt amf.			
172.00	172.41	0.41	"	mest sv. limmpu			
172.41	172.71	0.30	gr. amf. f. m.	"			
172.71	172.87	0.16	gr. amf. f. m.	" 170-180m			
172.87	172.98	0.11	gr. f. m.				
172.98	173.15	0.17	gr. amf. f. m.	gult sv. f. m., f. m.			
173.15	173.21	0.06	gr. amf. f. m.	mest sv. f. m.			
173.21	173.20	0.00	gr. f. m.	" litt amf.			
173.20	173.40	0.20	gr. amf. f. m.	" 183-184m: skiff/djerna			
173.40	173.58	0.18	gr. f. m.	" 100-150m: sand detef.			
173.58	173.84	0.26	gr. amf. f. m.	sv. FeS ₂ -imp.			
173.84	174.11	0.27	gr. f. m.	190-200m: ca 80°			
174.11	174.30	0.19	gr. amf. f. m.	sv. FeS ₂ -imp.			
174.30	174.46	0.16	"	FeS ₂ -imp.			
174.46	174.80	0.34	gr. f. m.	sv. FeS ₂ -imp.			
174.80	175.00	0.20	gr. f. m.	mest sv. FeS ₂ -imp., litt amf.			
175.00	175.92	0.92	gr. amf. f. m.				
175.92	176.25	0.33	amf. f. m.	epit. f. m.			
176.25	176.70	0.45	imp. m. ZnS, FeS ₂ , litt PbS + Cu-Kis i f. m. delv.		0.01	0.10	0.26 4.59
				detef. f. m.			105 Fe
176.70	177.70	1.00	f. m.	lyt. m. delv. p. mss			
177.70	178.30	0.60	"	sv. f. m. litt p.			
178.30	179.05	0.75	f. m.	sv. limmpu 63m			
179.05	179.58	0.53	imp. m. ZnS, FeS ₂ , delv., litt FeS, litt Cu-Kis, litt		0.16	0.60	1.59 5.62
				PbS, m. ZnS			1440 Fe

Gm 2

Kilogramm 1.1 met

Ph C Zn S

195.58 200.01 0.44 sv. FeS₂-impr. i fl. sk. men an f. sk. sk. per }

sp. 0.05 0.29 3.02
8.05% Fe

200.02 200.09 0.07 sk. sv. ZnS-impr.

200.09 200.30 0.21 fl. sk., p. f. sk.

lyxpi

200.30 200.39 0.09 p. sk. fl. m.

myer sv. FeS₂-impr.

200.39 202.71 1.89 p. fl. m.

..

1.00

202.71 203.12 0.47 fl. m.

sv. FeS₂, Fe-impr. fl. p. sk.

203.12 206.79 3.67 p. p. fl. m.

222

206.79 206.78 0.12 FeS₂-impr., litt ZnS, litt Cu sk. : mund. sk.

206.78 207.33 0.55 mund. sk.

200-210 m: p. 8.5

0.10 0.12 0.53 2.80
3 0.08% Fe

207.33 207.89 0.56 sv. ZnS + FeS₂-impr. + litt Cu sk. + litt ZnS : mund. sk.

207.89 210.75 2.86 mund. sk.

litt p.

210.75 210.79 0.04 " myer sv. ZnS, Cu sk., FeS₂, FeS-impr.

210.79 211.23 0.44 p. f. sk. fl. sk.

moh

211.23 211.44 0.21 p. sk. sv. ZnS + Cu sk. + FeS₂-impr.

211.44 211.98 0.54 uregelmessige smale FeS₂ + litt CuFeS₂ - sk. per i fl. sk.

211.98 212.16 0.18 rik. FeS₂, sammensatte krystaller, myer litt ZnS + Cu sk. } sv 0.10 0.54 9.90
3.69% Fe

212.16 213.00 0.84 sv. ZnS + Cu sk. + FeS₂-impr. + fl. sk.

detaljert

213.00 213.60 0.60 p. sk.

210-210m

213.60 213.72 0.12 fl. sk.

0.10 0.12 0.48 3.56
5 8.0% Fe

213.72 213.62 0.31 uregelm. i smale sk. per impr. m. litt ZnS, FeS₂, litt CuFeS₂

i fl. sk.

detaljert

213.62 214.00 0.37 fl. sk. p. 213.87 m: 1 cm FeS₂ + litt ZnS

214.00 214.00 0.10 sv. ZnS + FeS₂-impr. i fl. sk.

214.00 214.74 0.44 fl. sk.

214.74 214.74 0.00 bitt. sk.

svat, litt, skenlige men?

214.74 215.00 0.54 fl. sk.

litt p., sk. per av CuFeS₂ + FeS

215.00 215.20 0.10 sv. FeS₂-impr.

215.20 215.40 0.20 fl. sk.

215.40 215.40 0.00 rik. FeS₂, FeS + litt Cu sk. + litt ZnS

gr	alt	met			PL	Q	Z	S
215.50	215.60	0.13	magt sv. Fels + Znd. impr.					
215.60	215.65	0.02	rik i PbS_2 + FeS_2 litt Cu-Kis					
215.62	217.27	0.64	fl. sk. delvis magt sv. Fels + Cu-Kis-impr. , litt gr					
217.27	217.57	0.30	dita, biot. rik, noen lye pinner amp. rike stuper.					
217.57	217.77	0.90	Znd-stupe + litt Fels + Cu-Kis	0.47, 0.32, 0.88, 2.98, 6.00	0.47	0.32	0.88	8.98 6.00
217.77	217.92	0.15	fl. sk. magt sv. FeS_2 -impr.					
217.92	218.16	0.24	Kvartsitt, hvit, porrk		0.79 PbS			
218.16	219.54	1.38	fr. færende fl. fr. b. m			0.06 FeS_2		
219.54	220.02	0.48	gnd meln: Znd, FeS_2 , PbS, Cu-Kis i kv. rike sk.		0.69	0.30	1.25	10.03
			av og litt amp. rike stuper.				7.70 FeS_2	
220.02	220.67	0.65	fl. sk., sv. FeS_2 -impr. b. m					
220.67	220.76	0.09	gnd meln: Znd, PbS, Cu-Kis, FeS_2 , litt FeS	1.64 m				
220.76	220.83	0.07	impr. av Znd, PbS, FeS_2	2.25 Z 0.02 Pb	1.98	0.10	6.07	7.41
220.83	221.10	0.27	fl. sk. b. m				6.58 FeS_2	
221.10	221.18	0.08	meln: FeS_2 , Znd					
221.18	221.64	0.46	fr. færende fl. fr.					
221.64	222.00	0.36	sv. Znd, FeS_2 -impr. hinknet	0.26, 0.44, 0.32, 4.47, 10.40	0.26	0.44	0.32	4.47 10.40
222.00	223.00	1.00	fl. sk., fr. færende m. b					
223.00	223.45	0.37	delvis magt sv. Znd + FeS_2 -impr. 220-223 m. de. luff?		0.78	0.60	0.40	4.80
223.45	223.77	0.32	impr. m. PbS, Fels, Znd, Cu-Kis, amp. færende				0.40	4.80
223.77	225.23	1.46	fl. sk., fr. færende b. m				12.68 FeS_2	
225.23	225.25	0.02	Znd + Cu-Kis, litt FeS + PbS, contact zone + amp.				19.80	
225.25	225.65	0.40	Kvartsitt hvit, porrk, p. 225.50: PbS-stripe					
225.65	228.35	2.70	fr. færende fl. fr. b. m					
228.35	228.40	0.05	fr. biot. sk. svart					
228.40	229.74	1.34	fr. færende fl. fr. m. b					
229.74	229.80	0.06	fr. biot. sk. svart					
229.80	230.13	0.33	fr. færende fl. fr. m. b					
230.13	230.21	0.08	Kvartsitt.					

[illegible]

Gm 2.

nr	lit	met		Pt	Ca	Sn	S
266.6	266.6	0.46	266.6 malm: FeS ₂ , ZnS, litt Cu-Kis i fl. vika fl. sk.	0.12	0.10	0.66	2.81
266.6	267.0	1.20	267.0 malm: ZnS, FeS ₂ , litt PbS + Cu-Kis, delvis färgad malm PbS + Cu-Kis, förhållande i sk. se malm FeS ₂ , litt FeS, 2 fl. vika fl. sk, b m	0.15	0.21	3.07	5.57
267.8	268.0	0.28	268.0 m. kummel, malm Cu-Kis, FeS ₂ + FeS: fl. vika fl. sk	sp.	0.12	0.24	5.89
268.0	268.0	0.32	268.0, sk., kis-impr. b m, litt m.				6.20
268.0	269.0	0.20	269.0 f. färgad malm fl. sk.				
269.0	269.6	0.66	269.6 f. färgad fl. sk., kis-impr.				
269.6	269.8	0.15	269.8 f. amfibolit (amfibolit m. lerkantig sken kis-impr. malm fl. sk. färgad)				
272.5	272.5	2.69	272.5 f. fl. f. m., kis-impr.				
272.5	273.0	0.50	273.0 f. amfibolit,				
273.0	275.5	2.50	275.5 f. amf. fl. f. m., kis-impr.				
275.5	277.3	1.82	277.3 f. amfibolit				
277.3	277.8	0.50	277.8 f. amf. bisk. m				
277.8	281.4	3.61	281.4 f. amfibolit				
281.4	281.5	0.09	281.5 p. m.				
281.5	282.4	0.91	282.4 amfibolit, f. färgad				
282.4	287.0	4.62	287.0 f. fl. f. m.				
287.0	287.2	0.21	287.2 f. amfibolit				
287.2	290.6	2.35	290.6 f. fl. f. m.				
290.6	290.7	0.10	290.7 f. amfibolit				
290.7	291.5	0.87	291.5 f. fl. f. m.				
291.5	291.8	0.10	291.8 f. amfibolit				
291.8	292.9	0.27	292.9 f. färgad fl. f. m.				
292.9	292.9	0.41	292.9 f. amfibolit				
292.9	292.6	0.37	292.6 f. färgad fl. f. m.				
292.6	292.9	0.32	292.9 f. amfibolit				
292.9	292.6	0.37	292.6 f. färgad fl. f. m.				

Start	Stop	Dist	Observation
295.64	295.74	0.10	fr. amphibolit
295.74	295.95	1.55	fr. frende fl. mass
295.95	295.98	0.21	fr. amphibolit
295.98	295.99	6.32	fr. frende fl. fr. med men. små ang. rittere eller gr. amphibolit - streper

H.3. Diabas 1/4 km. og p. masser (med eller uten granat)
er stort sett kvartsitt

De amphibol frende bergarter er bestandig
epidot (klinozoit?) friende

Detaljerte minne opiler veldig sterkt inn og
faller i hvert fall 1:1 dels avvekslingene
mellom 2 bergarter (som f.eks. fr. amphibolit
med fr. frende fl. fr. mellom 140 og 200 m)

Boringene ble utført med de svenske
pulverkraner diaborit og H10 som
på Mo fjellet øst for en fjernminne av
100 m/kran (man regner vanligvis med
80 m/kran i den slup bergarter).

GM hull 1.

1976 Østkoordinater:
925.476,0X/43.790,0Y, 195 m o.h.
Innmålt 1971: 2375 Ø, 91,5 S, +194 moh.

K-top	fra	til	målt		
				2365 Ø, 110 S	(GM-målt 1244 Ø, 470 S) Pb Cu Zn S
				H = +205 moh barometer Loddhull nedover	nå bar høyde: +205 m
Innmålt i K-kedverdi: 1976: 925.476,0X/43.790,0Y, +195 m o.h.					
0.65	0	0.65	0.65	Kjernetop	
0.65	4.60	3.95	gr. gl. gn.		litt an f. f. rind
4.60	4.85	0.25	pefm.		
4.85	7.45	2.60	mørk. gn., gr. f. rind		lysegrå - hvit, men blik. v. k. streper
7.45	11.60	4.15	gr. gl. gn.		10-15 m: 70-80°
11.60	12.10	0.50	pefm.		
12.10	16.00	3.90	gr. gl. gn.		10-20 min. l. g.
16.00	18.15	2.15	"		sv. FeS ₂ - impr.
18.15	18.20	0.05	"		+ l. s. fulbrun mineral (epidot, ZnS?)
18.20	18.50	0.30	gr. gl. gn.		20-30 m: 60-80°
18.50	18.55	0.05	"		+ l. s. fulbrun mineral
18.55	19.70	0.15	gr. gl. gn.		på 19.75 m: slapp m. belh. 20°
19.75	19.95	0.20	"		lysegrå - hvit
19.95	20.05	0.10	"		+ l. s. fulbrun mineral
20.05	20.46	0.41	"		
20.46	20.53	0.07	gr. gn., litt rik.		
20.53	21.12	0.59	gr. gl. gn., an f. rind i streper		+ l. s. fulbrun mineral, mindre gr.
21.12	21.90	0.78	"		på 21.34 og 21.72: slapp, belh. 50°
					i retning av skilingsplan
21.90	22.15	0.25	gr. gl. gn.		sv. FeS ₂ - impr.
22.15	22.20	0.05	"		ZnS - f? mindre gr.
22.2	24.55	2.35	"		22.22 m: slapp 60° i skilingsplan
24.55	24.70	0.15	pefm.		
24.70	25.70	1.00	gr. gl. gn.		
25.70	27.42	1.72	Kv. rik. mørk. gn., gr. f. rind		
27.42	27.74	0.32	pefm.		
27.74	29.00	1.26	gr. f. rindende gl. gn.		

top	for	t.l.	metr		Pb	Cu	Zn	S	V
29.08	29.20	0.12	pefm						
29.20	29.28	0.08	gl.fm.						
29.28	29.48	0.20	gl.fm.	Zn + Fe ₂					
29.48	30.00	1.32	gl.fm.	sv. impr.					
30.80	31.54	0.74	mul. fm.					30-40-60-80°	
31.54	31.57	0.03		ZnS					
31.57	31.97	0.40							
31.97	34.00	2.03		sv. Zn + Fe ₂ impr.					
34.00	34.45	0.45		sv. FeS ₂ impr.					
34.45	36.30	1.85	fl. fm.	sv. FeS ₂ - impr.					
36.30	38.85	2.55	mul. fm. pr. föränd						
38.85	42.20	3.35	gl. fm. pr. föränd					40-60-80-90°	
42.20	47.35	5.15	gl. fm.	ZnS + FeS ₂ - impr.					
47.35	46.15	2.80	gl. fm. med pefm. skivor av sm. kända	sv. FeS ₂ - impr.					
46.15	46.50	0.35	gr. fl. fm. anf. föränd						
46.50	51.95	5.05	gr. anf. fl. fm.					40-50-60-80°	
51.95	52.30	0.35	anf. föränd gr. fl. fm.						
52.30	50.80	0.50	kvartsitt	hvit, grovkornet					
50.80	54.00	3.20	gr. föränd anf. fl. fm.	feltop. porf. grobl.					
54.00	54.30	0.30	kvartsitt	hvit, finst.					
54.30	56.80	2.50	anf. föränd gr. fl. fm.	epidyt (klorozinit) / FeS ₂ impr.					
56.80	58.95	2.15	gr. anf. fl. fm.	FeS ₂ - impr.					
58.95	60.00	1.05	gr. föränd fl. fm.					50-60-80°	
60.00	61.90	1.90	fl. fm.	sv. FeS ₂ impr. typ. pefm., mul. skivor					
61.90	63.30	1.40	fl. fm. pr. föränd						
63.30	63.45	0.15	gr. anf. föränd fl. fm.						
63.45	64.00	0.55	fl. fm. pr. föränd						
64.00	65.10	1.10	fl. fm.					60-80-45°	
65.10	66.00	0.90	gr. fl. fm. anf. föränd					60-70-60-80°	

Temp	tra	höl	mark		Pb	Ca	Zn	S
66.90	68.85	1.95	pr. fl. fr., amp. föränd.	sv. Fe ₂ -impr.				
68.85	68.95	0.10	pejm.					
68.95	71.55	2.60	pr. fl. fr., amp. föränd.					
71.55	71.95	0.40	pejm m. fl. fr. - streper.					
71.95	74.10	2.15	fl. fr. m. små pejm - streper	70-80m: 80-90				
74.10	76.13	2.03	amp. f. pr. fl. fr.	sv. Fe ₂ -impr.				
76.13	77.85	1.72	fl. fr.	delvis pr. föränd				
77.85	82.75	4.90	mind. fr.	delvis litt pr. föränd, delvis fältsp. påsprid. of bilt. kl. i b. b.				
82.75	83.45	0.70		a litt Ca - lös + magnetit impr. men b. b.				
83.45	86.82	3.37	mind. fr.					
86.82	87.00	0.18	pejm.	80-90m: 80-90				
87.00	87.90	0.90	bänd fl. fr.					
87.90	88.50	0.60	mind. fr.					
88.50	89.10	0.60	amp. fl. fr.	mind. - porf., decussat, mye fältsp. påsprid.				
89.10	89.43	0.33	amp. b. b.	fältsp. i b. b. of bänd, detalj. (det.)				
89.43	96.45	7.02	mind. fr.	litt pr. föränd, litt kv. fältsp. streper				
96.45	97.20	1.35	pr. amp. föränd fl. fr. med mind. fr. bänder	90-100m: 80-90				
97.20	100.67	2.87	mind. fr.	delvis pr. föränd				
100.67	101.27	0.60	amp. föränd pr. fl. fr.					
101.27	102.40	1.13	bänd fl. fr.	delvis pr. föränd				
102.40	112.40	10.00	mind. fr.	delvis litt pr. föränd				
112.40	112.40	0.20	pejm.	100-110: 80-90, slippfilds				
112.40	112.43	0.83	mind. fr.	litt pr. f. små kv. fältsp. bänd				
112.43	113.42	0.99	kvartitt	hvit, porf. kornt.				
113.42	115.05	1.43	mind. fr.	delvis pr. föränd, bänd				
115.05	118.35	3.30	bänd pr. fl. fr.	bänd pr. f. avskiljande				
				fl. of kv. platt.				

Kitet fra til mekt

Tb Ca Zn S

118.35	118.60	0.25	bånd gr. amf. fr.	110-120 m. stål skeliff	
118.60	122.90	4.30	gr. førende fl. fr.	uregelmæssig, p. 112 m.	
122.90	123.25	0.35	gr. amf. fr.		
123.25	125.57	2.32	gr. førende fl. fr.		
125.57	126.00	0.43	gr. amf. fr.	120-130 m. stål skeliff	
126.00	126.50	0.50	fr. førende fl. fr.	uregelmæssig fr. amf. p. 120 m.	
126.50	127.25	0.75	gr. amf. fr.	fr. fl. fr. p. 120 m. stål skeliff	
127.25	130.43	3.18	fr. førende fl. fr.		
130.43	130.50	0.07	fr. amf. fr.		
0.80	130.50	131.30	0.80 Kitet	p. 120 m. faste Hænk Kifer	
131.30	131.40	0.10	gr. amf. fr.		
131.40	136.45	5.05	fr. fl. fr.	130-140 m. stål skeliff	
136.45	136.50	0.13	fr. amf. fr.		
136.50	150.06	13.48	fr. fl. fr.	140-150 m. stål skeliff	
150.06	151.27	1.21	fr. amf. fr.		
151.27	156.60	5.33	gr. førende fl. fr.		
156.60	156.75	0.15	fr. amf. fr.	150-160 m. stål skeliff	
156.75	157.38	0.63	fr. førende fl. fr.	fl. amf. p. 150 m.	
157.38	157.45	0.07	fr. amf. fr.		
157.45	158.07	0.62	gr. førende fl. fr.		
158.07	158.60	0.53	fr. amf. fr.		
158.60	160.01	1.41	fr. førende fl. fr.		
160.01	160.30	0.29	fr. amf. fr.		
160.30	161.55	1.25	fr. førende fl. fr.	næst gr. amf. gr. bånd	
161.55	161.70	0.15	gr. amf. fr.		
161.70	163.05	1.35	fr. førende fl. fr.	160-170 m. stål skeliff	
163.05	164.00	0.95	p. h. h. fr.	fl. amf. p. 160 m.	
164.00	164.70	0.70	fr. førende fl. fr.		
164.70	164.80	0.10	p. h. h. fr.	epit førende Samme type	

Kilop	gr	1:1	merk	Pb	Cu	Zn	S
164.87	166.60	1.73	gr. fremde fl. pr.				
166.60	166.90	0.30	gr. birl. pr.				epid. fremd
166.90	169.12	2.22	gr. fremde fl. pr.				Alle diese fl. pr. her litz gr., Ku. rick, unvoll. sticht
169.12	169.80	0.68	auf fremde gr. birl. pr.				epid. fremd
169.80	170.10	0.30	gr. fremde fl. pr.				
170.10	170.85	0.75	auf. fremde gr. birl. pr.				epid. fremde
170.85	171.05	0.20	gr. fremde fl. pr.				
171.05	171.35	0.30	auf. fremde gr. birl. pr.				epid. fremd
171.35	173.65	2.30	gr. fremde fl. pr.				170-180mm: sticht, d. sticht
173.65	173.80	0.15	gr. birl. pr.				epid. fremd
173.80	180.15	6.35	gr. fremde fl. pr.				sticht.
180.15	180.32	0.17	gr. birl. pr.				epid. fremd.
180.32	182.30	1.98	gr. fremde fl. pr.				
182.30	182.20	0.20	gr. birl. pr.				epid. fremd
182.20	190.60	8.40	gr. fremde fl. pr.				180-190mm: sticht d. sticht
190.60	195.55	4.95	gr. auf. birl. pr.				epid. fremd.
195.55	195.80	0.25	gr. birl. pr.				FeS ₂ -impr.
195.80	195.95	0.15	gr. auf. pr.				190-200mm: d. sticht, d. sticht
195.95	196.60	0.65	"				su. FeS ₂ -impr.
196.60	200.00	3.40	"				
200.00	205.30	5.30	gr. fl. pr.				mittelgr. d., litt auf. sticht.
205.30	209.80	4.50	gr. fremde fl. pr.				su. FeS ₂ -impr. auf. sticht
209.80	209.86	0.06	litz <u>ZnS</u> -sticht				200-210mm: gr. gr.
209.86	209.90	0.04	gr. fremde fl. pr.				
209.90	209.95	0.05	gr. fl. pr.				Ku. rick, fl. fettig, litzgr.
209.95	209.85	0.10	gr. fremde fl. pr. + litz <u>ZnS</u> + FeS ₂ + Cu. d. impr.				
209.85	210.10	0.25	gr. fl. pr.				Ku. rick, fl. fettig, auf. fremd
210.10	211.88	1.78	gr. FeS ₂ + Cu. FeS ₂ -impr				1 fl. pr. auf. fremd, auch gr. fl.

Kj. top fra 4:1 metk

Pb Cu Zn S

211.88	212.10	0.22	melin: ZnS , Cu kis, FeS , FeS i bl. sk.	}	0.25	0.26	1.13	5.41 8.65% Fe
212.10	212.40	0.30	fr. f. press, bl. rik.					
212.40	212.50	0.10	melin stripe: ZnS , Cu kis.					
212.50	212.62	0.12	fr. f. rinde Cu kis i bl. sk.					
212.62	212.97	0.35	melin: ZnS , lidt Cu kis i bl. sk.					
212.97	213.30	0.33	fr. f. rinde bl. sk.	}	0.00	0.12	0.32	1.01 3.20% Fe
213.30	213.35	0.05	ZnS -stripe					
213.35	213.80	0.45	gr. f. rinde bl. sk.					
213.80	213.90	0.10	lyse ZnS	}	0.47	0.44	0.40	3.03 5.20% Fe
213.90	214.00	0.10	fr. f. rinde bl. sk.					
214.00	214.10	0.10	ZnS -stripe					
214.10	215.15	1.05	bl. sk, sv. i ang. m. $CuFeS_2$, FeS_2 , sv. og lidt Zn .					
215.15	215.50	0.35	gr. amp. f. rinde bl. sk.					
215.50	216.50	1.00	amp. f. rinde bl. sk.					
216.50	217.55	1.05	melin: ZnS , Cu kis, FeS , lidt PbS i middelpåsen	sp.	0.31	1.23	2.61	5.76% Fe
217.55	218.20	0.65	amp. bl. sk. g. rinde					
217.55	218.20	0.65	fr. f. rinde m. sk. sk.					
218.20	218.25	0.05	Stripe med Cu kis og FeS					
218.25	218.73	0.48	m. sk. sk.					
218.73	218.78	0.05	Stripe med Cu kis, FeS_2 , FeS					
218.78	218.95	0.17	m. sk. sk.					
218.95	219.00	0.05	Stripe med Cu kis + FeS					
219.00	219.16	0.16	m. sk. sk.					
219.16	219.31	0.05	Cu kis i m. sk. sk.					
219.31	221.10	1.80	gr. f. rinde bl. sk.	sp. f. rinde				
221.10	221.40	0.30	peper.					
221.40	221.90	0.50	fr. f. rinde bl. sk.					
221.90	222.15	0.25	ZnS -melin + Cu kis, FeS_2 og lidt PbS					
222.15	223.37	1.12	gr. bl. sk. + stripe ZnS (2cm)					

	Pb	Cu	Zn	S
223.57 223.60 0.23 melm.: ZnS				
223.60 227.25 3.65 gr. färande fl. pr. + lgs. sublim. mineral				
227.25 228.30 0.75 fl. pr., lutt. Cu-kis + FeS ₂ -impur.				
228.00 228.17 0.17 impur. m. ZnS, Cu-kis, FeS ₂ i fl. pr.				
228.17 228.60 0.43 fl. pr.				
228.60 228.67 0.07 ZnS-impur.				
228.67 229.20 0.53 gr. färande mink. pr.				
229.20 229.50 0.30 kvartslutt				
229.50 239.50 10.00 gr. fl. pr. 240-250 m. 20-30°				
239.50 259.25 19.75 gr. färande fl. pr. delvis kemiskt gr. vid				
259.25 260.02 0.77 pepm. ingen, eller svagt lutt. granat				
260.02 260.52 0.50 granat pepmettelt 250-260 m. 20-30°				
260.52 261.45 0.93 pepm. ingen, eller lutt. granat				
261.45 267.45 6.00 gr. färande fl. pr.				
267.45 267.50 0.05 p. amfibollutt				
267.50 271.99 4.49 gr. färande fl. pr.				
271.99 275.10 0.11 melmimpur i fl. sk. ZnS, Cu-kis, FeS ₂ 0.52 0.27 1.72 3.4 10.07%				
275.10 275.30 0.20 gr. färande fl. pr. ved malmens ingång				
275.30 275.95 0.25 melm.: ZnS, FeS ₂ , lutt. Cu-kis + PbS i fl. sk., kemiskt 0.45 0.18 1.25 3.4 8.92%				
275.95 276.10 0.15 fl. sk. meriskt				
276.10 276.25 0.13 gr. färande fl. pr. 270-280 m. 20-30°				
276.25 276.57 0.32 st. kis-impur., svagt lutt. ZnS i fl. pr. 0.13 0.08 0.47 2.3 4.88%				
276.57 276.70 0.13 fl. pr.				
276.70 276.80 0.10 yngre Cu-ZnS, Cu-kis, magnetit i fl. sk.				
276.80 277.55 0.75 fl. sk. lutt. kis-impur. lutt. pr.				
277.55 277.75 0.20 melmimpur: ZnS, Cu-kis, FeS ₂ i fl. sk. 0.29 0.22 1.30 2.9 11.99%				
277.75 277.85 0.10 fl. sk. m. svaga Cu-kis-impur.				
277.85 278.08 0.23 gr. sv. opal färande anaf. fl. pr. middelhög- och, sv. kis-impur.				
278.08 279.00 0.92 anaf. fl. pr. middelhög- och, sv. kis-impur.				

fra	til	melt		P ₀	C ₀	2 ₀	S
279.11	281.80	2.80	gr. fl. fm.	sv. kinger	litt anfibol.		
281.80	290.33	8.53	gr. amfibolitt				
290.33	294.53	4.20	fl. fm., gr. fien	anfibol	anfibol	striper	
294.53	295.00	0.47	gr. amfibolitt				
295.00	295.54	0.54	fl. fm.	litt gr.			
295.54	295.48	0.14	gr. amfibolitt				
295.48	298.50	3.02	gr. fien de fl. fm.				
298.50	298.66	0.16	gr. amfibolitt				
298.66	302.35	3.69	gr. fien de fl. fm.	noen smale birt side strips			
Foreløbig slutt. Etterad hull nr 2 var							
ferdig ble hull nr 1 videre andyret.							
302.35	303.29	0.94	gr. fl. fm.	birt = mure			
303.29	303.38	0.09	amfibolitt	lgs. kv. feltip. eid.			
303.38	305.77	2.39	gr. fl. fm.	birt = mure			
305.77	306.05	0.28	gr. amfibolitt				
306.05	306.23	0.18	gr. fl. fm.	birt = mure			
306.23	306.65	0.42	Kvartitt	port. hv. t			
306.65	306.85	0.20	gr. fl. fm.	kv. rikk			
306.85	307.93	1.08	gr. fl. fm. med amfibolitt striper				
307.93	309.75	1.82	gr. amfibolitt				
309.75	310.43	0.68	Kvartitt	2 amfibolitt striper			
				på 310m (30m) oppå 310m (10m)			
310.43	317.50	7.07	gr. amfibolitt	fam. i store gr. (ca 0.5 cm)			
som vanlig i disse gr. amfibolitten. Epibiot fien de							
noen kv. og kv. feltip. striper							
317.50	317.82	0.32	gr. amf. fl. fm.	300-310. 20-30"			
317.82	317.90	0.08	amfibolitt rikk kv. feltip. Sv. mure og feltip. i mure				
317.90	318.03	0.13	Fels + Fels - mure i gl. sk. kvartitt				
318.03	318.35	0.32	gr. amf. fl. fm.				

top	from	to	metre			Pb	Cu	Zn	S
310.35	310.55	0.10	amfibolitt	lys, grovk., kv. sil.					
				sv. magnetit-impr.					
318.50	318.67	0.10	FeS + FeS ₂ - impr	if. sil.					
318.67	319.00	0.33	gr. amf. fl. fm.	310-320:00					
319.00	319.85	0.85	gr. amfibolitt						
319.85	320.70	0.85	pejrn.	lett gr. fjend					
320.70	322.30	1.60	gr. amf. fl. sil.	bild som mnd.					
322.30	322.71	0.41	gr. amfibolitt						
322.71	322.90	0.19	gr. amf. fl. fm.						
322.90	322.95	0.05	amfibolitt	lett gr. fjend					
322.95	323.06	0.11	pejrn.	gr. fjend					
323.06	323.89	0.83	gr. amf. fl. fm.						
323.89	327.74	3.85	gr. amfibolitt	220-320:00					
327.74	327.83	0.09	pejrn.	gr. fjend					
327.83	333.83	6.00	gr. amfibolitt						
333.83	334.62	0.79	gr. fl. fm.	kv. sil, finl., som amf. chips					
334.62	334.72	0.10	amfibolitt	gr. fjend					
334.72	334.90	0.18	gr. fl. fm.						
334.90	338.90	4.00	gr. amfibolitt	finnset avvikende med store graniter					
338.90	342.35	3.45	gr. amfibolitt	grovk., kv. sil., lys amf.					
342.35	342.60	0.25	ditte stekt FeS - impr						
342.60	347.73	5.13	gr. amfibolitt	opid. fjend, kv. feltip. streper					
	347.73								
N.B. bergarten fra 318.50 til 347.73 er tydelig kvik plettig og glimmerrik. b. som mnd.									