



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 3349	Intern Journal nr	Internt arkiv nr Boks nr 14	Rapport lokalisering Nordland	Gradering
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Kjernebeskrivelser, originaler, Mofjellet Gruber. 448 - 759				
Forfatter		Dato 19	Bedrift Bergverkselskapet Nord-Norge A/S	
Kommune Rana	Fylke Nordland	Bergdistrikt Nordlandske	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Fagområde	Dokument type	Forekomster		
Råstofftype	Emneord			
Sammendrag				

Fortegnelse over forkortelser og tegn i borekernebeskrivelserne for hull 7504 og 7601:

Ossá grubertanðar

Viktigste bjergartsforkortelser: bjergartsenheder som i Mofjell rapporterne 1974-1976

2 gl. gn, alm.	to -glimmergnejs, almindelig type, med nogenlunde lige meget biotit og m $\ddot{u}$ skovit
2 gl. gn, b.p.	to -glimmergnejs, biotit pr $\ddot{a}$ get type, hvor biotit dominerer over m $\ddot{u}$ skovit indholdet
2 gl. gn, b.d.	to -glimmergnejs, biotit domineret type, næsten $\ddot{u}$ del $\ddot{a}$ kkende med biotit. M $\ddot{u}$ skovit oftest kun til stede som discordant m $\ddot{u}$ skovit.
biot. gn.	biotit gnejs
m $\ddot{u}$ sk. gn.	m $\ddot{u}$ skovit gnejs
hbl. gn.	hornbl $\ddot{a}$ nde gnejs
amf.	amfibolit
pegm.	pegmatit
D. gn. type	disth $\ddot{e}$ ngnejs type
K $\ddot{a}$ rv gn.	K $\ddot{a}$ rv gnejs, gnejs med prismatisk amfibol af br $\ddot{u}$ nsort farve

Strukturelle udtryk:

Stejlt foldet, vertikalt foldet, lodret foldet,
foldet om lodret, foldet om vertikal.

angiver denne foide stil



Spidst foldet, flad foldet.

angiver denne foldestil



PbS, ZnS: er understregede i beskrivelsen

Forkortelser:

alm.	almindelig
baryt (?)	formodet baryt
biot.	biotit
br.	brun
cl.	chlorit
c.p.	chalcopirit
D	disthen
D?	disthen, usikker identifikation
(D)	bleg grønlig Mg-chlorit, fra omdannet disthengnejs
delv.	delvis
discord.	diskordant
fink.	finkornet
gl.	glimmer
gn.	gnejs
gr.	granat
grovk.	grovkornet
hbl.	hornblende
hom.	homogen

hor.	horizont
impr.	impregnation, imprægneret
incl.	inkluderende
indh.	indhold
lign.	lignende
m.	med
maf.	mafisk
mlk.	mellemkornet
musk.	muskovit
omd.	omdannet
py.	pyrit
rel.	relativ
stign.	stigende
sv.	svag
tern.	terninger
u.	uden
u. ordn.	underordnet, underordnede
var.	varierende

Lokalitet: profil 44.090

Borehull: 758

Dato : Mai - 81
 Koordinater : X: 925.439
 Retning : N
 Helling/stigning: - 45°
 Høyde : - 83.6
 Lengde : 29.50

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	Tap							
1.20 - 2.60	1.40	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-2 mm. mass.							
2.60 - 5.40	3.80	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. "skiktad" stripet Sl,Cp, Gn, Po, Py	45°	0.05	0.40	3.90			2.60-3.00
				0.03	0.53	2.94			3.00-4.00
				0.42	0.43	5.15			4.00-5.40
5.40 - 6.50	1.10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. skiktet med biot.hbl. imp. Py. spor Sl	45°	0.08	0.15	1.13			
6.50 - 29.50	23.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr-førende imp. Py	40° 45°						

14/5 - 81
 Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.090

Dato

Mai 1981

Koordinater

X: 925.438 Y: 44.089 ca.

Retning

: Lodd

Helling/stigning:

- 90°

Høyde

: - 83,6

Lengde

: 9,95

Borehull: 757

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	Skarn Mørk, grovk. Sl, Cp, Gn, Py		0.39	0.05	2.95			
0.50 - 1.00	0.50	2 gl.gn. Rel.lys, mlk. spor hbl. Impr. Sl, Cp, Gn, Py, Po	70°	0.14	0.10	0.95			/
1.00 - 3.55	2.55	Biot.hbl.gn. Mørk, mlk. "skiktig" Striper Sl, Cp, Gn, Py, Po,	60, 90°	0.10	0.68	3.68			400 - 200
				0.56	0.96	6.61			200 - 355
3.55 - 5.30	1.75	Biot.hbl.gn. Mørk, mlk. spredte gr. 1-2mm	80°	0.06	0.11	0.65			
5.30 - 9.95	4.60	Hbl.gn. Mørk, mlk. gr-førende. Impr. Py	80°						

14/5 1981
Stellan Burman

Lokalitet: Profil: 44.870

Borehull: 754

Dato Mai - 81

Koordinater $x = 925.912,9$ $y = 44872,9$

Retning : opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : -102,7

Lengde : 11,5 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. 5 cm pegm. ved 0.30 m, biotskikt, spredte gr.	80° 90°				81.6 As		
0.50 - 3.65	3.15	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. vekslende med opp til 5-10 cm biot.band. malm som striper. klysor och imp. Foldet <u>Sl,Cp,Gn,Py,Po.</u>	70-90°	0.93	0.94	4.48	17.5		0.50-1.50
				1.43	0.62	3.96	22.9		1.50-2.50
				0.87	0.56	2.65	17.3		2.50-3.65
3.65 - 5.15		2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-2 m.	80-90°						
5.15 - 8.05		Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-2 mm. svak impr. <u>Py</u>	"						
8.05 - 10.50		2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. hbl. enstaka gr.	"						
10.50 - 11.50		Hbl.gn. Mørk,mlk. spredt gr. 1-2 m	"						

29/4 1981
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.870

Dato : Mars -81

Koordinater : X: 925.417,4 Y: 44.872,6

Borehull: 753

Retning : Opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : 103.0

Lengde : 10.00

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.60	5.60	2 gl.gn. Lys,mlk. småfoldet,mineralisering i dm-tykke band. Sl,Gn,Cp,Py, både lys og mørk Sl	60-80°	0.19	0.09	0.94			0.00-1.00
				0.94	0.21	5.10			1.00-2.00
				0.28	0.14	1.53			2.00-3.00
				0.81	0.58	2.56			3.00-4.00
				0.58	0.32	1.70			4.00-5.00
				0.05	0.04	0.15			5.00-5.60
5.60 - 6.25	0.65	Pegm.							
6.25 - 6.75	0.50	2 gl.gn. Lys,mlk. småfoldet.	70-90°						
6.75 - 7.40	0.65	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. tildels breksjert	80-90°						
7.40 - 10.00	2.60	Hbl.gn. Mørk,mlk. småfoldet. gr. 1-3mm impr. py	80-90°						
6.7. 1981									
Nils A. Bang.									

Lokalitet: Profil 44.870

Borehull: 752

Dato : Mars-81

Koordinater : X: 925.422,4 Y: 44.871.5

Retning : Opp

Helling/stigning: 90°

Høyde : - 102,1

Lengde : 20.00

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.60	7.60	2 gl.gn. rel.lys,mlk. noe småfoldet Sl,Cp,Py, 0.00-0.10 og 2.20- 2.40. svak impr. <u>Py</u>	80-90°						
7.60 - 9.90	2.30	Biot.gn. Mørk,mlk. småfoldet og ondu- lering noe breksjert. Spredt gr. 1-3 mm. str. og impr. med Cp,Sl,Py	80-90°	0.04	0.03	0.15			760-860
				0.03	0.03	0.16			860-9.90
9.90 - 20.00	10.10	Biot.hbl.gn. Rel.mørk,mlk.-grovk. ondulert rik impr. <u>Py</u> 6.7. 1981 Nils A. Bang	70-90°						

Lokalitet: *Profil 44.870*

Borehull: 751

Dato : Mars -81
 Koordnater : X: 925.428,1 Y:44.872,0
 Retning : Opp
 Helling/stigning: + 90°
 Høyde : - 101,9
 Lengde : 10,00

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	2.30	2 gl.gn. Lys,mlk. foldet, stedvis tett foldet.							
2.30 - 10.00	7.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. foldet, stedvis breksjert. svak impr. Py Sl,Gn,Cp,Py. 9,50-10.00 i band.	70°						
				0.73	0.35	2.83			9.50-10.00
		6.7. 1981 Nils A. Bang							

Lokalitet: Profil 44.870

Borehull: 750

Dato : Mars -81

Koordinater : X:-25.433,2 Y: 44.877,7

Retning : Opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : 102,5 m

Lengde : 10,00

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 10.00	10.00	2 gl.gn.b.d. rel.lys,mlk. m/enkelte skarnholdige band. foldet, ondulert. svak impr. <u>Py</u> , spor <u>S1</u> 1,24 - 1,35 6.7. 1981 Nils A. Bang.	70°						

Lokalitet: Profil 43.650

Borehull: 6

Dato : Juni -81
 Koordinator : X: 925.404.8 Y: 43.653,2
 Retning : S
 Helling/stigning : -65°
 Høyde : -62,3
 Lengde : 34,10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 14.90	14.90	2 gl.gn. rel.lys,mlk. m/biot.gn.band. 1,95-2.15 småfoldet 7.40-7.60 gn.cp. 2.40-2.45 po,sl,cp,py 6.90 - 7.05,7.45-7.55	60-70°						
14.90 - 16.10	1.20	Pegm.							
16.10 - 21.15	5.05	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. m/cm-tykke biot. gn.band.	60-70°						
21.15 - 27.50	6.35	2 gl.gn. rel.mørk,mlk. m/dm-tykke biot.gn.band. Sl,py,cp,gn,po hovedsakelig i biot.gn.part.	50-80°	1.12	0.26	2.39			21.15-23.15
				0.86	0.29	2.08			23.15-25.15
				1.12	0.27	3.33			25.15-27.50
27.50 - 34.10	6.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. m/rik impr. Py Gr. 1-3 mm. i enkelte band.							
29.6. 1981									
Nils A. Bang									

Lokalitet: Profil 43.650

Borehull: 5

Dato : Juni -81
 Koordinater : X: 925.405,3 Y: 43.653
 Retning : S
 Helling/stigning: 83°
 Høyde : - 62,3
 Lengde : 28,40

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 24.15	24,15	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. foldet m/cm-tykke band av biot.gn. Biot. hbl.gn. og hbl.gn. og pegm. Po,Py,Sl,Cp,Gn i band 5,50-6,70, 11,50-11,80, 21.60-22,70.	60-90°	0,53	0,49	1,24			550-670
				0,62	0,32	2,46			21,60-22,70
24.15 - 28.40	4,25	Hbl.gn. Mørk,mlk. m/cm-dm-tykke band av amfibolitt og 2 gl.gn. gr. 1-3 mm.	70-90°						
29/6 1981									
Nils A. Bang									

Lokalitet: Profil 43.650

Borehull: 3

Dato : Juni - 81

Koordinater : X: 925.407,4 Y: 43.651

Retning : N

Helling/stigning: 64

Høyde : - 62,3

Lengde : 37,40

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.05	1.05	2 gl.gn.	Lys,mlk. spr. gr.						
1.05 - 1.80	0.75	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spr. gr.	50-70°					
1.80 - 29.60	27.80	2 gl.gn.	Rel.lys,mlk. m/cm-tykke band av biot.gn. og hbl.gn. m/gr. 1-10 mm. Sl,po,py,gn,cp i cm-tykke band fra 4,65-6,45	50-70°	0,68	0,28	1,26		4,65-6,45
29.60 - 31.30	1.70	Hbl.gn.	Mørk,mlk. båndet m/gr. Spr. gr. 1-3 mm. impr. Py	70°					
31.30 - 33.15	1.85	Biot.hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. båndet gr. 1-3 mm. rel. rik impr. Py	60-70°					
33.15 - 37.15	4.00	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. m/biot.gn.band 5.00 - 5.15 og dm-tykke band av 2 gl.gn.impr. Py.	60-70°					
37.15 - 37.40	0.25	2 gl.gn.	Rel.lys,mlk. impr. Py	80°					
26.6. 1981 Nils A. Bang									

Lokalitet: Profil 43.650

Dato : Mai-81

Koordinater : X:925.406,2 Y: 43.653

Retning : N

Helling/stigning: 80°

Høyde : - 62,3

Lengde : 34,25

Borehull: 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.35	5.35	2 gl.gn. lys,mlk. m/dm-tykke biot.band og biot.hbl.band. Spr.gr. 1-3 mm.	70-90°						
5.35 - 6.70	1.35	Biot.gn. Mørk,mlk. m/cm-tykke 2 gl.gn. band. sl,cp,py,po,gn.	60-80°	0.84	1.55	5.00			
6.70 - 17.95	11.25	2 gl.gn. Lys,mlk. enkelte gr. litt py,sl,cp,gn,po 6.70-7.00 og 11.60-11.70.	70-90°	0.45	0.91	1.80			6.70-7.00
17.95 - 19.00	1.05	pegm.							
19.00 - 22.50	3.50	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm. Py,sl,cp,gn. fra 21.55-22.50	70-90°	0.73	1.97	4.66			21.55-22.50
22.50 - 23.60	0.70	biot.gn. Mørk,mlk. tildels breksjert Py,cp,sl,gn. m/cm-tykke 2 gl.gn.band.	60-70°	0.53	0.58	5.44			
23.60 - 25.75	2.15	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. m/cm-dm-tykke band av hbl.gn. og biot.hbl.gn. imp. Py fortrinnsvis i biot. hbl.gn.band.	60-70°						
25.75 - 27.35	1.60	Hbl.biot.gn. Rel.mørk,mlk. m/cm-tykke 2 gl.gn.band. Spredte granater 1-3 mm. Impr. Py	60-70°						
27.35 - 30.60	3.25	2 gl.gn.bd. Rel.mørk. spr. gr. 1-3 m. rik impr. Py	60-80°						
30.60 - 34.25	3.65	Hbl.gn. Rel.mørk,m/cm-dm-tykke amfi-bolitter. gr. 1-5 mm.Impr. Py	60-80°						
26.6. 1981									
Nils A. Bang									

Lokalitet: Profil 43.650

Borehull: 1

Dato : Mai - 81
 Koordinator :
 Retning : N
 Helling/stigning: - 88
 Høyde : - 62,3
 Lengde : 28.50

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spredt Sl,cp,py	90 ⁰						
0.70 - 1.60	0.90	Hbl.gn. Mørk,mlk. spredte gr. 1-3mm	80-90 ⁰						
1.60 - 4.35	2.75	2 gl.gn. Lys,mlk. enkelte gl.rikere partier	70-80						
4.35 - 6.35	2.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. cm-dm-tykke biot.gn.band. Sl,py,cp,gn.po fortrinnsvis i biot.gn.band + impr. enkelte cm-tykke pegm.band.	70-90 ⁰	1.31	0.84	4.43			435-535
				0.89	0.36	2.22			5.35-6.35
6.35 - 20.20	13.85	2 gl.gn. Rel.lys,mlk, båndet m/cm tykke biot.gn.bånd. spr. impr. py,cp, gr. 1-3 mm. fortrinnsvis i biot.gn.band.	70-90 ⁰						
20.20 - 20.48	0.28	Biot.gn. Mørk,mlk. tildels brøksjært Sl,Py,Cp m/2 gl.gn.band.	60-80 ⁰	0.38	0.91	3.04			
20.48 - 21.05	0.57	Pegm.							
21.05 - 22.60	1.55	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. m/dm-tykke 2 gl.gn. band. Sl,Cp,Py,Gn,Po.	70-80 ⁰	1.37	0.46	4.15			
22.60 - 23.95	1.35	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. enkelte biot. gn.band. svak impr. Py,gn.	80-90 ⁰						
23.95 - 26.30	2.35	Biot.hbl.gn. Rel.mørk,mlk. cm/dm tykke 2 gl.gn.band og hbl.gn.band m/gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	70-80 ⁰						
26.30 - 28.50	1.90	Hbl.gn. Mørk,mlk. m/gr. 1-5 mm.	60-80 ⁰						

26/6 1981
 Nils A. Bang

Lokalitet: 44.983

Dato

Apr. - 81

Koordinater

X=925.427,1 y=44983,8

Retning

: N

Borehull: 749

Helling/stigning:

+21°

Høyde

: 1210-101,6

Lengde

: 130.00

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 12.00	12.00	2 gl.gn. lys, mlk. enstaka gr. delvis svak impr. Py enstaka cm-tykke pegm.band.	45-50°						
12.00 - 12.20	0.20	Hbl.førende 2 gl.gn.	45°						
12.20 - 13.05	0.85	2 gl.gn. - " -							
13.05 - 13.25	0.20	Hbl.gn.							
13.25 - 13.50	0.25	2 gl.gn. m hbl.band	45°						
13.50 - 28.80		" " <u>Sl</u> ved 14.30	45-30°						
28.80 - 29.80		Hbl.gn. vekslende m 2 gl.gn.band	0-30°						
29.80 - 61.80	32.00	Hbl.gn. gr.rik	35-45°						
61.80 - 73.40		Musk.biot.gn. Grovk. "Flagig" jevn imp. <u>Py</u> , Spredte gr.	30°						
73.40 - 91.30		Hbl.gn. Amfibolitisk	45°						
91.30 - 93.70		Biot.hbl.gn. Impr. <u>Py</u>	"						
93.70 - 96.00		Musk.biot.gn. "	"						
96.00 - 96.60		Pegm.	"						
96.60 - 127.30		2 gl.gn.	30-45°						
127.30 - 130.00		Hbl. 2 gl.gn. Vekslende gr. førende							

Lokalitet: Profil 43.650

Borehull: 6

Dato : Juni -81

Koordinater : X: 925.404,8 Y: 43.653,2

Retning : S

Helling/stigning: -65°

Høyde : -62,3

Lengde : 34,10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 14.90	14.90	2 gl.gn. rel.lys,mlk. m/biot.gn.band. 1,95-2,15 småfoldet 7.40-7.60 gn.cp. 2.40-2.45 po,sl,cp,py 6.90 - 7.05,7.45-7.55	60-70°						
14.90 - 16.10	1.20	Pegm.							
16.10 - 21.15	5.05	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. m/cm-tykke biot. gn.band.	60-70°						
21.15 - 27.50	6.35	2 gl.gn. rel.mørk,mlk. m/dm-tykke biot.gn.band. Sl,py,cp,gn,po hovedsakelig i biot.gn.part.	50-80°	1.12	0.26	2.39			21.15-23.15
				0.86	0.29	2.08			23.15-25.15
				1.17	0.27	3.33			25.15-27.50
27.50 - 34.10	6.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. m/rik impr. Py Gr. 1-3 mm. i enkelte band.							
29.6. 1981									
Nils A. Bang									

Lokalitet: 44.985

Borehull: 748

Dato : April 1981

Koordinater : X: 925.427,1 Y: 44.983,8

Retning : N

Helling/stigning: + 13,5°

Høyde : - 101,5

Lengde : 125,0 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 26.65	26,65	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk, litt variert med enkelte biotrikere band partier. Enstaka opp til dm-tykke pegm.band. Fra 0,70 - 0,90 pegm. stedvis svak impr. <u>Py</u> , fortrinnsvis i de biotrikere partier. Spor <u>Sl</u> ved 0,70 (1 cm). enstaka gr. 1-2 mm	35° 45° 50° 40° 30° 40°					
26.65 - 27.05	0,40	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spor gr. <u>Py</u> 1-2mm	50°					
27.05 - 28.10	1.05	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. kv.rik. Impr. <u>Py</u>	35°					
28.10 - 30.30	2.20	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende med partier 2 gl.gn. Spredte gr. i hbl.gn.	45°					
30.30 - 30.50	0.20	Pegm.kv.							
30.50 - 33.40	2.90	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ biot.skikt og cm-tykke Hbl.gn.band. tildels gr-førende. spor <u>Py</u>						
33.40 - 35.90	2.50	Hbl. ?	Mørk,mlk. vekslende m/cm-tykke 2 gl.gn.band. Stedvis foldet slirig med skarnslirer. spredte gr. 1-2 mm.	50-80					
35.90 - 47.60	11.70	Hbl.gn.	Mørk,mlk. delvis skiktet med kv.rike skikt. gr.før. 1-3 mm. Impr. <u>Py</u> .	45° 50°					
47.60 - 59.00	11.40	2 gl.gn.	rel.lys,mlk. tildels hbl.-førende, samt enkelte Hbl.gn.band. Gr.førende 1-3 mm.	45° 35°					

Lokalitet:

Borehull: 748

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
59.00 - 61.30	2.30	Pegm.							
61.30 - 65.40	4.10	Biot.gn.	Enstaka dm.tykke Pegm.-band. Rel.mørk,mlk. enkelte Hbl-førende partier, dm.tykke gr.førende. fortrinnsvis i Hbl.førende partier. Impr. Py. Spredte Pegm.band.	35° 40°					
65.40 - 69.00	3.60	Hbl.gn.	Mørk,mlk. tildels skiktet m/biot.rike skikt. Spredte gr. tildels gr.førende 1-3 mm. Impr. Py.	35° 40°					
69.00 - 76.95	7.95	Biot.gn.	Mørk,mlk. rel.mass. Spr. gr. 1-2 mm. Impr. Py	35° 20° 10°					
76.95 - 78.00	1.05	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. ondulerende Impr. Sl,Cp,Gn,Py	10° 0° 5°	1,25	0,11	3,98	59/0,35	
78.00 - 79.35	1.35	"	Lys,mlk. impr. Py Spor gr. 1-3 mm.	5°					
79.35 - 80.70	1.35	"	Rel.lys,mlk. litt "fläckig" av Biot.anr. Svak impr. Sl,Cp,Gn,Py.	10°	1,32	0,28	4,46	46/0,41	79,65-80,60
80.70 - 88.10	7.40	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. Musk. som "flagig" ondulerad Impr. Py spor Sl Spredte gr. 1-2 mm. Cp, Po ved 76.45.	10° 0°					

Lokalitet:

Borehull: 748

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
70.00 - 76.95	6.95	Biot.gn. Py-impr. Spredt noe Hbl. og gr. og noe D. rel. lys Fra 73 m	35° 0-20				81t Ag/Au		
76.95 - 78.00	1.05	<u>malm</u> Lys sf. i grå gn.	0-15	1.25	0.11	3.98	59/0.35		
78.00 - 79.65	1.65	grå gn. bd.	0-15						
79.65 - 80.60	0.95	<u>malmimpr.</u> i grå gn. spredt noe Hbl.	0-30	1.32	0.28	4.46	46/0.41		
80.60 - 83.40	2.80	grå gn. Spredt noe Py-impr. rundt	0						
83.40 - 86.50	3.10	Biot.gn. gr. meget spredt noe Hbl. På 86.45 m noe Cp.	25-10°						
86.50 - 86.65	0.15	Pegm.							
86.65 - 88.10	1.45	Musk.gn. gl.rik. Noe bior. Py-impr.	0-20						
88.10 - 88.80	0.70	<u>malm</u> i musk.gn. i lyse sf. Cp, Py	0-10	1.03	0.91	4.98	31/0.25		
88.80 - 89.70	0.90	Pegm.		1.17	0.10	5.95	25/0.20		79.10 - 79.10
89.70 - 93.35	3.65	<u>malm</u> i biot.gn. rel. lys. lyse sf. Noe pegm. innsprengt.	10-30	0.67	0.14	2.90	16/		79.10 - 79.12
93.35 - 93.80	0.45	Pegm.		0.72	0.21	1.90	17/		79.10 - 79.35
93.80 - 94.15	0.35	<u>malmimpr.</u> i musk.biot.gn.	40°	1.24	0.17	3.22	28/		
94.15 - 95.40	1.25	pegm.							
95.40 - 95.85	0.45	<u>malmimpr.</u> i musk.gn. Noe biot.	0-20	0.51	0.12	1.45	15/		
95.85 - 96.20	0.35	<u>malmimpr.</u> i musk.biot.gn.	10						
96.20 - 96.65	0.45	pegm.							
96.65 - 97.50	0.95	<u>Sv.malmimpr.</u> i musk.biot.gn.	0-10	0.28	0.08	1.24	10/		
97.50 - 98.75	1.25	musk.biot.gn. sterkt py-impr.	25 10-30						

Lokalitet:

Borehull: 748

5

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
98.75 - 101.90	3.15	grå gn.	10				8/t Ag/Au		
101.90 - 102.80	0.90	sv.malmimpr. i grå gn.	10-25	0.38	0.04	1.27	12/		
102.80 - 125.00	22.20	grå gn. spredt noe gr. litt etter hvert mere gr. Mot slutten	30-40						
			40-50						

Lokalitet: 44.985

Borehull: 747

Dato : Mars 1981

Koordinate : X: 925.427,1 Y: 44.983 8

Retning : N

Helling/stigning: + 10°

Høyde : - 101,6

Lengde : 136,5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 13.90	13.90	2 gl.gn.bd. Rel. lys mlk. m/enkelte små band imp. <u>Py</u> Spredte gr. 1-3 mm. Enstaka dm-tykke pegm.band. Spor <u>Sl</u> ved 26,40.	20° 30° 10°					8,5%	
35.50 - 35.90	0.40	Pegm.							
35.90 - 38.30		2 gl.gn. lys mlk. rel. kv.rik. Enstaka gr. 1-2 mm. spor <u>Py</u>	10° 0° 5°						
38.30 - 39.95	1.65	2 gl.gn. Rel. lys mlk. svakt ondulerende. Svak impr. <u>Py, Sl, Cp, Gn,</u>	10° 0° 5°						
39.95 - 50.50	10.55	2 gl.gn.bd. - " - " - Spor <u>Sl</u> ved 41.20	5° 0° 10°						
50.50 - 69.30	18.80	2 gl.gn.bd. Rel. lys, mlk. litt vekslende med biot. rikere band (tild. biot.gn. spor hbl.) over enstaka skarnband. stedvis ondulerad, svag impr. <u>Py, Cp, Sl, Gn.</u>	10° 0° 5° 0°	0,16	0,18	0,97		10,6	50,50 - 69,30
				0,46	0,13	1,68			50,50 - 69,30
69.30 - 74.50	5.20	2 gl.gn.alm. lys, mlk. kv.rik, spor gr. 1-2 mm. <u>Py.</u> Delvis mass.	5°						
74.50 - 77.50	3.00	" - " - " - Spor <u>Py, Cp, Gn, Sl.</u>	0° 5°						

Lokalitet:

Borehull: 747

Dato :

Koordinate :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
77.50 - 83.10	5.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. vekslende m/dm-tykke biot.gn.band enstaka gr. 1-3 mm.	5°						
83.10 - 86.30	3.20	" Lys,mlk. m/filmtynne biot. skikt.lmp. Py,Cp,Gn,Sl	0° 5°	1.55	0.22	3.93		33.3	
86.30 - 89.00	2.70	" - " - " - Enstaka spor Sl impr. Py	5° 0°						
89.00 - 92.50	3.50	2 gl.gn.alm. Lys mlk. svak impr. Py	5°						
92.50 - 136.50	3.50	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. rel.mass. spredte Spredte gr. 1-3 mm. Enstaka opp til dm.tykke pegm.band.	5° 10° 20° 30° 45°						

6/4 1981

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.986

Borehull: 746

Dato :

Koordinater : X: 925.4271 Y: 44.9838

Retning : N

Helling/stigning: + 15° *Avviks målt + 19° med 4.*

Høyde : - 101,2

Lengde : 140 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.80	2.80	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka cm - 5 cm. tykke kv.pegm.band. spor gr. 1-3 mm. Spor Sl ved 2.20.	35° 40°						
2.80 - 3.70	0.90	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk.enkelte 2 gl.gn. band og slirer. Svak impr. Py, spor Sl ved 3,35	35°						
3.70 - 10.70	7.00	2 gl.gn.bp. Lys,mlk.-fink. enstaka opp til 5 cm tykke kv.pegm.band. Litt vekslende m/enkelte biot.rikere partier.	35° 40° 60° 40°						
10.70 - 13.00	2.30	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-tykke biot.gn.band, spr. gr. 1-2 mm.	30° 40°						
13.00 - 15.30	2.30	Biot.gn. Mørk,mlk.vekslende m/partier 2 gl.gn. biot.gn. gr.førende 1-2 mm. Impr. Py	35°						
15.30 - 23.60	8.30	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. litt vekslende m/enstaka biot.rikere band. samt enkelte dm.tykke pegm. band. spor Sl ved 21.50	30-45						
23.60 - 26.00	2.40	hbl.gn. Mørk,mlk.enkelte cm-tykke biot.gn.band. svak impr. Py	30°						
26.00 - 31.50	5.50	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enkelte biot.-rikere partier m/spor hbl. spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py fortrinnsvis i partier m/ biot.hbl. Pegm fra 29.20 - 29.40.	30° 45°						

Lokalitet:

Borehull: 746

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
31.50 - 33.30	1.80	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. vekslende m/ 2 gl.gn.band. svak impr. Py, enstaka gr. 1-2 mm (Foldet).	30 ⁰ 50 ⁰						
33.30 - 47.30	14.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. tildels tilsynes Skiktad m/ lysere skikt av kv. Musk? Foldet, gr.før. 1-3 mm. Svak impr. Py	50 ⁰ 80 ⁰ 40 ⁰						
47.30 - 53.60	6.30	2 gl.gn. Rel.lys,skiktet, strimlet hbl.førende, spor gr. svak impr. Py, Foldet.	40 ⁰ 60-10 ⁰						
53.60 - 58.60	5.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr-førende 1-3mm Impr. Py	20 ⁰ 25 ⁰						
58.60 - 61.90	3.30	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. spredte gr. tildels gr-førende 1-2 mm Svak impr. Py	20 ⁰						
61.90 - 62.40	0.50	Pegm.							
62.40 - 66.80	4.40	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. gr.førende. Impr. Py	15 ⁰ 20 ⁰						
66.80 - 76.95	10.15	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. m (fjällig Musk) enstaka gr. 1-3 mm. Impr. Py, tildels rik.	30 ⁰						
76.95 - 80.60	3.75	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. biot.rike part. m. spor hbl. gr.før. 1-3 mm. ved 77.30 stichto- litisk impr. Py.	20 ⁰						

Lokalitet:

Borehull: 746

Dato :
 Koordinater :
 Retning :
 Helling/stigning:
 Høyde :
 Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	24.9 24.9	% Fe	
80.60 - 86.95	6.35	hbl.gn. Mørk,mlk. tildels gr.før. partier 1-3 mm. impr. Py	20° 0° 10°						
86.95 - 88.70	1.85	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. spredte store gr. 1-5 mm. Impr. Py	10°						
88.70 - 91.60	2.90	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. (Fjällig) Impr. Py	0° 10°						
91.60 - 94.70	3.10	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-tykke biot.gn.band. Impr. Py Sl ved 93.60 enstaka gr. 1-3 mm.	0° 10° 20° 10°						
94.70 - 96.20	1.50	Biot.gn. Mørk,mlk. tildels ondulerende impr. Py	0° 5°						
96.20 - 96.80	0.60	Pegm.							
96.80 - 98.00	1.20	Biot.gn. (2 gl.gn. biot.rik) Rel.mørk,mlk.-grovk. litt ondulerad. enstaka pegm. band. Impr. Sl,Cp,Gn,Py	20° 5°	0.33	0.18	141	88		
98.00 - 100.00	2.00	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. ondulerende rel.homogen. Impr. Sl, Cp,Gn,Py.	?° 0° 10°	0.59	0.14	137	20.6/ 0.15		
100.00 - 101.50	1.50	" " Svak impr. Sl.	10°	0.14	0.04	0.80	46		
101.50 - 121.00	19.50	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. rel.kv.rik. enst. cm-dm-tykke pegm.band. ved 107,40 Py,Po, enstaka gr. 1-4 mm	10° 15° 20° 30°						
		121.00	35°						
121.00 - 140.00	19.00	" Lys,mlk. enkelte biot.rik. part. m/spor hbl.	30° 40°						

Lokalitet:

Borehull: 746

Dato :
 Koordinater :
 Retning :
 Helling/stigning :
 Høyde :
 Lengde :

4.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
121.00 - 140.00	19.00	2 gl.gn.bd. Gr.førende tildels gr.rik 1-3 mm.							

Lokalitet: 44.830

Borehull: 745

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning

Høyde

Lengde

Februar 1981

X: 925.468,5 Y: 44.830

N

15°

8,50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.50	8.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels kv.rik og m/spr. gr. 1-3 mm. Ved 0,50, 1,70 spor Sl.	10° 30°						

3/3 1981
H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.820

Dato : Feb. 81
 Koordinator : X: 925.468,5 Y: 44.830
 Retning : N
 Helling/stigning: Horisontalt
 Høyde : -102,0 m
 Lengde : 10.00 m

Borehull: 744

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. spor Sl,Gn,Cp, impr. Py	0 10	0,13	0,11	0,30			
1.50 - 5.80	4.30	" Impr. Sl,Gn,Cp, Py tildels i halv kjernen	0 10	0,76	0,19	2,20			1,50-2,50
				0,26	0,13	0,65			2,50-3,50
				0,55	0,30	1,97			3,50-4,50
5.80 - 10.00	4.20	" Spr. gr. 1-3 mm	10 30	1,04	0,37	3,75			4,50-5,80
				0,03	0,02	0,13			5,80-6,80
3.3. 1981 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.820

Dato : Februar 1981

Koordinater : X: 925.468,5 Y: 44.830

Borehull: 743

Retning : N

Helling/slingning: 20°

Høyde : - 102,5 m

Lengde : 13,75 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.25	0,25	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik. spr.gr. 1-3 mm.							
0.25 - 1.00	0.75	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. impr. Py	20° 30°	0,46	0,18	0,76			
1.00 - 1.50	0.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-brede band biot.gn.	30°	0,03	0,08	0,14			
1.50 - 3.10	1.60	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. veksl.m/ dm-brede band 2 gl.gn.b.d. Spor hbl. fra 2,20-2,30 kalkspat. Impr. Sl,Gn,Cp,Py	20° 30°	0,80	0,27	3,01			
3.10 - 4.30	1.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ parti musk.gn. tildels hbl. førende, impr. Sl,Gn,Cp,Py	30°	1,20	0,24	3,76			
4,30 - 13.75	9.45	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ 1-2 dm. brede pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. tildels svak impr. Py.	30°	0,15	0,04	0,38			430-5,30
		2.3. 1981 Holger Pantdalsli							

Lokalitet: 44.820

Borehull: 742

Dato : Februar 1981
 Koordinator : X: 925.468,5 Y:44.830
 Retning : N
 Helling/stigning: 45°
 Høyde : - 103,0
 Lengde : 10,00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels kv.-rik, svak impr. Py	40°	0.07	0.08	0.19			
0.80 - 3.35	2.55	" Striper, impr. Sl,Cp,Py, tildels m/skarn.	40°	1.60	0.18	5.05			0.80-2.00
				0.45	0.54	1.42			2.00-3.35
3.35 - 10.00	6.65	" Spr. gr. 1-3 mm.	40°	0.16	0.10	0.42			3.35-6.35
3.3. 1981 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.820

Borehull: 741

Dato : Febr. 1981
 Koordinator : X:925.466,8 Y: 44.830
 Retning :
 Helling/stigning: Lodd
 Høyde : - 103,5 m
 Lengde : 8,40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
00,00 - 1,15	1.15	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.spor gr. 0,5-1 mm.	80°	0.04	0.04	0.15			
1.15 - 1.90	0.75	" striper, impr. Sl,Cp,Gn,Py, tildels m/skarn,hbl.	80°	2.10	0.21	3.76			
1.90 - 8.40	6.30	" Spr.gr. 1-3 mm.	80°	0.01	0.01	0.13			1.90-2.90
3.3. 1981 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.755

Borehull: 740

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Feb-81

X: 925.424 Y: 43.756

: N

: 58°

: 48,3

: 68,40 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 11.70	11.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor gr. Spor gr. Ved 0.10, 0.50 8,30, 10,30 spor Sl.	75° 80°	0.06	0.07	0.33			10,70-11,70
11.70 - 12.70	1.00	" Spr. striper Sl.		0.16	0.09	0.78			
12.70 - 14.40	1.70	" Hbl.skarnførende striper m/impr. Sl,Cp,Gn,Py.	70°	1.88	0.37	4.53			
14.40 - 36.30	21.90	" Rel.lys,mlk.tildels kv.rik spor gr. 0,5-2 mm.	60° 70°	0.08	0.15	0.28			14,40-15,40
36.30 - 36.55	0.25	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. hbl.skarn- førende impr. Sl,Cp,Py.							
36.55 - 37.40	0.85	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.spor gr.	60°						
37.40 - 37.75	0.35	Pegm.							
37.75 - 40.30	2.55	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.spor gr.	50°						
40.30 - 43.30	3.00	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. veksl. m/ hbl.førende band. Svak impr. Py.	50° 60°						
43.30 - 46.50	3.20	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/dm- brede band 2 gl.gn.bd. spr.gr. tildels rik 1-5mm	40° 50°						
46.50 - 48.40	1.90	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. tildels hbl.førende, spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	50°						
48.40 - 59.20	10.80	Hbl.gn. Mørk,mlk.vekslende m/ cm-brede pegm.band. spr.gr. 1-3 mm.	50° 40°						

Lokalitet:

Borehull: 740

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
59.20 - 61.30	2.10	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.enkelte biot. rike band m/ gr. 1-5 mm.	50°					
61.30 - 61.50	0.20	Hbl.gn.	Mørk,mlk.gr.førende 1-3mm						
61.50 - 65.50	4.00	2 gl.gn.alm.	rel.lys, mlk. kv.rik, veksl. m/dm.brede biot. rike gr. 1-5 mm.førende band.	50°					
65.50 - 68.40	2.90	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. gr.førende 1-5 mm.	50°					
4.3. 1981 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.755

Dato

Jan - 81.

Koordinater

X: 925.424 Y: 43.756

Borehull: 739

Retning

N

Helling/stigning:

68°

Høyde

- 48,3

Lengde

50.0 mm.

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.80	7.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk,vekslende m/cm-brede biot.rike band, Spr. gr. 1-3 mm.	75° 80°	0.02	0.01	0.04			400-800
7.80 - 9.20	1.40	" Vekslande m/dm-brede biot. hbl.førende band, fortr.v. m/impr. Sl,Cp,Gn,Py	70° 80°	0.50	0.19	1.91			
9.20 - 9.80	0.60	" Svak impr. Py, spor Sl.		0.07	0.09	0.34			
9.80 - 10.20	0.40	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk.spor hbl. impr. Sl,Gn,Cp,Py.	60°	0.77	0.31	1.47			
10.20 - 10.60	0.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. svak impr.Py		0.21	0.12	0.42			
10.60 - 11.30	0.70	" Vekslande m/dm-brede biot. hbl.rike band fortrinnsvis med impr. Sl,Gn,Cp,Py	60°	2.30	0.16	4.75			
11.30 - 12.60	1.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik spr. str. m/biot.hbl. Sl,Cp,Gn. Py.	60°	0.14	0.10	0.31			
12.60 - 13.65	1.05	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. Hbl.-førende, impr. Sl,Gn,Cp,Py	60°	0.95	0.56	3.16			
13.65 - 14.35	0.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor gr.,svak impr. Py.	60°	0.05	0.06	0.21			
14.35 - 14.60	0.25	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spor hbl. impr. Sl,Cp,Py		0.57	0.29	1.40			
14.60 - 15.35	0.75	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spr. gr.1-3mm	60°	0.10	0.05	0.39			
15.35 - 15.80	0.45	" Hbl.førende striper fortrinnsvis m/impr. Sl,Cp, Gn.Py.		0.97	0.58	3.43			

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 739

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15.80 - 36.20	20.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. tildels m/ spr. gr. 1-3 mm. Ved 18.60, 18,70, 32,70, 32,90, 33,20, spor <u>Sl,Gn</u> , <u>Cp,Py</u> .	60°						
36.20 - 42.30	6.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede band 2 gl.gn. alm. Impr. Py ved 37.40 spor Sl.	60°						
42.30 - 44.60	2.30	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/dm- brede band 2 gl.gn.b.d. tildels gr.rik 1-3 mm.	60°						
44.60 - 48.00	3.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede hbl.gn.band. fortrinnsvis gr.førende 1-3 mm.	60°						
48.00 - 50.00	2.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/cm- dm-brede band 2 gl.gn.b.d. Spr. gr. 1-5 mm.	60°						
3.3. 1981 H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 43.760

Dato Febr. -81
 Koordinater : X: 925.423 Y: 44.755
 Retning : N ?
 Helling/stigning: 74° ? Nå kontr.
 Høyde : - 48.3
 Lengde : 50.0 m.

Borehull: 738

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.30	8.30	2 gl.gn.bp. Lys,mlk. rel.kv.rik. enst. cm-tykke biot.gn.band. spor gr. 1-2mm. ved 2.50-255 <u>Sl</u> , <u>Py</u>	80° 90°	0.09	0.14	0.20			2.30-8.30
8.30 - 10.05	1.75	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. vekslende m/partier biot.sk. (ondulerad) hbl. tildels skarnførende str. impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u> .	80° 85°	0.81	0.23	2.50			
10.05 - 10.65	0.60	" Lys,mlk. spor <u>Cp</u> , <u>Sl</u> .	75° 80°	0.20	0.15	0.65			
10.65 - 11.55	0.90	Biot.gn. Rel.mørk,mlk. hbl.skarnførende, enkelte Pegm. 2 gl.gn.band. striper <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u> .	70° 70°	1.60	0.42	5.85			
11.55 - 12.10	0.55	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.-fink. enstaka gr. 1-2 mm.	70°	0.15	0.03	0.65			
12.10 - 13.00	0.90	" Rel.lys,mlk, spredte biot. hbl.gn.band med <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u>	75°	0.47	0.27	2.32			
13.00 p 14.30	1.30	2 gl.gn.bp. Lys,mlk. rel.kv.rik. Svak impr. <u>Py</u>	75° 80°	0.04	0.04	0.13			
14.30 - 15.40	1.10	" - " - Ensta. cm.tykk skarnband med <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u> .	75°	0.14	0.09	0.59			
15.40 - 17.30	1.90	" Lys,mlk.enstaka smale <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u> , striper.	75°	0.18	0.06	0.44			
17.30 - 17.70	0.40	Skarn Mørk,mlk-grov. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u>		0.88	0.26	3.64			
17.70 - 18.30	0.60	2 gl.gn.bp. Lys,mlk. enstaka gr.1-3 mm.	70°	0.04	0.03	0.18			

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Borehull: 738

Helling/stigning:

Høyde :

2.

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
18.30 - 18.55	0.25	Skarn biot. mørk, mlk. Cp, Cy, Sl ?		0.36	0.24	0.76			
18.55 - 22.10	3.55	2 gl.gn.bp. lys, mlk. rel.kv.rik. spr. gr. 1-3 mm. ved 20.70 - 20.90 pegm.	70°	0.03	0.06	0.10			18.55-18.55
22.10 - 22.65	0.55	2 gl.gn.bd. Rel.lys, mlk. vekslende m/cm-tykke biot.sk.band m/Cp, Py, Sl?	65°	0.09	0.23	0.16			
22.65 - 24.25	1.60	2 gl.gn.bd. Rel.lys, mlk. spredt gr. 1-3 mm. spor Py.	60° 65°						
24.25 - 25.90	1.65	2 gl.gn. rel.lys mlk. vekslende m/dm.tykke gl.rikere partier m/filtet preg. gr.førende i biot.rikere partier 1-3 mm. fra. 24.25-24.35 SL.	60° 40° 60°						
25.90 - 33.20	7.30	2 gl.gn.bp. lys, mlk.kv.rik. litt veksl. m/enstaka cm-tykke biot.hbl. pegm.band. Spr. gr. 1-2 mm svak impr. Py	65°	0.05	0.09	0.10			32.20-33.20
33.20 - 33.75	0.55	skarn rel.lys, mlk.-grov m/2 gl.gn. sliror. Stripet impr. Sl, Cp, Gn, Py, Po.		2.70	0.60	7.65			
33.75 - 33.90	0.15	2 gl.gn.alm. lys, mlk. kv.rik.	75°	0.18	0.11	0.42			
33.90 - 35.75	1.85	Hbl.biot.gn. Mørk, grovk. (Skiktad) Stripet Cp, Py, Sl, Gn.	65°	0.13 0.02	0.45 0.45	2.05 0.54			34.90-35.75 33.90-34.90
35.75 - 36.80	1.05	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. tildels skiktad m/filmtynne biot. skikt. spor hbl.. Impr. Sl, Cp, Gn, Py	65° 80° 65°	0.09	0.24	0.44			

Lokalitet:

Borehull: 738

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
36.80 - 38.30	1.50	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. tildels filtet preg. Spr. gr.1-2mm	65°	0.01	0.04	0.04			3490-3780
38.30 - 40.20	1.90	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende med opp til dm-tykke biot. gn.band. spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py	65° 70°						
40.20 - 41.35	1.15	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. Py	65° 50° 70°	0.03	0.12	0.08			
41.35 - 47.35	6.00	Hbl.gn. Mørk,mlk.enstaka opp til dm.tykke pegm.band. Gr.førende 1-4 mm.Impr.Py	75° 80°						
47.35 - 50.00	2.65	" Mørk,mlk.bandet (lagdelt) med cm-tykke Amf.band. Spredte gr. 1-3 mm. fortr. vis i Amf.band.	70° 75°						

19/2 1981
Stellan Burman

Lokalitet: 43.755

Borehull: 737

Dato Jan. -81

Koordinater : X: 925.423,4 Y 43.756,4

Retning : S

Helling/stigning: - 60°

Høyde : - 48,3

Lengde : 50.0 m.

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.65	7.65	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka cm-tykke biot.rikere band. Spredte gr. 1-2 mm. Sl ved 0.70-1.00 m	65° 70°						
7.65 - 8.10	0.55	Biot.gn. Mørk,mlk. m/2 gl.gn.band. Impr. Sl,Cp,Gn,Py.	70°	0.29	0.49	1.14			3
8.10 - 9.35	1.25	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka cm-tykke Biot.gn.band. m/Sl Cp,Gn,Py.	65° 70°	0.03	0.06	0.27			
9.35 - 9.70	0.35	2 gl.gn. Rel.lys,mlk.enkelte skarn-band Sl,Cp,Gn,Py.	70°	2.20	0.52	4.64			
9.70 - 14.60	4.90	2 gl.gn.bd. Lys,mlk.rel.kv.rik. Spr. opp til dm.tykke biot. Hbl.gn.band m/skarn. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	60° 70°						
14.60 - 19.45	4.85	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.-fink. kv.rik.Spr. gr. 1-2 mm. spor Py. homogen.	70°?						
19.45 - 20.65	1.20	2 gl.gn.bp. Lys,mlk. kv.rik.enstaka cm-tykke Sl,Py striper. Sl,Py striper. Spr. gr. 1-2 mm.	60°	0.13	0.14	0.76			
20.65 - 22.20	1.55	Biot.gn. Mørk,mlk. str. Sl,Cp,Gn,Py	60°	0.68	0.60	3.10			
22.20 - 22.80	0.60	Pegn. Spor Gn.		0.67	0.11	0.28			
22.80 - 23.05	0.25	Biot.gn. Mørk,mlk. (skarnførende) Rik Sl,Cp,Gn,Py.		1.70	0.51	8.16			

Lokalitet:

Borehull: 737

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
23.05 - 23.70	0.65	2 gl.gn.bb	Rel.lys,mlk.spor gr. 1-2 mm. ved 23.60-23.70 Biot.hbl. gn. m. Sl,Cp,Gn,Py.	65°	0.17	0.13	1.67		
23.70 - 29.20	5.50	2 gl.gn.bp.	Lys,mlk.enstaka gr. 1-3 mm Svak impr. Py Ved 26.50 spor Sl	60° 65°					
29.20 - 29.70	0.50	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. Brecciert Sl,Cp, Gn,Py		0.31	0.69	1.40		
29.70 - 34.60	4.90	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk.enstaka opp til 5 cm. tykke Pegm.og Biot.gn.band. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	65° 70°					
34.60 - 35.70	1.10	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. Py,Cp, Sl?	65°	0.02	0.14	0.14		
35.70 - 36.65	0.95	2 gl.gn.b.p.	Rel.lys,mlk. spor Py	65°	0.01	0.04	0.10		
36.65 - 37.95	1.30	Biot.gn.	Mørk,mlk.enkelte partier 2 gl.gn. str. Sl,Cp,Gn,Py	65° 70°	0.65	0.18	1.90		
37.95 - 42.70	4.75	2 gl.gn.bb.	Rel.lys,mlk. enstaka cm- tykke Pegm./Biot.gn.band. Spr. gr. 1-2 mm.	70°	0.14	0.09	0.41		37.95-38.95
					0.01	0.02	0.06		41.75-42.70
42.70 - 44.05	1.30	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ hbl.biot.gn.band. Str. Sl,Cp,Gn,Py.	65°	2.80	0.19	5.36		
44.05 - 44.60	0.55	2 gl.gn.	Rel.mørk,mlk. skarnførende		0.19	0.09	0.16		
44.60 - 46.90	2.30	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. bandet m/opp til 5 cm.tykke hbl.gn.band gr.førende 1-4 mm. fortr. vis i hbl.gn.band. Impr.Py	65°					
46.90 - 50.00	3.10	hbl.gn.	Mørk,mlk.enstaka cm.tykke 2 gl.gn.band.gr.førende 1-5 mm. Impr. Py	60°					
				65° 70°					

Lokalitet: *Profil 44.430*

Dato: *Jan-81*
 Koordinater: *X: 925.473 Y: 44.430*
 Retning: *S*
 Helling/stigning: *- 45°*
 Høyde: *- 64*
 Lengde: *17.50 m.*

Borehull: 736

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	Kv.Pegm. Visse biot.skikt, spor <u>Sl</u>		<i>< 0.01</i>	<i>0.03</i>	<i>0.04</i>			
0.60 - 1.80	1.20	Biot.gn. Mørk, mlk- enstaka opptil 5 cm. tykke 2 gl.gn.band, impr. <u>Py</u>	<i>45°</i>	<i>0.04</i>	<i>0.13</i>	<i>0.53</i>			
1.80 - 4.80	3.00	2 gl.gn.bd. Rel.lys, mlk.spor gr. svak impr. <u>Py</u>	<i>45°</i>						
4.80 - 7.00	2.20	Biot.sk. Mørk, mlk.-grovk. enstaka cm-tykke Amf.band. Impr. <u>Py</u> , <u>Cp</u> , (<u>Sl</u> ?).	<i>20-45°</i>	<i>< 0.01</i>	<i>0.18</i>	<i>0.16</i>			<i>4.80 - 5.80</i>
				<i>0.12</i>	<i>0.72</i>	<i>1.63</i>			<i>5.80 - 7.00</i>
7.00 - 7.60	0.60	Biot.hbl.gn. Mørk, mlk.impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u> , <u>Po</u> .	<i>45°</i>	<i>0.66</i>	<i>0.36</i>	<i>3.59</i>			
7.60 - 10.40	2.80	Biot.gn. Mørk, mlk.tildels hbl.før. impr. <u>Py</u> .	<i>45°</i>	<i>0.01</i>	<i>0.17</i>	<i>0.06</i>			<i>7.60 - 8.60</i>
10.40 - 11.30	0.90	hbl.gn. Mørk, mlk.spredte gr. 1-2mm	<i>45-50°</i>						
11.30 - 15.50	4.20	Biot.gn. Mørk, mlk. enstaka cm-tykke kv. og hbl.band. Impr. <u>Py</u>	<i>45-50°</i>						
15.50 - 17.50	2.00	2 gl.gn.bd. Lys, mlk.kv.rik, enstaka gr 1-2 mm. Svak impr. <u>Py</u>	<i>45°</i> <i>40°</i>						

23/1 1981
 Stellan Burman

Lokalitet: *Profil 44.430*

Dato 23/1 1981
 Koordinater : X:925.473 Y:44.430
 Retning : S
 Helling/stigning: Horisontalt
 Høyde : - 62,5
 Lengde : 14,65 m

Borehull: 735

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.40	1.40	2 gl.gn. rel.lys,mlk. kv.rik Middels grov, spor <u>Py</u>	25 ⁰ 30 ⁰						
1.40 - 1.65	0.25	Pegm.		0.01	0.01	0.07			
1.65 - 2.10	0.45	2 gl.gn.gn. Rel.lys,kv.rik.bd. middels grov. impr. <u>Py,Po,Cp</u>	25 ⁰ 30 ⁰	0.01	0.17	0.03			
2.10 - 2.50	0.40	Biot.sk. Mørk,mlk. kv.rik. Py,Po <u>Stripet impr. Sl</u>	20 ⁰ 25 ⁰	0.57	0.16	3.44			
2.50 - 3.00	0.50	Hbl.gn. Mørk,middels grov i veksl. med 5 cm band med pegm. spor <u>Po,Py</u>	60 ⁰ 70 ⁰	0.01	0.07	0.14			
3.00 - 5.45	2.45	2 gl.gn. b.d. rel.lys,middels til grov k. kv.rik.impr. Py	0-10 ⁰	0.01	0.24	0.31			4.45-5.45
5.45 - 6.00	0.55	2 gl.gn. Lys,middels grov kv.rik impr. <u>Py</u>		0.01	0.21	0.12			
6.00 - 7.00	1.00	Biot.gn. Mørk,grovkornet.Impr. <u>Py,Po,Cp,</u>	0-20 ⁰	0.01	0.43	0.18			
7.00 - 14.65	7.65	2 gl.gn. rel.lys,ml.grov. sv.impr. <u>Py</u>	0-15 ⁰	0.02	0.26	0.19			7.00-8.00

Lokalitet: 44.430

Borehull: 734

Dato

Koordinater : X: 925.473 Y: 44.430

Retning : S

Helling/stigning: + 45°

Høyde : -63.5

Lengde : 9.70 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.55	0.55	Biot.gn. Mørk,mlk. Brecciert med spor <u>Sl</u> , som sprekkefyll.							
0.55 - 1.05	0.50	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk.	20°						
1.05 - 1.55	0.50	Biot.gn. Mørk,mlk.stripet <u>Sl,Cp,Gn</u> , <u>Py</u>	20°	0.98	0.06	4.57			
1.55 - 4.15	2.60	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. m/enkelte dm-tykke hbl.gn.band.	10° 20°						
4.15 - 4.60	0.45	hbl.gn. Mørk,mlk.							
4.60 - 8.45		2 gl.bd. Rel.lys,mlk. enst. hbl.band 0 spr. gr. 1-2 mm.							
8.45 - 9.70		Hbl.gn.							

Lokalitet: Profil 43.755

Borehull: 732

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning

Høyde

Lengde

Jan-81

X: 925 426 Y: 43,755

S

70°

- 48

52.60 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.05	7.05	2 gl.gn.bd. Lys,mlk.rel.kv.rik. enstaka cm-tykke biot.gn.band. Spr. gr. 1-2 mm. spor Py Ved 0,50 og 6,50 spor Sl	60°	0,04	0,02	0,21			6,05-7,05
7.05 - 7.90	0.85	Skarn biot.gn. Mørk,mlk-grovk. Impr. Sl, Cp,Gn,Py	60°	0,48	0,34	1,59			
7.90 - 9.60	1.70	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.vekslende med opp til dm-tykke biot.gn. band. impr. Py. Spor Sl fortrinnsvis i biot.gn.bånd	70°	0,11	0,11	0,39			
9.60 - 10.10	0.50	Skarn,biot.gn. Mørk,mlk-grov. impr. Sl,Cp,Gn,Py.		2,30	0,42	6,15			
10.10 - 17.05	6.95	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka biot. rikere partier, opp til dm-tykke. Sl ved 10.90-11.00	60°	0,43	0,10	0,77			10,10-11,10
17.05 - 17.70	0.65	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. delvis med skarn, pegm. biot. Sl,Cp, Gn,Py.	70°	0,85	0,81	1,65			
17.70 - 18.95	1.25	2 gl.gn.bp. Lys,mlk. enstaka små gr. 1-2 mm.	80°	0,05	0,06	0,13			
18.95 - 20.00	1.05	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. bandet med skarnførende biot.gn.band m/Sl,Cp,Gn,Py	70° 60°	0,28	0,93	2,31			
20.00 - 20.50	0.50	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. svak impr. Py Ved 20.25-20,30 Sl,Gn,Py	70°	0,52	0,73	0,53			
20.50 - 21.90	1.40	Biot.gn. Mørk,mlk.vekslende m/opp til dm-tykke 2 gl.gn.band. Str. Sl, Cp, Gn, Py	60°	2,00	0,49	4,35			

Borehull: 732

Dato
Koordinater
Retning
Helling/stigning
Hoyde
Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
21.90 - 24.90	3.00	2 gl.gn.bp. lys,mlk.enstaka små gr. 1-2 mm. Spor Py.	60°	0.38	0.03	0.26			2190-2290
24.90 - 26.10	1.20	Pegm.							
26.10 - 34.60	8.50	2 gl.gn.bp. lys,mlk. enstaka små gr. 1-2 mm. ved 33.80-33.95 Sl.	60° 70°	0.08	0.13	0.56			3360-3460
34.60 - 36.45	1.85	Biot.gn. Mørk,mlk. litt vekslende med 2 gl.gn.band. Spor hbl. Striper Sl,Cp,Gn,Py	80°	0.07	0.30	2.20			3460-3560
36.45 - 36.70	0.25	2 gl.gn.		<0.01	0.16	0.34			3560-3660 ?
36.70 - 37.65	0.95	Pegm.		0.02	0.06	0.13			
37.65 - 39.30	1.75	2 gl.gn.bp. Lys,mlk.spredte gr. 1-2 mm.	70°	<0.01	0.01	0.03			
39.30 - 40.90	1.60	" " " " " striper Lys Sl,Cp,Gn,Py	60°	0.94	0.22	3.89			
40.90 - 42.40	1.50	" " Rel.lys,mlk.enkelte dm-tykke bl.førende band. Spr. gr. 1-2 mm. fortrinnsvis i hbl. førende band.	70°						
42.40 - 44.80	2.40	Biot.hbl.gn. Rel.mørk,mlk. enkelte opp til dm.tyke hbl.gn.band. gr.førende 1-4 mm. Impr.Py	70° 80°						
44.80 - 49.50	4.70	Hbl.gn. Mørk,mlk. enkelte partier biot.hbl.gn.gr.førende 1-4 mm. Impr. Py	70°						
49.50 - 50.55	1.05	Biot.sk. Mørk,mlk.striper Py(Brecciert)	60°						
50.55 - 52.20	1.65	Hbl.gn. Mørk,mlk. Amfibolitisk Gr.førende 1-2 mm.	60°						

Lokalitet:

Borehull: 732

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
52.20 - 52.30	0.10	Pegm.							
52.30 - 52.60	0.30	Klorit sk.? Grønn, mlk. fin, bløt, komp.							
23/1 1981 Stellan Burman									

Lokalitet: 43.755

Borehull: 731

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning

Høyde

Lengde

Jan - 81

X: 925.426 Y: 43.755

S

- 80°

- 48

50.0 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	2 gl.gn.bd. Lys, mlk. kv.rik, spor gr. 1-2 mm.	80°						
0.40 - 0.65	0.25	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. skarnførende striper Sl,Cp,Gn,Py	70	0.82	0.27	2.08			
0.65 - 6.75	6.10	2 gl.gn.bp. Lys,mlk.rel.kv.rik. enstaka cm-tykke biot.hbl. band. spredte gr. 1-3 mm	70						
			80	0.04	0.02	0.06			5.75-6.75
6.75 - 7.30	0.55	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk-grovk. tildels skarnførende. Stripet imp. Sl,Cp,Gn,Py	80°	0.35	0.48	0.79			
7.30 - 7.80	0.50	2 gl.gn.bd. Lys,mlk.kv.rik enstaka filmtynne biot.skikt. svak impr. Py	80	0.03	0.02	0.04			
7.80 - 9.60	1.80	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. skiktad.m/mm-tynne biot.skikt. enkelte dm.tykke skarnførende band med rik Sl,Gn. Stripet impr. Sl,Gn,Cp,Py	80 90	1.26	0.28	3.23			
9.60 - 10.10	0.50	Biot.hbl.gn.(sk) Mørk, mlk-grovk. Brecciert med Sl som sprekkefyllinger. Sl,Cp, Gn,Py	70 1 90°	1.75	0.41	8.36			
10.10 - 10.50	0.40	2 gl.gn.bp. Lys,mlk. rel.kv.rik. enstaka cm-tykke hbl.biot. band. Striper Sl,Cp,Gn,Py.	70 80	2.25	0.47	4.90			
10.50 - 15.90	5.40	2 gl.gn.bp. Lys,mlk.kv.rik. spredte gr 1-2 mm. Svak impr. Py	70 80	0.05	0.05	0.13			10.50-11.50
				0.02	0.01	0.02			14.90-15.90

Lokalitet: 43.755

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 731

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15.90 - 16.50	0.60	Biot.sk. Mørk,mlk. impr. Sl,Cp,Gn,Py	70°	0.66	0.79	1.49			
16.50 - 16.70	0.20	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. striper Sl,Cp,Gn,Py	80°	0.64	0.37	1.53			
16.70 - 17.00	0.30	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. kv.rik	70°	0.23	0.52	1.20			
17.00 - 18.00	1.00	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-tykke biot.rikere band. Stripet Sl,Cp,Gn,Py	70° 80°	0.50	0.70	2.56			
18.00 - 18.20	0.20	Pegm. Sl,Cp,Gn,Py		0.91	0.31	0.15			
18.20 - 18.40	0.40	Calci Anhydrit		0.25	0.22	1.12			
18.40 - 18.55	0.15	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. impr. Py	60°	2.00	0.28	0.01			
18.55 - 18.80	0.25	Pegm. Gn.		0.73	0.10	0.08			
18.80 - 20.55	1.75	2 gl.gn.bd. Rel lys,mlk. vekslende bandet) m/cm-dm-tykke biot-rikere partier, tildels skarnførende stripet Sl,Cp,Gn,Py	70° 80°	1.30	0.59	4.04			
20.55 - 27.80	7.45	2 gl.gn.bp. Lys,mlk.kv.rik.enstaka små gr. 1-2 mm. spor Py fra 24.60 - 25.00. Sl,Cp,Gn,Py	80°	0.47 0.73	0.04 0.28	0.77 1.90			20.55-24.55 24.60-25.00
27.90 - 29.95	2.05	Pegm. Spor Gn,Cp.							
29.95 - 32.95	3.00	2 gl.gn.bp. Lys,mlk. kv.rik. enstaka cm-tykke pegm.band. Spredte gr. 1-2 mm. spor Py	70° 80°	0.04	0.03	0.07			31.95-32.95
32.95 - 33.90	0.95	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. banda m/cm-dm-tykke biot.hbl.gn.band med Sl,Cp,Gn,Py.	70°	0.43	0.43	4.37			

Lokalitet:

Borehull: 731

3.

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
33.90 - 34.75	0.85	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk.-grov. stripet impr. Sl,Cp,Gn,Py	80°	0,17	0,26	9,22			
34.75 - 35.20	0.45	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.enstaka små gr. 1-2 mm. Spor Py	70°	0,06	0,03	0,26			
35.20 - 38.15	2.95	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.vekslende m/partier biot.,biot.hbl. partier. m/Sl,Cp,Gn,Py,Po.	70°	0,73	0,31	4,75			35,20-36,60
			80°	1,55	0,40	4,83			36,60-38,15
38.15 - 49.70	11.65	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. vekslede med opp til et par dm-tykke biot. hbl.førende band. Impr. Py fortrinnsvis i biot.hbl.gn.	70°	0,05	0,02	0,18			38,15-39,15
			80°						
49.70 - 50.00	0.30	Pegm.							
		23/1 -81 Stellan Burman							

Lokalitet: *Profil. 44.570*

Borehull: 730

Dato : Des. 1980
 Koordinater : X: 925.474,5 Y: 44.570
 Retning : Opp
 Helling/stigning: + 90°
 Høyde : - 94.5
 Lengde : 41.45 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser <i>Ag/1</i>				Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% Fe	
0.00 - 32.00	32.00	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.enkelte dm-tykke Pegm.band. samt fra 20.00 enkelte biot.rikere partier.	70° 80°					
32.00 - 33.00	1.00	Pegm.						
33.00 - 33.45	0.45	Biot.gr.(sk). Mørk,mlk.kv.sprengt impr. <u>Py,Cp,Gn,Po.</u>	60° 70°	<i>0.17</i>	<i>0.43</i>	<i>4.48</i>	<i>9.9</i>	
33.45 - 34.15	0.70	2 gl.gn. Rel.lys mk. spor <u>Py</u>	80°	<i>0.07</i>	<i>0.10</i>	<i>0.22</i>	<i>2.9</i>	
34.15 - 34.65	0.50	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk-grov. impr. <u>Sl,Cp</u> <u>Gn,Py.</u>	70 60°	<i>1.85</i>	<i>0.34</i>	<i>3.22</i>	<i>64.0</i>	
34.65 - 35.50	0.85	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. impr. <u>Py.</u>		<i>0.06</i>	<i>0.05</i>	<i>0.23</i>	<i>3.0</i>	
35.50 - 35.80	0.30	Amf. Mørk, massiv gr.førende 1-4 mm.						
35.80 - 38.85	3.05	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.vekslende m/cm-tykke hbl.gn.band. Hbl.gn. band. gr.førende impr. <u>Py</u>	60°					
38.85 - 39.10	0.25	Kv.						
39.10 - 41.45	1.35	Biot.hbl.gn. mørk,mlk.	70°					

23/12 1980
 Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.570

Borehull: 729

Dato Des. -80
 Koordinater : X: 925.475 Y: 44.570
 Retning : N
 Helling/stigning: + 77°
 Høyde : - 94,5
 Lengde : 47,40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser <i>Gr. Ag. 1/2</i>					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 34.70	34.70	2 gl.gn.b.c. Rel.lys,mlk. enstaka dm-tykke pegm.band.	70° 80°						
34.70 - 35.65	0.95	biot.gn. Mørk,mlk.enkelte cm-tykke 2 gl.gn.band. svak impr. Py	70°	0.24	0.12	0.67	5.8		
35.65 - 36.65	1.00	" Mørk,mlk.litt skarn str. imp. Sl,Cp,Gn,Py.	70°	1.60	0.15	2.28	27.7		
36.65 - 37.20	0.55	" Mørk,mlk.litt skarn. Stripet impr. Py,Po(Sl,Gn)?		0.06	0.25	1.23	5.0		
37.20 - 38.40	1.20	" " Sl,Cp,Gn,Py	70°	1.01	0.05	2.70	18.5		
38.40 - 39.00	0.60	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.filterpreg svak impr. Cp,Sl,Py.	70°	0.27	0.13	1.06	7.1		
39.00 - 40.00	1.00	" Rel.lys,mlk.enstaka gr.1-2 mm. impr. Py	60° 70°	0.03	0.08	0.27	2.6		
40.00 - 41.40	1.40	Biot.gn. Mørk,mlk. enkelte gr. 1-3mm Impr. Po,Py	60°						
41.40 - 47.40	6.00	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enkelte opp til 5 cm tykk biot.gn.band. Svak impr. Py. Spredte gr. 1-3 mm.	70°						

23/12 1980
 Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.570

Dato Des. 80
 Koordinater : X: 925.480 Y: 44.570
 Retning : N
 Helling/stigning: + 72°
 Høyde : - 94,5
 Lengde : 47,50

Borehull: 328

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 40.50	40.50	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. vekslende m/spr. biot.rikere partier også dm-tykke Pegm.band. Spredte gr.	60° 70°						
				0.25	0.03	0.48	2.2		40.0 - 40.50
40.50 - 41.00	0.50	Biot.gn. Mørk,mlk. Striper Sl,Cp, Gn,Py.	70°	1.28	0.56	3.41	23.9		
41.00 - 43.90	2.90	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.enstaka cm-tykke Biot.band m/gr. 1-3 mm.	70°						44.00 - 42.00
43.90 - 47.50	3.60	Biot.gn. Mørk,mlk. litt vekslende m/s gl.gn.band. Svak impr. Py. Spredt gr. 1-2 mm	60° 70°						

23/12 1980
 Stellan Burman

Lokalitet:

Borehull: 727

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning

Høyde

Lengde

7. jan - 81

X: 925.426 Y: 43.755

Lodd.

-90°

-48.0 m

50.0 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.80	7.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/dm.brede b.d.parti. Spr. gr. 1-2 mm cm-brede striper Sl, ved 0,25,0,35, 1,40, 1,50.	70° 80°	0.01	0.01	0.05			6.80-7.80
7.80 - 8.75	0.95	" Impr. Sl,Cp,Gn,Py	80°	0.24	0.37	1.78			
8.75 - 9.30	0.55	" Lys,mlk,kv.rik. Svak impr. Py		<0.01	0.05	0.11			
9.30 - 9.85	0.55	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. impr. Sl,Gn,Cp,Py	65°	1.14	0.38	2.20			
9.85 - 16.70	6.85	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl.gn.b.d. Cm-brede striper Sl ved 11.60, 11.80,12.70, 13.25, 13.70, 14.10 (spor).	70°	0.12	0.08	0.08			9.85-10.85
				<0.01	<0.01	0.01			16.60-12.60
16.70 - 17.10	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. impr. Sl,Cp,Gn,Py		0.97	0.33	2.27			
17.10 - 18.05	0.95	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spr.gr. 1-3mm Svak impr. Py	70°	0.04	0.07	0.10			
18.05 - 20.15	2.10	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. tildels hbl. skarnførende, impr. Sl,Gn Cp,Py	70° 80°	0.40	0.31	0.99			18.05-12.00 ?
				1.91	0.70	4.30			12.00-30.15 ?
20.15 - 30.65	10.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl.gn.b.d. fortrinnsvis m/spr. gr.1-3mm	80°	0.11	0.04	0.20			20.15-24.00
				0.11	0.05	0.02			30.00-30.65
30.65 - 31.70	1.05	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. vekslende m/cm-dm-brede band pegm. og 2 gl.gn.alm. Impr. Sl,Cp,Gn,Py, fortrinnsvis i biot.gn.	70° 80°	0.49	0.37	1.20			

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull:

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
31.70 - 32.55	0.85	2 gl.gn.alm. rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl.gn. b.d. m/spor Sl.	80°	0.02	0.13	0.11			
32.55 - 33.50	0.95	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. tildels hbl. og skarnførende, impr. Sl,Cp,Gn,Py	80°	0.57	0.46	4.80			
33.50 - 34.90	1.40	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm.	80°	0.05	0.07	0.04			
34.90 - 35.05	0.15	Malm		2.65	0.30	8.00			
35.05 - 36.55	1.50	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band biot.gn. hbl.førende. Spr. gr. spor Sl. ved 35.30.	80°	0.06	0.21	0.32			
36.55 - 37.00	0.45	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. tildels skarn-førende. Str. impr. Sl,Gn,Cp,Py.		0.36	0.74	3.29			
37.00 - 37.50	0.50	Biot.gn. Mørk,mlk.svak impr. Py. Ved 37.35 impr. Sl.	80°	0.10	0.07	0.18			
37.50 - 38.10	0.60	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/2 gl.gn.alm. Spr. striper Sl,Gn,Cp,Py.	80°	1.56	0.20	4.60			
38.10 - 43.00	4.90	" Vekslende m/cm- 2 dm.brede band 2 gl.gn.alm. spor hbl. gr. og skarn.	80°	0.02	0.04	0.07			38.10 - 43.10
43.00 - 50.00	7.00	hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm.	70-80°						

29.1. 1981
H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.670

Borehull: 726

Dato Des. 80
 Koordinater : X: 925.485,5 Y: 44.680
 Retning : N
 Helling/stigning: + 82°
 Høyde : - 94.0
 Lengde : 41.50 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	g-Ag/g	% Fe	
0.00 - 26.20	26.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede 2 gl.gn.bd. og pegm.band. spr. gr. 0,5-3 mm fortrinnsvis i biot. rike parti.	70° 80°						
26.20 - 27.40	1.20	Biot.gn. Mørk,mlk.vekslende m/dm.-brede pegm.band. spor hbl. impr. Py,Po. Fra 26.20-26.25 spor Sl.	80°						
27.40 - 28.15	0.75	Pegm.		0.03	0.03	0.06	0.1		
28.15 - 29.35	1.20	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. spor hbl. impr. Sl,Gn,Cp,Py,Po	70° 75°	0.61	0.51	4.78	19.4		
29.35 - 31.40	2.05	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.vekslende m/dm brede 2 gl.gn.b.d.band. Spr. gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py. Fra 29.70-29.75 Spor Sl.	60° 80°	0.06	0.09	0.24	2.9		2935-3035
31.40 - 32.70	1.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk, spr.gr. 1-5 mm. svak impr. Py.	70°						
32.70 - 41.50	3.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede 2 gl.gn.b.d. og pegm.band. spr. gr.0,5-3 mm. Svak impr. Py.	60° 80°						

4.12. 1980

H.P.

Lokalitet: 44.670

Borehull: 725

Dato Des. -80

Koordinater : X: 925.486 Y: 44.680

Retning : N

Helling/stigning: 67°

Høyde : -940

Lengde : 44.35 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	g-Pb/g-S	% Fe	
0.00 - 30.00	30.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl. gn.bd. og pegm. Spr. gr. 1-3 mm, fortrinnsvis i b.d. parti.	70° 80°						
30.00 - 30.25	0.25	Pegm.							
30.25 - 34.05	3.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm.	60° 70°						
24.05 - 35.45	10.40	Biot.gn. Mørk,mlk.tildels hbl. førende. Fra 34.05 - 35.00 god impr. Sl,Cp,Gn,Py. Fra 35.00-35.45 spr. striper malm.	30° 60°	0.03	0.02	0.05	0.6		3305-3405
35.45 - 40.00	4.55	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. dm. brede pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	60°	0.06	0.04	0.20	0.9		3545-3645
40.00 - 40.85	0.85	Pegm.							
40.85 - 44.35	3.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	70°						

3/12 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.670

Dato

Nov. 80

Koordinater

X 923.486 Y: 44.680

Retning

N

Borehull: 724

Helling/stigning:

+ 60°

Høyde

- 97.0

Lengde

56.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 20.70	20.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik. veksl. m. spredte dm.brede 2 gl. gn.bd. partier med spr. gr. 1-3 mm. Spor Py i de biot.rikere partier. Även enstaka Pegm.band.	80° 70°						
20.70 - 44.20	23.50	2 gl.gn.bd. Lys,mlk.enstaka opp til 5 cm. tykke biot.hbl.band. Spredte gr. 1-3 mm. spor Py. Gr.førende i Biot. hbl.band.	60° 70°						
44.20 - 45.25	1.05	Pegn.							
45.25 - 47.70	2.45	2 gl.gn.bd. (Se ovenf.)	70°						
47.70 - 49.20	1.50	Biot.sk. Mørk,mlk-grovk. litt ondulerende. Gr.førende 1-2 mm. Impr. Py.							
49.20 - 50.05	1.15	Biot.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. Impr. Py	70° 80°						
50.05 - 51.60	1.55	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.spredte gr. 1-2 mm.	70°						
51.60 - 51.85	0.15	Skarn foldet.							
51.85 - 54.80	3.95	Biot.gn. Mørk,mlk.vekslende m.opp til 5 cm. tykke hbl.gn. band. gr.førende 1-4 mm.	70°						
54.80 - 55.10	0.30	Hbl.gn. Mørk,mlk.-grov.							
55.10 - 56.50	1.40	Biot.gn. Se ovenf.							
2.12. 1980, Stellan Burman									

Lokalitet: 4.670

Borehull: 723

Dato: Nov. 80
 Koordinater: X: 925.486 Y: 44.680
 Retning: N
 Helling/stigning: 75°
 Høyde: - 94.0
 Lengde: - 47.45 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% Ag ^{As}	% Fe	
0.00 - 13.60	13.60	2 gl.gn.alm. rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede pegm.og 2 gl.gn. bd.band. Spr. gr. 0,5-2 mm fortrinnsvis i b.d.partiene Fra 5.60-5.65 spor Sl.	80° 60°						
13.60 - 28.90	15.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk.vekslende m/ cm-dm-brede pegm. og 2 gl. gn.alm.band. spr. gr. 1-3mm	70° 80°	0.03	0.02	0.09	0.4		27.90-28.90
28.90 - 29.45	0.55	" Striper, impr. Sl,Gn,Cp,Py	80°	4.10	0.24	7.56	98.1		
29.45 - 30.30	0.85	Biot.gn. Mørk,mlk.tildels m/hbl. svak impr. Py	80°	0.19	0.09	0.37	8.1		
30.30 - 31.00	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ dm-bred biot.gn.parti. Spr. striper Sl,Gn,Cp,Py	80°	0.41	0.20	2.02	11.9		
31.00 - 31.60	0.60	Biot.gn. Mørk,mlk.tildels m/hbl. imor. Sl,Gn,Cp,Py	80°	0.68	0.15	6.66	12.8		
31.60 - 32.20	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. striper, impr. Sl,Gn,Cp,Py	80°	1.40	0.04	5.75	32.9		
32.20 - 47.45	15.25	" rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm.	80°	0.10	0.06	0.40	4.1		32.20-33.20
2.12. 1980 Holger Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 43.980

Dato

Koordinater : X: 925.425 Y: 43.983

Retning : S

Hellingssvingning: - 70°

Høyde : - 67

Lengde : 29.30 m

Borehull: 722

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.85	1.85	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.rel.kv.rik. Spr. cm-dm-tykke skarnstriper med <u>Sl,Cp,Gn,Py</u> , Tap 1.00 - 1.30	65° 70°	1.18	0.19	4.54			
1.85 - 2.45	0.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.kv.rik. impr. <u>Py</u> Spor <u>Sl,Cp,Gn</u> .	65°	0.35	0.23	1.50			
2.45 - 3.60	1.15	" Lys,mlk.kv.rik.enstaka striper <u>Sl</u> .	65°	0.36	0.11	2.55			
3.60 - 3.95	0.35	Biot/pegm. Mørk,mlk.-grov. striper <u>Sl</u> , <u>Gn,Py</u>	65°	2.30	0.23	2.03			
3.95 - 4.80	0.85	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. striper impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u> .	60°	1.00	0.23	2.03			
4.80 - 9.75	4.95	4.95 Rel.lys,mlk. enstaka cm-tykke biot.hbl.band med gr. 1-3 mm. Spor <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	65° 70°	0.29	0.12	0.79			4.80 - 5.80
				0.30	0.23	0.96			5.80 - 6.80
				0.01	0.01	0.01			6.80 - 7.80
9.75 - 10.45	0.70	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk.imp. <u>Py</u>	80°						
10.45 - 11.35	0.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.kv.rik.spredte gr. 1-3 mm. spor <u>Py</u>							
11.35 - 12.45	1.10	Biot.gn. Mørk,mlk. litt ondulerende <u>Py</u> som klysor/sliror 11,65-11,75 hbl.førende	75° 65°						
12.45 - 14.75	2.30	2 gl.gn.bd. rel.lys mlk. vekslende med cm-dm-tykke biot.gr.band, enkelte hbl.førende. Imp. <u>Py</u> ,fortrinnsvis i biot.gn. band.	70° 75°						
				0.02	0.05	0.05			13.5 - 14.5
14.75 - 15.50	0.75	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk-grov.litt ondulerende,tildels brecciert striper <u>Sl,Cp,Gn,Py,Po</u>	70°	0.54	0.34	3.03			

Lokalitet:

Borehull: 722

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15.50 - 16.40	0.90	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.kv.rik. enkelte striper <u>Py,Po,Sl</u>	70°	0.10	0.13	0.61			
16.40 - 16.80	0.20	Biot.hbl.pegm. Mørk,grovk. sliror, <u>Py,Po,Sl</u>	65° 75°	0.04	0.25	0.75			
16.80 - 17.50	0.70	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. filmtynne biot. skikt.svak impr. <u>Py</u> Spor gr. 1-2 mm.	70°	0.01	0.03	0.01			
17.50 - 18.50	1.00	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.tildels skiktad m/biot. impr. <u>Py, Sl?</u> enstaka gr. 1-2 mm.	75°	0.01	0.07	0.07			
18.50 - 18.90	0.40	Biot.sk. Mørk,mlk.-grovk. ondulerad <u>Py,Po</u> som klysor,striper	75°	0.01	0.32	1.42			
18.90 - 19.60	0.70	2 gl.gn.m/ skarn rel.lys,mlk. enkelte biot. hbl.skikt. Impr. str. <u>Sl,Cp,Gn</u>	75°	0.75	0.29	3.28			
19.60 - 20.10	0.50	2 gl.gn.bd. al.lys,mlk. spredte gr.1-3 mm. Spor <u>Py</u> .	70°	0.07	0.07	0.89			
20.10 - 20.40	0.30	Komp.malm. <u>Sl,Cp,Gn,Py,Po</u>		0.69	0.51	15.20			
20.40 - 23.50	3.10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.enstaka dm-tykke biot.hbl.gn.partier. Svak impr. <u>Py</u> . spr. gr. 1-3 mm. fortrinnsvis i biot.hbl.band. Ved 23.35 - 23.40 <u>Sl</u> .	75°						2040-2140
23.50 - 29.30	5.80	hbl.gn. Rel.mørk,mlk. litt vekslende med hbl.biot.gn.partier. Impr. <u>Py</u> Gr.førende, fortrinnsvis i hbl.gn.							

25/11 1980
Stellan Burman

Lokalitet: 43.980

Dato

Koordinater : X:925.424 Y: 43.983

Borehull: 721

Retning : S

Helling/stigning: - 85°

Høyde : - 67

Lengde : 29.60 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.bp. Lys,mlk.kv.rik.impr. <u>Py</u> . Sl ved 0,05-0,07.		0,34	0,13	1,11			
0.50 - 3.60	3.10	" Lys,mlk.kv.rik. bandet med cm-dm-brede malm-band og slirer, <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	80°	0,95	0,28	3,96			0,50-2,00
				1,50	0,37	4,30			2,00-3,60
3.60 - 4.15	0.55	Biot.gn. Mørk,mlk.(skiktet) impr. <u>Py</u> Sl,Cp,Gn	70° 80°	0,61	0,25	1,29			
4.15 - 4.60	0.45	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.kv.rik.svak impr. <u>Py</u>	80°	0,24	0,11	1,14			
4.60 - 5.10	0.50	2 gl.gn.(skarnførende/ Lys,mlk-fink. Applitisk(kornig) impr. <u>Py,Sl,Gn</u> ?		0,29	0,25	1,30			
5.10 - 6.95	1.85	2 gl.gn.bp. Lys,mlk. kv.rik. enstaka biot.rikere partier. m/imp. <u>Py,Sl</u>	70° 60°	0,23	0,24	0,57			
6.95 - 10.30	3.25	2 gl.gn.bp. Lys,mlk.rel.kv.rik.spredte gr. 1-2 mm. spor <u>Py</u> .	70° 80°	0,02	0,06	0,06			4,5-7,5
10.30 - 10.55	0.25	Pegm.,							
10.55 - 11.50	0.95	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk.-grovk. impr. <u>Py</u>	70°						
11.50 - 12.45	0.95	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spor gr. 1-3mm, svak impr. <u>Py</u>	70°						
12.45 - 13.45	1.00	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. skiktet med opp til cm-tykke biot.skikt spor hbl. i biot.skiktene.	70° 60°	0,03	0,02	0,12			
13.45 - 13.80	0.35	Biot.gn/m 2 gl.gn. Mørk,mlk-grovk. Brecciert, Po, <u>Py</u> som sprekkefyllinger	"	0,08	0,44	0,66			
13.80 - 14.05	0.25	Komp. malm.		1,88	0,23	16,32			

Lokalitet:

Borehull: 721

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
14.05 - 14.60	0.55	2 gl.gn./ Biot.gn.	Rel.lys,mlk.(Brecciert) Po,Py som sprekkefylling	0.06	0.29	0.63			
14.60 - 14.90	0.30	Pegm.							
14.90 - 19.20	4.30	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. vekslende m/ dm-tykke biot.gn. m/hbl.band striper og impr. Sl,Cp,Gn,Py fortrinnsvis i biot.hbl.band.	0.18	0.21	0.73	1.74	2.	14.90-16.00
				0.02	0.13	0.74			16.00-17.50
				0.07	0.13	0.88			17.50-19.20
19.20 - 19.75	0.55	Biot.sk.	Mørk,mlk-grov. skifrig, impr. Sl,Cp,Gn,Py,Po	0.21	0.36	2.32			
19.75 - 19.90	0.15	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spor hbl. Spor Py	0.31	0.16	0.80			
19.90 - 20.35	0.45	komp. malm		5.30	0.25	20.70			
20.35 - 20.55	0.20	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk. skarnførende Str. impr. Sl,Cp,Gn,Py	1.60	0.72	6.30			
20.55 - 21.90	1.45	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. enstaka biot. skikt spor hbl. svak impr. Py, Sl	0.37	0.10	0.06			
21.90 - 25.05	3.15	hbl.gn.	Mørk,mlk.vekslende m/dm- tykke biot.hbl.gn.band. gr. 1-3 mm. Impr. Py, for- trinnsvis i biot.hbl.gn.	0.17	0.03	0.32			21.90-22.90
25.05 - 26.40	1.35	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk.enstaka gr. 1-4mm Impr. Py						
26.40 - 29.60	3.20	Hbl.gn.	Mørk,mlk.enstaka partier Biot.hbl.gn. gr.førende 1-4 mm. imp. Py stichto- litisk. 26.40-26,70. 28,40-28,60.						

Lokalitet: Profil 44.965

Borehull: 720

Dato: Nov. 1980
Koordinater: X: 925.422,5 Y: 44.965
Retning: Opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde: - 97.5
Lengde: 1.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py	80°						
18/11 1980 Holger Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 44.965

Dato : Nov. -80
 Koordinater : X: 925.420 Y: 44.965
 Retning : S
 Retning/stigning: 20°
 Høyde : - 101,5
 Lengde : 11.70 m

Borehull: 719

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.70	1.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede biot.gn. band. striper impr. <u>Sl,Gn</u> , <u>Cp,Py</u>	10° 20°	0.81	0.39	2.53			
1.70 - 2.00	0.30	" Impr. Py		0.12	0.35	0.78			
2.00 - 2.90	0.90	" Impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	15°	0.60	0.38	2.23			
2.90 - 11.70	8.80	" Rel.mørk,mlk.-grovk. veksl. m/cm-dm-brede biot.gn.band spr. gr. 1-5 mm. svak impr. Py.	20° 30°	0.03	0.07	0.12			2.90-3.90
18/11 1980 H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 44.965

Dato: Nov. 1980

Koordinater : X: 925 Y: 44.965

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : - 103,0

Lengde : 4,90 m

Borehull: 718

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.90	3.90	2 gl.gn.b.d. Rel. mørk, mlk. vekslende m/cm-dm-brede 2 gl.gn.alm. band. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	80° 90°						
3.90 - 4.90	1.00	Hbl.gn. Mørk, mlk. gr.førende 1-5 mm.	80°						
18/11 80 Holger Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 44.965

Borehull: 717

Dato: Nov. 1980
 Koordinater: X: 925.425 Y: 44.965
 Retning: N
 Helling/stigning: 20°
 Høyde: - 101,5
 Lengde: 17.0 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.90	1.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py Fra 1.50 - 1.52 spor Sl.	40°						
1.90 - 2.30	0.40	Pegm.							
2.30 - 17.00	14.70	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede pegm. og biot. band, spr. gr. 0,5-3 mm svak impr. Py.	30° 40°						
18/11 1980 H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 44.965

Borehull: 716

Dato : Okt. -80
 Koordinator : X: 925.420
 Retning : S
 Helling/stigning: + 45°
 Høyde : - 99,5
 Lengde : 11.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.00	4.00	2 gl.gn. Lys, mlk.	40°						
4.00 - 11.00	7.00	Hbl.biot.gn. Mørk mlk. gr.førende 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	40-45°						
16/11-80 Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.965

Borehull: 715

Dato : Okt. -80
 Koordinater : X:925.420
 Retning : S
 Helling/stigning : - 45°
 Høyde : - 103
 Lengde : 5,40

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.50	3.50	2 gl.gn. Lys,mlk. enstaka gr.1-2 mm	40°						
3.50 - 3.80	0.30	Biot.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	45°						
3.80 - 5.50	1.70	2 gl.gn. Lys,mlk.	40°						
16/11 1981 Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.965

Borehull: 714

Dato : Okt. -80
 Koordinator : X: 925.425 Y: 44.965
 Retning : N
 Helling/stigning: - 45°
 Høyde : - 103
 Lengde : 4,50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	2 gl.gn. Lys,mlk.	40°						
1.00 - 1.50	0.50	Pegm.							
1.50 - 4.50	3.00	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. enstaka gr. 1-2 mm. spor <u>Py</u>	40° 45°						
16/11 1980 Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.965

Borehull: 713

Dato : Okt. -80
 Koordinater : X:925.425
 Retning : N
 Helling/stigning: + 45°
 Høyde : - 99,5
 Lengde : 10,65 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. tildels biot. rik. Sl,Cp,Gn,Py	45°						
0.30 - 1.00	0.70	" Lys,mlk.	40-45°	0.22	0.22	0.90			
1.00 - 1.15	0.15	" " Po	45°	0.28	0.20	0.58	}		
1.15 - 1.55	0.40	Biot.gn. Mørk,mlk.	40°						
1.55 - 2.05	0.50	Skarn Litt 2 gl.gn. stripet imp. Sl,Cp,Gn,Py		2.00	0.55	6.25			
2.05 - 5.00	2.95	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spredte gr. 1-3 mm.	40-45°	0.04	0.03	0.27			2.05-1.95!
5.00 - 5.70	0.70	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk.	"						
5.70 - 5.95	0.25	Hbl.gn. Mørk,mlk. spredte gr. svak impr. Py	40°						
5.95 - 9.50	3.55	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. vekslende cm- tykke biot.band, gr.førende fortrinnsvis i hbl.gn. 1-3 mm.	40° 45°						
9.50 - 10.65	1.15	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. spor Py.	40°						

16/11 - 80

Stellan Burman

Lokalitet: 43.980

Dato

Koordinater : X:925.425 Y: 43.983

Retning : N

Helling/stigning: 83°

Høyde : - 67

Lengde : 26.55

Borehull: 712

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. Impr. Py		0.12	0.30	0.45			
0.30 - 1.00	0.70	" Impr. Sl,Gn,Cp,Py	65°	0.54	0.77	3.29			
1.00 - 1.30	0.30	Pegm.		0.04	0.26	0.27			
1.30 - 3.20	1.90	2 gl.gn.bd. Rel-mørk,mlk.vekslende m/dm brede pegm.band. tildels hbl.førende.impr. Sl,Gn,Cp, Py.	70°	0.19	0.57	2.13			1.30-2.30
				0.11	0.57	1.14			2.30-3.20
3.20 - 11.90	8.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.spor gr. svak impr. Py	70°	0.02	0.03	0.10			3.20-4.20
				0.01	0.01	0.04			10.90-11.90
11.90 - 13.20	1.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk.-grovk. veksł. m/dm-brede pegm. og 2 gl.gn. alm.band. spr. striper Sl,Gn,Cp,Py	70°	0.27	0.27	1.84			
13.20 - 13.40	0.20	Malm Hbl.førende		1.45	0.20	16.30			
13.40 - 15.70	2.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spr.gr. 1-3 mm Svak impr. Py. Ved 13.60 spor Sl.	70°	0.02	0.01	0.25			13.40-14.40
				<0.01	<0.01	0.01			14.40-15.70
15.70 - 16.40	0.70	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk-grovk.veksł. m/cm-brede biot.rike band. Spor Hbl. spr. striper Sl, Gn,Cp,Py	70°	0.23	0.38	2.12			
16.40 - 16.90	0.50	" Svak impr. Py		0.03	0.07	0.16			
16.90 - 18.40	1.50	" Veksłende m/biot.rike hbl.- førende band, fortrinnsvis m/god impr.Sl,Gn,Cp,Py.	1	1.14	0.67	9.36			

Lokalitet:

Borehull: 712

2.

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
18.40 - 19.05	0.65	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spr. biot.rike band. svak impr. Py.	70°	0.07	0.08	0.36			
19.05 - 19.70	0.65	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede biot.rike hbl.før. band, fortrinnsvis m/god impr. Sl,Gn,Cp,Py	70°	0.42	0.39	4.00			
19.70 - 20.60	0.90	" Svak impr. Py.	70°	0.03	0.13	0.34			
20.60 - 21.30	0.70	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. tildels hbl.førende striper, impr. Sl,Gn,Cp,Py,Po	70°	0.20	0.79	4.93			
21.30 - 22.70	1.40	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede biot.gn. og hbl.gn. band. tildels spr.gr. 1-3 mm. Impr. Py.	75°	0.02	0.09	0.15			2130-22,10
22.70 - 25.00	2.30	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. Svak impr. Py.	80°						
25.00 - 26.00	1.00	Biot.gn. Mørk,mlk.god impr. Py.	70-80°						
26.00 - 26.55	0.55	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-2 mm.							

21/11 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.980

Dato

Koordinater : X:925.425 Y: 43.983

Borehull: 711

Retning : N

Helling/stigning: 63°

Høyde : - 67

Lengde : 29.50 m.

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. vekslende m/dm-brede pegm.band. tildels hbl (skarn)førende Impr. Sl,Cp,Gn,Py,Po.	50°	0,14	0,24	1,03			
1.00 - 1.30	0.30	Pegm. Impr. Cp,Py,Po		0,06	0,75	0,24			
1.30 - 2.75	1.45	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. impr. Sl, Cp,Py,Po.	55°	0,72	0,29	2,70			
2.75 - 2.95	0.20	Pegm.		0,05	0,06	0,15			
2.95 - 3.60	0.65	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. impr. Sl,Gn, Cp,Py.	55°	0,28	0,26	0,58			
3.60 - 15.40	11.80	" Tildels kv.rik, spr. gr. 1-3 mm	50° 60°	0,21	0,07	0,05			360-460
15.40 - 16.70	1.30	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. svak impr. Py.	50°						
16.70 - 20.50	3.80	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spr.gr.1-3mm	50-60°	0,02	0,01	0,04			1850-20,20
20.50 - 21.80	1.30	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk.tildels kv.rik impr. Sl,Cp,Py,Po.	60°	0,01	0,14	0,52			
21.80 - 22.80	1.00	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede biot.gn.band. svak impr. Py.	60°	0,01	0,03	0,17			
22.80 - 23.70	0.90	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. tildels kv.rik.spor hbl. Impr. Py	60°	0,01	0,11	0,06			
23.70 - 24.60	0.90	" Maln		2,10	0,46	12,36			
24.60 - 25.20	0.60	" Impr. Py, spor hbl.gr.	60°	0,04	0,06	0,27			
25.20 - 26.30	1.10	Hbl.gn. Mørk,mlk.gr.førende 1-5 mm	60°						
26.30 - 27.00	0.70	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spor hbl. spr. gr. 1-3 mm. impr. Py	60°						

Lokalitet:

Borehull: 711

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
27.00 - 29.50	2.50	Hbl.gn. Mørk, mlk. gr. førende 1-3 mm	60°						
		20/11 1980 H. Pantdalsli							

Lokalitet: Profil 44.160

Borehull: 710

Dato :

Koordinater : X: 925.392 Y: 44.160

Retning : S

Helling/stigning: - 50°

Høyde : - 71

Lengde : - 25.5 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.05	3.05	2 gl.gn.bd. rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede band 2 gl.gn. alm. tildels hbl.førende impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	50°	1.05	0.56	3.68			0.0 - 1.50
			30°	2.60	0.53	8.50			1.50 - 3.05
3.05 - 3.30	0.25	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. spor hbl. impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	50°	0.14	0.53	1.26			
3.30 - 3.80	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl. førende. impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	45°	0.05	0.77	0.16			
3.80 - 4.15	0.35	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. spor hbl. impr. <u>Sl,Cp,Py</u>	50°	0.10	0.59	1.52			
4.15 - 5.00	0.85	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.kv.rik.tildels hbl.førende. striper, impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	50°	0.42	0.23	0.66			
5.00 - 7.30	2.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.hbl.førende, impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>		1.07	0.75	5.46			5.00 - 6.00
			50°	0.84	0.41	3.10			6.00 - 7.30
7.30 - 10.00	2.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik. tildels hbl.førende. striper, impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	50°	0.41	0.21	1.30			7.30 - 8.60
				0.60	0.31	2.04			8.60 - 10.00
10.00 - 10.90	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	50°	1.00	0.34	6.10			
10.90 - 13.30	3.40	" Rel.mørk,mlk. tildels hbl.- førende, spr. gr. 1-2 mm. svak impr. Py.	40°	0.05	0.02	0.17			10.90 - 11.90
			50°						
13.30 - 16.80	3.50	Hbl.gn. Mørk,mlk.spr. gr. 1-3 mm. god impr. Py	50°	0.05	0.08	0.10			15.80 - 16.80
16.80 - 17.30	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u> .	50°	0.15	0.64	0.90			

Lokalitet:

Borehull: 710

2.

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
17.30 - 19.70	2.40	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm. god impr. Py.	50°	0.04	0.05	0.12			17.30 - 19.30
19.70 - 20.90	1.20	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. hbl.førende, Striper impr. Sl.Gn,Cp,Py,Po	50°	0.03	0.03	0.05			19.30 - 19.70
20.90 - 26.50	5.60	" Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band pegm. og hbl.50° gn. spr. gr. 1-3 mm. fortrinnsvis i hbl.gn. Svak impr. Py.		0.06	0.03	0.21			
17/11 1980 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.160

Dato

Koordinater : X: 925.392 Y: 44.160

Retning : S

Helling/stigning: - 70°

Høyde : - 71,0 m

Lengde : 20,5 m

Borehull: 709

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.30	4.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ 1-2 dm.brede biot.gn.band. tildels hbl.førende, str. Impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	50° 80°	1,70	0,20	4,38			0,00-1,50
				0,64	0,31	3,07			1,50-3,00
				0,61	0,25	3,37			3,00-4,30
4.30 - 6.20	1.90	2 gl.gn.alm. lys,mlk.kv.rik.spor gr. svak impr. Py	60°	0,14	0,05	0,14			4,30-5,30
				0,02	0,02	0,06			5,30-6,20
6.20 - 9.10	2.90	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk.hbl.førende, impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	50°	1,06	0,17	4,86			6,20-7,70
				0,62	0,34	5,00			7,70-9,10
9.10 - 11.20	2.10	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. Hbl.førende impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	50°	0,61	0,29	1,10			9,10-10,10
				0,35	0,37	1,41			10,10-11,20
11.20 - 13.10	1.90	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. hbl.førende, vekslende m/dm-brede biot.gn. band. Impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	50°	0,26	0,59	3,13			11,20-12,20
				0,27	0,47	1,90			12,20-13,10
13.10 - 14.40	1.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. hbl.førende, spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	50°	0,05	0,17	0,55			
14.40 - 16.10	1.70	" Rel.mørk,mlk. hbl.førende, striper, impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	50°	2,00	1,14	10,50			
16.10 - 20.50	4.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.kv.rik, spor gr. svak impr. Py	50°	0,06	0,04	0,24			16,10-17,10
17/11 1980 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.122

Borehull: 708

Dato

Koordinater : X: 925.434 Y: 44.122

Retning : N

Helling/stigning: + 62°

Høyde : - 79.5

Lengde : 44.7 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.40	3.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/dm-brede biot.rike band. impr. Py. Fra 0,70-0,80 spor Sl.	50° 70°						
3.40 - 5.80	2.40	Biot.gn. Mørk,mlk.grovk. vekslende m/ dm-brede 2 gl.gn.alm.band. impr. Py,Po.	60°						
5.80 - 25.60	24.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik. spr. gr. 1-3 mm. 60°							
25.60 - 28.20	2.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.-grovk. veksl. m/1-2 dm-brede biot.gn. band fortrinnsvis m/impr. Py,Po, Ved 26.70, 27.20, 28,20 striper på ca. 1 cm m/sl.							
28.20 - 44.70	16.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik veksl. m/1-3 dm brede biot.rikere parti. spr. gr. 1-3 mm.	50° 60°						
20/11 1980 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.122

Dato : okt -80

Koordinater : X: 925.4345 Y: 44.122

Borehull: 707

Retning : Opp

Helling/stigning: 75

Høyde : - 79

Lengde : 40.00 m.

1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk, impr. Py. Spor Sl	5 80°	0.08	0.14	0.23			
0.60 - 1.70	1.10	Biot.gn. Mørk, grovk.-mlk., tildels m/cm-brede kv.band, impr. Py,Po, svak impr. Sl,Cp	80° 60°	0.03	0.10	0.19			
1.70 - 2.00	0.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. kv.rik, svak impr. Py, spor Sl,Cn.		0.03	0.06	0.07			
2.00 - 5.00	3.00	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. veksl. m/ kv.rik parti. spor skarn gr. vekslende impr. Sl, Cp,Gn,Py,Po	60°	0.18	0.30	1.18			2.00-3.50
			80°	0.02	0.13	0.20			3.50-5.00
5.00 - 5.30	0.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spor gr. svak impr. Py		0.16	0.26	0.02			
5.30 - 5.60	0.30	Biot.gn. Mørk,grovk.-mlk. svak impr. Py	70°	0.01	0.10	0.12			
5.60 - 11.00	5.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. tildels kv. rik. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	60° 70°	0.04	0.04	0.07			10.00-11.00
11.00 - 12.35	1.35	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. tildels kv. rik, spr. dm-brede band m/god impr. Sl,Gn,Cp,Py Skarn.	60° 70°	0.60 0.60	0.13	1.43			
12.30 - 13.05	0.75	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. svak inpr. Py. Spor gr.	70°	0.04	0.02	0.16			
13.05 - 14.75	1.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik, spor gr. svak impr. Py.	70°						
14.75 - 17.10	2.35	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. tildels kv. rik. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	70° 30°						

Lokalitet:

Borehull: 707

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
17.10 - 20.00	2.90	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. mass. kv.rik spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	70° 80°						
20.00 - 21.10	1.10	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py	70° 80°						
21.10 - 21.75	0.65	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. veksl. m/dm.brede pegm.band. impr. Py,Po. Ved 21.70 spor Sl	75°						
21.75 - 22.10	0.35	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. svak impr. Py.	70°						
22.10 - 23.35	1.25	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. spr. gr. 1-2 mm. Svak impr. Py.	70°						
23.35 - 25.60	2.25	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. kv.rik, spor gr. svak impr. Py. Fra 23.40 - 23.45 skarn m/god impr. Sl,Gn,Cp,Py	70° 75°						
25.60 - 26.10	0.50	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. Spr. gr. 0,5-3 mm. Fra 26.00-26.10 impr. Cp,Po,Py.	70°	0.04	0.06	0.11			
26.10 - 26.40	0.30	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.svak impr. Py		0.04	0.04	0.14			
26.40 - 26.60	0.20	" " Impr. Sl,Gn,Cp,Py		0.96	0.20	3.30			
26.60 - 27.35	0.75	" " Svak impr. Py, spor gr.	70°	0.06	0.05	0.27			
27.35 - 27.80	0.45	" " Striper impr. Sl,Gn,Cp,Py		0.53	0.16	2.35			
27.80 - 28.10	0.30	" " Svak impr. Py.							

Lokalitet:

Borehull: 707

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
28.10 - 29.50	1.40	2 gl.gn.alm. Striper impr. Sl,Gn,Cp,Py	60°70°	1.18	0.35	2.87			
29.50 - 29.95	0.45	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.svak impr. Py		0.12	0.08	0.25			
29.95 - 31.00	1.05	" " Impr. Sl,Gn,Cp,Py	65°	0.32	0.18	0.88			
31.00 - 31.20	0.20	Pegm.							
31.20 - 36.40	5.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/l-3 dm brede band 2 gl.gn bd. tildels kv.rik. spor gr. svak impr. Py.	60° 70°	0.09	0.07	0.24			35.40-36.40
36.40 - 37.25	0.85	" " Striper impr. Sl,Gn,Cp,Py	60°70°	0.66	0.23	1.62			
37.25 - 40.00	2.75	Vekslende m/pegm.striper svak impr. Py. Ved 39.20 spor Sl.	60°	0.03	0.01	0.07			37.25-38.25
5/11 1980 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.122

Borehull: 706

Dato : okt-80
 Koordinator : X:925.434 Y:44.122
 Retning : opp
 Helling/stigning: 90°
 Høyde : - 79
 Lengde : 38,30

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.75	1.75	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. vekslende m/dm-brede band 2 gl.gn.bd. Spor hbl. impr. Py, Po	70° 80°						
1.75 - 2.45	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. impr. Py. Fra 1.25-1.90 impr. Sl,Gn.	75°	0.11	0.11	0.77			
2.45 - 3.00	0.55	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. vekslende m/dm-bred pegm. Impr. Sl,Gn Cp,Py.	75°	0.56	0.30	2.66			
3.00 - 4.10	1.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels m/cm-brede band biot.gn. Spor gr. svak impr. Py	75°	0.02	0.01	0.12			
4.10 - 4.85	0.75	Biot.gn.(sk). Mørk,mlk-grovk. vekslende m/cm-dm-brede pegm.band. Impr. Sl,Cp,Py,Po.	70° 80°	0.02	0.24	0.41			
4.85 - 15.60	10.75	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl.gn. alm. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py. Fra 10.10 - 10.15 impr. Sl.	75°	0.21	0.15	0.10			
15.60 - 20.30	4.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. tildels m/dm-brede band pegm. spor gr.	80°						
20.30 - 23.10	2.80	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. impr. Py	75°						
23.10 - 24.50	1.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik. svak impr. Py.	75°	0.02	0.01	0.13			25.20-26.20
24.50 - 25.40	0.90	" " Svak impr. Sl, Gn, Cp, Py	75°	0.34	0.20	1.13			
25.40 - 35.00	9.60	" " Rel.lys,mlk. kv.rik, spor gr. svak impr. Py	70°80°	0.06	0.07	0.38			26.20-26.20

Lokalitet:

Borehull: 706

2.

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
35.00 - 38.30	3.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. tildels gr.førende. 1-3 mm Impr. Py	70° 80°						
		7.11. 1980 Holger Pantdalsii							

Lokalitet: Profil 44.900

Borehull: 705

Dato : Okt. 1980
 Koordinater : X: 925.401,5 y: 44.900
 Retning : S
 Helling/stigning: + - 0°
 Høyde : - 10,6
 Lengde : 5,50

Dybde	L	Bergart	S	Analyser				Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	
0.00 - 2.80	2.80	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.	0° 5°					
2.80 - 3.50	0.70	Skarn Mørk, Sl,Cp,Gn,Py (3,10-3,50 halve kjernen malm skarn, andre halv. 2 gl.gn.)	0° 3° 0°	1.70	0.85	6.59	29.6	
3.50 - 5.50	2.00	2 gl.gn. rel.lys,mlk.	2° 5°					
12/10 1980 Stellan Burman								

Lokalitet: Profil 44.900

Borehull: 704

Dato : Okt. 1980
Koordinater : X: 925.401,5 Y. 44.900
Retning : S
Helling/stigning: - 45°
Høyde : - 107,5
Lengde : 5,50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.30	5.30	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spredte gr. 1-3 mm.	45° 50°						
		11/10 1980 Stellan Burman							

Lokalitet: Profil 44.900

Borehull: 703

Dato : Okt. 1980
Koordinater : X: 925.417 Y: 44.900
Retning : N
Helling/stigning: - 45°
Høyde : - 107,5
Lengde : 5.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.30	5.30	2 gl.gn.bd. Rel.lys, mlk. spredte gr. 1-3 mm.	50° 60°						
		11/10 1980 Stellan Burman							

Lokalitet: Profil 44.900

Borehull: 702

Dato : Okt. -1980

Koordinater : X: 925.417 Y:44.900

Retning : N

Helling/stigning: + - 0°

Høyde : - 10,6

Lengde : 5.30

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.30	5.30	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. Spredte gr. 1-2 mm. spor <u>Py</u>	0° 5° 0°						
		11/10 1980 Stellan Burman							

Lokalitet: Profil 44.900

Borehull: 701

Dato : Okt. 1980

Koordinater : X: 925.413,6 Y: 44.900

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : - 107,5

Lengde : 2.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.20	2.20	2 gl.gn.bd. Rel, lys,mlk. kv.rik Spredte gr. 1-3 mm. 11/10 1980 Stellan Burman	80° 90°						

Lokalitet: Profil 44.900

Borehull: 700

Dato : Okt. 1980
 Koordinater : X: 925.417 Y: 44.900
 Retning : N
 Helling/stigning: + 40°
 Høyde : - 104,0
 Lengde : 13,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser				Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	
0.00 - 0.90	0.90	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. m/skarn <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>		1.03	0.23	4.41		17.3
0.90 - 2.35	1.95	Skarn Mørk,rik malm <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>		3.50	0.33	12.56		44.8
2.35 - 3.35	6.00	2 gl.gn.bd. lys,mlk. enkelte biot.skikt Svak imp. <u>Py.</u> spor Hbl. m/gr.	45° 50°					
8.85 - 13.30	4.45	2 gl.gn.bd. lys,mlk. spredte gr. 1-2 mm.	45°					

11/10 1980
 Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.900

Borehull: 699

Dato : Okt. 80
 Koordinater : X: 925.411,5 Y:44.900
 Retning : S
 Helling/stigning: + 45°
 Høyde : - 104
 Lengde : 11,50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	2 gl.gn.bd. Rel.lys, mlk. enkelte biot.band. spor hbl.	50°						
2.50 - 11.50	9.00	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka hbl. band med gr. 1-3 mm	45° 50°						
11/10 1930 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.160

Borehull: 697

Dato

Koordinater : X: 925.434 Y: 44.160

Retning : Opp

Helling/stigning: 90°

Høyde : - 79,5

Lengde : 35.55

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.05	1.05	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. impr. <u>Sl,Cp,</u> <u>Py,Po</u>	80° 50°	0.08	0.17	0.70			
1.05 - 1.95	0.90	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.kv.rik. svak impr. <u>Py. Spr. gr. 1-2 mm.</u> Fra 1,25-1,35 impr. <u>Sl,Cp,Py,Po</u>	80°	0,02	0,04	0,06			
1.95 - 3.40	1.45	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. vekslende m/ dm/brede band 2 gl.gn.alm. svak impr. <u>Sl,Cp,Py,Po</u>	60° 70°	0,07	0,08	1,15			
3.40 - 4.10	0.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.kv.rik, enkelte band m/skarn og impr. <u>Sl,Gn,</u> <u>Cp,Py,Po</u>	70°	0.70	0.31	2.31			
4.10 - 6.75	2.65	Biot.gn. Mørk,grovk.-mlk. vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl.gn. alm. spor hbl. Impr. <u>Sl,Cp,Py,Po</u>	80° 70°	0.29	0.18	0.55			4.10-5.50
6.75 - 7.90	1.15	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/dm. brede band biot.gn. spr. gr. 1-2 mm.	70° 80°	0,02	0,02	0,04			5.50-6.75
7.90 - 9.25	1.35	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. vekslende m/ cm-brede band 2 gl.gn.alm. spor hbl. Impr. <u>Sl,Cp,Py,Po.</u>	70° 80°	0,09	0,13	0,78			
9.25 - 18.10	8.85	2 gl.gn.alm. rel.lys,mlk. Spr. gr. 1-2 mm.	80°	0,13 0,10	0,04 0,04	0,40 0,37			9,25-10,25 17.10-18.10
18.10 - 19.10	1.00	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk.svakt ondulerende Impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py,Po.</u>	80°	0,22	0,16	0,56			
19.10 - 19.75	0.65	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. striper impr. <u>Sl</u> <u>Gn,Cp,Py</u>	80°	0,72	0,17	2,86			

Lokalitet:

Borehull: 697.

2

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19.75 - 24.90	5.15	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.vekslende m/dm-brede biot.rike parti fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm.	70° 80°	0,11	0,06	0,23			20.75-200
24.90 - 26.40	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor gr. impr. Py	70°						
26.40 - 29.85	3.45	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. tildels kv. rik. svak impr. Py. ved 9.25 spor <u>Sl</u>	70° 80°						
29.85 - 35.55	5.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslede m/cm-dm.brede pegm. og hbl.gn.band. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	70° 80°						

20.11. 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: *Profil: 44.265.*

Borehull: 696

Dato

Koordinater : X: 925.428 Y: 44.265

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde :

Lengde : 8,55 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.95	2.95	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ dm-bred pegm. og 2 gl.gn. bd-band. svak, impr. Py, spor gr.							
				0.05	0.60	0.20			195-295
2.95 - 3.60	0.65	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. impr. Sl, Cp,Py		0.63	0.16	3.25			
3.60 - 3.85	0.25	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. impr. Sl, Gn,Cp,Py.		0.48	0.87	9.20			
3.85 - 5.80	1.95	" Hbl.førende, spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py		0.04	0.06	0.21			385-485
5.80 - 7.20	1.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels m/ hbl. spr. gr. 1-3 mm.							
7.20 - 8.55	1.35	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik. Svak impr. Py.							

18/11 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.260

Dato

Koordinater : X: 925.435 Y: 44.265

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde :

Lengde : 8.55 m

Borehull: 695

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.10	2.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik. vekslende m/dm-brede biot. rike band. spor gr. Fra 0.70 - 0.85 spor Sl. Svak impr. Py.	70°						
2.10 - 3.75	1.65	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. impr. Py Fra 2.50 - 2.52 spor Sl	65°						
3.75 - 4.10	0.35	Pegm.							
4.10 - 5.40	1.30	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. impr. Py Ved 4.25, 4.60, 5.35 spor Sl.	65°						
5.40 - 8.55	3.15	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. svak impr. Py.	60° 70°						

18.11. 80
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 694

Dato :
 Koordnater : X: 925.475 Y: 44.770
 Retning : Opp
 Helling/stigning: + 90
 Høyde : - 95.0
 Lengde : 40.0 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	2 gl.gn. m/skarn	Rel.lys,mlk.-grov Sl,Cp,Gn,Py.	1.80	0.33	3.75			
0.40 - 15.00	14.60	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk. litt vekslende m/dm-tykke biot.rikere band även enstaka opp til 5 cm. tykke hbl.band gr. i hbl.band.	80° 70° 80°					
15.00 - 17.80	2.80	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. spredte gr. 1-3 mm. impr. <u>Py</u>	80° 90°					
17.80 - 40.00	22.20	Hbl.gn.	Mørk,mlk. gr.førende tildels rik 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>	80° 90°					

8/10 1980
 Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.770

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Kalle med Agn om
nummering?
y: 44.770Borehull: ~~693~~ 693

Lodd

-90°

-100

17.50

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-2 mm.	90°						
0.80 - 1.00	0.20	kv.							
1.00 - 1.90	0.90	2 gl.gn.bd. Se ovenf.	90°						
1.90 - 2.10	0.20	Skarn <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>							
2.10 - 2.90	0.80	Pegm.							
2.90 - 4.00	1.10	2 gl.gn. lys,mlk. enstaka pegm. band. spredte gr. 1-3 mm ved 3.30 <u>Sl.</u> spor <u>Py</u>	80°						
4.00 - 4.20	0.20	skarn <u>Sl.Cp,Gn,Py</u>							
4.20 - 8.70	4.50	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3mm Svak impr. <u>Py.</u> Ved 8.55 <u>Sl.</u>	80° 90°						
8.70 - 9.50	0.80	2 gl.gn.b.b. Rel.mørk,mlk. hvlførende klyser. impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	80°	0.46	0.19	1.42			
9.50 - 13.20		Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm Enstaka dm-tykke 2 gl.gn. band.	80° 70°						
13.20 - 13.80	0.60	Pegm.							
13.80 - 17.50		Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-2mm							

8/10 1980
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.770

Dato : Sept. 80

Koordinater : X: 925.482 Y: 44.770

Retning : N

Helling/stigning: + 60°

Høyde : - 95.5

Lengde : 47.80

Borehull: 692

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.70	6.70	2 gl.gn.bd. Rel.lys, mlk. kv.rik enstaka cm-tykke kv. Pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm.	60°						
6.70 - 7.90	1.20	2 gl.gn. Lys,mlk. rel.musk.rik. Impr. <u>Py</u>	60°						
7.90 - 15.90	8.00	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. rel.kv.rik enstaka opp til 5 cm. tykke Pegm.band. og biot.band Spredte gr. 1-3 mm. Spor Py i biot.bandene.	60° 50°						
15.90 - 17.40	1.50	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. vekslende m/ dm-tykke biot.rike band. (Skarnførende m/lys <u>Sl</u>) <u>Py, Cp, Gn.</u>	50°	0.05	0.02	0.12			14.90-15.90
17.40 - 20.10	2.70	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. Spr. gr. 1-3mm	50°	0.01	0.02	0.07			17.40-18.90
20.10 - 20.70	0.60	Biot.gn. Mørk,mlk. svak impr. <u>Py</u> .	40°						
20.70 - 22.80	2.10	2 gl.gn. Lys,mlk. kv.rik bandet med opp til 5 cm. tykke biot.hbl.band. Foldet.	50°	0.01	0.01	0.04			21.80-22.80
22.80 - 23.30	0.50	Biot.gn. Mørk,mlk. spor hbl. impr. <u>Sl, Cp, Gn, Py</u>	60°	0.30	0.12	0.66			
23.30 - 23.70	0.40	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. Spr. gr. 1-3mm	60°	0.03	0.02	0.11			
23.70 - 25.05	1.35	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. Biot. som skikt impr. <u>Sl, Cp, Gn, Py</u> . Foldet (Lys <u>Sl</u>).	60°	0.31	0.17	1.46			
25.05 - 25.95	0.90	Pegm. Spor Gn.		0.03	0.05	0.13			

Lokalitet:

Borehull: 692

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
25.95 - 27.50	1.65	Biot.gn. Mørk, mlk. bandet m/2 gl.gn. Pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. Sprøtt og grønn Sl, Cp, Gn, Py	70°	0,19	0,16	0,68			
27.50 - 29.05	1.55	Biot.gn. Mørk, mlk. spor hbl. foldet impr. Py, Sl, Cp, Gn.	50° 60°	0,55	0,17	2,53			
29.05 - 29.35	0.30	Pegm.							
29.35 - 30.10	0.75	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. spor hbl. Sl, Cp, Gn, Py	55°	0,25	0,11	1,48			
30.10 - 31.80	1.70	Hbl.gn. Mørk, mlk. gr.førende 1-4 mm rel.mass.		0,03	0,02	0,14			
31.80 - 33.05	1.25	Biot.gn. Mørk, mlk.-grov. vekslende m/cm-tykke pegm.band. Striper Sl, Cp, Gn, Py spor Po	60°	0,54	0,33	3,13			
33.05 - 34.30	1.25	" Mørk, mlk. spor hbl. Impr. Sl, Cp, Gn, Po, Py.	50°	0,21	0,30	3,11			
34.30 - 37.80	3.50	Biot.gn. Mørk, mlk. litt vekslende m/cm-tykke 2 gl.gn. pegm. band. Sl? Imp. Py, Po	50°	0,09 0,11 0,13	0,12 0,11 0,06	0,19 0,82 0,34			34.30-35.30 35.30-36.30 36.30-37.80
37.80 - 47.80	10.00	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. enstaka hbl. band m gr. 1-3 mm.	60° 70°						

25/9 1980
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.770

Dato : Sept. -80

Koordinater : X: 925.482 Y: 44.770

Borehull: 691

Retning : N

Helling/stigning: + 40°

Høyde : - 94

Lengde : 56,50

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. kv.rik. spr. gr. 1-3 mm.							
0.20 - 0.55	0.35	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm	60°						
0.55 - 5.95	5.40	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. vekslende m. dm.tykke partier biot.gn. Biot.hbl.gn. gr.førende (Fra 2.50-3.00 sterkt fold.)	60° 50°						
5.95 - 6.20	0.25	Kv.							
6.20 - 23.85	17.65	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-dm-tykke render og band av Pegm.,biot.hbl.gn. Spr. gr. Gr.førende i biot. hbl.band. 1-3 mm. Stedvis svak impr. Py	60° 40°						
23.85 - 24.30	0.45	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk-grov (flakig) gr.førende 1-3 mm. spor hbl.							
24.30 - 24.70	0.40	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk. kv.rik	45°	0,23	0,07	0,59			
24.70 - 25.40	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. litt skarn. Impr. Py, Sl, Cp, Gn.	45°	0,80	0,16	1,73			
25.40 - 26.15	0.75	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. spor hbl.skarn Impr. Sl, Cp, Gn, Py	40°	1,10	0,25	3,18			
26.15 - 27.10	0.95	" " Rel.lys,mlk. spor hbl. Impr. Py spor Sl!	40° 45°	0,62	0,25	2,10			
27.10 - 28.70	1.60	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk. rel.kv.rik. enstaka gr. 1-2 mm. spor Py	40°	0,04	0,01	0,08			
28.70 - 28.80	0.10	Biot.gn. Mørk, mlk. impr. Py, Sl	35-40°	0,24	0,08	0,60			
28.80 - 30.10		2 gl.gn.bp. Lys,mlk.kv.rik, enstaka gr. 1-3 mm.	40°						

Lokalitet:

Borehull: 691

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
30.10 - 30.90	0.80	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spredte gr. 1-3 mm.	45°						
30.90 - 32.60	1.70	Biot.gn. Mørk,mlk. tildels hbl.-førende, spr. gr. 1-3 mm	40°						
32.60 - 37.40	4.80	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. Litt veksl. m/dm-brede Biot.gn. og hbl.-førende band. spr. gr. 1-3 mm.	40° 45°						
37.40 - 37.75	0.35	Biot.gn. Mørk,mlk. m/cm-tykke kv. band. enkelte str. <u>Sl,Gn,Py</u> , Cp.	45°						
37.75 - 37.95	0.20	Kv.							
37.95 - 39.40	1.45	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm	45°						
39.40 - 56.50	17.10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. tildels rik. Litt veksl. med enkelte biot.rikere partier. Enstaka opp til dm.tykke pegmband. Spr. gr. 1-3 mm. Tildels massiv.	40° 45°						

9/9 1980
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 690

Dato : Sept. -80

Koordinater : X: 925.482 Y: 44.770

Retning : N

Helling/stigning: + 70°

Høyde : - 95

Lengde : 40,0 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.60	4.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. enstaka cm-tykke hbl.gn.band. Spor Py	60° 70°	0.03	0.02	0.10			360-460
4.60 - 6.60	2.00	Biot.gn. Mørk,mlk. enstaka opp til 5 cm tykke hbl.gn. m/skarn-band, som fører Sl Gr.førende impr. Py Foldet	70° 60°	0.14	0.09	0.40			
6.60 - 14.40	7.80	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. litt veksl.med opp til dm.tykke biot.rikere partier, som stedvis fører hbl. Spr. gr. fortrinnsvis i de biot.hbl.førende part. Svak impr. Py. 13.45-13.50 Sl	60° 70°	0.01	0.01	0.06			660-760
				0.14	0.09	0.36			1340-1440
14.40 - 15.35	0.95	Biot.gn. Mørk,mlk. tildels hbl.før. enstaka striper Sl,Cp,Gn,Py	70°	0.19	0.09	0.69			
15.35 - 16.25	0.90	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. kv.rik	70°						
16.25 - 16.70	0.45	Biot.sk. Mørk,grovk.	70°						
16.70 - 18.05	1.35	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. gr.1-3 mm							
18.05 - 19.80	1.75	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl.førende impr. Py,Po,Sl?	70°	0.08	0.07	0.32			
19.80 - 20.15	0.35	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spor Py	65°	0.13	0.06	0.54			
20.15 - 21.90	1.75	Biot.gn. Mørk,mlk. skarn-førende litt ondulert. Impr. Sl,Cp,Gn,Py.		0.49	0.19	2.08			
21.90 - 22.20	0.30	Pegm.							
22.20 - 22.80	0.60	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl.førende filmtynne skikt Sl,Cp,Py,Gn	70°	0.39	0.16	1.32			

Lokalitet:

Borehull: 690

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
22.80 - 25.30	2.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm impr. <u>Py</u> . Rel. mass.		0.02	0.02	0.06			2280-2380
25.30 - 25.80	0.50	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-3 mm. impr. <u>Py</u>	70°	0.02	0.04	0.06			
25.80 - 26.25	0.45	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. <u>Sl,Cp,Gn.Py</u>	70°	0.46	0.21	1.94			
26.25 - 26.40	0.15	Pegm.							
26.40 - 27.30	0.90	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-tykke biot.gn. Pegm.band Impr. <u>Py</u> spor <u>Sl</u> .	70°	0.11	0.10	0.42			
27.30 - 30.65	3.35	Hbl.gn. Mørk,mlk. tildels mass. gr.førende 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>	70°						
30.65 - 34.40	3.75	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. impr. <u>Py</u>	60-70°						
34.40 - 36.95	2.55	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. vekslende mellom Hbl.gn. og biot.gn. gr.før- ende i hbl.gn. svak impr. <u>Py</u>	70°						
36.95 - 38.05	1.10	Biot.sk. Mørk,grovk. spr. gr. 1-2 mm impr. <u>Py</u>	70° 80°						
39.75 - 39.85	0.10	Kv.							
39.85 - 40.00	0.15	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. kv.rik. Spr. gr. 1-3 mm.	70°						

9/9 1980
Stellan Burman

Lokalitet: Profu 44 770

Dato : Sept. -80
 Koordinater : X: 925.482 Y: 44.770
 Retning : N
 Helling/stigning: + 50°
 Høyde : - 95
 Lengde : 53.85

Borehull: 689

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 27.15	27.15	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. skiktad m. biot. samt enstaka dm.tykke partier biot.gn. gr.førende 1-3 mm, fortrinnsvis i de biot.rikere partier. Åven enstaka dm.tykke pegm. band. (Fra 0.00-5.60 mlk-grovt-mlk).	60° 65°						
				0.04	0.01	0.12			26.15-27.15
27.15 - 29.50	2.35	2 gl.gn.b.d. Rel. lys mlk. enkelte biot. rikere band med Sl,Cp,Gn,Py	60°	0.26 0.30	0.10 0.07	0.91 0.57			27.15-28.15 28.15-29.50
29.50 - 30.30	0.80	2 gl.gn.m/skarn Rel.lys,mlk. god impr. Sl,Cp,Gn,Py (impregnasjonstype lys Sl.)	60°	1.83	0.13	4.35			
30.30 - 32.50	2.20	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. skiktet og slirig m/biot. spr. str. Sl,Cp,Gn,Py	50°	0.29 0.60	0.07 0.24	0.57 0.71			30.30-31.50 31.50-32.50
32.50 - 34.85	2.35	Biot.gn. Mørk,mlk. skiktet, slirig spor hbl. god stripet malm Sl,Cp,Gn,Py. Lys Sl (Kan delvis oppfattes som deformert, med Sl som fyllinger).	50° 60°	1.11 1.47	0.51 0.38	2.00 5.47			32.50-33.50 33.50-34.85
34.85 - 37.20	2.35	Malm skarn m/enstaka 2 gl.gn.band god impr. Sl,Cp,Gn,Py		1.21 2.22	0.45 0.42	3.95 11.08			34.85-35.85 35.85-37.20
37.20 - 37.65	0.45	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. med biot-rikere band der Sl,Cp,Gn,Py opptrer.	45°	0.57	0.17	2.08			
37.65 - 53.85	15.20	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. enstaka opp til 5 cm tykke pegm.band. spor Py Spr. gr. 1-3 mm.	45°	0.04	0.04	0.08			37.65-38.65

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 688

Dato :

Koordinater : X: 925.482 Y: 44.770

Retning : N

Helling/stigning: - 45° ?

Høyde : - 100

Lengde : 26,40

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 9.80	9.80	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. rel.kv.rik. Spredte gr. 1-2 mm. Ved 8,85 - 8.90 hbl.gn. Spor <u>Py</u> .	45° 70°						
9.80 - 12.30	2.50	Pegm.							
12.30 - 15.40	3.10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka opp til 5 cm tykke. Biot.hbl.gn.band. gr.førende	50						
15.40 - 16.00	0.60	Pegm.							
16.00 - 17.30	1.30	2 gl.gn. Lys,mlk.tildels musk.rik m/filtet preg. Impr. <u>Py</u>	40 45	0,12	0,17	0,39			
17.30 - 18.00	0.70	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. litt skarn og hbl. Enkelte klyser og Str. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u> .	45°	1,20	0,26	2,45			
18.00 - 26.40	8.40	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/str. Biot.hbl.gn. Gr.førende	50° 60°						
8/10 1980 Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 687

Dato : Aug. -80

Koordinater : X:925.455 Y:44.770

Retning : Opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : - 95,5m

Lengde : 23,50

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 13.60	13.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. vekslende m. dm.tykke partier biot.gn. m.spor hbl. Spredte gr. 1-3 mm og spor Py fortrinnsvis i de biot-rike partier.	70° 80°						
13.60 - 14.10	0.50	Pegm.							
14.10 - 14.60	0.50	Hbl.biot.gn. Mørk,grovk. Biot. og hbl. som flakig masse.							
14.60 - 23.50	8.90	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. vekslende med partier hbl.gn. gr. fførende fortr.vis i hbl.rike part. 1-4 mm. enstaka cm-tykke biot.skikt.	80° 90°						
		26.8. 1980							

Lokalitet: 44.770

Dato : Aug. 1980

Koordinater : X: 925.445 Y: 44.770

Borehull: 686

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : - 100,0

Lengde : 20,0 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels m/ spor hbl.og gr. Svak impr. Py. Fra 0.50-0.65 spor Sl,Gn	80°						
0.90 - 1.80	0.90	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik. Fra 1.30-1.40 pegm. Spor gr.	75°						
1.80 - 2.80	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ dm-brede 2 gl.gn.alm.band. Spor gr. svak impr. Py.	75°						
2.80 - 3.10	0.30	Pegm.							
3.10 - 3.50	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor gr.							
3.50 - 4.00	0.50	Pegm.							
4.00 - 15.40	11.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels kv.rik vekslende m/1-3 dm-brede 2 gl.gn.alm. og pegm.band. Spr. gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py.	70°						
15.40 - 17.40	2.00	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm. god impr. Py.	70°						
17.40 - 20.00	2.60	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm.	75°						

26.8. 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.770

Borehull: 685

Dato : Aug. 1980

Koordinater : X: 925.445 Y: 44.770

Retning : Opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : - 95,5

Lengde : 17,65 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.90	2.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede pegm.band Svak impr. Py	80°						
2.90 - 3.40	0.50	Pegm.							
3.40 - 4.70	1.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. svak impr.Py	80°						
4.70 - 5.00	0.30	Pegm.							
5.00 - 10.00	5.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. kv.rik, enkelte 1-2 dm brede pegm. band. Svak impr. Py	80°						
10.00 - 10.80	0.80	" "							
10.80 - 13.55	2.75	Biot.gn. Mørk,mlk.gr.førende 1-3mm. tildels m/hbl. og skarn, svak impr. Py.	80°						
13.55 - 15.60	2.05	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm	80°						
15.60 - 17.65	2.05	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ 1-2 dm-brede hbl.gn.band. gr.førende 1-3 mm. Svak impr. Py.	80°						

26.8. 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.770

Borehull: 684

Dato : Aug. 1980

Koordinater : x: 925.435 Y: 44.770

Retning : Lødd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : - 100,0

Lengde : 17.50

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.45	0.45	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. spør hbl. enstaka gr. 1-2 m.	60°						
0.45 - 0.65	0.20	hbl.gn. mørk,mlk. gr.førende 1-2 mm. impr. <u>Py</u>	60°						
0.65 - 9.65	9.00	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. enstaka hbl.gn. og kv.band opp til 5 cm tykke. Spr. gr. 1-2 mm. ved 7,70-7,75 <u>Sl</u>	60° 70°						
9.65 - 10.10	0.45	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende Impr. <u>Py</u>	70°						
10.10 - 10.90	0.80	Pegm.							
10.90 - 12.40	1.50	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. svak impr. <u>Py</u>	70° 80°						
12.40 - 12.85	0.45	Pegm.							
12.85 - 17.50	4.65	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. Impr. <u>Py</u> .	80°						

25/8 1980
Stellan Burman

Lokalitet: 44.770

Borehull: 683

Dato : Aug. 80

Koordinater : X: 925.435 Y: 44.770

Retning : Opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : - 95.5

Lengde : 18.45 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik, impr. Py	80°						
2.00 - 10.80	8.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band hbl.gn fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py. ved 10.15 spor sl.	80° 90°						
10.80 - 14.10	3.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. enkelte gr. 1-5 mm. svak impr. Py. ved 11.30 spor Sl.	80°						
14.10 - 14.90	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr 0,5 - 2 mm. Impr. Py. Fra 14.35-14.45 impr. Sl.	80°						
14.90 - 15.20	0.30	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm. svak impr. Py.							
15.20 - 16.00	0.80	Biot.gn. Mørk,mlk. tildels hbl-førende. spr. gr. 1-3 mm Impr. Py	80°						
16.00 - 18.45	2.45	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 0,5-3 mm. Svak impr. Py.	90°						

25/8 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.770

Dato Aug. -80

Koordinater : X: 925.426 Y: 44.770

Borehull: 682

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : - 100,0

Lengde : 17.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk. kv.rik. spor gr. 1-2mm.	80°						
0.80 - 1.30	0.50	TAP							
1.30 - 5.90	4.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. kv.rik. Spr. gr. 1-2 mm. ved 1.30 - 1.32 <u>S1</u>	90						
5.90 - 7.70	1.80	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm	80°						
7.70 - 10.85	3.15	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. enkelte Biot. <i>en brude hbl</i> <i>spalte</i> gr. 1-2 mm. fortrinnsvis i hbl.Biot.bandene. Svak impr. <u>Py</u> . Ved 8.30-8.35 og 8.75-8.80 <u>S1</u> .	80° 90°						
10.85 - 11.00	0.15	Pegm.							
11.00 - 11.25	0.25	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk. kv.rik impr. <u>Py</u>	90°						
11.25 - 11.35	0.10	Pegm.							
11.35 - 11.50	0.15	Biot.gn. Mørk,mlk. m/skarn. Impr. <u>S1, Gn, Cp, Py</u> .	80°						
11.50 - 11.70	0.20	Pegm.							
11.70 - 13.90	2.20	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. kv.rik. enstaka gr. 1-3 mm.Spor <u>Py</u>	80°						
13.90 - 15.30	1.40	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. gr.førende 1-3 mm. impr. <u>Py</u>	80°						
15.30 - 15.90	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. svak impr. <u>Py</u>	90°						
15.90 - 17.40	1.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm Svak impr. <u>Py</u>	80° 90°						

26/8 1980
Stellan Burman

Lokalitet: 44.770

Borehull: 681

Dato : Aug. 80
 Koordinater : X: 925.426 Y: 44.770
 Retning : Opp
 Helling/stigning: + 90°
 Høyde : - 95,5
 Lengde : 17,40

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. svak impr. Py	80°						
1.50 - 1.75	0.25	Skarn Mørk,mlk-grovk. impr. Sl, Gn,Cp,Py							
1.75 - 8.50	6.75	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk.tildels m/striper og band pegm. hbl. spr. gr. 0,5-2 mm impr. Py, spor Po.	70° 80°						
8.50 - 12.60	4.10	Hbl.gn. Mørk, mlk. gr.førende 1-3 mm. Svak impr. Py.	75°						
12.60 - 17.40	4.80	Hbl.g-biot.gn. Mørk,mlk, gr.førende 1-3 mm. Tildels m/skarn striper, god impr. Py.	70°						

26/8 1980
 H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.770

Borehull: 680

Dato : Aug. 80

Koordinater : X: 925.418,5 Y: 44.770

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : - 95,5

Lengde : 17.00

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.50	5.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/1-3 dm brede band 2 gl. gn.alm. spr.gr. 1-3 mm, svak impr. Py	80°						
5.50 - 8.20	2.70	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm impr. Py	80°						
8.20 - 11.40	3.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ striper og dm.brede hbl.-førende band. spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py.	80°						
				0.01	0.02	0.14			10.40-11.40
11.40 - 12.30	0.90	" " Enkelte pegm.band, ondu-lerende, svak impr. Sl,Cp, Gn,Py	70° 80°	0.26	0.21	1.01			
12.30 - 13.90	1.60	Hbl.-biot.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-2 mm, god impr. Py.	80°	0.01 0.01	0.02	0.08			12.30-13.30
13.90 - 17.00	3.10	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/små pegm.striper,gr.førende 1-3 mm.	80°						

26.8. 80
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.770

Dato : Aug. -80
 Koordinater : X:925.418,5 Y:44.770
 Retning : Opp
 Helling/stigning: + 90°
 Høyde : - 95,5
 Lengde : 17.50

Borehull: 679

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.25	0.25	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. skarnførende spor hbl. impr. Sl,Cp,Cn,Py	90°	1.85	0.65	5.91			
0.25 - 1.60	1.35	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk. rel.kv.rik. svak impr. Py	70°	0.03	0.01	0.17			0.25 - 1.25
1.60 - 1.95	0.35	Pegm.							
1.95 - 3.90	1.95	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik. enstaka biot.rikere band opp til 5 cm. Spr. gr. 1-3 m. spor Py	70° 80°						
3.90 - 11.05	7.15	Hblg.ng. Mørk,mlk. enstaka 2 gl.gn. band. opp til 5 cm. Gr.førende. 1-4 mm. Impr.Py	80°						
11.05 - 11.55	0.50	Hblg.biot.gn. Mørk,mlk. spredte gr. 1-3m Impr. Py		0.00	0.01	0.05			
11.55 - 11.80	0.25	Biot.gn. Mørk,mlk.-grov. litt ondu-lerende. Impr. Cp,Sl,Py	70° 80°	0.02	0.04	0.07			
11.80 - 17.50	5.70	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk.vekslende m/hbl./amf.band opp til 10 cm. Impr. Py Spredte gr. 1-3 mm.	70° 80°	0.01	0.02	0.07			11.80 - 12.40
26.8. 1980 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.770

Dato: Aug. 80

Koordinater : X: 925.411 Y: 44.770

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : - 100

Lengde : 17.60 m

Borehull: 678

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. impr. <u>Sl,Cp</u> , Gn,Py		0.58	0.66	2.94			
0.50 - 1.70	1.20	" Impr. Py		0.03	0.10	0.05			
1.70 - 2.50	0.80	" Striper,impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>		1.30	0.38	6.90			
2.50 - 2.65	0.15	" Lys,mlk. svak impr. Py		0.08	0.04	0.60			
2.65 - 3.05	0.40	Pegm.							
3.05 - 6.40	3.35	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band hbl.gn. Spr. gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py.							
6.40 - 6.60	0.20	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm.							
6.60 - 8.00	1.40	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. tildels hbl- førende. Spr.gr. 1-3 mm. impr. <u>Py</u>							
8.00 - 8.70	0.70	Pegm.							
8.70 - 10.70	2.00	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spor hbl. spr. gr. 1-3 mm. Impr.Py.	0.06	0.04	0.40				9.70-10.70
10.70 - 10.85	0.15	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. impr. <u>Sl,Cp</u> , Gn,Py	0.68	0.08	1.87				
10.85 - 11.40	0.55	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. tildels m/ pegm. spor hbl. Impr. Py	0.05	0.15	0.40				
11.40 - 11.80	0.40	" rel.mørk,mlk. striper, impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	1.95	0.31	6.00				
11.80 - 14.30	2.50	" Rel.mørk,mlk. hbl.førende spor gr. impr. Py.	0.02	0.02	0.10				11.80-12.80
14.30 - 17.60	3.30	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm.							

14/8 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: *Profile. 44.770*

Dato : Aug. -80
 Koordinater : X: 925.411 Y: 44.770
 Retning : Opp
 Helling/stigning: + 90°
 Høyde : - 95,5
 Lengde : 17.20 m

Borehull: 677

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	2 gl.gn.bd. lys,mlk. enstaka gr. 1-3mm Ved 0,05 - 0,10 <u>Sl</u>	80°						
0.80 - 1.05	0.25	Kvarts							
1.05 - 1.70	0.65	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr.gr. 1-3mm Spor <u>Py</u>	80° 90°						
1.70 - 4.20	2.50	Hbl.gn. Mørk,mlk.gr.førende 1-3mm Svak impr. <u>Py</u>	90°						
4.20 - 4.90	0.70	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm. impr. <u>Py</u>	90°						
4.90 - 6.00	1.10	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm. svak impr. <u>Py</u>	80°						
6.00 - 7.50	1.50	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spor hbl. Impr. <u>Py</u>	90°						
7.50 - 8.60	1.10	Biot.gn. Mørk,mlk-grov. tildels skiktet m/mm-tykke biot- skikt. (även Biot som flager) Impr. <u>Py, Po</u>	80° 90°						
8.60 - 12.80	4.20	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. enkelte cm- tykke biot.band. Spr. gr. 1-2 mm. Svak impr. <u>Py</u>	80° 90°						
12.80 - 17.20	4.40	Hbl.gn. Mørk,mlk. tildels gr.førende 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	80° 90°						
14.8. 1980 Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.770

Dato: Aug. 1980

Koordinater : X: 925.493 Y: 44.770

Retning : S

Helling/stigning: + - 0° Horisontalt

Høyde : -98,5

Lengde : 20,0 m

Borehull: 676

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	2.30	Hbl.gn. Mørk, mlk-grovk. gr.før. 1-3 mm. Stedvis ondulerende Impr. <u>Py</u>	30° 0° 30°						
2.30 - 7.75	5.45	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. enkelte cm-tykke hbl.førende band. samt ved 5.60-5.70 pegm. Spr. gr. 1-2 mm. Svak impr. <u>Py</u>	20°						
7.75 - 8.95	1.20	Pegm.							
8.95 - 10.60	1.65	2 gl.gn.bd. Rel.lys, mlk. hbl.førende svak impr. <u>Py</u> . Spr. gr. 1-2 mm.	20° 5°						
10.60 - 20.00	9.40	Hbl.gn. Mørk, mlk. enkelte partier m/hbl.biot.gn. Spredte gr. 1-3 mm. Impr. <u>Py</u> .	5° 0°						

14/8 1980
Stellan Burmen

Lokalitet: 44.770

Dato

Aug. 1980

Koordinater

X: 925.394

Y: 44.770

Retning

S

Helling/stigning:

+ 45

Borehull: 675

1.

Høyde

- 98,5

Lengde

19.90 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spr.gr.1-3 mm. Spor hbl. Impr. Py	50° 60°						
0.60 - 2.30	1.70	" Rel.mørk,mlk. hbl.førende Spr. gr. 1-3 mm.Impr. Py	50° 60°						
2.30 - 2.60	0.30	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.rik 1-5 mm.							
2.60 - 4.20	1.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	60°						
4.20 - 5.40	1.20	" Rel.mørk,mlk. spor hbl. Spr. gr. 0,5-2 mm. Svak impr. Py	50°						
5.40 - 8.60	3.20	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk.vekslende m/dm-brede 2 gl.gn.bd. band. Spr. gr. 1-3 mm. Impr.Py	50° 60°						
8.60 - 9.10	0.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.spor hbl.gr.	55°						
9.10 - 12.20	3.10	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm. impr. Py. Fra 10.70-10.80 spor Sl,Cp,Gn,Py. Skarn							
12.20 - 13.05	0.85	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk.-grovk. ondulerende. spr. gr.1-3mm svak impr. Py	60°						
13.05 - 12.30	0.15	Pegm.							
13.20 - 13.90	0.70	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spor hbl. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	60°						
13.90 - 16.30	2.40	Hbl.gn. Mørk,mlk.spr.gr. tildels rik, 1-3 mm. Svak impr.Py	60°						
16.30 - 16.70	0.40	2 gl.gnb.d. rel.mørk,mlk. tildels hbl-førende,spr.gr.0,5-2mm. Svak impr. Py.	60°						

Lokalitet:

Borehull: 675

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
16.70 - 17.00	0.30	Skarn							
17.00 - 18.10	1.10	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede band skarn, hbl.gn. spor gr. svak impr. Py.							
18.10 - 19.90	1.80	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. vekslende m/dm-brede band, pegm. 2 gl.gn. b.d. spor gr. Svak impr. Py.							
		14.8. 1980 H. Pantdalsli							

Lokalitet: 44.770

Borehull: 674

Dato Aug. -80

Koordinater : X: 925.394 Y: 44.770

Retning : S

Helling/stigning: - 45°

Høyde : - 100

Lengde : 20.00 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	Pegm.							
0.40 - 0.75	0.35	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. veksl. m/cm-brede kv.band. Impr. Py	60°						
0.75 - 1.00	0.25	Pegm.							
1.00 - 5.50	4.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. veksl. m/cm-dm-brede biot.rike parti fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm og hbl.førende Svak impr. Py. Fra 1,30-1,32 spor Sl,Gn.	45° 50°						
5.50 - 6.20	0.70	Hbl.gn. Mørk,mlk-grovk. skarn-før.							
6.20 - 6.80	0.60	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. Spr. gr. 1-5 mm. Impr. Py.	50°						
6.80 - 8.40	1.60	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk. tildels biot.rik. spor hbl.spr.gr. 0,5-2 mm Impr. Py	50°						
8.40 - 9.00	0.60	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.rik 1-3 mm.							
9.00 - 9.90	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende, Spr. gr. 0,5-2mm. Impr. Py	55°						
9.90 - 10.30	0.40	Pegm.							
10.30 - 14.85	4.55	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl.førende, m/enkelte biot.-rikere parti, cm-dm-brede. Enkelte spr. gr. 2-3 mm. Impr. Py	60° 70°						
14.85 - 15.70	0.85	Pegm.							
15.70 - 16.15	0.45	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. Spr. gr. 0,5-2 mm. Svak impr. Py	60° 70°						

Lokalitet:

Borehull: 674

2

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
16.15 - 16.50	0.35	Pegm.							
16.50 - 18.60	2.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-brede hbl. og pegm. band, spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	70°						
18.60 - 19.70	1.10	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-4mm	70°						
19.70 - 20.00	0.30	Pegm.							
14/8 1980 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.770

Dato

Aug. -80

Koordinater

X: 925.398

Y: 44.770

Borehull: 673

Retning

Opp

Helling/stigning:

+ 90°

Høyde

- 95.5

Lengde

14.30

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spor hbl. gr.- førende 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	80° 90°						
0.70 - 1.70	1.00	Hbl.gn. Mørk,mlk.gr.førende 1-3mm. Svak impr. <u>Py</u> Rel.mass.	90°						
1.70 - 1.80	0.10	Kvarts.							
1.80 - 2.55	0.75	Hbl.gn. Se ovenf.	90°						
2.55 - 5.65	3.10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enkelte cm- tykke musk.band. m/filtet preg. Svak impr. <u>Py</u>	80°						
5.65 - 14.30	8.65	Hbl.gn. Mørk,mlk.litt vekslende m/dm.tykke hbl.førende 2 gl.gn.band. gr.førende fortr.vis i hbl.fn. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u> .	80° 90°						

14/8 1980
Stellan Burman

Lokalitet: 44.770

Borehull: 672

Dato : Aug. -80
 Koordinater : X: 925.398 Y: 44.770
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : - 100.0
 Lengde : 15.75 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spr. gr.1-3mm Svak impr. Py.	70°						
0.30 - 3.80	3.50	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. veksl. m/cm-dm brede band 2 gl.gn.bd. tildels kv.rik.spor gr. svak impr. Py. Ved 0,80, 3.10 spor Sl.	80°						
3.80 - 4.30	0.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende, svak impr. Py	70° 80°						
4.30 - 5.80	1.50	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk.tildels m/ spor hbl. Svak impr. Py Spr. gr. 1-3 mm.	80°						
5.80 - 6.10	0.30	Pegm.							
6.10 - 9.80	3.70	Hbl.gn. Mørk,mlk. veksl.m/dm brede band 2 gl.gn.bd. Spr. gr. 1-5 mm. svak impr. Py	80°						
9.80 - 14.40	4.60	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. veksl. m/dm brede band pegm. Spor gr. impr. Py	80°						
14.40 - 15.75	1.35	Hbl.gn. Mørk,mlk. rel.mass. gr.rik 1-3 mm.							

14/8 -80
 H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.770

Borehull: 671

Dato: Aug. -80

Koordinater: X: 925.405 Y: 44.770

Retning: Opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde:

Lengde: 17.70 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.40	1.40	2 gl.gn.bd. rel.mørk. mlk. tildels hbl.førende, Spr.gr. 1-3mm Svak impr. Py	80° 90°						
1.40 - 3.40	2.00	Hbl.gn. Mørk,mlk.spr.gr. 1-5mm. Svak impr. Py	70° 80°						
3.40 - 11.20	7.80	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. tildels biot. og hbl.rik. Spr. gr. 1-3mm Impr. Py	70°						
11.20 - 17.70	6.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. tildels m/cm-dm-brede Pegm.band. Gr.før. 1-3 mm. Svak impr. Py.	55°						

14/8 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.770

Dato: Aug. 1980

Koordinater : X: 925.405 Y: 44.770

Borehull: 670

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : - 100

Lengde : 17,65 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. kv.rik Svak impr. Py.	70°	0.07	0.19	0.32	8/1 Ag		
0.30 - 1.85	1.55	" Rel.mørk,mlk. tildels m/svak impr. Cp,Po,Py.	70°	0.02	0.23	0.11			
1.85 - 2.30	0.45	" Rel.mørk,mlk. str. Impr. Sl,Cp,Gn,Po,Py	70°	0.81	1.37	10.72	21		
2.30 - 2.95	0.65	" Rel.mørk,mlk. impr. Po,Py	70-80°	0.01	0.03	0.12			
2.95 - 5.50	2.55	Pegm.							
5.50 - 9.50	4.00	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr.1-3 mm Impr. Po,Py	70°						
9.50 - 10.55	1.05	Pegm.		0.02	0.02	0.04			
10.55 - 10.75	0.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. striper, impr. Sl,Cp,Gn,Py,Po.		1.53	1.10	6.08	46		
10.75 - 11.80	1.05	" Rel.mørk,mlk. veksl. m/dm- brede band pegm. Spor hbl. og gr. Impr. Py,Po.	70°	0.01	0.04	0.08			
11.80 - 13.50	1.70	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl.førende, tildels spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	80°						
13.50 - 16.90	3.40	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-5mm Svak impr. Py	80°						
16.90 - 17.45	0.55	Pegm.							
17.45 - 17.65	0.20	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. tildels m/skarn spr. gr. 1-3 mm.							

15/7 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.800

Dato : Juli-80

Koordinater : X.925.467 Y: 44.800 Ikke målt

Retning : N

Helling/stigning: - 45°

Høyde : - 101,5

Lengde : 11,55 m

Borehull: 669

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. spredte gr. 1-3mm Svak impr. Py	45°	0.04	0.05	0.13	8/tAg		
0.70 - 2.60	1.90	Skarn Rel.lys,mlk.-grovk. god malm. Sl,Cp,Gn,Py, mass.		1.46	0.49	5.37	39		
2.60 - 3.80	1.20	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enkelte cm- tykke skarnband, m/Sl,Cp, Gn,Py. Svak impr. Sl i 2 gl.gn.	45°	0.26	0.22	0.65			
3.80 - 4.20	0.40	Skarn Rel.lys,mlk-grovk. god malm Sl,Cp,Gn,Py, mass.		1.74	0.31	3.33	33		
4.20 - 5.05	0.85	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka små gr. 1-1,5 mm. Svak impr.Py	45°	0.20	0.21	0.65			
5.05 - 5.50	0.45	Skarn Se ovan. på skarn. god malm		1.57	0.80	5.32	42		
5.50 - 6.40	0.90	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-2mm Svak impr. Py	50°	0.10	0.05	0.29			
6.40 - 6.55	0.15	Pegm.							
6.55 - 11.55	5.00	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik. enstaka dm-tykke biot.rikere part. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	45° 50°						

14/7 1980
Stellan Burman

Lokalitet: 44.800

Dato: Juli 1980

Koordinater : X: 925.462 Y: 44.800 Ikke målt

Retning : S

Helling/stigning: - 45° Ned

Høyde : - 101.50 Ca.

Lengde : 10,0 m

Borehull: 668

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	2 gl.gn.m/ skarn	Rel.lys, mlk. Sl i skarn- band.	80° 90°	1.45	0.39	4.40		
0.40 - 0.55	0.15	TAP							
0.55 - 0.75	0.20	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. impr. <u>Py</u>	80°	0.19	0.62	0.83		
0.75 - 0.95	0.20	Pegm.							
0.95 - 1.30	0.35	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. tildels skarn m/Sl,Cp,Gn, <u>Py</u>	80°	0.07	0.29	0.73		
1.30 - 1.65	0.35	Pegm.							
1.65 - 5.95	4.35	2 gl.gn.bd.	Lys,mlk. spr.gr. 1-3mm Svak impr. <u>Py</u>	70° 80°	0.06	0.07	0.22		165-265
5.95 - 6.90	0.95	Biot.gn.	Mørk,mlk. spor hbl. Svak impr. <u>Py</u>	70°					
6.90 - 10.00	3.10	2 gl.gn.bd.	Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm. enkelte dm-tykke biot.gn.partier. Ved 9.50 - 9.70 Hbl.gn.	60°					

14/7 1980
Stellan Burman

Lokalitet: 44.800

Borehull: 667

Dato: Juli: 1980

Koordinater : X: 925.460 Y: 44.800 *ikke målt*

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90

Høyde : - 101.5

Lengde : 10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 10.00	10.00	2 gl.gn.bp. lys,mlk. enstaka cm- tykke band m biot.gn. m/hbl. og gr. 1-3 mm. Spor <u>Py.</u>	80° 90°						
		14/7 1980 Stellan Burman							

Lokalitet: Profil 44.800

Dato : Juli - 80

Koordinater : X: 925.467 Y: 44.800 ikke målt

Borehull: 666

Retning : N. Horisontalt

Helling/stigning: + - 0°

Høyde : - 99,5 ca.

Lengde : 14,50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	2 gl.gn.bp. Lys,mlk. m/småle striper pegm. Halve kjernen svak spor Py, Lys Sl, Cp	0°	0,20	0,19	0,46			0,00-1,25
			3°	0,17	0,24	0,42			1,25-2,50
2.50 - 3.30	0.80	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. svakt ondulerende Impr. Py, Sl, Gn, Cp	0°	0,39	0,24	1,04			
3.30 - 4.55	1.25	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. tildels skiktet Svakt ondulerende. i halve kjernen skarn m/sl,cp,gn, Py	5°	0,89	0,37	2,59			
4.55 - 6.00	1.45	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. enkelte cm-tykke biot.rikere band. spor gr. 1-2 mm Svak impr. Py, spor Sl.	5°	0,31	0,11	0,82			
6.00 - 7.90	1.90	Skarn Rel.mørk, mlk-grovk. m/ god malm Sl,Cp,Gn,Py,mass.	20°	0,86	0,20	2,63			6,00-7,00
			0°	3,30	0,45	8,54			7,00-7,90
7.90 - 8.20	0.30	Pegm. (Sl)		0,63	0,10	1,87			
8.20 - 8.50	0.30	Skarn - " - " -		1,74	0,18	5,95			
8.50 - 8.95	0.45	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enkelte biot. flagor. Spredte gr. 1-3mm Spor Py	0°	0,05	0,03	0,14			
8.95 - 9.25	0.30	Pegm.							
9.25 - 14.50		2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spor hbl. gr. førende 1-2 mm. spor Py	0-10°						

14/7 1980
Stellan Burman

Lokalitet: 44.800

Borehull: 665

Dato : Juli - 80

Koordinater : X: 925.467 Y:44.800

Retning : N

Helling/stigning: + 45° opp

Høyde : - 97

Lengde : 10.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.25	0.25	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. <u>Py</u> spor <u>Sl</u> ?	25°	0,05	0,10	0,18			
0.25 - 2.50	2.25	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. spredte gr. 1-3 mm spor <u>Py</u>	25° 30°	0,01	0,08	0,11			0,25 - 1,25
2.50 - 3.40	0.90	Biot.gn. Mørk,mlk. tildels skifrig impr. <u>Py</u> , <u>Sl</u> ?	25°	0,06	0,11	0,16			
3.40 - 4.10	0.70	Biot.sk. Mørk,mlk. spor hbl. Impr. <u>Py</u> <u>Sl</u> ?		0,02	0,11	0,17			
4.10 - 10.00	5.90	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enkelte biot-rikere partier impr. <u>Py</u>	25° 50°	0,00	0,03	0,09			4,10 - 5,00
10.00 - 14.00	4.10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-2 mm.	60° 70°	0,15	0,03	0,43			10,10 - 14,10
14.10 - 14.40	0.30	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. impr. <u>Sl</u> .	70°	0,88	0,07	2,72			
14.40 - 17.50	3.10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	60°	0,05	0,03	0,12			14,40 - 15,40
14/7 1980 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.800

Dato : Juli 1980

Koordinater : X: 925.645 Y: 44.800 ikke målt

Borehull: 664

Retning : opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : - 96,5

Lengde : 14.75 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik, spor gr. 1-3 mm. Impr. Py	70°						
2.00 - 9.05	7.05	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ 1-3 dm brede 2 gl.gn.alm. band. Impr. Py.	70°						
9.05 - 9.60	0.55	Pegm.							
9.60 - 12.20	2.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor gr. ved 10.30 spor Sl.	70°						
12.20 - 12.40	0.20	Pegm.							
12.40 - 12.60	0.20	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. Spor gr. impr. Py.							
12.60 - 12.70	0.10	Pegm.							
12.70 - 13.00	0.30	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. spr.gr. 1-3 mm. Impr. Py.							
13.00 - 13.50	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor skarn og gr. svak impr. Py	70°						
13.50 - 14.75	1.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/linser skarn og cm-dm-brede band hbl.gn. m/gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	70°						

14/7 1980
Holger Pantdalsli

Lokalitet: 44.800

Borehull: 663

Dato : Juli - 80
 Koordinater : X: 925.462 Y: 44.800 Ikke målt.
 Retning : Syd
 Helling/stigning: + 50°
 Høyde : - 97,0 m
 Lengde : 9.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.05	1.05	2 gl.gn.b.d. Rel. lys, mlk. svak inapr. Py	45°	0.00	0.02	0.05			
1.05 - 1.40	0.35	Skarn Gn, Sl, Cp, Py, Mass.		0.24	0.24	1.03			
1.40 - 9.30	7.90	2 gl.gn.b.d. Rel. lys, mlk. visse dm- tykke partier med biot.gn. Enstaka gr. 1-3 mm.	40° 50°						

14/7 1980
 Stellan Burman

Borehull: 662

Dato : Juli - 80
Koordinater : X: 925.462 Y: 44.800 Ikke målt.
Retning : S
Helling/stigning: + - 0°
Høyde : - ca. 99,5 m
Lengde : 10,0 m

[illegible]

Lokalitet: 44.570

Borehull: 661

Dato : Juni 1980

Koordinater : X: 925.400 Y: 44.570

Retning : opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde :

Lengde : 26.35 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.40	2.40	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka cm-tykke hbl.førende band. svak impr. Py. Ved 2,20 spor <u>Sl.</u>	80° 90°						
2.40 - 2.75	0.35	Pegm.							
2.75 - 6.55	3.80	2 gl.gn.b.d. Som ovenfor	80°						
6.55 - 8.30	1.75	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm Svak impr. <u>Py</u>	70°						
8.30 - 12.00	3.70	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enkelte dm-tykke hbl.førende partier. enstaka dm-tykke pegm.band Spredte gr. 1-2 mm. Svak impr. <u>Py</u> .	70° 80°						
12.00 - 13.50	1.50	hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm svak impr. <u>Py</u>	80°						
13.50 - 14.50	1.00	biot.gn. Mørk,mlk. m/spor hbl.gr. 1-2 mm. Impr. <u>Py</u>	80°						
14.50 - 14.75	0.25	Pegm.							
14.75 - 15.15	0.40	Biot.gn. Mørk,mlk m/spor hbl. gr. 1-2 mm. Svak impr. <u>Py</u>	80°						
15.15 - 15.35	0.20	Pegm.							
15.35 - 17.40	2.05	Biot.gn. Se ovenfor	80°						
17.40 - 18.15	0.75	Pegm.							
18.15 - 19.10	0.95	Biot.gn. Se ovenfor	80°						
19.10 - 19.50	0.40	Pegm.							
19.50 - 19.90	0.40	Biot.gn. Se ovenfor på Biot.gn.							
19.90 - 21.30	1.40	Pegm.							

Lokalitet:

Borehull: 661

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
21.30 - 21.80	0.50	Biot.gn. Mørk, mlk. m/spor hbl.gr. 1-2 mm. Impr. Py	80°						
21.80 - 22.30	0.50	Hbl.gn. Mørk, mlk. gr.førende 1-3 mm.							
22.30 - 22.80	0.50	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. kv.rik impr. Py	70°						
22.80 - 24.30		Hbl.gn. Mørk, mlk. vekslende m/biot. gn. gr.førende 1-3 mm. svak impr. Py	80°						
24.30 - 24.70	0.40	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. kv.rik	80°						
24.70 - 26.35	1.65	Biot.gn. Mørk, mlk. hbl.førende vekslende m/dm-brede 2 gl.gn. alm.band. Spr. gr. 1-2 mm. Svak impr. Py	70° 80°						
14/7 1980 Stellan Burman									

Lokalitet:

Borehull: 660

Dato

Koordinater : 2

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.70	8.70	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. veks1. m/dm-brede hbl.gn.band. Spr. dm.brede pegm.band. Hbl.førende. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py.	80°						
8.70 - 11.55	2.85	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm.	80°						
14/7 1980 H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil ~~44.770~~ ^{44.680}

Borehull: 659

Dato: Juni 1980
 Koordinater: X: 925.448 Y: 44.680
 Retning: Opp
 Helling/stigning: + 90°
 Høyde: - 95,5
 Lengde: 20,0 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.95	3.95	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik. rel.mass. spor <u>Py</u>	80° 90°						
3.95 - 4.25	0.30	Pegm.							
4.25 - 5.60	1.35	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. svak impr. <u>Py</u>	80°						
5.60 - 6.80	1.20	libl.biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. Tildels filtet preg. Spr. gr. 1-3 Svak impr. <u>Py</u>	80° 70°						
6.80 - 12.70	5,90	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka cm-tykke Pegm.band. ved 12,15-12.20 <u>Py</u> , <u>Po</u> , Svak impr. <u>Py</u>	70° 80°						
12.70 - 13.50	0.80	Pegm.							
13.50 - 20.00	6.50	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. Enstaka gr. 1-2 mm. Svak impr. <u>Py</u>	70° 80°						

16/6 1980
 Stellan Burman

Lokalitet: Profil ~~44.778~~
44.680

Borehull: 658

Dato: Juni -80
Koordinater: X: 925 448 Y: 44.680
Retning: Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde: - 100
Lengde: 20,0 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. str. og impr. Sl, Cp, Gn, Py	70° 80°	0.53	0.49	2.46			
0.70 - 1.40	0.70	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. svak impr.Py	70°	0.01	0.05	0.10			
1.40 - 2.20	0.80	Pegm. (ved 1.80-1.85 biot.gn. ondulerende).							
2.20 - 3.25	1.05	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. svak impr.Py	70°	0.01	0.04	0.10			
3.25 - 7.35	4.05	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. veksl. med dm-tykke pegm.skarn.band. Spr. striper og tildels impr. Sl,Cp,Gn,Py,Po.	70° 80°	0.67	0.35	0.55			3.25 - 4.25
				0.52	0.19	1.78			4.25 - 5.25
				0.21	0.68	1.95			5.25 - 6.00
				2.02	0.76	2.47			6.00 - 7.35
7.35 - 10.20	2.85	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-2 mm. svak impr. Py	70° 80°	0.12	0.10	0.25			7.35-8.35
10.20 - 11.20	1.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm	80°						
10.20 - 10.80	0.60	Pegm.							
10.80 - 11.80	1.00	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.-grovk. Svak impr. Py							
11.80 - 18.80	7.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende. enstaka cm-tykke 1-3 mm 2 gl.gn.band. svak impr.Py	80°						
18.80 - 19.60	0.80	Pegm.	80°						
19.60 - 20.00	0.40	2 gl.gn.alm. lys, mlk-fink. kv.rik. enstaka små gr. 0,5-1.00mm							

16/6 1980
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.680

Dato : Juni 1980

Koordinater Ca: X: 925.439 Y: 44.680 Ikke målt.

Borehull: 657

Retning : Opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde ca.: - 96

Lengde : 20,0

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. svak impr. <u>Py</u> Spor <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u>	70°	0,33	0,16	0,71			
1.50 - 2.55	1.05	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. rel.mass. (skarnførende) god impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u>		0,91	0,67	5,59			
2.55 - 5.65	3.10	2 gl.gn.bp. lys,mlk. kv.rik enstaka biot.rikere band. svak impr. <u>Py</u>		0,13	0,05	1,02			?
5.65 - 8.40	2.75	hbl.gn. Mørk,grovk. enkelte 5 cm-tykke amfband. Svak impr. <u>Py</u>	70° 80°						
8.40 - 10.05	1.65	Pegm. (Litt biot. som flager).							
10.05 - 10.50	0.45	2 gl.gn.alm. lys,mlk. kv.rik. spr. gr. 1-2 mm	70° 80°						
10.50 - 11.10	0.60	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.							
11.10 - 12.50	1.40	Biot.gn. Mørk,grovk. spor Hbl. (fläckig)	70°						
12.50 - 15.40	2.90	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. enkelte cm-tykke hbl-band. Spr. gr. 1-2 mm. fortrinnsvis i hbl.band. Svak impr. <u>Py</u>	70° 80°						
15.40 - 19.50	4.10	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr-førende 1-3mm Spr. partier gr.rik. Svak impr. <u>Py</u> (veckad)	70° 70°						
19.50 - 20.00	0.50	Pegm.							

23/6 1980
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.680

Dato Juni -80

Koordinater ca: X: 925.411 Y: 44.680 ikke målt

Borehull: 656

Retning : 0

Helling/stigning: - 68°

Høyde ca: - 98,5

Lengde : 17,50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.10	0.10	Skarn <u>Sl, Cp, Gn, Py</u>		0.74	1.27	1.92			
0.10 - 0.70	0.60	2 gl.gn.bd. Lys,mlk. kv.rik. Svak impr. Py. spor Sl.	60°	0.20	0.18	0.69			
0.70 - 1.30	0.60	2 gl.gn.bd. Rel. lys,mlk. skarnførende impr. <u>Sl, Cp, Gn, Py</u>	60°	0.63	0.19	2.62			
1.30 - 1.70	0.40	Biot.gn. Mørk,mlk. spor hbl. svak impr. Py	70°	0.02	0.14	0.17			
1.70 - 3.70	2.00	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enkelte cm- tykke hbl.band m/gr. 1-2mm	60°	0.00	0.01	0.08			1.20-2.70
3.70 - 4.15	0.45	Pegm.							
4.15 - 6.35	2.20	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. litt veksl. med enstaka cm-tykke 2 gl.gn. band. spr. gr. 1-3 mm.	60°						
6.35 - 12.00	5.65	2 gl.gn. bd. Rel.lys,mlk. veksl. med dm-tykke hbl.gn.band. Spredte gr. 1-2 mm. Svak impr. Py.	50° 60°						
12.00 - 17.50	5.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm tildels amfibolitisk.	60°						

23/6 1980
Stellan Burman

Lokalitet: Profil: 44.680

Dato : Juni 1980

Koordinater ca: X: 925.429,5 Y: 44.680 ikke målt

Borehull: 655

Retning : Opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde ca. : - 96

Lengde : 17.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	2 gl.gn.b.d. rel.lys mlk.	80°	0.04	0.09	0.14			
0.40 - 0.70	0.30	Skarn god impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u>		4.10	0.31	8.30			
0.70 - 1.20	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk, tildels skarn-førende m/ <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u>	80°	1.20	0.30	1.61			
1.20 - 1.50	0.30	Pegm.							
1.50 - 3.60	2.10	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. enkelte dm-tykke partier m/biotskiktet Spor <u>Py</u> .	80°	0.08	0.03	0.24			2.60 - 3.60
3.60 - 4.15	0.55	Hbl.biot.gn. Mørk, grovk. god impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u> . rel.mass.		0.14	0.20	5.75			
4.15 - 4.60	0.45	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. enkelte film-tynne biotskikt. Svak impr. <u>Py</u>	80°	0.02	0.15	0.19			
4.60 - 5.75	1.15	Hbl.gn. Mørk, mlk-grovk. god impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u> . Rel.mass.		0.04	0.36	3.32			
5.75 - 6.55	0.80	2 gl.gn.b.d. rel.mørk, mlk. spor hbl. Svak impr. <u>Py</u> spor <u>Sl</u>	80°	0.16	0.21	2.15			
6.55 - 8.55	2.00	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. enkelte 5 cm-tykke hbl.gn.band. Svak impr. <u>Py</u> , <u>Po</u> , <u>Cp</u> , <u>Po</u> , <u>Cp</u> i hbl.bandene	70° 80°	0.00	0.09	0.06			
8.55 - 9.30	0.75	Pegm.							
9.30 - 13.70	4.40	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. spredte 5 cm-tykke partier med hbl.biot. Svak impr. <u>Py</u>	80° 70°						
13.70 - 17.30	3.60	Hbl.gn. Mørk, mlk. gr.førende 1-3mm Svak impr. <u>Py</u>	70° 80°						
23/6 1980 Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.680

Dato : Juni 1980

Koordinater ca.: X: 925.430 Y: 44.680 ikke målt

Borehull: 654

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde ca. : - 98,5

Lengde : 15.85 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.95	2.95	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik, enstaka gr. 1-2 mm. Svak impr. Py	80°	0.13	0.07	0.31			1.95-2.95
2.95 - 3.35	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. litt skarn Impr. Sl,Cp,Gn,Py	80°	0.25	0.98	0.91			
3.35 - 4.20	0.85	Hbl.gn. Mørk,mlk.gr.førende 1-4 mm svak impr. Py	80°	0.01	0.02	0.04			
4.20 - 5.10	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. spor hbl. Spredte gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	80°	0.01	0.02	0.10			
5.10 - 5.80	0.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik. Stripet Sl,Cp,Gn,Py Spredte gr. 1-3 mm.	80°	2.30	0.35	5.76			
5.80 - 6.70	0.90	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk. kv.rik spor Py	80°	0.14	0.07	0.44			
6.70 - 8.00	1.30	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk. kv.rik,spr. gr. 1-2 mm. tildels skarnførende m/ Sl,Cp,Gn,Py	80° 70°	0.69	0.62	3.10			
8.00 - 11.20	3.20	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik,enstaka gr. 1-2 mm. svak impr. Py	80° 75°	0.02	0.06	0.14			8.00-9.00
11.20 - 14.10	2.90	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm	80°						
14.10 - 15.60	1.50	Pegm.							
15.60 - 15.85	0.25	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm							

23/6 1980
Stellan Burman.

Lokalitet: Profil. 44.680

Borehull: 653

Dato : Juni 1980

Koordinater : X: 925.420 Y: 44.680

Retning : opp.

Helling/stigning: + 90°

Høyde : ~~20.0 m~~ - 95.0

Lengde : 20.0 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.55	1.55	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk.-fink. kv.rik. spor gr. rel. mass.	80° 90°						
1.55 - 2.85	1.30	Pegm.							
2.85 - 3.65	0.80	Hbl.gn. Mørk,mlk-grovk. tildels skarn. god impr. <u>Sl,Cp,Gn</u> <u>Py</u>	80°	0,39	0,18	5,38			
3.65 - 4.70	1.05	Skarn Mørk,grovk. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>		0,94	0,15	3,52			
4.70 - 5.70	1.00	2 gl.gn.b.d. rel.lys,mlk. litt skarn- førende, spor <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	70° 80°						
5.70 - 7.05	1.35	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. litt filtet preg, svak impr. <u>Py</u>	80°						
7.05 - 7.60	0.55	Pegm.							
7.60 - 11.30	3.70	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. enkelte gr. 1-2 mm. svak impr. <u>Py</u>	80°						
11.30 - 11.60	0.30	Pegm.							
11.60 - 14.70	3.10	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm	80-90°						
14.70 - 20.00	5.30	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spredte gr. 1-2 mm. Enkelte dm.tykke hbl.gn. partier gr.førende Impr. <u>Py</u>	70° 80°						

12/6 1980
Stellan Burman

Lokalitet: *Profil 44.680*

Dato: Mai 1980

Koordinater: *x: 925.411 y: 44.680*

Retning: Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde: - 99.5

Lengde: 14.60

Borehull: 652

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. kv.rik Impr. Sl,Cp,Gn,Py	80°	0.67	0.34	3.49			
0.30 - 2.50	2.20	2 gl.gn.alm. lys,mlk.kv.rik. enstaka små gr. 0,5-1.0 mm.	80°	0.08	0.04	0.03			0.30 - 1.30
2.50 - 6.10	3.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. tildels hbl.- førende, även enstaka cm- tykke hbl.gn.band m/gr. 1-3 mm.	80° 90°						
<i>?</i> 6.10 - 6.30	0.20	skarn Sl,Cp,Gn,Py,Po.		0.05	0.28	0.88			
6.30 - 6.95	0.65	Pegm.							
6.95 - 7.80	0.85	Biot.hbl.gn. mørk,mlk. filtet preg m/skarn Sl,Cp,Gn,Po,Py i de skarn- førende partier.	80° 70°	0.49	0.54	2.68			
7.80 - 7.95	0.15	Pegm.							
7.95 - 9.50	1.55	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. spor hbl. enkelte cm-tykke Sl,Cp,Gn band.	80° 90°	0.18	0.11	0.25			
9.50 - 9.90	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. spor hbl/gr. 1-2 mm. svak impr. Py	90°	0.06	0.02	0.08			
9.90 - 10.35	0.45	Pegm.							
10.35 - 11.35	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. rel. mass. sbak impr. Py							
11.35 - 14.50	3.15	hbl.gn. Mørk,mlk. amfibolittisk gr.førende, tildels rik 1-3 mm.	80° 90°						

12/6 1980

Stellan Burman

Lokalitet: Profil: 44.680

Dato Juni -80

Koordinater : X: 925.411 Y: 44.680 is innmålt

Retning : Opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : - 93.0 m

Lengde : 26.30

Borehull: 651

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-2 mm. rel. mass.	ca. 90°	0.29	0.30	0.84			
1.00 - 2.55	1.55	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. vekslende med dm-tykke skarn band m/ <u>S1</u> <u>Cp, Gn, Py, Po</u>	70°-90°	2.50	0.66	5.19			
2.55 - 4.95	2.40	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. ved 3.60 Po	80-90°	0.13	0.26	0.47			2.55 - 3.55
4.95 - 5.40	0.45	" " Rel.lys,mlk. gr. hbl.før. rel. mass.							
5.40 - 10.30	4.90	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm rel.mass. svak impr. <u>Po, Py</u>	80°-90°						
10.30 - 10.55	0.25	Pegm.							
10.55 - 14.90	4.35	2 gl.gn.b.d. rel.lys,mlk. tildels hbl-førende. gr. 1-2 mm. svak impr. <u>Py, Po</u>	80°						
14.90 - 15.30	0.40	Hbl.gn. Rel.mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>							
15.30 - 18.35	3.05	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. enstaka dm-tykke hbl.førende partier Svak impr. <u>Py</u> Spr.gr. 1-2 mm. Ved 16.05-16.10 <u>S1</u>	70°-90°						
18.35 - 20.75	2.40	Hbl.gn. Mørk,mlk. tildels gr.før. 1-3 mm. svak impr. <u>Py</u>	80°						
20.75 - 21.00	0.25	Pegm.							
21.00 - 24.70	3.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spr.gr. 1-3 mm. Enkelte cm-tykke hbl.band.	70°						
24.70 - 26.30	1.60	hbl.gn. Mørk,mlk. rel. mass.							

12.6. 1980
Stellan Burman

Lokalitet: *Profil 44.680*
Dato
Koordinater
Retning
Helling/stigning:
Høyde
Lengde

Mai 1980

X: 925.396 Y: 44.680

S

+ 45°

- 96 m

25.00

Borehull: 650

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.70	4.70	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. spr.gr. 1-2 mm. Spor <u>Py</u>	60°						
4.70 - 5.70	1.00	hbl.gn. Mørk, mlk. litt hbl.biot. gn. gr.førende 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	60° 70°						
5.70 - 9.70	4.00	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. vekslende med opp til 5 cm brede hbl.gn. band. Spr. gr. 1-3 mm. svak impr. <u>Py</u> , fortrinnsvis i hbl.gn. bandene.	60° 50° 60°						
9.70 - 10.05	0.35	Pegm.							
10.05 - 13.40	3.35	Hbl.gn. Mørk, mlk. tildels gr.før. 1-3 mm. impr. <u>Py</u>	60°						
13.40 - 20.70	7.30	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. enstaka dm- tykke Pegm. og hbl.band impr. <u>Py</u> tildels gr.førende 1-3 mm. Spor <u>Sl</u> ved 19.80.	60° 50°						
20.70 - 24.05	3.35	Hbl.gn. Mørk, mlk. spr.gr. 1-4 mm. spor <u>Py</u>	60°						
24.05 - 25.00	0.95	2 gl.gn.b.d. Lys, mlk. kv.rik enkelte gr. 1-3 mm. rel.mass.	60° 70°						

12/6 1980
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.680

Dato : Mai - 80

Koordinater Ca: X: 925.396 Y: 44.680 ikke målt

Retning : S

Helling/stigning: - 45°

Høyde : - 99

Lengde : 23.30 m

Borehull: 649

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.55	0.55	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.-fink. kv.rik komp. Sl, Cp, Gn, Py band ved 0,0 - 0,05, 0,30-0,35, 0,50-0,55 m.	60°	0.86	0.48	2.96			
0.55 - 1.10	0.55	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik.	70°	0.22	0.16	0.21			
1.10 - 2.55	1.45	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. enkelte dm.-tykke band m/Sl,Cp,Gn,Py.	60°	0.50	0.32	1.38			
2.55 - 3.30	0.75	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. spredte gr. 1-2 mm.	60°	0.04	0.04	0.09			
3.30 - 3.60	0.30	Pegm.							
3.60 - 4.60	1.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm	50°						
4.60 - 10.60	6.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl-førende. også noen cm-tykke amf.band.	50° 60°						
10.60 - 11.05	0.65	Pegm.							
11.05 - 13.45	2.40	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. enstaka gr. 1-2 mm. svak impr. Py	60°						
13.45 - 13.80	0.35	Pegm.							
13.80 - 14.40	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. svak impr. Py	60°						
14.40 - 14.45	0.05	Pegm.							
14.45 - 15.50	1.05	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm Svak impr. Py							
15.50 - 16.50	1.00	Pegm.							
16.50 - 18.10	1.60	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm	60° 50°						
18.10 - 18.30	0.20	Pegm.							
18.30 - 21.70	3.40	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm enstaka cm-tykke Amf-band svak impr. Py	60° 70°						

Lokalitet:

Borehull: 649

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
21.70 - 23.80	1.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. tildels kv.rik Spr. små gr.	60°						
		2/6 -80 Stellan Burman							

Lokalitet: Profil 44.680

Borehull: 648

Dato : MAI - 80

Koordinater : X 925.442 Y 44.680 ikke målt

Retning : opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : - 95

Lengde : 17,65 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.95	1.95	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik, enkelte små gr. 0,5-1.0 mm. spor <u>Py</u>	70° 80°						
1.95 - 4.20	2.25	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. enkelte hbl-førende band. gr.rik i hbl.bandene 1-4 mm.	70° 60°						
4.20 - 6.10	1.90	hbl.gn. Mørk,mlk. gr.rik 1-4 mm.	70°						
6.10 - 17.65	11.55	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl-førende m/gr. 1-3 mm.	70° 80°						
2/6 1980 Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.680

Dato : Mai-80

Koordinater UTM: X 925.442,5 Y: 44.680 ikke målt

Borehull: 647

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : - 99

Lengde : 10,70 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.10	0.10	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. impr. Py		0.03	0.23	0.19			
0.10 - 0.80	0.70	Pegm.		0.04	0.10	0.04			
0.80 - 0.90	0.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik, svak impr. Py	70°	0.02	0.04	0.09			
0.90 - 1.45	0.55	2 gl.gn.m/skarn Rel. lys mlk-grovk. god impr. Sl,Cp,Gn,Py	60° 80°	2.00	0.32	7.48			
1.45 - 1.80	0.35	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. filtet preg. Svak.impr. Py	60° 70°	0.34	0.28	0.90			
1.80 - 2.15	0.35	skarn Mørk mlk-grovk.Impr. Sl,Cp Gn, Py. rel.mass.		0.99	0.81	2.77			
2.15 - 2.95	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. nd- 2.25-2.30 hbl.gn. 2.70 - 2.75 m skarn. Enkelte gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.		0.01	0.03	0.02			
2.95 - 3.30	0.35	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm	70° 70°						
3.30 - 4.80	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. tildels hbl.-førende gr. i de hbl.førende partier 1-3 mm. svak impr.Py	70° 80°						
4.80 - 6.40	1.60	Hbl.gn. Mørk,mlk. enkelte 2 gl.gn.-partier. gr.førende, fortrinnsvis i hbl.gn. 1-3 mm. Svak impr. Py	70° 80°						
6.40 - 9.30	2.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. enkelte hbl. førende partier. Spr. gr. 1-2 mm.	80°						
9.30 - 10.70	1.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm rel. mass.							

Lokalitet: Profil 44.770

Dato : Mai 1980

Koordinater : X: 925.452,5 Y: 44.770 ikke målt

Borehull: 646

Retning : Nord

Helling/stigning: -90°

Høyde : -100

Lengde : 14,20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.10	0.10	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. kv.rik	80°						00-0.90
0.10 - 0.25	0.15	Skarn Spor Py		0.06	0.06	0.10			
0.25 - 0.90	0.65	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik, spor Sl,Py	80°						
0.90 - 1.10	0.20	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. cm-tykke skarn band m/Sl,Cp,Py	80°	0.28	0.22	0.80			
1.10 - 1.35	0.25	Pegm.		0.04	0.05	0.07			
1.35 - 2.35	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. rel.kv.rik. Svak impr. Sl, Py	80° 90°	0.27	0.18	0.50			
2.35 - 2.80	0.45	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik. enkelte flager biot. spor gr. 1-2 mm	70° 70°	0.01	0.02	0.05			
2.80 - 3.25	0.45	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. kv.rik. svak impr. Sl, Py	80°	0.85	0.20	2.00			
3.25 - 7.40	4.15	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. kv.rik. enkelte gr. 1-2 mm. rel.mass		0.01	0.02	0.03			325-420
7.40 - 7.70	0.30	skarn							
7.70 - 14.20		2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. kv.rik. enkelte cm.tykke biot.band. Spredte gr. 1-2 mm.	70° 80°						

28/5 1980
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.770

Dato : Mai -80

Koordinater : X: 925.465 Y: 44.770 ikke målt

Borehull: 645

Retning : Lodd

Helling/stigning: -90°

Høyde : - 100

Lengde : 8.30

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.40	4.40	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. kv.rik Spredt gr. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	70° 80°	0.02	0.01	0.07			3.40-4.40
4.40 - 5.85	1.45	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk-grovk. tildels skarnførende, fortrinnsvis i dm.tykke band. Grov. impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u> helst i skarnbandene.	80° 70° 70° 80°	1.15	0.31	3.05			
5.85 - 6.70	0.95	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk. kv.rik	80°	0.03	0.03	0.01			
6.70 - 6.90	0.20	Skarn Rel.lys, grovk. Grov impr. <u>Sl, Cp, Gn, Py</u>		0.97	0.35	7.60			
6.90 - 8.30	1.40	2 gl.gn.b.d. Rel. lys,mlk. kv.rik spredte gr. 1-2 mm. Enkelte filmtynne biot- skikt.	70° 80°	0.03	0.03	0.05			6.50-7.90
23/5 1980 . Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.789 (ca.)

Dato : Mai -80

Koordinater 20: X: 925.458,4 Y: 44.789 iklemt målt

Borehull: 644

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : 100,5

Lengde : 5,35

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. kv.rik Svak impr. Sl,Gn,Cp,Py	80°	0,16	0,19	0,03			
0.40 - 2.60	2.20	2 gl.gn. Rel.lys, mlk-grovk. tild. skarnførende, fortrinnsvis i dm.tykke band med god impr. Sl,Cp,Gn,Py (Impr. typ.)	70° 80°	1,25	0,05	3,49			
2.60 - 3.90	1.30	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. kv.rik	80°	0,05	0,01	0,10			
3.90 - 4.30	0.40	Pegm.							
4.30 - 5.30	1.00	2 gl.gn.alm. lys,mlk. kv.rik. enstaka gr. 1-2 mm. rel. mass.	80°						

23/5 1980

Stellan Burman

Lokalitet: 44.780 Ca.

Borehull: 643

Dato : Mai - 80

Koordinater : X 928.460 Y 144.780

Retning : Lødd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : - 109,5

Lengde : 8,55

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	g Ag/t	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	Malm Rel. lys, mlk-grovk. Skarnførende 2 gl.gn. god. impr. Sl, Gn, Cp, Py		2,30	0,32	7,68	59,7 25,3		
1.60 - 8.55	6.95	2 gl.gn.b.d. Rel. lys, mlk. tildels kv.rik enkelte og spredte gr. 1-3mm Spor Sl ved 7.80 og 8.40	80° 90°	0,05	0,03	0,13			1.60-2.60
22/5 1980 Stellan Burman									

Lokalitet: Profil ca. 44.780

Dato : Mai -80

Koordinater *ca:* X: 925,4635 Y: 44,780 *iløke målt*

Borehull: 642

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : - 100,5

Lengde : 10.0 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	Malm Rel.lys,mlk-grov. Skarnførende 2 gl.gn. God impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>		1.50	0.32	3.92			
0.80 - 1.40	0.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik	70	0.03	0.03	0.01			
1.40 - 2.00	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. m/enkelte cm-tykke hbl.band. gr. 1-3 mm	70°						
2.00 - 7.35	5.35	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk. rel.kv.rik. Spr. gr. 1-2 mm. Ved 4.50-4.55 <u>Sl, Gn</u>	80°	0.01	0.01	0.06			6.50-7.35
7.35 - 7.95	0.65	2 gl.gn. Lys,mlk. tildels skarnførende Impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	60° 90°	1.60	0.62	5.32			
7.95 - 10.00	2.05	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik. Spr. små gr. 0,5 - 1.0 mm. rel.mass.		0.03	0.03	0.21			7.95-8.00
22/5 1980 Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 44.680

Dato : Mai -80

Koordinater x : 925.438.5, y : 44.680 ikke målt.

Retning : Lodd

Helling/stigning: -90°

Høyde : - 101,5

Lengde : 18,40 m

Borehull: 641

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.10	4.10	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. enkelte part. er skiktet med filmtynne biot.skikt. Spredte gr. 1-2mm	70 ^o 80 ^o	0,01	0,03	0,04			3,50-4,40
4.10 - 4.40	0.30	Pegm.							
4.40 - 6.30	1.90	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. vekslende med dm.tykke biot.gn.band, impr. Sl,Cp,Gn,Py fortrinnsvis i de biot.rikere part.	80 ^o	0,76	0,22	1,27			
6.30 - 7.20	0.90	2 gl.gn.alm. Lys,kv.rik, mlk. kv.rik enkelte gr. 1-2 mm.	70 ^o	0,02	0,03	0,04			
7.20 - 8.30	1.10	2 gl.gn. Rel.lys,mlk. vekslende m/dm.tykke biot.rikere part. spor skarn. Sl,Cp,Gn.Py	80 ^o	0,36	0,38	2,78			
8.30 - 12.40	4.10	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. enkelte cm-tykke hbl.gn.band. Enkelte spredte gr. 1-2 mm	80 ^o	0,01	0,04	0,11			8,30-9,40
12.40 - 18.40	6.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm	70 ^o 80 ^o						

28/5 1980
Stellan Burman

Lokalitet: 44.680

Dato : Mai 1980

Koordinater : X: 925.467. Y: 44.680

Borehull: 640

Retning : Lodd

Retning/stigning: + 90°

Høyde : - 935 m

Lengde : 34 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	2 gl.gn.alm. Rel. lys,mlk. kv.rik, spr. gr. 0,5 - 2 mm. Fra 0,30-0,40 impr. Sl.	80°	0,30	0,05	0,75			
0.90 - 2.30	1.40	" Rel. lys,mlk. god impr. Sl, Cp,Gn,Py, tildels skarnførende.	80°	1,40	0,37	4,84			
2.30 - 2.70	0.40	Pegm.		0,06	0,04	0,11			
2.70 - 3.60	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. enkelte cm-brede pegm.band. impr. Py Fra 2.70 - 3.60 impr. Sl.	80°	0,13	0,07	0,63			
3.60 - 4.00	0.40	Pegm.		0,02	0,08	0,25			
4.00 - 5.00	1.00	2 gl.gn.alm. Rel. lys,mlk. kv.rik m/impr. Sl,Cp,Gn,Py		0,62	0,26	1,97			
5.00 - 5.60	0.60	" " Impr. Sl,Cp,Gn,Py. Fra 5.40 - 5.50.	70°	0,38	0,15	1,17			
5.60 - 6.70	1.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. impr. Py		0,09	0,12	0,11			
6.70 - 8.45	1.75	2 gl.gn.alm. Rel. lys,mlk. kv.rik, spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py	80°						
8.45 - 9.10	0.65	Pegm.							
9.10 - 19.30	10.20	2 gl.gn.b.d. Rel. mørk,mlk.-grovk. veksl. m/cm-dm-brede 2 gl.gn.alm. band. Svak impr. Py, spor Po.	80° 70°						
19.30 - 21.60	2.30	2 gl.gn.bd. rel.mørk,mlk. tildels hbl.-førende m/spr. gr. 0,5-2mm svak impr. Py.	80°						
21.60 - 23.00	1.40	2 gl.gn.alm. Rel. lys,mlk. ondulerende, m/impr. Py. Fra 22.30-22.60 svak impr. Sl,Cp,Gn,Py							

Lokalitet:

Borehull: 640

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
23.00 - 24.60	1.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ 2 gl.gn.alm. Hbl. og gr. førende, fortrinnsvis i 2 gl.gn.b.d.. Svak impr.Py	80°						
24.60 - 31.50	6.90	Hbl.gn. Mørk,mlk.vekslende m/cm- dm-brede band 2 gl.gn.b.d. Spe. gr. 1-3 mm, svak impr. Py.	80°						
31.50 - 31.75	0.25	Biot.sk. Mørk,grovk.hbl.førende, impr. Py, Po, spor Sl.	80°						
31.75 - 34.00	2.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende vekslende m/1-3 dm brede band hbl.gn. spr. gr. tildels rik 1-3 mm. Svak impr. Py. Fra 31.80-31.85 impr. Sl.	80°						

21.5. 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.680

Borehull: 639

Dato: Mars 1980
 Koordinater: X: 925.467 Y: 44.675
 Retning: Lodd
 Helling/stigning: $\pm 90^\circ$
 Høyde: - 99 m
 Lengde: 15.45 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.40	6.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.kv.rik. spor gr. 1-3 mm. svak impr. Py Ved 6.20 spor Sl.	70° 80°						
6.40 - 7.10	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py							
7.10 - 11.00	3.90	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm bred 2 gl.gn.b.d. band. tildels m/hbl. Spor gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	70° 80°						
11.00 - 15.45	4.45	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/dm-brede 2 gl.gn. b.d.band Spr. gr. tildels rik 1-3 mm. Svak impr. Py.	70° 80°						

25/3 1980
 H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.680

Dato

Mars 1980

Koordinater

X: 925.485

Y: 44.675

Borehull: 638

Retning

Lodd

Helling/stigning:

+ 90°

Høyde

- 94,0 m

Lengde

43.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	9/2 Pb	% Fe	
0.00 - 26.60	26.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik, vekslende m/cm-dm-brede 2 gl.gn.b.d. band. fortr. m/spr. gr. 1-5 mm. svak impr. Py. Ved 16.85 spor Sl.	70° 80°						
26.60 - 27.30	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede pegm.band. Svak impr. Sl,Gn,Cp,Py		0.04	0.02	0.08	2.0		25.60-26.60
27.30 - 29.10	1.80	Biot.gn.(sk.) Mørk,mlk - grovk. impr. Sl,Cp,Py,Po.	80°	0.12	0.14	1.25	25.3		
29.10 - 29.90	0.80	Pegm.		0.07	0.41	1.84	10.5		
29.90 - 32.60	2.70	Biot.gn.(sk). Mørk,grovk-mlk. svak impr. Sl,Cp,Py,Po	60° 70°	0.03	0.05	0.14	2.9		
32.60 - 33.70	1.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. svak impr.Py	70°	0.17	0.26	4.50	9.8		29.90-31.30
33.70 - 38.10	4.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl. førende, spr. gr. 1-3 mm impr. Py. Fra 34.70-34.90 Stichtolitisk	70° 80°	0.03	0.03	1.04	12.6		
38.10 - 43.50	5.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede 2 gl.gn.b.d. band fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	70° 80°	0.04	0.03	0.16	1.0		

25/3 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.680

Dato : mars 80

Koordinater : X: 925.485 Y: 44.675

Retning : Lodd

Helling/stigning: + 90°

Høyde : - 99 m

Lengde : 20.00 m

Borehull: 637

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.80	1.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik, spor gr. 0,5-2 mm. Svak impr. Py	70°						
1.80 - 2.00	0.20	Pegm.							
2.00 - 7.50	5.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik. veksl. m/cm-dm-brede 2 gl. gn. b.d. band fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	70° 80°						
7.50 - 12.75	5.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende, vekslende m/cm-dm-brede hbl.gn. band. Spr. gr. tildels rik 1-5 mm. impr. Py.	70° 80°						
12.75 - 12.95	0.20	Pegm.							
12.95 - 14.95	2.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. enkelte cm-dm-brede pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. impr. Py.	70°						
14.95 - 15.85	0.90	Pegm.							
15.85 - 20.00	4.85	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py.	70° 80°						

25/3 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.740

Dato: mars 1980

Koordinater : X:44.740 Y:925.461

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : - 102 m

Lengde : 14.45 m

Borehull: 636

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	Ag % g/c	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.alm. rel.lys,mlk.kv.rik,veksl. m/spr. striper <u>Sl,Cp,Gn,Py</u> , Spor gr.	80°	0.43	0.18	1.08	9.1		
0.50 - 2.60	2.10	" " Rel.lys,mlk. kv.rik,spr. gr. 1-5 mm, svak impr. <u>Py</u>	80°	0.02	0.02	0.02	0.8		
2.60 - 2.75	0.15	" " Kv.rik,ompr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>		1.48	0.35	3.47	17.6		
2.75 - 3.05	0.30	" " Kv.rik,spr.gr. 1-3 mm, svak impr. <u>Py</u>	80°	0.04	0.01	0.08	0.4		
3.05 - 4.00	0.95	" " Kv.rik,striper impr. <u>Sl,Cp</u> <u>Gn,Py</u>		0.47	0.13	1.46	5.0		
4.00 - 5.95	1.95	" " Rel.lys,mlk,kv.rik,spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	80°	0.03	0.05	0.13	0.8		
5.95 - 6.60	0.65	" " Kv.rik,tildels med skarn, striper,impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>		0.44	0.47	3.34	14.4		
6.60 - 6.90	0.30	Pegm.		0.06	0.06	0.08	1.7		
6.90 - 10.00	3.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede 2 gl.gn.alm. og pegm.band. Spr.gr. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	80°	0.02	0.04	0.09	1.4		
10.00 - 14.45	4.45	" " Rel. mørk,mlk. vekslende m/striper og småparti hbl. gn. Spr.gr. 1-3 mm, impr. <u>Py</u> .	80°						

5/3 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.740

Dato : Mars 1980

Koordinater : X 44.740 X: 925.461

Borehull: 635

Retning : Lodd

Helling/stigning: + 90°

Høyde : - 97 m

Lengde : 8,85 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	Ag % g/t	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik Spr. striper m/sl,cp,gn,Py	80°	0.36	0.14	1.26	11.8		
1.20 - 2.75	1.55	" " Vekslede m/cm-dm-brede biot.d.band. kv.rik, spor gr. svak impr. Py.	80°	0.01	0.02	0.04	1.7		
2.75 - 3.65	0.90	" " Kv.rik,spr. skarn-førende striper m/sl,Cp,Gn,Py	80°	0.64	0.11	1.45	11.2		
3.65 - 5.20	1.55	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. m/svak impr. Sl,Cp,Py.		0.18	0.22	0.62	15.3		
5.20 - 8.85	3.65	" " Rel.mørk,mlk. enkelte dm-brede hbl.førende band. Spor gr., svak impr. Py	80°	0.04	0.02	0.11	1.3		
5/3 1980 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.570

Dato Jan. 1980

Koordinater : X:44.580 Y:925.466

Retning : Lodd

Helling/stigning: + 90°

Høyde : - 95 m

Lengde : 99 m

Borehull: 634

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	Ag g/t	% Fe	
0.00 - 1.40	1.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-brede biot.d. og pegm. band. Biot.d.band fortrævis m/spr. gr. 0,5-2 mm	80°						
1.40 - 1.70	0.30	Pegm.							
1.70 - 8.50	6.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. veksl. m/cm-dm-brede biot.d. og pegm.band. spor gr, svak impr. Py. Fra 7.90-8.20 meget svake spor <u>Sl,Gn,Cp, Py</u>	80° 90°						
8.50 - 8.95	0.45	Pegm.							
8.95 - 11.30	2.35	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.vekslende m/cm-brede biot.d.band, fortrinnsvis m/spr. gr.0,5-2mm	80° 90°						
11.30 - 11.70	0.40	Pegm.							
11.70 - 14.45	2.75	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.vekslende m/cm-dm-brede biot.d. og pegm.band,spor gr., svak impr. Py	80° 90°						
14.45 - 15.05	0.50	Pegm.		0.04	0.01	0.06	3.0	1.80	13.50-14.45
15.05 - 15.60	0.55	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/parti 2 gl.gn.alm. Str. impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	80°	0.02	0.04	0.03	2.0	1.00	
15.60 - 16.40	0.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. svak impr. <u>Py</u>	80°	0.21	0.21	1.47	14.0	6.10	
16.40 - 16.85	0.45	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.-grovk. veksl. m/pegm.band. Spor Cp, impr. Po,Py.	80°	0.01	0.02	0.04	3.0	1.70	
				0.05 0.22	0.08	0.03	44.0	4.40	

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Borehull: 634

Høyde

2.

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	Ag %	% Fe	
16.85 - 18.40	1.55	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/striper og band,biot.d. gn. Fra 17.10-17.40 musk. gn. Spr.svak impr. <u>Sl,Cp</u> Gn,Py	80°						
18.40 - 24.00	3.60	" " Rel.lys,mlk. vekslende m/cm brede biot.d.band. Fra 21.00 - 21.40 impr. Po,Py, spor gr.	75°	0.23	0.10	0.42	15.5	4.30	18.40-19.40
24.00 - 25.40	1.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/parti biot.gn. svak impr. <u>Py</u>	70° 80°						
25.40 - 26.50	1.10	Pegm.							
26.50 - 27.00	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. kv.rik.							
27.00 - 27.30	0.30	Pegm.							
27.30 - 29.90	2.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. Fra 29.80-29.90 hbl.førende. Impr. <u>Py</u>	70°						
29.90 - 30.30	0.40	Pegm.							
30.30 - 30.70	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/str. hbl.gn. impr. <u>Py</u>	70°						
30.70 - 31.60	0.90	Biot.gn.(sk). Mørk,grovk. tildels m/impr. <u>Sl,Cp,Py,Po.</u>							
31.60 - 36.20	4.60	Hbl.gn. Mørk,mlk.vekslende m/cm-dm-brede 2 gl.gn.b.d.band Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py.</u> Fra 31.70-31.80 stichtolitisk.	60°						

Lokalitet:

Borehull: 634

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
36.20 - 54.30	18.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede hbl.gn. 2 gl.gn. alm. og lyse stichtolitiske band. Spr. gr. tildels rik. 0,5-3 mm. Impr. Py	70°						
54.30 - 75.80	21.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede biot.d.band. Spor hbl. spr.gr. 0,5-2mm Tildels m/dm-brede stichtolitiske band. Svak impr. Py.	60° 70°						
75.80 - 83.60	7.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.vekslende m/dm-brede hbl.gn.band. Hbl.førende. Spr. gr. 0,5-2 mm. Impr. Py	70°						
83.60 - 91.25	7.65	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.vekslende m/cm-dm-brede hbl.gn. og 2 gl.gn.b.d.band. fortr. vis m/ spr. gr. 0,5-3 mm Svak impr. Py.	70°						
91.25 - 92.90	1.65	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. tildels rik 1-3 mm.							
92.90 - 94.50	1.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor hbl. gr.rik 1-3 mm. Impr. Py	70°						
94.50 - 99.00	4.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/cm-brede pegn.band. spr. gr. tildels rik 1-3 mm.							

6/3 1980
H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.570

Borehull: 633

Dato : Feb. 1980
 Koordinater : X: 44.580 X: 925.465
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : - 99 m
 Lengde : 5.05 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.10	0.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk. impr. Py	70° 80°						
0.10 - 0.60	0.50	Pegm.							
0.60 - 5.05	4.45	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. veks1. m/ små parti 2 gl.gn.b.d. Spr.gr. 0,5-2 mm. Impr. Py. Ved 2.80 svake spor Sl.							
5/3 1980 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44.570

Borehull: 632

Dato : Jan.-febr. 80
 Koordinater : X: 925.480 Y: 44.580
 Retning : N
 Helling/stigning: + 50°
 Høyde : - 94,5 m
 Lengde : 70 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.50	4.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.tildels hbl. og skarnførende, spr. gr. 0,5-3 mm, impr. Py.	60° 70°						
4.50 - 5.00	0.50	Musk.gn. Lys,mlk-grovk. impr. Py							
5.00 - 8.20	3.20	2 gl.gn.alm. Rel. lys,mlk, spor gr. Spr. små pegm.band. svak impr. Py.	60° 70°						
8.20 - 8.80	0.60	Pegm.							
8.80 - 54.80	46.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. veksl. m/str. og dm.brede 2 gl.gn.b.d. og pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. fortrinnsvis i b.d. parti,svak impr. Py	50° 60°						
54.80 - 70.00	15.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. veksl. m/striper og dm-brede hbl.-førende band, tildels hbl. gn. spr. gr. 1-3 mm. Spr. dm.brede pegm.band Impr. Py.	60°						

12.3. 80
 Holger Pantdalsli

Lokalitet: 44.570

Borehull: 631

Dato : Jan. 80
 Koordinater : X 925.436.5 Y: 44.570
 Retning : N
 Helling/stigning: + 75°
 Høyde : - 95 m
 Lengde : 46.65 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	g/t Ag	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. tildels kv.rik svak, impr. Sl,Cp,Gn,Py		0.13	0.23	0.42	3.8	4.2	
0.50 - 0.95	0.45	Pegm.		0.09	0.56	0.09	1.3	0.8	
0.95 - 4.30	3.35	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.tildels kv.rik veksl. m/parti 2 gl.gn.b.d. Hbl. og skarnførende parti fortrinnsvis m/impr. Sl, Cp,Am, Py	50°	1.04	0.32	3.71	12.6	5.0	0.95-2.50
4.30 - 5.70	1.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. veks. m/parti biot.gn. tildels hbl.førende fortrinnsvis m/god impr. Sl,Cp,Gn,Py	60°	0.75	0.32	2.61	14.7	5.8	
5.70 - 6.90	1.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik, spor hbl. og skarn. god impr. Sl,Cp,Gn,Py	60°	1.32	0.33	5.50	20.9	9.6	
6.90 - 7.90	1.00	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. spor hbl. impr. Sl,Cp,Gn,Py,Po.	60°	1.52	0.36	3.57	31.5	5.5	
7.90 - 8.90	1.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik,bandet m/ 2 gl.gn.b.d. Svak impr. Sl,Cp,Am,Py	60°	0.17	0.49	1.20	10.0	8.9	
8.90 - 10.00	1.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr.gr. tildels rik. 1-3 mm.		0.17	0.14	0.50	4.4	3.5	
10.00 - 10.30	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. impr. Sl,Cp,Gn,Py		0.02	0.01	0.03	0.9	2.6	
10.30 - 12.00	1.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik, spor gr. ved 10.60 og 11.20 cm-bred band Sl, svak impr. Py		1.50	0.18	3.41	29.5	3.3	
				0.10	0.06	0.23	4.3	2.1	

Lokalitet:

Borehull: 631

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
12.00 - 12.30	0.30	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk. spor hbl. og skarn. impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>		0,24	0,25	1,75	13,8	4,8	
12.30 - 12.80	0.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik,spor gr. svak impr. <u>Py</u>		0,08	0,08	0,18	3,7	2,4	
12.80 - 13.75	0.95	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. og skarn. Striper impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>		0,60	0,19	1,69	26,8	4,3	
13.75 - 20.30	6.55	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor gr. fra 18.40-18.50 impr. <u>Cp,Po</u>	60°	0,02	0,03	0,12	2,9	2,6	13,75-15,00
20.30 - 21.60	1.30	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. tildels m/ hbl. og spor <u>Sl,Cp</u> , god impr. <u>Py</u>	60°	0,03	0,02	0,07	11,1	3,0	15,00-16,50
				0,01	0,03	0,07	1,6	3,2	16,50-19,30
				0,01	0,01	0,01	0,9	3,2	19,30-20,30
21.60 - 27.60	6.00	Pegm.		0,08	0,08	0,94	3,7	8,8	
27.60 - 27.85	0.25	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. god impr. <u>Py</u> .		0,01	0,01	0,03	0,3	0,8	
27.85 - 28.10	0.25	Pegm.		0,00	0,04	0,03	2,0	8,1	
28.10 - 28.70	0.60	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. veksl. m/ dm brede pegm.band. tildels m/hbl. god impr. <u>Py, Po</u>	60°	0,01	0,01	0,03	0,9	6,0	
				0,01	0,05	0,04	1,0	9,3	
28.70 - 29.00	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor gr. god impr. <u>Py</u>	60°	0,01	0,01	0,03	0,1	4,4	
29.00 - 35.30	6.30	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk.vekslende m/parti skarn og pegm. tildels spr. gr. 1-3 mm. impr. <u>Py</u>	60°	0,01	0,01	0,03	0,1	4,8	29,00-31,00
				0,01	0,01	0,02	0,4	4,5	31,00-33,00
				0,01	0,01	0,01	<0,1	3,9	33,00-35,30
35.30 - 37.00	1.70	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. fra 36.25 - 36.35 kv. spor gr. svak impr. <u>Py</u>	60°	0,01	0,01	0,06	0,5	3,9	

Lokalitet:

Borehull: 631

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
37.00 - 41.50	4.50	Biot.-hbl.gn. Mørk, mlk. spr. gr. tildels rik 1-5 mm. Svak impr. Py	60°	0,01	0,01	0,03	8/16 Ag <0,1	4,8	37,00-39,25
41.50 - 46.65	5.15	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk-grovk. Spr. gr. 1-2 mm. spor hbl. god impr. Py.	60°	0,00	0,01	0,03	<0,1	4,3	39,25-41,50
				0,00	0,01	0,02	<0,1	6,7	41,50-42,50
				0,00	0,01	0,02	<0,1	7,0	42,50-44,50
				0,01	0,01	0,01	0,5	7,0	44,50-46,65

25/1 1980
Holger Pantdalsli

Lokalitet: 44.570

Dato

Jan. 80

Koordinater

Y: 44.569 X: 925.434

Retning

Lodd

Helling/stigning:

+ 90°

Høyde

- 95 m

Lengde

22.10 m

Borehull: 630

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels biot. rik, (biot.gn.) svak impr. Sl,Cp,Py	60°	0,57	0,39	0,99	16,3	5,1	
0.30 - 0.50	0.20	Pegm.							
0.50 - 2.70	2.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. grovk. veksl. m/1-2 dm.brede biot.gn.-band. Svak impr. Sl,Cp, tildels god impr. Py.	60°	0,26	0,31	0,94	9,0	5,9	0,50-1,50
				0,24	0,31	1,83	8,1	5,5	1,50-2,70
2.70 - 3.90	1.20	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. hbl.skarn førende, god impr. Sl,Cp,Py	60°	0,21	0,34	4,88	10,2	5,7	
3.90 - 7.40	3.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. veksl. m/dm-brede biot.gn.band. fortr.-vis m/hbl. Svak impr. og spr. striper Sl,Cp,Gn,Py	60°	0,26	0,25	1,05	7,5	3,9	3,90-5,00
				0,32	0,20	0,82	7,2	3,8	5,0-6,0
				1,00	0,31	2,81	21,6	3,3	6,00-7,40
7.40 - 12.20	4.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk. veksl. m/dm-brede band 2 gl.gn.b.d. Spr. gr. svak impr. Py	70°	0,05	0,04	0,08	4,3	1,5	7,40-8,40
12.20 - 12.90	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. impr. Py	70°						
12.90 - 13.80	0.90	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik. Spor gr.							
13.80 - 15.60	1.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. svak impr. Py	70°						
15.60 - 17.60	2.00	Pegm.							
17.60 - 22.10	4.50	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm Impr. Py. ved 18.05 spor Sl.	70°						

22.1. 1980
Holger Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.570

Oppbevar

Dato

Des. 79

Koordinater

X: 44.580 Y: 925.481

Retning

N

Helling/stigning:

- 40°

Høyde

- 99 m

Lengde

140.30 m

Borehull: 629

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. tildels kv.rik svak impr. Py	50°					
0.80 - 1.75	0.95	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl.førende. spr. gr. 0.5 - 3 mm. impr. Py	50°					
1.75 - 6.75	5.00	hbl.gn.	Mørk,mlk. rel.massiv, gr.rik 1-10 m stichtoli- tisk. Svak impr. Py	50°					
6.75 - 9.25	2.50	Hbl.gn.	Mørk,mlk. enkelte partier m/2 gl.gn.b.d. hbl.før. Spor anhydritt ved 7.75 gr.førende 1-3 m. svak impr. Py.	50°					
9.25 - 14.85	5.60	hbl.gn.	Mørk,mlk. tildels mass. gr.førende 1-3 m. Veksl. med stichtolitiske partier gr. 1-5 m. Impr. Py	50°					
14.85 - 17.30	2.45	Amf.	Mørk,mlk. hom. Spredte gr. 1-3 m	50°					
17.30 - 19.50	2.20	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. svakt hbl. førende. Spredte gr.1-3m Svak impr. Py	50°					
19.50 - 20.80	1.30	hbl.gn.	Mørk,mlk. spor gr. Py	50°					
20.80 - 23.80	3.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. tildels hbl. førende. Enkelte cm-tykke pegm.band. Spor gr. 1-3 m Py	50°					
23.80 - 26.40	2.60	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. spor gr. 1-2 m	50°					

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 629

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
26.40 - 26.70	0.30	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. cm.tykke pegm. band, spredte gr. 1-3 mm Svak impr. Py	50°						
26.70 - 31.50	4.80	2 gl.gn. Lys, mlk. enstaka cm- dm brede hbl.gn.band. Spor gr. 1-2 m i hbl.bandene gr.førende 1-3 mm.	50°						
31.50 - 32.60	1.10	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk,enkelte hbl.-førende band.	50°						
32.60 - 40.00	7.40	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. enstaka dm.brede hbl.gn.band. Spredte gr. 1-2 mm.	50°						
40.00 - 42.90	2.90	Hbl.gn. Mørk,mlk. Amf.preget gr.-førende tildels rik. Enstaka 5-10 1-5 mm Spr. cm-brede pegm.band.	50°						
42.90 - 43.35	0.45	Pegm.							
43.35 - 59.20	15.95	Amf. Mørk,mlk. vekslende med hbl.gn. med amf.preg. Gr.førende tildels rik 1-10 mm. Stichotolitisk fr 56.10 - 56.55.	50°						
59.20 - 62.20	3.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm Tildels Stichotolitisk	40°						
62.20 - 66.70	4.50	Amf. Mørk,mlk. vekslende m/hbl.gn, gr.førende tildels rik 1-3 mm	40° 50°						
66.70 - 94.30	27.60	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/amf. parti.gr.førende tildels rik 1-5 mm.Spr. cm-dm-brede pegm.band.	40° 50°						

Lokalitet:

Borehull: 629

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
94.30 - 101.80	7.50	Amf.	Mørk, mlk. vekslende m/ hbl.gn. førende 1-3 mm	40°					
101.80 - 140.30	38.50	Hbl.gn.	Mørk, mlk. vekslende m/parti anf. og cm-dm. brede pegm. band. gr. førende 1-3 mm.	35°					
22/1 1980 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 44 570

Dato

Nov. 79

Koordinater

: X: 925.434 Y: 44.570 ca.

Borehull: 628

Retning : lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : - 99

Lengde : 14.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	Biot.gn. Mørk, grovk-mlk. god impr. Py							
0.40 - 4.30	3.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. vekslende m/dm-brede pegn.band, spor gr., ved 0.90 spor Sl Svak impr. Py	80°						
4.30 - 4.50	0.20	Pegn.							
4.50 - 5.80	1.30	Biot.gn. Mørk, mlk. hbl. førende, spr. gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py	80°						
5.80 - 14.50	7.70	Hbl.gn. Mørk, mlk. gr. førende 0,5-3 mm. Svak impr. Py.	80°						
6.12. 1979									
H. Pentdalsli									

Lokalitet: 44 570

Borehull: 627

Dato

Nov. 79.

Koordinater

X: 925.405 Y: 44.570

Retning

Lodd

Helling/stigning:

- 90°

Høyde

- 99

Lengde

10.45 m.

gj. innmålt

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.50	4.50	2 gl.gn.b.d. Rel.merk,mlk,tildels hbl. førende, spor gr. svak impr. Py.	80°						
4.50 - 5.60	1.10	Hbl.gn. Merk,mlk-grovk. spr. gr. 1-5 mm. Svak impr. Py							
5.60 - 8.40	2.80	2 gl.gn.b.d. Rel.merk,mlk. tildels hbl. førende, spor gr. impr. Py	80°						
8.40 - 10.45	2.05	Hbl.gn. Merk,mlk. spr. gr. 0,5- 3 mm. Svak impr. Py	80°						

11.12. 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: 44 570

Dato: Nov. 1979

Koordinater : X: 925.392 Y: 44.570 ca.

Retning : S

Helling/stigning: + 45°

Høyde : - 94,5

Lengde : 29,65 m.

Borehull: 626

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.10	5.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/dm-brede hbl.gn.band, Fortrinnsvis m/spr. gr. 1-5 mm. Svak impr. Py	40° 50°						
5.10 - 5.70	0.60	Pegm.							
5.70 - 7.10	1.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende, spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	50°						
7.10 - 8.00	0.90	Pegm.							
8.00 - 19.70	11.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.-grovk. hbl.-førende, vekslende m/1-2 dm-brede hbl.gn.band. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	50° 60°						
19.70 - 21.50	1.80	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/dm-brede pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	50° 60°						
21.50 - 23.95	2.45	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede pegm.band, hbl.førende, spr. gr. 1-3 mm Svak impr. Py	50° 60°						
23.95 - 24.45	0.50	Pegm.							
24.45 - 26.00	1.55	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk, hbl.førende, Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	50°						
26.00 - 29.65	3.65	Hbl.gn. Rel.mørk,mlk.vekslende m/dm-bred 2 gl.gn.b.d. band Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	50°						

11.12. 1979
H. Pentdalsli

Lokalitet: Profil 44.570

Dato

Nov. 1979

Koordinater

X: 925.450 Y: 44.570

Retning

Lodd

Helling/stigning:

- 90°

Høyde

- 99 m

Lengde

80 m

Borehull: 625

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.20	3.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/dm brede pegm.band. Spor Sl ved 0.30. Impr. Py	70°						
3.20 - 7.70	4.50	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk, vekslende m/dm brede Hbl.gn.band fortrinnsvis gr.førende 1-3 mm. Tildels god impr.Py	60° 70°						
7.70 - 16.00	8.30	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/parti 2 gl.gn.b.d. Spr. gr. 1-3mm Svak impr. Py	70°						
16.00 - 19.70	3.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	70°						
19.70 - 22.40	2.70	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. Spr. gr. 1-3mm	80°						
22.40 - 32.00	9.60	Hbl.gn. Mørk,mlk. Spr. gr. 1-5 mm	80°						
32.00 - 38.00	6.00	2 gl.gn.b.d. Rel. mørk, mlk. vekslende m/cm-dm-brede band hbl.gn. Spr. gr. 1-3 mm.	80°						
38.00 - 80.00	42.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/dm-brede band 2 gl.gn.b.d. Spr. gr. tildels rik 0,5-3 mm.	60° 80°						

23/11 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44570

Dato

Okt. 79

Koordinater

X: 925.419 X: 44.570

Retning

S

Helling/stigning:

+ 60°

Høyde

- 95.5 m

Lengde

15,60 m

Borehull: 624

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	2 gl gn.b.d. Rel.mørk,mlk. veksl. m/ dm-brede band 2 gl.gn.alm. Spor gr. svak impr. <u>Py</u>	50° 60°	0,05	0,17	1,85		6,10	1,50-2,50
2.50 - 3.30	0.80	" Rel.mørk,mlk. vekslende m/ biot.rike parti, spor hbl. impr. <u>Cp, Po</u>	55°	0,00	0,51	0,72		12,00	
3.30 - 4.50	1.20	" Rel. mørk,mlk. spor hbl.gr. Svak impr. <u>Py, Po</u>	55°	0,00	0,09	0,09		5,50	
4.50 - 5.60	1.10	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk.-grovk. spor gr. impr. <u>Py, Po</u>	55°						
5.60 - 5.90	0.30	Pegm.							
5.90 - 6.80	0.90	Biot.gn. Mørk,mlk. spor gr. Svak impr. <u>Py</u> .							
6.80 - 7.00	0.20	Pegm.							
7.00 - 8.05	1.05	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. tildels kv.rik. Impr. <u>Sl, Cp, Po</u>	55°	0,01	0,34	1,43		9,90	0
8.05 - 14.75	6.70	Pegm.							
14.75 - 15.60	0.85	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm Impr. <u>Py</u>							

14.11. 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.670

Borehull: 623

Dato

Okt. 79

Koordinater

X: 926.419.5 Y: 44570

Retning

Lodd

Helling/stigning:

- 90°

Høyde

- 99 m

Lengde

14.60 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl.-førende, m/striper. Impr. Sl, Cp, Gn, Py	80°	2.70	0.18	4.74		5.40	
0.50 - 1.00	0.50	" Rel.mørk,mlk. tildels hbl.-førende. Spr. gr. 0.5-2 mm Svak impr. Py	80°	0.11	0.03	0.11		4.40	
1.00 - 1.40	0.40	" Rel.mørk,mlk. tildels hbl.-førende, striper impr. Sl, Cp, Gn, Py.	80°	1.01	0.34	3.28		8.10	
1.40 - 2.80	1.40	" Rel.mørk,mlk. spor hbl. Spr.gr. 0.5-2 mm, ved 1.60 spor Sl, svak impr. Py	80°	0.08	0.05	0.29		3.90	
2.80 - 3.00	0.20	Pegm.							
3.00 - 3.90	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 0.5-2 mm. Ved 3.35 spor Sl	80°						
3.90 - 4.50	0.60	Pegm.							
4.50 - 8.90	4.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. veksl. m/dm-brede hbl.gn.band. fortrinnsvis gr.førende 1-3 mm. Tildels god impr. Py.	80°						
8.90 - 14.60	5.70	Hbl.gn. Mørk,mlk. tildels m/dm-brede pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm Svak impr. Py	80°						

14.11. 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44570

Dato Okt. 1979

Koordinater : Y: 925.542 X: 44.570

Borehull: 622

Retning : S

Helling/stigning: - 45°

Høyde : - 99 m

Lengde : 91 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl.førende, m/dm-brede pegm.band. impr. Sl,Py	50°	0,85	0,17	4,24		4,90	
1.20 - 1.70	0.50	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.spor gr. svak impr. Py	50°	0,06	0,05	0,28		2,20	
1.70 - 2.50	0.80	" Lys,mlk. tildels hbl.førende impr. Sl,Cp,Gn,Py	50°	0,89	0,59	2,44		7,40	
2.50 - 3.80	1.30	" Lys,mlk.spor hbl. gr. svak impr. Py	50°	0,08	0,03	0,09		2,10	
3.80 - 12.10	8.30	Hbl.gn. Mørk,mlk.enkelte cm-dm-brede pegm.band. God impr. Py.	50°						
12.10 - 12.65	0.55	Pegm.							
12.65 - 22.00	9.35	Hbl.gn. Mørk, mlk. vekslende m/biot og hbl.rikere parti. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	50°						
22.00 - 27.00	5.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.-fink. Tildels kv.rik.vekslende m/cm-dm-brede hbl. biot.rike band, fortrinnsvis m+spr. gr. 0,5-3 mm.	50°						
27.00 - 35.00	8.00	Hbl.gn. Mørk,mlk.enkelte cm-brede pegm.band. Gr.førende 1-3mm	50°						
35.00 - 41.80	6.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk, enkelte cm-dm-brede pegm.band, tildels hbl.førende, spr. gr. 1-3mm	50°						

Lokalitet:

Borehull: 622

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
41.80 - 54.60	12.60	Hbl.gn.	Mørk, mlk. vekslende m/ 2 gl.gn.b.d. og enkelte pegm.band, gr.førende 1-3 mm	50° 55°					
54.60 - 55.10	0.50	Pegm.							
55.10 - 91.00	35.90	Hbl.gn.	Mørk, mlk. vekslende m/biot. rike parti og enkelte dm- brede pegm.band. gr.førende 1-3 mm.	50°					
13/11 1979 H. Pantdalsli									

Jkk innmalt.

Lokalitet: Profil 43.440

Dato : Sept. 79
 Koordinater : X: 925.435.5 Y: 43.440
 Retning : 5
 Helling/stigning: ~~5~~ 60°
 Høyde : ~~60~~⁰ - 31 m
 Lengde : 34.45 m

Borehull: 621

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende, god impr. Sl,Cp,Gn,Py.	40°	2.45	0.32	0.87		3.0	
0.50 - 5.00	4.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	40°	0.02	0.01	0.11		1.5	0.50-6.50
5.00 - 5.40	0.40	TAP							
5.40 - 15.70	10.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. Spr. gr. 1-3 mm. Enkelte dm-brede kv.band, ved 15.40 5 cm. band m/impr. Sl.	40°						
15.70 - 16.10	0.40	Kv.							
16.10 - 16.80	0.70	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm Svak impr. Py	40°						
16.80 - 23.40	6.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels m/ dm-brede hbl.gn. og pegm. band. Spr. gr. 1-3 mm.	40°	0.00	0.05	0.09		2.1	22.40-23.40
23.40 - 24.60	1.20	Biot.gn. Mørk,grovk.-mlk. hbl.før. Impr. Sl,Cp,Py	50°	0.33	0.56	1.23		7.4	
24.60 - 28.00	3.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm.	50°	0.01	0.03	0.06		1.6	24.60-25.60
28.00 - 29.00	1.00	Pegm.							
29.00 - 33.20	4.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. enkelte dm-brede biot.gn.band. Spr. gr. 1-3 mm.	50°						
33.20 - 34.30	1.10	Pegm.							
34.30 - 34.45	0.15	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl.førende	50°						

6/9 1979
 H. Pantdalsli

Lokalitet: 43.440

Borehull: 620

Dato Aug. -79

Koordinater : $X: 925.435.5$ $Y: 43.440$

Retning : S

Helling/stigning: -12° Høyde : -31 m Lengde : 16.75 m

3kk innmalt.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.alm. lys,mlk. kv.rik. 1/2 2/2 malm <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	0°	2,10	0,38	14,4		8,5	
0.70 - 6.40	5.70	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk-grov. vekselnde hbl. innhold. Litt ondu- lerende, stripet <u>Sl,Gn,Cp</u> <u>Py</u>	0-5°	2,70	0,27	10,50		2,9	0,70-2,70
			0°	1,36	0,28	4,80		5,8	2,70-4,70
				0,90	0,58	2,80		5,1	4,70-6,40
6.40 - 12.80	6.40	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk-grov. Vekslende biot.hbl.,hblbiot. gn. Även hbl.gn.band. Spredte gr. 1-3 mm fortrinns- vis i de hbl.rikere partier Imp. <u>Py</u> .	0-5°	2,01	0,10	0,09		5,7	6,40-7,60
12.80 - 13.25	0.45	Hbl.gn. Mørk,grov,gr.rik 1-5 mm stichtolitisk							
13.25 - 16.75	3.50	Hbl.gn. Mørk,mlk-grov. gr.førende 1-3 mm. Tildels gr.rik Enkelte dm-brede biot.rike partier. Rel.mass. Impr. <u>Py</u>	0-5°						

6/9 1979
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 43.440

Borehull: 619

Dato: Aug. 79

Koordinater: X: 925.435.5 X: 43.440

Retning: S

Helling/stigning: Horizontal

Høyde: - 31 m

Lengde: 10.80 m

Jekk innmelt

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.70	1.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. kv.rik, tildels hbl.førende, Stripet impr. Sl,Cp,Gn,Py	30°	1.70	0.66	5.45		5.7	
1.70 - 6.50	4.80	- " - Rel.mørk,mlk. tildels hbl.førende, spredte gr. 0,5 - 2 mm. Impr. Py	30°	0.09	0.15	0.27		6.8	1.70-2.70
6.50 - 10.05	3.55	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.rik 1-5 mm. Stichtolitisk							
10.05 - 10.80	0.75	Hbl.gn. Mørk,mlk. svak impr. Py	30°						

6/9 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 43.440

Borehull: 618

Dato

Aug. 79

Koordinater

X: 925.435.5 m Y: 43.440

Retning

S

Helling/stigning:

- 35°

Høyde

- 31 m

Lengde

30.50 m

Jkke innmålt.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.20	2.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. hbl.førende, Tildels skarn, god impr. Sl,Gn,Cp,Py.	20° 30°						
2.20 - 2.50	0.30	Pegm. Spor Sl,Cp.		2.90	0.22	8.80		7.5	
2.50 - 4.00	1.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. tildels hbl-førende, kv.rik, impr. Sl,Cp,Gn,Py	25°	0.43	0.33	0.70		1.6	
4.00 - 6.50	2.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. kv.rik, spr. gr. 1-3 mm. impr. Py.	25°	0.46	0.17	1.46		2.6	
6.50 - 7.90	1.40	2 gl.gn.alm. Tildels hbl.førende Svak impr. Sl,Cp,Gn,Py.	30°	0.01	0.01	0.55		1.5	
7.90 - 13.90	6.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spr. gr.1-3mm Svak impr. Py	25° 30°	0.18	0.17	0.92		2.8	7.90-9.00
13.90 - 23.90	10.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. svakt ondu-lerende, tildels hbl.før. kv.rik, god impr. Sl,Cp, Gn,Py	20° 25°	0.01	0.01	0.02		1.4	12.90-13.90
				0.03	0.07	0.01		1.7	13.90-15.90
				0.33	0.67	2.39		8.9	15.90-17.90
				0.74	0.13	3.57		2.4	17.90-19.90
				0.40	0.75	2.17		7.5	19.90-21.90
				0.92	0.57	4.00		8.3	21.90-23.90
23.90 - 25.00	1.10	Tap		0.35	0.63	4.02		3.6	23.90-25.00
25.00 - 30.50	5.50	2 gl.gn.alm. Rel. lys,mlk. Hbl.førende tildels m/skarn, god impr. Sl,Cp,Gn,Py	25°	0.78	0.36	5.22		7.0	25.00-27.00
				1.00	0.15	9.50		7.7	27.00-29.00
				0.55	0.20	6.20		7.0	29.00-30.50
6/9 1979 H. Pantdalsli									

Lokalitet: 43.440

Borehull: 617

Dato: Aug.-79

Koordinater: X: 925.435.5 X: 43.440

Retning: S

Helling/stigning: - 25°

Høyde: - 31 m

Lengde: 20.00 m

Jekk innmelt.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 11.70	11.70	2 gl.gn.alm. (malm) Rel. lys,mlk. enkelte dm- tykke hbl.band. God malm. Sl,Cp,Gn,Py	10 - 20°	1.60	0.08	10.74		6.9	0.00-2.00
				1.70	0.55	13.78		9.7	2.00-4.00
				1.70	0.15	11.42		8.0	4.00-6.00
				4.10	0.02	17.66		13.7	6.00-8.00
				4.90	0.02	16.54		12.6	8.00-10.00
11.70 - 17.80	6.10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spor hbl. Enstaka dm-tykke hbl.band. Enstaka gr. 1-3 mm.	15°	4.20	0.10	16.00		10.9	10.00-11.70
17.80 - 20.00	2.20	Hbl.gn. Mørk mlk. gr.rik 1-10 mm Stichtolitisk		0.08	0.34	0.65		5.8	11.70-12.70

6/9 1979
Stellan Burman

Jkke innmalt.

Lokalitet: 43.440

Dato Aug. 79

Koordinater : x: 925.435.5 y: 43.440

Retning : -30° SHelling/stigning: -30° Høyde : ~~34.90 m~~ 31 m

Lengde : 34.90 m

Borehull: 616

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.65	0.65	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. m/spor hbl. rel. svak impr. <u>Sl,Cp,Gn,</u> <u>Py</u>	10 ⁰	0.55	0.18	2.21		4.20	
0.65 - 3.80	3.15	Malm Tildels hbl.førende, rel. kompakt <u>Sl, (lys)Cp,Gn,Py</u>	5 ⁰ 10 ⁰	3.70	0.03	17.04		9.20	
3.80 - 5.80	2.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. m/spor hbl., rel. svak impr. <u>Sl,Cp,Gn,</u> <u>Py</u>	0 5 ⁰	0.67	0.15	1.50		2.80	
5.80 - 8.50	2.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-fink. kv.rik, spor gr., hbl. enkelte parti svak impr. <u>Sl,Cp,Py</u>	5 ⁰	0.74	0.24	1.99		4.00	
8.50 - 9.30	0.80	TAP		0.71	0.29	2.03		4.40	9.30-11.30
9.30 - 16.50	7.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl- førende, impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	5 ⁰	0.17	0.32	2.12		6.00	11.30-13.30
16.50 - 32.80	16.30	Malm Tildels hbl.førende, m/spr. anhydritt, god malm tildels kompakt <u>Sl,Cp,Gn,</u> <u>Py</u>	5 ⁰	0.80	0.34	3.74		6.90	13.30-16.50
				3.90	0.08	17.88		10.10	16.50-19.50
				4.30	0.06	23.92		13.70	19.50-22.50
				3.80	0.04	21.12		12.00	22.50-25.50
				3.10	0.16	13.84		9.40	25.50-28.50
				4.30	0.06	22.52		14.20	28.50-31.50
32.80 - 34.90	2.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. m/spor hbl. rel. svak impr. <u>Sl,Cp,Py</u>	5 ⁰	4.40	0.04	18.52		9.40	31.50-32.80
				0.44	0.64	1.52		6.50	

29/8 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 43.440

Borehull: 615

Dato: Aug. -79

Koordinater: X: 925.435,5 Y: 43.440

Retning: S

Helling/stigning: 40°

Høyde: - 81 m

Lengde: 30,0 m

Jkke innmålt.

1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.70	1.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.-fin. kv.rik ved 0.30 - 0.40 skarn. Stripet impr. Sl,Gn,Cp,Py	20°	1.43	0.58	5.08		5.00	
1.70 - 2.30	0.60	2 gl.gn.alm. lys,mlk-grov. litt ondulerende (fjällig) Svak impr. Py,Sl	20° 0°	0.14	0.14	0.33		2.10	
2.30 - 3.15	0.85	2 gl.gn.alm. lys,mlk.-fin. kv.rik Impr. Sl,Gn,Cp,Py	0-20°	1.74	0.22	4.15		3.30	
3.15 - 4.00	0.85	2 gl.gn.alm. lys,fink. kv.rik. mass. svak impr. Py		0.08	0.05	0.32		2.00	
4.00 - 5.40	1.40	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. rel.kv.rik Spr. gr. 1-2 mm.	20°	0.11	0.05	0.32		1.90	
5.40 - 6.50	1.10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. kv.rik. Spredte gr. 1-2 mm. Impr. Sl,Gn,Cp,Py	20°	0.66	0.14	1.42		3.00	
6.50 - 14.60	8.10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. kv.rik. enkelte gr. 1-3 mm.	30° 40°	0.05	0.02	0.09		1.50	6.50-7.50
14.60 - 17.40	2.80	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. senstaka gr. 1-3 mm. spor Py	30°	1.07	0.22	0.48		5.40	16.40-17.40
17.40 - 19.05	1.65	2 gl.gn. Rel.lys,mlk-grovk. vekslende med kv.band Pegm,skarn.stripes., Impr. Sl,Cp,Gn,Py.		0.42	0.84	3.43		4.10	
19.05 - 20.60	1.55	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. kv.rik enkelte gr. 1-3 mm. spor Py.	30°	0.09	0.05	0.30		1.80	
20.60 - 26.50	5.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grov. litt varierende med biotrikere partier og hbl.skarn. str. tild.god malm,Sl,Gn,Cp,Py,Po	30° 20°	0.86	0.92	3.79		8.40	20.60-23.60
				0.97	0.61	5.06		7.70	23.60-26.50

Lokalitet:

Borehull: 615

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
26.50 - 27.80	1.30	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enkelte små gr. 0,5-1,0 mm. Svak impr. <u>Py</u>	35°	0.08	0.05	0.33		1.40	
27.80 - 28.60	0.80	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-2 mm. impr. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	35°						
28.60 - 29.15	0.55	Pegm.		0.10	0.06	2.15		1.90	
29.15 - 30.00	0.85	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. rel.kv.rik Spr. gr. 1-2 mm. spor <u>Py</u>	35°						

29/8 1979
Stellan Burman

Jkke innmålt.

Lokalitet: Profil 43.440

Dato Aug. -79
 Koordinater : X: 925.435.5 Y: 43.440
 Retning : S
 Helling/stigning: - 50°
 Høyde : - 31 m
 Lengde : 12.15 m

Borehull: 614

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. Impr. Sl,Py,Cp	40°	1.28	0.33	4.24		4.00	
0.50 - 1.80	1.30	2 gl.gn.alm. Lys, mlk-fin. kv.rik. Svak impr. Py, Sl	35° 40°	0.29	0.08	1.31		2.40	
1.80 - 12.15	10.35	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. tildels kv.- rik. enkelte dm.tykke partier 2 gl.gn.alm. (ved 2.90 - 2.95 Sl) Spor gr. 1-2 mm. Spor Py	40° 30°						

29/8 1979
 Stellan Burman

Lokalitet: *Profil 43.820*

Borehull: 613

Dato

Koordinater : X: 925. 411,7 Y: ~~43.822,3~~ 43.822,3

Retning : N

Helling/stigning: - 50°

Høyde : - 61,2

Lengde : 35,45 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.00	6.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor gr. svak impr. Py	50° 60°	0.12	0.05	0.29		2.00	5.00-6.00
6.00 - 7.60	1.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/hbl.førende band. Striper, impr. Sl,Cp,Gn,Py	60°	1.01	0.50	3.08		6.50	
7.60 - 9.00	1.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. tildels kv.rik enkelte hbl.førende band. m/impr. Sl,Cp,Gn,Py	50° 60°	0.37	0.50	0.94		3.90	
9.00 - 10.50	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende god impr. Sl,Cp,Gn,Py.	55°	1.17	1.06	2.93			
10.50 - 12.00	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor gr. svak impr. Py	60°	0.07	0.08	0.19		3.1	
12.00 - 12.50	0.50	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. svak impr. Py	60°						
12.50 - 13.00	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. svak impr. Py	60°	0.02	0.09	0.33		4.5	
13.00 - 15.50	2.50	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. vekslende m/dm brede pegm.band. Vekslende impr. Sl,Cp God impr. Py, Po.	60°	0.03	0.52	0.47		10.1	
15.50 - 16.70	1.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor gr.	60°	0.07	0.04	0.04		2.20	
16.70 - 17.00	0.20	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. svak impr. Py	60°						
17.00 - 17.50	0.50	TAP							
17.50 - 19.70	2.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. svak impr. Py	50°	0.03	0.06	0.09		3.2	19.00-19.70
19.70 - 21.70	2.00	" " Enkelte striper Sl,Cp,Py,Po	60°	0.24	0.40	0.68		5.6	
21.70 - 22.50	0.80	Pegm.		0.06	0.20	0.16		1.5	

Lokalitet:

Borehull: 613

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
22.50 - 24.50	2.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor gr. Svake spor <u>Sl,Cp,Py</u>	60°	0,12	0,14	0,28		2,7	
24.50 - 25.30	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende tildels god impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	60°	0,71	0,48	5,12		9,0	
25.30 - 26.90	1.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor gr. svak impr. <u>Py</u>	60°	0,09	0,21	0,19		3,4	
26.90 - 27.60	0.70	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. impr. <u>Sl,Cp,Py,Po</u>	60°	0,17	0,67	2,60		10,6	
27.60 - 29.50	1.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/hbl.førende band, fortr. vis m/impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	60°	1,08	1,19	4,58		7,0	
29.50 - 35.45	4.95	" " Rel. mørk, mlk. m/spor hbl. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr <u>Py</u> .	60°	0,10	0,18	0,07		3,5	29.50-35.45
6/7 1979 H. Pantdalsli									

Lokalitet: *Profil 48.830*

Dato: Juni 79

Koordinater: *X: 925.411,7 Y: 43.827,4*

Retning: N

Helling/stigning: + 45°

Høyde: - 57,5

Lengde: 32,40 m.

Borehull: 612

1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 9.60	9.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mik. vekslende m/dm-brede band pegm. spor gr. Ved 0.60 spor <u>Sl</u> .	55°	0,23	0,05	0,28		1,70	8,60-9,60
9.60 - 10.00	0.40	" " Enkelte hbl.førende band, fortrinnsvis m/impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> <u>Py</u> .	55°	0,28	0,17	1,09		2,70	
10.00 - 11.35	1.35	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl-førende, striper impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u> .	50° 60°	1,70	0,85	5,41		7,60	
11.35 - 12.85	1.50	" " Enkelte hbl.førende band fortrinnsvis m/impr. <u>Sl</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u> .	50° 60°	0,67	0,38	2,01		3,90	
12.85 - 16.10	3.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band pegm. Spor gr.	60°	0,08	0,05	0,13		2,00	12,85-13,85
16.10 - 16.60	0.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor gr. svak impr. <u>Py</u>	60°	0,12	0,18	0,08		1,50	
16.60 - 17.20	0.60	Musk.gn. Lys,mlk-grovk. ondulerende Impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u>		0,32	0,23	0,19		4,50	
17.20 - 22.00	4.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl-førende god impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u>	60°	1,14 1,10	0,28 0,41	4,14 4,51		4,40 7,30	17,20-19,50 19,50-22,00
22.00 - 22.30	0.30	Pegm.							
22.30 - 22.45	0.15	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk. hbl.førende god impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Py</u>		0,79	0,20	6,77		6,50	
22.45 - 22.70	0.25	Pegm.							
22.70 - 28.20	5.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/hbl.førende parti, spr. gr 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u> . Ved 27.70 spor <u>Sl</u>	60°	0,32	0,07	0,10		4,30	22,70-23,70

Lokalitet:

Borehull: 612

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
28.20 - 32.40	4.20	Hbl.gn. Mørk, mlk, spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	60°						
		6/7 1979 H. Pantdalsli							

Lokalitet: *Profil 43.830*

Dato: Juni - 79

Koordinater: X: *925.411,2* Y: *43.827,3*Retning: *N.*Helling/stigning: *+ 70°*Høyde: *- 57,0*Lengde: *20,0 m.*

Borehull: 611

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.40	3.40	2 gl.gn.alm. Lys, rel. kv.rik, enkelte gr. 1-2 mm. <u>Sl</u> som enstaka cm tykke band. Svak impr. Py	65° 70°	0.11	0.06	0.42		1.90	
3.40 - 3.85	0.45	Pegm.							
3.85 - 5.20	1.35	2 gl.gn.alm. Lys kv.rik enstaka biot. skikt. spredte gr. 1-3 mm Spor Py	60°	0.04	0.03	0.19		2.00	
5.20 - 5.35	0.15	Pegm.							
5.35 - 6.30	0.95	2 gl.gn. m/skarn Rel.lts, mlk-grovk. vekslende m/diopsid(skarn) samt enkelte filmtynne biotskikt. Stripet malm. <u>Sl, Gn, Cp, Py.</u>	70°	0.19	0.40	2.60		4.10	
6.30 - 12.50	6.20	2 gl.gn.bd. Rel.lys, mlk. partier m/ 2 gl.gn. alm. enstaka gr. 1-2 mm. Spredte striper og band <u>Sl, Cp, Gn, Py</u>	60°	0.35	0.25	2.51		4.60	6.30-8.30
			70°	0.42	0.14	1.00		2.80	8.30-10.30
				0.52	0.21	2.48		3.30	10.30-12.30
12.50 - 13.00	0.50	Biot.hbl.gn. Mørk, rel.grovk. enstaka gr. 1-3 mm. impr. Py. spor <u>Sl?</u> .	70°	0.09	0.25	0.37		7.80	?
13.00 - 14.45	1.45	Hbl.gn. Mørk, grovk-mlk. spredte gr 1-3 mm. Impr. Py	60°	0.07	0.04	0.20		5.60	
14.45 - 14.55	0.10	Pegm.							
14.55 - 20.00	5.45	Hbl.gn. Mørk, grovk. Amfibolitiske partier (dm-tykke) impr. <u>Py</u> Gr.førende 1-3 mm.	60° 70°						

6/7 1979
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.460

Dato Juni 1979

Jkke innmålt.

Koordinater :

Retning : S

Helling/stigning: + 45°

Høyde :

Lengde : 25.80

Borehull: 610

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.40	6.40	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. hbl-førende, Enkelte dm-brede hbl.band Spr.gr. 1-3 mm.Svak impr. <u>Py</u>	60°						
6.40 - 24.20	18.20	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede 2 gl.gn.b.d. band Spr.gr. (23.00-24.00 gr.rik) 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	60°						
24.20 - 25.80	1.60	2 gl.gn.alm. lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm Svak impr. <u>Py</u>	60°						

18/6 1979
H. Pantdalsli.

Lokalitet: Profil 44.460

Dato: Juni 1979

Ikke innmålt.

Borehull: 609

Koordinater :

Retning : S

Helling/stigning: - 45°

Høyde :

Lengde : 23.50

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.70	5.70	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. hbl.førende, Spr.gr. 1-3 mm. tildels god impr. <u>Py</u> (vekslende innhold hbl. <u>Py</u>).	40°						
5.70 - 5.90	0.20	Pegm.							
5.90 - 7.30	1.40	2 gl.gn.b.d. Som forgående	40°						
7.30 - 7.50	0.20	Pegm.							
7.50 - 8.80	1.30	2 gl.gn.b.d. Som forgående	40°						
8.80 - 9.00	0.20	Pegm.							
9.00 - 10.70	1.70	2 gl.gn.b.d. Som forgående	40°						
11.70 - 15.10	3.40	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk,enkelte dm-brede hbl.førende band, tildels biot.gn. spr. gr. 0,5-2 mm. Impr. <u>Py</u>	50°						
15.10 - 17.00	1.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.vekslende biot. innhold, spr. gr. 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>	50°						
17.00 - 17.20	0.20	Hbl.gn. Mørk,mlk.gr.rik 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>							
17.20 - 17.40	0.20	Pegm.							
17.40 - 18.70	1.30	Hbl.gn. Mørk,mlk.vekslende m/dm-brede band pegm. og 2 gl.gn.b.d. tildels gr.rik 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>	50°						
18.70 - 23.00	4.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. små parti svakt ondulerende, hbl-førende, spr. gr. 1-3mm Impr. <u>Py</u>	40° 50°						

Lokalitet:

Borehull: 609

2.

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
23.00 - 23.20	0.20	Pegm.							
23.20 - 23.50	0.30	2 gl.gn.b.d. Som forgående							
12/6 1979 H. Pantdalsli									

Lokalitet: *Profil 44.460*

Dato: *Mai 1979*

Koordinater: *X: 925.453 Y: 44.460*
925.453 X

Retning: *Lodd*
11 = - 91,9

Helling/stigning: *- 90°*

Høyde: *- 91.9 m*

Lengde: *15.75 m*

Borehull: 608

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor gr. Svak impr. Py	60°	0.01	0.08	0.07		2.90	
0.70 - 1.60	0.90	" Vekslende m/pegm.band, enkelte striper <u>Sl,Gn,Cp</u> Svak impr. <u>Py</u>	60°	0.17	0.23	0.53		5.40	
1.60 - 2.20	0.60	" Lys, mlk. spor gr.		0.01	0.07	0.13		2.60	
2.20 - 3.70	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede band 2 gl.gn. alm. striper impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u> , <u>hbl</u> .	60°	0.89	0.22	3.75		6.60	
3.70 - 7.60	3.90	" Rel.mørk,mlk. spr. gr. 0,5-3 mm. Svak impr. <u>Py</u> , Ved 6.30 spor <u>Sl</u>	60° 70°	0.62	0.02	0.13		1.70	3.20-4.70
7.60 - 8.00	0.40	Pegm.							
8.00 - 9.30	1.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spor gr.	60-70°						
9.30 - 10.65	1.35	Pegm. m/enkelte dm-brede band 2 gl.gn.b.d.							
10.65 - 11.50	0.85	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u> .							
11.50 - 13.20	1.70	" hbl.førende,god impr. <u>Py</u> .							
13.20 - 14.05	0.85	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk.spr.gr. 1-3 mm Svak impr. <u>Py</u>							
14.05 - 14.50	0.45	Pegm.							
14.50 - 15.75	1.25	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 0,5-2mm Svak impr. <u>Py</u> .	60° 70°						

8/6 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44 460

Dato: Mai 1979

Koordinater: X: 925.455 Y: 44.460

925.455 X

Retning: N

H = ?

Borehull: 607

Helling/stigning: + 60°

Høyde: - 88.4 m (c9)

Lengde: 46.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.80	1.80	2 gl.gn.alm. lys,mlk.tildels hbl-førende Kv.rik, striper, impr. Sl, Cp, Gn, Py.		0.72	0.41	4.26		4.80	
1.80 - 4.50	2.70	" Kv.rik, spor gr.	50-60°	0.03	0.09	0.15		2.20	1.80-2.80
4.50 - 5.40	0.90	Pegm.							
5.40 - 6.00	0.60	2 gl.gn.alm. lys,mlk.kv.rik.							
6.00 - 7.60	1.60	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede pegm.band. Svak impr. Py.	60°						
7.60 - 15.20	7.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. tildels kv.rik spor gr. ved 13.50 og 14.10 spor Sl.	50° 60°	2.01	0.03	0.03		1.70	14.20-15.20
15.20 - 15.70	0.50	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spor hbl., Striper impr. Sl,Cp,Gn,Py		0.45	0.20	3.82		5.60	
15.70 - 19.30	3.60	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. hbl.før. Spr. gr. God impr. Py	60°	0.00	0.10	0.22		6.00	15.70-16.70
19.30 - 20.00	0.70	Biot.gn.(sk) Mørk,grovk. spr. gr. 1-3 mm Impr. Py	60°						
20.00 - 20.80	0.80	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. hbl.førende, Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	60°	0.00	0.06	0.03		5.90	
20.80 - 23.40	2.60	Biot.gn(sk) Mørk,grovk. hbl-førende, Impr. Sl,Cp,Py,Po	60°	0.00	0.12	1.25		12.20	
23.40 - 24.50	1.10	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk.-grovk. veksl. m/dm-bred biot.sk.band. fortrinnsvis m/striper Sl, impr. Py, Po.	60°	0.08	0.10	0.56		6.40	
24.50 - 25.00	0.50	Pegm.							

Lokalitet:

Borehull: 607

2.

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
25.00 - 26.80	1.80	Biot.gn(sk). Mørk, grovk. hbl.førende, vekslende m/dm-brede pegm.-band. Stripper impr. <u>Sl, Cp, Py, Po.</u>	60°	0.00	0.25	0.23		10.10	
26.80 - 28.10	1.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. hbl.førende spor gr. tildels impr. <u>Sl, Cp, Py</u>	60°	0.00	0.06	0.01		4.80	
28.10 - 29.10	1.00	Hbl.gn. Mørk, mlk.spr. gr. 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>	50°	0.00	0.03	0.00		3.90	
29.10 - 32.00	2.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk-grovk. hbl.-førende tildels biot.gn. Stripper impr. <u>Sl, Cp, Py, Po</u>	60°	0.13	0.17	1.35		7.50	
32.00 - 46.20	14.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. tildels hbl-førende. Spr.gr. 1-3 mm Vekslende m/dm-brede pegm.-band. Svak impr. <u>Py</u>	50° 60°	0.00	0.02	0.06		1.90	32.00-33.00

8.6. 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: PROFIL 44.460

Dato : Mai 1979

Ikke innmålt.

Koordinater :

Retning : N

Helling/stigning: + 60°

Høyde :

Lengde : 53,40 m.

Borehull: 606

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.40	6.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl. gn.bd. Spr. gr. 0,5-2 mm, Svak impr. Py. Fra 6.00 - 6.40 spor hbl, Sl,Py	70°	0.03	0.03	0.16		2.20	5.00-6.00
				0.40	0.45	1.79		5.40	6.00-6.90
6.40 - 7.70	1.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/dm-brede band biot.gn. Impr. Sl,Cp,Py,Po	70°	0.00	0.41	0.17		6.80	
7.70 - 8.70	1.00	" Spor Sl,Cp,Py,Po. Spr. gr. 1-3 mm.		0.00	0.08	0.15		3.70	
8.70 - 13.70	5.00	" Vekslende m/2 gl.gn.alm. Spr. gr. 0,5-2 mm. Svak impr. Py. Fra 12.80-13.10 spor Sl,Gn,Cp,Py,hbl.	65° 70°						
13.70 - 14.00	0.30	Pegm.							
14.00 - 14.50	0.50	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,spor gr. Svak impr Py	70°	0.01	0.02	0.11		1.90	
14.50 - 15.20	0.70	" Enkelte striper Sl,Cp,Gn, Py, hbl.		1.14	0.31	1.33		3.80	
15.20 - 18.30	3.10	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. impr. Sl, Cp,Py,Po	60°	0.03	0.18	1.11		9.40	
18.30 - 21.00	2.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor gr.	70°	0.00	0.04	0.11		2.30	18.30-19.30
21.00 - 28.50	7.50	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. enkelte dm-brede pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm.	60° 70°	0.00	0.04	0.17		2.40	27.50-28.50
28.50 - 30.70	2.20	Biot.gn. Mørk,grovk.spor hbl. impr. Sl,Cp,Py,Po.	60° 70°	0.07	0.20	2.17		8.40	

Lokalitet:

Borehull: 606

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
30.70 - 32.70	2.00	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. impr. Py, Po. spor <u>Sl</u>	60 ⁰ 70 ⁰	0,04	0,06	0,17		6,10	
32.70 - 37.00	4.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk-grovk. vekslende m/cm-dm-brede biot.gn.band. Spr. gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py.	60 ⁰ 70 ⁰	0,00	0,01	0,03		2,60	3270-3370
37.00 - 53.40	16.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk-fink. veksl. m/cm-dm-brede band 2 gl.gn.bd. Spor gr. 0.5-2mm. tildels kv.rik og mass.	70 ⁰						

8.6. 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.460

Borehull: 605

Dato : Mai 1979

Koordinater : X: 925.467.2 Y: 44.459.3

Retning : N

Helling/stigning: 45°

Høyde : - 91.5 m

Lengde : 39 m

1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. hbl.førende Impr. Sl, Cp, Py, Po	50°	0.02	0.38	2.86		11.60	
0.40 - 1.00	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk.vekslende m/ små pegm.band, Impr. Py	50°	0.02	0.06	0.13		4.20	
1.00 - 1.20	0.20	Pegm.							
1.20 - 2.90	1.70	Biot.gn. Mørk, mlk.-grovk, tildels hbl.førende, vekslede impr. Sl, Cp, Py, Po	50° 40°	0.02	0.23	0.59		7.20	
2.90 - 3.20	0.30	Pegm.							
3.20 - 3.70	0.50	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. tildels hbl.førende, vekslede m/ små pegm.band, spor Sl, Cp Py, Po	40° 50°	0.01	0.36	0.25		7.70	
3.70 - 4.20	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. svak impr.Py		0.01	0.04	0.21		2.40	
4.20 - 4.55	0.35	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk, hbl.førende Impr. Sl, Cp, Py, Po	50°	0.01	0.16	0.42		8.20	
4.55 - 4.85	0.30	Pegm.							
4.85 - 5.10	0.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. spr.gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	40-50°						
5.10 - 6.75	1.65	2 gl.gn.alm. Lys, mlk-fink. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	40-50°	0.00	0.03	0.05		2.70	4.85-5.85
6.75 - 8.60	1.85	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. gr.førende tildels rik 1-3 mm. Svak impr. Py.	40-50°						
8.60 - 9.00	0.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk, spor gr. Svak impr. Py	50°						
9.00 - 13.00	4.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk, vekslede m/ hbl.førende parti, spr.gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	50°						

Lokalitet:

Borehull: 605

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.00 - 19.70	6.70	Hbl.gn. Rel.mørk,mlk.vekslende m/ 1-3 dm brede band 2gl.gn.b.d Spr. gr. 1-3 m Tildels rik Svak impr. Py.	40°						
19.70 - 22.60	2.90	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk.spr. små band pegm. Spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py.	50°						
22.60 - 22.90	0.30	Pegm.							
22.90 - 26.60	3.70	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk.vekslende m/dm.bred band og 2 gl.gn.alm. Spr.gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	50°						
26.60 - 29.15	2.75	2 gl.gn.alm. lys,mlk. vekslede m/striper biot.gn. tildels kv.rik, Spr. gr. 0,5-2 mm.	50°						
29.15 - 29.70	0.55	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.rik 1-3 mm.							
29.70 - 37.60	7.90	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslede m/ 1-3 dm brede band 2 gl.gn. b.d. Spr. gr. 1-3 mm.	40° 50°						
37.60 - 39.00	1.40	Hbl.gn. Mørk,mlk, spr. gr. tildels rik 1-3 mm.	50°						

29/5 1979

H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.460

Borehull: 604

Dato : Mai 1979

Koordinater : X: 925.443.2 Y: 44.457.5

Retning : N

Helling/stigning: + 59°

Høyde : - 89 m

Lengde : 42,40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. Svak impr. Sl,Cp,Gn,Py	70°	0.88	0.44	2.72		5.60	
0.50 - 2.05	1.55	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk. Fra 1.10 - 1,55 spor hbl. svak impr. Sl,Cp,Gn,Py	70°	0.05	0.05	0.15		1.60	0.50-1.10
				1.44	0.46	4.81		6.50	1.10-1.55
				0.05	0.04	0.17		2.00	1.55-2.05
2.05 - 2.50	0.45	Pegm.							
2.50 - 12.00	9.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ enkelte biot.rike band og dm-brede pegm.band. Spor gr. Svak impr. Py.	60°						
12.00 - 14.00	2.00	Biot.gn. Mørk,grovk.-mlk. svak impr. Py	55°						
14.00 - 14.60	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. veksl. m/cm- brede pegm.band. Spor gr. Fra 14.50 - 14.60 spor Sl.	60°						
14.60 - 16.30	1.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.-fink. kv.rik, Spor gr.	55°						
16.30 - 17.30	1.00	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ biot. ved 16.90 Po.Spor gr.	55°						
17.30 - 18.00	0.70	" " Hbl.førende m/spor gr. 1-3 mm.							
18.00 - 19.00	1.00	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. Fra 18.30- 18.60 biot.sk. Spr. gr. 1-3 mm.	60°						
19.00 - 21.20	2.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende, Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	60°						

Lokalitet:

Borehull: 604

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
21.20 - 22.00	0.80	Biot.gn. Mørk,mlk. impr. <u>Py</u>		0.38	0.14	1.49		10.40	
22.00 - 22.70	0.70	" Mørk,mlk-grovk. vekslende m/kv.rike band og spor hbl. Impr. <u>Sl,Cp,Py</u>	50°	0.28	0.10	1.30		11.70	
22.70 - 24.20	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/dm-brede biot.gn.band. spor hbl. gr. svak impr. <u>Py</u>	50°	0.02	0.04	0.25		6.40	22.70-23.70
24.20 - 27.60	3.40	Hbl.gn. Rel.mørk,mlk. tildels gr.-rik 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	50°						
27.60 - 29.00	1.40	2 gl.gn.alm. lys,mlk. svak ondulerende Spor gr.	50°						
29.00 - 30.20	1.20	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.rik 1-3 mm.	50°						
30.20 - 42.40	12.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende tildels hbl.gn. m/spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	50° 70°						

16/5 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.460

Borehull: 603

Dato : Mai 1979

Koordinater : X: 925.443.4 Y: 44.458.9

Retning : ~~+90°~~

Helling/stigning: Lodd

Høyde : - 92 m

Lengde : 13,90 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. Fra 0.00 - 0.05 spor Sl,Cp	70°	0,03	0,10	0,15		2,88	
0.90 - 3.20	2.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/1-3 dm brede band god malm (skarntype)		0,49	0,24	2,00		7,20	
3.20 - 5.05	1.85	" " Hbl.førende tildels kv.rik, impr. Sl,Cp,Py,Po	70° 80°	0,09	0,24	0,82		5,30	
5.05 - 5.45	0.40	" " Dpor gr. svak impr. Py	80°	0,01	0,07	0,07		4,30	
5.45 - 7.20	1.75	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/biot.rike parti. Striper impr. Sl,Cp, Py, Po.	80° 60°	0,47	0,35	1,71		6,70	
7.20 - 9.50	2.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-fink. kv.rik ved 7.80, 9.20 spor Sl. Enkelte gr. 1-3 mm.	80°	0,11	0,13	0,46		3,70	7,20-8,20
9.50 - 13.90	4.40	" " Hbl.førende tildels hbl.gn. Spr. gr. 1-3 mm.	80°						

16/5 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: *Profil 44.510*

Dato April 79

Jekte innmålt.

Borehull: 602

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: Lodd

Høyde :

Lengde : 10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	TAP							
0.20 - 0.80	0.60	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. spor <u>Sl</u> , <u>Cp, Py, Po.</u>	80°	<i>0.04</i>	<i>0.31</i>	<i>0.90</i>			
0.80 - 1.80	1.00	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. hbl.førende, god impr. <u>Sl, Cp, Gn, Py</u>	80°	<i>1.55</i>	<i>0.42</i>	<i>9.65</i>			
1.80 - 2.60	0.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk-fink. spor gr.	80°	<i>0.04</i>	<i>0.03</i>	<i>0.10</i>			
2.60 - 3.10	0.50	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. hbl.førende, god impr. <u>Sl, Cp, Gn, Py</u>		<i>0.62</i>	<i>0.86</i>	<i>4.44</i>			
3.10 - 5.20	2.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk. spor gr.		<i>0.00</i>	<i>0.02</i>	<i>0.03</i>			<i>3.10-4.10</i>
5.20 - 10.00	4.80	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. enkelte pegm.band. tildels hbl.- førende. Spr. gr. 0,5-3 mm Svak impr. <u>Py.</u>	80°						

24/4 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.490

Dato April 1979

Ikke innmålt.

Borehull: 601

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: Lodd

Høyde :

Lengde : 10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	TAP							
0.20 - 0.55	0.35	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spor <u>Sl,Cp,Py</u>	80°	0.06	0.19	0.27			
0.55 - 0.95	0.40	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. impr. <u>Sl</u> <u>Cp,Py.</u>	70°	0.03	0.30	2.52			
0.95 - 1.15	0.20	Pegm.							
1.15 - 3.75	2.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink. Fra 1.15 - 2.60 enkelte dm-brede hbl- førende band m/impr. <u>Sl</u> , <u>Cp,Py</u>	70° 80°	0.43 0.02	0.22 0.02	1.99 0.04			1.15-2.60 2.60-3.75
3.75 - 4.20	0.45	Biot.gn. Mørk,mlk,hbl.førende m/ spr. gr. 0,5-3 mm	80°						
4.20 - 4.70	0.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 0,5-3mm	85°						
4.70 - 5.15	0.45	Biot.gn. Mørk,mlk. hbl.førende m/ spr. gr. 1-2 mm.	80°						
5.15 - 7.20	2.05	2 gl.gn.bd. Rel. mørk, mlk. -grovk, tildels ondulerende Spor hbl. spr. gr. 1-2 mm	80°						
7.20 - 7.50	0.30	Pegm.							
7.50 - 10.00	2.50	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk.tildels gr.rik 1-3 mm	80°						

23/4 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.490

Dato April 79

Jkk inn målt.

Borehull: 600

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning: Lodd

Høyde :

Lengde : 9.90 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. veksl. m/dm-brede band biot.gn. hbl.førende. Spor gr. svak impr. Py.	70°	0.00	0.01	0.04			
1.10 - 1.85	0.75	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. Veksl. m/striper impr. hbl. Sl,Cp,Py.	70°	0.33	0.16	4.51			
1.85 - 3.10	1.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. striper hbl. Spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py	70°	0.03	0.03	0.20			
3.10 - 4.90	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-fink. tildels kv.-rik. Fra 3.70-4.00 (skarn) impr. hbl. Sl,Cp,Py	70°	0.00	0.02	0.20			3.10-3.70
				2.23	0.14	7.15			3.70-4.00
				0.06	0.04	0.16			4.00-4.90
4.90 - 9.90	5.00	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk, spr. gr. tildels rik 1-3 mm.	70°						

23/4 1979
H. Pantdalsli

Ikke innmålt.

Lokalitet: Profil 43.790

Dato April 1979

Borehull: 599

Koordinater :

Retning : S

Helling/stigning: - 20°

Høyde :

Lengde : 86.80 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 14.40	14.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/små parti 2 gl.gn.alm. Spr. gr. 1-3 mm. fra 3.10 - 3.20. 12.20 - 12.30 spor <u>Sl</u> .	40°	0.04	0.07	0.14			13.40-14.40
14.40 - 15.65	1.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ 10-30 cm band god malm, hbl.førende og 2 gl.gn.alm Impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py,Po</u> .	30° 40°	1.03	0.34	5.17			
15.65 - 17.20	1.55	2 gl.gn.alm. Rel.lys mlk, vekslende m/dm-brede 2 gl.gn.b.d.band fortrinnsvis m/spr. gr. 1-3 mm. svak impr. <u>Py</u> .	35°	0.13	0.08	0.10			
17.20 - 26.90	9.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels ondulerende, vekslende med små parti 2 gl.gn.alm. spor hbl. Impr. <u>Sl,Cp,Py,Po</u>	5° 30°	1.05 0.28 0.24 0.46 0.23	0.25 0.19 0.16 0.18 0.21	3.30 0.94 0.53 0.46 0.61			17.20-19.20 19.20-21.20 21.20-23.20 23.20-25.20 25.20-26.90
26.90 - 27.60	0.70	Pegm.							
27.60 - 29.50	1.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. impr. <u>Sl,Cp,Py,Po</u>	40°	0.39	0.27	1.30			
29.50 - 30.90	1.40	Biot.gn. Mørk,grovk.-mlk. hbl-førende tildels rik, impr. <u>Sl,Cp,Py,Po</u> .	40°	0.42	0.31	1.82			
30.90 - 51.20	20.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. veksl. m/cm-dm-bred hbl. og biot. gn.band. Spr. gr. tildels rik 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>	20° 40°	0.03	0.04	0.05			30.90-32.00

Lokalitet:

Borehull: 599

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
51.20 - 61.50	10.30	Hbl.-biot.gn. Mørk, mlk. spr. gr. 1-3 mm Impr. <u>Py</u>	35°						
61.50 - 68.80	7.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. grovk. ondulerende. Spor gr. impr. <u>Py</u> .	10° 30°						
68.80 - 75.80	7.00	Hbl.-biot.gn. Mørk, mlk, vekslende m/ små parti pegm. og hbl.gn. Spr. gr. tildels rik 1-3mm Svak impr. <u>Py</u>	30°						
75.80 - 77.50	1.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk-grovk. ondu- lerende. spor gr. impr. <u>Py</u>	10° 30°						
77.50 - 82.70	5.20	Hbl.gn. Mørk, mlk. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	35°						
82.70 - 86.80	4.10	Hbl.-biot.gn. Mørk, mlk. spr. gr. 1-3 mm Svak impr. <u>Py</u>	35°						

2/5 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: Profil 43.790

Dato Mars 1979

Ikke innmålt.

Borehull: 598

Koordinater :

Retning : S

Helling/stigning: - 30°

Høyde :

Lengde : 68,65 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 9.40	9.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,vekslende m/ 2 gl.gn.alm. og dm.brede pegm.band. Fra 4.60-4.80. 6.60-6.80, 7.20-7.30 spor Sl,Cp, Enkelte parti m/ spr.gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py	40° 50°				8,4g		-
9.40 - 12.30	2.90	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. tildels kv.rik, Fra 9.80-12.30 Striper impr. Sl,Cp,Gn,Py Fra 11.60 - 11.90 hbl.førende. Fra 12.10 - 12.20 Po-rik.	50°	2,03	2,04	0,01			8,80-9,80
12.30 - 12.70	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. Fra 12.60- 12.70 impr. Sl,Cp,Py,Po.		0,53	0,34	2,30	15,5		9,80-12,30
12.70 - 15.00	2.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslede m/ kv.rike parti og 2 gl.gn.b.d. striper impr. Sl,Cp,Gn,Py,Po	50°	0,37	0,19	1,88	10,4		
15.00 - 20.00	5.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.vekslende m/cm- dm-brede pegm. og 2 gl.gn. alm.band. Parti m/spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py. Fra 15.50 - 15.55 spor Cp,Py,Po Fra 18.25-19.00 svak impr. hbl. Sl,Cp,Py	50°	0,50	0,26	1,60	18,8		15,00-16,00
				0,17	0,18	0,30			
				0,02	0,15	0,19			17,25-18,25
				0,24	0,12	0,41	6,4		18,25-19,00
				0,34	0,17	0,23	9,2		19,00-20,00
20.00 - 21.00	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. impr. Sl,Cp,Gn, Py.	50°	0,14	0,15	0,78	5,8		
21.00 - 21.60	0.60	" " Spor hbl. Spr.gr. 0.5-2 mm	50°	0,06	0,06	0,18	2,1		
21.60 - 22.00	0.40	" " Impr. Sl,Cp,Gn,Py	50°	0,37	0,22	3,00	10,4		
22.00 - 23.10	1.10	" " Spr. gr. 1-3 mm.	50°	0,03	0,07	0,12	1,6		
23.10 - 24.00	0.90	" " Svakt ondulerende. Impr. Sl,Cp Gn,Py	50°	0,58	0,21	2,30	17,9		

Lokalitet:

Borehull: 598

2.

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
24.00 - 25.70	1.70	2 gl.gn.b.d. Spor hbl. skarn, svak impr. <u>Sl, Cp, Gn</u> , god impr <u>Py</u>	50°	0.13	0.17	0.42			26/10-27/10
25.70 - 26.10	0.40	Biot.gn. Mørk, grovk-mlk. hbl.førende impr. <u>Cp, Py</u>	50°	0.02	0.14	0.08			
26.10 - 28.15	2.05	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. hbl-førende, spr. diffuse gr. 0,5-2 mm Impr. <u>Py</u>	50°	0.01	0.05	0.06			
28.15 - 28.85	0.70	2 gl.gn.b.d. Enkelte gr. 1-5 mm	50°						
28.85 - 30.20	1.35	" " Hbl.førende m/spr. gr. 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>	"						
30.20 - 32.60	2.40	Biot.hbl.gn. Mørk, mlk. vekslende, spr. gr. tildels rik 1-5 mm.	"						
32.60 - 36.95	4.35	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. vekslende m/dm-brede hbl.gn.band. Spr. gr. 1-3 mm. Fra 34.50-34.55 spor <u>Sl</u>	"						
36.95 - 37.40	0.45	Biot.gn. Mørk, mlk. hbl.førende, Spr. gr. 1-3 mm	"						
37.40 - 40.05	2.65	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. Spr. gr. 1-3 mm.	50°						
40.05 - 40.50	0.45	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk, spr. gr. 0,5-2 mm.	50°						
40.50 - 40.60	0.10	Biot.gn. Mørk, grovk-mlk. god impr. <u>Sl, Cp, Gn, Py</u>							
40.60 - 40.75	0.15	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. kv.rik, Spr. gr. 0,5-2 mm							

Lokalitet:

Borehull: 598

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
40.75 - 40.85	0.10	Biot.gn.(sk)	Mørk,grovk. spor anhydritt, god impr. <u>Cp, Sl, Py, Po</u>						
40.85 - 41.30	0.45	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk. spr. gr. 0,5-2 mm.	50°					
41.30 - 47.80	6.50	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm	50°					
47.80 - 48.80	1.00	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. Spr.gr. 1-3 mm	50°					
48.80 - 49.05	0.25	" "	Impr. <u>Sl, Py</u>						
49.05 - 50.45	1.40	" "	Tildels hbl.førende. Spr. gr. 0,5-3 mm. Impr. <u>Py</u>	50°					
50.45 - 58.00	7.55	Biot.hbl.gn.	Mørk,mlk-grovk. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>	50°					
58.00 - 62.65	4.65	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede hbl.gn.band. Spr.gr. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	50°					
62.65 - 62.80	0.30	Pegm.							
62.80 - 64.30	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk.Impr.Py	50°					
64.30 - 64.95	0.65	Biot.gn.	Mørk,mlk. spr. gr.1-3 mm	50°					
64.95 - 65.40	0.45	Pegm.							
65.40 - 65.70	0.30	Biot.gn.	Mørk,mlk.spr. gr. 0,5-2 mm						
65.70 - 68.65	2.95	Hbl.gn.	Mørk,mlk.gr.rik,0.5-3 mm	50°					
24/4 1979 H. Pantdalsli									

Lokalitet: *Profil 44.460*

Dato : Mars 1979

Ikke innmalt.

Koordinater :

Retning : N

Helling/stigning: - 76°

Høyde :

Lengde : 9,40 m

Borehull: 597

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ dm-brede biot.gn.band hbl.førende fortrinnsvis m/ striper impr. Sl,Cp,Gn,Py	80°	<i>0.73</i>	<i>0.24</i>	<i>2.22</i>			
1.20 - 4.20	3.00	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spor gr. 0.5-2 mm	80°	<i>0.04</i>	<i>0.16</i>	<i>0.06</i>			<i>1.20-2.20</i>
4.20 - 9.40	5.20	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm-brede band hbl.gn. Spredte gr. tildels rik 0,5-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	80°						

27/3 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: *Profil 44.410*

Dato

Mars 1979

Koordinater

X: 925.413.3 Y: 44.4102

Retning

N

Helling/stigning:

- 80

Høyde

- 87.4 m

Lengde

7,35 m

Borehull: 596

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.15	0.15	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. spor hbl. Impr. Sl, Cp, Py.		<i>0.16</i>	<i>0.28</i>	<i>2.07</i>			
0.15 - 0.30	0.15	TAP							
0.30 - 0.80	0.50	Biot.gn. Mørk, mlk.-grovk. vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl.gn. b.d. tildels kv.rik. Spor hbl. Stripet impr. Sl, Cp, Py	70°	<i>0.17</i>	<i>0.32</i>	<i>1.11</i>			
0.80 - 1.60	0.80	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. vekslende m/ dm-brede pegm.band. Spor hbl. stripet, impr. Sl, Cp Gn, Py.	60° 70°	<i>0.17</i>	<i>0.34</i>	<i>4.38</i>			
1.60 - 2.40	0.80	2 gl.gn.alm. Lys, mlk-fink. vekslende m/ cm-dm-brede pegm.band. Striper impr. Sl, Cp, Gn, Py	60° 70°	<i>0.05</i>	<i>0.17</i>	<i>1.28</i>			
2.40 - 3.80	1.40	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. vekslende m/ dm-brede 2 gl.gn.alm. band hbl.førende, striper impr. Sl, Cp, Gn, Py.	70°	<i>1.09</i>	<i>0.16</i>	<i>4.76</i>			
3.80 - 5.30	1.50	2 gl.gn.alm. Lys, mlk.-fink. spor gr. svak impr. Py.	70°	<i>2.05</i>	<i>0.03</i>	<i>0.32</i>			<i>380-4.80</i>
5.30 - 7.35	2.05	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. vekslende m/ cm-dm-brede band hbl. m/gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py.							

27/3 1979
Holger Pantdalsli

Lokalitet: *Profil 44410*

Borehull: 595

Dato: Mars 1979

Koordinater: *X: 925.413.9 Y: 44.408.2*

Retning: N

Helling/stigning: - 73°

Høyde: *- 87.2 m*

Lengde: 7.60 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.80	1.80	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. Hbl.før. Striper impr. <u>Sl, Cp, Py, Po</u>	60°	<i>0.33</i>	<i>0.51</i>	<i>7.24</i>			
1.80 - 5.80	4.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk. Fra 1.80-3.50 enkelte cm-brede biot.hbl. rike striper m/spor <u>Sl, Cp</u> <u>Gn, Py</u>	60°	<i>0.13</i>	<i>0.18</i>	<i>0.81</i>			<i>1.80-3.50</i>
				<i>0.01</i>	<i>0.02</i>	<i>0.05</i>			<i>3.50-5.80</i>
5.80 - 6.60	0.80	Biot.-hbl.gn. Mørk, mlk, gr.førende 0,5- 2 mm. Svak impr. Py	60°						
6.60 - 7.20	0.60	Pegm.							
7.20 - 7.60	0.40	Biot.gn. Mørk, mlk. spor hbl. og gr. 0.5-2 mm. Svak impr. Py.	60°						

27/3 1979
Holger Pantdalsli

Lokalitet: *Profil 44.060*

Borehull: 594

Dato : Mars 1979
 Koordinater : *X: 925.410,3 Y: 44.059,4*
 Retning : N
 Helling/stigning: - 53°
 Høyde : -60,5
 Lengde : 50.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.90	3.90	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. vekslende m/dm brede band 2 gl.gn.alm. Fra 1.30 - 2.40 striper Sl,Gn,Cp,Py m.hbl.	45°	0.03	0.11	0.02			0.00-1.30
				0.76	0.36	2.57			1.30-2.40
				0.07	0.10	0.36			2.40-3.90
3.90 - 4.35	0.45	Pegm.							
4.35 - 4.80	0.45	Musk gn. Lys,mlk-grovk. spor Sl, Impr. Py	45°	0.13	0.14	0.34			
4.80 - 5.70	0.90	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.-fink. veksl. m/hbl. førende band. Fortrinnsvis m/impr. Sl,Cp Gn,Py.	45°	0.42	0.64	1.98			
5.70 - 7.40	1.70	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/hbl. (skarn)førende parti fortrinnsvis m/striper og impr. Sl,Gn,Cp,Py	45°	3.00	0.45	9.60			
7.40 - 9.60	2.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ parti 2 gl.gn.bd. Enkelte spr. striper Sl,Gn Cp, impr. Py.	45°	0.27	0.09	0.30			
9.60 - 11.80	2.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende tildels hbl.førende. Striper impr. Sl,Gn,Cp,Py	45°	0.74	0.57	0.53			
11.80 - 14.00	2.20	Skarn Mørk,mlk. vekslende m/1-2 dm brede 2 gl.gn.alm. band. Striper, impr. Sl,Gn,Cp,Py	50°	0.52	0.66	2.71			
14.00 - 19.00	5.00	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ 1-2 dm brede 2 gl.gn.alm. band. Tildels spr. gr. 1-3 mm. Fra 14.00-15.00 Svak impr. Sl,Gn,Cp,Py	50°	0.24	0.24	3.84			14.00-15.00
				0.03	0.03	1.09			15.00-16.00

Lokalitet:

Borehull: 594

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
11.80 - 14.00	2.20	Skarn (Hbl.rik) mørk, mlk. vekslende m/1-2 dm brede 2 gl.gn.alm.band Striper, impr. <u>Sl, Gn, Cp, Py</u>	50°						
14.00 - 19.00	5.00	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. vekslende m/ 1-2 dm brede 2 gl.gn.alm. band. Tildels spr. gr. 1-3 mm. Fra 14.00-15.00 svak impr. <u>Sl, Gn, Cp, Py</u>	50°						
19.00 - 19.20	0.20	Pegm.							
19.20 - 20.80	1.60	Biot.gn. Mørk, grovk.-mlk. spor <u>Cp</u> impr. <u>Py</u> .	50°						
20.80 - 21.60	0.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk-fink. Spor gr. svak impr. <u>Py</u>	40°	0.04	0.03	0.09			
21.60 - 23.40	1.80	Biot.gn. Mørk, grovk.-mlk, vekslende m/1-2 dm brede 2 gl.gn.bd. band. impr. <u>Sl, Cp, Py</u> i biot.gn.	40°	0.03	0.36	1.44			
23.40 - 25.20	1.80	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk-grovk. veksl. m/dm.brede biot.gn.band fortrinnsvis m/impr. <u>Sl, Cp,</u> <u>Py</u>	40° 45°	0.01	0.04	0.07			
25.20 - 25.70	0.50	Biot.gn. Mørk, grovk. spor hbl. <u>Sl, Cp</u> <u>Py</u>	45°	0.01	0.27	0.40			
25.70 - 25.90	0.20	Pegm.							
25.90 - 28.30	2.40	Biot.gn. Mørk, grovk.-mlk. hbl.førende impr. <u>Sl, Cp, Py, Po</u>	45° 50°	0.14	0.34	1.84			
28.30 - 28.90	0.60	Pegm.							

Lokalitet:

Borehull: 594

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
28.90 - 29.50	0.60	Biot.gn. Mørk, grovk. spor hbl. Cp, Sl, Py	45°	0.02	0.22	0.86			
29.50 - 30.50	1.00	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. Spr. diffuse gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	45°	0.01	0.05	1.53			
30.50 - 31.80	1.30	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. tildels hbl førende. Impr. Sl, Cp, Gn, Py	45°	1.26	0.35	6.40			
31.80 - 36.00	4.20	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. veksl.m/hbl. førende parti. fortrinnsvis m/gr. 1-3 mm. Svak impr. Py	45° 50°	0.04	0.10	2.04			3/80 - 38,00
36.00 - 38.80	2.80	Hbl.gn. Mørk, mlk. gr.rik 1-5 mm.	50°						
38.80 - 50.00	11.20	Biot.hbl.gn. Mørk, mlk. vekslende m/1-3 dm-brede band 2 gl.gn.bd. Spr. gr. 1-3 mm.							

14/3 1979
Holger Pantdalsli

Lokalitet: *Profil 43.830*Dato : *Mars 79*Koordinater : *X: 925.977 Y: 43.830 (gj. innmålt)*

Retning : N

Helling/stigning: - 70°

Høyde : *-68,7*Lengde : *11.50 m*

Borehull: 593

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	TAP							
0.30 - 1.80	1.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor hbl. Impr. lys,Sl,Gn,Cp,Py	70°	<i>1.39</i>	<i>0.21</i>	<i>7.81</i>			
1.80 - 4.80	3.00	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spor hbl. vekslende biot.innhold. Impr. Sl,Gn,Cp,Py	70°	<i>0.56</i>	<i>0.24</i>	<i>3.97</i>			<i>1.80-3.00</i>
				<i>0.29</i>	<i>0.30</i>	<i>1.88</i>			<i>3.00-4.80</i>
4.80 - 5.20	0.40	TAP							
5.20 - 5.80	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. Impr. Sl,Gn,Cp,Py	70°	<i>0.67</i>	<i>0.53</i>	<i>3.65</i>			
5.80 - 7.00	1.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. Spor gr. svak impr. Py	75°	<i>0.21</i>	<i>0.09</i>	<i>0.80</i>			
7.00 - 7.60	0.60	TAP							
7.60 - 10.20	2.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.-fink. veksł. m/dm-brede biot.hbl. førende band. Impr. Sl,Gn Cp,Py	70°	<i>0.36</i>	<i>0.19</i>	<i>2.23</i>			
10.2½ - 10.40	0.20	TAP							
10.40 - 11.50	0.90	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor hbl. Impr. Sl,Gn,Cp,Py Fra 10.60 - 10.80 skarn (God malm).		<i>0.56</i>	<i>0.74</i>	<i>4.49</i>			
14/3 1979 Holger Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 44.060

Dato: Feb. 1979

Koordinater: X: 925.377,8 Y: 44.057.2

Retning: S

Helling/stigning: - 75°

Høyde: - 69,5 m

Lengde: 20.00 m

Borehull: 592

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.70	3.70	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. Spr. gr. 0.5 - 3 mm.	70°	0.03	0.03	0.06			2.20-3.70
3.70 - 4.70	1.00	2 gl.gn.alm. lys,mlk.svak impr. Py. fra 3.80-3.95 impr. Sl,Cp Gn,Py spor hbl.	70°	0.25	0.26	1.56			
4.70 - 7.00	2.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spor hbl. impr. Sl,Cp,Gn,Py	70°	0.53	0.27	3.14			
7.00 - 7.80	0.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.svak impr. Sl Cp,Gn,Py	70°	0.35	0.23	1.13			
7.80 - 10.60	2.80	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. hbl.førende impr. Sl,Cp,Gn,Py	70°	0.93	0.41	2.95			
10.60 - 12.60	2.00	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. hbl.førende spr.gr. 0.5-3 mm. Svak impr. Py.	60°	0.08	0.05	0.15			
12.60 - 14.00	1.40	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. hbl. og skarnførende. Impr. Sl, Cp,Gn,Py		1.20	1.09	3.76			
14.00 - 15.00	1.00	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. hbl.førende, spr. gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py.	60° 70°	0.05	0.09	0.11			
15.00 - 15.30	0.30	Pegm.							
15.30 - 17.00	1.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. Spr. gr. 0,5-3 mm. Fra 15.30 - 15.90. impr. Sl Cp,Gn,Py	60°	1.48	0.33	5.97			15.30-15.90
				0.08	0.04	0.30			
17.00 - 18.10	1.10	Hbl.gn. Mørk,mlk. spor gr.	60°						
18.10 - 20.00	1.90	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. hbl.førende gr.rik 0,5-3 mm.Svak impr. Py.	60°						

Lokalitet: *Profil 43.860*

Dato: Febr. 1979

Koordinater: *X: 925.390.8 Y: 43.866.5*

Borehull: 591

Retning: N

Helling/stigning: -70° Høyde: -63.7 m Lengde: 18.35 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.10	0.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>		<i>0.11</i>	<i>0.06</i>	<i>2.61</i>			
0.10 - 0.20	0.10	TAP							
0.20 - 3.60	3.40	Malm God malm, med litt hbl.biot.		<i>1.26</i>	<i>0.70</i>	<i>8.74</i>			
3.60 - 4.00	0.40	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.kv.rik (mot musk gn.) Svak impr. Py	40°	<i>0.38</i>	<i>0.30</i>	<i>2.40</i>			
4.00 - 4.60	0.60	TAP							
4.60 - 6.60	2.00	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spr.gr. 1-2 mm. (Fra 5.45-5.85 svake spor Sl,Gn,Cp)	40°	<i>0.64</i>	<i>0.12</i>	<i>0.60</i>			
6.60 - 7.40	0.80	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spor hbl. spor <u>Sl,Cp.</u>		<i>0.95</i>	<i>0.46</i>	<i>2.50</i>			
7.40 - 7.60	0.20	TAP							
7.60 - 7.80	0.20	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spor hbl. spor <u>Sl,Cp</u>	40°	<i>1.80</i>	<i>0.32</i>	<i>6.50</i>			
7.80 - 8.20	0.40	Pegm. <u>m/Py</u>							
8.20 - 9.20	1.00	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spor gr. 0.5 - 1.0 mm.	60°	<i>0.05</i>	<i>0.02</i>	<i>0.17</i>			
9.20 - 12.30	3.10	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spor gr. 1-2mm Spredte spor <u>Sl,Cp</u>	60°	<i>0.57</i>	<i>0.10</i>	<i>0.54</i>			
12.30 - 13.00	0.70	Biot.gn. Mørk,mlk. m/cm-tykke 2 gl. gn.band. Spor hbl. Spor <u>Sl, Cp, Py</u>	60°	<i>0.46</i>	<i>0.38</i>	<i>1.62</i>			
13.00 - 13.20	0.20	TAP							
13.20 - 14.30	1.10	Biot.gn. Mørk,mlk. spor <u>Sl,Cp,Py</u>	60°	<i>0.03</i>	<i>0.25</i>	<i>1.20</i>			
14.30 - 14.80	0.50	TAP							
14.80 - 15.20	0.40	Biot.sk. Mørk,mlk. <u>Sl,Cp,Py,Po.</u>	60°	<i>0.02</i>	<i>0.21</i>	<i>1.73</i>			
15.20 - 15.30	0.10	TAP							

Lokalitet:

Borehull: 591

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15.30 - 15.60	0.30	Biot.sk. Mørk, mlk. <u>Sl, Cp, Py, Po</u>	60°	0.01	0.63	3.58			
15.60 - 18.85	3.25	2 gl.gn.alm. Lys, mlk-fink. Fra 16.30 - 17.40 cm-tykke Biot, hbl, pegm. striper. Spor <u>Sl, Cp, Gn, Py</u>	60°	0.16	0.11	0.48			
6/3 1979 Stellan Burman									

Lokalitet: *Profil 43.860*

Borehull: 590

Dato : *Feb-79.*
Koordinater : *X: 925.386,8 Y: 43.864,8*
Retning : *N.*
Helling/stigning: *-70°*
Høyde : *-63,1*
Lengde : *11,70 m.*

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.90	3.90	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ 1-3 dm-brede biot.d. Hbl.førende band fortr.vis m/malm. Impr. Sl,Cp,Gn,Py	70°	0.50	0.24	3.30			0.0-2.00
				0.69	0.38	4.00			2.00-3.90
3.90 - 4.15	0.25	TAP							
4.15 - 5.75	1.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende stripet malm fra 4.15-5.20 m/spor hbl.	70°	0.46	0.29	3.40			4.15-5.20
				0.02	0.03	0.17			5.20-5.75
5.75 - 6.16	0.40	TAP							
6.15 - 6.40	0.25	Pegm.							
6.40 - 6.70	0.30	TAP							
6.70 - 9.00	2.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spor gr. svak impr. <u>Py</u>	70°						
9.00 - 9.20	0.20	TAP							
9.20 - 11.70	2.50	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ dm-bred pegm.band, spor gr. Svak impr. <u>Py</u> .	70°						

28/2 1979
H. Pantdalsli.

Lokalitet: Profil 44.060

Dato

Februar 1979

Koordinater

X: 925.399,1 Y: 44.054,7

Borehull: 589

Retning

Lodd

Helling/stigning:

- 90°

Høyde

- 61,7

Lengde

30.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.30	1.30	Malm Skarn, vekslende m/band 2 gl.gn.alm. ondulerende.		3,10	0,18	10,60			
1.30 - 2.30	1.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. vekslende m/biot. d. hbl.førende band. impr. Sl,Gn,Cp,Py	60° 70°	1,80	0,81	5,44			
2.30 - 9.80	7.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. fra 2.30- 4.00 spr. cm-dm-brede band m/impr. Sl,Gn,Cp,Py Fra 8.20 - 9.80 spr. cm-dm- brede band m/impr. Sl,Gn,Cp Py. Spor gr.	70° 80°	0,88 0,16 0,09 0,07 0,45	0,41 0,07 0,06 0,01 0,09	2,86 1,26 0,14 0,15 1,05			2,30-3,00 3,00-4,00 4,00-5,00 7,20-8,20 8,20-9,20
9.80 - 10.10	0.30	Malm Skarn, hbl.rik.		0,34 3,50	0,61 0,21	1,84 13,40			8,20-9,20
10.10 - 11.30	1.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. Ved 11.20 spor Sl.	70°	0,08	0,07	0,37			
11.30 - 15.20	3.90	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk.vekslende fra skarn til biot.sk. m/hbl. Impr. Sl,Cp,Po,Py. Tildels meget rik på magnetkis (Po) ondulerende.		0,93 0,45 0,43 0,13	0,69 1,82 0,62 1,45	3,19 4,51 5,94 2,07			11,30-12,30 12,30-13,30 13,30-14,30 14,30-15,20
15.20 - 16.20	1.00	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. impr. Py spor Sl.	70°	0,15	0,38	0,76			
16.20 - 19.20	3.00	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. vekslende m/parti skarn m/hbl. Impr. Sl,Cp,Po,Py. Ondulerende.		0,45 0,47 0,31	0,49 0,68 0,52	2,58 2,19 5,13			16,20-17,20 17,20-18,20 18,20-19,20
19.20 - 19.80	0.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. spor Sl. Impr. Py	70°	0,36	0,21	1,67			

Lokalitet:

Borehull: 589

2.

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19.80 - 20.30	0.50	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. impr. <u>Sl,Gn,</u> <u>Cp, Py</u>		0.78	0.53	4.62			
20.30 - 22.15	1.85	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ band 2 gl.gn.alm., spor hbl. spr.gr. 0,5-2 mm.	70°	0.04	0.05	1.33			2030-2130
22.15 - 22.70	0.55	Pegm.							
22.70 - 24.10	1.40	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/dm-brede hbl.gn.band. Svak impr. Py.	70°						
24.10 - 25.10	1.00	Biot.hbl.gn. Mørk,grovk.gr.rik 1-3 mm.	60°						
25.10 - 30.00	4.90	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ cm-dm-bred pegm. hbl.gn. band, tildels gr.rik 1-3 mm.	70°						
26/2 1979									
Holger Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 44.060

Dato : Feb. 1979

Koordinater : X: 925.409,5 Y: 44.059,2

Borehull: 588

1.

Retning : N

Helling/stigning: - 75

Høyde : - 60,6

Lengde : 38.60 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spor gr. Sl, Py	60°	0.05	0.09	0.18		3.10	
0.60 - 4.90	4.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/l-3 dm brede skarn band (god malm). hbl.førende. Impr. Sl,Cp,Gn,Py	40°	1.20	0.55	5.30		6.50	0.60-2.60
			60°	1.55	0.59	6.00		6.70	2.60-4.90
4.90 - 7.00	2.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. Fra 5.55-5.65 Sl,Gn,Cp. Fra 6.80-6.90 Sl,Gn,Cp. Spor gr. svak impr. Py.	50° 60°	0.99	0.08	1.20		1.70	
7.00 - 7.40	0.40	Pegm.							
7.40 - 9.20	1.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. rel. mass, Fra 8.05-8.10 og 9.05-9.15 Impr. Sl,Cp,Gn,Py. Spor gr.	50° 60°						
9.20 - 9.80	0.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink. spor gr.		0.02	0.03	0.06		1.60	
9.80 - 12.70	2.90	2 gl.gn.alm. Rel. lys,mlk-fink. veksl. m/l-2 dm bred skarnband. (god malm) hbl.førende. Impr. Sl,Gn,Cp,Py	50°	0.91	0.55	4.00		9.80	
			60°						
12.70 - 13.15	0.45	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. hbl.førende Impr. Sl,Cp,Po,Py		0.21	0.84	2.60		10.50	
13.15 - 13.55	0.40	Pegm. Spor Cp, Po, Py		0.02	0.12	0.27		3.40	
13.55 - 14.80	1.25	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. vekslende m/l-2 dm-brede skarnband. hbl.førende. Impr. Sl,Cp, Po, Py	50°	0.32	0.61	3.20		14.20	
14.80 - 15.40	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. Spor gr. Sl, Cp, Py	50°	0.17	0.26	0.70		3.80	

Lokalitet:

Borehull: 588

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15.40 - 19.00	3.60	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. vekslende m/dm-brede 2 gl.gn.b.d.band Spor hbl. svak impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Po</u> , <u>Py</u>	50°	0.01	0.32	0.47		7.00	15.40-19.00
				0.00	0.11	0.18			19.00-19.00
19.00 - 20.90	1.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. spr.gr. 0,5-2mm	50°	0.00	0.03	0.03		2.00	
20.90 - 21.30	0.40	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. m/spor hbl. Impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Py</u> .	50°	0.01	0.33	1.60		9.50	
21.30 - 21.70	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. spr. gr. 0,5-2 mm. Svak impr. <u>Py</u>	60°	0.00	0.12	0.25		4.80	
21.70 - 22.95	1.25	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. vekslende m/1-2 dm-brede pegm. og 2 gl.gn.b.d. band. Impr. <u>Sl</u> <u>Cp</u> , <u>Py</u> , <u>Hbl</u> . fortrinnsvis i biot.gn.	50°	0.00	0.22	0.41		7.40	
			60°						
22.95 - 25.00	2.05	Skarn Rel.lys, mlk. vekslende m/cm-dm-brede band. 2 gl.gn.alm. kv.rik. Impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Po</u> , <u>Py</u>		0.61	0.37	2.30		4.00	
25.00 - 27.70	2.70	Biot.gn. Mørk, mlk. vekslende m/dm-brede 2 gl.gn.b.d. band. Tildels hbl. og skarn førende Spr. gr. 0,5-2 mm. Svak impr. <u>Py</u> .	50°	0.00	0.03	0.04		4.20	25.00-26.00
			70°						
27.70 - 30.70	3.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. vekslende m/dm-brede band hbl.gn. Spr. gr. 0,5-1mm.	70° 80°						

Lokalitet:

Borehull: 588

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
30.70 - 32.40	1.70	Biot-hbl.gn. Mørk, mlk. spr. gr. 0,5-3 mm Svak impr. Py.	60° 70°						
32.40 - 33.70	1.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. vekslende m/dm.brede band biot.hbl.gn. Spr. gr. 0,5-3 mm.	70°						
33.70 - 38.60	4.90	Biot.hbl.gn. Mørk, mlk. tildels gr.rik 0,5-3 mm.	70°						
23/2 1979 H. Pantdalsli.									

Lokalitet: *Profil 43860*

Dato : Jan. -79

Koordinater : *X: 925.400,8 Y: 43.863,1*

Retning : N

Helling/stigning: - 70°

Høyde : *- 62,2*Lengde : *13,70 m*

Borehull: 587

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.45	0.45	2 gl.gn.alm. lys,mlk. spor <u>Py</u>	60°						
0.45 - 0.60	0.15	TAP							
0.60 - 12.70	12.10	2 gl.gn.alm. lys,mlk. sprett dm.brede bd-partier m/enstaka gr. 1-3 mm. Ved 7.60 - 7.65 <u>Sl</u> 8.40-8.60 <u>Sl</u> . Spor <u>Sl</u> ved 10.20. 10.70-11.00 <u>svak</u> impr. <u>Py</u> .	60°						
12.90 - 13.70	1.00	Biot.gn. Mørk, mlk-grov. m/gr. 1-4 mm.	60°						

28/2 1979
Stellan Burman

Lokalitet: 44.460

Borehull: 586

Dato : Jan -79

Koordinater : X: 925.406,6 Y: 44 463,5

Retning : S

Helling/stigning: - 45°

Høyde : - 91,1

Lengde : 28,15 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	Pegm. cm-tykke biot.hbl.band							
0.40 - 1.00	0.60	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk. Imp. <u>Py</u>	60°						
1.00 - 1.40	0.40	Biot.gn. mørk,mlk-grovk. hbl.førende ved 1.30 spor <u>Sl</u> , <u>Cp</u> Imp. <u>Py</u>	60°						
1.40 - 1.90	0.50	2 gl.gn.alm. lys,mlk.enkelte korn <u>Sl</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u> .	60°						
1.90 - 2.95	0.35	Pegm. Enkelte korn <u>Gn</u> .							
2.25 - 4.10	1.85	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. litt veksl. biot.innhold. spor gr.1-2mm ved 2,30 2,80 2,90 3.00 finnes mm-tynne <u>Sl</u> -striper	60°						
4.10 - 5.80	1.70	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk-grovk.vekslende biot. og hbl.rike partier. Spredt gr. 1-3 mm. fortrinnsvis hbl.	60°						
5.80 - 7.70	1.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels spor hbl. spr. gr. 1-3 mm. svak impr. <u>Py</u> .	50° 60°						
7.70 - 9.60	1.90	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk-grovk. enkelte dm-brede pegm.band. spr. gr. 1-2 mm. ved 7.95-8.05 spor <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , Ved 9.50-9.55 <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , impr. <u>Py</u> .	50°						
9.60 - 11.30	1.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. vekslende enkelte dm-tykke 2 gl.gn.bd-band. spor gr. 1-2 mm. Svak impr. <u>Py</u> .	55°						
11.30 - 11.90	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel. lys,mlk. spor gr. 1-2mm <u>Py</u>	55°						

Lokalitet:

Borehull: 586

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
11.90 - 13.20	1.30	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk-grov. Spr. gr. 1-4 mm. Impr. <u>Py</u> .	50°						
13.20 - 13.45	0.25	Pegm.							
13.45 - 18.50	5.05	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm Imp. <u>Py</u> .	50°						
18.50 - 21.80	3.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende med dm.brede hbl.pegm. band. Spredte gr. 1-3 mm. gr.rikere i hbl.bandene impr. <u>Py</u>	50°						
21.80 - 25.00	3.20	Hbl.gn. Mørk,mlk. enkelte dm- tykke pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. svak impr. <u>Py</u> .	50°						
25.00 - 25.40	0.40	Pegm.							
25.40 - 25.95	0.55	Biot.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm Impr. <u>Py</u>	50°						
25.95 - 28.15	2.20	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. vekslende med cm/dm-tykke enkelte Biot. gn. og Pegm.band. Spredte gr. 1 Biot.gn.band	50°						

6/1 1979
Stellan Burman

Lokalitet: *Profil 44.460*

Borehull: 585

Dato Jan. 1979

Koordinater : X: *925.407,6* Y: *44.462,9*

Retning : S

Helling/stigning: + 70° S

Høyde : *- 87,7*

Lengde : *18,15 m.*

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.05	1.05	Hbl.gn. Mørk, mlk. 0,5 - 1.05 gr. førende tildels rik 1-3 mm Svak impr. <u>Py.</u>	70°						
1.05 - 8.00	6.95	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. tildels hbl. førende, spr.gr. 0,5-2 mm Svak impr. <u>Py.</u>	70° 90°						
8.00 - 18.15	10.15	Hbl.gn. Mørk, mlk. enkelte cm-brede pegm. og amf.band. Spr. gr. 0,5 - 3 mm. svak impr. <u>Py.</u>	70° 90°						
6.2. 1979 H. Pantdalsli									

Lokalitet: *Profil 44.460*Dato: *Jan-79*Koordinater: *X: 925.428,5 Y: 44.456,5*Retning: *S*Helling/stigning: *+70°*Høyde: *-88,1*Lengde: *30,0 m.*

Borehull: 584

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	Biot.gn. Mørk, grovk. impr. <u>Sl, Cp, Py</u>		<i>0.09</i>	<i>0.48</i>	<i>1.88</i>			
0.50 - 1.30	0.80	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. spor gr. Impr. <u>Py</u> .	55°	<i>0.06</i>	<i>0.21</i>	<i>0.08</i>			
1.30 - 2.65	1.35	Hbl.gn. Rel.mørk, mlk. spr. gr. 0,5 - 2 mm. impr. <u>Py</u>	60°	<i>0.01</i>	<i>0.02</i>	<i>0.02</i>			
2.65 - 3.20	0.55	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. vekslende m/pegm.band. spor gr. impr. <u>Py</u>	60°	<i>0.08</i>	<i>0.21</i>	<i>0.30</i>			
3.20 - 4.05	0.85	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. spor hbl. bandet m/rel. rike striper og impr. <u>Sl, Cp, Py</u> .	60°	<i>1.34</i>	<i>0.23</i>	<i>4.33</i>			
4.05 - 5.40	1.35	Biot.gn. Mørk, grovk.-mlk. vekslende tildels sk. impr. <u>Sl, Cp, Py, Po</u> fortrinnsvis i biot.rike parti.	60°	<i>0.14</i>	<i>0.34</i>	<i>1.67</i>			
5.40 - 6.60	1.20	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. vekslende m/dm-brede band 2 gl.gn.alm. impr. <u>Sl, Cp, Py, Po</u>	50° 60°	<i>0.03</i>	<i>0.19</i>	<i>0.24</i>			
6.60 - 6.95	0.35	Hbl.gn. Mørk, mlk. impr. <u>Py</u>		<i>0.00</i>	<i>0.04</i>	<i>0.09</i>			
6.95 - 7.80	0.85	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. Fra 7.20-7.40 2 gl.gn.alm. Spor gr. hbl. <u>Sl, Py</u>	70°	<i>0.15</i>	<i>0.13</i>	<i>0.52</i>			
7.80 - 8.40	0.60	2 gl.gn.alm. Lys, mlk-fink. rel. mass.		<i>0.02</i>	<i>0.10</i>	<i>0.06</i>			
8.40 - 9.55	1.15	Biot.gn. Mørk, grovk.-mlk. spor gr. impr. <u>Sl, Cp, Py</u>	70°	<i>0.19</i>	<i>0.20</i>	<i>3.20</i>			
9.55 - 10.35	0.80	Pegm?		<i>0.02</i>	<i>0.02</i>	<i>0.17</i>			

Lokalitet:

Borehull: 584

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
10.35 - 12.40	2.05	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. spor gr. vekslende m/dm-brede pegm. band. impr. Py.	70°	0.00	0.04	0.04			
12.40 - 14.25	1.85	Hbl.biot.gn. Mørk, mlk.spr.gr. 0.5-3 mm. impr. Py	70°	0.00	0.04	0.07			
14.25 - 15.10	0.85	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. vekslende m/band 2 gl.gn.alm. Spor hbl. impr. Sl, Cp, Py	70°	1.10	0.22	4.12			
15.10 - 16.50	1.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. spor hbl. gr. impr. Py.	70°	0.09	0.04	0.25			
16.40 - 30.00	13.60	Hbl.gn. Mørk, mlk. vekslende m/amf. band. spr. gr. tildels rik 1-3 mm. impr. Py.	70°						

31/1 1979
H. Pantdalsli

Lokalitet: *Profil 44.460*

Dato

7 jan - 79

Koordinater

Retning

S

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 583

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. rel. mass.						
2.00 - 4.35	2.35	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spr.gr. 0.5-4 mm.	70°					
4.35 - 5.00	0.65	2 gl.gn.alm.	Rel.lys, mlk.						
5.00 - 8.20	3.20	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. Spor gr. 0.5-3 mm.	70°					
8.20 - 10.20	2.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. enkelte pegm.band. spor gr.	70°					
10.20 - 11.00	0.80	2 gl.gn.alm.	rel.lys,mlk. enkelte pegm. band. spor gr.	70°					
11.00 - 13.50	2.50	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. gr. impr. <u>Py.</u>	70°					
13.50 - 18.60	5.10	Hbl.gn.	Mørk,mlk. enkelte pegm. band. spr. gr. 1-3 mm.	70°					
18.60 - 20.70	2.10	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spor gr. 0,5 - 3 mm.	70°					
20.70 - 27.30	6.60	Hbl.gn.	Mørk,mlk. vekslende m/ band 2 gl.gn.alm. og pegm. tildels amf. spr.gr. 1-3mm	70°					
31/1 1979 H. Pantdalsli									

Lokalitet: *Profil 43860*

Dato: Jan. 79
 Koordinater: *X: 925.464.8 Y: 43.863.3*
 Retning: N
 Helling/stigning: - 70°
 Høyde: - 62.6 m
 Lengde: 32.80 m

Borehull: 582

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.45	0.45	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enkelte gr. 1-2 mm	75°						
0.45 - 0.90	0.45	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spr. gr. 0,5-2 mm	75°						
0.90 - 1.35	0.45	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.enkelte gr. 1-2 mm.	70°						
1.35 - 1.50	0.15	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spr. gr. 0,5-2 mm	70°						
1.50 - 1.95	0.45	Biot.gn. Mørk,mlk. gr.rik. 1-3 mm.	70°						
1.95 - 2.30	0.35	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. tildels gr. rik 1-3 mm.	70°						
2.30 - 4.10	1.80	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik. spor gr. 0,5-1.0 mm	70° 60°						
4.10 - 5.60	1.50	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. vekslende m/dm.brede 2 gl.gn.alm.band Spr. gr. 1-3 mm.	60°						
5.60 - 6.00	0.40	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik. spor gr. 0.5 - 1.0 mm.	60°						
6.00 - 6.20	0.20	TAP							
6.20 - 7.50	1.30	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik. spor Sl	60°	0.08	0.14	0.28			
7.50 - 8.10	0.60	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. impr. Sl, Cp, Gn, Py, Po	65°	0.27	0.30	0.61			
8.10 - 8.60	0.50	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. Hbl.-førende impr. Sl,Cp,Gn,Py	65°	0.99	1.70	6.50			
8.60 - 10.00	1.40	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk-grov litt veksl. med enkelte cm-dm-tykke biot.band. Impr. 8.60-9.70 Sl,Cp,Gn	65°	1.98	0.24	1.20			8.60-9.70
				0.01	0.02	0.05			9.70-10.00

Lokalitet:

Borehull: 582

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
10.00 - 11.25	1.25	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. rel.kv.rik. Spor gr. 0,5-1 mm.	65°	0.06	0.06	0.15			
11.25 - 12.25	1.00	TAP							
12.25 - 13.00	0.75	2 gl.gn.alm. Se foregående	65°						
13.00 - 13.65	0.65	TAP							
13.65 - 14.00	0.35	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. spor gr. 0,5 - 1.0 mm. Svak impr.Py	65°	0.00	0.01	0.05			
14.00 - 14.45	0.45	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. <u>Py</u> , <u>Po?</u> Spor <u>Sl</u> , <u>Gn</u> , <u>Cp</u>	65°	0.00	0.05	0.13			
14.45 - 15.10	1.65	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk,tildels grovk. svak impr. Py	65°	0.00	0.03	0.05			
15.10 - 15.35	0.25	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. <u>Py</u>	60°	0.00	0.05	0.13			
15.35 - 16.10	0.75	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. tildels kv.rik spor gr. 1-2 mm. svak impr. Py	60°	0.00	0.01	0.04			
16.10 - 16.60	0.50	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Py</u>	60°	0.00	0.18	0.26			
16.60 - 18.50	1.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. tildels kv.rik. Fra 17.40 - 17.50 Biot.gn. m/ <u>Sl</u> , <u>Cp</u>	60° 65°	0.00	0.01	0.05			16.60-17.40
18.50 - 19.85	1.35	TAP		0.00	0.02	0.35			17.40-18.50
19.85 - 23.45	3.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. rel.kv.rik.spor gr. 1-2 mm.	60° 65°						
23.45 - 23.70	0.35	TAP							
23.70 - 24.70	1.00	Musk.gn. Lys,mlk. ondulerende spor <u>Sl</u> , <u>Gn</u> , <u>Cp</u> , <u>Py</u>	60°	0.21	0.07	0.36			
24.70 - 26.10	1.40	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. vekslende m/cm- dm-brede biot.bd.hbl.førende band m/god malm <u>Sl</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u> , <u>Cp</u>	60° 65°	1.72	0.34	6.80			

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 582

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
26.10 - 26.70	0.60	2 gl.gn.bd.	Rel. lys, mlk. spor gr. 1-2 mm.						
26.70 - 28.30	1.60	Breccia	Rel. lys, mlk-grov, vekslende m/hbl.gn. skarn 2 gl.gn.kv pegm. stykker hopkittet av fink. lys ubestemmbart materiale (små druserum med apophyllit) spor gr. 1-2 mm	0.03	0.02	0.09			26.10-27.10
28.30 - 29.50	1.20	Hbl.gn.	Mørk, mlk. vekslende m/dm- tykke 2 gl.gn.band. gr. førende fortrinnsvis i de hbl. førende band 1-3 mm						
29.50 - 31.60	2.10	Breccia	Se ovenstående						
31.60 - 32.80	1.20	Biot.hbl.gn.	Mørk, mlk-grov. Impr. <u>Py</u>						

28/2 1979

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.350

Dato : Okt., Nov. 1978

Koordinater :

Borehull: 581

Retning : Ø

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk.impr. <u>Py</u>						
0.90 - 3.05	2.15	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk-grovk.m/impr. <u>Py</u> . Halve kjernen onduler- ende med filmtynne biot.- skikt samt "øgon" av fink. kv.pegm. imp. <u>Sl,Cp,Py</u>	5 ⁰ -0 0-5 ⁰					
3.05 - 3.90	0.85	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk.spor hbl. gr- førende tild. gr.rik. 1-4 mm. svak imp. <u>Py</u>	5-10 ⁰					
3.90 - 6.05	2.15	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. sprette små gr. 0,5-1 mm	10-5 5-0-5 ⁰					
6.05 - 6.95	0.90	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.hbl.jevnt fordelt som spor.tildels hbl.førende imp <u>Py</u> spor gr.	5 ⁰					
6.95 - 20.50	13.55	2 gl.gn.bd. hbl.gn.	Rel. mørk,mlk. impr. <u>Py</u> Spr. gr. 0,5-1,0 mm.	0-5 ⁰					
20.50 - 20.95	0.45	Hbl.gn.	Mørk,mlk.spr. gr. tildels gr.førende 1-2 mm.	5-30 ⁰ 30-0 ⁰					
20.95 - 23.50	2.55	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. impr. <u>Py</u> . Spredt gr. 1-2 mm.	0-5 ⁰					
23.50 - 23.90	0.40	Hbl.gn.	" "	20 ⁰ 30 ⁰					
23.90 - 45.50	21.60	Hbl.gn.	" " (Små partier med 2 gl.gn.bd. hbl.førende).	0-10 ⁰					
45.50 - 56.95	1.45	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk.hbl.førende Spr. gr. 1-2 mm. Imp. <u>Py</u> .	0					
46.95 - 51.95	5.00	TAP	(Avviksboret)						

Lokalitet:

Borehull: 581

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
51.95 - 54.80	2.85	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. hbl.førende Spr. diffuse gr. 1-3 mm, Imp. <u>Py</u> .	0-5 ⁰						
54.80 - 59.00	5.20	" Rel.mørk,mlk,spor gr.0,5-3mm Svak impr. <u>Py</u>	5-0 ⁰						
59.00 - 60.00	1.00	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk.gr.rik 0,5-3mm Svak impr. <u>Py</u> .	0-5 ⁰						
60.00 - 60.80	0.80	" Rel.mørk,mlk. spor gr. Imp. <u>Py</u>	10 ⁰						
60.80 - 61.70	0.90	Pegm.							
61.70 - 62.50	0.80	Musk.gn. Lys,mlk.-grovk. svakt ondu- lerende. spor <u>Cp</u> , Impr. <u>Py</u>	10 ⁰ -0						
62.50 - 64.00	1.50	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. tildels kv.rik Spor gr. impr. <u>Py</u>	0-5 ⁰						
64.00 - 66.00	2.00	Pegm. M/innslag av 2 gl.gn.bd. Hbl.førende,impr. <u>Py</u>	5 ⁰ -0 0-10 ⁰						
66.00 - 67.00	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. impr. <u>Py</u>	10 ⁰ -0						
67.00 - 73.70	6.70	TAP Avviksboring							
73.70 - 74.00	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. impr. <u>Py</u> pegm.ca. halve kj.	0-5 ⁰						
74.00 - 76.80	2.80	TAP Avviksb.							
76.80 - 80.00	3.20	Hbl.gn. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ bd.gn. og pegm. Spr.gr. 1-2 mm. impr. <u>Py</u>	5 ⁰ -0 0-10 ⁰						
80.00 - 80.75	0.75	TAP Avviksb.							
80.75 - 81.00	0.25	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. hbl.førende impr. <u>Py</u>	10 ⁰ -5						

Lokalitet:

Borehull: 581

3.

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
81.00 - 83.30	2.30	TAP	Avviksboret						
83.30 - 85.80	2.50	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. spr. gr. 0,5-3 mm Impr. <u>Py</u>	5 ⁰					
85.80 - 89.60	3.80	TAP	Avviksboret						
89.60 - 95.00	5.40	Hbl.gn.	Mørk,mlk. spr.gr. 1-3 mm Svak impr. <u>Py</u>	5-0 ⁰					
95.00 - 95.50	0.50	Pegm.							
95.50 - 100.50	5.00	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. hbl.førende tildels m/parti hbl.gn. spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	5 ⁰ -0					
100.50 - 112.50	12.00	"	Rel.mørk,mlk. spor hbl. spr. gr. 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>	0-5 ⁰					
112.50 - 131.30	18.80	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. vekslende med parti b.d. gn. og pegm. gr.førende. tildels rik 1-5mm	5 ⁰ -0					
131.30 - 133.00	1.70	"	" (tildels skarn og kv.rik)	0-25 ⁰					
133.00 - 135.10	2.10	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. spor hbl. Spr. gr. 1-10 mm.	25 ⁰					
135.10 - 139.05	3.95	Hbl.gn.	Mørk,mlk.gr.førende.Tildels rik 0,5-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	20 ⁰ -30 ⁰					
139.05 - 146.00	6.95	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk.vekslende m/små parti hbl.gn. spor gr. svak impr. <u>Py</u>	30 ⁰ -20 ⁰					
146.00 - 155.70	9.70	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. tildels mass. gr. førende 0,5-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	20 ⁰ 25 ⁰					

Lokalitet:

Borehull: 581

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

4.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
155.70 - 160.00	4.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. hbl. gr.førende 0,5 - 3 mm. Impr. <u>Py</u>	25 ⁰ 30 ⁰						
160.00 - 162.40	2.40	Hbl.gn. Rel.mørk,mlk.tildels mass. svak impr. <u>Py</u>	30 ⁰ 25 ⁰						
162.40 - 172.30	9.90	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/hbl. førende parti. Spor gr. Impr. <u>Py</u>	25 ⁰ 20 ⁰						
172.30 - 175.00	2.70	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. spor hbl. gr. svak impr. <u>Py</u>	20 ⁰ 15 ⁰						
175.00 - 176.50	1.50	Hbl.gn. Rel.mørk,mlk. gr.rik 1-3 mm, mass.	15 ⁰ 20 ⁰						
176.50 - 178.90	2.40	" Rel.mørk,mlk-grovk. tildels gr.førende, små parti m/biot. gn. svak impr. <u>Py</u>	20 ⁰						
178.90 - 180.00	1.10	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. tildels gr.- førende 1-3 mm. vekslende m/ små parti hbl.gn. svak impr. <u>Py</u>	20 ⁰						
180.00 - 182.30	2.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-vekslende m/hbl. band og pegm. Spr. gr. 1-3 mm Svak impr. <u>Py</u>	20 ⁰ 15 ⁰						
182.30 - 183.30	1.00	" Lys,mlk.vekslende m/mørke biot.rike band. spor gr.	15 ⁰						
183.30 - 200.00	16.70	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. spor hbl.og gr. enkelte hbl.rikere parti. svak impr. <u>Py</u>	15 ⁰						
23/11 1978 H. Pantdalsli									

Lokalitet: Mofjellet Gruber

Dato : juni

Koordinater : 925.409,6 X, 44.173,3 Y

Retning : vest

Borehull: 580 profil 44.180

~~Helling~~/stigning: + 70°

Høyde : - 66,2 m

Lengde : 23.85

Side 1

Dybde	L	Bergart	S°	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	musk.gn. py-impr.	30	0.01	0.10	0.13		4.40	
0.20 - 0.40	0.20	pegm.							
0.40 - 2.00	1.60	2-gl.gn. gl.-rik. py-impr.	60						
2.00 - 2.10	0.10	god malm	60	0.85	0.17	2.13		4.07	
2.10 - 2.55	0.45	m. spredte malmimpr. 2-gl.gn. gl.-rik	55						
2.55 - 4.35	1.80	gr.hbl.biot.gn. D. Py-impr. Sprekk 20°, strøk parallell med S. Vinkel med S = 60°	55						
4.35 - 4.40	0.05	musk.gn.	55	0.04	0.11	0.15		5.93	
4.40 - 4.85	0.45	meget god malm grågrønn skarn + karb.	60-70						
4.85 - 6.10	1.25	middels-god stripet malm 2-gl.gn.bp, D + grågrønn karb.skarn (rikest malm).	60-70						
6.10 - 7.80	1.70	ditto	60-80	2.12	0.41	5.39		7.25	
7.80 - 8.90	1.10	ditto, hbl. i skarn	45	0.94	0.61	3.53		5.71	
8.90 - 9.00	0.10	meget god malm	55						
9.00 - 9.50	0.50	malmstr. i 2-gl.gn. med skarn	55						
9.50 - 14.35	4.85	gr.hbl.biot.gn. D.Py-impr. Foldet tildels liten hbl.	55-75						
14.35 - 14.70	0.35	gr.amf.	65						

Lokalitet: (Hjortebakke)

Dato : 22.10.78
 Koordinater : 59° 40' N 15° 15' E
 Retning : vest
 Helling/stigning : -
 Høyde : 150 m
 Lengde : 100 m

Borehull:

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
14.70 - 16.00	1.30	gr.hbl.biot.gn D. Py-impr.	65						
16.00 - 19.00	3.00	gr.amf.	65						
19.00 - 23.85	4.85	gr.hbl.biot.gn. D. Py-impr. Foldet	45-75						
10.7. 78 A. Kruse									

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER

Borehull: 579 profil 44.180

Side 1

Dato : juni 1978
 Koordinater : 44.184,3 Y, 925.432,6 X
 Retning : nord
 Helling/stigning : - 60°
 Høyde : - 69,9 m
 Lengde : 40.35 m

Dybde	L	Bergart	S ^o	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2-gl.gn. med gr.	30	0.03	0.08	0.28		4.55	
0.50 - 0.70	0.20	biot.gn. biot.rik, sv. py-impr.							
0.70 - 0.85	0.15	kvarts							
0.85 - 1.10	0.25	biot.gn.		0.09	0.22	1.41		11.48	
1.10 - 2.50	1.40	malmstr. sl,po,ccp,py biot.hbl.gn. mørk,delvis skiferaktig kv.-feltspatøyer(durchbewegt)	50-40						
2.50 - 2.75	0.25	2 gl.gn.b.d. noe gr.	40-50						
2.75 - 3.45	0.70	malmstr. og impr. biot.gn.+biot.hbl.gn. Skiferaktig	50	0.03	0.11	0.71		8.75	
3.45 - 3.60	0.15	kvarts							
3.60 - 4.50	0.90	2-gl.gn.,bp med gr.	60-70						
4.50 - 5.00	0.50	biot.gn. kv.feltsp. øyer Noe py, po, ccp	55-70	0.17	0.12	0.50		4.89	
5.00 - 7.50	2.50	2-gl.gn. med gr. fold på 6,00-6.40, Si	70 65						
7.50 - 7.80	0.30	kvarts							
7.80 - 9.80	2.00	Spredte malmstr. og impr. i starten lyse biot.gn. noe hbl. sl.	50-60	1.30	0.16	3.83		2.61	
9.80 - 10.00	0.20	2-gl.gn.							
10.00 - 11.20	1.20	stripet malm grågrønn skarn + pegm.							

Lokallitet:

Dato:

Koordinat:

Retning:

Helling/stigning:

Høyde:

Lengde:

Borehull:

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
11.20 - 11.30	0.10	2-gl.gn., b.p.	45						
11.30 - 11.45	0.15	pegm.							
11.45 - 14.35	2.90	2-gl.gn. b.p. noe gr.	30-60						
14.35 - 15.55	1.20	malmstr. biot.gn. med hbl.	30-50	0.07	0.17	0.91		5.68	
15.55 - 16.00	0.45	2-gl.gn. bd.	50						
16.00 - 17.50	1.50	stripet malm, middels-god. noe po hbl. biot.gn. med grågrønn skarn	45-70	0.15	0.41	3.98		8.30	
17.50 - 18.00	0.50	malmimpr. amf. rel. mye po. tett mørkegrønn. Noe biot.	50-60	0.03	0.48	1.11		11.82	
18.00 - 18.20	0.20	hbl. biot.gn. Py-impr.	60						
18.20 - 18.65	0.45	2-gl.gn. bd Noe båndet	60						
18.65 - 18.70	0.05	malmstr. + impr. hbl. biot.gn.	40-70						
18.70 - 19.35	0.65	2-gl.gn.	60						
19.35 - 19.90	0.55	gr. hbl. biot.gn.	60						
19.90 - 20.50	0.60	2-gl.gn. Noe gr. Noe foldet	60						
20.50 - 21.30	0.80	gr. hbl. biot.gn. foldet	0-60						
21.30 - 22.05	0.75	gr. amf. Noe gullig sk. Foldet	0.70						
22.05 - 23.20	1.15	2-gl.gn. bp. med gr. På 22.40 m 2 x 1 mm sl.	60	0.10	0.05	0.38		1.98	
23.20 - 24.00	0.80	biot.gn. Noe gr. po-py-impr. spor cep.	60-25	0.05	0.10	0.53		6.59	

Lokalitet:

Dato:

Koordinat:

Retning:

Helling/stigning:

Hoyde:

Lengde:

Borehull:

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
24.00 - 24.80	0.80	gr.hbl.biot.gn. Py-impr.	25	0.03	0.06	0.08		6.15	
24.80 - 25.40	0.60	biot.musk.gn.,md (D) Py-impr. Foldeomb.	25-0	0.14	0.05	0.25		4.18	
25.40 - 26.30	1.10	sv.malmimpr. musk.biot.gn.bp. (D) Overveiende	0-50 40	0.60	0.16	2.56		5.27	
26.50 - 29.20	2.70	gr.hbl.biot.gn. Noe py-impr. 26.50 : 27.50 28.70 29.20	40 10 0 45						
29.20 - 29.70	0.50	gr.amf.	70						
29.70 - 31.60	1.90	gr.hbl.biot.gn. Rel.lys,gr.rik	75						
31.60 - 32.10	0.50	gr.amf. rik på små gr.	75						
32.10 - 32.35	0.25	kvarts							
32.35 - 32.80	0.45	gr.amf.							
32.80 - 33.15	0.35	gr.hbl.biot.gn. rel.lys, gr.rik	80						
33.15 - 34.20	1.05	2-gl.gn. bd. gr.rik	80-90						
34.20 - 35.20	1.00	gr.hbl.biot.gn.							
35.20 - 36.90	1.70	2-gl.gn. gr.rik,amf.type.Noefoldet.	70-80						
36.90 - 37.40	0.50	gr.amf. stict. med store gr.	70						
37.40 - 40.35	2.95	gr.amf. mlk. og gr.rik	70						
10.7. 78 A. Kruse									

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER

Borehull: 578

Profil 44.180

side 1

Dato : juni 1978

Koordinate : 925.432,6 X, 44.184.4 Y

Retning : nord

Helling/stigning: + 50°

Høyde : - 65.8 m

Lengde : 48.40 m

Dybde	L	Bergart	S ^o	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	musk.gn.	55°	0.27	0.21	0.70		6.05	
0.40 - 2.25	1.85	2-gl.gn. Noe gr.	45						
2.25 - 3.00	0.75	sv.malmimpr. I starten honningblende 2-gl.gn.							
3.00 - 4.75	1.75	m.sv. og spredt malmimpr. musk.gn. D, grovskjellet, med biot.	45						
4.75 - 4.85	0.10	middels malm musk-gn.	40						
4.85 - 5.70	0.85	2-gl.gn. rel. gl.rik, middelsk. Noe gr. og noe py-impr.	30-20	0.49	0.30	1.66		6.87	
5.70 - 8.00	2.30	2-gl.gn.bp-bd. Med gr. D.	20						
8.00 - 9.50	1.50	gr.hbl, biot.gn. Steilt foldet	0						
9.50 - 11.60	2.10	2-gl.gn.	20-40						
11.60 - 12.00	0.40	2 gl.gn.bp-bd. Med gr.	40						
12.00 - 13.00	1.00	hbl.biot.gn. grågrønn skarn, noe gr.	40-60	0.07	0.06	0.19		4.58	
13.00 - 13.35	0.35	2-gl.gn.	40						
13.35 - 14.30	0.95	malmstr. og impr. 2-gl.gn. Noe anhydritt og grågrønn skarn.	40						
14.30 - 14.95	0.65	2 gl.gn. Spredt noe gr.	40						
14.95 - 17.05	2.10	sv. malmimpr. ml-grovk.skjellet, med musk.gn. biot (D)	40						
17.05 - 17.80	0.75	biot.gn. D	30-5	0.05	0.21	0.37		11.78	

Lokalitet

Dato

Koordinat

Retning

Helling/stigning

Hoyde

Lengde

Borehull

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
17.80 - 19.50	1.70	spredte malmstr. og impr. 2-gl.gn. Noe grågrønn sk. på 18.50	40	0.25	0.16	0.91		4.74	
19.50 - 21.30	1.80	2 gl.gn. av og til spredt noe gr.	50						
21.30 - 23.00	1.70	meget spredte malmstr. og impr. 2-gl.gn.	60	0.12	0.11	0.55		3.07	
23.00 - 25.00	2.00	m.spredte malmstr. og impr. i 2-gl.gn.	50-60	0.08	0.09	0.33		2.50	
25.00 - 25.90	0.90	malmstr. + impr. 2-gl.gn.	40-50	0.25	0.09	1.11		3.07	
25.90 - 27.10	1.20	2-gl.gn. med gr.	45						
27.10 - 29.10	2.00	spredte malmstr. og impr. 2-gl.gn.		0.22	0.14	0.48		3.75	
29.10 - 30.05	0.95	2-gl.gn.	50						
30.05 - 30.90	0.85	malmstr. og impr. 2-gl.gn.	40-60						
30.90 - 31.35	0.45	2-gl.gn. med gr.	55	0.15	0.13	0.60		3-18	
31.35 - 31.80	0.45	spredte malmimpr. 2-gl.gn.	50						
31.80 - 32.30	0.50	2-gl.gn. spredt noe gr.-	50						
32.30 - 33.25	0.95	stripet malm grågrønn båndet skarn med hbl. steilt foldet	50-0						
33.25 - 33.50	0.25	musk.gn.	35	0.04	0.13	3.13		2.50	
33.50 - 33.65	0.15	malm Hbl.skarn	45						

Lokalitet:

Dato:

Koordinat:

Retning:

Helling, stigning:

Høyde:

Lengde:

Borenull:

Side 3

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
33.65 - 35.00	1.35	musk.gn.	Py-impr. spor st. gl.rik.Noë biot. (D?)	50	0.15	0.12	0.38		3.64	
35.00 - 35.85	0.85	musk.biot.gn.	sv. py-impr.	50-35						
35.85 - 36.10	0.25	gr.musk.biot.gn.	sv. py-impr.	35-45						
36.10 - 37.55	1.45	gr.hbl.gn.		55						
37.55 - 38.10	0.55	gr.hbl.biot.gn.	sv. py-impr.	55						
38.10 - 38.90	0.80	gr.musk.biot.gn.	D. py-impr.	55						
38.90 - 39.30	0.40	hbl.gl.gn.	noë gr. sv.py-impr.	60						
39.30 - 40.05	0.75	spredte malmstr. musk.biot.gn.	og impr.	60	0.34	0.12	0.58		3.64	
40.05 - 41.20	1.15	biot.musk.gn. båndet	Noë gr. sv. py-impr.	45-55						
41.20 - 41.50	0.30	gr.hbl.gl.gn.		60						
41.50 - 41.65	0.15	malmstr. biot.musk.gn.								
41.65 - 41.95	0.30	hbl.skarn	gullig sk.							
41.95 - 42.60	0.65	gr.amf.	båndet							
42.60 - 42.90	0.30	gr.hbl.biot.gn.	D. py-impr.							
42.90 - 44.80	1.90	gr.amf.	steilt foldet	0-35						
44.80 - 46.20	1.40	gr.hbl.b.gn.	sv. py-impr.	60						
46.20 - 46.40	0.20	gr.gl.gn.	lys, fink. gr.rik	v						
46.40 - 47.25	0.85	gr.b.m.gn.	D, middelsgrå	50-60						
47.25 - 48.40	1.15	gr.hbl.b.gn.	mlk.	55						
6.7. 78 A. Kruse										

Lokaltet: NOFJELLET GRUBER

Dato: mai/juni 1978

Koordinat: 925.432,3 X, 44.180,5 Y

Retning: nord

Helling/stigning: + 70°

Høyde: - 65,2 m

Lengde: 36,00 m

Borehull: 577 Profil 44.180

Side 1

Dybde	L	Bergart	S ^o	% Pb	% Cu	Analysen % Zn	% S	% Fe	Prove m
0.00 - 0.75	0.75	2-gl.gn. Noe vekslende type spredt noe gr.	80° avtakende til 60	0.58	0.16	0.10		6.20	
0.75 - 2.60	1.85	spredte malmstr. og impr. musk.gn. Rel. gl-rik. lyse sl.	50°						
2.60 - 3.15	0.55	musk.gn.	50						
3.15 - 3.45	0.30	malmstr. musk.gn.							
3.45 - 3.55	0.10	2-gl.gn.	55						
3.55 - 3.75	0.20	gr.biot.gn. D.mlk.	55						
3.75 - 4.90	1.15	2-gl.gn. litt gr.	50						
4.90 - 6.30	1.40	gr.hbl.gn. gr.rik,mlk.	40-50						
6.30 - 8.00	1.70	2-gl.gn. med gr. På 7.20 m: <u>1 cm</u> <u>malm</u>							
8.00 - 9.10	1.10	2-gl.gn.b.p.	Ca. 0						
9.10 - 10.30	1.20	2-gl.gn. med gr.	50						
10.30 - 10.90	0.60	musk.gn. spredt gr. litt biot.	50						
10.90 - 11.85	0.95	2-gl.gn. vekslende type, med gr.	50						
11.85 - 12.90	1.05	spredt malmimpr. I starten lyse sl. 2-gl.gn. (hønningblende)	60-70						
12.90 - 13.85	0.95	m.spredte malmimpr. 2-gl.gn.	70						
13.85 - 15.25	1.40	2-gl.gn. med gr.	70						

Lokalitet: *Skandinavia - H.0001*Dato: *mai/juni*Koordinat: *55.632, 2 N, 46.184, 2 V*Retning: *nord*Helling/stigning: *+ 70*Høyde: *- 65.2 m*Lengde: *2,5 x 0*Borehull: *1-2* Profil *4.7.78*

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	% Pb	% Cu	Analysert % Zn	% S	% Fe	Prove m
15.25 - 18.10	2.85	m.spredte malminpr. 2-gl.gn.	50-60	0.28	0.16	0.64		5.40	
18.10 - 19.25	1.15	2-gl.gn. sv. py-impr.	50-60	0.09	0.12	0.19		6.05	
19.25 - 20.30	1.05	2-gl.gn. b.p.	30-70						
20.30 - 21.75	1.45	gr.hbl.gn.	70						
21.75 - 27.90	6.15	gr.hbl.b.gn.	Py-impr. Noe småfoldet.						
27.90 - 29.60	1.70	gr.amf.	med biot. Flere folder- ombøyninger, akseplan ca. 0						
29.60 - 35.75	6.15	gr.b.hbl.gn. båndet	A. noe py-impr. Meget foldet						
35.75 - 36.00	0.25	2-gl.gn.	båndet						

A.Kruse 4.7.78

Lokalitet: *Profil 44.180*

Borehull: 576

Dato : *17.06 - 78*
 Koordinator : *X: 925.428,7 Y: 44.186,4*
 Retning : *8*
 Helling/stigning: *+70°*
 Høyde : *-65.1*
 Lengde : *2990 m*

1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.05	2.05	2 gl.gn.musk.d. Lys,mlk. Py-rik m/spor <u>Sl, Gn.</u>	80°	<i>0.12</i>	<i>0.11</i>	<i>0.36</i>		<i>4.55</i>	
2.05 - 3.85	1.80	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.tildels mass. svak. imp. <u>Py</u>	80°	<i>0.02</i>	<i>0.02</i>	<i>0.05</i>		<i>1.94</i>	<i>305-305</i>
3.85 - 7.30	3.45	Hbl.gn. Mørk,mlk-grovk. Vekslende m/parti biot.gn. tildels gr.rik. 1-3 mm. Imp. <u>Py</u>	60° 80°	<i>0.01</i>	<i>0.03</i>	<i>0.03</i>		<i>6.82</i>	<i>450-250</i>
7.30 - 8.40	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk-grovk. veksl. m/dm brede hbl.førende parti, imp. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	70°	<i>1.36</i>	<i>0.31</i>	<i>2.96</i>		<i>2.44</i>	
8.40 - 9.20	0.80	2 gl.gn.musk.d. Lys,mlk,spor hbl. <u>Sl,Gn,</u> <u>Cp, Py</u>	70°	<i>0.33</i>	<i>0.10</i>	<i>0.52</i>		<i>2.71</i>	
9.20 - 11.00	1.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm brede biot-hbl.før. bånd. Spor <u>Sl,Gn,Cp, imp.</u> <u>Py</u>	60° 70°	<i>0.67</i>	<i>0.13</i>	<i>1.17</i>		<i>3.92</i>	
11.00 - 12.10	1.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. Spor hbl. Svake spor <u>Sl,Cp,Gn.</u> Imp. <u>Py</u>	70°	<i>0.06</i>	<i>0.18</i>	<i>0.88</i>		<i>6.61</i>	
12.10 - 17.00	4.90	Hbl.gn. Mørk,mlk,veksl. m/parti 2 gl.gn.b.d. tildels gr. rik 1-3 mm. Imp. <u>Py</u>	70° 80°						
17.00 - 17.40	0.40	Musk.gn. Lys,mlk-fink. Rel.kv.rik. mass. Svak imp. <u>Py</u>							
17.40 - 19.40	2.00	Hbl.gn. Mørk,mlk-frovk. tildels mass. gr.rik 1-5 mm.Imp. <u>Py</u>	70° 80°						

Borehull: 576

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning :
Høyde :
Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19.40 - 20.10	0.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink.rel.mass. imp. <u>Py.</u>							
20.10 - 29.90	9.80	Hbl.gn. Mørk,mlk-grovk. Veksl. med små parti 2 gl.gn.b.d. Cm-brede pegm.bånd. Rel. mass. gr.førende 1-3 mm. Omp. <u>Py.</u>	70° 80°						
31.5. 1978 Holger Pantdalsli									

Lokalitet: *Prof. 43.640*

Dato : *7.11-79*
 Koordinater : *X: 925.438,7 Y: 43.636,9*
 Retning : *N*
 Helling/stigning: *-70°*
 Høyde : *-44.0*
 Lengde : *15,10*

Borehull: 574

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.80	5.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/dm-brede pegm.band, Spor gr.	75°						
5.80 - 6.00	0.20	TAP							
6.00 - 15.10	9.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl.gn.bd. Spor gr. Ved 6.85 spor Sl. Fra 9.75 - 9.80 impr. Sl,hbl. Fra 10.05 - 10.10 spor Sl. Fra 11.40 - 11.45 spor Sl.							

19/1 1979
H. Pantdalsli

44.460

Borehull: 573

Dato : Jan. 1979
 Koordinator : X:925.411.9 Y:44.462.9
 Retning : N
 Helling/stigning: - 65°N
 Høyde : 91.9
 Lengde : 7.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.35	0.35	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. impr. <u>Sl,Cp,Py</u> .	70°	0.24	0.43	7.10			
0.35 - 0.65	0.30	Tap							
0.65 - 1.30	0.65	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-brede biotrike band, rel. mass.	70°	0.03	0.06	0.50			
1.30 - 1.55	0.25	Pegm.		0.02	0.02	0.02			
1.55 - 2.20	0.65	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. veksl. m/biot.rike band, impr. <u>Sl,Cp,Py</u>	70°	0.12	0.11	1.02			
2.20 - 3.00	0.80	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-brede band pegm. spor hbl. impr. <u>Sl,Cp,Py</u>	70°	0.48	0.40	4.47			
3.00 - 5.00	2.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.-fink. veksl. m/cm-bred biot.rike band fortrinnsvis m/spor gr.	70°	0.04	0.04	0.26			
5.00 - 6.10	1.10	2 gl.gn.bd. Rel. mørk, mlk. hbl. førende, m/sor. gr. 0.5-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>							
6.10 - 6.55	0.45	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor gr.							
6.55 - 7.30	0.75	Pegm.							
7.30 - 7.50	0.20	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk. m/pegm-band.							

10/1 1979
 H. Pantdalsli

Lokalitet: 44.460

Borehull: 572

Dato : Jan. -79

Koordinater : X: 925.406.9 Y: 44.462.6

Retning : S

Helling/stigning: - 70°

Høyde : - 91.9

Lengde : 5.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk-grovk. hbl.førende, spor <u>Py</u>	60° 70°	0.01	0.16	0.06			
1.00 - 2.00	1.00	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. tildels kv.rik. enstaka 5 cm. tykke <u>Sl, Gn</u> band.	60° 70°	0.59	0.15	3.48			
2.00 - 5.40	3.40	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. vekslende m cm- tykke band. hbl. biot.rik 2 gl.gn. spredte gr. fortrinnsvis i hbl.bandene	60° 70°	0.01	0.04	0.10			
10/1 1979 Stellan Burman									

Lokalitet: *Prof. 42.580*

Dato : *7-11-79*
 Koordinater : *X: 925.425,2 Y: 48.579,0*
 Retning : *S*
 Helling/stigning : *-60°*
 Høyde : *-45,4*
 Lengde : *11.90 m.*

Borehull: 571

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.40	6.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl.gn.bd. og pegm. Spredte gr. 0,5-2 mm.	55° 60°						
6.40 - 7.00	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mør,mlk. vekslende m/parti 2 gl.gn.alm. Spr. gr. 0,5 - 3 mm.	55°	<i>0.01</i>	<i>0.03</i>	<i>0.01</i>			
7.00 - 8.00	1.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/dm-brede hbl.førende band fortrinnsvis m/impr. Sl,Cp,Py		<i>1.05</i>	<i>0.46</i>	<i>2.86</i>			
8.00 - 9.30	1.30	Musk,gn. Lys,mlk. tildels kv.rik. spor gr.	60°	<i>0.04</i>	<i>0.02</i>	<i>0.03</i>			
9.30 - 11.90	2.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede 2 gl.gn.bd. og pegm.band, spor gr.	60°						

19/1 1979.
H. Pantdalsli

Lokalitet: *Profil 43.580*

Borehull: 570

Dato : *dec-78*Koordinater : *X: 1925.426,5 Y: 43.580,1*Retning : *N*Helling/stigning: *-76°*Høyde : *-45,2*Lengde : *12.00 m.*

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.40	5.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/enkelte cm-brede band pegm. spr. gr. 1-3 mm.	70°	<i>0.04</i>	<i>0.03</i>	<i>0.15</i>			<i>4.60-5.40</i>
5.40 - 6.50	1.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/pegm.band og biotslepper Spor hbl. Sl,Cp,Py	80° 50°	<i>0.24</i>	<i>0.17</i>	<i>0.90</i>			
6.50 - 7.10	0.60	musk.gn. Lys,mlk, tildels kv.rik, spor gr.		<i>0.03</i>	<i>0.03</i>	<i>0.05</i>			
7.10 - 7.50	0.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. rel.mass. spor gr.							
7.50 - 8.10	0.60	2 gl.gn.bd.. Rel. mørk,mlk. vekslende m/dm.brede band 2 gl.gn.alm spor hbl. gr.	70°						
8.10 - 8.50	0.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor gr.							
8.50 - 12.00	3.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/dm-brede band. 2 gl.gn.bd. Spr. gr. 1-3 mm.	65°						

19/1 1979

H. Pantdalsli

Lokalitet: *Profil 44.420*

Borehull: 569

Dato : *des-78*
 Koordinater : *X: 925.428,0 Y: 44.421,6*
 Retning : *N.*
 Helling/stigning: *-77°*
 Høyde : *-88,8*
 Lengde : *9,17 m.*

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.65	0.65	Pegm. Bandet m/biot.gn.		<i>0.02</i>	<i>0.10</i>	<i>0.11</i>			
0.65 - 2.50	1.85	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. enkelte dm-brede band m/2 gl.gn. alm. spor hbl. Impr. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Py</u>	60° 70°	<i>0.30</i>	<i>0.21</i>	<i>1.25</i>			
2.50 - 3.45	0.95	2 gl.gn.alm. rel. lys, mlk.	65°	<i>0.08</i>	<i>0.05</i>	<i>0.30</i>			
3.45 - 4.00	0.55	Pegm.							
4.00 - 4.55	0.55	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. spor hbl.	65°						
4.55 - 5.55	1.00	2 gl.gn.alm. Rel. lys, mlk-fink.	65°						
5.55 - 7.80	2.25	2 gl.gn.bd. Rel.mørk, mlk. tildels biot.gn. hbl.førende. spr. gr. 0,5-3 mm. Svak impr. <u>Py</u> .	65°						
7.80 - 9.10	1.30	2 gl.gn.alm. Rel. lys, mlk.	65°						

4/1 1979
 H. Pantdalsli

Lokalitet: *Prof. 43. 80*

Borehull: 568

Dato : Dec - 78
Koordinater : X: 925.418,0 Y: 43.477,5
Retning : N.
Helling/stigning: - 21°
Høyde : - 51,3
Lengde : 12,20 mm.

[illegible]

Lokalitet: *Profil 43.720*Dato: *Nov - 78*Koordinater: *X: 925.416,0 Y: 43.725,9*Retning: *S*Helling/stigning: *-55°*Høyde: *-49,1*Lengde: *24,60 m.*

Borehull: 567

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.85	0.85	TAP							
0.85 - 9.60	8.75	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band 2 gl.gn.b.d. spredte gr. 1-3 mm.	60°						
				<i>0,25</i>	<i>0,04</i>	<i>0,50</i>			<i>2,60-2,60</i>
9.60 - 10.00	0.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ biot.rike band. Fortr.vis m/spor Sl,Cp,Gn,Py	50°	<i>0,44</i>	<i>0,22</i>	<i>0,90</i>			
10.00 - 11.45	1.45	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/10-30 cm brede band. rel. kompakt hbl.førende malm, Sl,Cp,Gn,Py.		<i>1,90</i>	<i>0,67</i>	<i>6,80</i>			
11.45 - 12.35	0.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink. kv.rik,mass.		<i>0,15</i>	<i>0,08</i>	<i>0,40</i>			
12.35 - 12.70	0.35	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. m/spredte gr. 1-5 mm.	50°						
12.70 - 14.50	1.80	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink. rel.kv.rik, mass. spor gr.							
14.50 - 14.85	0.35	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr.1-3mm	50°						
14.85 - 16.40	1.55	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.-fink. tildels kv.rik og mass. Spor gr. Sl, Cp, Py	60°	<i>0,15</i>	<i>0,04</i>	<i>0,30</i>			
16.40 - 16.85	0.45	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ 5-10 cm brede biot.,hbl-førende band. god malm. Sl,Cp,Gn,Py		<i>1,30</i>	<i>0,77</i>	<i>4,55</i>			
16.85 - 17.60	0.75	Pegm.		<i>0,24</i>	<i>0,15</i>	<i>0,66</i>			
17.60 - 18.20	0.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. tildels kv.rik. spor gr.	60°						
18.20 - 18.80	0.60	Pegm.							

Lokalitet:

Borehull: 567

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
18.80 - 19.40	0.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mik. Spredte gr. 0,5 - 2 mm	60 ^o						
19.40 - 19.60	0.20	Pegm.							
19.60 - 24.60	5.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mik. vekslende m/ cm-dm-brede band 2 gl.gn. bd. og pegm. spor gr.	60 ^o						

22/1 1979
Holger Pantdalsli

Lokalitet:

Profil 43.480

Borehull: 566

Dato : Dec-78
Koordinater : X: 925,423,2 Y: 48.477,6
Retning : N.
Helling/stigning: -60°
Høyde : -51,0
Lengde : 12,10 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.alm. lys,mlk. vekslende m/biot.-rike dm-brede band. svak impr. <u>Py.</u>	60°						
0.50 - 1.50	1.00	Pegm. Fra 1.10 - 1.20 biot.gn. spor Cp, Po,Py.							
1.50 - 4.60	3.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede biotrike band fortrinnsvis m/spr. gr. 0,5-3 mm. Spor <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	60°	0.04	0.05	0.19			360-460
4.60 - 5.00	0.40	Biot.gn. Mørk,mlk.hbl.førende, impr. <u>Cp, Gn, Py</u>		0.70	0.35	0.04			
5.00 - 6.25	1.25	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.vekslende m/cm-dm brede biot,rike band. Fra 5.90-6.00 pegm. Spr. gr	60°	0.19	0.07	0.04			
6.25 - 7.90	1.65	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk.tildels hbl-førende. fra 6.70-6.85 pegm. 7.05-7.30 alm. gn. Impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	60° 70°	0.74	0.58	3.60			
7.90 - 12.10	4.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. Fra 8.60-8.75 Pegm. 11.70-11.90 biotrik. Spr. gr. 0.5-3 mm.	60° 40°	0.73	0.11	0.50			790-900
		12/12 1978 H. Pantdalsli							

Lokalitet: *Profil 43.720*

Borehull: 565

Dato : Nov. 1978
 Koordinator : X: 925.417,8 Y: 43.725,6
 Retning : N
 Helling/stigning: - 55°
 Høyde : - 49,1 m
 Lengde : 36,10 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	TAP							
0.80 - 7.00	6.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mik. spor gr.	55° 60°						
7.00 - 7.70	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. fra 7.10 - 7.20 god impr. <u>Sl,Cp,Gn.Py</u> Fra 7.55-7.65 spor <u>Sl,hbl.</u>	60°						
7.70 - 11.95	3.25	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.ved 9.65 spor <u>Cp,Sl,Po</u> . Enkelte små mørke biot.rike parti. spor gr.	60°	0,14	0,04	0,45			11,00-11,95
11.95 - 13.70	1.75	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende med dm-brede biot.rike hbl. førende band. Impr. <u>Sl,Cp</u> <u>Gn, Py.</u>	50° 60°	1,02	0,26	2,20			
13.70 - 14.70	1.00	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. rel.mass. spor gr.		0,12	0,06	0,18			
14.70 - 15.40	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende med dm-brede biot. gr.rike band Ved 14.85 spor <u>Sl, Cp</u>	55°	0,01	0,10	0,28			
15.40 - 21.00	5.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/spr. striper og band opptil 20 cm bred m/impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u> hbl. spor gr.	60°	0,17	0,10	0,65			15,50-18,00
				0,35	0,13	1,20			18,00-21,00
21.00 - 23.75	2.75	2 gl.gn.alm. rel.lys,mlk.enkelte små pegm.band. spr. gr. 0,5-2 mm.	60°	0,06	0,01	0,16			21,00-22,00
23.75 - 24.00	0.25	Biot.gn.(sk). Mørk, grovk. impr. <u>Py.</u>							
24.00 - 36.10	12.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.vekslende med spr. striper og dm-brede band 2 gl.gn.bd. og pegm. Spr. gr. 0,5 - 3 mm.	60°						
19/12 1978 H. Pantdalsli									

Lokalitet: *Profil 48.480*

Borehull: 564

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Hoyde

Lengde

*Uov-78**X: 925.423,2**Y: 43.472,6**N.**-76°**-50,5**12,21*

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.alm. lys,mlk. vekslende med små biot.rike band, fortrinnsvis m/spr. gr.	70°						
0.50 - 1.40	0.90	Pegm. Spor <u>Gn,Cp,Py,Po</u>							
1.40 - 3.10	1.70	Musk.gn. lys,mlk.vekslende med dm-brede biot.rike band med gr. 0,5 - 2 mm.	70°						
3.10 - 3.45	0.35	Pegm. Spor <u>Gn,Cp,Py,Po</u>							
3.45 - 6.20	2.75	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk, Fra 3.45 - 4.00 spor <u>Sl,Cp,Gn,Py</u> . Fra 5.60 - 5.75 pegm. Spor gr.	70°	<i>0.03</i>	<i>0.05</i>	<i>0.07</i>			<i>5,20-6,20</i>
6.20 - 7.60	1.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-grovk. veksl. m/dm-brede band biot.gn. m/spor hbl. fortrinnsvis med impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	70°	<i>0.95</i>	<i>0.25</i>	<i>3,80</i>			
7.60 - 11.05	3.45	2 gl.gn.alm. lys,mlk.rel.mass. spor gr.	70°	<i>0.02</i>	<i>0.02</i>	<i>0.04</i>			<i>7,60-8,60</i>
11.05 - 12.20	1.15	Pegm.							

18/12 1978

H. Pantdalsli

Lokalitet: *Profil 43.480*Dato: *Nov - 78*Koordinater: *X: 925.423,3 Y: 43.477,6*Retning: *N.*Helling/stigning: *- 45*Høyde: *- 50,5*Lengde: *15,20*

Borehull: 563

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.95	0.95	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink. rel.mass. kv.rik. spor gr.	50°						
0.95 - 1.40	0.45	Pegm.							
1.40 - 1.80	0.40	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink. Rel. mass. kv.rik. spor gr.	50°						
1.80 - 2.05	0.25	Pegm.							
2.05 - 2.80	0.75	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink. rel.mass. kv.rik. spor gr.	60°						
2.80 - 3.10	0.30	Pegm.							
3.10 - 6.30	3.20	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink. rel. mass. Kv.rik. vekslende med cm-dm brede pegm. og biot. rike band. spor gr.	50° 60°						6.00 -
6.30 - 7.00	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende med 2 gl.gn.alm. spor gr.	60°	0.05	0.02	0.04			- 7.00
7.00 - 7.60	0.60	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. spor hbl. ondulerende impr. <u>Sl,Cp,Gn</u> <u>Py.</u>		0.65	0.52	1.30			
7.60 - 15.30	7.70	2 gl.gn.alm. Rel lys,mlk. vekslende m/ pegm. og biot.rike band. Spr. gr. 0,5-5 mm.	60° 40°	0.02	0.04	0.10			7.60-8.60
		14/12 -78							
		H. Pantdalsli							

Lokalitet: *Profil 43.720*

Borehull: 562

Dato : Nov. 78
 Koordnater : X: 925.417,1 Y 43.725,9
 Retning : N
 Helling/stigning: 70°
 Høyde : - 49,1
 Lengde : 30 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	TAP							
0.30 - 6.55	6.25	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ biot.rike mørke band fortrinnsvis m/gr. 0,5-3mm	70°	0.04	0.02	0.11			0.55-6.55
6.55 - 7.00	0.45	Biot.gn. Mørk,grovk.-mlk. spor hbl. impr. Sl,Cp,Gn,Py	70° 60°	0.25	0.92	0.93			
7.00 - 7.25	0.25	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. svak impr. Py.		0.03	0.40	0.39			
7.25 - 7.75	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/biot.rike band. Ved 7.30 spor sl. Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	50° 80°	0.04	0.10	0.61			
7.75 - 8.20	0.45	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spr. gr. 0,5-2 mm Svak impr. Py.	50°	0.06	0.07	0.16			
8.20 - 8.50	0.30	Malm Hbl.rik.		3.25	0.63	9.75			
8.50 - 17.80	9.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. Fra 8.90-9.00 lys Sl. 11.10 - 11.15 Sl, Cp. 13.15-13.30 pegm. Spr. gr. 0,5-3 mm. Svake impr. Py.	50° 60°	0.48	0.12	1.70			8.50-9.50
				0.06	0.02	0.21			9.50-10.50
				0.02	0.03	0.06			16.80-17.80
17.80 - 21.90	4.10	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,grovk. vekslende m/band biotgn.(sk.)spor hbl, impr. Sl,Cp,Gn,Py.	40° 50°	0.45	0.29	1.70			17.80-19.80
				1.01	0.29	3.25			19.80-21.90
21.90 - 23.10	1.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink,spor hbl. gr.0,5-2 mm. Fra 22.00 - 22.10 Sl,Cp, 22.95-23.10 Sl,Cp,Gn.	50°	0.61	0.08	0.80			
23.10 - 23.60	0.50	Pegm.		0.02	0.05	0.05			

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 562

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
23.60 - 24.00	0.40	2 gl.gn.bd Rel.mørk,mlk. spor hbl. <u>Sl,Cp,Py</u>	60°	0.14	0.29	0.31			
24.00 - 24.30	0.30	Pegm.		0.08	0.06	0.09			
24.30 - 25.30	1.00	2 gl.gn.bd Rel.mørk,mlk. tildels hbl.førende Impr. <u>Sl, Gn,Py</u>	45°	0.54	0.36	1.20			
25.30 - 30.00	4.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/dm brede pegm.band. Spr. gr. 0.5-3 mm	30° 50°	0.05	0.03	0.10			25.30-26.30

11/12 1978

H. Pantdalsli

Lokalitet: *Profil 48.440*Dato: *Nov-78*Koordinater: *X: 925.411.1 Y: 48.444.0*Retning: *N.*Helling/stigning: *-80°*Høyde: *-53,1*Lengde: *40,85 m.*

Borehull: 561

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.80	3.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk,spor gr.0,5-2mm Svak impr. <u>Py</u> .	70°						
3.80 - 4.20	0.40	Pegm.							
4.20 - 19.30	15.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. veksl. m/dm- brede mørke biot.rike band Spr. gr. 0,5-5 mm.	70°						
19.30 - 19.70	0.40	Pegm.							
19.70 - 29.50	9.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ dm-brede mørke biot.rike band, spor græ	60° 70°	0.09	0.07	0.07			29m-29.0
29.50 - 30.00	0.50	Biot.gn. Mørk,mlk. svak impr. <u>Py</u>	60°	0.02	0.05	0.08			
30.00 - 31.30	1.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. veksl. m/ band rel. kompakt malm.m/ hbl. impr. Sl,Cp,Py	60°	0.64	0.42	2.60			
31.30 - 32.05	0.75	2 gl.gn.alm. lys,mlk,-fink. spor gr. svak impr. <u>Py</u>	60°	0.03	0.80	0.15			
32.05 - 32.40	0.35	Pegm.							
32.40 - 33.90	1.50	Biot.gn. Mørk,mlk. vekslende m/band hbl.gn. spr.gr. 0,5-3 mm fortrinnsvis i hbl.gn. Impr. <u>Py</u> .	60°						
33.90 - 34.10	0.20	Pegm.							
34.10 - 34.80	0.70	Hbl.gn. Rel.mørk,mlk. spr.gr. 0,5 - 3 mm.	60°						
34.80 - 35.00	0.20	Pegm.							
35.00 - 36.80	1.80	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. veksl. med biot.gn. og pegm.band Svak impr. <u>Py</u>	60° 70°						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 561

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
36.80 - 38.80	2.00	Biot.gn. Mørk, mlk. vekslende m/ pegm.band, spor hbl. Spr. gr. 0,5 - 3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	60 ^o 70 ^o						
38.80 - 40.85	2.05	Hbl.gn. Rel.mørk, mlk. Spr. gr. 1-3mm	70 ^o						
24/11 1978 Holger Pantdalsli									

Lokalitet: *Profil 42.700.*

Borehull: 560

Dato: *okt. 78.*
 Koordinater: *X: 925.400.8 Y: 42.706.4*
 Retning: *S*
 Helling/stigning: *-80°*
 Høyde: *-22.7 m*
 Lengde: *52.20 m*

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.75	0.75	Tap							
0.75 - 1.25	0.50	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. oppknaust. Spor gr impr. <u>Py</u>							
1.25 - 1.95	0.70	Tap							
1.95 - 6.80	4.85	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. ved 5.30 1 cm Sl,Cp, Spor Gr.	60° 70°						
6.80 - 7.00	0.20	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk. foldet, impr. <u>Sl</u> <u>Cp, Py.</u>							
7.00 - 19.10	12.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. Vekslede m/b inhold, spr. gr. 0,5-3 mm tildels kv.rik.	60° 70°						
19.10 - 19.50	0.40	Pegm.							
19.50 - 20.10	0.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk, spor gr.	60°	<i>0.18</i>	<i>0.06</i>	<i>0.06</i>			
20.10 - 21.00	0.90	Biot.gn. Mørk,grovk. tildels sk. preget, hbl.førende, små foldet, impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>		<i>0.58</i>	<i>0.68</i>	<i>4.18</i>			
21.00 - 23.70	2.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.-fink. var. m/b.d. band. 21.55-21.65 Impr. <u>Sl, Cp</u> . Spor diffuse gr.	70° 80°	<i>0.21</i>	<i>0.17</i>	<i>0.60</i>			<i>21.00-22.00</i>
23.70 - 24.20	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.		<i>0.02</i>	<i>0.04</i>	<i>0.12</i>			
24.20 - 26.00	1.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. impr. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	60° 80°	<i>0.73</i>	<i>0.33</i>	<i>3.35</i>			
26.00 - 28.90	2.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl- førende. Spr. gr. 0,5-3 mm imp. <u>Py.</u>	70° 80°	<i>0.08</i>	<i>0.04</i>	<i>0.37</i>			<i>26.00-27.00</i>
28.90 - 36.90	8.00	Hbl.gn. Mørk,mlk.-grovk. 31.10 - 31.20 anhydrit. tildels gr.rik 0,5-3 mm.	60° 70°						

Lokalitet:

Borehull: 560

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
36.90 - 40.80	3.90	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk. vekslende m/band av hbl.gn. fortrinnsvis m/gr. 0,5-3 mm. Impr. Py.	60° 80°						
40.80 - 46.10	5.30	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 0,5-3mm	70°						
46.10 - 47.50	1.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. enkelte små pegm.band.	60° 70°						
47.50 - 49.50	2.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. var. m/cm-brede hbl.gn.band m/gr.	70°						
49.50 - 52.20	2.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 0,5 - 3 mm.	70°						
14/11 1978 Holger Pantdalsli									

Lokalitet: Profil F43.730

Dato : Nov - 78
 Koordinater : X: 925.4178 Y: 43.726,1
 Retning :
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : - 49,1
 Lengde : 42,0 m

Borehull: 559

L.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.55	0.55	TAP							
0.55 - 6.50	5.95	2 gl.gn.alm. lya,mlk-fink. rel. hom. enkelte små pegm.band. spor gr. svak impr. Py	60° 70°	0.18	0.10	0.50			5.0-6.0
6.50 - 6.85	0.35	Biot.gn.(sk) Mørk,grovk.hbl.førende, impr. Sl,Cp,Py	70°	2.40	0.85	3.80			
6.85 - 9.40	2.55	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede band god malm Sl,Cp, og Hbl. Svak impr. Py	70°	0.31	0.60	1.30			9.0-10.0
9.40 - 12.10	2.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,rel. hom. spr gr. Svak impr. Py.	60° 70°	0.03	0.13	0.16			9.0-10.40
12.10 - 13.05	0.95	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. enkelte gr. 0,5-2 mm.	70°						
13.05 - 17.20	4.15	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. enkelte pegm.band. spor gr. rel.mass. fra 16.40-16.50 impr. Sl, Cp, Py.	60°	0.07	0.05	0.29			16.40-16.50
17.20 - 18.50	1.30	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. svak impr. Sl, Cp, Py.	60°	0.53	0.30	1.40			
18.50 - 20.20	1.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spor gr. svak impr. Py	60°	0.21	0.25	0.70			
20.20 - 21.60	1.40	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. fra 20.20-21.00 rik på kalkspat. Impr. Sl, Cp, Gn, Py	60°	1.00	0.41	2.50			
21.60 - 23.00	1.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/biotrikere parti. Fra 22.20-22.30 lys sl,Cp Gn. Py. Spor gr.	60°	0.57	0.15	1.60			

Lokalitet:

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning:

Borehull: 559

2.

Høyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
23.00 - 24.80	1.80	Pegm.	Spor <u>Sl, Gn.</u>	0.42	0.15	1.60 0.06			2500-2600
24.80 - 31.00	6.20	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/biot.rikere band. SPor gr.	70°	0.06	0.05	0.04		2800-3100
31.00 - 31.40	0.40	2 gl.gn.bd.	Rel.mørk,mlk. impr. <u>Sl</u> <u>CP, Py</u>	70°	0.70	0.87	2.00		
31.40 - 34.30	2.90	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. vekslende m/biot.rikere band. Fra 32.45-32.50 lys <u>Sl</u> , hbl. Fra 32.65-32.67 <u>Sl,Cp</u> , hbl. spor gr.	70° 50°	0.18	0.12	0.80		
34.30 - 35.45	1.15	Biot.gn.	Mørk,grovk. spor hbl. Imp <u>sl,Cp, Py</u>	60°	0.05	0.86	3.80		
35.45 - 37.05	1.60	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk.Fra 36.80- 36.85 <u>Sl, Po, Py</u> Spor gr. Svak impr. <u>Py</u>	70°	0.11	0.28	0.50		
37.05 - 41.30	4.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. spor gr. Fra 38.65 - 38.70 spor <u>Sl,Cp</u> . Svak impr. <u>Py</u>	70°					
41.30 - 42.00	0.70	Hbl.gn.	Rel.mørk,mlk. gr.førende 0.5-3 mm. Svak impr. <u>Py</u>	70°					

27/11 1978
H. Pantdalsli

Lokalitet: *Profil 42.700*

Borehull: 558

Dato : *06.1.78*
 Koordinator : *X: 925.399,2 Y: 42.706,4*
 Retning : *S*
 Helling/stigning: *-60°*
 Høyde : *-22,7*
 Lengde : *76,45 m. 76.00 m.*

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	TAP							
0.50 - 2.30	1.80	Musk.gn. Lys,mlk.-grovk. Karakteristisk ondulerende foliasjon, filtet preg, litt gr. 0,5-2 mm. god impr. Py	40°						
2.30 - 10.00	7.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. kv.rik. mass. enkelte diffuse gr. 0,5-1mm. fra 6.10-6.30 god impr. Py	50°	0.02	0.02	0.15			9.0-10.00
10.00 - 10.15	0.15	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. impr.Sl,Py		0.22	0.21	3.04			
10.15 - 10.30	0.15	Pegm.							
10.30 - 10.60	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. impr. Sl,Cp Py	40° 60°	0.35	0.41	1.77			
10.60 - 23.30	12.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. Veksl. med biotrikere band, fortrinnsvis m/spr. gr. 0,5 - 3 mm. enkelte små pegm.band.	45° 60°	0.04	0.11	0.31			10.60-11.60
23.30 - 23.55	0.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,grovk. tildels musk-biot.sk. ondulerende, impr. Sl,Cp,Py		0.20	0.51	3.06			
23.55 - 23.75	0.20	TAP							
23.75 - 24.35	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,grovk-mlk. Svakt ondulerende, tildels sk.rig Impr. Sl,Cp, Py	50° 60°	0.88	0.33	3.29			
24.35 - 24.55	0.20	Pegm. Spor Sl, Gn.		0.22	0.10	0.90			
24.55 - 27.40	2.85	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. fra 24.70 - 24.80 biot.gn. enkelte spr. gr. 0,5 - 5.mm	70°	0.03	0.02	0.11			

Lokalitet:

Borehull: 558

2.

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
27.40 - 28.00	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. Impr. Sl, Cp, Gn, Py.	70°	0.16	0.23	0.62	8/6 Ag/Au		
28.00 - 28.60	0.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. enkelte cm- brede hbl.band.	70°	0.02	0.05	0.03			
28.60 - 28.80	0.20	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.spor hbl. impr. Sl, Cp, Gn, Py	70°	3.50	0.07	11.00	29,3/0,15		
28.80 - 29.80	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. impr. Py	70°	0.28	0.17	0.62	6,1/0,15		
29.80 - 30.15	0.35	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.kv.rik. hbl.førende impr. Sl, Cp, Gn, Py		1.30	0.26	2.62	41,5/2,30		
30.15 - 30.70	0.55	Musk.gn. Lys,mlk. små parti m/litt b. Impr. Py	60° 70°	0.28	0.18	0.60	8,7/0,45		
30.70 - 31.40	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. grovk. impr. Sl, Cp, Gn, Py		0.93	0.52	1.61	18,5/0,55		
31.40 - 33.00	1.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk, spr. dm.brede band hbl.førende. Spr. gr. 0,5 - 3 mm.	60° 70°	0.07	0.02	0.17			3/60 - 34,60
33.00 - 42.70	9.70	Hbl.gn. Mørk,mlk, stichtolitisk fra 42.00 - 42.70. Tildels gr.- rik 0,5 - 3 mm.	50° 70°						
42.70 - 49.50	6.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. 44.20 - 45.30 dm.brede stichtolitiske band. Spr. gr. tildels rik 0,5-5 mm. 42.70-45.50 impr. Py	60° 70°						
49.50 - 51.70	2.20	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.rik 0,5-3 mm	60°						
51.70 - 52.00	0.30	Pegn.							
52.00 - 55.80	3.80	Biot.-hbl.gn. Mørk,mlk,spr. gr. 0,5-3 mm	60°						

Lokalitet:

Borehull: 558

3.

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
55.80 - 63.60	7.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk. spr. gr. 0,5 - 3 mm.	60°						
63.60 - 76.00	12.40	Hbl.gn. Mørk, mlk. 63.60 - 66.40 gr.førende 0,5 - 3 mm	60°						
13/11 1978 Holger Pantdalsli									

Lokalitet: *Profil 42.700*

Borehull: 557

Dato : *06-1-78*Koordinater : *X: 925.398,4 Y: 42.706,4*Retning : *S.*Helling/stigning: *-40°*Høyde : *-227*Lengde : *73,45 m.*

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	Tap							
0.40 - 0.80	0.40	Musk.gn. Lys, grovk. spor <u>sl.</u>	20° 50°	<i>0.86</i>	<i>0.29</i>	<i>1.70</i>		<i>5.60</i>	
0.80 - 5.30	4.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, grovk.-mlk. Spor gr. 1-2 mm. fra 3.50 til 3.70. Spor <u>Sl</u> , <u>Cp</u> . God imp. Py fra 0.80 - 3.00.	25° 40°	<i>0.49</i>	<i>0.30</i>	<i>1.30</i>		<i>9.70</i>	<i>0.80-3.00</i>
				<i>0.05</i>	<i>0.07</i>	<i>0.15</i>		<i>5.90</i>	<i>3.00-4.00</i>
5.30 - 9.00	3.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk. spredte gr. 0,5 - 3 mm.	30°						
9.00 - 10.70	1.70	Biot.gn. Rel.mørk, grovk.-mlk. Vekslennde m/parti 2 gl.gn. alm. Spr. gr. 1-3 mm.	35° 40°						
10.70 - 16.20	5.50	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. Spr. gr. 1-3 mm.	40°						
16.20 - 16.85	0.65	Biot.gn. Mørk, grovk. god imp. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u> .	10° 30°	<i>0.02</i>	<i>0.02</i>	<i>0.06</i>		<i>1.80</i>	<i>15.20-16.20</i>
16.85 - 17.50	0.65	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. spor 0.5-1 mm gr.	10° 40°	<i>5.10</i>	<i>1.17</i>	<i>0.44</i>		<i>16.20</i>	
17.50 - 19.65	2.15	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. Vekslennde m/biot. og gr.rikere band. Spr. gr. 0,5-2 mm.	20° 40°	<i>1.90</i>	<i>0.21</i>	<i>0.09</i>		<i>3.20</i>	
19.65 - 19.85	0.20	Pegm.							
19.85 - 25.30	5.45	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. Vekslennde m/ biot.rikere band, spr. gr. 0,5 - 2 mm.	20° 50°						
25.30 - 27.60	2.30	2 gl.gn.alm. Lys, mlk-fink. Spr. gr. 0,5 - 1 mm.	45°						

Lokalitet:

Borehull: 557

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
27.60 - 30.30	2.70	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.-fink. Veksl. m/parti 2 gl.gn.alm. Spredte gr. 0,5 - 2 mm.	30° 40°						
30.30 - 34.35	4.05	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink. pegm. fra 31.20 - 31.45. Spr. gr. 0,5 - 1 mm. Tildels mass.	40°	0,04	0,01	0,02		1,10	33.36-34.35
34.35 - 34.85	0.50	biot.gn. Mørk,grovk. pegm. fra 34.40 - 34.60. Spor <u>Sl,Cp</u> <u>Gn</u> , <u>Hbl</u> . <u>Py</u> .	70°	0,17	0,43	0,14		7,20	
34.85 - 35.60	0.75	Malm Skarn,diopsid,hbl.		2,90	0,77	5,60		7,70	
35.60 - 37.75	2.15	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.-fink. Veksl. m/biot.rikere band. Enkelte gr. 0,5-1 mm.	40° 50°	0,14	0,05	0,33		2,30	
37.75 - 39.00	1.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. Veksl. med band 2 gl.gn.alm. mineralisering fortrinnsvis i biot.rike partier. Imp. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> , <u>Py</u>	0 40°	0,46	0,23	3,00		6,60	
39.00 - 39.85	0.85	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,enkelte band m/hbl. svake spor <u>Sl,Cp</u> <u>Gn,Py</u> .	50°	0,17	0,20	0,34		8,00	
39.85 - 41.60	2.75	2 gl.gn.alm. Rel. lys, mlk.	50°	0,02	0,02	0,08		1,75	39.85-40.85
41.60 - 49.00	7.40	Hbl-biot.gn. Rel.mørk,mlk-grovk. Veksl. m/hbl. Gr. 1-3 mm. tildels mass.	40° 50°						
49.00 - 50.80	1.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. enkelte diffuse gr. 0,5-1 mm.	50° 70°	0,03	0,05	0,07		4,38	50.00-50.70
50.80 - 51.25	0.45	Biot.gn.(sk). Mørk,grovk. Imp. <u>Sl,Gn,Cp</u> <u>Py</u> .	50°	0,79	0,23	2,10		6,23	6

Lokalitet:

Borehull: 557

3.

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
51.25 - 52.80	1.55	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enkelte spor hbl. gr. 0,5-1 mm. Imp. Py	50°	0.08	0.05	0.13		5.90	
52.80 - 56.40	3.60	Amf Mørk,mlk. gr.førende 1-3mm m/enkelte biot.rike parti	30° 60°						
56.40 - 56.95	0.45	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink.	45°						
56.95 - 58.15	1.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. Pegm. 57.45 - 57.65. Spor hbl. Imp. Py	50°	0.10	0.16	0.07		5.10	
58.15 - 60.20	2.05	Hbl.gn. Mørk,mlk. enkelte cm-brede band m/spor sl, imp. Py	50°	0.08	0.19	0.22		6.80	
60.20 - 62.05	1.85	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. Enkelte biot-band.	50° 60°	0.05	0.07	0.16		2.19	
62.05 - 64.50	2.45	Biot.gn. Mørk,mlk.-grovk. spor hbl. Imp. Py	50° 60°						
64.50 - 66.30	1.80	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk-grovk. Imp. Py	20° 50°						
66.30 - 73.15	6.85	amf. Mørk,mlk.tildels gr.rik 1-3 mm.	60°						
73.15 - 73.45	0.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.	60°						

1/11 1978
H. Pantdalsli

Lokalitet: *Profil 42.950*

Borehull: 556

Dato : *sep - 78*
 Koordinator : *X: 925.385 Y: 42.950*
 Retning : S
 Helling/stigning: - 60
 Høyde : *-42,3*
 Lengde : *58,10 m.*

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	Hbl.biot.gn. Rel.mørk,mlk. gr.førende 1-2 mm. svak imp. Py	40	0.09	0.10	0.17	3/4 Ag/Au	13.37	
0.20 - 2.90	2.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grov-mlk. (tildels bladig) enkelte partier med spor hbl. Sprett imp. Sl,Gn,Cp,Py	30 0 80	0.58	0.32	2.18		8.37	
2.90 - 3.10	0.20	Amf. Mørk,mlk. Biot som spredte filmtynne skikt.	30	0.11	0.09	0.21		5.95	
3.10 - 4.40	1.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. med Spredte cm-tykke hbl.førende band enstaka gr. 1-2 mm. Spor Sl,Cp,Gn,Py.	30	0.06	0.13	0.31		6.95	
4.40 - 4.80	0.40	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik.	30°	0.05	0.08	0.15		2.85	
4.80 - 5.15	0.35	TAP							
5.15 - 10.60	10.45	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.-fink.-mlk. Spredte cm-tykke biot.rike band. Enstaka små granater 0,5 - 1.0 mm.	30 35						
10.60 - 10.80	0.20	Pegm.							
10.80 - 17.40	6.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. rel.kv.rik, med enkelte dm.tykke biot.d. partier. Spr. gr. 1-3 mm.	35 50	0.04	0.03	0.06	2.2/0,05	2.32	1640-1740
17.40 - 18.95	1.55	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk. rel.kv.rik.Spr. gr. 1-2 mm. Enkelte str. Sl,Cp,Gn, Svak imp. Py.	45 50°	0.49	0.20	1.72	8,4/0,05	4.28	
18.95 - 19.40	0.55	Malm komp.		1.00	0.64	5.83	14,8/0,15	12.88	
19.40 - 21.20	1.80	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk. rel. kv.rik. Spr. gr. 1-2 mm. enkelte Striper Sl,Cp,Gn,Py	45°	0.88	0.12	1.08	5,4/0,05	3.74	

Lokalitet:

Borehull: 556

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
21.20 - 23.50	2.30	2 gl.gn.bd Rel. lys,mlk. spor hbl. svak imp. <u>Py</u> spor Gn.	45	1.80	0.38	0.16	25.0/910	8.91	21.20-22.20
23.50 - 36.70	13.20	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. tildels mass. Enkelte hbl.rikere partier Gr.førende 1-3 mm fortrinns- vis i hbl.rikere partier. Svak imp. <u>Py</u> .	50 70						
36.70 - 37.20	0.50	Amf. Mørk,mlk. rel. mass.							
37.20 - 39.80	2.60	Biot.hbl.gn. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 1-2m Svak imp. <u>Py</u> .	60						
39.80 - 42.40	2.60	Hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-2 m Svak imp. <u>Py</u> .	70						
42.40 - 43.00	0.60	Pegm.							
43.00 - 47.60	4.30	2 gl.gn.b.d. Rel. lys,mlk. opp til 5 cm tykke hbl.gn.band. Gr.førende 1-2 mm. Svak imp. <u>Py</u>	70 80						
47.60 - 48.00	0.40	Pegm.							
48.00 - 56.70	8.70	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. gr.førende 1-2 mm. enkelte dm-tykke pegm.band. svak imp. <u>Py</u>	70 80						
56.70 - 58.10	1.40	hbl.gn. Mørk,mlk.rel.mass. gr.før. 1-4 mm.							

4/10 1978

Stellan Burman

Lokalitet: *Profil: 42,950*

Borehull: 555

Dato : *Sep - 78*
 Koordinater : *X: 925,385,3 Y: 42.950*
 Retning : N
 Helling/stigning: - 60°
 Høyde : *- 42,3*
 Lengde : *59,25*

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.70	3.70	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk. rel. homogen og kv.rik. Enstaka små gr. 0.5 - 1.0 mm. Spor <u>Py</u> .	60°					
3.70 - 3.95	0.25	Pegm.							
3.95 - 6.05	2.10	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk.enstaka cm-tykke hbl.biot.band. Spredte gr. 1-2 mm. ved 4.90-4.95 Gn. Spor <u>Py</u> .	70° 80°					
6.05 - 6.55	0.50	Pegm.							
6.55 - 8.60	2.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. spor hbl. (som mm tykke skikt). Spredte gr. 1-2 mm. Ved 6.60 - 6.80 spor <u>Sl, Cp</u>	80°					
8.60 - 9.50	0.90	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk mlk. tildels gr. hbl.førende. Ved 8.60 - 8.70 spor <u>Sl, Gn</u>	70°					
9.50 - 10.00	0.50	TAP.							
10.00 - 20.60	10.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk. kv.rik. enkelte dm.tykke partier biot.rikere m/spor hbl. Spr. gr. 1-2 mm. spor <u>Py</u>	75° 80°					
20.60 - 21.00	0.40	Hbl.gn.	Mørk,mlk. rel.mass. gr.-førende 1-3 mm.						
21.00 - 26.80	5.80	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. litt veksl. med Biot.rikere partier. Enkelte opp til 5 cm tykke pegm.band og hbl.gn.band. Spr. gr. hovedsakelig i hbl. bandene. Spor <u>Py</u> .	70°					

Lokalitet:

Borehull: 555

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
26.80 - 36.00	9.20	hbl.gn. Mørk, mlk. gr. førende. Enkelte cm-tykke pegm.band Fr. 29.00 - 30.60 stichto-litisk. Svak imp. Py.	60° 80°						
36.00 - 37.80	1.80	hbl.gn. Mørk, fin-mlk. gr. førende 1-3 mm. rel.mass. (amfibol-litisk). Svak imp. Py	70° 80°						
37.80 - 42.70	4.90	Biot.hbl.gn. Mørk, mlk.enstaka dm-tykke Pegm.band.	70° 10° 70°						
42.70 - 45.70	3.00	2 gl.gn.alm. lys, mlk-fin. Spr. gr. 1-2 mm. Enstaka cm-tykke pegm.band.	70° 80°						
45.70 - 51.80	6.10	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. enkelte cm-tykke amf.band m/gr.-1-3m	70° 80°						
51.80 - 52.50	0.70	Amf. Mørk, mlk. mass.gr. førende 1-3 mm.	70°						
52.50 - 55.40	2.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. spr. gr. 1-2 m. 54.20 - 54.30 amf.	80°						
55.40 - 56.00	0.60	Biot.hbl.gn. Mørk-mlk. gr. førende 1-2mm	70°						
56.00 - 56.40	0.40	Hbl.gn. Mørk, mlk. gr. rik 1-3 mm.	70°						
56.40 - 59.60	3.20	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. gr. førende spor hbl.	70°						

22/9 1978
Stellan Burman

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

: Aug - 78

: X: 925420,5 Y: 44115,9

: N

: - 45°

: - 52.0

: 58,21 m.

Borehull:

554 Profil 44.120

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	Hbl.biot.gn. Rel.mørk,mlk. gr.førende 1-3 mm. Spor <u>Py</u> .	45°						
0.40 - 1.80	1.40	Pegm. Med spredte musk.flaigor							
1.80 - 3.80	2.00	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. rel.kv.rik. pegm.mellom 2.80-3.00 m Svak impr. <u>Py</u> .	40° 45°	0,08	0,11	0,23		4,00	210-3,80
3.80 - 4.80	1.00	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.spor hbl. Impr. <u>Sl, Cp, Gn, Py</u>	40° 45°	0,49	0,34	1,56		6,00	
4.80 - 5.40	0.60	Pegm.							
5.40 - 7.80	2.40	2 gl.gn.bd. Rel. lys,mlk. spor hbl. Striper <u>Sl,Cp,Py</u>	40° 45°	0,30	0,14	1,00		4,00	
7.80 - 17.25	9.45	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.homogen. svakt gr.førende med små gr. 0,5 - 1.0 mm.	45° 60°	0,05	0,03	0,18		2,20	210-9,80
17.25 - 17.45	0.20	Pegm.							
17.45 - 19.20	1.75	2 gl.gn.bd. Mørk,mlk.vekslende med opp til cm-tykke band hbl.biot. og kv. spredte gr. 1-3 mm.	50° 60°	0,01	0,01	0,08		2,00	
19.20 - 21.50	2.30	biot.sk. mørk,mlk-grov. vekslede med band og slirer pegm. hbl. <u>Sl,Cp,Py</u> som skikt og klyser fortrinnsvis i biot.skikten.	10° 40°	0,00	0,15	0,33		9,40	
21.50 - 22.70	1.20	2 gl.gn.bd. Rel.mørk mlk. vekslede med mm-tykke skikt av biot.hbl. Enslige gr. 1-2 mm. Spor <u>Cp, Py</u>	20° 30°	0,01	0,03	0,10		4,00	

Lokalitet:

Borehull: 554

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
22.70 - 24.30	1.60	Biot.sk. Mørk,mlk-grovk. vekslende med band og slirer pegm. Hbl. <u>Sl,Cp,Py</u>	20 ⁰ 30 ⁰	0.05	0.11	1.16		4.80	
24.30 - 25.40	1.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. dm.tykke partier kv. <u>anhydrite</u> ved 25.10-25.20 <u>Py, Cp</u>	30 ⁰ 40 ⁰	0.03	0.07	0.18		2.20	
25.40 - 26.45	1.05	Biot.gn. Mørk,mlk. spor hbl. og <u>Sl Cp Py</u>	40 ⁰ 60 ⁰	0.03	0.12	0.20		7.00	
26.45 - 27.90	1.45	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk. enkelte mm-tykke biot.skikt. Ondulerende. <u>Py, Po</u>	20 ⁰ 40 ⁰	0.00	0.08	0.07		2.40	
27.90 - 28.70	0.90	Biot.gn. Mørk,mlk-grov. litt veksl. med cm-tykke band 2 gl.gn. og Pegm. spor hbl. Enstaka <u>Sl</u> striper og <u>Py, Cp</u>	20 ⁰ 40 ⁰	0.16	0.16	0.50		2.20	
28.70 - 30.20	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. enkelte biot.-rikere band. Svak imp. <u>Py</u>	40 ⁰ 45 ⁰	0.04	0.17	0.27		4.60	
30.20 - 31.40	1.20	2 gl.gn. Rel.lys,mlk.vekslende med mm-tykke striper biot. hbl. str. imp. <u>Sl,Gn,Cp,Po,Py</u>	40 ⁰	0.47	0.23	3.43		9.60	
31.40 - 33.45	2.05	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. rel.kv.rik imp. <u>Py, Po</u>	40 ⁰ 45 ⁰	0.03	0.05	0.47		4.00	
33.45 - 34.50	1.05	2 gl.gn.bd. Mørk,mlk.vekslende med partier mot gl,sk. Spor <u>Sl,Cp</u>	20 ⁰ 40 ⁰	0.02	0.08	0.13		5.40	
34.50 - 36.40	1.90	Biot.hbl.gn. Mørk mlk.-grov.vekslende med enstaka 2 gl.gn.part. Stripet imp. malm. <u>Sl,Gn, Cp, Po, Py</u>	40 ⁰	0.06	0.30	1.50		10.60	

Lokalitet:

Borehull: 554

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
36.40 - 37.65	1.25	2 gl.gn.bd. Rel.mørk,mlk. vekslende m/biot.hbl.skikt. Stripet imp. malm. <u>Sl,Gn,</u> <u>Cp,Py,Po</u>	30° 40°	1.23	0.70	3.79		9.40	
37.65 - 40.90	3.25	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. svak impr. <u>Py</u>	40,45°	0.09	0.24	0.40		5.60	32.65 - 38.65
40.90 - 42.90	2.00	Hbl.gn. Mørk,mlk.rel.mass. Gr.før- ende stichtolitisk.	45°						
42.90 - 45.80	2.90	Pegm.							
45.80 - 51.30	5.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. rel.mass. enstaka dm-tykke pegm.band. Gr.før- ende 1-3 mm.	60° 70°						
51.30 - 52.10	0.80	Pegm.							
52.10 - 52.70	0.60	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk. mass.							
52.70 - 53.20	0.50	Pegm.							

11/9 1978
Stellan Burman

Lokalitet: *Profil: 44.120*

Borehull: 553

Dato : *Aug - 78*
 Koordinater : *X: 925.419, Y: 44.115, Z*
 Retning : N
 Helling/stigning: - 60°
 Høyde : *-58,9*
 Lengde : *48,85 m.*

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	kv.							
0.20 - 1.25	1.05	2 gl.gn.bd. Rel.lys mlk. tildels gr. og hbl.førende, med enstaka kv. band opp til 5 cm tykke. gr. fortrinnsvis i de hbl. rikere partier. Spor <u>Py</u>	45° 50°						
1.25 - 7.40	6.15	2 gl.gn.b.d. Lys, mlk. rel homogen. (Mellom 6.20 - 6.40 pegm.) Spredte gr. 1-2 mm. Svak imp. <u>Py</u> .	50° 70°						
7.40 - 7.90	0.50	Pegm.							
7.90 - 7.95	2.05	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. rel.mass. enstaka gr. 1-2 mm. spor <u>Py</u> .	50°						
9.25 - 12.60	2.65	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk.kv.rik. rel. mass. Spr. gr. 1-2 mm.	50° 60°						
12.60 - 14.00	1.40	Biot.sk. Mørk, mlk-grov, spor hbl. Kv. feltspat som små linser (eller øyne) Svak imp. <u>Py</u> Cp, som spor.	50° 0° 50°						
14.00 - 17.90	3.90	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. rel.mass. enkelte cm-tykke hbl. biot-rikere band. Spr. gr. 1-2 mm. Svak imp. <u>Py</u>	55°	<i>0.05</i>	<i>0.07</i>	<i>0.14</i>		<i>4.17</i>	<i>16.90 - 17.10</i>
17.90 - 18.60	0.70	Biot.hbl.gn. Mørk, mlk-grovk. delvis ondulerende stripet impr. Sl, Cp, Gn, <u>Py</u>	50° 60°	<i>0.59</i>	<i>0.47</i>	<i>3.42</i>		<i>11.08</i>	
18.60 - 19.50	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. spredte gr. 1-3 mm ved 19.20 en biot. band cm tykk (muligens glid plan?).	50°	<i>0.09</i>	<i>0.06</i>	<i>0.51</i>		<i>4.08</i>	

Lokalitet:

Borehull: 553

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19.50 - 20.30	0.80	Biot.gn. Mørk,mlk.spr. gr. spor hbl. Py,Cp	40 ^o 50 ^o	0.01	0.04	0.08		6.04	
20.30 - 23.25	2.95	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. enkelte biot. rikere partier med spor hbl. Spredte gr. 1-3 mm.	50 ^o 60 ^o	0.06	0.05	0.17		3.98	
23.25 - 25.80	2.55	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk-grov vekslende med opptil cm-tykke band og slirer av biot. Veckad og tildels nærmest becciert. Spor Sl,Py,Cp,Gn	50 ^o 60 ^o	0.10	0.17	0.49		5.18	
25.80 - 26.70	0.90	Biot.hbl.gn. Mørk,grovk.stripet impr. malm Sl,Cp,Gn,Py	50 ^o 60 ^o	1.62	0.46	5.84		10.94	
26.70 - 27.60	0.90	Biot.gn. Mørk mlk-grov.Enkelte 2 gl. gn.band.Spor hbl. enstaka gr. 1-3 mm. Spor Py. (Sl,Gn?)	50 ^o 60 ^o	0.12	0.13	0.53		5.47	
27.60 - 29.70	2.10	Biot.hbl.gn. Mørk mlk-grov mye vekslende med biot,hbl kv. band. Sl,Cp,Py,Po,Gn.	50 ^o 60 ^o	0.03	0.51	1.24		9.21	
29.70 - 31.30	1.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.vekslende med opp til 5 cm tykke hbl.band. og opp til cm-tykke biot.skikt noe ondulerende. Ved 29.80 - 29.95, 31.05 - 31.30. Komp. malm.	40 ^o 60 ^o	0.69	0.60	4.73		11.94	
31.30 - 34.60	3.30	2 gl.gn.bd. Rel. lys mlk.rel.mass. Svak imp. Py	50 ^o	0.03	0.13	0.24		4.60	540-5250
34.60 - 34.70	0.10	Amf. Mørk,mlk. mass.	50 ^o						
34.70 - 37.30	2.60	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk.hbl.førende spr. gr. 1-2 mm. Svak imp. Py	50 ^o 60 ^o						

Lokalitet:

Borehull: 553

3

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
37.30 - 48.80	11.50	Hbl.gn. Mørk, mlk. rel. mass. Enstaka dm.tykkpegm.band. Gr.førende 1-3 mm. Svak imp. <u>Py</u>	40° 60°						
		31/8 1978 Stellan Burman							

Lokalitet: *Profil: 44.120*
 Dato : *Aug - 78*
 Koordinater : *X: 925.419,8 Y: 44.115,7*
 Retning : *-*
 Helling/stigning: *Lodd*
 Høyde : *- 59,0*
 Lengde : *38,37 m*

Borehull: 552

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.70	1.70	hbl.gn. Rel.mørk,mlk. enkelte cm-tykke band 2 gl.gn.bd. gr-førende 1-3 mm svak impr. Py	80° 90°						
1.70 - 4.35	2.65	2 gl.gn.bd rel.lys,mlk. rel.homogen imp. py.	80°	0,07	0,08	0,11		4,69	3,55 - 4,35
4.35 - 5.35	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.kv.rik. imp. Py Lys sl	80° 90°	0,58	0,34	2,26		6,75	
5.35 - 6.90	1.65	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. kv.rik med enkelte opp til 5 cm tykke pegm.band. imp. stripet malm sl,gn,cp,py.	70° 80°	1,37	0,23	6,44		6,38	
6.90 - 8.30	1.40	2 gl.gn.b.d. rel.lys,mlk. impr. sl,cp,py	80°	0,75	0,18	2,20		5,25	
8.30 - 11.00	2.70	2 gl.gn.alm. lys,mlk.kv.rik.homogen svak impr. Py	80° 90°	0,09	0,04	0,22		1,88	8,30 - 9,30
				0,04	0,02	0,08		1,00	9,30 - 11,00
11.00 - 12.25	1.25	2 gl.gn.b.d. rel.lys,mlk.kv.rik. Impr. Py,Cp,Sl,Gn	80°	0,57	0,20	1,96		7,69	
12.25 - 13.35	1.10	Pegm							
13.35 - 14.05	0.70	Biot.gn. Mørk,mlk-grov slirig med mm tjukke biotslirer. Spor hbl. gr. 1-2 mm impr. Py spor Cp	60° 80°						
14.05 - 16.90	2.85	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.rel.kv.rik spredte gr. 1-3 mm. svak imp. Py	mass. 80° 90°	0,08	0,04	0,17		2,26	16,00 - 16,90
16.90 - 18.55	1.65	Biot.gn. Mørk,mlk-grov.spor hbl. stripet imp. malm Sl, Gn, Cp, Py	70° 90°	2,61	0,34	7,37		11,81	

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 552

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
18.55 - 20.20	1.75	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk-grov tildels biot. gn. og hbl.førende. Impr. Sl,Gn,Py,Cp.	80°	0,42	0,44	2,17		12,56	
20.20 - 21.00	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.kv.rik.Imp. Py	70°	0,32	0,19	0,75		5,63	
21.00 - 21.70	0.70	Biot.sk. Mørk,grovk.slirig med Hbl. slirer (Brecciert) Stripet malm Sl,Cp,Py,Po.	60° 90°	0,18	1,34	2,65		18,26	
21.70 - 23.80	1.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.vekslende med cm-tykke biot.hbl.band. Imp. Py,Po,Sl,Cp	70° 80°	0,52	0,42	1,81		6,94	
23.80 - 32.10	10.30	2 gl.gn.b.d. Rel.lys mlk. rel. kv.rik homogen enstaka gr. 1-2 mm. svak imp. py	80° 90°	0,04	0,03	0,12		1,76	
32.10 - 33.30	1.20	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. svak impr. Py	80°						
33.30 - 34.70	1.90	Biot.sk. Mørk mlk. Spr. gr. svak impr. Py	80°						
34.70 - 35.80	1.10	hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-5 mm Imp. Py	80°						
35.80 - 37.40	1.60	Biot.sk. Mørk,mlk-grov. Spr. gr. 1-3 mm. Imp. Py	80° 90°						
37.40 - 38.30	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslede med opp til 5 cm tykke band kv og hbl førende band. gr-førende fortrinnsvis i de hbl.rikere part.	80°						

24/8 1978
Stellan Burman

Lokalitet: *Profil: 44.120*

Borehull: 551

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning: + 60°

Høyde

Lengde

*Aug - 78**N 925,420,6 Y: 44.115,9*

: N

: + 60°

: - 54.8

: 28,45 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink.	65°						
0.70 - 0.90	0.20	Pegm. Med Sl,Gn		<i>1.14</i>	<i>0.22</i>	<i>5.51</i>		<i>5.44</i>	
0.90 - 2.45	1.55	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.enkelte filmtynne skikt biot. spor Py og gr. 1-2 mm.	45° 60°						
2.55 - 4.20	1.75	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. homogen. Spredte gr. 1-2 mm Svak imp. Py. Spor Sl Cp ved 3.95-4.00 m	60° 30°						
4.20 - 6.70	2.50	Biot.gn. Mørk,mlk-grov.Tildels skiktet med opp til mm-tykke biot.skikt ondulerende.Enstaka cm-tykke pegm.band. svak imp. Sl, Gn, Cp, Py	30° 55°	<i>0.30</i>	<i>0.20</i>	<i>0.99</i>		<i>6.75</i>	
6.70 - 9.00	2.30	Biot.gn. Mørk,mlk.rel.homogen Spr. gr. 1-2 mm. Imp. Py spor Cp(Sl?)	55° 70°	<i>0.04</i>	<i>0.11</i>	<i>0.17</i>		<i>7.50</i>	<i>6.70-270</i>
9.00 - 13.20	4.20	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk.rel.mass.tildels gr.førende.(Stichtolitisk) fortrinnsvis i de hbl. rikere partier. Svak imp. Py	55°						
13.20 - 28.50	15.30	Hbl.gn. Mørk fin-grov-mlk. Veksl. med dm-tykke biot.gn.part. samt tildels båndet med opp til cm-tykke pegm.band Spredte gr. 1-3 mm. Spor Py (Ved 27.80-27.90 biotsk.) Rotazon?	50° 60°						

Lokalitet: *Profil: 44.120*

Borehull: 550

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning: + 60

Høyde

Lengde

: *17.9-78*: *X: 925.415,4 Y: 44.117,5*

: S

: *-54,4*: *26,95 m*

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	2 gl.gn.alm. lys,mlk. Svak imp. <u>Py</u> spor <u>Sl</u>	70° 80°	<i>0,65</i>	<i>0,18</i>	<i>1,35</i>		<i>4,64</i>	
1.20 - 1.70	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. spor hbl. enkelte <u>Sl</u> striper <u>imp.Py</u> Spor <u>Cp</u>	50-70° 70°	<i>1,14</i>	<i>0,80</i>	<i>4,51</i>		<i>7,23</i>	
1.70 - 5.00	3.30	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. rel.mass. enkelte gr. 1-2 mm. svak impr. <u>Py</u>	80°	<i>0,03</i>	<i>0,12</i>	<i>0,12</i>		<i>7,79</i>	<i>1,70-2,70</i>
5.00 - 8.60	3.60	hbl.gn. Rel.mørk,mlk. rel.mass. Enkelte cm-tykke pegm. band. Spr. gr. 1-3 mm.	60° 70°						
8.60 - 10.20	2.60	hbl.gn. Rel.mørk,grovk. gr.førende 1-3 mm. spor <u>Py</u>	60° 70°						
10.20 - 13.10	2.90	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk-grovk. Imp. <u>Py</u> spor <u>Cp</u> . Gr.førende 0,5 - 1.0 mm.	70°						
13.10 - 18.80	5.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,hbl.førende dm-tykke partier m. hbl.gn samt stichtolitisk. gr- førende, fortrinnsvis i de hbl.rikere partier. Svak impr. <u>Py</u> , spor <u>Cp</u>	80°						
18.80 - 20.80	1.50	hbl.gn. mørk,mlk-grov. veksl. med cm-tykke band pegm. og biotrike render. Spredt gr. 1-5 mm.	50° 70°						

Lokalitet:

Borehull: 550

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
20.30 - 25.80	5.00	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.-fink. tildels mass. med enkelte opptil cm-tykke band biot.hbl. Spr. gr. 1-3 mm fortrinnsvis i hbl. biot.band svak imp. <u>Py</u>	70° 80°						
25.80 - 26.50	1.10	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. enkelte dm-tykke parti biot-hbl.gn. Gr.førende. 1-3 mm.	70° 80°						
28/8 1978 Stellan Burman									

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER

Dato : juni 1978

Koordinater : 925.413,0 X 44.018.8 Y

Borehull: 549 profil 44.020

Retning : nord

Helling/stigning : - 45°

Høyde : - 58,4 m

Lengde : 34,55 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S ^o	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.25	0.25	2-gl.gn. med gr. py-impr.	15°,20						
0.25 - 4.65	4.40	gr.hbl.-(biot.)gn. sv. py-impr. gr.rik foldet fra 0.25 til m(0-75°) S=0 på 0.5 m, 1,7 m, 2,4 m, 3,3 m.	v						
4.65 - 5.85	1.20	2-gl.gn.,bp. Foldet D? mlk.	75,0 50						
5.85 - 6.50	0.65	sv.malmimpr. 2-gl.gn.	60,55	0.27	0.32	0.71		9.11	
6.50 - 7.00	0.50	god malm skarnh.gn.+pegm. mørke sl.	50						
7.00 - 7.75	0.75	spredt malmimpr. 2-gl.gn. Rel.gl.(musk.)-rik,mlk.	45,60	0.70	0.30	3.19		7.01	
7.75 - 7.85	0.10	god malm pegm. mørke sl.							
7.85 - 9.70	1.85	malmstr. + impr. Overveiende <u>lys</u> sl. musk.gn. noe biot. og hbl.	65,30 55,40	0.49	0.42	1.89		7.95	
9.70 - 10.00	0.30	god malm skarnh.gn. <u>Lyse</u> sl, py, ga.	40	2.23	0.09	10.67		9.35	
10.00 - 12.10	2.10	god stripet malm skarnh.gn.med karb. og hbl. På 12 m noe anhydritt (violett).	50,70	1.33	0.39	4.08		7.24	
12.10 - 13.50	1.40	2-gl.gn. Spredt noe malmimpr.	70,40	0.34	0.22	0.65		7.24	
13.50 - 13.70	0.20	hbl.gn. Lys, noe biot. Sterkt py-impr.	70						

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER

Dato : juni 1978

Koordinater : 925.413,0 X 44.018.8 Y

Retning : nord

Helling/~~stigning~~ : - 45°

Høyde : - 58,4 m

Lengde : 34,55 m

Borehull: 549 profil 44.020

side 2

Dybde	L	Bergart	S°	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.70 - 14.60	0.90	god stripet malm hbl.biot.gn.	Steilt foldet Rel.lys	70,35 0,30 70,50	1.68	0.35	3.89	9.11	
14.60 - 15.25	0.65	pegm.							
15.25 - 16.05	0.80	m.sv.malmimpr. musk.gn.	Py og litt honningblende mlk.,noe biot.	50,40	0.24	0.20	0.62	6.08	
16.05 - 16.50	0.45	god malm skarnh.gn.			1.76	0.98	2.24	9.82	
16.50 - 16.90	0.40	malmimpr. 2-gl.gn.		40,50 60,50					
16.90 - 21.40	4.50	2-gl.gn.	Noe gr. På 17.5 m $\frac{1}{2}$ cm py $\frac{1}{2}$ ga. Fra 18,5-21 m	40,25 0,60 40					
21.40 - 21.60	0.20	pegm.	små årer ga + cp.						
21.60 - 23.15	1.55	musk.gn.	Noe biot.	20,0 35,45					
23.15 - 29.25	6,10	2-gl.gn.	med gr.	35,45					
29,25 - 30,60	1.35	biot.gn.	Noe musk.Mlk.Steilt foldet	40,0 60,60					
30,60 - 31,00	0.40	2-gl.gn.		20					
31.00 - 32.20	1.20	biot.gn/sk.	Spredt noe hbl.Grovk. sv.impr. med py,po,cp. Virker "durchbewegt"	30,40 25,35					
32.20 - 33.25	1.05	2-gl.gn.alm.	Noe gr. Mlk.	50,30					
33.25 - 33.65	0.40	biot.gn.	Med gr. Grovk.	20,45					
33.65 - 34.55	0.90	2-gl.gn.b.d.	Noe gr. Mlk.	45					
14/7 1978 A. Kruse									

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER

Dato : juni 1978

Koordinater : 925.413,1 X 44.018.5 Y

Retning : nord

Målingstigning: + 30°

Høyde : - 54,6 m

Lengde : 28.45 m

Borehull: 548 profil 44.020

Side 1

Dybde	L	Bergart	S ^o	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	Malmstr. og impr. Malmstr. i grågrønn 2 gl.gn. Rel.musk.rik.	35,50, 60,50	0.61	0.17	1.27		4.21	
1.60 - 2.05	0.45	2 gl.gn. med gr.	40						
2.05 - 2.60	0.55	spredte malmstr. og impr. 2 gl.gn.	35						
2.60 - 3.65	1.05	2-gl.gn. Spredt gr.	40,35	0.73	0.19	1.13		5.14	
3.65 - 4.15	0.50	malmimpr. 2-gl.gn.	55						
4.10		2-gl.gn.	50,40						
4.15		Forkastning parallell 4.10 m, disk. 4.20 m	40	0.43	0.16	0.86		4.21	
4.20		2-gl.	40						
		Strøkforskjell ff- 4.20 m = ca. 20°, forøvrig ca. loddrett S på 4.20m (100°).ff med i mm biot.							
4.15 - 7.20	3.05	2-gl.gn. Rel.musk.rik i starten spredt gr.	40,30 20,10	0.43	0.16	0.86		4.21	
7.20 - 9.50	2.30	spredt malmimpr. 2-gl.gn. flere(2-3?) foldeombøyn. (på 9.1 m)	ca.0 45.0						
9.50 - 10.00	0.50	god malm skarn grågrønn	10,45						
10.00 - 10.80	0.80	2-gl.gn. spredt gr.	35,0	1.62	0.36	2.57		4.67	
10.80 - 11.50	0.70	stripet malm gl.gn.-skarn lys,grågrønn skarn. svakt foldet rundt 0°	15.0 15,0						
11.50 - 12.65	1.15	2-gl.gn. med gr. Svakt foldet rundt 0	0						
12.65 - 13.25	0.60	malmstr. 2-gl.gn. svakt foldet rundt Litt grågrønn skarn.	0	0.38	0.21	1.43		5.84	

Lokalitet: MOFJELLET GRUBER

Dato : juni 1978

Koordinater : 925.413,1 X 44.018.5 Y

Retning : nord

Hellingstigning: + 30°

Høyde : - 54,6 m

Lengde : 28.45 m

Borehull: 548 profil 44.020

Side 2

Dybde	L	Bergart		S ^o	Analyser					Prøve m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.25 - 13.90	0.65	God malm 2-gl.gn.	Svakt foldet rundt Med grågrønn skarn rel. mye po	0						
13.90 - 14.00	0.10	2-gl.gn.	med pegm.							
14.00 - 14.60	0.60	stripet malm 2-gl.gn.	svakt foldet rundt Litt grågrønn skarn	0 40,50						
14.60 - 15.40	0.80	2 gl.gn.	med granat	50,55	0.27	0.11	0.87		2.80	
15.40 - 16.00	0.60	spredte malmstr. 2-gl.gn.		55, 40,20						
16.00 - 16.50	0.50	spredt malmimpr. 2-gl.gn.	Litt pegm.	15,0, 15						
16.50 - 18.70	2.20	2-gl.gn.	med gr.	30,45, 55	0.06	0.03	0.11		2.01	
18.70 - 20.05	1.35	spredte malmstr. 2-gl.gn.		45,25, 35						
20.05 - 20.35	0.30	spredt malmimpr. 2-gl.gn.		35,0						
20.30		ditto		50	0.43	0.09	0.70		3.01	
20.35		forkastning	Ca. samme strøk som på 20.30 og 20,40	15						
20,40		ditto som før	Vinkel ff-20,30 m:ca.60° " " 20,40m:ca.145°	20						
20.35 - 21.20	0.85	spredte malmstr. 2-gl.gn.		20,10						
21.20 - 21.90	0.70	ditto		10,20	0.35	0.16	0.74		4.88	
21.90 - 23.20	1.30	m.sv. malmimpr. 2-gl.gn.		20						

Lokalitet: NOFJELLET GRUBER

Borehull: 548 profil 44.020

Dato : juni 1978
 Koordnater : 925.413,1 X 44.018.5 Y
 Retning : nord
 Helling/stigning : + 30°
 Høyde : - 54,6 m
 Lengde : 28.45 m

Side 3

Dybde	L	Bergart	S °	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
23.20 - 24.70	1.30	2-gl.gn. Py-impr., spredt noe gr.	20,5 30						
24.70 - 27.00	2.30	gr.hbl.biot.gn. Svakt foldet rundt 0	30,0						
27.00 - 27.35	0.35	kverts.	10						
27.35 - 28.50	1.15	gr.amf. svakt foldet rundt 0	20.30 0.20						
12.7. 1978 A. Kruse									

Lokalitet: Profil 44.020

Borehull: 547

Dato : Mai/jun.-78
 Koordinator : X:925.413.0 Y:44.018.6
 Retning : N
 Helling/stigning: + 45°
 Høyde : - 54.7
 Lengde : 22.15 m.

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.10	2.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. rel.mass. kv.rik, sv.imp. <u>Sl,Cp, Py</u>	40°	0,43	0,13	0,94		3,75	
2.10 - 3.00	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels mass. kv.rik. Spr. diffuse gr. 1-3 mm. Imp. <u>Py</u>	55°	0,05	0,02	0,08		2,35	
3.00 - 3.50	0.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. mass. kv.rik, sv. imp. <u>Py</u>		0,04	0,03	0,05		2,03	
3.50 - 3.80	0.30	Pegm.		0,07	0,05	0,06		1,09	
3.80 - 4.40	0.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. mass. kv.rik. spor <u>sl</u> , Svak imp. <u>Py</u>		0,17	0,06	0,51		2,66	
4.40 - 5.10	0.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. rel.mass. kv.rik, tildels hbl.førende stripet imp. <u>Sl,Cp,Py</u>	50°	0,80	0,41	2,95		7,67	
5.10 - 6.60	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,tildels mass. kv.rik, enkelte pegm.band spor gr. Fra 6.30-6.35 spor <u>Sl</u> . Svak imp. <u>Py</u>	40° 50°	0,09	0,04	0,29		3,44	
6.60 - 7.20	0.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. rel. mass. kv.rik tildels hbl.førende imp. <u>Sl,Cp,Py</u> .		0,27	0,27	2,76		9,10	
7.20 - 7.70	0.50	2 gl.gl.alm. Rel.lys,mlk-fink. Rel.mass. kv.rik. Imp. <u>Sl,Py</u>	40	0,49	0,17	1,73		5,32	
7.70 - 8.80	1.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. Rel.mass. kv.rik, tildels hbl.førende og biot.rikere parti. imp. <u>Sl,Cp,Py</u>	40°	0,51	0,32	3,93		8,14	
8.80 - 9.70	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels kv.rik og hbl.førende. Imp. <u>Sl</u> , <u>Cp, Py</u>	30° 40°	1,28	0,29	2,85		6,73	

Lokalitet:

Borehull: 547

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
9.70 - 11.20	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.vekslende m/ parti 2 gl.gn.alm. Spor gr. <u>Sl,Cp,Py</u>	40°	0,41	0,18	1,08		4,70	
11.20 - 17.00	5.80	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. vekslede m/parti hbl.gn. Fra 15.90- 16.10 stichtolitisk Spr. gr. 1-3 mm. God imp. <u>Py</u>	50°	0,03	0,23	0,09		8,61	11,20-12,20
17.00 - 22.25	5.25	Hbl.-biot.gn. Mørk,mlk. rel. mass., tildels gr. rik 1-3 mm. Imp. <u>Py</u>	50°						

9.6. 1978
Holger Pantdalsli

Lokalitet: *Profil 44.020*

Borehull: 546

Dato : *Mai - 78*
 Koordinator : *X: 925.410,9 Y: 44.020,9*
 Retning : *S*
 Helling/stigning: *-70°*
 Høyde : *-58,4*
 Lengde : *26.10 m*

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. med cm-brede pegm.band. spor <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Py</u> .							
0.30 - 1.10	0.80	Hbl.gn. Mørk,mlk, tildels gr.rik 1-3 mm. Imp. <u>Py</u> .	70° 80°						
1.10 - 1.70	0.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. Spr. cm-brede bånd. Pegm. imp. <u>Py</u> .		0.14	0.05	0.23		2.09	
1.70 - 2.70	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. mass. god imp. <u>Py</u> spor <u>Sl</u> , <u>Cp</u>		0.24	0.20	0.41		8.75	
2.70 - 3.45	0.75	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. tildels kv.rik. imp. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Py</u>	70° 80°	0.15	0.24	0.76		6.54	
3.45 - 3.65	0.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. Kv.rik.Hbl.-førende. god. imp. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Gn</u> . <u>Py</u> .		2.54	0.14	8.21		7.64	
3.65 - 4.30	0.65	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. mass. kv.rik, Spor gr. imp. <u>Sl</u> <u>Gn</u> , <u>Py</u> .		0.56	0.30	0.25		4.86	
4.30 - 5.10	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel. lys,mlk. tildels kv.-rik. spor hbl. imp. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Py</u>	65°	0.56	0.40	0.78		8.54	
5.10 - 6.50	1.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. rel.mass. kv.rik. tildels hbl.førende fortrinnsvis m/imp. <u>Sl</u> (lys) <u>Gn</u> , <u>Cp</u> , <u>Py</u>	60° 70°	1.20	0.21	5.68		8.91	
6.50 - 8.05	1.55	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.rel. mass. tildels kv.rik. God imp. <u>Py</u> Spor <u>Sl</u> , <u>Gn</u> , <u>Cp</u> .	60°	0.33	0.12	0.99		4.00	
8.05 - 9.40	1.35	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. rel.mass. tildels kv.rik.vekslende m.dm.brede biot.rike parti	50° 70°	0.44	0.07	0.05		1.84	

Lokalitet:

Borehull: 546

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
9.40 - 10.40	1.00	2 gl.gn.b.d. Fra 9.05 - 9.10 spor <u>Gn,Cp</u> Imp. Py.		0.08	0.03	0.04		2.09	
10.40 - 10.65	0.25	Malm Rel.mørk,mlk,mass. spor gr. 1-3 mm.		5.14	1.70	5.75		8.36	
10.65 - 11.80	1.15	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.-fink. rel.mass. tildels kv.rik. fra 11.40-11.80 hbl.førende bånd fortrinnsvis m/imp. <u>Sl,Cp</u> , <u>Py. Gn.</u>	60° 70°	0.37	0.40	0.89		5.64	
11.80 - 14.40	2.60	Diopsid Skarn m/imp. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>		2.84	0.50	3.47		3.81	
14.40 - 14.90	0.50	2 gl.gn.alm. lys,mlk. svak imp. <u>Py</u>	50°	0.65	0.12	2.04		5.09	
14.90 - 15.70	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. tildels hbl.førende, imp. <u>Sl,Cp,Py</u>	50°	1.03	0.34	4.77		14.36	
15.70 - 18.00	2.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk. tildels mass., kv.rik,vekslende m/dm brede parti 2 gl.gn.b.d. Svak imp. <u>Py.</u>	60° 70°	0.03	0.03	0.12		3.09	
18.00 - 19.30	1.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. Hbl.før. tildels kv.rik. Imp. <u>Sl,Cp</u> <u>Py</u>	60° 70°	0.78	0.23	3.54		13.45	
19.30 - 23.90	4.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. kv.rik. mass. vekslende m/parti 2 gl.gn.b.d. Spor gr. 1-3 mm Svak imp. <u>Py.</u>	70°	0.05	0.06	0.87		4.18	19.30-23.90
23.90 - 24.30	0.40	Pegm.							

Lokalitet:

Borehull: 546

3.

Dato :
 Koordinater :
 Retning :
 Helling/stigning :
 Høyde :
 Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
24.30 - 25.25	0.95	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. kv.rik, spor hbl. Gr.rik 1-4 mm, svak imp. <u>Py</u> , spor <u>Po</u>	70°	}	0.21	0.26	1.07	10.91	
25.25 - 26.10	0.85	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. tildels kv.rik. Ondulerende, imp. <u>Sl</u> , <u>Cp</u> , <u>Py</u> , <u>Po</u>	70°						
2/6 1978 Holger Pantdalsli									

Lokalitet: *Profil 43.880*

Borehull: 545

Dato : *11/11 78.*
 Koordinator : *X: 925.404.3 Y: 43.897.5*
 Retning : *N*
 Helling/stigning: *+55°*
 Høyde : *-79.6 m*
 Lengde : *56.30 m*

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.80	3.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.-fink. veksl. m/2 gl.gn.b.d. enkelte pegm.band. Spr. diffuse gr. 0.5 - 1 mm svak imp. Py	50° 60°						
3.80 - 5.10	1.30	kv-pegm. Svake spor cp, Gn, Sl, Py							
5.10 - 5.80	0.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ 2 gl.gn.b.d. Spor gr. 0.5- 4 mm. Fra 5.75-5.80 svake spor Sl, Py.		0.11	0.05	0.23		2.60	
5.80 - 6.10	0.30	Pegm. Svake spor Sl,Gn,Cp,Py.		0.04	0.03	0.05		1.38	
6.10 - 8.20	2.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. Svak imp. m/rikere parti Sl,Cp,Py	40° 60°	0.24	0.13	0.63		4.67	
8.20 - 8.60	0.40	Pegm. Vekslende m/parti 2 gl.gn. b.d. Svak imp. Py		0.08	0.07	0.21		2.08	
8.60 - 9.80	1.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk.Enkelte cm-brede pegm.band. Svak imp. Sl,Cp,Py	40°	0.03	0.03	0.09		2.25	
9.80 - 10.25	0.45	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,grovk.-fink. Hbl.- førende. Fra 10.05 - 10.15 kv.rik, god stripet imp. Sl,Cp,Gn,Py.	40°	0.47	0.63	3.03		9.17	
10.25 - 11.20	0.95	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink. Kv.rik, til- dels mass. Spor Sl, Svak imp. Py.	60°	0.22	0.10	1.00		3.29	
11.20 - 11.35	0.15	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende, kv.rik god imp. Sl,Cp,Py		0.12	0.63	4.12		9.17	
11.35 - 11.70	0.35	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink. Kv.rik, tildels mass. Imp. Py	40° 60°	0.01	0.03	0.02		1.38	

Lokalitet:

Borehull: 545

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
11.70 - 11.95	0.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. Hbl.førende kv.rik. God imp. <u>Sl,Cp,Py</u>		1.54	0.43	4.93		9.87	
11.95 - 12.45	0.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. Tildels mass. imp. <u>Py</u>	50°	0.01	0.08	0.14		2.60	
12.45 - 12.85	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk.Hbl-førende.Fra 12.65-12.75 2 gl.gn.alm. Striper imp. <u>Sl, Cp, Po, Py</u>		0.15	0.66	5.59		15.40	
12.85 - 19.10	6.25	2 gl.gn.alm. Rel.lys,m/mørke parti, Mlk. vekslende m/biotrikere part tildels mass. Enkelte dm-brede pegm.band, spredte diffuse gr. 1-3 mm. Svak imp. <u>Py</u> .	50° 60°	0.01	0.03	0.05		2.08	12.85-13.85
19.10 - 19.60	0.50	Pegm.							
19.60 - 20.10	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.tildels mass. Spr. diffuse gr. 0.5-1 mm, Imp. <u>Py</u> .		0.01	0.03	0.05		2.60	
20.10 - 20.40	0.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. Kv.rik, mass. Str. imp. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>		2.54	0.11	2.79		2.60	
20.40 - 21.30	0.90	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. Tildels kv.rik, mass. spr. gr. 0.5-1 mm. Svak imp. <u>Py</u> .	50° 60°	0.01	0.02	0.05		1.56	
21.30 - 21.95	0.65	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.kv.rik.Spor gr. mass. Spr. hbl.førende band fortrinnsvis med god imp. <u>Sl, Cp, Gn, Py</u>		0.74	0.08	3.05		3.46	
21.95 - 23.30	1.35	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. tildels kv.rik,spr. hbl.førende band.Str. imp. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	60°	1.71	0.14	2.79		7.62	

Lokalitet:

Borehull: 545

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
23.30 - 24.10	0.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink.enkelte biot.rike band m/spor gr. Ved 23.90 spor Sl, Svak imp. Py.	50° 65°	0.39	0.08	0.70		3.29	
24.10 - 24.80	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. Fra 24.25 - 24.30 pegm.band m/spor hbl. Sl,Cp, svak imp. Py.	50°						
24.80 - 29.30	4.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.tildels mass. svake spor gr. Py.	50°						
29.30 - 29.50	0.20	Pegm.							
29.50 - 33.80	4.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. tildels mass. enkelte pegm.band. Spr. gr. 0.5-1 mm.Svak imp. Py	60°						
33.80 - 34.30	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk.Spor Sl,Cp,Gn,Py.	50°						
34.30 - 38.50	4.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink.tildels mass. kv.rik,Spr. diffuse gr. 0.5-2 mm.	50°	0.02	0.02	0.05		1.90	37.50-39.50
38.50 - 38.80	0.30	Pegm.		0.28	0.09	0.61		1.73	
38.80 - 39.80	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. str. imp. Sl,Cp,Cu,Py	50°	1.35	0.37	2.82		5.19	
39.80 - 41.90	2.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink.tildels mass.kv.rik,svake spor Sl,Gn,Py	50°	0.19	0.09	0.56		2.42	
41.90 - 43.10	1.20	2 gl.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk.Veksl. m/hbl.førende parti fortrinnsvis m/imp. Sl,Cp Gn,Py	50°	1.11	0.28	2.68		4.67	
43.10 - 44.60	1.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-grovk.Veksl. m/biot.rike parti,tildels ondulerende,svak imp.Sl,Cp, god imp. Py.	50°	0.68	0.22	1.30 1.80		6.87	

Lokalitet:

Borehull: 545

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

4.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
44.60 - 51.70	7.10	Biot-hbl.gn. Mørk,mlk-grovk. vekslende m/cm-brede band hbl.gn. Spredte gr. 0.5-3mm. God impr. <u>Py</u> .	50°						
51.70 - 52.35	0.65	Hbl.gn. Mørk,mlk-fink. rel.mass. gr.rik 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>							
52.35 - 56.30	3.95	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk-grovk, veksl. m/dm-brede gn.band. Fortrinnsvis gr.rik. Gr.førende 1-3 mm. Imp. <u>Py</u> .	50°						

24/5 1978

Holger Pantdalsli

Lokalitet: *Profil 44.020*

Borehull: 544

Dato : *Mai 78.*
 Koordinater : *X: 925.412.4 Y: 49.019.4*
 Retning : *SN*
 Helling/stigning: *-70°*
 Høyde : *-58.4 m*
 Lengde : *38.20 m*

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	Hbl.gn. Mørk, mlk.tildels mass, kv. gr.rik 1-3 mm. Fra 0.10 - 0.20 peger. Imp. <u>Py</u>	50°						
1.00 - 2.45	1.45	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.tildels mass. kv. gr.rik 1-5 mm. Imp. <u>Py</u>							
2.45 - 2.65	0.20	Pegm.							
2.65 - 4.70	2.05	2 gl.gn.b.d. Rel. mørk, mlk-grovk. tildels kv.rik, imp. <u>Py</u>	50°						
4.70 - 5.30	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. Str. imp. <u>Sl, Cp, Py</u>	50°	<i>0.07</i>	<i>0.11</i>	<i>0.21</i>		<i>5.56</i>	<i>3.70-4.70</i>
5.30 - 6.80	1.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. tildels mass. kv.rik. Str. imp. <u>Sl, Cp, Gn, Py</u> , fortrinnsvis m/spor hbl.	50° 70°	<i>0.85</i>	<i>0.48</i>	<i>2.99</i>		<i>7.79</i>	
6.80 - 7.60	0.80	Malm Skarn type, veksl. m/ 2 gl. gn. b.d.		<i>0.92</i>	<i>0.41</i>	<i>3.53</i>		<i>6.49</i>	
7.60 - 8.50	0.90	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. rel.mass. kv.rik. Fra 8.40-8.50 malm Svak imp. <u>Py</u> .		<i>7.31</i>	<i>0.31</i>	<i>36.41</i>		<i>8.16</i>	
8.50 - 11.20	2.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. rel.mass. kv.rik. Spor gr. Sv.imp. <u>Py</u>	70°	<i>1.85</i>	<i>0.29</i>	<i>2.89</i>		<i>3.71</i>	
11.20 - 11.70	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-fink.Tildels mass.kv.rik fra 11.20-11.30 imp. <u>Sl, Cp, Py</u>	70°	<i>0.06</i>	<i>0.03</i>	<i>0.09</i>		<i>2.04</i>	<i>8.50-9.50</i>
11.70 - 11.85	0.15	Biot.gn. Mørk,grovk-mlk. Hbl.førende god imp. <u>Sl,Cp,Py</u>		<i>0.29</i>	<i>0.04</i>	<i>0.51</i>		<i>1.86</i>	<i>9.50-10.20</i>
11.85 - 14.30	2.45	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels kv.-rik, spor hbl. str. imp. <u>Sl, Cp, Gn, Py</u>	70°	<i>0.16</i>	<i>0.05</i>	<i>0.21</i>		<i>2.04</i>	<i>10.20-11.20</i>
				<i>0.19</i>	<i>0.26</i>	<i>0.41</i>		<i>4.82</i>	
				<i>1.32</i>	<i>0.99</i>	<i>4.22</i>		<i>10.57</i>	
				<i>1.24</i>	<i>0.53</i>	<i>2.13</i>		<i>8.72</i>	

Lokalitet:

Borehull: 544

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
14.30 - 19.90	6.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.tildels mass. kv.rik spr. gr. 1-2 mm. svak impr. Py	70°	0.21	0.14	0.57		5.19	1430-1530
19.90 - 20.70	0.80	Biot.gn. Mørk,grovk-mlk. m/cm-brede band pegm. Spr. str. Sl, Cp, Py.	50°	0.06	0.02	0.14		2.41	1890-1990
20.70 - 20.95	0.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.spor gr.1-2mm	50°	0.00	0.31	1.19		15.95	
20.95 - 21.85	0.90	Biot.gn. Mørk,grovk-mlk. veksl. med parti 2 gl.gn.b.d. Spor gr. 1-2 mm. Svak imp Py,Po	55°	0.00	0.07	0.23		8.72	
21.85 - 22.10	Pegm.			0.01	0.09	0.21		9.09	
22.10 - 23.50	1.40	2 gl.gn.b.d. Mørk,grovk.-mlk.Veksl. med cm-tykke band 2 gl.gn.b.d. og pegm. Spor Sl,Cp,Py,Po	55°	0.01	0.03	0.06		2.23	
23.50 - 24.70	1.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. rel. mass. kv.rik.Spr. biot.rike band spor gr. 0,5-1 mm. Svak impr. Py	50°	0.01	0.17	0.36		4.82	
24.70 - 26.00	1.30	Biot.gn. Mørk,grovk-mlk.Veksl. med cm-brede band pegm. Enkelte str. Sl, Cp, Py, Po	50°	0.02	0.07	0.09		4.27	
26.00 - 26.60	0.60	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. m/biot.rike band. Svak imp. Py	50°	0.20	0.23	1.11		8.16	
26.60 - 27.20	0.60	Pegm.		0.02	0.06	0.09		4.08	
27.20 - 28.60	1.40	2 gl.gn.alm. Rel. lys, mlk. rel.mass. kv.rik, spor gr. 0,5-1 mm Svak imp. Py.	60°						
28.60 - 30.10	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. Vekslende m/dm-brede biot-band.Svak imp. Py	50°	0.01	0.19	0.14		7.98	29.10-30.10

Lokalitet:

Borehull: 544

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
30.10 - 31.70	1.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. med dm-brede band biot.gn. fortrinnsvis m/striper <u>Sl</u> <u>Cp, Py, Po</u>	50°	0.52	0.19	1.82		9.83	
31.70 - 32.50	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. svak imp. <u>Py</u>	65°	0.01	0.03	0.07		3.71	
32.50 - 34.50	2.00	2 gl.gn.b.d. Rel. mørk,mlk. spr. hbl. førende band (dm-brede). fortrinnsvis m/gr. 1-3 mm. Sv. imp. <u>Py</u>	50° 60°						
34.50 - 35.05	0.55	Hbl.gn. Mørk,mlk.gr.rik.1-3 mm. Svak imp. <u>Py</u>							
35.05 - 35.50	0.45	Biot.gn. Mørk,grovk.imp. <u>Py</u>	60°						
35.50 - 35.70	0.20	Pegm.							
35.70 - 36.70	1.00	Hbl.gn. Mørk,mlk.mass.gr.rik 1-3 mm Stichtolitisk, imp. <u>Py</u>							
36.70 - 37.30	0.60	Biot.gn. Mørk,grovk. spr. gr. 1-2 mm Imp. <u>Py</u>	40° 50°						
37.30 - 38.20	0.90	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk-grovk. Spr. gr. 1-2 mm. Imp. <u>Py</u> .	60°						

24.5. 1978
Holger Pantdalsli

Lokalitet: *Profil 44.270*

Borehull: 543

Dato : *Mai-78*
 Koordnater : *X: 925.393, Y: 44.270,5*
 Retning : *0*
 Helling/stigning: *- 88°*
 Høyde : *- 71,6*
 Lengde : *24.20 m*

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.10	0.10	Hbl.gn. Mørk, mlk. gr.førende 1-3mm spor Py							
0.10 - 1.25	1.15	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. rel.kv.rik. dm.tykke partier med spor hbl. gr. 1-2 mm. ved 0.20-0.30 sl. 0.70-0.80 sl 1.15-1.25 sl svak impr. Py	50°	1.24	0.30	1.56		6.77	
1.25 - 2.20	0.95	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. kv.rik. mass. svak impr. Py.	60° 70°	0.06	0.04	0.02		1.43	
2.20 - 3.25	1.05	2 gl.gn. Mørk, mlk. kv.rik, hbl. Rel. god malm. Sl, Cp, Gn, Py.		0.25	0.58	3.55		19.25	
3.25 - 4.80	1.55	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk-grovk. jevnt bandet med cm-tykke hbl. band. Impr. Sl, Cp, Py Enstaka gr. 1-2 mm	80°	0.08	0.22	0.82		7.66	
4.80 - 5.40	0.60	2 gl.gn.alm. Lys, fink. kv.rik (applitisk) små gr. 0.5-1.0 mm. mass.		0.36	0.08	0.16		8.88	
5.40 - 5.70	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. Spor hbl. diffuse gr. impr. Py Spor Sl, Cp	80°	0.08	0.06	0.04		8.29	
5.70 - 5.95	0.25	Pegm.		0.04	0.05	0.09		8.18	
5.95 - 6.55	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys mlk. Spr. gr. 1-2mm 1-2 mm. spor Sl, cp, py	80° 90°	0.06	0.05	0.11		8.58	
6.55 - 7.05	0.50	biot.gn. Mørk, mlk. spor Cp, Sl, Py	70°	0.07	0.28	0.12		10.06	
7.05 - 8.30	1.25	biot.hbl.gn. Mørk, mlk.-grovk. Skiktet. str. impr. malm sl, cp, gn, Py, po. (Cp som klyser)	70° 80°	1.46	1.41	3.72		15.35	

Lokalitet:

Borehull: 543

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
8.30 - 10.70	2.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grov-mlk. jevnt bandet med cm-tykke hbl.,pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py.	70° 80°	0.09	0.06	0.26		4.94	8.30-9.30
10.70 - 11.30	0.60	hbl.gn. Mørk,mlk.rel.mass. Spr. gr. 1-2 mm	70° 80°						
11.30 - 15.00	3.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. jevnt skiktet og bandet med mm-tykke biot. skikt. og cm-tykke hbl.før. band. spr. gr. 1-2 mm. svak impr. Py.	70° 80°						
15.00 - 18.00	3.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende spr. gr. 1-2 mm. 15.40-15.60 spor sl,ep,gn 16.50-16.60 spor sl. Svak impr. Py.	70°	0.09	0.09	0.16		7.24	15.40-15.60
			80°	0.53	0.96	0.96		12.88	15.60-16.50
			80°	0.36	0.50	0.76		8.82	16.50-16.60
			80°	0.23	0.34	0.92		7.59	16.60-16.80
18.00 - 21.50	3.50	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. med enkelte cm-tykke hbl.førende band ved 19.40. Spor anhydrite	70° 80°	0.04	0.07	0.08		6.88	18.00-18.40
21.50 - 22.60	1.10	TAP							
22.60 - 23.20	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende	80°						
23.20 - 24.20	1.00	Pegm.							

9/5 1978
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.300

Borehull: 542

Dato : April-78
 Koordinater : X: 925.411,9 Y: 44.300.1
 Retning : N.
 Helling/stigning: -86°
 Høyde : 70.55
 Lengde : 26.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	biot.gn.	Mørk, mlk. ved 0.80 en cm-tykk biot.band. Spr. gr. 1-2 mm. (rotazon) Svak impr. Py.	80°					
1.00 - 2.05	1.05	Hbl.gn.	Mørk, mlk-grovk. enkelte gr. 1-2 mm.	80°					
2.05 - 2.60	0.55	Hbl.gn.	Mørk, mlk-grovk. gr. rik 1-10.0 mm. Tildels stichtolitisk.						
2.60 - 3.90	1.30	Hbl.gn.	Mørk, mlk.mass. spor gr. 0.5-1.0 mm.						
3.90 - 5.05	1.15	2 gl.gn.alm.	Lys, mlk-fink. rel. kv.rik Svak impr. Py.	70° 80°					
5.05 - 5.50	0.45	Pegm.							
5.50 - 5.60	0.10	Biot.sk.	Mørk, grovk Ondulerende Spr. gr. 1-2 mm.	70° 80°					
5.60 - 6.00	0.40	TAP							
6.00 - 6.20	0.20	Biot.sk.	Mørk, mlk-grovk. Spor gr. 1-2 mm. Spor Py.	70°					
6.20 - 7.20	1.00	Hbl. biot.gn.	Mørk, mlk. tildels mass. gr. førende 1-2 mm. Svak impr. Py.	70° 80°					
7.20 - 7.50	0.30	Biot.gn.	Mørk, mlk-grovk. Spor hbl. Svak impr. Py.	70°					
7.50 - 8.10	0.60	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk, mlk.Spr. gr. 1-2mm	80°					
8.10 - 10.00	1.90	Hbl.gn.	Mørk, mlk-grovk. veksl. med enstaka dm-tykke partier 2 gl.gn.b.d. samt tykke pegm.band.Gr.førende 1-3mm fortrinnsvis i hbl.gn.	60° 80°					

Lokalitet:

Borehull: 542

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

- 2 -

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
10.00 - 11.70	1.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. Tild. biot.gn. vekslende med cm tykke hbl.band samt opp til dm-tykke pegm.partier Impr. Py spor Cp	60° 80°	0.02	0.12	0.46		8.55	
11.70 - 13.40	1.70	biot.gn. Mørk,mlk-grovk. skiktet med mm-tykke biot.skikt. Str. impr. Sl,Cp,Py,Po	70°	0.29	0.64	3.11		19.07	
13.40 - 14.90	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel. lys,mlk. spor hbl. tildels kv.rik, str. I-pr. Sl, Py, Cp, Po	60° 70°	1.48	0.47	8.93		7.66	
14.90 - 15.30	0.40	biot.sk. Mørk,mlk. spor hbl. Sl,Py,Po,Cp	70°	0.35	0.60	8.28		9.27	
15.30 - 16.80	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. spor onhydrit ved 16.10 m. Impr. sl	70° 80°	1.26	0.46	3.21		7.13	
16.80 - 17.60	0.80	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.kv.rik.Spor Py,Sl Gn.	70° 80°	0.10	0.07	0.50		3.03	
17.60 - 18.10	0.50	Pegm.							
18.10 - 18.90	0.80	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. rel.kv.rik.Spor Py	80°	0.02	0.03	9.16		1.78	
18.90 - 19.40	0.50	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk. Rel.kv.rik. Strip. impr. Sl, Cp, Py	80°	2.54	0.33	5.82		8.91	
19.40 - 21.80	2.40	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink. Kv.rik. Spor gr. 1-2 mm. Spor sl.	90°	0.08	0.05	0.16		2.14	
21.80 - 23.90	2.10	2 gl.gn.b.d. Rel. lys,mlk. Enkelte dm-tykke hbl.band. Spor gr. 1-2 mm. Spor Py.	80°						
23.90 - 26.00	2.10	biot.hbl.gn. Mørk,mlk. Spr. gr. 1-3mm	80-90°						

8/5 1978
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 42.880

Borehull: 541

Dato : April 78.
 Koordinater : X: 925.404.3. Y: 43.897.5.
 Retning : N
 Helling/stigning: +45°
 Høyde : - 79.9 m
 Lengde : 74.65 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.35	1.35	2 gl.gn.b.d. Rel. mørk, mlk. rel. mass. spr. gr. 1-3 mm.	60°						
1.35 - 1.65	0.30	Pegm.							
1.65 - 2.85	1.20	2 gl.gn.b.d. Rel. mørk, mlk. rel. mass. tildels kv. rik. spr. gr. 1-2 mm.							
2.85 - 4.60	1.75	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. rel. mass. kv. rik, Spr. diffuse gr. 1-2 mm.	70°						
4.60 - 5.00	0.40	Pegm. Spor <u>Gn, cp, po</u>							
5.00 - 6.15	1.15	2 gl.gn.alm. Rel. lys, mlk. rel. mass, Spr. diffuse gr. 0.5-1 mm.	70°						
6.15 - 6.85	0.70	Pegm.							
6.85 - 8.05	1.20	2 gl.gn.alm. Rel. lys, mlk-fink. delvis mass, biot.rike parti, spor diffuse gr. 0.5-1mm	50°	0.20	0.10	0.54		3.03	
8.05 - 8.25	0.20	Pegm. Str. <u>sl, gn, cp, po, py.</u>		2.14	0.07	3.33		10.87	
8.25 - 8.55	0.30	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk. spor hbl. Imp. <u>sl, cp, Py, Po</u>	50°	0.98	0.18	1.81		7.64	
8.55 - 9.25	0.70	2 gl.gn.alm. Rel. lys, mlk, mass. kv. rik, spor <u>Py</u>		0.12	0.09	0.29		2.89	
9.25 - 10.00	0.75	2 gl.gn.b.d. Rel. mørk, mlk. enkelte str. m/ imp. <u>Sl, Cp, Py</u>	50°	0.39	0.19	1.06		4.75	
10.00 - 12.10	2.10	2 gl.gn.b.d. Rel. mørk, mlk. rel. mass, spor gr. 1-2 mm.	50°	0.02	0.03	0.08		2.39	
12.10 - 12.50	0.40	Malm (Skarn type)		0.88	1.37	5.20		9.17	
12.50 - 12.90	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel. mørk, mlk. mass, kv. rik enkelte str. <u>sl, cp, py</u>	50°	1.74	0.26	2.52		4.92	

Lokalitet:

Borehull: 541

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
12.90 - 13.60	0.70	Malm Enkelte parti m/hbl, b.d.gn. og pegm. Tildels kompakt malm, Po-rik.		0.36	0.29	1.59		24.62	
13.60 - 14.50	0.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink, tildels mass. spor diffuse gr. 0.5-1mm.	50°	0.06	0.04	0.19		2.02	
14.50 - 16.75	2.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk, veksl. m/hbl. kompakt malmførende parti, fra 14.50-15.00 lys sl. Imp. sl,cp,gn,py	50°	0.98	0.58	5.01		11.89	
16.75 - 17.50	0.75	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk-grovk. tildels hbl-førende. Imp. sl,cp,gn,Py	50°	0.86	0.18	2.88		8.49	
17.50 - 17.90	0.40	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. mass. svak imp. Py		0.03	0.05	0.06		1.43	
17.90 - 18.40	0.50	2 gl.gn.alm. Rel.mørk, mlk. mass. kv.rik, vekslende m/hbl. Sl,Gn,Py		2.38	1.05	2.40		10.53	
18.40 - 18.60	0.20	2 gl.gn.alm. Lys, mlk, mass, svak imp. Py		0.14	0.12	0.16		2.05	
18.60 - 19.45	0.85	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels kv. hbl.rik. Imp. sl, cp, gn, Py	40°	0.86	0.54	1.52		7.69	
19.45 - 20.90	1.45	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink. m/pegm.band, enkelte str. m/sl,cp,gn,Py	50°	0.27	0.22	0.48		4.58	
20.90 - 21.80	0.90	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk-grovk. hbl-førende, god imp. sl,cp, gn, Py		1.62	0.87	2.53		9.65	
21.80 - 22.70	0.90	2 gl.gn.alm. Rel. lys,mlk. mass, svake spor gr. Py.		0.19	0.12	0.32		2.95	
22.70 - 23.00	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.hbl.førende imp. sl,cp,gn,py	60°	1.72	0.46	2.76		10.15	
23.00 - 23.35	0.35	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. mass. svak imp. Py		0.01	0.05	0.05		1.70	
23.35 - 23.50	0.15	Malm		2.32	0.27	7.92		19.64	

Lokalitet:

Borehull: 541

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
23.50 - 26.20	2.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. tildels mass. ved 23.90 - spor Sl. Fra 25.70 - 25.85. Spor hbl, <u>sl</u> svak imp. <u>Py</u> Spor gr. 0.5-1 mm.		0.08	0.07	0.41		2.78	
26.20 - 26.50	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.hbl.førende, God imp. <u>sl,gn,Py</u>		1.04	1.79	5.74		17.35	
26.50 - 29.30	2.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-grovk. tildels mass. spr. dm-brede bånd pegm. spor diffuse gr. Svak impr. <u>Py</u> .	40° 50°	0.11	0.13	0.39		4.09	26.50-27.50
29.30 - 41.20	11.90	2 gl.gn.alm. Rel. lys,mlk. tildels mass. spr. pegm.band. spor gr. spor gr. 1-2 mm.	40° 50°						
41.20 - 41.40	0.20	Pegm.							
41.40 - 44.10	2.70	2 gl.gn.alm. lys, mlk.-fink. mass,kv.rik spor diffuse gr. 1-3 mm.							
44.10 - 44.60	0.50	Pegm.							
44.60 - 46.40	1.80	2 gl.gn.alm. lys,mlk-fink. mass. spor gr.							
46.40 - 46.60	0.20	Pegm.							
46.60 - 50.80	4.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-grovk, spr. pegm.band. svake spor gr. <u>Py</u>	40°	0.19	0.12	0.44		3.60	47.80-50.80
50.80 - 51.20	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.spor hbl.imp. <u>Sl,Cp,Py</u>		0.77	0.35	1.85		6.36	
51.20 - 51.95	0.75	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-grovk. imp. <u>Py</u> Spor <u>sl</u>	40°	0.30	0.18	0.75		5.56	

Lokalitet:

Borehull: 541

Dato:

Koordinater:

Retning:

Helling/stigning:

Høyde:

Lengde:

4.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
51.95 - 53.70	1.75	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-grovk, svak imp. sl, cp, gn, py	40°	0.65	0.22	1.17		5.24	
53.70 - 60.00	6.30	Hbl-biot. gn. Mørk,mlk,tildels mass. Fra 53.70-55.50 Stichtolitisk gr.førende 1-5 mm. Svak imp. Py.	40° 50°	0.03	0.05	0.12		5.89	53.70-54.70
60.00 - 74.65	14.65	Hbl-biotgn. mørk, mlk, tildels mass, enkelte dm brede pegm band, gr førende 1-3 mm svak imp Py							

10-5-78.

Holger Pantdalsen

Lokalitet: Profil 44.350

Borehull: 540

Dato : April -78

Koordinater : X: 925.418,2 Y: 44.349,2

Retning : E

Helling/stigning: - 45°

Høyde : -66,5

Lengde : 36.80 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk, rel. biot.rik impr. ep,sl,Py.	45°	0.08	0.22	0.18		2.81	
0.90 - 2.05	1.15	malm		4.43	0.67	12.66		10.14	
2.05 - 3.40	1.35	hbl.gn. mørk,mlk-grovk. tildels biot.rik. spor gr. 1-2 mm impr. Py,ep,sl?	45°	0.05	0.05	0.10		2.36	
3.40 - 3.65	0.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.biot.rik spr. gr. 1-2 mm. impr. Py,ep	50°	0.07	0.11	0.16		11.62	
3.65 - 5.40	1.75	Pegm.		0.03	0.02	0.07		11.64	
5.40 - 6.35	0.95	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.biot.rik. spor gr. 0.5-1 mm.Impr. Py	50°	0.02	0.09	0.05		2.53	
6.35 - 8.30	1.95	hbl.gn. mørk,mlk-grov-mlk. veksl. med cm-tykke band 2 gl.gn. b.d. og pegm.band. gr.før. fortrinnsvis i hbl.gn. Impr. Py, Po.	45°						
8.30 - 8.65	0.35	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor gr. 1-2 mm. impr. Py, Po	55°						
8.65 - 9.00	0.35	TAP							
9.00 - 9.25	0.25	hbl.gn. mørk,mlk. impr. Py.		0.03	0.16	0.03		2.20	
9.25 - 10.00	0.75	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk mlk. tildels hbl- førende. impr. Py	50°	0.03	0.18	0.08		2.85	
10.00 - 11.05	1.05	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk. kv.rik, spor hbl. ved 10.50. Impr. py, spor Sl.	55°	0.09	0.23	0.31		2.20	
11.05 - 11.40	0.35	malm		1.34	0.64	13.51		19.20	

Lokalitet:

Borehull: 540

Dato :
 Koordinator :
 Retning :
 Helling/stigning:
 Høyde :
 Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
11.40 - 11.80	0.40	2 gl.gn.b.d. rel.mørk, grovk. gl.rik. (nærmest gl.skiifer) ondulerende. impr. <u>py</u> spor <u>sl</u>	60°	0.28	0.46	1.62		11.78	
11.80 - 13.20	1.40	2 gl.gn.b.d. lys, mlk-fink. enkelte dm.- tykke partier som er hbl.- førende. impr. <u>Py</u> .	55°	0.07	0.07	0.19		6.05	
13.20 - 13.50	0.30	TAP							
13.50 - 14.45	0.95	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk.skiktet med filmtynne biot.skikt. spor gr. 1-2 mm. Svak impr. <u>Py</u> .	55°						
14.45 - 15.00	0.55	TAP							
15.00 - 16.70	1.70	2 gl.gn.b.d. lys, mlk.spor hbl. enkelte gr. 1-2 mm.	50°	0.06	0.07	0.04		8.02	
16.70 - 17.20	0.50	biot.sk. Mørke grovk. ondulerende spr. gr. 1-3 mm. impr. <u>py</u>	50°	0.03	0.10	0.12		10.15	
17.20 - 17.65	0.45	biot.sk. mørk, grovk.ondulerende spr. gr. 1-3 mm. Cm-tykke hbl.band.Str. imp. <u>sl, po, py, cp</u> .	50°	0.03	0.15	4.71		15.38	
17.65 - 18.50	0.95	hbl.biot.gn. mørk, mlk-grovk. veksl. med cm-tykke pegm.band.imp. <u>Py, Po</u>	55°	0.00	0.14	0.26		8.66	
18.50 - 19.95	1.45	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. tildels hbl. førende spr. gr. fortrinns- vis i de hbl.rikere part. 1-2 mm. Impr. <u>Py</u>	50°	0.00	0.11	0.09		7.83	
19.95 - 21.80	1.85	2 gl.gn.b.d. mørk mlk.-grovk. biot.rike tild. biot.sk) cm-tykke hbl.band med enk. gr. 1-2 mm impr. <u>Py, Po</u> , spor <u>sl, cp</u>	55°	0.10	0.32	0.55		12.83	

Lokalitet:

Borehull: 540

Dato :
 Koordinator :
 Retning :
 Helling/stigning :
 Høyde :
 Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
21.80 - 22.40	0.60	malm Mørk,biot.hbl.pegm. Cp,Py,Sl		0.37	0.76	3.86		17.83	
22.40 - 23.55	1.15	2 gl.gn.bd. lys,mlk,kv.rik,spor hbl. Impr. Py,sl,gn. (lys sl.)	50°	1.40	0.25	2.70		8.00	
23.55 - 23.95	0.40	biot.sk. Mørk,mlk-grovk.spor hbl. Stripet impr. Py,sl,cp.	40° 50	1.10	0.97	4.39		14.33	
23.95 - 24.15	0.20	biot. mørk,grovk. (rotazon?) Cp, Py, Sl?	40°	0.08	1.46	0.67		15.16	
24.15 - 25.90	1.75	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk.jevnt skiktet med mm-tynne biot.skikt. spor hbl. impr. Py,po,cp,sl.	50°	0.06	0.54	1.69		11.83	
25.90 - 26.60	0.70	2 gl.gn.alm. lys,mlk-fin. rel.kv.rik Spor hbl.impr. Py,Cp,Sl	65°	0.39	0.30	1.78		7.50	
26.60 - 27.85	1.25	2 gl.gn.b.d. lys,mlk.rel.kv.rik. film- tynne biot.skikt.Cm-tykke pegm.band. spor hbl. Str. og impr. Py,Sl,Cp,Gn.	50°	1.43	0.41	3.70		8.00	
27.85 - 28.80	0.95	2 gl.gn.alm. lys,mlk-fink.Kv-rik.Enkelte små gr. 0.5-1 mm. Impr. Py	60°	0.28	0.24	0.79		5.00	
28.80 - 29.15	0.35	2 gl.gn.alm. lys,mlk-fink.kv.rik. Bandet med komp.malm.	60°	1.94	0.32	7.76		8.66	
29.15 - 29.95	0.80	2 gl.gn.alm. lys,mlk-fink.kv.rik.Enkelte cm-tykke band med 2 gl.gn.b.d.	55°	0.10	0.08	0.55		3.67	
29.95 - 31.10	1.15	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.homogen. Impr. Py spor Sl.	55°	0.04	0.25	0.40		5.65	
31.10 - 34.00	3.90	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.homogen.Svak impr. Py	55°	0.00	0.14	0.04		3.17	31.10-32.10
34.00 - 34.70	0.70	2 gl.gn.b.d. lys,mlk.veksl. med dm-tykke pegm.band. svak impr. Py	60°						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 540

4.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
34.70 - 36.00	1.30	2 gl.gn.b.d. Rel. lys mlk.	55°						
36.00 - 36.80	0.80	Pegm.							
		26/4 -78							
		Stellan Burman							

Lokalitet: *Profil 43880*

Borehull: 539

Dato

Koordinatorer

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

*April - 78**X: 925.408,6 Y: 43.897.6**N.**+ 70°**- 79,3**50.0 m.*

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.60	3.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels kv.-rik, enkelte spr. gr. 1-4 mm spor skarn eller epidot? Fra 1.80-2.00, 2.70-2.75 pegm. svak imp. Py.	70°						
3.60 - 4.20	0.60	Pegm. Bandet med 2 gl.gn.		0.13	0.13	0.37		2.68	
4.20 - 5.45	1.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk, tildels kv.-rik, svak imp. Sl,Cp.Py	50°	0.19	0.29	0.66		5.68	
5.45 - 7.55	2.10	Pegm. Spor Sl,Cp,Py		0.02	0.14	0.13		2.21	
7.55 - 8.00	0.45	Biot.gn. Mørk, mlk-grovk, tildels hbl.førende. Imp. Sl,Cp,Py	70°	1.89	0.81	4.47		11.36	
8.00 - 8.60	0.60	Musk.gn. Lys,mlk-fink. Kv.rik massiv, spor hbl, Sl,Cp,Py.		0.29	0.16	0.90		4.93	
8.60 - 9.70	1.10	Malm Fra 8.60-9.00 biot+hbl.gn. m/lys Sl. Fra 9.00-9.70 Pegm.kv.rik,m/diopsid(skarn)		1.03	0.45	4.56		8.84	
9.70 - 12.80	3.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk,enkelte spr. gr. 1-2 mm. Fra 10.85-10.90 Sl.	70°	0.44	0.20	1.17		2.31	9.70-10.90
12.80 - 14.30	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.spr.gr.1-5 mm	70°						
14.30 - 15.30	1.00	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. tildels m/pegm.band Spr. gr. 1-2 mm. 1-2 mm	70° 80°						
15.30 - 15.85	0.55	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. bandet med 2 gl.gn.alm. Spr.gr. 1-5 mm	70°						
15.85 - 18.30	2.45	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,bandet med 2 gl.gn. b.d. Spor gr. 0,5-1 mm.	70°	0.00	0.03	0.05		2.25	17.10-18.10
18.30 - 19.70	1.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.-grovk. m/biot. Hbl.rike band.fortr.vis med Sl, Cp, Gn, Py	60° 70°	0.79	0.52	2.86		9.92	17.30-19.30

Lokalitet:

Borehull: 539

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19.70 - 24.65	4.95	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.tildels massiv m/biot.rike band. spor gr. Fra 20.35-20.40, 24.25-24.30 24.45-24.46 Spor Sl	60° 65°	0,18	0,14	0,35		3,21	19,70-24,70
				0,22	0,07	0,58		2,89	23,65-24,65
24.65 - 25.15	0.50	Biot.hbl.gn. Mørk,grovk-mlk, bandet med 2 gl.gn.alm. Imp. Sl,Cp,Py	70°	1,22	0,51	4,13		8,68	
25.15 - 26.60	1.45	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.mass. spor gr. Imp. Py	70°	0,89	0,11	0,36		2,89	
26.60 - 27.00	0.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. Kv.rike parti m/ Sl, Cp, Py		0,30	0,16	1,66		7,71	
27.00 - 28.20	1.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk,mass. spor gr. 0.5 - 1 mm. Svak imp. Py	70°	0,05	0,05	0,20		2,73	
28.20 - 30.20	2.00	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.-grovk. rel.mass. tildels kv.rik,biot.hbl. rike band, fortrinnsvis m/sl,Cp, Py.	60° 65°	0,22	0,34	1,21		6,75	
30.20 - 31.10	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk, tildels mass. kv.rik m/hbl.førende band fortrinnsvis m/sl,Cp,Py	70°	0,75	0,31	1,64		6,59	
31.10 - 32.35	1.25	Malm Kompakt (Skarn).		3,86	0,24	13,86		5,79	
32.35 - 32.85	0.50	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink.mass.kv.rik, hbl. biot.band.Imp. Sl,Cp,Py		0,63	0,63	2,22		6,11	
32.85 - 33.50	0.65	Malm Kompakt (Skarn)		3,21	0,96	12,35		9,48	
33.50 - 34.10	0.60	2 gl.gn.alm. Rel.mørk,mlk.kv.rik.Hbl.før. kompakt malmband Sl, Cp, Py	70°	2,09	0,53	7,56		9,16	

Lokalitet:

Borehull: 539

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
34.10 - 36.50	2.40	Hbl.-biot.gn. Mørk, mlk-grovk. med kv.-band. Spr. gr. 1-5 mm. Fra 35.00-35.40 Stichtolitisk. Imp. <u>Py.</u>	60°	0.19	0.08	0.55		6.43	34.10-35.10
36.50 - 50.00	13.50	Hbl.gn. Mørk, mlk-grovk. tildels mass. gr.rik 1-4 mm. Fra 46.40 - 46.60 Stichtolitisk. Imp. <u>Py.</u>	50° 60°						
26/4 1978 H. Pantdalsli									

Lokalitet: Profil 44.340

Borehull: 537

Dato : April-78

Koordinater : X: 925.417,1 Y: 44.343,9

Retning : W

Helling/stigning: - 85°

Høyde : -66,6

Lengde : 29.00 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. impr. <u>Py</u> Spor <u>Cp</u>	80°	0.09	0.32	0.44		8.68	
0.60 - 0.80	0.20	malm		2.60	0.38	6.56		7.26	
0.80 - 2.20	1.40	hbl.gn. Mørk,mlk.homogen.Spor gr. 1-2 mm.	70	0.06	0.10	0.20		7.73	
2.20 - 2.50	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende spor hr. 1-2 mm.	80	0.02	0.07	0.34		9.78	
2.50 - 3.80	1.30	Pegm.							
3.80 - 4.80	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.hbl..førende	70-80						
4.80 - 5.70	0.90	hbl.gn. Mørk,mlk-grov. veksl.med opp til cm-tykke band med biot. m. pegm. gr.fortrinns- vis i de hbl.rikere part. ved 4.90-4.95. Sl, Imp.Py	80	0.03	0.12	0.34		7.73	
5.70 - 6.00	0.30	TAP							
6.00 - 6.20	0.20	hbl.gn. Mørk,mlk.gr.førende.1-2 mm Impr. Sl,Py	80°	0.84	0.08	3.20		8.68	
6.20 - 8.40	2.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.veksl. med opp til dm-tykke partier med hbl.gn. spr. gr. fortrinnsvis i de hbl.rik. part. Impr. Py.	80° 90°	0.06	0.15	0.04		8.68	6.20-7.20
8.40 - 9.35	0.95	TAP							
9.35 - 10.40	1.05	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.hbl.førende spor gr. 1-2 mm. Impr. <u>Py</u>	80°						
10.40 - 12.50	2.10	biot.hbl.gn. Mørk,mlk-grovk. jevnt båndet og skiktet med hbl. rike band og biot.skikt. samt enkelte cm-tykke pegm. band.Enkelte gr.1-2 mm. <u>Py</u> opptrer som slirer og klyser, Spor <u>Cp</u> ..	80° 90°						

Lokalitet:

Borehull: 537

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
12.50 - 13.10	0.60	Pegm.							
13.10 - 14.00	0.90	TAP							
14.00 - 16.35	2.35	Biot.hbl.gn. Mørk,mlk-grov.Jevnt bandet med hbl.rike band og biot. skikt samt enkelte cm-tykke pegm.band. Py opptrer som slirer med klyser. Fra 14.40 - 16.35 blir det str. impr. Sl, Cp.	80°	0.02	0.22	0.39	10.4	10.41	14.00-16.35
				0.28	0.52	1.68	15	13.10	
16.35 - 16.55	0.20	TAP							
16.55 - 18.40	1.85	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.hbl.førende partier med skarnmalm Sl,Cp,Cn,Py,Po	80°	0.26	0.35	3.07		7.25	
18.40 - 18.50	0.20	Pegm.							
18.60 - 19.30	0.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. rel.kv.rik. Enkelte biot.skikt,Spor Sl, Py,	90°	0.17	0.08	0.46	4.6	2.68	
19.30 - 19.70	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. stripet malm	80°	2.23	0.60	5.83		10.73	
19.70 - 21.30	1.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink. Rel.kv.rik. spor Py	80°	0.11	0.05	0.84		2.68	
21.30 - 23.20	1.90	Pegm.							
23.20 - 25.20	2.00	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.Rel.kv.rik med spor Py	90°						
25.20 - 25.50	0.30	TAP							
25.50 - 28.60	3.10	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. rel.kv.rik Homogen,svak impr. Py	80°						
28.60 - 28.70	0.10	Pegm.							
28.70 - 29.00	0.30	hbl.gn. Mørk,mlk. gr.førende 1-2 mm Impr. Py	90°						

Lokalitet: *Profil 43.890*

Borehull: 536

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

*April - 78**X: 925.365,5 Y: 43.892,3**S.**+ 70°**- 75**36,23 m*

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.75	0.75	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.rel.mass. veksl. med hbl.førende partier. Str. imp. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	60°	<i>1.76</i>	<i>0.52</i>	<i>4.84</i>		<i>10.80</i>	
0.75 - 1.20	0.45	Biot-hbl.gn. Mørk,grovk-mlk. Rel.mass. 0.80 - 0.85 grov biot., God imp. <u>Sl,Cp,Py</u>	60°	<i>0.48</i>	<i>0.64</i>	<i>4.60</i>		<i>15.22</i>	
1.20 - 3.10	1.90	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk-fink- grovk rel. mass. veksl. med hbl. førende partier. 2.70-2.75 grov biot. Str. imp. <u>Sl,Cp,Py</u> .	60°	<i>0.18</i>	<i>0.25</i>	<i>1.44</i>		<i>11.62</i>	
3.10 - 5.10	2.00	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,grovk-mlk, svakt ondulerende, spor hbl.D. Imp. <u>Sl,Gn,Cp,Py</u>	50° 80°	<i>0.39</i>	<i>0.23</i>	<i>1.17</i>		<i>11.45</i>	
5.10 - 6.15	1.05	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. rel. mass. hbl.førende.Enkelte pegm. band. Str. imp. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	60° 70°	<i>0.87</i>	<i>0.48</i>	<i>4.97</i>		<i>8.35</i>	
6.15 - 8.20	2.05	2 gl.gn.musk.d. Lys,mlk-grovk,veksl.m/band biot. spor hbl. Imp. fortr. lys <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	60° 70°	<i>0.68</i>	<i>0.20</i>	<i>1.70</i>		<i>5.40</i>	
8.20 - 9.50	1.30	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk-grovk.spor hbl. imp. <u>Sl,(lys) Gn,Cp,Py</u>	60°	<i>0.83</i>	<i>0.28</i>	<i>2.85</i>		<i>7.30</i>	
9.50 - 10.50	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,grovk-mlk. hbl.før. imp. <u>Sl,Cp,Gn,Py</u>	60°	<i>1.26</i>	<i>0.36</i>	<i>3.82</i>		<i>8.60</i>	
10.50 - 11.40	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.mass.hbl.før. Spr. gr. 1-2 mm. Imp. <u>Py</u>	60°	<i>0.13</i>	<i>0.06</i>	<i>0.46</i>		<i>7.80</i>	
11.40 - 14.90	3.50	biot.-hbl.gn. Mørk,mlk-fink. rel.massiv, bandet m/amf. gr.førende 1-3 mm. Imp. <u>Py</u>	60° 70°						

Lokalitet:

Borehull: 536

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
14.90 - 19.75	4.85	hbl.gn. Mørk, mlk.mass. spr. pegm. band. Gr.førende. Tildels rik 1-3 mm. Imp. <u>Py</u>	60° 70°						
19.75 - 20.40	0.65	Breksje							
20.40 - 24.55	4.15	hbl.gn. Mørk, mlk-grovk. rel.mass. bandet m/amf. gr.førende 1-3 mm. Imp. <u>Py</u> .	70°						
24.55 - 26.10	1.55	2 gl.gn.alm. Rel.lys, fink. mass. biot.-rikere band 24.50-24.60 epidot? Gr.førende 0.5-2 mm.	70°						
26.10 - 26.60	0.50	Pegm.							
26.60 - 27.90	1.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys, fink-mlk, mass. Enkelte mørke biot.rike band. Spr. gr. 0.5-2 mm	80°						
27.90 - 28.30	0.40	Pegm.							
28.30 - 30.90	2.60	2 gl.gn.alm. Lys, fink.-mlk. mass. Enkelte mørke biot.rike band. Spr. gr. 0.5-2 mm.	80°						
30.90 - 36.20	5.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk, mass.enkelte hbl.rike band. Spr. gr. 1-3 mm.	70° 80°						

19/4 1978
H. Pantdalsli

Lokalitet: *Profil 44.230*

Borehull: 535

Dato : *April - 78*
 Koordinator : *X: 925.378,4 Y: 44.230,7*
 Retning : *S*
 Helling/stigning: *- 69°*
 Høyde : *- 78,7*
 Lengde : *29,80 m*

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.35	0.35	2 gl.gn.b.d. Rel..mørk,mlk. cm.tykke pegm.band. mm-tykke skikt biot.Spr. gr. 1-2 mm.	60°						
0.35 - 0.80	0.45	TAP							
0.80 - 4.50	3.70	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. bandet med opp til cm-tykke kv.rike band. samt skiktas med filmtynne biot.skikt.Enkelte gr. 1-2 mm. <u>Py</u> opptrer som enstaka klysor og svak impr. spor sl, cp ved 2.65 m.	80°						
4.50 - 4.65	0.15	TAP							
4.65 - 6.20	1.55	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl. førende gr.førende 1-2 mm fortrinnsvis i de hbl.før. partiene. Svak impr. <u>Py</u> .	80°						
6.20 - 9.05	2.85	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. jevnt bandet med cm-tykke kv.rike og hbl. rike band. svak impr. <u>Py</u> .	70° 80°						
9.05 - 16.60	7.55	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.Enkelte cm-tykke pegm.band. Svak impr. <u>py</u> .	70° 80°						
16.60 - 17.70	1.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl.-førende.Spr. gr. 1-3 mm.	70° 80°						
17.70 - 20.00	2.30	2 gl.gn.b.d. lys,mlk.spr. gr. 1-2 mm. svak impr. <u>Py</u> .	70°						
20.00 - 20.70	0.70	2 gl.gn.musk.d. Lys,mlk-grovk. spor <u>Py</u>	70°						
20.70 - 24.20	3.50	2 gl.gn.b.d. lys,mlk.svak imp. <u>Py</u>	70°						

Lokalitet:

Borehull: 535

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
24.20 - 24.70	0.50	biot.gn. Mørk, grovk.gr.førende 1-3 mm.	80°						
24.70 - 25.25	0.55	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. spor gr. 1-2mm Spor <u>Py.</u>	70°						
25.25 - 25.85	0.60	TAP							
25.85 - 26.80	0.95	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk.spr. gr. 1-2 mm. Svak impr. <u>Py.</u>	60° 70°						
26.80 - 27.10	0.30	Pegm.							
27.10 - 29.40	2.30	hbl.gn. Mørk, mlk.gr.førende 1-3 mm.	80°						
29.40 - 29.60	0.20	Pegm.							
29.60 - 29.80	0.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk.hbl.førende. svak impr. <u>Py.</u>	80°						
12/4 - 1978									
Stellan Burman.									

Lokalitet: Profil 43.890

Borehull: 534

Dato : April 78
 Koordinator : Y: 925.367,6 X: 43.889.0
 Retning :
 Helling/stigning: +70°
 Høyde : - 74.9 m
 Lengde : 30 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.35	1.35	Pegm. Spor sl, Gn, Cp, Py		1.64	0.14	0.35		15.56	
1.35 - 1.90	0.55	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. imp. Py	60°	0.20	0.14	0.17		28.68	
1.90 - 2.10	0.20	Malm Mørk, mlk, hbl. rik, god imp. Sl, Cp, Py		0.83	1.05	1.35		17.24	
2.10 - 3.20	1.10	2 gl.gn.musk.d. Lys, mlk-grovk. hbl. rike band fortrinnsvis med imp. sl, cp, py	50° 60°	0.14	0.22	1.77		7.17	
3.20 - 5.80	2.60	2 gl.gn.b.d. Rel. lys, grovk.-mlk, tildels ondulerende, Veksl. med partier musk.d.gn. Spr. hbl. rik band fortrinnsvis med imp. sl, cp gn, py	20° 60°	0.45	0.26	1.84		7.32	
5.80 - 6.80	1.00	Malm Rel. mørk, mlk, hbl. rik, veksl. med 2 gl.gn. god imp. sl, cp Gn, Py.	60°	1.48	0.59	7.43		12.05	
6.80 - 9.30	2.50	2 gl.gn.alm. Rel. lys, mlk.-grovk. hbl. før. band fortrinnsvis med imp. sl, cp, gn, py.	50° 60°	0.53	0.30	2.13		7.02	
9.30 - 10.45	1.15	Malm Mørk, mlk, hbl. rik veksl. med partier 2 gl.gn.b.d. God imp. sl, cp, gn, py	60°	0.55	0.63	5.25		13.27	
10.45 - 11.60	1.15	2 gl.gn.b.d. Rel. mørk, mlk, hbl. førende, spr. diffuse gr. 1-3 mm. Svake spor Sl, cp, imp. Py	60°	0.39	0.20	0.45		9.00	
11.60 - 17.80	6.20	Hbl.-biot.gn. Mørk, mlk-grovk. rel. massiv, gr. førende 1-3 mm. Spor Gn ved 14.30 Imp. Py.	60°						

Lokalitet:

Borehull: 534

2.

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
17.80 - 18.40	0.60	Hbl.gn. Mørk,mlk.massiv gr.førende 1-4 mm. Svak imp. <u>Py.</u>	60°						
18.40 - 18.65	0.25	Musk.gn. lys,grovk.spor gr. 1-2 mm.							
18.65 - 19.40	0.75	Hbl.-biot.gn. Mørk, mlk-grovk. rel.massiv gr.førende 1-3 mm. Spor <u>Cp</u> imp. <u>Py.</u>							
19.40 - 19.70	0.30	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.kv.rik, massiv.	70°						
19.70 - 20.90	1.20	Hbl.-biot.gn. Rel.mørk,mlk-grovk. rel. massiv,veksl.med band av 2 gl.gn.alm. gr.førende 1-3 mm. Svak imp. <u>Py.</u>							
20.90 - 21.60	0.70	Hbl.gn. Mørk,mlk,massiv,gr.førende 1-5 mm. Svak imp. <u>Py.</u>	80°						
21.60 - 22.30	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. tildels hbl. gr.førende 1-3 mm. Svak imp. <u>Py.</u>							
22.30 - 22.60	0.30	Musk.gn. lys,grovk.massiv.							
22.60 - 23.80	1.20	Hbl.-biot.gn. Mørk,mlk,rel.massiv. Spr. gr. 0.5-2 mm.Imp. <u>Py</u>							
23.80 - 24.00	0.20	Pegm.							
24.00 - 25.05	1.05	Hbl.biot.gn. Mørk,mlk.massiv,spr. band pegm. Spr. gr. 1-3 mm. imp. <u>Py.</u>							
25.05 - 30.00	4.95	2 gl.gn.alm. lys,mlk.-fink.kv.rik,spor gr. rel.massiv.	60°						

13/4 1978
E.H. Pantdalsli

Lokalitet: *Profil 43.880*

Borehull: 533

Dato : *Mars - 78*
 Koordinator : *N: 925.376,7 Y: 43.883,7*
 Retning : *N.*
 Helling/stigning: *+ 35°*
 Høyde : *- 76,0*
 Lengde : *64.20 m*

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	2 gl.gn.alm. lys,mlk.-fink.kv.rik, tildels mass. Impr. <u>sl</u> ,cp, Gn, Py.		<i>0.67</i>	<i>0.57</i>	<i>3.34</i>		<i>9.24</i>	
0.90 - 1.40	0.50	2 gl.gn.musk.d. lys mlk-grovk. impr. <u>sl</u> , cp, gn, py	40°	<i>0.85</i>	<i>0.30</i>	<i>3.60</i>		<i>5.35</i>	
1.40 - 2.50	1.10	2 gl.gn.b.d. Rel. lys mlk-grovk. enstaka gr. 1-3 mm. spor Py	40°	<i>0.08</i>	<i>0.03</i>	<i>0.30</i>		<i>2.59</i>	
2.50 - 9.30	6.80	2 gl.gn.b.d. Rel. lys,mlk. tildels mass. enstaka gr. 1-3 mm. svak impr. <u>Py</u> .	20° 30°						
9.30 - 9.70	0.40	Pegm.							
9.70 - 11.20	1.50	2 gl.gn.alm. lys,fink. kv.rik mass.spor gr. 1-2 mm. spor Py	40°	<i>0.07</i>	<i>0.09</i>	<i>0.15</i>		<i>2.76</i>	
11.20 - 11.50	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende god impr. <u>sl</u> ,cp,gn,py	40° 50°	<i>0.38</i>	<i>0.25</i>	<i>7.58</i>		<i>16.05</i>	
11.50 - 12.00	0.50	2 gl.gn.alm. lys,fink.kv.rik,spor <u>sl</u> , Cp, Py	40° 50°	<i>0.47</i>	<i>0.23</i>	<i>1.57</i>		<i>4.22</i>	
12.00 - 12.45	0.45	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. rel. kv.rik. impr. <u>Sl</u> ,Cp,Gn,Py.	40° 50°	<i>1.92</i>	<i>0.22</i>	<i>5.12</i>		<i>6.97</i>	
12.45 - 13.10	0.65	2 gl.gn.alm. lys,fink.med biot.rikere band.impr. <u>sl</u> ,cp,gn,py.	40°	<i>0.63</i>	<i>0.18</i>	<i>1.70</i>		<i>3.73</i>	
13.10 - 15.20	2.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.massiv.hbl. førende. God imp. <u>sl</u> ,cp Gn, py.		<i>0.94</i>	<i>0.59</i>	<i>7.10</i>		<i>12.97</i>	
15.20 - 15.90	0.70	2 gl.gn.musk.d. lys,mlk-grovk. onduler- ende, spor <u>sl</u> , py	10° 30°	<i>0.19</i>	<i>0.07</i>	<i>0.81</i>		<i>3.73</i>	

Lokalitet:

Borehull: 533

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15.90 - 16.90	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. Ondulerende,hbl.førende,god imp. <u>sl,cp,gn,py</u> .	40°	1.01	0.58	6.47		9.89	
16.90 - 19.15	2.25	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk-grovk. svakt ondulerende,god imp. <u>sl,cp,gn,py</u>	40°	0.70	0.44	3.09		8.43	
19.15 - 19.80	0.65	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk.Rel.mass.kv.rik, hbl.førende. God imp. <u>sl,cp,gn,py</u> .		5.95	0.20	12.92		8.27	
19.80 - 22.20	2.40	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.rel.massiv. tildels kv.rik,vekslende mineralisering m/hbl. God imp. <u>sl,cp,gn,py</u> .	40°	1.34	0.30	4.92		10.54	
22.20 - 22.50	0.30	hbl.gn. Mørk,grovk.imp. <u>sl,cp,gn,py</u>	30-40°	2.19	1.07	2.03		6.81	
22.50 - 23.00	0.50	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.rel.massiv.Imp. <u>Py</u>		0.15	0.14	0.48		2.27	
23.00 - 25.00	2.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk,rel. massiv, hbl-førende.tildels kv.rik God stripet imp. <u>sl,cp,gn,py</u>	0° 30°	1.44	0.64	6.21		12.49	
25.00 - 34.25	9.25	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk,rel. massiv, tildels kv.rik med spr. band av pegm. enkelte gr.1-3 mm Fra 29.75-29.80,31.80-31.95 imp. <u>sl,Cp,Gn,Py</u>	10° 30°	0.18	0.08	1.04		3.73	25.00-26.00
				0.11	0.03	0.35		2.27	33.25-34.25
34.25 - 35.00	0.75	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk,kv.rik,hbl.før. imp. <u>sl,cp,gn,py</u> .	10° 20°	1.40	0.41	4.70		6.56	
35.00 - 35.50	0.50	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.massiv.Svake spor <u>sl,cp,gn,py</u>		0.66	0.10	1.87		3.05	
35.50 - 36.80	1.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. tildels kv.rik og massiv.Spr. miner.hbl.før.band.imp. <u>sl,cp,gn,py</u>	30° 40°	2.23	0.14	2.31		3.81	

Lokalitet:

Borehull: 533

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
36.80 - 38.00	1.20	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,grovk.ved 37.80 spr. med druserom. Svak impr. <u>sl,cp,gn,py</u>	30°	0.23	0.23	0.65		10.98	
38.00 - 39.15	1.15	Malm (skarn) Rel.lys,mlk,kv.rik,hbl.før. Ved 38.30 druserom,god imp. <u>sl,cp,gn,py</u> .	10° 20°	2.31	0.13	10.99		10.98	
39.15 - 41.30	2.15	2 gl.gn.alm. rel.lys,mlk.-fink.tildels kv.rik og massiv.bandet minerals m/hbl. imp. <u>sl,cp,gn,py</u> .	30° 40°	0.67	0.69	3.66		6.86	
41.30 - 44.60	3.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.tildels kv.rik og massiv. hbl.førende med rikere band, tildels god <u>sl,cp,gn,py</u> .	10° 40°	0.27	0.50	0.86		9.31	41.30-42.95
44.60 - 44.90	0.30	Pegm.		0.92	0.48	2.02		7.69	42.95-44.60
44.90 - 46.30	1.40	2 gl.gn.alm. rel.lys,mlk.tildels kv.rik massiv og hbl.førende, imp. <u>sl,cp,gn,py</u>	30°	0.10	0.30	4.41		2.27	
46.30 - 47.30	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.tildels kv.rik massiv og hbl.før. imp. <u>sl,cp,gn,po,py</u> .	30°	1.05	0.38	1.92		5.49	
47.30 - 51.30	4.00	Malm(skarn) Rel.mørk,mlk-grovk.tildels massiv,kv.rik,hbl.diopsid førende. God imp. <u>sl,cp,gn,py</u> .	20° 30°	1.15	0.41	3.14		9.76	
				2.24	0.41	7.92		6.86	47.30-49.30
				2.73	0.13	12.13		9.61	49.30-51.30
51.30 - 52.65	1.35	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.-fink.Tildels kv.rik, massiv hbl.førende, imp. <u>sl,cp,gn,py</u> .	30°	1.80	0.22	4.03		6.10	
52.65 - 53.75	1.10	Malm(skarn) Rel.mørk,mlk.massiv,hbl. og diopsid førende.God imp. <u>sl,cp,py</u>		0.84	1.36	6.55		12.97	

Lokalitet:

Borehull: 533

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

4.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
53.75 - 55.40	1.65	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. musk.-rik fra 53.75-54.00.Hbl.før. fra 54.30 - 54.45. Svak imp. sl,cp,py.	30°	0.23	0.24	0.70		8.24	
55.40 - 59.30	3.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. tildels massiv,hbl.førende med spr. gr. 1-2 mm, imp. Py	30°	0.09	0.18	0.47		8.24	55.40-56.40
59.30 - 64.20	4.90	hbl.gn. Mørk,mlk-grovk.tildels mass. spor gr. 1-2 mm. imp. Py	30°						

12/4 1978

H. Pantdalsli.

Lokalitet: *Profil 44230*

Borehull: 532

1.

Dato : *17015 - 78*
 Koordinator : *X: 925 381,9 Y: 44 229,9*
 Retning : *N.*
 Helling/stigning: *- 55°*
 Høyde : *- 787*
 Lengde : *19.80 m.*

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk.hbl-førende. Impr. <u>sl</u> ,cp,gn,py	50°	<i>0.29</i>	<i>0.57</i>	<i>1.22</i>		<i>14.27</i>	
0.70 - 1.70	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.hbl.før.svak impr. <u>Py</u> spor cp,sl	40° 60°	<i>0.08</i>	<i>0.30</i>	<i>0.28</i>		<i>7.95</i>	
1.70 - 1.95	0.25	Pegm.							
1.95 - 2.40	0.45	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende spor <u>Py</u> , <u>Gp</u> .	50°	<i>0.00</i>	<i>0.22</i>	<i>0.05</i>		<i>8.76</i>	
2.40 - 3.95	1.55	Malm		<i>1.56</i>	<i>0.61</i>	<i>7.23</i>		<i>12.65</i>	
3.95 - 10.00	6.05	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. jevnt bandet med 2 gl.gn.,hbl.gn. samt enstaka cm-tykke amf.band. Gr.førende fortrinnsvis i hbl.rikere part. 1-2 mm.	70° 80°	<i>0.97</i>	<i>0.49</i>	<i>0.35</i>		<i>6.00</i>	<i>3.95-5.00</i>
10.00 - 10.65	0.65	TAP							
10.65 - 12.00	1.35	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.gn. ved 10.65-10.70 m. Spr. gr. 1-2 mm. Svak impr. <u>Py</u> .	80°						
12.00 - 12.30	0.30	TAP							
12.30 - 15.15	2.85	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.med enstaka cm-tykke pegm. og hbl.rike band. spr. gr. 1-2 mm.	80°						
15.15 - 15.30	0.15	Pegm.							
15.30 - 16.00	0.70	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk.enk.gr. 1-3 mm.	70°						
16.00 - 16.20	0.20	hbl.gn. mørk,mlk.gr.rik 1-4 mm. stichtolitisk.							
16.20 - 16.70	0.50	TAP							
16.70 - 17.60	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.spor hbl. tildels gr.før. 1-2 mm. impr. <u>Py</u> .	70° 80°						

Lokalitet:

Borehull: 532

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
17.60 - 17.80	0.20	hbl.gn. Mørk, mlk-grovk. gr.førende 1-3 mm. (amfibolitisk)							
17.80 - 18.20	0.40	TAP							
18.20 - 18.55	0.35	Hbl.gn. Mørk, mlk.enkelte gr. 1-2 mm. spor <u>Py</u> .	80°						
18.55 - 19.05	0.50	Pegm.							
19.05 - 19.50	0.45	hbl.gn. mørk, mlk. spr. gr. 1-3 mm. spor <u>Py</u> .	80°						
19.50 - 19.80	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. gr.førende 1-2 mm. Svak impr. <u>Py</u>	80°						
13/4 -78 Stellan Burman									

Lokalitet: *Profil 43.880*

Borehull: 531

Dato: *17.05-78*Koordinater: *X: 925.326,1 Y: 43.883,7*Retning: *N.*Helling/stigning: *+60°*Høyde: *-75,8*Lengde: *36.05 m.*

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.10	2.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.spor gr. 1-2 mm (fr.0.10-0.20 spor sl,gn.)	60°						
2.10 - 2.90	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.-grovk. spor hbl.gr.0.5-1.0 mm. 0.5 cm tykk sleppe med diopsid ved 2.80.	60°						
2.90 - 6.05	3.15	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.rel.mass.spor gr. 0.5 - 1.0 mm.	60						
6.05 - 6.90	0.85	2 gl.gn.bd. Rel.lys,mlk-grovk. veksl. med part. med peg, samt opp til cm-tykke biot.rikere band, fortrinnsvis med gr. 1.0 - 3.0 mm.	60°	0.01	0.03	0.05		2.70	
6.90 - 9.00	2.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. jevnt bandet med lys sl,gn,cp,py og hbl.	65°	0.59	0.23	2.16		6.00	
9.00 - 10.30	1.30	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. part. med god imp. sl,gn,cp,py.	60°	1.29	0.49	5.50		9.30	
10.30 - 13.10	1.80	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-grovk. tildels musk.rik enkelte hbl. rike band imp. sl,cp,Gn, Py.	60	0.38	0.27	1.52		5.85	
12.10 - 12.30	0.20	Pegm.		0.89	0.35	0.10		1.35	
12.30 - 15.80	3.50	2 gl.gn. Rel.lys,mlk-grovk. med ondulerende preg. veksl. med hbl. rikere partier, samt cm-tykke pegm.band. God imp. Sl,Gn,Cp,Py.	20° 50°	1.01	0.50	4.01		8.55	
15.80 - 16.70	0.90	2 gl.gn.musk.d. Lys,grovk. spor sl,py	50°	0.35	0.15	0.33		4.80	

Lokalitet:

Borehull: 531

2.

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
16.70 - 19.10	2.40	malm (Skarntype)		1.23	0.59	9.36		10.50	
19.10 - 20.00	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. bandet, spor hbl, gr. 1-2 mm Py.	60°	0.07	0.38	0.23		8.25	
20.00 - 20.40	0.40	Pegm.							
20.40 - 36.05	15.65	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk.delvis mass. gr. førende 1-3 mm.Enkelte hbl førende partier (ved 24.80 - 25.00 Stichtolitisk).	40° 60°						

28/3 -78

Stellan Burman

Lokalitet: *Profil 44270*

Borehull: 530

Dato : *Mars-78*Koordinater : *X: 925.370,1 Y: 44.272,6*Retning : *N*Helling/stigning: *- 79°*Høyde : *- 713*Lengde : *18,70 m*

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.00	5.00	2 gl.gn.b.d. Rel. lys,mlk. rel.mass. spor hbl. gr.førende 1-3mm spor <u>Py</u>	70°						
5.00 - 5.20	0.20	Pegm.							
5.20 - 5.50	0.30	2 gl.gn.bb. Rel.lys,mlk. svak imp. <u>py</u>	70°						
5.50 - 6.00	0.50	hbl.gn. mørk,mlk-grovk. rel. mass. gr.førende 1-5 mm. stichto- litisk. Spor <u>py</u> .							
6.00 - 6.20	0.20	TAP.							
6.20 - 6.70	0.50	hbl.gn. mørk,mlk-grovk. rel.mass. gr.førende 1-5 mm. Stichtolitisk, spor <u>py</u> .							
6.70 - 8.70	2.00	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.spor hbl. gr.førende 1-2 mm.svak impr. <u>Py</u> , spor <u>Cp</u> .	70°						
8.70 - 9.40	0.70	2 gl.gn.musk.d. Lys,mlk.kv.rik enkelte gr. 1-2 mm.	75°						
9.40 - 12.20	2.80	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. tildels båndet med cm-tykke kv.rikere bånd. spr.gr. 1-3 mm. Spor hbl. Svak impr. <u>Py</u>	60° 70°	0.09	0.03	0.08		4.95	11.20-12.20
12.20 - 12.40	0.20	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. med hbl. Impr. sl,cp, <u>Py</u>		0.30	0.26	0.46		6.75	
12.40 - 13.55	1.15	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.jevnt båndet med opp til cm-tykke band av kv.pegm. hbl.rikere band samt mm.tykke skikt av biot. spor <u>Py</u> .Gr-før.1-2mm	60° 70°	0.02	0.06	0.08		4.50	
13.55 - 13.75	0.20	malm komp. malm.		1.15	0.34	6.77		6.80	

Lokalitet:

Borehull:

530

2.

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.75 - 18.70	4.95	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. jevnt båndet med opp til cm-tykke band av kv.pegm. hbl.rikere band. samt mm-tykke skikt av biot. svak impr. <u>Py.</u> Gr.førende 1-2 mm.	70°	0.07	0.06	0.13		4.35	13.75-14.75
		11/4 1978 Stellan Burman							

Lokalitet: *Profil: 44270*

Dato : *Mars - 78.*
 Koordina : *X: 925.380,0 Y: 44.271,0*
 Retning :
 Helling/stigning: *- 90°*
 Høyde : *- 71,5*
 Lengde : *28,10 m*

Borehull: 529

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.00	3.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. gr. 1-3 mm og hbl førende, imp. <u>Py</u>	75° 80°						
3.00 - 3.15	0.15	TAP							
3.15 - 8.40	5.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,med lysere parti. Mlk., tildels massiv, gr. 1-3 mm og hbl. førende, imp. <u>py</u> .	70°						
8.40 - 10.00	1.60	2 gl.gn.alm. Lys,fink-mlk. Veksl. med biot.rikere parti, spr. gr. 1-2 mm. svak imp. <u>Py</u> .	80°	<i>0.11</i>	<i>0.05</i>	<i>0.38</i>		<i>4.05</i>	
10.00 - 11.50	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. Ondulerende preg, spor hbl.gr. Imp. <u>sl</u> , <u>cp</u> , <u>py</u>		<i>0.39</i>	<i>0.60</i>	<i>2.76</i>		<i>9.90</i>	
11.50 - 14.70	3.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende, spr. gr. 1-2 mm. imp. <u>Py</u> .	80°	<i>0.06</i>	<i>0.13</i>	<i>0.38</i>		<i>4.65</i>	<i>11.50-12.50</i>
14.70 - 15.00	0.30	TAP							
15.00 - 19.60	4.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.-grovk.hbl.før. Spr. gr. 1-3 mm. Imp. <u>Py</u> .	80°						
19.60 - 19.90	0.30	TAP							
19.90 - 24.70	4.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.båndet m/2 gl. gn.alm. Spor hbl,gr. 1-2mm fra 20.15-20.20,21.30-21.35, 22.00-22.05 kv.rik m/spor <u>cp</u> , <u>po</u> . Imp. <u>py</u> .	75°						
24.70 - 25.00	0.30	TAP							
25.00 - 28.10	3.10	2 gl.gn.b.d. mørk,mlk,rel.massiv,spor hbl spr. gr. 1-2 mm. Imp. <u>py</u>	80°						

11/4 1978
 Holger Pantdalsli

Lokalitet: Profil 44.010

Borehull: 528

Dato : Febr. 78

Koordinater : X: 925.364.7 Y: 44.009.3

Retning : SV

Helling/stigning: - 60°

Høyde : 68.6 m

Lengde : 12 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.45	0.45	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk-grov, spor hbl. gr. imp. py.	40°	0.19	0.24	0.43		7.71	
0.45 - 0.80	0.34	TAP							
0.80 - 2.25	1.45	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,m/lysere parti, mlk.-grov, spor hbl, imp. sl, cp, py.	40°	0.45	0.30	1.03		7.39	
2.25 - 2.45	0.20	TAP							
2.45 - 4.90	2.45	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.spor hbl. God imp. sl, cp, gn, py.	50° 60°	0.78	0.38	3.97		10.12	
4.90 - 6.00	1.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk,spor hbl. gr. Imp. sl, cp, gn, py.	65°	0.42	0.28	1.32		5.95	
6.00 - 6.10	0.10	TAP							
6.10 - 7.30	1.20	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.imp. sl,cp,gn.py	60°	1.04	0.20	2.09		6.43	
7.30 - 7.70	0.40	TAP							
7.70 - 8.60	0.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk, svake spor hbl. gr. sl, cp, gn, py.	60°	0.20	0.08	0.43		5.30	
8.60 - 8.80	0.20	TAP							
8.80 - 12.00	3.20	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. fra 9.60-9.75 pegm. svak imp. Py.	60°	0.02	0.02	0.06		4.50	8.80-9.80
14.3. 1978 Holger Pantdalsli									

Lokalitet: Linse 3

Borehull: 527

side 1

Dato : 1-3 -78

Koordinatorer : X: 925.376.3 Y: 43.883.7

Retning : N

Helling/stigning: +25°

Høyde : -77

Lengde : 56m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.90	2.90	2 gl.gn.alm. lys,mlk-grovk. svak imp. <u>sl</u> py, cp	80° 40°	0.24	0.20	0.74		4.96	
2.90 - 4.15	1.25	2 gl.gn.alm. lys,mlk. spor hbl. impr. sl, py, cp.	0 30	0.32	0.19	0.99		9.00	
4.15 - 4.90	0.75	2 gl.gn.alm. lys,mlk.-grovk. svak imp. sl, py, cp.	20°	0.06	0.12	0.52		4.78	
4.90 - 5.90	1.00	2 gl.gn.b.p. lys,mlk-fink. rel. mass. imp. <u>sl,gn,cp,py.</u>	0 20°	0.63	0.34	2.16		7.90	
5.90 - 7.00	1.10	2 gl.gn.b.p. lys,mlk.spor hbl..imp. <u>sl,cp</u> <u>py</u>	0 20°	0.57	0.29	1.57		4.41	
7.00 - 8.70	1.70	2 gl.gn.alm. lys,mlk. svak imp. <u>py</u>	30°	0.08	0.07	0.19		2.39	
8.70 - 9.00	0.30	2 gl.gn.b.d. rel.lys,mlk. spor hbl. imp. <u>py</u>	25°						
9.00 - 9.60	0.60	2 gl.gn.alm. lys,mlk.	0-10°						
9.60 - 10.10	0.50	Peg.							
10.10 - 11.30	1.20	2 gl.gn.alm. lys,mlk.-grov.	0-20°	0.10	0.10	0.06		3.12	
11.30 - 13.20	1.90	2 gl.gn.b.p. lys,grovk. med onduleret preg. impr. <u>sl, cp</u> (Sl,Cp, som klysor och sprickfyllnader).	0° 10°	0.27	0.34	0.43		4.78	
13.20 - 13.60	0.40	Peg. Spor MoS ₂ ?		0.65	0.06	0.06		1.10	
13.60 - 15.90	2.80	2 gl.gn.alm. lys,mlk-grov-mlk. vekslende med opp til cm-tykke peg. slirer. imp. <u>sl,cp,py.</u>	0 20°	0.25	0.23	0.37		3.67	
15.90 - 17.90	2.00	2 gl.gn.alm. lys,mlk. mass.kv.rik.spor gr. 0.5 - 1.0 mm. spor <u>sl,py,cp.</u>		0.05	0.12	0.46		2.39	15.90-16.90
17.90 - 18.00	0.10	Peg.		0.02	0.04	0.03		1.29	16.90-17.90
				0.08	0.05	0.01		1.29	

Lokalitet:

Borehull: 527

Side 2

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning

Høyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
18.00 - 19.70	1.70	2 gl.gn.b.d. rel.lys,mlk. spor hbl. ved 18.90-19.05 cm tykk biot. bånd. spor sl,gn,cp,py	0° 30°	0.35	0.07	0.52		3.67	
19.70 - 20.50	0.80	2 gl.gn.b.p. lys,mlk.kv.rik imp. sl,gn. Py. (lys sl).	30°	1.12	0.28	7.87		11.94	
20.50 - 22.90	2.60	2 gl.gn.alm. lys,mlk-fink. kv.rik imp. sl, cp, Py	10° 20°	0.51	0.25	1.47		6.44	
22.90 - 26.05	3.15	malm mørk,kv.hbl. diopsid? mass. god malm. sl, gn. cp, py		8.74	0.85	9.61		12.32	
26.05 - 36.10	10.05	2 gl.gn.alm. lys,mlk. kv.rik.tildels mass. spor gr. 0.5-1.0 mm.Ved 32.70-32.90 spor sl,cp,py	10° 20°	0.07	0.94	0.17		3.03	26.05-27.05
36.10 - 36.70	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,kv.rik.spor hbl. imp. sl,gn,cp,py.	25°	4.91	0.23	13.22		9.28	
36.70 - 37.70	1.00	2 gl.gn.alm. lys,mlk-fin. kv.rik. spor sl,gn,cp,py (Lys sl)	30°	1.18	0.13	2.27		2.46	
37.70 - 38.00	0.30	2 gl.gn.b.d. rel.lys,mlk. spor hbl. imp. sl,gn,cp,py.	30°	2.80	0.35	6.05		5.31	
38.00 - 38.30	0.30	2 gl.gn.alm. lys,mlk-fin. vekslende med cm-tykke peg. og hbl. bånd. spor sl,cp,py.	30°	0.31	0.19	0.91		4.17	
38.30 - 39.40	1.10	2 gl.gn.alm. lys,mlk.kv.rik.Spr. gr. 1.0-2.0 mm. spor py,cp,po.	25°	0.02	0.02	0.05		1.89	
39.40 - 41.00	1.60	2 gl.gn.alm. lys,mlk-fin. kv.rik.tildels mass. spr. gr. 1-3 mm.	25°	0.07	0.07	0.12		2.08	
41.00 - 41.60	0.60	2 gl.gn.b.p. rel.lys,mlk. slirig, spor hbl. mm-tykke biot.skikt. imp. sl,gn,cp,py	10° 80°	2.45	0.46	4.82		9.09	

Lokalitet:

Borehull:

Side 3

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
41.60 - 49.50	7.90	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk.-rel. kv.rik. Spr. gr. 1-2 mm.	20°	0.45	0.09	0.68		2.84	41.60-42.60
49.50 - 49.70	0.20	kv.peg. Lys,melkekv.							
49.70 - 51.95	2.25	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk.rel.kv.rik. Tildels mass. spor <u>Py</u>	20° 30°						
51.95 - 52.20	0.25	Peg.							
52.20 - 56.00	3.80	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk. rel.kv.rik. bandet med opp til 5 cm. tykke band peg. spor gr. 0.5-1.0 mm.	20° 30°						

1/3 1978

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.010

Borehull: 526

Dato : Febr. 78
 Koordinator : X:925.364.7 Y:44.010.3
 Retning : S
 Helling/stigning: - 58°
 Høyde : - 68.6 m
 Lengde : 18.10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	2 gl.gn.alm. lys,mlk. imp. <u>sl, py</u>		1.03	0.31	2.00		6.59	
0.20 - 0.65	0.45	Tap							
0.65 - 1.65	1.00	2 gl.gn.alm. lys,mlk. imp. <u>sl, cp, py</u>	30-40°	0.74	0.24	1.59		6.75	
1.65 - 2.55	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk.m/spor hbl. Imp. <u>sl, cp, py.</u>	40°	0.25	0.27	0.77		9.16	
2.55 - 3.45	0.90	2 gl.gn.alm. lys,mlk.m/imp. <u>sl, cp, py.</u>	40°	0.52	0.20	1.56		4.66	
3.45 - 5.45	2.00	2 gl.gn.alm. rel.lys,mlk-grov,Veksl. med kv.rikere parti,god imp. <u>sl</u> <u>cp, gn, py</u> (spor hbl.)	40°	0.91	0.34	4.24		10.77	
5.45 - 6.40	0.95	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grov, m/spor gr. 1-2 mm. Svak imp. <u>sl, cp</u> <u>py</u>	60°	0.25	0.12	0.79		6.75	
6.40 - 6.60	0.20	skarn? Rel.lys,mlk. kv.rik,god imp. <u>sl, cp, py.</u>		2.41	0.18	6.14		5.14	
6.60 - 7.30	0.70	2 gl.gn.alm. lys,fink.-mlk.m/spor gr. 0.5 - 1 mm. Imp. <u>Py.</u>	60°	0.11	0.05	0.48		4.34	
7.30 - 7.50	0.20	TAP							
7.50 - 7.65	0.15	Pegn.							
7.65 - 9.60	1.95	2 gl.gn.alm. rel.lys,mlk. stichtolitisk ved 8.20. Spr. gr. 1-3 mm, imp. <u>Py</u>	60°						
9.60 - 10.25	0.65	TAP							
10.25 - 16.60	5.55	2 gl.gn.alm. Rel.lys,m/mørkere parti,mlk. spor hbl. spr.gr. 1-3 mm. delvis god impr. <u>Py.</u>	60°						
16.60 - 16.80	0.20	TAP							
16.80 - 18.10	1.30	2 gl.gn.alm. lys,mlk.spor hbl.imp. <u>Py.</u>	60°						
14.3. 1978 Holger Pantdalsli									

Lokalitet:

Forsørings-ort
Profil 44.250

Borehull:

525

Side 1

Dato

: Feb. 78.

Koordinater

: 925.392.7 Y 44.246.5

Retning

: S

Helling/stigning:

-40°

Høyde

: -69.7

Lengde

:

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.55	0.55	2 gl.gn.b.d. Rel. lys,mlk. spr. gr. 1-2 mm. spor <u>py</u>	35°						
0.55 - 0.70	0.15	Tap.							
0.70 - 1.55	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel. lys,mlk. spor hbl. spr. diffuse gr. 1.0-1.5 mm. spor <u>Py</u>	30° 40°						
1.55 - 2.60	1.05	biot.hbl.gn. rel.mørk,mlk. rel.mass. spr. gr. svak impr. <u>Py</u>	30°						
2.60 - 5.90	3.30	biot.gn. mørk,mlk-grov. litt variende med små partier hbl. opp til cm-tykke band og slirer med kv.peg..Spr. gr. 1-2 mm. svak imp. py	30° 50°						
5.90 - 6.55	0.65	2 gl.gn.b.d. Rel. lys,mlk. spor hbl. Kv-rik imp. <u>sl,py,po</u> (Lys sl)	30°	0.04	0.11	0.18		6.69	4.50-5.90
6.55 - 7.70	1.15	TAP		0.70	0.36	3.36		9.39	
7.70 - 9.40	1.70	2 gl.gn.b.d. Rel. lys,mlk.-grov-mlk. ford. spor hbl. tildels kv.rik imp. og slirer <u>sl,py,po,cp</u>	0° 10°	0.28	0.66	1.08		6.05	
9.40 - 10.50	1.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grov.biot.rik spor hbl. foldet spor <u>sl,py, cp, po</u>	0° 10°	0.12	0.29	0.70		7.17	
10.50 - 11.70	1.20	2 gl.gn.b.d. Rel. lys,mlk.tildels kv.rik imp. og slirer <u>sl,py,po,cp</u>	10°	1.21	0.71	5.72		9.87	
11.70 - 12.00	0.30	biot.gn. mørk, mlk-grov.	10-20°	1.15	0.27	1.48		6.53	
12.00 - 12.70	0.70	2 gl.gn.b.d. rel. lys,mlk-grov. rel.kv.-rik spor hbl. spor <u>sl, py</u>	10° 20°	0.50	0.33	0.62		6.37	
12.70 - 13.00	0.30	biot.skifer mørk,grovk.foldet, muligens rørlsezone?	0° 10°	0.06	1.26	1.45		9.24	

Lokalitet:

Borehull: 525

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.00 - 14.40	1.40	biot.gn. mørk, mlk-grov varierende med cm-smale band og striper peg.hbl. spr. gr. 1-3 mm. spor <u>py</u>	10° 30°	0.08	0.36	0.48		7.81	
14.40 - 15.40	1.00	TAP		0.02	0.06	0.07		4.78	14.40-15.45
15.40 - 16.45	1.05	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk. vekslende (bandet) med opp til cm-tykke band og slirer kv.peg, hbl.biot. Spr. gr. 1-2 mm spor <u>Py</u>	20°						
16.45 - 16.80	0.35	TAP							
16.80 - 18.30	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.veksl. mlk-grov. veks. l. (bandet) med opp til cm-tykke band med kv.peg. hbl. biot. spor gr. 1-2 mm. spor <u>Py</u>	30° 40°						

14/2 1978

Stellan Burman

Lokalitet: Forseringsort
Profil

Borehull: 524

Dato : Febr. 1978
Koordinater : 925.395.7 Y: 44.240.8
Retning : S
Helling/stigning: - 63°
Høyde : - 70.7 m
Lengde : 23.82

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.alm. lys, fink.-mlk.	70						
0.50 - 0.60	0.10	TAP							
0.60 - 1.30	0.70	2 gl.gn.alm. lys, fink.-mlk.	70°						
1.30 - 2.10	0.80	2 gl.gn.b.p. rel.lys,mlk. kv.rik	65						
2.10 - 5.50	3.40	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk. kv.rik.svak imp. py	65°						
5.50 - 7.10	1.60	Pegm.							
7.10 - 9.40	2.30	2 gl.gn.b.d. mørk,mlk.-grovk. svak impr. py.	60° 65°	0.16	0.12	0.59		7.65	8.40-9.40
9.40 - 9.95	0.55	2 gl.gn.alm. lys,mlk.svak.spor sl, imp.Py	65°	0.21	0.28	0.46		4.30	
9.95 - 10.45	0.50	TAP							
10.45 - 11.25	0.80	2 gl.gn.alm. lys,mlk.svake spor sl, impr. py.	65°	0.35	0.27	0.99		5.26	
11.25 - 11.80	0.55	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk. kv.rik delvis hbl. imp. sl, cp, py, po.	65°	0.93	0.32	4.00		10.67	
11.80 - 12.65	0.85	2 gl.gn.b.d. mørk,mlk-grovk. band m/hbl. spr. gr. 1-3 mm. Imp. py.	65°	0.40	0.25	0.15		6.21	
12.65 - 12.85	0.20	2 gl.gn.b.p. rel.lys,mlk. spr. gr. 1-3 mm	65°						
12.85 - 14.10	1.25	2 gl.gn.b.d. mørk,mlk-grovk, hbl. førende spr. gr. 1-3 mm. svak imp.Py	50°	0.16	0.11	0.29		5.89	13.10-14.10
14.10 - 14.55	0.45	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk. hbl.før. imp. sl, py	60°	0.63	0.25	0.94		5.42	
14.55 - 16.20	1.65	2 gl.gn.b.d. mørk, m/lyse parti mlk.-grovk. dm.brede band m/hbl.gn. spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py	60°	0.02	0.02	0.05		4.46	

Lokalitet:

Borehull: 524

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
16.20 - 18.50	2.30	hbl.gn. mørk,mlk-grovk. delvis gr. rik 1-3 mm. svak impr. <u>Py</u>	50° 60°						
18.50 - 19.40	0.90	TAP							
19.40 - 19.60	0.20	hbl.gn. Mørk,mlk-grovk. spr. gr. 1-3 mm. svak imp. <u>py</u>		0.09	0.14	0.07		6.05	
19.60 - 20.10	0.50	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,grovk.-mlk. hbl.før. spredte gr. 1-3 mm. imp. <u>Py</u>	50° 60°	0.03	0.09	0.05		5.58	
20.10 - 20.75	0.65	2 gl.gn.b.p. rel.lys,mlk,h-l.førende. kv.rik.imp. <u>sl,cp,py,po.</u>		0.40	2.41	2.42		16.09	
20.75 - 20.90	0.15	2 gl.gn.b.d. mørk,mlk-grovk.spor hbl. gr. 1-2 mm. svak imp. <u>py.</u>		0.07	0.09	0.25		7.33	
20.90 - 21.00	0.10	TAP							
21.00 - 21.10	0.10	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk-grovk.spor gr.1-2mm		0.04	0.09	0.05		8.60	
21.10 - 21.40	0.30	TAP							
21.40 - 22.60	1.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,grovk.-mlk. spr. gr. 1-2 mm. imp. <u>py</u>	50° 60°	6.04	0.09	0.12		8.60	
22.60 - 22.80	0.20	TAP							
22.80 - 23.80	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,grovk.-mlk. spredte gr. 1-2 mm. imp. <u>py</u>	50° 60°						
13.2. 1978									
Holger Pantdalsli									

Lokalitet: Forseringsort
 Profil 44.240

Borehull: 523

Dato : Febr. 78
 Koordinater : X:925.395.6 Y:44.240.4
 Retning : S
 Helling/stigning: + 68°
 Høyde : - 68.5 m
 Lengde : 13.58 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.70	5.70	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk-grov-mlk. spor hbl. spredte gr. 1-2 mm. spor <u>Py</u> .	60°	0.09	0.06	0.07		8.30	4.50-5.70
5.70 - 6.65	0.95	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.spr. gr.1-2mm spor hbl. svak imp. <u>sl,py</u>	60° 70°	0.58	0.12	1.05		8.83	
6.65 - 9.70	3.05	hbl.gn. mørk,mlk.tildels biot.rik (2 gl.gn.b.d.hbl.førende) spr. gr. 1-2 mm. svak imp <u>py</u>	70° 80°	0.07	0.03	0.07		7.27	6.65-8.00
9.70 - 12.10	2.40	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk.cm-tykke band med kv.preg,og hbl. spr. gr. 1-3 mm.	70° 80°						
12.10 - 12.70	0.60	hbl.gn. rel.mørk,grovk.lyse str. peg. spr. gr. med stichto- litisk preg. 1-4 mm. spor <u>py</u> .	60° 80°						
12.70 - 13.60	0.90	2 gl.gn.alm. lys,mlk-fink. mass.kv.rik	80°						

14/2 1978

Stellan Burman

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.240

Borehull: 522

Side 1

Dato : Febr. 1978
Koordinator : X:925.401.3 Y:44.241.2
Retning : N
Helling/stigning: - 65°
Høyde : - 70.8
Lengde : 22.90

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.alm. lys,mlk.enkelte hbl.band. str. imp. <u>sl,py</u>	55°	0.68	0.12	2.59		3.98	
0.50 - 2.30	1.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. Hbl. førende.Rik fra 2.00-2.30 imp. <u>sl, py</u>	50° 60°	1.03	0.28	3.31		8.83	
2.30 - 5.30	3.00	Pegm.		0.10	0.05	0.23		1.25	2.30-3.80
5.30 - 6.70	1.40	Biot.-hbl.gn. mørk,grovk.-mlk. Imp. <u>sl,py</u>	60°	0.26	0.04	0.24		1.71	3.80-5.30
6.70 - 6.90	0.20	Pegm.		0.35	0.34	3.03		14.37	
6.90 - 8.00	1.10	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk. spor hbl.gr. svak imp. <u>py.</u>	70°	0.09	0.36	0.92		6.75	
8.00 - 8.50	0.50	biot.-hbl.gn. Mørk,grovk. imp. <u>sl,py.</u>		0.05	0.07	0.23		6.23	
8.50 - 9.00	0.50	TAP		0.11	0.28	3.54		13.33	
9.00 - 10.45	1.45	Biot.-hbl.gn. Mørk,grovk. fra 9.10-9.20, 9.50-9.60, 10.35-10.45 kv.pegm.band. Imp. <u>sl,cp,py,po</u>	60° 70°	0.24	0.47	0.82		10.73	
10.45 - 11.75	1.30	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk. hbl.førende svak imp. <u>sl,cp,py</u>		0.04	0.85	0.10		9.69	
11.75 - 13.65	1.90	biot.hbl.gn. Mørk,veksl. m/lyse parti grovk. tildels kv.rik Imp. <u>sl,cp,py,po</u>	50°	0.17	0.55	2.08		15.95	
13.65 - 14.25	0.60	TAP							
14.25 - 16.65	2.40	Biot.-hbl.gn. Mørk,m/lyse parti grovk- mlk m/kv.rike parti 15.35- 15.50 pegm. Imp. <u>sl,cp,py,po</u>	60°	0.05	0.78	4.46		16.22	14.25-15.45
16.65 - 16.80	0.15	TAP		0.67	0.34	4.64		11.42	15.45-16.65
16.80 - 17.10	0.30	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk. imp. <u>sl,py</u>	60°	0.56	0.39	2.13		7.96	
17.10 - 18.55	1.45	Malm rel.lys,mlk-grovk. kv.rik, hbl.førende. Imp. <u>sl,cp,py</u>		0.74	0.98	6.90		10.56	

Borehull: 522

Retning :
Helling/stigning:
Hoyde :
Lengde :

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
18.55 - 18.90	0.35	TAP							
18.90 - 20.50	1.60	Malm Rel.lys,mlk-fink. veksl. m. parti 2 gl.gn.alm.hbl.- førende. Imp. sl,cp,py	60°	1.48	0.47	5.31		7.27	
20.50 - 22.80	2.30	2 gl.gn.alm. lys,fink.spor hbl. gr. 0.5 - 1 mm. <u>Py</u>	70°	0.14	0.04	0.25		1.90	20.50-21.50
13/2 1978									
Holger Pantdalsli									

Lokalitet: FORSERINGSORT
 Profil 44.240

Borehull: 521

Dato : Jan. 78
 Koordinator : X: 925.401.6 Y: 44.240.8
 Retning : N
 Helling/stigning: + 65°
 Høyde : - 68.3 m
 Lengde : 14.99

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	malm rel.lys,mlk.kv.rik.spor m/hbl. Imp. og striper <u>sl</u> <u>cp, py, gn.</u>		6.85	0.66	15.81		10.67	
0.50 - 1.30	0.80	musk.gn. lys,mlk-fink.kv.rik imp. <u>sl,py,po,cp</u>	45°	0.41	0.63	0.87		12.83	
1.30 - 2.00	0.70	malm rel.lys,mlk. tildels kv.rik m/spor hbl. diopsid.		0.76	2.24	1.58		12.33	
2.00 - 2.40	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk-grovk. spor <u>sl, Py, cp</u>	50° 60°	0.09	0.45	0.59		5.83	
2.40 - 4.00	1.60	malm rel.lys,mlk. tildels kv.rik m/hbl. diopsid mass.		1.52	0.65	6.89		10.00	
4.00 - 4.20	0.20	2 gl.gn.b.p. lys,mlk-grov. spor hbl. gr. 1-2 mm.	50°	0.57	0.19	1.58		5.17	
4.20 - 7.00	2.80	2 gl.gn.b.d. rel.lys, mlk. varierende med kv.rikere partier.spor hbl. gr. 1-2 mm. ved 5.05-5.10 spor <u>sl,cp,py</u>	60° 70°	0.06	0.05	0.46		7.17	4.20-5.20
7.00 - 10.20	3.20	2 gl.gn.b.d. rel.lys,mlk.spor hbl. smale part. tildels hbl.førende med gr. 1-3 m imp. <u>py.</u>	60° 70°						
10.20 - 13.90	3.70	hbl.gn. mørk,mlk.-fink. spredte gr. 1-3 mm. svak imp. <u>py</u>	80°						
13.90 - 15.20	1.30	hbl.gn. mørk,grov-mlk. svak imp. <u>py</u>	60-70°						

13/2 1978

S. Burman

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.220

Borehull: 520

Dato : Jan. 78
Koordinator : X:925.397.8 Y:44.221.3
Retning : S
Helling/stigning: + 67°
Høyde : - 68.6
Lengde : 16.57 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.30	1.30	Malm Rel.lys,mlk. kv.rik m/spor hbl. diopsid.Veksl. m/str. 2 gl.gn.b.d. Stripet,imp. <u>sl, cp, py</u>	80°	1.51	0.69	6.12		11.83	
1.30 - 4.80	3.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. Frg.2.00 - 2.30. Stichtolitisk. Hbl. førende. spr. gr. 1-3 mm. Imp. <u>py</u> .	70° 80°	0.13	0.12	0.20		7.33	1.30-3.00
4.80 - 5.25	0.45	musk.gn. Lys,mlk.-grovk. m/spor <u>sl</u> , gn. <u>py</u>		0.04	0.03	0.10		7.50	3.00-4.80
5.25 - 6.60	1.35	2 gl.gn.b.d. Rel. mørk,mlk-grovk. Hbl. førende parti. spr. gr. 1-2 mm. impr. <u>Py</u> .	80°	0.45	0.08	0.38		8.50	
6.60 - 7.30	0.70	musk.gn. Lys,grovk. spr. diffuse gr. 0.2 - 0.5 mm. Impr. <u>Py</u> .	70° 80°	0.04	0.08	0.10		8.83	
7.30 - 10.70	3.40	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk. m/hbl.førende parti. spr. diffuse gr. 1-2 mm. impr. <u>py</u> .	75°						
10.70 - 11.80	1.10	hbl.gn. mørk,mlk. gr. 1-3 mm.Imp. <u>Py</u>	70-80°						
11.80 - 13.70	1.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr.1-3 mm. Imp. <u>py</u>	80°						
13.70 - 16.70	3.00	2 gl.gn.alm. Lys,fink.spor <u>Py</u> .	80°						
13.2. 1978									
H. Pantdalsli									

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.220

Borehull: 519

Side 1

Dato : Jan. 78
Koordinater : X: 925.398.0 Y: 44.221.5
Retning : S
Helling/stigning: - 60°
Høyde : - 70 m
Lengde : 21.33 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. 0.40 - 0.45. Mye grov biot.hbl. førende, m/spr. gr. 1-3 mm impr. py	45°						
0.70 - 1.65	0.95	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,grovk.-mlk. Peg.-band fra 1.15-1.20. spor D. ved ca. 1.00 enkelte striper m/hbl. Imp. py.	60°	0.03	0.47	0.05		8.33	
1.65 - 2.20	0.55	2 gl.gn.alm. lys,mlk-grovk.spor hbl fra 1-95 - 2.15. Imp. sl, py	60°	0.31	0.17	3.82		9.33	
2.20 - 3.00	0.80	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk. band hbl.gr. 1-3 mm fra 2.65-2.70 svak imp. py	60°	0.10	0.11	0.35		8.83	
3.00 - 3.70	0.70	2 gl.gn.alm. lys,mlk.spor sl ved 3.70. svak imp. py	45° 50°	0.22	0.09	0.27		3.83	
3.70 - 4.90	1.20	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk.grovk.kv.rik fra 4.00 - 4.10. Rik på grov biot. fra 4.10-4.90 spor hbl. Imp. lys sl,py fra 3.70-4.10. imp. mørk sl, py, po fra 4.10-4.90	50° 60°	0.41	0.74	4.27		10.83	
4.90 - 5.55	0.65	2 gl.gn.b.p. lys,mlk,hbl.førende. Imp. lys sl, py	60°	0.31	0.23	3.07		8.00	
5.55 - 6.00	0.45	2 gl.gn.b.d. rel. mørk,mlk-grovk, hbl.-før. imp. sl, py, po		0.09	0.89	2.14		10.17	
6.00 - 6.15	0.15	TAP							
6.15 - 6.80	0.65	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. pegm. fra 6.30-6.40. Imp. sl, py, po.	60°	0.05	0.66	2.40		11.67	

Lokalitet:

Borehull: 519

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
6.80 - 7.85	1.05	biot.gn. Mørk,grovk.-mlk. tildels hbl.førende fra 7.75-7.85 kv.rik. svak imp. <u>sl,cp,Py</u> <u>po.</u>	60°	0.13	0.41	1.19		9.67	
7.85 - 8.65	0.80	TAP							
8.65 - 9.25	0.60	hbl.biot.gn. Rel.lys,mlk-grovk.tildels kv.rik imp. <u>sl,cp,py,po.</u>	60°	0.69	1.72	6.14		17.00	
9.25 - 10.20	0.95	2 gl.gn.b.d. mørk,mlk-grovk. tildels biot.gn. str. m/hbl. Impr. lys <u>sl, py, spor po.</u>	60°	1.23	0.55	3.29		9.83	
10.20 - 12.70	2.50	malm rel.lys,mlk-grovk.kv.rik, hbl. diopsid førende. impr. <u>sl, cp, py, po.</u>		0.46	0.28	5.97		12.17	
12.70 - 13.25	0.55	biot.-hbl.gn. Rel.mørk,m/lyse kv. rike parti, svak imp. <u>sl,py,po</u>	60°	0.12	0.39	1.50		17.17	
13.25 - 13.80	0.45	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk-grovk.spor hbl. gr. 1-3m imp. <u>py</u>	60°						
13.80 - 16.15	2.35	2 gl.gn.b.p. rel.lys,m/mørkere parti, mlk.-grovk. band dm brede hbl.førende,spr. gr. 1-3 mm svak imp. <u>py</u>	60°	0.01	0.03	0.05		4.33	13.25-14.25
16.15 - 20.70	4.55	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,m/lysere parti, mlk,hbl. gr. 1-3 mm. førend. vekslende svak imp. <u>py.</u>	60°						
20.70 - 21.15	0.45	TAP							
21.15 - 21.30	0.15	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk.svak imp. <u>Py</u>							

10/2 1978

H. Pantdalsli

Lokalitet: FORSERINGSØRT
Profil 44.100

Borehull: 518

Dato: 7.10.78
Koordinater: X 925.367,2 Y 44.102,9
Retning: N.
Helling/stigning: - 58
Høyde: - 72,0
Lengde: 22,50

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	Biot.gn. Noe mørk,mlk.Enkelte lys- ere partier.Noie spr. hbl. Spr. gr. 0.5-1 mm.	55- 60	0.24	0.16	0.20		5.83	
1.50 - 2.00	0.50	biot.gn. Noe mørk,mlk.Noie kv. og pegm. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .	55- 60	1.80	0.75	4.82		13.17	
2.00 - 6.10	4.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.-grovk.Enkelte biot.rikere partier.Noie spr. hbl.Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , noe <u>gn</u> , <u>cp</u>	60	0.71	0.29	1.57		5.33	2.00-4.00
6.10 - 6.90	0.80	biot.gn. Noe mørk,mlk-grovk.Noie hbl. Impr. <u>sl</u> , <u>gn</u> , <u>po</u> , <u>cp</u> , <u>gn</u> .	60	0.89	0.33	2.97		7.50	4.00-6.10
6.90 - 7.50	0.60	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk.Spr. spor hbl. Noie kv.	50- 55	1.39	1.23	4.16		10.33	
7.50 - 9.85	2.35	hbl.-biot.gn. Noe lys,mlk.Noie kv. og pegm. Enkelte musk.rike part. Spredte gr. 0.5-1 mm.	60	0.11	0.16	0.41		5.00	6.90-8.00
9.85 - 10.05	0.20	Pegm. hvit, grovk.							
10.05 - 11.30	1.25	hbl.biot.gn. Samme b.art som før pegm.		0.06	0.07	0.10		6.49	
11.30 - 11.50	0.20	biot.gn. Mørk,mlk-grovk.Noie pegm. litt hbl.Impr. <u>py</u> , <u>po</u> , <u>cp</u> .		1.00	0.39	0.05		23.33	
11.50 - 14.10	2.60	hbl.gn. Noe mørk,mlk.-grovk. Endel partier med grovk. biot og hbl. Noie kv. Rel.jevnt besatt gr. 1-2 mm. Sv. impr. <u>py</u> .	60	0.04	0.06	0.05		7.50	11.50-13.50
14.10 - 14.55	0.45	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk. Noie kv. og hbl. Rel. godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u>		0.03	0.03	0.05		5.33	

Lokalitet:

Borehull: 518

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
14.55 - 15.15	0.60	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Enkelte biot- rike band. Litt hbl. Spredte gr. 1-2 mm. Impr. <u>py</u>	60 ⁰	1.69	0.18	5.15		6.00	
15.15 - 15.85	0.70	hbl.gn. Noe mørk, grovk-mlk. Endel kv. og pegm. Endel skarn i hbl.		0.12	0.06	0.37		6.67	
15.85 - 16.05	0.20	Pegm. Hvit, grovk.							
16.05 - 16.95	0.90	Hbl.gn. Noe mørk, grovk.-mlk. Mye kv. og pegm. En god del skarn i hbl. Gr. 0.5- 1 mm i biot-bånd. Sv. impr. <u>py</u>							
16.95 - 22.50	5.55	hbl.gn. Noe mørk, mlk. Enkelte str. 2 gl.gn.alm. Noe kv. Rel. jevnt besatt gr. 1-2 mm. Impr. <u>py</u> .	60						

3/2 1978

Kaare M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.100

Borehull: 517

Dato: 7.10.78
Koordinater: X 925.364.7 Y 44.108.2
Retning: S.
Helling/stigning: - 28
Høyde: - 72.0
Lengde: 21.10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.25	0.25	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk. Enkelte biot.str.	35-40					
0.25 - 4.10	3.85	2 gl.gn.b.d.	Litt mørk,mlk. Enkelte str. grovk.biot.Noë kv. og pegm. Spr. gr. 1-2 mm. Gn.-impr. på 0.50-0.60.	25-30					
4.10 - 4.65	0.55	hbl.-biot.gn.	Noë mørk,mlk.Endel kv. Rel. jevnt besatt gr. 1-2 mm.						
4.65 - 5.20	0.55	biot.gn.	Noë mørk,mlk.Endel kv. Noë ujevnt besatt gr. 0.5-1 mm						
5.20 - 6.30	1.10	hbl-biot.gn.	Noë lys,mlk.Tenderer stedvis mot hbl.gn. Noë kv. Rel.jevnt 30 besatt gr. 0.5-1 mm.						
6.30 - 7.80	1.50	2 gl.gn.b.d.	Noë lys,mlk.Endel 2 gl.gn. alm. - b.p. partier. Noë kv. spr. gr. 1-2 mm	30	0.04	0.06	0.21	5.09	
7.80 - 8.75	0.95	biot.gn.	Noë mørk,mlk.Enkelte partier 2 gl.gn.b.d. Noë kv. Spr. spor hbl. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>cp</u> .	30-35	0.92	0.52	3.35	9.39	
8.75 - 9.50	0.75	musk.gn.	Lys,mlk.Noë spr. biot. Sv. impr. <u>sl</u>	35-40	0.20	0.10	0.64	2.22	
9.50 - 10.45	0.95	2 gl.gn.b.p.	Noë lys,mlk.Noë kv. Sv.spor. hbl.Impr. <u>sl</u> , <u>py</u>	35-40	1.41	0.36	3.17	7.70	
10.45 - 11.00	0.55	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk-grovk.Noë kv. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u>	30-35	0.93	0.27	2.88	5.61	
11.00 - 12.55	1.55	2 gl.gn.b.d.	Lys,mlk.Noë pegm.og kv. Enkelte partier noe rikere på musk.Spor hbl.Tildels godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , noe <u>cp</u> .	35-40	0.84	0.32	5.58	10.50	

Lokalitet:

Borehull: 517

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
12.55 - 14.60	2.05	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.Stedvis noen biot-rike str. Noe kv. Stedvis spor <u>sl</u> , <u>py</u>	35-40	0.21	0.13	0.53		4.83	
14.60 - 15.10	0.50	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk.Enkelte biot.rike part. Spr. gr. 0.5 - 1 mm. Spor <u>py</u> .		0.02	0.05	0.10		5.67	
15.10 - 15.75	0.65	biot.gn. Noe mørk,mlk. Litt hbl.Noekv. sv.impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>po</u> .	30-35	0.08	0.39	0.71		13.83	
15.75 - 17.50	1.75	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.Enkelte biot.rike str. Spor hbl.Spor gr. 0.5 - 1 mm	30-35	0.02	0.06	0.10		3.83	
17.50 - 21.10	3.60	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.Noekv.Tenderstedvis mot biot.gn. Noe spredt hbl.Spredte gr. 0.5 - 1 mm. Stedvis sv. impr. <u>py</u> .	30-35						

3/2 1978

Kaare H. Hegrum

Lokalitet: FORSLERINGSORT
Profil 44.100

Borehull: 516

Dato Jan. 78
Koordinater X: 925.364.6 Y:44.103.1
Retning : S
Helling/stigning: - 50°
Høyde : - 72.0 m
Lengde : 22.80 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.85	0.85	2 gl.gn.alm. lys,mlk.Stedvis biot-rikere partier Noe kv.	30						
0.85 - 1.10	0.25	biot.gn. Noe mørk,mlk.Spredte gr. 1-2 mm.	30-						
1.10 - 1.25	0.15	hbl.gn. Mørk,mlk-grovk. Litt kv.							
1.25 - 2.20	0.95	biot.gn. Noe lys,mlk.Spor hbl. Spor gr. 0.5-1 mm. Noe kv.	35-40	0.19	0.12	0.25		6.08	
2.20 - 2.70	0.50	biot.gn. Samme b.art som over. Impr. sl, py.		0.97	0.68	2.89		9.45	
2.70 - 3.00	0.30	TAP							
3.00 - 3.70	0.70	biot.gn. Noe lys, mlk. Tynne part. 2 gl.gn.b.p. Sv. impr. sl, py, cp.	40-45	1.16	0.39	2.60		5.85	
3.70 - 5.50	1.80	2 gl.gn.b.p. lys,mlk. Enkelte partier musk-rik. Andre biot-rik. Noe kv. sv. impr. sl, py.		0.65	0.26	1.52		5.18	
5.50 - 6.60	1.10	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk.Noie kv. Spor hbl. Rel.godt impr. sl,py		1.16	0.38	6.10		11.03	
6.60 - 7.70	1.10	2 gl.gn.b.p. Samme b.art som over. Spor sl, py	40-45	0.58	0.29	1.90		5.85	
7.70 - 11.45	3.75	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk. Enkelte str. biot.gn. Gr. 0.5 - 1 mm. i disse.Noie kv. og pegm.	55-60	0.06	0.04	0.25		4.28	7.70-10.00
11.75 - 14.65	2.90	hbl.-biot.gn. Noe lys, mlk.Noie kv.striper Tynne partier 2 gl.gn.b.p. Stedvis gr.0.5-1mm. Impr. py, sl.	60	0.03	0.09	0.12		10.58	13.30-13.50
				0.47	0.26	1.63		10.80	13.80-14.10
				0.05	0.06	0.14		5.85	14.10-14.25
14.65 - 15.20	0.55	TAP							

Lokalitet:

Borehull: 516

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15.20 - 19.50	4.30	2 gl.gn.b.d. Noe lys,mlk.Tynne partier musk.gn. og biot.gn. Endel kv. og pegm. Spredte gr. 1-5 mm. Spredt impr.py	60- 65						
19.50 - 22.80	3.30	hbl.gn. Noe mørk,mlk.No. kv. og pegm. Enkelte partier 2 gl. gn.alm. Noe ujevnt besatt gr. 1-3 mm. Sv. impr. py.	60- 65						

30/1 1978


 Kaare M. Hegrum

Lokalitet: FORSERINGSORT
Profil 44.220

Borehull: 515

Dato : Jan. 78
Koordinater : X:925.403.5 Y:44.219.5
Retning : N
Helling/stigning: - 51°
Hoyde : - 70.6 m
Lengde : 25.84 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.10	3.10	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk.Enkelte partier rike på musk, andre på biot. Stedvis kv.rik.Noë hbl. Impr. sl, py, noe gn.	60-65	1.36	0.13	6.58		9.71	0.00-1.00
				1.53	0.32	3.65		7.10	1.00-2.00
				1.19	0.46	2.90		8.53	2.00-3.10
3.10 - 4.20	1.10	biot.gn. Noë lys,mlk.Enkelte striper grovk. biot. Noë kv. Endel hbl. Sv. impr. py, sl.	60-65	0.09	0.24	0.48		9.47	
4.20 - 6.45	2.25	hbl.gn. Noë mørk,mlk. Endel kv. Rel.jevnt besatt gr.1-3 mm Impr. py.	40-45	0.00	0.04	0.04		8.50	4.20-5.50
6.45 - 8.15	1.70	biot.sk. Mørk grovk. Endel kv. ibl. Spor hbl. Rel.jevnt besatt gr. 1-2 mm.Stedvis spor po, cp.	40-45						
8.15 - 10.00	1.85	biot.gn. Noë lys,mlk.Stedvis tynne partier med 2 gl.gn.b.d. Noë hbl. rel.jevnt besatt gr. 1-3 mm.	30-35						
10.00 - 11.40	1.40	hbl.gn. Noë mørk,mlk. Endel kv. iblandet.Jevnt besatt gr. 1-2 mm.	25-30						
11.40 - 11.80	0.40	biot.sk. Mørk,grovk.Endel kv. Impr.py							
11.80 - 12.45	0.65	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk.Rel.kv.rik Enkelte tynne str. grovk. biot.	30						
12.45 - 12.70	0.25	biot.sk. Mørk,grovk. Endel kv. Sv. impr. py.							
12.70 - 13.40	0.70	hbl.gn. Noë mørk,mlk.Noë kv. sv. impr. py.	40-45						

Lokalitet:

Borehull: 515

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.40 - 13.75	0.35	Pegm. Hvit, grovk. Noen striper grovk. biot.	40-45	0.03	0.13	0.14		7.82	12.70-14.10
13.75 - 14.10	0.35	biot.gn. Noe lys, mlk. Kv. rik							
14.10 - 14.75	0.65	biot.gn. Noe lys, mlk. Striper av grovk. biot. sk. Noe hbl. Tenderer mot slutten mot 2 gl.gn.b.d. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , Noe <u>gn</u> .		1.07	0.59	3.49		13.97	
14.75 - 15.00	0.25	TAP							
15.00 - 16.75	1.75	hbl.gn. Noe mørk, mlk. Endel kv. Endel grovk. biot. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , noe <u>gn</u> , <u>cp</u> .		0.77	0.85	3.22		14.45	
16.75 - 18.00	1.25	2 gl.gn.b.d. Noe lys, mlk. Noe kv. og pegm. Enkelte striper grovk. biot. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .	30-35	0.78	0.29	1.44		4.97	
18.00 - 18.25	0.25	TAP							
18.25 - 19.50	1.25	2 gl.gn.b.d. Samme 2 gl.gn.b.d. som før tap.		0.59	0.32	1.81		8.55	
19.50 - 19.85	0.35	TAP							
19.85 - 20.15	0.30	2 gl.gn.b.d. lys, mlk-fk. Noe kv.		0.10	0.12	0.25		3.83	
20.15 - 22.10	1.95	biot.gn. Noe mørk, mlk-grovk. Tenderer stedvis mot biot. sk. Endel kv. og pegm. Spor hbl. spredt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .	40-45	0.19	0.64	1.60		12.60	
22.10 - 23.65	1.55	2 gl.gn.b.d. lys, mlk. kv-rik. Noen pegm.-str. Noe hbl. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , Noe <u>gn</u> .	40-45	1.93	0.67	5.63		6.53	
23.65 - 24.35	0.70	2 gl.gn.b.p. lys, mlk. Kv.-rik. Stedvis litt <u>py</u> , <u>sl</u> .	35-40	0.23	0.05	0.35		2.00	

Lokalitet:

Borehull: 515

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
24.35 - 25.00	0.65	TAP							
25.00 - 25.40	0.40	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn. som før tap.							
25.40 - 25.80	0.40	hbl.gn. Noe mørk, mlk. Noe kv. og grovk. biot. Spor skarn. Spredte gr. 1-3 mm.	40-45	0,07	0,04	0,11		4,05	
30/1 1978 <i>Kaare M. Hegrum</i> Kaare M. Hegrum									

Lokalitet: FORSLRINGSORT
 Profil 44.220

Borehull: 514

Dato : Jan. 78
 Koordinater : X:925.403.4 Y:44.219.5
 Retning : N
 Helling/stigning: + 77°
 Høyde : - 68.7 m
 Lengde : 15.05 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.40	2.40	hbl.gn. Noe mørk,mlk. Enkelte part. grovk. hbl.No. kv. Rel.jevnt besatt gr. 0.5-1 mm.Impr.py	65-70						
2.40 - 2.70	0.30	Pegm. Hvit. grovk.							
2.70 - 4.10	1.40	hbl.gn. Samme hbl.gn. som før pegm.	45-50						
4.10 - 5.30	1.20	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk.Enkelte part. 2 gl.gn.b.d. Kv.rik.Spor hbl. Spredte gr. 1-2 mm.	45-50	0.00	0.03	0.08		6.39	4.10-5.30
5.30 - 5.65	0.35	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk. Tynne partier musk.gn. og 2 gl.gn.b.d. Impr. sl, py.		0.48	0.78	2.58		9.24	5.30-5.65
5.65 - 6.55	0.90	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.Partier med 2 gl.gn.alm. og biot.gn. spor hbl.Tildels sterkt impr. sl, py, noe gn, ep.		3.49	0.31	12.78		9.24	5.65-6.55
6.55 - 7.85	1.30	hbl.biot.gn. Noe lys,mlk. Noe pegm. Impr. sl, py.	35-40	0.58	0.25	2.64		9.47	6.55-7.85
7.85 - 8.35	0.50	hbl.biot.gn. Samme b.art som over. Rel. godt impr. sl, py.		1.97	0.49	6.87		12.32	7.85-8.35
8.35 - 9.25	0.90	biot.gn. Noe mørk,mlk. Noe hbl. Spredte gr. 0.5-1 mm. Sv. impr. py.	60-65	0.03	0.24	0.16		9.00	8.35-9.25
9.25 - 11.20	1.95	hbl.gn. Noe lys,mlk. Enkelte kv-str. Rel. jevnt besatt gr. 1-2 mm. Impr. py.	60-65						
11.20 - 14.90	3.70	amf. Mørk,fk.-mlk. "Tett" Noe ujevnt besatt gr. 1-3mm	70-75						

27/1 1978
 Kaare M. Hegrum
Kaare M. Hegrum

Lokalitet: FORSERINGSSORT
PROFIL 44.200

Borehull: 513

Dato: JUN. 78
Koordinater: X: 925.398,5 Y: 44.200,5
Retning: S
Helling/stigning: ÷ 62°
Høyde: ÷ 71,1 m
Lengde: 19.86 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.45	0.45	hbl.gn. Noe lys,mlk. Endel biot. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>gn</u> .	30-35	2.76	0.71	1.43		6.75	
0.45 - 5.20	4.75	2 gl.gn.b.d. Noe lys,mlk. En del kv. og pegm.str. Spredte spor hbl. Enkelte musk-rike partier. Tildels godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , Noe gn.	55-60	2.00	0.35	3.76		8.78	0.45-1.50
				2.00	0.80	5.14	NB	9.45	1.50-3.00
				0.66	0.41	3.88	NB	8.55	3.00-4.00
				0.34	0.78	4.23	NB	10.13	4.00-5.20
5.20 - 5.90	0.70	biot.gn. Noe lys,mlk.kv. rik spor hbl. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , noe po, <u>cp</u> .		1.18	1.00	4.35	NB	9.90	
5.90 - 6.00	0.10	TAP							
6.00 - 6.75	0.75	biot.sk. Mørk,grovk-mlk. Endel kv. Tynne partier biot.gn. Impr. <u>py</u> ,spor <u>sl</u> .	60	0.03	0.40	4.38		9.90	
6.75 - 7.70	0.95	TAP							
7.70 - 8.10	0.40	biot.gn. Noe mørk,mlk.Tenderer stedvis mot biot.sk.Endel kv. Noe hbl.Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , Noe cp.	60	0.77	1.26	5.05		15.98	
8.10 - 8.75	0.65	Biot.gn. Noe lys,mlk.Endel kv.striper Noe hbl. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> ,noe gn.		0.56	0.69	4.37		13.50	
8.75 - 9.00	0.25	TAP							
9.00 - 10.00	1.00	2 gl.gn.b.d. Noe lys,mlk.Enkelte str. grovk. biot.No hbl.Impr.py	60	0.20	0.26	0.53	NB	5.40	
10.00 - 10.55	0.55	TAP							
10.55 - 13.00	2.45	biot.gn. Noe mørk,mlk.Enkelte part. tenderer mot 2 gl.gn.b.d. Endel kv. og pegm.str. Endel hbl. Tildels god impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , Noe po, <u>cp</u> .	60	0.89	1.45	4.66		11.93	10.55-12.00
				1.04	1.00	5.56		14.63	12.00-13.00
13.00 - 13.20	0.20	TAP							

Lokalitet:

Borehull: 513

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.20 - 14.40	1.20	hbl.gn. Noe lys,mlk.No. kv.og pegm. Stedvis partier med 2 gl. gn.b.p. sv. impr. py.	60°	0.03	0.18	0.05	NB	3.29	
14.40 - 15.00	0.60	biot.gn. Noe lys,mlk.Endel kv. Enkelte partier 2 gl.gn. b.p. Spredte gr.0.5-1 mm							
15.00 - 16.10	1.10	2 gl.gn.alm. Noe lys,mlk.-grovk. Spor hbl. Spredte gr. 1-2 mm.	35- 40						
16.10 - 16.75	0.65	biot.gn. Noe lys,mlk.Endel kv. Litt hbl.Spredte gr. 0.5-1 mm.	35- 40	0.06	0.05	0.07	NB	4.05	
16.75 - 17.40	0.65	biot.gn. Samme b.art som over,uten gr. Impr. sl, py, po, cp.		0.43	0.06	1.54		10.80	
17.40 - 19.70	2.30	hbl.gn. Noe mørk,mlk.No. grovk. biot. Spredte gr. 1-2 mm.	45- 50	0.03	0.11	0.09		4.84	17.40-18.50

27/1 1978

Kaare M. Hegrum
Kaare M. Hegrum

PRØVER MERKET NB 1% S-RUBRIKKEN
ER NOG USIKRE, OG PRØVEPOSENE VIL
GÅTT ~~IGJEN~~ I STYKKER VED ANKOMST TIL
LABORATORIET. MEN KJERNENE ER LØST
TILBAKE I ANTATT RIKTIGE POSER

Lokalitet: FORSERINGSORT
 Profil 44.240

Borehull: 512

Dato : Jan. 78
 Koordinator : X:925.399.2 Y:44.243.5
 Retning : - 90°
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : - 70.8
 Lengde : 86.48

Side 1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. impr. <u>sl</u>	90°	1.58	0.18	4.85	8.6Ag 25.4	5.61	
0.20 - 0.95	0.75	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.filmtynne skikt med biot.spor <u>py</u> .	80°	0.03	0.06	0.24	0.9	7.09	
0.95 - 1.30	0.35	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. kv.rik. impr. <u>sl</u> , gn.po.py.	90°	6.39	0.57	1.41	81.4	7.57	
1.30 - 1.65	0.35	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.spor hbl. svak impr. <u>Py</u> .	80°	0.03	0.11	0.03	0.7	3.13	
1.65 - 2.20	0.55	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.spor hbl.impr. <u>py</u>	70°	0.17	0.15	0.16	2.0	10.43	
2.20 - 3.30	1.10	Pegm.							
3.30 - 4.30	1.00	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk.diffuse gr. 0.5-1.5 mm. Svak impr. <u>Py</u> ,spor <u>Po</u>	70° 80°						
4.30 - 4.80	0.50	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.mm tykke biot.-band. spor hbl. svak impr. <u>py</u> , spor <u>po</u> .	80°						
4.80 - 5.10	0.30	Pegm.							
5.10 - 5.70	0.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys.spor gr. 0.5-1.0 mm svak impr. <u>py</u> .	80°						
5.70 - 6.00	0.30	Pegm.							
6.00 - 7.00	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,grov-mlk. hbl.før. tildels kv.rik.diffuse spor gr. 0.5-1.0 mm. Ved 6.70-6.75 spor <u>sl</u> . Imp. <u>py</u> .	70° 90°	0.22	0.08	0.48	3.5	7.57	
7.00 - 7.30	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.-grovk. biot.rik imp. <u>Py</u> .	70°	0.01	0.11	0.08	2.7	9.26	
7.30 - 7.75	0.45	skarn Mørk,mlk.		0.01	0.03	0.01	0.1	3.00	
7.75 - 8.00	0.25	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. spor hbl. svak imp. <u>py</u> .	70° 80°	0.00	0.02	0.00	1.3	5.35	
8.00 - 8.90	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.lys mlk.-grovk. svakt hbl.før.spor gr.0.5-1.0mm. svak imp. <u>py</u>	80°	0.04	0.05	0.32	1.3	7.34	

Lokalitet:

Borehull: 512

side 2

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
8.90 - 9.45	0.55	hbl.gn. mørk, grovk. impr. sl, cp, py	80°	0.17	2.53	3.14	21.8	14.22	
9.45 - 10.15	0.70	biot.gn. Mørk, mlk-grovk. spor hbl. Imp. sl, cp, po, py.	70° 80°	0.16	1.11	2.69	11.4	19.57	
10.15 - 10.40	0.25	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk-fink. med cm-tykke band av hbl. svak imp. py spor sl.	80°	0.02	0.22	0.02	2.1	3.13	
10.40 - 11.05	0.65	biot.gn. Mørk, grovk-mlk. hbl.førende noen kv.slirer. impr. sl, cp Py, po.	80°	0.40	0.74	6.90	10.8	22.70	
11.05 - 11.70	0.65	2 gl.gn.b.d. Rel. mørk, mlk. med mm.tykk skikt biot. og hbl. spor gr. 0.5-1.0 mm. impr. py	80°	0.09	0.18	0.35	2.9	8.09	
11.70 - 13.00	1.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. hbl.førende, cm tykke band med hbl. gn. kv.rikere partier. spr. gr. 1-3 mm. svak impr. py.	70° 80°	0.44	0.14	0.75	7.0	6.65	
13.00 - 15.35	2.35	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk.spor hbl. tildels kv. rik. imp. lys sl, py	70° 80°	0.59	0.46	2.37	10.8	7.43	
15.35 - 17.75	2.40	2 gl.gn.b.d. Rel. lys, mlk. hbl.førende dm.tukke kv.rike partier. Spredte gr. tildels gr-før. 1-3 mm. ved 16.00 - 16.10 amf. Svak imp. Py spor sl.	80°	0.25	0.09	0.51	6.0	5.48	
17.75 - 20.25	2.50	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. kv.rik. spor gr. 1-2 mm. spredte spor hbl. cm-tykk band pegm.	80° 90°	0.07	0.02	0.27	2.1	3.13	17.75-19.50
20.25 - 20.90	0.65	hbl.gn. Rel.mørk, grov-mlk. gr.førende tildels gr.rik. 1-10 mm.spor py	80°						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 512

Side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
20.90 - 24.45	3.55	2 gl.gn.b.d. Rel. lys,mlk. vekslende med dm.tykke band hbl.gn. spr. gr. tildels gr.førende 1-3 mm fortrinnsvis i hbl.gn. svak impr. py.	80° 90°						
24.45 - 25.95	1.50	2 gl.gn.b.d. lys,mlk.rel.kv.rik.spor hbl. spr. gr. 1-2 mm, svak imp. Py.	80° 90°						
25.95 - 26.75	0.80	Peg.							
26.75 - 28.65	1.90	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. spor hbl. 27.45 - 27.55 amf. band. spr. gr. 1-3 mm.	80° 90°						
28.65 - 29.15	0.50	Peg.							
29.15 - 30.45	1.30	Hbl.gn. Rel.lys,fink.gr. tildels gr. før. rel.mass. cm.tykke peg.band. spor py.	80° 90°						
30.45 - 30.70	0.25	Peg.							
30.70 - 31.05	0.35	hbl.gn. Rel.lys,fink.kv.rik.mass. Spr. diffuse gr. 0.5-1.0 mm	80°						
31.05 - 31.35	0.35	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.hbl.førende. spor gr. 1-2 mm.	80°						
31.35 - 32.05	0.70	Peg.							
32.05 - 33.60	1.55	hbl.biot.gn. Rel.mørk,mlk. vekslende cm-tykke band peg. spr.gr.1-3mm	80° 90°						
33.60 - 34.20	0.60	2 gl.gn.b.p. Lys,fink.mass.kv.rik. spor gr. 1-2 mm.	90°						
34.20 - 34.70	0.50	Peg.							
34.70 - 36.20	1.50	2 gl.gn.b.p. Lys,fink.mass.kv.rik spor gr. 0.5 - 2 mm.	90°						
36.20 - 36.80	0.60	hbl.gn. mørk,mlk. gr.førende	80°						

Lokalitet:

Borehull: 512

side 4

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
36.80 - 37.70	0.90	amf. mørk, mlk. mass.	90°						
37.70 - 38.20	0.50	hbl.gn. Mørk, mlk. amf. preg.	85°						
38.20 - 38.35	0.15	Peg.							
38.35 - 38.85	0.50	hbl.gn. mørk, mlk. spr. gr. 1-3 mm	90						
38.85 - 39.20	0.35	Peg.							
39.20 - 43.50	4.20	Hbl.gn. Mørk, mlk-fink. enkelte cm-tykke band med peg. gr.før. tildels rik. 1-4 mm.	80° 90°						
43.50 - 44.55	1.05	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, fink.-mlk. tildels kv.rik gr.førende 1-3 mm.	90°						
44.55 - 44.80	0.25	kv. vit. (Njølke, kv.)							
44.80 - 47.50	2.75	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, fink. rel.mass. kv. rik. gr.førende 1-3 mm tildels gr.rik.	80° 90°						
47.50 - 47.90	0.40	hbl.gn. rel.mørk, mlk. gr.rik. 1-3 mm.	90°						
47.90 - 48.60	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.lys, mlk.-fink. tildels kv.rik. gr.førende. 1-3 mm.	80° 90°						
48.60 - 57.90	9.30	hbl.gn. Rel.mørk, mlk. vekslende med smale peg.band. og amf. opp til cm-tykke. Gr.førende tildels rik 1-3 mm.	80° 90°						
57.90 - 58.25	0.35	2 gl.gn.b.p. Lys, fink. kv.rik. opplitisk. gr.rik. mass. 0.5-1.0 mm.	90°						
58.25 - 61.70	3.55	hbl.gn. Rel.mørk, mlk. jevnt bandet med cm-tykke lysere band. kv.peg.gr.førende tildels rik. 1-3 mm.	80° 90°						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 512

side 5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
61.70 - 61.90	0.20	kv.							
61.90 - 67.10	5.20	hbl.gn.	Mørk,mlk-fink. meget veks- lende med diffuse overganger mellom biot.hbl.gn. Hbl.gn. med amf.preg. samtidig gjennom- krysset av opp til cm-tykke slirer og band av peg. gr.- førende, tildels rik. 0.5-2 mm	70° 90°					
67.10 - 68.05	0.95	hbl.biot.gn.	Mørk, fink. mass. gr.førende 0.5 mm.						
68.05 - 68.40	0.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys, fink.mass.preg. opp til cm-tykke peg.slirer.. gr.førende 0.5 - 1.0 mm.	70° 80°					
68.40 - 73.20	4.80	hbl.gn.	mørk, fink-mlk-grov.vekslende med små partier av fink. hbl. biot.gn. cm-tykke band med peg. gr.før. tildels gr.rik. 1-3 mm.	70° 90°					
73.20 - 73.75	0.50	Peg.							
73.75 - 75.00	1.25	hbl.gn.	Mørk, mlk. gr.rik. 1-3 mm.	90°					
75.00 - 75.20	0.20	Peg.							
75.20 - 78.90	4.40	hbl.gn.	Mørk, mlk. med smale kv.rikere partier fra 77.15-77.20 peg. gr.førende 1-3 mm.	70° 90°					
78.90 - 79.10	0.20	Peg.							
79.10 - 79.60	0.50	2 gl.gn.b.p.	Lys, mlk-fink. kv.rik.gr.før. 0.5 - 1.0 mm.	90°					
79.60 - 81.50		hbl..gn.	mørk, mlk.med smale 0.5 cm tykke peg.band. spr. gr. 1-3 mm.	80° 90°					

Lokalitet:

Borehull: 512

side 6

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
81.50 - 81.75	0.25	Pegm.	80° 90°						
81.75 - 86.40	4.65	hbl.gn. Mørk, mlk. bandet med opp til 0.5 cm-tykke lysere tildels filmtynne lv.peg.band. Spr. gr. tildels gr.førende.1-3mm.							
		10/2 1978							
		Stellan Burman							

Lokalitet: FORSLRINGSORT
PROFIL 44.200

Borehull: 511

Dato: JAN. 78
Koordinater: X: 925.404,4 Y: 44.197,8
Retning: N
Helling/stigning: 62°
Hoyde: 70.8 m
Lengde: 25.94 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.50	3.50	hbl.gn. Noe lys,mlk.Enkelte partier ekstra kv.rike. Litt pegm. Noen biot.rike partier. Godt impr. sl,py,gn,noe cp.	60	1.65	0.74	8.78		9.00	0.00-1.00
				2.48	0.21	8.86		7.93	1.00-2.00
				0.92	0.84	5.94		11.36	2.00-3.50
3.50 - 4.30	0.80	Pegm. livit, grovk.		0.11	0.08	0.82		1.48	
4.30 - 5.70	1.40	hbl.gn. Noe mørk,mlk.Litt pegm. Noe skarn. Rel. jevnt besatt gr. 2-4 mm. Sv. impr. py	70°	0.00	0.04	0.07		6.00	
5.70 - 6.05	0.35	biot.sk. Mørk,grovk. Spor gr.Noie kv.	60-65						
6.05 - 7.20	1.15	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk.-fk. kv-rik	45-50						
7.20 - 8.70	1.50	biot.sk. Mørk,grovk.-mlk. Endel kv. iblandet. Spor hbl. Sv.impr. py.	50-55						
8.70 - 9.00	0.30	TAP							
9.00 - 9.75	0.75	Hbl.biot.gn. Noe mørk,mlk.Noie kv.Spredte gr. 1-2 mm. Flekk sl,py, på 9.13 - 9.15	30-35						
9.75 - 10.05	0.30	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fk.Kv.rik.Noie biot-rike partier	40-45						
10.05 - 11.00	0.95	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk.Enkelte biot.str. Noie kv. spor py.	55-60	0.06	0.25	0.16		4.93	
11.00 - 11.50	0.50	biot.sk. Mørk,grovk.Endel kv.ibl. impr. py. Sv. impr. sl.		1.51	0.28	1.79		11.79	
11.50 - 11.80	0.30	hbl.gn. Noe mørk,mlk.Endel kv. Impr. sl, py.		1.46	0.40	3.58		10.07	
11.80 - 12.35	0.55	2 gl.gn.b.d. Noie mørk,mlk. Litt kv. Sv. impr. sl, py.		0.47	0.31	1.25		9.00	

Lokalitet:

Borehull: 511

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
12.35 - 13.05	0.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-grovk.Spor hbl. Sv. impr. <u>py</u> .	40- 45	0.24	0.17	0.82		5.14	
13.05 - 16.00	2.95	biot.sk. Mørk,grovk.-mlk.Endel kv. iblandet.Endel grovk.hbl. Delvis godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> <u>po</u> . Noe <u>cp</u> .	40- 45	0.25	1.66	2.56		18.43	13.05- 14.00
16.00 - 16.40	0.40	TAP		0.20	0.99	1.48		15.86	14.00- 16.00
16.40 - 16.55	0.15	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. Noe kv.		0.15	0.18	0.41		5.14	
16.55 - 19.20	2.65	hbl.gn. Mørk,mlk.No. vekslende ford. av biot og hbl. Delvis noe grovk.biot. Endel kv. Delvis godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>po</u> . Noe <u>cp</u> .	55- 60	0.52	0.86	6.08		12.86	16.55- 18.00
19.20 - 20.10	0.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. Noe kv.Stedvis noe hbl.Impr. <u>sl</u> , <u>py</u>	55- 60	1.64	0.19	3.15		5.79	
20.10 - 22.05	1.95	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.Litt pegm. og kv. Enkelte biot.rike striper	60- 65	0.23	0.05	0.37		1.71	20.10- 22.00
22.05 - 24.60	2.55	hbl.biot.gn. Noe mørk,mlk. Endel kv.og pegm. Enkelte hbl.rike og biot-rike partier.Spredte gr. 1-2 mm. Sv. impr. <u>py</u> .	30 35						
24.60 - 24.90	0.30	Pegm. Hvit grovk.							
24.90 - 25.90	1.00	Biot.gn. Lys,mlk-fk. kv-rik.Spor gr. 0.5-1 mm.	60						

25.1. 1978


 Kaare M. Hegrum

Lokalitet: FORSLERINGSORT
PROFIL 44.200

Borehull: 510

Dato: JAN. 78
Koordinater: K: 925.404,3 Y: 44.198,2
Retning: N
Helling/stigning: +83°
Høyde: -68,3 m
Lengde: 10.34 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.15	0.15	Pegm.	Hvit grovk.						
0.15 - 1.20	1.05	Hbl.biot.gn.	Noe mørk,mlk. Enkelte større flekker hbl. Spor gr. 0.5-1mm Impr. py.						
1.20 - 1.55	0.35	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.Tenderer mot musk.gn. Noe grovk. hbl. Spor gr. 1-2 mm. Tynn stripe sl,py, på 1.52 - 1.54						
1.55 - 3.40	1.85	Biot.gn.	Noe mørk,mlk.Spredte spor hbl.Enkelte pegm.striper. Spor gr. 1-2 mm.Impr. py. Stedvis D.	0.09	0.29	0.21		8.42	
3.40 - 3.80	0.40	hbl.gn.	Noe mørk,mlk-grovk. Noe kv. og pegm. Sv. impr. sl,py.	0.50	0.17	1.23		4.91	
3.80 - 4.30	0.50	biot.gn.	Noe mørk,mlk. Enkelte lyse partier 2 gl.gn.alm.Litt hbl.	0.02	0.32	0.11		6.08	
4.30 - 4.55	0.25	Pegm.	Hvit, grovk.						
4.55 - 4.90	0.35	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.Noie hbl.mot slutten Impr. py, noe sl.	1.08	0.15	3.25		7.71	
4.90 - 5.20	0.30	biot.gn.	Noe lys,mlk-fk. Kv-rik.Noie hbl. Impr. sl,py,cp.	1.33	1.22	7.81		13.09	
5.20 - 6.25	1.05	hbl.gn.	Noe lys,mlk.kv.rik.Enkelte biot.rike partier.Impr. sl, py, noe cp.	2.05	0.63	5.82		9.35	
6.25 - 6.55	0.30	malm	Noe mass. sl-malm med gn,cp kv. og hbl. iblandet.	9.03	0.26	12.38		7.71	
6.55 - 6.75	0.20	hbl.gn.	Noe mørk,mlk.-grovk. Noe grovk. biot. og hbl. Impr. sl, po, cp.	1.02	2.11	2.85		10.52	

Lokalitet:

Borehull: 510

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
6.75 - 7.45	0.70	biot.gn.	Noe mørk, mlk. Sv. spor hbl. Impr. py, spor sl. Noe kv.	60-65	0.29	0.22	1.53	6.86	
7.45 - 7.70	0.25	malm	Rel. mass. sl-malm. Endel grovk. biot. og hbl. ibl.		2.43	0.37	12.01	11.57	
7.80 - 8.00	0.30	biot.gn.	Noe mørk, mlk. Noe kv. spor hbl. Impr. py.		0.11	0.26	0.43	7.50	
8.00 - 9.20	1.20	hbl.gn.	Noe lys, mlk. Enkelte biot- rike partier. Noe kv. Impr. py.	60-65					
9.20 - 10.00	0.80	amf.	Mørk, mlk. Enkelte biot. rike partier. Noe kv. Rel. jevnt besatt gr. 2-4 mm. De største stichtolitisk preget. Impr. py.						
10.00 - 10.35	0.35	hbl.gn.	Noe mørk, mlk. Noe kv. Rel. jevnt besatt gr. 1-2 mm. Impr. py.						

25.1. 1978

Kaare M. Hegrum
 Kaare M. Hegrum

Lokalitet: FORSERINGSORT
PROFIL 44.170

Borehull: 509

Dato JAN. 1978
Koordinatorer X: 925.396,3 Y: 44.171,2
Retning : S
Helling/stigning: ÷ 63°
Hoyde : ÷ 761 m
Lengde : 21.38 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.Enkelte biot-rike partier.Noie pegm. Spor hbl. Tildels godt impr. <u>sl</u> (lys type). Py, noe <u>cp</u> ,gn.	35°	2.29	0.30	5.39		9.82	
1.50 - 4.60	3.10	biot.gn. Noie mørk,mlk-grovk. En god del kv.striper.Stedvis noe hbl. Tildels godt impr. <u>sl</u> , py, noe <u>po</u> , <u>cp</u> .	40°	0.48	0.46	2.70		14.73	1.50 - 3.00
				1.22	0.80	3.56		15.43	3.00 - 4.60
4.60 - 5.90	1.30	hbl.gn. Lys,mlk-fk. kv-rik.Noie biot.str. Godt impr. <u>sl</u> (lys type). Py.	40-45	0.65	0.16	5.06		11.69	
5.90 - 6.60	0.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. Enkelte biot-rike partier.	60°	0.12	0.06	0.40		2.34	
6.60 - 7.20	0.60	hbl.gn. Lys,mlk.-fk. kv.rik Impr. lys, <u>sl</u> , py.		4.12	0.13	4.17		9.35	
7.20 - 7.80	0.60	hbl.gn. lys,mlk.-fk. Endel pegm. Enkelte biot.str. Impr. <u>sl</u> , py.		0.62	0.48	3.59		7.01	
7.80 - 9.90	2.10	hbl.gn. mørk,mlk-grovk.biot. og hbl. Endel kv. Godt impr. Mørk <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>po</u> , Noie <u>cp</u> .	60°	0.69	0.57	7.36		13.32	
9.90 - 11.20	1.30	hbl-biot.gn. Noie mørk,mlk-grovk. Endel grovk.biot. og hbl. Enkelte kv-striper.Spredte gr. 1-2 mm. Impr. <u>py</u> .	30-35	0.18	0.16	0.77		5.84	
11.20 - 13.30	2.10	hbl.gn. Noie mørk,mlk-grovk. Endel grovk.biot og hbl. Noie kv. striper. Sv. impr. <u>sl</u> , <u>py</u>	40-45	0.52	0.63	2.11		9.12	

Lokalitet:

Borehull:

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.30 - 14.50	1.20	hbl.gn. Noe mørk, mlk-grovk. Noe grovk. biot. og hbl. Rel. jvent besatt gr. 1-2 mm. spor py.	55-60	0.07	0.11	0.38		6.31	
14.50 - 15.00	0.50	TAP							
15.00 - 15.55	0.55	hbl.gn. Noe mørk, mlk. Samme som før tap.		0.02	0.14	0.21		6.08	
15.55 - 16.00	0.45	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. Tenderer mot musk. gn. Impr. Sl, py.	60-65	1.51	0.15	3.92		6.78	
16.00 - 16.85	0.85	2 gl.gn.alm. Lys, mlk.-grovk. Spor sl, py.	40-45	0.24	0.18	1.04		3.51	
16.85 - 17.25	0.40	malm Rel.mass. Sl-malm med str. av 2 gl.gn.alm. og pegm.		2.38	0.10	11.46		10.99	
17.25 - 21.35	4.10	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. Enkelte tynne striper biot.gn. Enkelte pegm.-striper.	55-60	0.05	0.03	3.06*		2.81	17.25-18.50

25/1 1978

Kaare M. Hegrum

Kaare M. Hegrum

X HER MÅ LIT AV DET
FØRØGÆNDE HA KOMMET MED

Lokalitet:

Borehull: 508

2.

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
8.70 - 9.00	0.30	2 gl.gn.b.p. lys,mlk.-grovk. sv. impr. py, spor sl.	45	0.33	0.19	0.79		6.73	
9.00 - 9.25	0.25	TAP							
9.25 - 9.70	0.45	2 gl.gn.b.p. lys,mlk-grovk. Endel biot. Noe kv. Noe hbl. mot slutt en sv. impr. sl, py.							
9.70 - 10.45	0.75	malm Rel. komp. sl malm med py cp, po. Svært mye grovk. biot og hbl. iblandet.		0.05	1.56	5.73		27.42	
10.45 - 14.00	3.55	hbl.biot.gn. Noe mørk,mlk. Stedvis partier grovk. biot. Også grovk. hbl. Endel kv-str. Impr. sl, py, gn, po.	30-35	0.53	0.63	3.18		10.93	10.45-12.00
				0.54	0.52	4.53		9.85	12.00-14.00
14.00 - 15.85	1.85	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk.Endel kv. Noe biot. Impr. sl, py.	60	0.42	0.37	3.45		6.43	
15.85 - 16.30	0.45	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. Spor sl, cp.		0.34	0.16	1.37		3.86	
15.30 - 17.30	1.00	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk. Enkelte biot-rike partier. Spor gr.1-2mm	55-60	0.04	0.06	0.13		2.96	
17.30 - 19.75	2.45	hbl.gn. Mørk,mlk. Stedvis amf.-partier. Også flekker av skarn. Noe ujevnt besatt gr. 1-2 mm. Impr. py.							

18/1 1978

Kaare H. Hegrum

Lokalitet: FORSERINGSORT
PROFIL 44.170

Borehull: 507

Dato : Des. 77
Koordinator : X:925.401.8 Y:44.170.1
Retning : N
Helling/stigning: + 78°
Høyde : - 69 m
Lengde : 14.83 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.40	2.40	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk. Enkelte tynne partier musk.gn. Flekker hbl. Impr. sl, py.	60	1.26	0.34	3.76		6.22	
2.40 - 2.65	0.25	TAP							
2.65 - 3.40	0.75	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk. flekker hbl. Enkelte biot-rike striper. Impr. sl, py.		1.01	0.32	2.74		5.38	
3.40 - 4.25	0.85	biot.gn. Nor mørk,mlk. Enkelte kv.-striper.Spor hbl.Sv.impr. sl, noe py.	45	0.34	0.52	0.55		10.09	
4.25 - 5.25	1.00	kvartsittisk gn. Lys,fk-mlk. stedvis bånd av 2 gl.gn.b.p. Noe hbl. Impr. sl, gn.		1.56	0.25	4.76		9.59	
5.25 - 5.40	0.15	TAP							
5.40 - 6.00	0.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. Noe kv.Enkelte biot.pregede soner,spor hbl.	75-80	0.26	0.28	0.43		5.21	
6.00 - 8.80	2.80	hbl.gn. mørk,mlk. Meget godt impr. sl, py. Endel massive str. sl. Enkelte biot.str. også gn, po.		1.82	0.61	8.63		11.77	6.00-7.50
8.80 - 15.00	6.20	hbl.gn. Noe mørk,mlk. Noe mere biot-rik helt til å begynne med. Jevnt besatt gr.1-2mm Impr. py.	60	3.18	0.74	9.73		11.77	7.50-8.80
				0.09	0.15	0.29		9.08	8.80-10.00

18.1. 1978

Kaare M. Hegrum

Kaare M. Hegrum

Lokalitet: FORSLRINGSORT
PROFIL 44.150

Borehull: 506

Dato : Des. 77
Koordinater : X:925.392.3 Y:44.155.7
Retning : S
Helling/stigning: - 60°
Høyde : - 71.4
Lengde : 11.62 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	Biot.gn. Mørk,mlk.endel kv. impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>cp</u> .		1.17	1.12	6.71		11.09	
0.40 - 1.00	0.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.Endel biot. i str. Noe kv. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .	40-45	1.10	0.10	2.39		9.00	
1.00 - 2.00	1.00	hbl.gn. Noe mørk,mlk. Endel kv.str. Mye hbl. som større rene partier. Godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .	45	1.64	0.72	6.55		13.60	
2.00 - 2.55	0.55	biot.gn. Noe lys,mlk. Spor hbl. Noe kv.str. Sv. impr. <u>py</u> .	30	0.11	0.26	0.24		9.21	
2.55 - 2.85	0.30	biot.sk. Mørk,grovk. Noe kv. Spor hbl. Impr. <u>py</u> , <u>sl</u> .	30	0.02	1.42	1.06		18.42	
2.85 - 3.75	0.90	hbl.-biot.gn. Noe mørk,mlk.hbl. noe uregelmessig.Endel kv. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .	30	0.57	0.82	4.07		12.14	
3.75 - 4.00	0.25	TAP							
4.00 - 5.15	1.15	biot.gn. Noe mørk,mlk.Spor hbl. Flere kv.striper. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .	35-40	0.70	0.64	2.48		9.42	
5.15 - 6.30	1.15	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.Endel biot-striper Noe kv. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>cp</u> .	45	0.47	0.29	1.32		2.93	
6.30 - 7.35	1.05	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.Noen tynne partier 2 gl.gn.alm. Endel kv-str.Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .	45-50	1.34	0.38	2.94		7.33	
7.35 - 8.00	0.65	TAP							
8.00 - 9.15	1.15	biot.gn. Noe mørk,mlk.Stedvis noe hbl. Noen kv.str.Impr. <u>sl</u> , <u>py</u>	60	0.98	0.37	3.68		10.67	
9.15 - 11.75	2.60	Mørk,mlk.-grovk.Endel grovk biot.Noen kv-str.Rel. tett besatt gr.l-2mm. Spor <u>py</u> .	45-50	0.10	0.10	0.52		6.07	9.15-10.00

5.1. 1978
Kaare M. Hegrum
Kaare M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.150

Borehull: 506

Dato : Des. 77
Koordinater : X: 925.392.3 Y:44.155.7
Retning : S
Helling/stigning: - 60°
Høyde : - 71.4 m
Lengde : 11.62 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	Biot.gn. Mørk,mlk. endel kv. Impr. sl, py, cp.		1.17	1.12	6.71		11.09	
0.40 - 1.00	0.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. Endel biot. i striper. Noe kv. Impr. sl, py.	40- 45	1.10	0.10	2.39		9.00	
1.00 - 2.00	1.00	hbl.gn. Noe mørk,mlk. Endel kv.- striper.Mye hbl. som større, rene partier. Godt impr. sl, py.	45	1.64	0.72	6.55		13.60	
2.00 - 2.55	0.55	biot.gn. Noe lys, mlk. Spor hbl. Noe kv.-striper.Av.impr.py	30	0.11	0.26	0.24		9.21	
2.55 - 2.85	0.30	biot.str. Mørk, grovk. Noe kv. Spor hbl. Impr. py, sl.	30	0.02	1.42	1.06		18.42	
2.85 - 3.75	0.90	hbl.-biot.gn. Noe mørk,mlk. hbl. Noe uregelmessig. Endel kv. Impr. sl, py.	30	0.57	0.82	4.07		12.14	
3.75 - 4.00	0.25	TAP							
4.00 - 5.15	1.15	biot.gn. Noe mørk,mlk. Spor hbl. Flere kv.striper. Impr. sl, py.	35- 40	0.70	0.64	2.48		9.42	
5.15 - 6.30	1.15	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. Endel rene biot- striper. Noe kv. Impr. sl, py, cp.	45	0.47	0.29	1.32		2.93	
6.30 - 7.35	1.05	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk. Noen tynne partier 2 gl.gn.alm. Endel kv.striper. Impr. sl, py.	45- 50	1.34	0.38	2.94		7.33	
7.35 - 8.00	0.65	TAP							

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.150

Borehull: 506

2.

Dato Des. 77
Koordinater X: 925.392.3 Y:44.155.7
Retning : S
Helling/stigning: - 60°
Høyde : - 71.4 m
Lengde : 11.62 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
8.00 - 9.15	1.15	biot.gn. Noe mørk, mlk. Stedvis noe hbl. Noen kv.striper. Impr. sl, py.	60	0.98	0.37	3.68		10.67	
9.15 - 11.75	2.60	Hbl.gn. Mørk, mlk-grovk. Endel grovk. biot. Noen kv.- striper. Rel. tett besatt gr. 1-2 mm. Spor py.		0.10	0.10	0.52		6.07	9.15-10.00

5.1. 1978
K.M. Hegrum
KM Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44150

Borehull: 505

Dato : Des. 77
Koordinater : X: 925.396,6 Y: 44.152,7
Retning : N
Helling/stigning: -48
Høyde : - 71,2m
Lengde : 21,38m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 0,30	0,30	2gl.gn.b.d	lys,mlk.kv. rik impr. sl,ep, gn.py	1.02	0.52	2.48		6.96	
0,30 - 1,80	1,50	biot.sl	mørk grovk. biot.Endel kv. og kv.linser.Stedvis hbl.Godt impr sl, py, po, noe ep 30	1.06	0.71	3.42		15.79	
1,80 - 2,35	0,55	biot.gn	noe lys,mlk-fk.Stedvis striper grovk. biot.Flekke av hbl. Godt impr. py,po,sl,ep	0.24	0.86	1.60		17.66	
2,35 - 2,75	0,40	biot.sk	mørk,grovk.Noel kv. flekker hbl.Godt impr. py,sl 30	0.78	0.24	5.12		21.06	
2,75 - 3,00	0,25	Tap							
3,00 - 4,25	1,25	biot.sk	Samme biot.sk.som over.også ep,gn 40-45	1.06	0.20	7.69		27.68	
4,25 - 5,35	1,10	biot.gn	noe lys,mlk.kv.rik.Endel hbl Enkelte pegm-striper.Meget godt impr sl,py.Også gn	1.98	0.55	7.11		13.25	
5,35 - 7,50	2,15	biot.gn	noe lys,mlk.Vekslende innhold av kv. og pegm.Noen få striper grovk. biot.Impr.sl,py.Noel gn 45	0.57	0.17	3.30		6.45	
7,50 - 8,15	0,65	biot.sk	mørk.grovk.Noel kv.iblandet spor hbl.Impr. py,po,sl,ep 45	0.69	0.37	4.10		18.85	
8,15 - 13,35	5,20	biot.gn (hbl.-biot.gn)	Noel lys,mlk.Endel kv. iblandet.60- Enkelte striper grovk. biot. 65 rel. jevnt fordelt hbl.rel. jevnt impr. sl,py,po.Noel gn,ep	0.30	1.01	4.03		15.11	8,15-9,50
				0.15	0.77	2.42		18.34	9,50-10,50
				0.30	0.71	3.13		17.32	10,50-11,50
				0.57	0.45	2.77		13.58	11,50-12,50
				1.08	0.48	3.11		6.45	12,50-13,35
									2

Lokalitet:

Borehull: 505

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13,35 - 13,80	0,45	Tap							
13,80 - 15,85	2,05	hbl-biot.gn	Noe lys,mlk.Flekke av muss. hbl.Biot rike striper Kv.rik. Noen pegm-striper.Godt impr. sl,py,Noe cp,gn	0.82	0.64	5.75		8.49	13,80- 15,00
			45	0.41	0.71	7.70		12.40	15,00- 15,85
15,85 - 16,50	0,65	biot.gn	Noe lys,mlk.Endel kv.Stedvis muss-rike partier.Impr.sl,py po,gn	0.88	0.18	2.19		6.11	
16,50 - 16,75	0,25	Tap							
16,75 - 17,40	0,65	2gl.gn.b.p	Noe lys,mlk.Enkelte biot.rike partier.Noegm	0.55	0.07	0.18		4.42	16,75- 18,00
17,40 - 17,50	0,10	pegm	hvit,grovk.Litt biot.Litt sprekkefulling av gn og po						
17,50 - 18,85	1,35	hbl.b.a	grønn,mlk-fk.Består strort sett bare av hbl.Litt biot. Rel.mye gulgrønn skarn.Sv. impr. py						
18,85 - 20,20	1,35	hbl.gn	Noe mørk,mlk.Noeg vekslende biot.innhold.Endel kv.Spor gr. 1-2mm.Impr.py						
20,20 - 21,35	1,15	2gl.gn.b.p	Noe lys,mlk.Vekslende biot. fordeling.Ebdel kv.						

21/12-77

K.M. Hegrum



Lokalitet: *Forserings-ort*
Profil Y: 44350

Borehull: 504

Side 1

Dato : *Des. 77.*
 Koordinater : *925.424.9 Y: 44.346.1*
 Retning : *-90°*
 Helling/stigning: *-90°*
 Høyde : *-66.3*
 Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.35	1.35	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk med lysere part. Mlk. smale hbl.band. Spr. gr. 1-4 mm. Svak impr. <u>Py</u>	60° 70°				<i>9/Ag</i>		
1.35 - 4.30	2.95	Peg.							
4.30 - 5.70	1.40	biot.gn. Mørk, med lysere band.mlk-grovk. jevnt båndet med cm-tykke band med peg. hbl.biot.spr.gr. företrädesvis i dom mørkare partierna 1-3 mm. svag impr. <u>py, po</u>	80°						
5.70 - 6.95	1.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk med lysere band. mlk. tildels med hbl-rikere part. Spor gr. 1-2 mm. ved 6.05-6.35 svake spor <u>sl</u> , impr. <u>py</u> .	70° 80°						
6.95 - 7.40	0.45	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.kv.rik.spor gr.1-2mm	70°						
7.40 - 9.00	1.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.svake spor hbl. spor gr. 1-3 mm. spor <u>Py</u>	80°						
9.00 - 10.10	1.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.kv.rik ved 9.90-9.95 spor hbl.gr.0.5-1 mm.sv.impr <u>Py</u> .	80°						
10.10 - 12.80	2.70	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk.rel.biot.rik på visse partier.Spor og tildels hbl.førende ved 11.50-11.60 biot.skiffer.Spr.gr. 1-3mm. fra 12.35-12.45 stichtolitisk svak impr. <u>py</u> .	80°						
12.80 - 13.60	0.80	Biot.gn. Rel.mørk,mlk-grovk.spor hbl. ved 13.00-13.05.Spr.gr. 1-2mm svak impr. <u>py</u> .	70° 80°	<i>0.05</i>	<i>0.12</i>	<i>0.33</i>	<i>2.9</i>	<i>9.14</i>	

Lokalitet:

Borehull: 504

side 2

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.60 - 14.15	0.55	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.ved 13.95-14.00 biot.rikere partier.Spor hbl.svak impr. sl, py	70° 80°	0.07	0.11	0.59	2/4 Ag	5.05	
14.15 - 14.80	0.65	Biot.gn. Mørk,grov-mlk. skifrig preg spor hbl.impr. sl, py	70° 80°	0.40	0.18	2.78	6,9	14.86	
14.80 - 16.40	1.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.biot-rikere part. svake spor hbl. impr.sl,py	70° 80°	0.49	0.24	2.35	7,7	9.14	
16.40 - 17.40	1.00	Biot.gn. Rel.mørk m/lyse band,mlk- grovk.hbl.førende.skifrig preg.Impr. sl,py,po.	70°	0.06	0.38	0.82	4,5	10.91	
17.40 - 17.65	0.25	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.svak impr.py.	70°	0.03	0.10	0.18	0,8	3.55	
17.65 - 18.75	1.10	2 gl.gn.b.d. Mørk,m/lyse parti mlk-grovk. bandet m/biot.rik s.gl.gn. alm. pegm. dm.brede. 18.00 -18.10 hbl.Imp. sl,cp py, po.	70° 75°	0.40	0.52	2.42	6,6	8.59	
18.75 - 19.10	0.35	2 gl.gn.b.d. Lys,rel.kv.rik,spor sl,py	60-70°	0.26	0.22	0.69	7,0	6.14	
19.10 - 19.80	0.70	Pegm. Lys,mlk.kv.sittisk preg. 19.45-19.55.2 gl.gn.alm. kv.rik spor sl.		0.12	0.09	0.23	1,0	2.86	
19.80 - 20.55	0.75	2 gl.gn.b.p. Rel.lys,mlk.cm.brede pegm. band.spor hbl.sl,cp.py.	70° 80°	0.22	0.13	1.56	3,4	3.68	
20.55 - 20.95	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.hbl.førende. impr.sl,cp.py.	75°	1.33	0.96	2.91	2,7	11.05	
20.95 - 24.15	3.20	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk-fink.rel.kv.rik, diffuse svake spor gr. 0.5 - 2 mm.	80°	0.07	0.05	0.28	1,8	2.86	2075-2220

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 504

Side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
24.15 - 26.70	2.55	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.hbl.førende 26.05 - 26.15. Amf.band 25.50 - 25.60-25.70-25.75 pegm.spredte gr.1-4 mm. svak impr. <u>py</u> .	80° 90°						
26.70 - 27.35	0.65	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.spor hbl. gr. 1-3 mm. svak impr. <u>py</u>	80°						
27.35 - 27.65	0.30	Pegm.							
27.65 - 28.35	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.kv-rik 27.75- 27.90 biot.rikere. 27.90- 28.00 pegm.band.Svak impr. <u>py</u>	80°						
28.35 - 29.15	0.80	Pegm.							
29.15 - 30.90	1.75	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk-fink.sv.impr. <u>py</u>	80°						
30.90 - 34.10	3.20	hbl.gn. Rel.mørk,mlk.spr.band pegm. biot.rik gr.1-3mm.førende svak impr. <u>py</u> .	80°						
34.10 - 36.00	1.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.band spor hbl. spr. gr. 1-4 mm.impr. <u>py</u> .	80°						
36.00 - 40.40	4.40	hbl.gn. Rel.mørk,mlk.spr. band pegm. biot.rik spr. gr.1-5 mm.	80°						
40.40 - 43.90	3.50	2 gl.gn.b.p. Rel.lys,mlk.spr. biot.rik band fra 2-4 cm. brede. Pertier m/spr. gr.0.5-3 mm	80°						
43.90 - 45.50	1.60	hbl.gn. Rel.mørk,mlk.spr.band pegm. gr.førende 1-5 mm.	80°						
45.50 - 48.40	2.90	amf. Mørk,fink.-mlk.noen få 3-4 cm bred pegm.band.	80°						
48.40 - 53.15	4.75	hbl.-biot.gn. mørk,mlk. homogen.							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 504

Helling/stigning:

Høyde :

Side 4

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
53.15 - 53.60	0.45	2 gl.gn.b.d. Mørk, fink-mlk.hbl.førende fra 53.15 - 53.40	75°						
53.60 - 54.45	1.45	biot.gn. Mørk,m/lyse parti mlk.,hbl førende.spr. gr. 1-3 mm.	75°						
54.45 - 56.20	1.75	Pegm.							
56.20 - 57.90	1.70	hbl.-biot.gn. Mørk,mlk.rel.massiv gr. rik 1-3 mm.							
57.90 - 61.50	3.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,m/lysere parti, enkelte pegm.band,tildels kv. gr.rik 1-4 mm, rel.mass.	70° 80°						
61.50 - 62.30	0.80	hbl.gn. mørk,mlk,m fink.rel.massiv gr.rik 0.5-2 mm.	70°						
62.30 - 64.30	2.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.rel.massiv. fra 63.10-63.30 hbl.gn. 64.15-64.20 hbl.band. Gr.rik 0.5-2 mm.	70° 80°						
64.30 - 69.15	4.85	hbl.gn. Mørk,mlk.vekslende m/amf. preg. rel.massiv.gr.før. 0.5-2 mm.	70° 80°						
69.15 - 69.30	0.15	Pegm.							
69.30 - 70.30	1.00	hbl.gn. Mørk,mlk.-fink. Spr. gr. 0.5 - 2 mm.	70°						
70.30 - 71.35	1.05	amf. Mørk,fink.gr.førende 0.5-2 mm.	70°						
71.35 - 71.55	0.20	Pegm.							
71.55 - 71.80	0.25	hbl.gn. Mørk,mlk.spr. gr.1-3 mm.							
71.80 - 72.05	0.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-fink. gr.rik 0.5 - 2 mm.							

Lokalitet:

Borehull: 504

Side 5

Dato :
 Koordinator :
 Retning :
 Helling/stigning:
 Høyde :
 Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
72.05 - 74.30	2.25	amf. Mørk, fink-mlk. spredt band pegm. Tildels m/hbl.gn.preg. gr.førende 0.5-2 mm.	75°						
74.30 - 76.70	2.40	Pegm.							
76.70 - 77.00	0.30	Amf. mørk, fink.massiv.spr. gr. 0.2 - 0.5 mm.	70°						
77.00 - 77.40	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, fink.massiv hbl. førende.gr.rik 0.2-0.5 mm.							
77.40 - 79.85	2.45	amf. mørk, m/lyse parti fink, bandet m/dm brede 2 gl.gn.b.d. hbl. førende parti. Tildels gr.rik 0.5 - 3 mm.	70° 80°						
79.85 - 80.15	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, fink.massiv.gr.rik 0.5 - 3 mm.							
80.15 - 81.80	1.65	hbl.gn. Mørk, m/lyse parti fink.-mlk. parti m/amf.preg, rel.massiv Tildels gr.rik.0.5-3 mm.	70° 80°						
81.80 - 82.00	0.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, fink-mlk. Rel.massiv gr.førende 0.5-3 mm.							
82.00 - 82.53	0.53	hbl.gn. Rel.mørk, m/lysere parti, mlk.-fink. cm-brede band pegm. spr. gr. 1-4 mm.	80°						

9/2 1978

Holger Pantdalsli

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.150

Borehull: 503

Dato : Des.77
Koordinater : X: 925.396,6 Y:44.152,6
Retning : N
Helling/stigning: + 79°
Høyde : - 68,9m
Lengde : 26,86m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 0,50	0,50	2gl.gn.alm	lys,mlk.Stedvis biot.sb.Noekv. sv.impr. py,sl	0.53	0.28	0.80		4.75	
0,50 - 1,10	0,60	2gl.gn.b.d	noe lys,mlk.Enkelte partier med musk-dominans.Endel kv. Spor hbl.Impr.sl,py 45	0.65	0.61	2.53		10.50	
1,10 - 1,30	0,20	hbl.gn	mørk,grovk. ambud bare grovk. hbl og biot.Litt kv. Impr.py, sl.	0.43	0.48	3.32		11.25	
1,30 - 2,00	0,70	2gl.gn.alm	lys,mlk.Litt kv.Stedvis biot.-dominans.Spor hbl til å begynne med.Impr. sl,py 30	0.80	0.29	2.36		6.00	
2,00 - 2,40	0,40	biot.gn	noe mørk,mlk.Stedvis noe musk. Endel kv. Impr.sl,py.Noecp	0.57	0.45	2.73		7.25	
2,40 - 2,65	0,25	Tap							
2,65 - 5,90	3,25	2gl.gn.b.p	Noe lys,mlk.Stedvis biot.rike partier.Ebdel kv.og pegm.	0.77	0.32	3.29		7.75	2,65-4,00
			Stedvis spor hbl.Tildels meget godt impr. sl,py noe gn,cp 60	1.35	0.30	5.57		7.60	4,00-5,00
				1.63	0.26	7.38		7.58	5,00-5,90
5,90 - 6,15	0,25	hbl.b.a	grønn,mlk.Ombrent bare hbl.og kv.Litt biot.Impr.sl,py,po,cp	0.59	1.14	2.61		10.75	
6,15 - 6,80	0,65	2gl.gn.b.p	rel.lys,mlk.Stedvis ekstra biot og musk-rike partier.Spor hbl. Meget godt impr. sl,py tildels som massive striper 55-60	1.81	0.14	9.37		10.75	
6,80 - 7,00	0,20	Tap							
7,00 - 7,20	0,20	2gl.gn.b.p	samme b.art som over.Impr.sl,py	1.04	0.08	1.99		4.53	
7,20 - 8,10	0,90	biot.gn	noe mørk,mlk.Stedvis spor hbl. Noe kv.Sprede gn.1-2mm.Impr.py 70+	MANGLER					
8,10 - 8,40	0,30	Tap							

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 503

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
8,40 - 12,95	4,55	hbl.gn	mørk, mlk. Litt kv. Spredte gr. 1-2mm Impr. py Stedvis ekstra hbl-og biot-rike partier. Noe stauroolitt						
			70-75	0.11	0.05	0.57		7.33	12,00-12,95
12,95 - 13,15	0,20	hbl.gn	mørk, mlk-grov. samme b. art som over. Impr sl, py	1.23	0.15	1.76		6.38	
13,15 - 16,50	3,35	hbl-biot.gn	mørk, mlk-grovk. Endel kv. stedvis rik på stauroolitt. Spredte gr 1-2mm. Impr. py	0.20	0.06	0.40		7.05	13,15-14,00
			65-70						13-15-14,0
16,50 - 16,95	0,45	amf	mørk, mlk-fk. Tett besatt gr 1-3mm						
			30						
16,95 - 19,85	2,90	hbl-biot.gn	mørk mlk-grovk. Noe kv. Stedvis rik på stauroolitt. Enkelte rene biot-sbr. Spredte gr 1-2mm. Impr py						
			30 - 35	0.26	0.05	0.25		8.28	18,50-19,85
19,85 - 20,60	0,75	biot.gn	mørk, grovk-mlk. Noe kv. Endel straurolitt stedvis rene biot. sk. Spor hbl. Impr. sl, py	1.50	0.16	2.41		10.00	
20,60 - 26,70	6,10	hbl.gn	mørk, mlk. Stedvis noe vekslende hvl-innhold. Endel kv. linser Spor stauroolitt. Spredte gr 1-2mm. Impr. Py	0.12	0.05	0.40		7.83	20,60-22,00

23/12-77
K.M. Hegrum
 K.M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
profil 44.140

Borehull: 502

Dato : Des. 1977
Koordinater : X:925.389,3 Y: 44.134,2
Retning : N
Helling/stigning: +72°
Høyde : -69,0m
Lengde : 25,39m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 0,80	0,80	hbl.gn	lys,mlk.Delvis sterke innslag av biot. og kv.Impr py,sl	45-50	1.25	0.41	3.32	9.50	
0,80 - 4,00	3,20	2gl.gn.b.p	Noe mørk,mlk.En god del hbl som flekker.Endel kv.stedvis ekstra biot.rike bånd.Godt impr. sl,py.Noegn,cp	60°	0.71	0.71	3.95	14.25	0,80-2,00
					1.20	0.59	7.41	11.50	2,00-3,00
					1.46	0.71	6.22	10.50	3,00-4,00
4,00 - 12,30	8,30	biot.gn	mørk,mlk.Noen kv. og pegm. striper.Stedvis noe hbl.rel. jevnt fordelt gr 1-3mm.Stedvis litt staurolitt.Sv.impr.py Sv.spor sl, på 10,90 og 11,90	60°	0.18	0.31	0.54	9.00	4,00-5,50
12,30 - 25,50	13,20	hbl.gn	mørk,mlk.Stedvis pegm striper Enkelte flekker ren hbl.Jevnt besatt gr.1-2mm.Impr.py.Stedvis tynne partier med biot.gn preg.	45-50					

28/12-77

K.M.Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.140

Borehull: 501

Dato : Des. 77
Koordinater : X:925.384.4 Y:44.138.0
Retning : S
Helling/stigning: - 45°
Høyde : - 71.4 m
Lengde : 19.86 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. Noe kv. Spredte spor sl, py	30	0.14	0.10	0.30		2.47	
1.60 - 2.15	0.55	biot.gn. Lys/mørk,mlk. Svært mye kv. gir b.a. et noe lyst utse- ende. Mørk ved biot.ansml. Spor hbl. Impr. sl,py,po.		0.28	0.26	4.07		13.19	
2.15 - 2.55	0.40	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk. Noe kv. Impr. sl, py, po.		0.64	0.30	2.78		6.91	
2.55 - 4.35	1.80	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk. Stedvis tynne partier 2 gl.gn.alm. Noen pegm.striper. Spredt impr. sl, py.	30- 35	0.72	0.21	1.19		4.40	
4.35 - 4.70	0.35	2 gl.gn.b.p. Noe mørk, mlk. Noe kv.	40-45	0.09	0.12	0.48		2.80	
4.70 - 5.00	0.30	2 gl.gn.b.p. Samme b.art som over. Noe pegm. Impr. sl, py.		0.28	0.20	1.94		3.56	
5.00 - 9.20	4.20	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk. Noe kv. og pegm. Tynn sprekkefylling av cp i kv. på 5.80	30- 35	0.07	0.16	0.65		2.93	5.00-6.00
				0.00	0.02	0.04		2.05	8.00-9.20
9.20 - 11.15	1.95	biot.gn. Noe mørk,mlk.-grovk. Enkelte partier med 2 gl. gn.alm. Spor hbl. Impr. sl, py, gn.	40- 45	0.27	0.19	1.03		6.28	9.20-10.00
				1.23	0.27	3.10		7.74	10.00- 11.15
11.15 - 12.30	1.15	biot.gn. Noe mørk,mlk-grovk. Spredte Noe lysere partier. Spor hbl. Noe ujevnt besatt gr. 0.5 - 1 mm.	40- 45	0.20	0.04	0.35		3.98	
12.30 - 19.85	7.55	hbl.-biot.gn. mørk,mlk.-grovk. Endel kv. og pegm.-striper. Noe ujevnt besatt gr. 1-2 mm Delvis impr. py.	40- 45						

5/1-78 K.M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.140

Borehull: 500

Dato : Des. 1977
Koordinater : X: 925.384,1 Y: 44.138,0
Retning : S
Helling/stigning: + 72°
Høyde : - 69,0m
Lengde : 17,54m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 15,15	15,15	hbl.gn noe mørk, mlk. En del kv. striper Stedvis ekstra biot. rike bånd Av og til amf-preget, med del- vis stichtolitsike gr. Rel. jevnt besatt gr. 1-3mm. Stedvis stauro litt. Impr. py	60°						
15,15 - 15,55	0,40	biot.gn mørk, mlk. Stedvis spor hbl. Rel- tett besatt gr. 1-2mm sv. impr py	65-70						
15,55 - 17,50	1,95	2gl.gn.b.p lys, mlk. Tenderer stedvis inn mot 2gl.gn. alm. Enkelte ekstra biot. rike bånd. Noen kv. linser Spredte gr 0,5-1mm	80-85						

28/12-77
K.M. Hegrum
K.M. Hegrum

Lokalitet: *Forserings-ort*
Profil 44350

Borehull: 499

Side 1

Dato: *Nov. - Des. 77.*
Koordinater: *X: 925.408.7 Y: 44.347.9*
Retning: *8*
Helling/stigning: *-35°*
Høyde: *-66.1 m*
Lengde: *75.15 m*

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.75	0.75	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.hbl.førende med spredte gr. 1-3 mm.impr. <u>py</u>	60°						
0.75 - 1.30	0.55	2 gl.gn.b.d. lys,mlk-fink.hbl.førende lysere band med kv.pegm. spor gr. 1-2 mm.impr. <u>py</u> .	60°						
1.30 - 2.30	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk mlk.hbl.førende impr. <u>py</u>	50°						
2.30 - 4.90	2.60	Musk,gn. lys,grovk.-mlk. med litt brun biot. ondulerende foliation(Filtet preg). spor gr.1-2 mm.Sv.sp. <u>sl</u> , <u>py</u>	50°	<i>0.01</i>	<i>0.02</i>	<i>0.05</i>		<i>6.27</i>	
4.90 - 6.70	1.80	2 gl.gn.b.d. rel.mørk,mlk.-grovk.delvis muskrikere partier underordnet med hbl.spor gr.1-3 mm. Spor <u>sl</u> , impr. <u>py</u>	60°	<i>0.28</i>	<i>0.07</i>	<i>0.56</i>		<i>7.36</i>	
6.70 - 7.50	0.80	D.biot.gn. Mørk,grovk-mlk.spor hbl. gr. 1-2 mm.sv.impr. <u>py</u> .	50° 60°						
7.50 - 9.00	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk mlk.spor hbl. gr.1-3 mm. impr. <u>Py</u>	50°	<i>0.21</i>	<i>0.08</i>	<i>0.31</i>		<i>6.41</i>	
9.00 - 10.50	1.50	Musk.gn. Lys,grovk.-mlk.litt brun biot. spor gr.1-2 mm.imrp. <u>py</u>	30° 40°						
10.50 - 13.00	2.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.-grovk.spor hbl.gr. 1-2 mm. impr. <u>py</u>	25°						
13.00 - 13.50	0.50	TAP							
13.50 - 14.30	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.-grovk. spor hbl.gr. 1-2 mm.impr. <u>py</u>	25°						
14.30 - 15.00	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk.hbl.før. tildels hbl-gn.svake spor <u>sl</u> impr. <u>py</u>	35°	<i>0.04</i>	<i>0.15</i>	<i>0.23</i>		<i>7.91</i>	
				<i>0.56</i>	<i>0.21</i>	<i>1.73</i>		<i>8.45</i>	

Lokalitet:

Borehull:

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15.00 - 18.00	3.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.-grovk.spor hbl.gr.1-2 mm.16.30-16.40 spor <u>sl</u> 16.90 - 17.00 spor <u>sl</u> Impr. <u>py</u> . spor <u>po</u>	30°	0.04	0.10	0.41		7.64	
18.00 - 19.00	1.00	hbl.gn. Rel.lys,mlk.-fink.kv.rik m/ gr.1-3 mm.Stichtolitisk preg fra 18.00 - 18.60 sv.impr. <u>py</u>	25° 40°	0.00	0.03	0.05		5.32	
19.00 - 22.50	3.50	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.19.80-20.25 pegm.band.(parti) gr.førende 1-4 mm.svak spor hbl. <u>py</u> .	45°						
22.50 - 23.45	0.95	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.rel.kv.rik.parti m/ biot.preg og spor gr. 1-2 mm. svak impr. <u>py</u> .	55°						
23.45 - 25.80	2.35	hbl.gn. Mørk,mlk.svake spor gr. 0.5- 2 mm svak impr. <u>py</u>	60°						
25.80 - 26.35	0.55	amf. rel.mørk, mlk massiv svak impr. <u>py</u>							
26.35 - 28.70	2.35	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,m/lyse parti mlk. veksl. m/hbl. rik parti (27.00 - 27.15 hbl.gn. m/ stichtolitisk preg)band m/ delv. gr. 1-3 mm. sv.imp. <u>py</u>	55°						
28.70 - 29.30	0.60	2 gl.gn.alm Lys,kv.rik m/spor gr.1-2mm	60°						
29.30 - 32.70	3.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk m/lyse parti mlk.- grovk. hbl.førende band spr. gr. 1-3 mm. 32.10-32.15 pegm. svak impr. <u>py</u>	60°						
32.70 - 33.50	0.80	hbl.-biot.gn. Mørk,grovk.-mlk.Spr. gr.1- 3 mm.32.80-32.90 amf.band. Impr. <u>py</u>	50°						

Lokalitet:

Borehull: 449

Side 3

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
33.50 - 33.80	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.hbl.førende spor gr. 1-3 mm.	40°						
33.80 - 36.70	2.90	hbl.gn. Mørk, m/lyse parti.Mlk.-grovk.Vekslende m/parti 2 gl.gn.b.d. Sprette gr. 1-3 mm.Svak impr. <u>py</u>	40° 60°						
36.70 - 39.40	2.70	2 gl.gn.b.d. Lys m/mørke parti.mlk. 36.90-36.95, 38.30-38.50 Hbl.rik 37.00-37.15 seresit kv.sit. sprette gr.1-3 mm svak impr. <u>py</u>	40° 60°						
39.40 - 43.50	4.10	hbl.biot.gn. Mørk m/lyse parti,mlk.-grovk vekslende m/parti 2 gl.gn.b.d. partier rel.rik på gr.1-3 mm svak impr. <u>py</u>	30° 40°						
43.50 - 44.50	1.00	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk.spr. gr. 0.5-2 mm spor hbl. svak impr. <u>py</u>	30°						
44.50 - 44.80	0.30	Pegm.							
44.80 - 49.80	5.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk m/lyse parti.Mlk-grovk.Kv-rik parti.Spr. gr. 0.5 - 2 mm, spor hbl, god impr. <u>py</u>	40° 50°						
49.80 - 50.95	1.15	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk,spr.gr.1-2mm.spor <u>Py</u>	45°						
50.95 - 51.90	0.95	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.spr.gr.1-2mm.spor <u>Py</u>	45°						
51.90 - 52.65	0.75	TAP							
52.65 - 55.70	3.05	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.-grovk.med spr. gr. 1-3 mm.Peg.band 55.65 - 55.70	40°						
55.70 - 57.20	1.50	TAP							

Lokalitet:

Borehull: 499

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
57.20 - 58.20	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk mlk.-fink.med smale band hbl.gr.førende 1-3 mm spor py.	40° 50°						
58.20 - 61.10	2.90	hbl.gn. Mørk,mlk-fink. gr-førende 1-3 mm. ved 60.80-60.85 pegm.bånd.	45°						
61.10 - 62.60	1.50	hbl.gn. Mørk,grovk.biot.rik.gr.før. 1-4 mm.	45°						
62.60 - 63.20	0.60	hbl.gn. Rel.mørk,mlk-fink.rel.kv.rik gr.rik 1-4 m	45°						
63.20 - 63.60	0.40	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk.hbl.peg.str.Spr.gr. 1-3 mm.	45°						
63.60 - 64.25	0.65	Peg.							
64.25 - 64.75	0.50	2 gl.gn.b.d. Mørk,grovk.spor hbl.og gr. 1-4 mm.	45°						
64.75 - 66.15	1.40	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fink.med små part. b.d. spor gr. 1-3 mm.	40° 50°						
66.15 - 66.65	0.50	TAP							
66.65 - 69.40	2.75	2 gl.gn.b.p. Rel.lys,mlk.rel.kv.rik Spredte gr. 1-2 mm	45° 50°						
69.40 - 75.15	5.75	Amf. Mørk,fink-mlk. rel.rik på gr.1-4 mm ved 71.40-71.50 kv. pegm.	45° 50°						

6/2 1978

H. Pantdalsli

Lokalitet: Forseringsort
 Profil 44.350

Borehull: 498

Dato : Nov-des 1977
 Koordinater : X: 925.409,7 Y: 44.347,5
 Retning : S
 Helling/stigning: ÷ 72°
 Høyde : ÷ 66,4m
 Lengde : 28,93 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 3,55	3,55	hbl.gn	Noe mørk, mlk. Stedvis noe biot. Endel kv.-iblandet. Spredte gr. 2-4. Impr. py	70-75					
3,55 - 4,30	0,75	biot.gn	Noe mørk, mlk. Stedvis noe hbl. Impr. py						
4,30 - 5,10	0,80	2gl.gn.b.d	Noe lys, mlk. Enkelte rene biot. str. Spor gr. 1-3mm	65-70	0.12	0.08	0.19		5.40
5,10 - 5,50	0,40	malm	rel mass. sl-malmed py, ep gn. Endel kv. og biot. iblandet		3.32	0.85	11.36		11.40
5,50 - 5,90	0,40	pegm	hvit, grovk.-mdk. Sor biot.	70-75	0.05	0.06	0.20		2.20
5,90 - 6,10	0,20	biot.gn	mørk, mlk. Spor hbl. Striper grovk. biot. Spredte gr 2-4mm. Impr. py						
6,10 - 6,60	0,50	2gl.gn.alm	lys, mlk. Stedvis spor gr						
6,60 - 6,75	0,15	hbl.gn	mørk, grovk.-mlk. Endel biot. Impr. py						
6,75 - 7,20	0,45	hbl-biot.gn	Noe lys, mlk. Noe hbl. Impr. py	70-75					
7,20 - 7,35	0,15	hbl.gn	mørk, grovk.-mlk. Sv. impr py						
7,35 - 8,00	0,65	2gl.gn.alm	lys, mlk-grovk. Spor gr 1-3mm	60					
8,00 - 8,40	0,40	biot.gn	Noe lys, mlk. Enkelte gr 1-2mm Impr. py	60					
8,40 - 10,75	2,35	hbl.gn	Noe mørk, mlk. Enkelte kv. striper. Spredte gr 1-3mm. Impr py	60					
10,75 - 11,55	0,80	2gl.gn.alm	lys, mlk. Stedvis biot-rike partier. Spr py	60-65					
11,55 - 12,20	0,65	2gl.gn.b.p	noe lys, mlk. Enkelte biot. rike partier. Spor gr 1-2mm. Spor py						

Lokalitet:

Borehull: 498

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
12,20 - 14,25	2,05	hbl-biot.gn	Noe lys,mlk-grovk.Enkelte flekke grovk.hbl.No. kv. Stedvis spor gr 1-2mm.Impr.py	65-70	0.01	0.13	0.09	9.60	13,50- 14,25
14,25 - 15,05	0,80	hbl.gn	mørk.grovk.En god del grovk. biot.No. kv.Impr.py	65-70	0.01	0.39	0.14	11.20	
15,05 - 15,50	0,45	malm	grovk.sl- malm med iblanding av kv. og biot.		0.00	0.30	13.26	22.40	
15,50 - 15,85	0,35	2gl.gn.b.d	lys,mlk.-fl.Kv.rik		0.05	0.06	0.67	4.40	
15,85 - 16,25	0,40	biot.gn	Noe lys, grovk.-mlk.Sterke innslag av kv. og pegm.Også grovk.biot.Godt impr.sl, py, po, Noe cp		0.02	0.36	4.45	16.00	
16,25 - 16,65	0,40	hbl.gn	Noe mørk,grovk.Sterke innslag av kv.,grovk hbl og biot. Spor skarn.Impr. py,po.Spor sl		0.00	0.22	0.80	10.00	
16,65 - 17,50	0,80	biot.gn	Noe mørk,grovk.-mlk.Sterke innslag av grovk. biot.og kv. Spor hbl.Tildels meget godt impr sl,py,po.No. cp	45-50	0.02	1.20	5.96	17.80	
17,50 - 18,65	1,15	hbl.gn	Noe mørk.mlk.No. kv og pegm. Spor gn 1-2mm. Sv. impr.sl py,po	65-70	0.06	0.16	0.58	6.40	
18,65 - 19,20	0,55	2gl.gn.alm	lys,mlk.Delvis noe musk.rik.Sv. impr. sl,py		0.44	0.10	1.92	4.00	
19,20 - 20,20	1,00	2gl.gn.b.d	Noe lys,mlk.Spor hbl.No. kv. Spredte gr1-2mm. Sc.spor py		0.05	0.03	0.13	4.00	

.....3

Lokalitet:

Borehull: 498

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
20,20 - 21,75	1,55	hbl.gn Noe lys,mlk-grovk.Endel kv. Enkelte musk-rike partier Impr.sl, py, po, cp.		0.46	0.61	2.34		6.20	
21,75 - 23,00	1,25	hbl.gn Noe mørk,mlk.Enkelte kv og pegm striper.Noen biot-rike partier.Spredte gr.1-2mm. Impr.py	35-40	0.19	0.17	0.46		5.80	
23,00 - 27,90	4,90	2gl.gn.b.p lys,mlk.Noen musk-rike partier.Noe kv.	60-65						
27,90 - 28,85	0,95	amf Mørk.grovk.-mlk.Stedvis skarn Enkelte kv. striper.Stedvis noe hbl.gn-pregm.Spredte gr. 1-5mm.Stedvis impr. py	60-65						

9/12-77
K. M. Hegrum
 K. M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.350

Borehull: 497

Dato : Nov. 77
Koordinater : X: 925.433,2 Y: 44.348,1
Retning : N
Helling/stigning: -45
Høyde : -66,3m
Lengde : 31,92m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 1,20	1,20	2gl.gn.b.d	Noe lys,mlk.Enkelte striper ren biot.Spor hbl.Spredte gr 1-3mm	45					
1,20 - 4,25	3,05	hbl.gn	Noe mørk,mlk.-grovk.Enkelte store flekker ren hbl.Endel kv.rel jevnt besatt gr.1-3mm Enkelte gr. 5-8mm.Rel jevnt impr py	40-45					
4,75 - 5,00	0,75	biot.gn	Noe lys,mlk.Sv.spor hbl.Rel jevnt besatt gr.1-3mm Sv.spor py	40-45					
5,00 - 6,10	1,10	biot.sk	lys/mørk,mlk-grovk.Mye kv.mellom grovk.biot.Endel hbl.spredte gr 1-3mm.Impr py						
6,10 - 6,50	0,40	biot.gn	lys fk-mlk.Spor hbl.	40-45					
6,50 - 6,60	0,10	biot.sk	samme b.art som før						
6,60 - 7,00	0,40	hbl.gn	Noe mørk,mlk.amf-preg.kv.-rik	40-45					
7,00 - 10,00	3,00	biot.sk	Mørk,grovk.Mye kv.innblanding Enkelte tynne striper 2gl.gn.Stedvis mye hbl.Spredte gr. 1-3mm .Impr. py						
10,00 - 10,65	0,65	hbl.gn	noe lys,mlk.Enkelte striper grovk.biot.Impr. py	60 ⁰					
10,65 - 11,00	0,35	biot.gn	noe lys,mlk.	60 ⁰					
11,00 - 11,65	0,65	biot.sk.	mørk,grovk.Svært mye kv.innblandet.Endel grovk.hbl.spredte gr.1-3mm.Impr. py	60-65					
11,65 - 11,90	0,25	pegm	hvit,grovk.						

....2

Lokalitet:

Borehull: 497

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
11,90 - 13,40	1,50	biot.gn	Noe lys,mlk.En god del kv. iblandet.Endel striper grovk. biot.Impr. py. Spor po	45-50					
13,40 - 14,20	0,80	hbl.biot.gn	Noe mørk,mlk-grovk.Endel kv. striper spor gr.Impr. py noe po	45-50					
14,20 - 18,00	3,80	2gl.gn.b.p	lys,mlk.Enkelte tynne partier 2gl.gn.alm.Enkelte tynne striper biot.Spor gr 1-2mm	40-45					
18,00 - 18,25	0,25	biot.gn	mørk,grovk.Noie kv.Spor py,po	40-45					
18,25 - 19,40	1,15	2gl.gn.b.p	samme b.art som over	45					
19,40 - 20,75	1,35	biot.gn	mørk,mlk-grovk.Mye kv.iblandet Endel hbl.Impr. py		0.16	0.14	0.58	7.33	
20,75 - 21,30	0,55	hbl-biot.gn	noe lys,mlk.Impr.sl,py		0.56	0.35	2.42	7.57	
21,30 - 22,40	1,10	biot.gn	Noe lys,mlk.Stedvis spor hbl.Impr.py	40-45	0.28	0.23	0.73	6.35	
22,40 - 22,80	0,40	biot.sk	Mørk,grovk.Noie grovk.hbl.Endel kv.		0.41	0.21	0.98	6.96	
22,80 - 23,65	0,85	2gl.gn.b.p	lys,mlk.Endel kv.og tynne biot- striper	40-45	0.13	0.13	0.28	4.76	
23,65 - 24,00	0,35	Tap							
24,00 - 24,25	0,25	2gl.gn.b.p	samme b.art som over		0.08	0.10	0.29	3.54	
24,25 - 25,75	1,50	biot.gn	Noe lys,mlk.Stedvis endel hbl. Enkelte biot.str. Impr. py sl.	40-45	0.07	0.28	0.49	6.47	

....3

Lokalitet:

Borehull: 497

Dato

Koordinator

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
25,75 - 27,40	1,65	biot.gn Mørk, grovk-mlk. Endel striper grovk. biot-sk. Noe kv. Spor hbl. Tildels grovk. impr sl, py		0.33	0.41	3.70		11.84	
27,40 - 27,70	0,30	biot.gn lys, mlk. Noe kv. sv. impr. py, sl	40-45	0.11	0.26	0.46		4.46	
27,70 - 28,00 28,00 - 32,00	0,30 4,00	Pegm 2gl.gn.b.p. hvit, grovk. lys, mlk.-fk. Enkelte biot.str. Noe kv. Spredte spor gr. 1-2mm	35-40	0.08	0.08	0.15		1.95	27,70- 29,00

11/11-77

K.M. Hegrum
K.M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.350

Borehull: 496

Dato : okt. 1977
Koordinater : x: 925.433,9 y: 44.348,0
Retning : N
Helling/stigning: +45°
Høyde : -68, m
Lengde : 27,36

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 1,90	1,90	2gl.gn.alm	lys,mlk.Stedvis noe biot. Spor hbl.Flekk med sl på 0,60	40-45	0.20	0.08	0.35	2.96	
1,90 - 3,10	2,20	2gl.gn.alm	lys,mlk.Stedvis striper biot. Sv.impr sl, py	35-40	0.70	0.23	1.44	5.20	
3,10 - 4,30	1,20	2gl.gn.b.p	Noe lys,mlk.Noeg pegm.Impr sl, py	30-35	1.21	0.28	2.47	7.00	
4,30 - 5,50	1,20	Tap							
5,40 - 7,10	1,60	biot.gn	Noe mørk,mlk.Endel kv. og pegm.Stedvis striper grovk. biot.Impr. py.Stedvis spor sl	30	0.32	0.26	0.99	8.40	
7,10 - 7,40	0,30	2gl.gn.alm	lys,mlk.Noeg kv.	30	0.12	0.15	0.42	6.20	
7,40 - 8,00	0,60	biot.gn	Noe mørk-grovk.Endel kv.Impr. py.Stedvis spor py	30					
8,00 - 8,50	0,50	2gl.gn.b.p	lys,mlk-fl.Stedvis striper ren biot.						
8,50 - 10,50	2,00	hbl-biot.gn	noe lys,mlk.Noeg pegm-striper. Spredte gr.1-3mm.Impr py	34-40					
10,50 - 12,45	1,95	biot.gn	noe lys,mlk.Stedvis tynne partier med amf-preg. Spor hbl.Endel kv.Rel.jevnt besatt gr.1-3mm.Impr.py	45					
12,45 - 14,30	1,85	amf.	Mørk,fl-mlk.En god del kv. iblandet.Stedvis tynne striper biot-gn.Rel.tett besatt gr 2-10mm	35-40					

....2

Lokalitet:

Borehull: 496

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
14,30 - 14,80	0,50	biot.gn	sanme biot.gn. som før amf.	35-40					
14,80 - 19,00	4,20	hbl.gn	Noe lys,mlk.Noen biot rike partier.Endel kv. stedvis tynne partier med amf.-preg. Stedvis spor skarn.Noie ujevnt gr.1-3mm. Impr. <u>py</u>	40-45					
19,00 - 19,70	0,70	2gl.gn.alm	lys,mlk.Noie ujevnt besatt gr. 1-3mm	40-45					
19,70 - 21,50	1,80	2gl.gn.b.p	Noe lys,mlk.Noie kv.jevnt besatt gr.2-4mm	40-45					
21,50 - 22,50	1,00	hbl.gn	Noe mørk,mlk.Endel pegm.Noie ujevnt besatt gr 1-3mm.Impr. <u>py</u>						
22,50 - 24,75	2,25	biot.gn	noe lys,mlk.Endel kv.iblandet Spredte spor hbl. Jevnt impr. <u>py</u>	40-45					
24,75 - 27,55	2,80	hbl-biot.gn	Noe lys,mlk.Endel kv.iblandet Stedvis amf.preg.Noie ujevnt besatt gr 1-5mm.Impr. <u>py</u>						

7/12-77
K.M. Hegrum
 K.M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.350

Borehull: 495

Dato : OKT. 1977
Koordinater : X: 925.425,3 Y: 44.349,4
Retning : E
Helling/stigning: + 86°
Høyde : 63.5 m
Lengde : 20.88 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 1,95	1,95	hbl.gn	noe lys,mlk.Spredte gn 1-2mm. Sv.impr. py						
1,95 - 5,20	3,15	amf	mørk,mlk.Endel iblanset av hbl.gn.Endel kv og pegm.Sted- vis store flekker gul grønn skarn.Også striper grovk. biot Noe ugjevnt besatt gr.3-10mm						
5,20 - 5,80	0,60	hbl-biot gn	Noe mørk,mlk.Ujevnt besatt gr 3-10mm						
5,80 - 11,60	5,80	hbl.gn	mørk,mlk.Store partier med gul-grønn skarn.Stedvis amf. preg.Noeg pegm.Noeg grovk.biot						
11,60 - 12,00	0,40	Tap							
12,00 - 12,60	0,60	hbl.gn	samme b.art som over						
12,60 - 16,20	3,60	amf.	mørk,mlk.-fk.Noeg pegm-striper Enkelte partier med hbl gn- preg. Ujevnt besatt gr 0,5-1mm						
16,20 - 21,00	4,80	hbl.gn	Noe mørk,mlk.Noeg pegm.Stedvis partier med biot.gn-preg. Stedvis flekker gul-grønn skarn.Ujevnt besatt gn 1-2mm. sv. impr py						

5/12-77
K.M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.350

Borehull: 494

Dato : 01. 1977
Koordinater : 925. 408,4 Y: 44.348,3
Retning : S
Helling/stigning: +75°
Høyde : 64.1 m
Lengde : 19.76 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 2,70	2,70	hbl.gn Noe lys,mlk.Endel biot.striper. Noe ujevnt besatt gr.2-4mm. sv. impr.py	65-70						
2,70 - 3,00	0,30	Tap							
3,00 - 3,80	0,80	2gl.gn.b.d Noe lys,mlk.-grovk.Endel striper grovk.biot.Spredte flekker hbl. Jevnt besatt gr.1-3mm.Sv.impr.py							
3,80 - 4,00	0,20	Tap							
4,00 - 6,25	2,25	hbl-biot.gn Noe mørk,mlk.Endel flekker grovk. hbl.Endel gul-grønn skarn på 6,10.Spredte gn.1-2mm.Sv.impr.py	65-70						
6,26 - 7,80	1,55	amf mørk,mlk.-fk.Endel striper hbl. gn.Jevnt besatt gr 2-4 mm	65-70						
7,80 - 8,70	0,90	hbl.gn noe lys,mlk.Noen tynne striper amf.Litt grovk.biot.Jevnt besatt gr.2-4mm.Impr.py	55-60						
8,70 - 9,10	0,40	Tap							
9,10 - 12,25	3,15	hbl.gn Noe lys,mlk.Endel flekker grovk. hbl og biot.Noen striper med amf. preg.Jevnt besatt gr 2-3mm.sv. impr.py	55-60						
12,25 - 13,75	1,50	amf. Mørk.fk.mlk.Noen tynne striper med hbl gn-preg.Tett besatt gr 2-4mm	70-75						
13,75 - 14,45	0,70	hbl.biot.gn Noe mørk,mlk.Noen flekker grovk. hbl. og biot.Jevnt besatt gr. 1-3mm							
14,45 - 17,75	3,30	biot.gn mørk,mlk.-grovk.Endel flekker hbl.Noe kv.Tett besatt gr 3-10mm	60-65						
17,75 - 20,00	2,25	2gl.gn.alm lys,mlk.Noen tynne stiper biot. Spredte spor gr. 0,5-1mm	40-45						

Lokalitet: *Forsering - ort*
Profil 44.380

Borehull: 493

Dato : *0kt. 77*
Koordinater : *X: 925.446.5 X: 44.380*
Retning : *6*
Helling/stigning: *-78°*
Høyde : *-65.5*
Lengde :

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk. noe kv. spor <u>py</u>	65						
0.20 - 0.65	0.45	hbl.gn. Noe mørk,mlk.rel.jevnt ford. gr. 1-3 mm. noe kv.sv.impr. <u>py</u>							
0.65 - 0.85	0.20	biot.sk. Mørk,grovk. noe kv. impr. <u>sl</u> <u>py, po</u>	40 50						
0.85 - 12.5	0.40	biot.gn. Noe mørk,mlk. Noe kv.pegm. str. spr. gr. 0.5-2 mm.spor hbl. sv.impr. <u>py</u> .							
1.25 - 4.50	3.25	hbl.gn. Mørk,med.lyse part. mlk- grovmk. enkelte partier med biot.gn. Enkelte gr.rike partier. 0.5-3 mm. 1.30, 2.20 biot.sk.str. 360 <u>Py,Po</u> str. spredt svak impr. <u>py</u> , <u>po</u> .	55 60						
4.50 - 4.65	0.15	biot.sk. Mørk,grovk. spor hbl. impr. <u>py, po</u> .	60 70						
4.65 - 6.35	1.70	biot.gn. Noe mørk,grovk-mlk. kv.rik med pegm.str. Stripper med biot.part. hbl.rik. spor gr. 1-2 mm.Rel. jevn. Impr. <u>py, po</u>	50 60						
6.35 - 7.05	0.70	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.Kv.rik med biot. str. spor hbl. Pegm.str. av impr. <u>py</u> spor <u>sl</u>	70						
7.05 - 7.25	0.20	TAP							
7.25 - 7.95	0.70	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk. med pegm.str. spor hbl. spor <u>sl, py, po</u>	80						
7.95 - 8.45	0.50	2 gl.gn.b.p. Lys,finmlk. kv.rik massiv spor gr. 1-2 mm.							

Lokalitet:

Borehull: 493

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning:

Høyde

2.

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
8.45 - 8.70	0.25	Pegm.	Grovk.-grovmk.Spor py.						
8.70 - 12.20	3.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.-grovk.Spr.gr. spor hbl.fr. 9.00-9.40 spor <u>sl,po, svake sp. py</u>	70°					
12.20 - 12.90	0.70	Biot.gn.	Rel.mørk,mlk-grovk.veksl. med part. av 2 gl.gn.b.d. spr. gr.1-2mm.Sv.spor <u>po,py</u>	80					
12.90 - 14.40	1.50	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.Spr. gr. 1-2 mm	90					
14.40 - 14.85	0.45	biot.gn.	Rel.mørk mlk.-grovk. veksł. part.med 2 gl.gn. Spr. gr. 1-2 mm.	80°					
14.85 - 22.90	8.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.fr. 22.00-22.50 dm.tykke pegm.partier. spredte gr. 1-2 mm.	80°					
22.90 - 24.20	1.30	biot.gn.	Mørk,mlk-grovk.veksl.med lysere str.spor gr. ved 23.00 - 23.20.1-2 mm. hbl.førende. fra 23.20-24.15 impr. <u>sl,py</u>	70°	0.02	0.04	0.11	3.39	22.50-23.20
24.20 - 25.15	0.95	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.spor hbl. spor gr.1-3 mm. Svak impr. <u>Sl,gn</u> <u>cp, po, py</u>	90° 80°	0.02	0.45	1.88	14.02	23.20-24.20
25.15 - 26.20	1.05	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.spor hbl.ved 25.85.Svak impr. <u>sl,py</u>	80°	0.77	0.25	0.84	7.08	
26.20 - 26.95	0.75	2 gl.gn.b.d.	Noe mørk,mlk-grovk.hbl.før. impr. <u>sl, py</u> .	80°	0.31	0.17	0.46	4.72	
26.95 - 28.30	1.35	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys,mlk.vekslende med opp til 2 dm. brede peg. bånd.spor gr.1-2mm.sv.sp. <u>py</u>	70°	0.49	0.31	1.33	8.70	
					0.01	0.02	0.04	1.48	

Lokalitet:

Borehull: 493

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
28.30 - 28.70	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.hbl.førende spor gr.1-2 mm.sv.impr.py	80°	0.06	0.04	0.05		5.46	
28.70 - 29.40	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.-grovk. spor hbl. Impr. sl,cp,po,py	70° 80°	1.26	0.39	2.59		11.36	
29.40 - 30.20	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.vekslende med dm.brede peg.band fra 29.80 - 30.05.Hbl.førende svak impr. sl,py	70° 80°	0.15	0.17	0.34		3.69	
30.20 - 30.65	0.45	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk. ved 30.45 - 30.55 impr. Po, py	90°	0.19	0.16	0.47		3.54	
30.65 - 30.95	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. impr. sl,po,cp	80°	0.63	0.47	2.27		7.91	
30.95 - 31.70	0.75	2 gl.gn.b.d. lys,mlk. spor hbl. spor gr. 1-2 mm. svak impr. py.	80°	0.10	0.14	0.59		4.50	
31.70 - 36.30	4.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk mlk.-grovk.tildels båndet med hbl.rike bånd og gr. 1-2 mm. spor py.	70° 80°						
36.30 - 39.10	2.80	2 gl.gr.b.d. Mørk,mlk-grovk.hbl.førende med gr. 1-4 mm.Stichtolitisk svak impr. Py.	80° 90°						
39.10 - 41.80	1.90	hbl.gn. mørk,mlk-grovk. b førende med cm-tykke str. pegm. gr.førende 1-4 mm.40.30-40.50 kjernetap.	80° 90°						
3/2 1978									
Stellan Borman									

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.390

Borehull: 492

Dato : Okt.1977
Koordinater : X: 925.480.7 Y: 44.391,9
Retning : N
Helling/stigning: +65°
Høyde : -61,8m
Lengde : 19,76m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
0.00 - 2,10	2,10	2gl.gn.b.p.	lys,mlk.Endel biot.rike striper. Noe kv.spredte gr. 1-3mm	65-70	0.11	0.04	0.28		3.07	0,00-1.00
					0.02	0.08	0.12		3.07	1.00-2,10
2.10 - 2,60	0,50	biot.gn.	noe lys,mlk-grovk.Flere kraftige striper biot.sk. Endel kv. Noe hbl.Impr.sl,py		0.06	0.16	1.89		10.64	
2,60 - 3,00	0,40	biot.gn.	Noe lys,mlk.Endel kv. Enkelte biot.striper		0.06	0.05	0.36		5.52	
3,00 - 3,70	0,70	biot.sk	Lysmlk-grovk.Kraftigiblandet kv. og pegm.Endel hbl.Spor gr.		0.00	0.02	0.09		5.52	
3,70 - 4,00	0,40	biot.sk	Mørk,grovk-mlk.Noe kv.Spor hbl spor gr. 0,5mm		0.00	0.02	0.08		5.73	
4,00 - 6,15	2,15	biot.gn	noe sly,mlk.Enkelte innslag av biot.sk.Endel kv. og pegm Spør hbl.Ujevnt besatt gr. 1-3mm	65-70	0.02	0.01	0.08		3.48	4,00-5,00
					0.00	0.03	0.06		4.70	5,00-6,15
6,15 - 6,50	0,35	pegm	hvit,grovk. Også litt biot Impr. py,po,cp		0.02	0.88	0.22		9.00	
6,50 - 7,00	0,50	biot.gn	noe mørk,mlk.Meget kraftig impr. sl,py,også gn		2.06	0.27	4.98		12.07	
7,00 -15,30	8,30	2gl.gn.b.p	noe lys,mlk.Enkelte kv. striper.Enkelte biot.rike partier.Spredte gn.1-3mm	60	0.02	0.03	0.10		2.45	7,00-8,50
15,30 -15,75	0,45	biot.gn	noe mørk,mlk.Endel kv.Rel. tett besatt gr. 0,5-1mm							
.....2										

Lokalitet:

Borehull: 492

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15,75 - 18,15	2,40	2gl.gn.b.p	70						
		samme 2gl.gn.b.p som tidligere.							
18,15 - 18,60	0,40	biot.gn							
		noe mørk, mlk. Noe kv. Rel. tett gr. 1-3mm. Enkelte gr 8-10mm							
18,60 - 19,80	1,20	2gl.gn.b.p							
		noe lys, mlk. Enkelte striper biot.gr. Noe kv. ujevnt besatt gr 1-3mm							
17/10-77 <i>K.M. Hegrum</i> K.M. Hegrum									

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.390

Borehull: 491

Dato: Okt. 77
Koordinater: X: 925.468,8 Y: 44.397,5
Retning: S
Helling/stigning: + 65⁰
Høyde: -62,2
Lengde: 14,86

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 1,20	1,20	malm	rel.mass. sl-malm.En del biot. sk. iblandet.Noie hbl	50	2.15	0.19	11.05	15.51	
1,20 - 1,35	0,15	biot.sk	mørk,grovk.Noie kv.og hbl. Impr.sl, py, cp		0.23	1.77	1.57	13.85	
1,35 - 1,60	0,25	biot.gn	lys,mlk.Mye kv. iblandet.		0.03	0.05	0.12	3.32	
1,60 - 2,50	0,90	biot.sk.	mørk,grovk.Endel kv.Spor hbl.Impr.sl,py,po	55-60	0.21	0.37	2.35	15.37	
2,50 - 3,30	0,80	hbl.gn	noe mørk,mlk.Noie skarn Spredte gr. 0,5-1mm	70	0.02	0.12	0.08	5.95	
3,30 - 3,45	0,15	malm	rel.mass. sl-malm.Noie biot+hbl.		1.77	0.16	8.90	12.60	
3,45 - 5,40	1,95	biot.gn	noe mørk,mlk.Endel striper biot.ek helt først.Spredte gr 1-2m. Impr.py	60	0.16	0.16	0.15	8.31	
5,40 - 5,70	0,30	Tap							
5,70 - 8,00	2,30	2gl.gn.b.d.	noe lys,mlk.Stedvis gr.1-2mm Spor hbl.Impr.py	45-50					
8,00 - 8,55	0,55	Tap							
8,55 - 10,00	1,45	hbl.biot.gn	noe mørk,mlk.Rel.jevnt besatt gr. 1-2mm. Sv. Impr.py	40					
10,00- 10,30	0,30	Tap							
10,30-15,00	4,70	hbl.biot.gn	noe mørk,mlk.Enkelte tynne striper biot.gn.og 2gl.gn. b.d. Noie ujevnt besatt gr 1-2mm.Et parti på 14,50-14,60 der gr. er noe større, og tydelig stichtolitisk.Sv. impr.py	40-45					

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.390

Borehull: 490

Dato : Okt. 1977
Koordinater : X: 925.469,7 Y: 44.396,9
Retning : S
Helling/stigning: -65⁰
Høyde : -64,9m
Lengde : 30,40m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 4,05	4,05	hbl.gn noe lys,mlk. Noen striper rep. biot.Endel kv. linser Spredte gr.1-2mm.Impr py	55-60 ⁰						
4,05 - 4,25	0,20	anf mørk,mlk-fk.Noie gul-grønn skarn							
4,25 - 4,45	0,20	biot.sk nørk grovk.-mlk.Striper ren biot i blanding med kv.Spor impr. py							
4,45 - 7,35	2,90	hbl.gn noe lys mlk.Tendenser sted- vis mot hbl-biot-gn.Enkelte striper ren biot.Noie kv. Spredte gr 1-2mm Sv impr.py	30-35						
7,35 - 7,70	0,35	Tap							
7,70 - 8,00	0,30	hbl.gn samme hbl.gn som over.							
8,00 - 8,35	0,35	Tap							
8,35 - 9,40	1,05	hbl.gn samme hbl.gn som før.	50-55	0.09	0.14	0.34		8.30	
9,40 - 10,55	1,15	biot.gn noe lys,mlk.Endel kv-striper Spor hbl,Sv.impr.sl, py	60	0.45	0.20	0.99		8.48	
10,55-11,45	0,90	2gl.gn.b.p noe lys,mlk.Noie striper biot.Endel kv.Impr.sl, py		1.75	0.17	1.89		3.46	
11,45-12,60	1,15	2gl.gn.b.p noe lys,mlk.Endel kv.spredte gr 0,5 -1mm	50	0.02	0.03	0.07		1.90	
12,60-18,90	6,30	2gl.gn.b.d noe lys,mlk.Noie striper kv. og pegm.Enkelte biot rike striper spredte gr 1-2mm	50-55						
18,90-19,90	1.00	2gl.gn.b.p noe lys,mlk.Endel kv.Spredte striper ren biot.	60-65						

....2

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 490

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19,90-21,45	1,55	2gl.gn.b.d	noe mørk,mlk.Endel kv. Spredte gr. 1-2mm						
21,45-21,75	0,30	pegm	hvit,grovk.						
21,75-23,20	1,45	2gl.gn.b.d	Noen mørk,mlk.Enkelte biot. 50-55 rike striper.Spor gr.0,5-1mm	0.06	0.06	0.11		2.60	
23,20-24,00	0,80	Tap							
24,00-24,40	0,40	2gl.gn.b.d	samme 2gl.gn.b.d som over	0.01	0.03	0.03		3.29	
24,40-24,60	0,20	2gl.gn.b.p	noe mørk,mlk.-grovk.Endel kv. og hbl.Godt impr.sl,py	2.01	0.49	3.36		11.77	
24,60-26,20	1,80	biot.gn	noe mørk,mlk.Enkelte striper med 2gl.gn b.d.Noie kv.Impr. sl,py	0.38	0.30	1.02		6.92	
26,20-26,50	0,30	biot.gn	mørk,mlk.En god del kv. iblandet. Godt impr.sl noe py og po	0.86	0.25	4.91		14.02	
26,50-26,65	0,15	biot.gn	noe lys,mlk.Endel kv.	0.10	0.16	0.59		5.71	
26,65-27,00	0,35	malm	rel.mass.sl.malm.Endel biot gn.iblandet	0.63	0.15	8.60		16.79	
27.00-27,35	0,35	Pegm	hvit,grovk.Noie hbl.Impr.sl, py,po cp	0.06	0.48	0.93		2.60	
27,35-27,55	0,20	hbl.b.a	grønaktig,mlk.Godt impr.sl py,po noe gn	0.91	2.70	7.56		10.56	
27,55-27,83	0,28	pegm	hvit,grovk.	0.38	0.61	1.62		4.29	
27,83-28,05	0,22	malm	rel.mass sl-malm.Endel hbl og kv.iblandet.	1.24	0.21	8.89		9.55	
									3

Lokalitet:

Dato

Koordinator

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 490

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
28,05-28,60	0,55	pegm	hvit, grovk. Spor impr.	0.09	0.12	0.27		1.91	
28,60-29,20	0,60	2gl.gn.b.p	noe lys, mlk-fk. Noe "tett" Endel kv. Spor hbl.	0.08	0.09	0.28		2.30	
29,20-29,40	0,20	2gl.gn.b.d	noe mørk, mlk. Sv. impr. sl	0.58	0.16	1.70		4.98	
29,40-30,00	0,60	2gl.gn.b.p	noe lys, mlk. Enkelte biot. str. Spredte spor gn 0,5-1mm	0.05	0.06	0.12		1.84	
13/10-77 <i>K.M. Hegrum</i> K.M. Hegrum									

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.390

Borehull: 489

Dato : Okt. 77
Koordinater : X: 925.470,7 Y: 44.390,6
Retning :
Helling/stigning: +90°
Høyde : - 62,2m
Lengde : 16,20m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0,90	0,90	biot.gn.	lys/mørk, mlk-fl. Veksling mellom rene biot-bånd, og lysere, kv- holdig matr. Spor hbl. Spor impr.	0.08	0.16	0.36		9.05	
0.90 - 1.80	0.90	2gl.gn.b.p	lys, mlk. Kv. holdig. Sv. spor impr.	0.05	0.06	0.20		2.76	
1.80 - 5.15	3.35	biot.sk.	mørk, grovk.-mlk. Hoveds. biot-sk, meh. også biot.gn Svært mye kv. og kv.bånd noe hbl. Tildels meget godt impr. sl, py. Også po	1.92	0.15	7.77		14.59	1.80-3.00
				0.69	0.31	3.51		14.91	3.00-4.00
				0.26	0.33	1.14		12.35	4.00-5.15
5,15 - 6,70	1,55	biot.gn.	noe lys, mlk. Endel kv. Godt impr sl py. Noe gn	1.31	0.14	6.29		9.69	
6.70 - 7.00	0.30	Tap							
7.00 - 9.65	2.65	2gl.gn.b.d	noe lys, mlk. Endel partier biot.gn. Noen kv. linser.	0.29	0.28	0.75		6.18	7.00-8.50
				0.09	0.06	0.17		6.07	8.50-9,65
9.65 -10.00	0.35	2gl.gn.b.d	Sv. spor impr. noe lys, mlk. Noe kv. Impr. sl, py	1.10	0.20	2.88		6.50	
10.00-10,65	0,65	Tap							
10,65-11.00	0.35	2gl.gn.alm.	Noe lys, mlk. Noe kv. Spredte gn 1-2mm	0.15	0.03	0.25		2.28	
11.00-11.40	0.40	2gl.gn.b.p	Noe mørk, mlk. Stiper av ren biot. Noe kv. impr. sl, py	0.55	0.31	3.27		6.50	
11,40-12,55	1.15	2gl.gn.b.p	Noe mørk, mlk. Noe kv. Sv. impr py Spor sl	0.29	0.23	0.71		5.64	

Lokalitet:

Dato

Koordinator

Retning :

Borehull: 489

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
12.55-14.00	1.45	2gl.gn.b.d Nørk mlk-grov. striper ren biot.Spor gr.0,5mm Impr. py	80-85	0.18	0.09	0.35		6.39	
14.00-16.20	2.20	2gl.gn.b.d. Noe lys mlk-fl.Virker noe "tett".Endel kv.Enkelte gn 3-5mm	60-65						

6/10-77

K.M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsorten
Profil 44.390

Borehull: 488

Dato : Sep. 1977
Koordinater : X:925.47,8 Y 44.391.9
Retning :
Helling/stigning: -90°
Høyde : -64,4m
Lengde : 32,02m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 1,35	1,35	2gl.gn.alm	lys,mlk.Stedvis noe kv. Spredte gn. 1-2mm	70-75					
1,35 - 1,55	0,20	2gl.gn.b.d	noe lys,mlk.Spredte gr.1-2 mm						
1,55 - 3,15	1,60	biot.gn	noe lys,mlk.Enkelte striper ren biot.Rel. jevnt besatt gr 1-2mm	75					
3,15 - 5,90	2,75	2gl.gn.b.p	lys,mlk.Enkelte tynne biot. rike partier.Spredte gr. 0,5-1mm	80					
5,90 - 6,60	0,70	pegm	hvit, grovk.						
6,60 - 9,30	2,70	2gl.gn.alm	lys,mlk.Noe veksling mellom biot-og musk-rike partier.Spredte spor gr.0,5mm						
9,30 - 9,80	0,50	pegm	hvir,grovk.						
9,80 -10,65	0,85	2gl.gn.alm	lys,mlk.Spredte spor gr.0,5m						
10,65 -15,70	5,05	2gl.gn.d.p	noe lys,mlk.Endel veksling mellom biot-og musk-rike partier.Spredte gr.0,5-1mm	80-85					
15,70 -16,60	0,90	Tap							
16,60 -17,05	0,45	2gl.gn.b.p	samme 2gl.gn.b.p som tid- ligere.						
17,05 -17,30	0,25	pegm	hvit, grovk.						
17,30 -17,85	0,55	Tap							

....2

Lokalitet:

Borehull: 488

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
17,85 - 18,15	0,30	pegm	hvit, grovk.						
18,15 - 18,40	0,85	2gl.gn.b.p	samme 2gl.gn.b.p som før	60-65					
19,00 - 19,40	0,40	Tap							
19,40 - 20,10	0,70	2gl.gn.b.p	samme 2gl.gn.b.p som før	65-70					
20,10 - 22,25	2,15	2gl.gn.b.d	noe lys,mlk.Veksling mellom biot-og musk-rike bånd.Spredte gr 1-2mm. Spor <u>sl</u> på 22,23-22,24	60-65					
22,25 - 28,40	6,15	hbl-biot gn	noe mørk,mlk.Enkelte steder biot.rike partier.Flekker av ren hbl.Endelkv.striper Ujevnt besatt gr 2-4mm rel.jevnt impr <u>py</u>	60-65					
28,40 - 28,85	0,45	amf.	mørk,mlk-fk.Spor skarn.Rel. tett besatt gn.3-5mm						
28,85 - 32,00	3,15	hbl gn	noe mørk,mlk.Noen <u>tynne</u> stiper amf.Spredte gr 2-4mm Impr. <u>py</u>	65					

5/10-77

K.M. Hegrum

K.M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.180

Borehull: 487

Dato: Sept. 77
Koordinator: X: 925.415,0 Y: 44.173,4
Retning: W
Helling/stigning: + 78°
Høyde: ÷ 68,7m
Lengde: 17.99

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 0,45	0,45	2gl.gn.b.d noe lys,mlk.Endel kv. Spor impr.		0.16	0.27	0.75		5.37	
0,45 - 1.00	0.55	2gl.gn.b.d noe mørk,mlk.Spor hbl.Kv- rik.Rel. godt impr sl,py		1.53	0.78	6.93		11.22	
1,00 - 1,50	0,50	pegm hvit mlk.Stedvis noe biot Impr. sl, gn		6.42	0.21	2.80		3.09	
1.50 - 2,10	0,60	biot.gn noe lys,mlk.Flekke med hbl.Sv.impr. sl, py	70	0.56	0.35	1.37		9.43	
2,10 - 2,55	0,45	pegm hvit. grovk.Spor gn		0.58	0.19	0.23		2.77	
2,55 - 3,70	1,15	2gl.gn.b.d Noe mørk,mlk. Noen kv.linger	70	0.21	0.09	0.28		3.04	
3,70 - 3,75	0,05	pegm hvit, grovk							
3,75 - 4,20	0,45	Tapr							
4,20 - 5,10	0,90	Pegm hvit, grovk.							
5,10 - 9,00	3,90	hbl-biot gn noe mørk,mlk.Enkelte biot. rike partier. Jevnt besatt gr. 1-2mm.Sv.impr.py	70	0.00	0.05	0.04		7.48	7,50- 9,00
9,00 - 9,65	0,65	musk.gn lys,mlk-grovk. Noen få biot striper Spor py, sl	70	0.03	0.06	0.31		2.11	
9,65 - 10,05	0,40	kv.b.art lys,fl-mlk.Spor hbl.Rel. godt impr. sl.Noie gn, py		5.82	0.71	10.89		7.81	
10,05 - 13,50	3,45	2gl.gn.b.p lys,mlk.Endel kv.-triper. Noe hbl.Flekke impr.sl,py	70	0.77	0.30	1.85		6.69	10,85-
				0.37	0.32	1.11		5.04	12,98-
				1.17	0.40	3.30		6.51	13,58-

Borehull: 487

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning: :
Hoyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13,50 - 18,20	4,70	hbl-biot.gn noe mørk, mlk. Stedvis partier med ren hbl.gn. Rel. jevnt besatt gr 1-3 mm. Enkelte opp mot 5mm. Jevnt impr.py	70	0.17	0.14	0.62		7.32	13,50- 15,00
		19/9-77 <i>K.M. Hegrum</i> K.M. Hegrum							

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.100

Borehull: 486

Dato : Sept. 77
Koordinater X: 925.390,2 Y: 44.096,9
Retning : N
Helling/stigning: + 85⁰
Høyde : - 69.0m
Lengde : 14,95m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 2,75	2,75	2gl.gn.alm	lys mlk, Enkelte kv-flekke Stedvis spor hbl. Spredte, flekkevis impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>ep</u>	55- 60	0.45	0.17	0.94	4.17	0,00- 1,50
					0.41	0.31	0.80	3.79	1,50- 2,75
2,75 - 5,15	2,40	2gl.gn.b.p	Noe lys, mlk.Stedvis kv. linser.Stedvis spor hbl. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>gn</u> ,	60	0.80	0.48	2.57	6.82	2,75- 4,00
					2.27	0.25	4.26	7.58	4,00- 5,15
5,15 - 6,45	1,30	malm	rel.mass. <u>sl</u> -malm med <u>py</u> , <u>gn</u> cp.Kvarts som hovd. b.arts min, også noe hbl.		2.00	0.80	11.03	13.64	
6,45 - 6,80	0,35	biot.gn.	noe lys,mlk.Også noe hbl.Sv. impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>ep</u>		0.35	1.10	2.66	9.28	
6,80 - 7,35	0,55	malm	rel. mass <u>sl</u> -malm med <u>py</u> , <u>po</u> , <u>gn</u> .		1.55	0.20	17.81	14.78	
7,35 - 7,60	0,25	2gl.gn.b.p.	noe lys,mlk.Endel kv. sv. impr. <u>sl</u> , <u>py</u> ,	60	0.25	0.26	3.02	5.68	
7,60 -10,10	2,50	biot.gn.	noe mørk,mlk.Enkelte kv. striper.Stedvis flekker av gr. 1-2m. Sv.impr. <u>py</u> .Noen få flekker hbl.		0.00	0.19	0.16	9.11	7,60- 9,00
10,10 -15,10	5,00	hbl-biot.gn	noe mørk,mlk.Noen kv.linser Rel. jevnt fordelte gn.1-2mm Rel.jevnt fordelt <u>py</u>	60- 65					

19/9-77

K.M.Hegrum

K.M. Hegrum

Lokalitet: **FORSERINGSØRT**
PROFIL 44.100

Borehull: **485**

Dato : **SEPT. 1977**
Koordinator : **925.384,3 Y: 44.099,9**
Retning : **W**
Helling/stigning: **+72°**
Høyde : **÷ 68,9 m**
Lengde : **14,75 m**

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 1,70	1,70	2gl.gn.alm	lys,mlk.Enkelte biot.rike ly stedvis flekker hbl.Flekkvis impr. sl, py, cp.	60	0.77	0.55	2.46	7.39	8,88-
					0.39	0.86	1.63	8.33	1,80-
1,70 - 3,55	1,85	2gl.gn.b.p	noe lys,mlk.Kv.rik b.art. Spor hbl. Rel.godt impr.sl, py, po,cp	60	1.43	0.60	2.84	8.15	1,70-
					0.65	0.72	3.96	12.13	3,55-
3,55 - 3,85	0,30	Tap							
3,85 - 4,00	0,15	2gl.gn.b.p	samme b.art som for tap		0.72	0.50	3.40	5.12	
4,00 - 5,30	1,30	biot.gn.	noe lys,mlk.Enkelte kv. stiper Sporatiske gr.0,50-1mm Stedvis flekker hbl.Impr. py	60- 65	0.13	0.27	0.14	6.63	
5,30 -11,65	6,35	hbl.biot.gn	noe mørk,mlk.Enkelte tynne partier men hbl.gn.Noie ujevnt fordelte gr 1-2mm,Sv impr. py	60- 65					
11,65 -11,90	0,25	hbl.gn	Noe mørk,mlk-fl. rel. tett besatt gr. 3-6mm.Alle tydelig stichtolitisk.						
11,90 -14,85	2,95	hbl.biot.gn	Samme hbl-biot gn som tidligere.	60- 65					

19/9-77
N.M. Hegrum
K.M. Hegrum

Lokalitet: Kom.ort
Profil 43.400

Borehull: 484

Dato : Aug. 77
Koordinater : x: 925. 428,5 y: 43.399
Retning : S
Helling/stigning: -35°
Høyde : -31,3
Lengde : 28.98

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 14,00	14,00	hbl.gn mørk, mlk. Endel kv. linser. Rel. jevnt besatt gn 1-2mm. Endel biot. Rel. jevnt impr. <u>py</u>	15-20						
14,00 - 14,30	1,30	2gl.gn.b.d. Mørk, mlk. Spor hbl. Spredte gn 1-2m Impr. <u>py</u>							
15,30 - 27,00	11,70	hbl.gn mørk, mlk. Endel biot. gn iblandt. rel. jevnt impr <u>py</u> . Spor gn 1-2m	35-40						
27,00 - 27,45	0,45	2gl.gn.b.d noe lys, mlk. Rel. tett besatt gn 2-5mm. De største tydelig stichtolitisk							
27,45 - 29,0	1,55	2gl.gn.b.d Noe mørk mlk. Tenderer stedvis mot biot gn. rel tett besatt gn 1-2m Impr. <u>py</u> . Flekk med <u>sl</u> og <u>py</u> på 28,34 - 36	35-40						

1/9-77

K.M. Hegrum



Lokalitet: Kom.ort
profil 43.400

Borehull: 483

Dato : jul 77
Koordinater : x: 925. 428,5 Y : 43.399
Retning : S
Helling/stigning: -45⁰
Hoyde : -31,2m
Lengde : 31,82m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 4,50	4,50	hbl.gn	noe mørk,mlk.Endel striper biot. gn. Del jevnt. besatt gn. 0,5-1m 25- rel.jevnt impr. <u>py</u> 30						
4,50 - 7,55	3,05	biot.gn	Noe mørk,mlk.Stedvis spor hbl. Endel kv.linser.Stedvis gn- ansamlinger gn 1-2m.Impr. <u>py</u> 25-30	0.05	0.33	0.17		7.65	6,00- 7,55
7.55 - 7.75	0,20	musk.gn	lys,mlk-grovk.Stedvis litt biot	0.03	0.08	0.14		3.00	
7.75 - 8,05	0,30	sl-malm	rel. mass. <u>sl</u> -malm med <u>py</u> og <u>gn</u> litt kv. og hbl isprengt	5.09	0.06	12.76		7.95	
8,05 - 9,15	1.10	2gl.gn.alm	lys mlk.Noie kv.	0.07	0.15	0.19		2.85	
9,15 - 9,50	0,35	hbl-biot.gn	Noe mørk,mlk.Endel kv.linser. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u>	1.25	1.36	2.24		7.95	
9,50 -13,80	4,30	sl-malm	rel.mass. <u>sl</u> -malm med <u>py</u> og <u>gn</u> . Endel hbl og kv. isprengt. Også <u>cp</u> .	0.82	1.43	9.01		8.85	9,50- 10,50
				2.40	1.84	14.80		13.80	10,50- 11,50
				4.94	0.19	17.26		13.80	11,50- 12,50
				4.27	0.34	16.88		11.55	12,50- 13,80
13,80 -19,70	5,90	2gl.gn.b.p	lys,mlk.Noie striper musk.gn.Meget kraftig impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .Noie <u>gn</u> <u>cp</u> 25-30	2.24	0.15	4.82		11.55	13,80- 15,80
				1.67	0.24	5.45		7.65	15,80- 16,80
				2.26	0.17	10.80		6.75	16,80- 17,80
				2.68	0.70	6.51		3.15	17,80- 18,80
				2.02	0.38	7.09		4.65	18,80- 19,80
				2.10	0.40	7.04		4.80	19,80-

Lokalitet:

Borehull: 483

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning

Høyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19,70 - 20,60	0,90	2gl.gn.b.p lys,mlk-fl.Tildels meget kv.rik rel dårlig impr. sl, py		1.27	0.60	2.95		3.23	
20,60 - 24,60	4,00	2gl.gn.b.p Lys,mørk.Tildels kv. rik.Enkelte kv.striper.Godt impr. <u>sl,py,gn</u> , Spor hbl.		1.37	0.82	4.76		5.38	20,6-
				1.60	0.50	5.12		7.23	21,6-
				1.90	0.31	8.31		6.15	22,6-
				0.77	0.49	3.33		7.38	23,6-
24,60 - 27,30	2,70	2gl.gn.b.d Noe lys,mlk.Endel veksling mellom biot-rike og musk-rike bånd. Noe hbl.Godt impr. <u>sl,py</u> .Noe gn	35- 40	1.69	0.53	8.29		10.31	24,6-
				2.47	0.16	8.77		10.77	26,0-
27,30 - 30,30	3,00	2gl.gn.b.d Noe mørk,mlk.No kv.Endel biot. gn-rike partier.No hbl.Rel.svakt impr. <u>sl,py</u>	30- 35	0.36	0.75	0.85		8.31	27,8-
				0.76	0.46	3.82		11.85	28,8-
30,30 - 31,70	1,40	2gl.gn.alm Lys,mlk-fl.Virker delvis noe "tett".Endel kv..Spredte spor gr. 1-2mm	25- 30 ⁰	0.08	0.05	2.39 *		2.65	
				*NOE AL MÅ HA BLITT MED FRA FOREGÅENDE PRØVE.					

1/9-77

K.M.Hegrum

K.M.Hegrum

Lokalitet: Kom.ort
 Profil 43.400

Borehull: 482

Dato : jul 77
 Koordinator : x: 925.428,5 y: 43.399
 Retning : S
 Helling/stigning: - 55
 Høyde : -31.3
 Lengde : 2736

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.85	1.85	hbl.gn. Noe lys, mlk. Endel biot. Spredde gr 1-2m jevnstriper <u>py</u>	30-35	0.02	0.02	0.13		6.88	
1.85 - 2.80	0.95	biot.gn noe lys, mlk. Endel hbl. Spredte <u>gr</u> 1-2m . Impr. <u>py</u>	30-35	0.13	0.06	0.03		8.72	
2.80 - 3.90	1.10	hbl.biot.gn litt mørk, mlk. Endel kv.linse Brunlig biot. Spredt impr. <u>sl</u> <u>py</u> , <u>po</u> , <u>cp</u> .		0.86	1.13	1.49		10.06	
3.90 - 4.30	0.40	2gl.gn.alm lys, mlk-fk litt kv.rik. Stedvis spor hbl. Spredt svak impr <u>sl</u> <u>py</u>	30-35	0.26	0.20	1.03		4.53	
4.30 - 5.70	1.40	sl.malm massiv sl-malm med <u>py</u> , <u>gn</u>		3.99	0.13	19.07		18.11	
5.70 - 7.20	1.50	2gl.gn.alm lys, mlk. Meget kraftig impr. <u>sl</u> Enkelte massive malmstriper		5.35	0.17	13.71		13.92	
7.20 - 11.75	4.55	musk.gn. lys, mlk. Noen kv.linser. Spredt noe biot. Vekslende impr. <u>sl</u> , <u>py</u> <u>cp</u> <u>gn</u> .	30-35	0.93	0.29	1.86		4.86	7.20-
				1.47	0.43	1.49		4.36	8.88
				1.55	0.26	6.62		7.88	10.80
				0.35	0.31	3.22		8.87	11.88
				0.52	0.74	5.62		3.19	11.98
11.75 - 13.35	1.60	2gl.gn.alm lys, mlk. Enkelte biot.rike striper. Noen kv.linser	40-45	0.03	0.05	0.11		1.09	
13.35 - 16.55	3.20	2gl.gn.b.d. Noe lys, mlk. Enkelte kv. linser. Stedvis spor hbl. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> <u>cp</u> , <u>gn</u> .	40-45	0.46	0.56	1.97		8.76	13.35-
				0.78	0.41	3.14		8.94	15.00
									16.55

Lokalitet:

Borehull: 482

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning

Høyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
16.55 - 18.45	1.90	2gl.gn.b.d Noe lys.mlk.Endel veksling med biot.gn. Stedvis spor skarn spor <u>sl, py</u>	40-45	0.05	0.13	0.31		4.01	16.55-
				0.10	0.10	0.24		3.83	17.50
18.45 -20.00	1.55	biot.gn Noe lys,mlk.Stedvis noe musk. Endel kv.og kv.striper.Spor hbl Impr.sl, py, cp gn		1.81	0.69	6.03		8.94	
20.00 -23.60	3.60	biot gn Samme b.art som over men vesentlig kraftigere impr <u>sl,py,gn</u>	45-50	2.27	0.06	8.24		10.40	20.00-
				3.06	0.83	10.20		10.95	21.00-
				2.77	1.36	8.24		7.66	22.00
				3.08	1.38	8.30		10.22	23.00-
23.60 -26.30	2.70	musk.gn lys mlk.kv.rik spredt biot. Spredte gr 0.5 - 1mm		0.03	0.04	0.14		1.28	23.60
26.30 -27.45	1.15	2gl.gn.b.d. lys,mlk.Noen kv.striper.No ujevnt besatt gr 1 - 2mm	45-50						25.00

1/9-77


 K.M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.370

Borehull: 481

Dato: Jun -Jul. 77
Koordinater: X: 925.451,7 Y: 44.367,2
Retning: N
Helling/stigning: + 5°
Høyde: 65,4 m
Lengde: 19,76

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 3,00	3,00	hbt-biot gn. Mørk, mlk-grovk. Noe kv. spredte gn. 1-2mm, Sv. impr <u>py</u> .	Hullet går nesten langs skifretningen S svinger mellom 0° og 10°	0.02	0.13	0.29		11.19	1.50-3.00
3,00 - 4,40	1,40	biot gn mørk, grovk. mlk. Noe kv. spor hbl. Sv impr. <u>ep</u> , <u>py</u>	- " -	0.01	0.45	0.12		19.13	
4,40 - 8,70	4,30	hbl. gn. mørk, mlk-grovk. Noe grovk. biot. Enkelte kv. og pegm. striper. Spredte gn. 1-2mm. Sv. impr. <u>py</u> Stedvis spor <u>ep</u>	- " -	0.01	0.34	0.09		13.78	4.40-5.50
8,70 - 9,00	0,30	Tap							
9,00 - 11,15	2,15	hbl. gn. Samme b. art som før Tap	- " -	0.01	0.08	0.03		8.75	10.00-11.15
11,15 - 17,60	6,45	biot-hbl. gn Mørk, grovk. Noe kv. Svært mye grovk. biot. Impr <u>sl</u> , <u>py</u>	- " -	0.02	0.21	0.71		13.84	11.15-17.60
17,60-18,00	0,40	Tap		0.01	0.17	1.71		18.46	17.60-18.00
18,00-19,90	1,90	biot-hbl. gn. Samme b. art som før Tap	- " -	0.06	0.10	1.63		18.24	18.00-19.00
				0.03	0.12	0.83		18.82	19.00-19.90
				0.02	0.11	2.07		18.38	19.90-20.00
				0.07	0.50	1.27		14.27	18.00-19.00
				0.07	0.13	0.46		6.74	19.00-19.90

8/7-77
K.M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.370

Borehull: 480

Dato: Jun 77
Koordinater: $x: 925.451,1$ $y: 44.367,3$
Retning: N
Helling/stigning: -60^0
Høyde: $\pm 66,2$
Lengde: $16,72$

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 4,95	4,95	hbl.gn. Noe lys,mlk.En del striper grovk.biot. Noenk.v.linser Delvis noe ugjevnt besatt gr 1-3mm. Sv.impr. <u>py</u>	2m:45 ⁰ 3m:30 ⁰ 4m:45-50 ⁰						
4,95 - 5,45	0,50	2gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.Spor hbl. Noe kv. Impr. <u>py</u> 3cm stripe <u>sl</u> i forb. med hbl.							
5,45 - 8,15	2,30	2gl.gn.b.p. Lys,fk. mlk. Virker noe "tett".Noen tynne partier med grovk.biot. ny kv. spredte <u>gr</u> 1-3m	60 ⁰						
8,15 - 8,70	0,55	kv.biotb. <u>a</u> lys/mørk,grovk.B.n av hovedsaklig kv-pegm + biot.Spor hbl.og skarn. <u>Spor</u> <u>py</u>							
8,70 - 9,00	0,30	Tap							
9,00 - 9,10	0,10	kv.biot b.n. Samme b. <u>a</u> som før tap							
9,10 - 9,40	0,30	pegm hvit,grovk.							
9,40 -10,35	0,95	biot.gn. lys,fk.mlk.hovedsaklig kv, biot.Enkelte striper ren biot.Spor gn.1-3m.sv.impr. <u>py</u>	70 ⁰	0.02	0.05	0.27		4.04	
10,35-12,00	1,65	biot-hbl.gn. Noe mørk,mlk.Enkelte kv.Noer ren biot.Sv.impr <u>Py</u>	70 ⁰	0.03	0.06	0.13		6.90	

Lokalitet:

Borehull: 480

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning :

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
12,00-12,45	0,45	hbl.gn	lys,mlk.Impr.sl,py.Spor gn	0.95	0.35	2.82		5.90	
12,45-13,70	1,25	2gl.gn.dm	lys mlk.Et par pegm-striper Spor py.	0.03	0.04	0.06		2.14	
13,70-16,80	3,10	2gl.gn.b.p.	lys,mlk.Noe ekstra biot rike partier Enkelte pegmstriper Spredte gn 1-2m						

8/7-77

K.M. Hegrum

K.M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsorten
Profil 44.370

Borehull: 479

Dato : Jun. 77
Koordinator : X 925.449,7 Y: 44.370,6
Retning : E
Helling/stigning: +68°
Høyde : 640 m
Lengde : 15,10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00- 0,70	0,70	2 gl.gn. b.d. Noen mørk, mlk. Enkelte kv.striper Spor <u>gn.</u> 1-2m Spor <u>py</u>							
0,70- 1,00	0,30	kv. linse							
1,00- 1,65	0,65	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. m.sv.spor <u>py</u>	45	0.16	0.07	0.64		3.53	
1,65- 2,00	0,35	2 gl.gn.b.d. samme 2gl.gn.b.d. som over. Sv. impr. <u>sl, py</u>		1.19	0.28	3.45		6.06	
2,00- 2,40	0,40	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Spor <u>gn</u> 1-2m	45	0.07	0.03	0.22		3.20	
2,40- 2,55	0,15	Samme som over. Sv.spor <u>sl, py</u>		0.29	0.25	1.35		6.90	
2,55- 2,85	0,30	2 gl.gn.b.d. Samme 2gl.gn.b.d som over	60	0.01	0.02	0.06		1.34	
2,85- 3,10	0,25	kv. linse							
3,10- 4,45	1,35	2gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Enkelte kv.striper. Spor <u>gn.</u> 1-2m Sv.spor <u>py, sl</u>	60	0.03	0.03	0.07		2.86	
4,45- 4,65	0,20	2gl.gnb.d. Samme 2gl.gn.b.d. som over. Impr. <u>sl, py</u>		1.02	0.26	1.70		4.37	

Lokalitet:

Borehull: 479

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
4,45- 4,65	0,20	2gl.gn.b.d. Samme 2gl.gn.b.d.som over. Impr. sl.py							
4,65- 5,00	0,35	2gl.gn.b.d. Samme 2gl.gn.b.d.som over.	60	0.10	0.09	0.32		2.94	
5,00- 5,50	0,50	2gl.gn.b.p Noe lys,mlk. Noe kv.Sv. impr.py spor sl		0.59	0.22	1.24		6.22	
5,50- 5,90	0,40	2gl.gn.b.p. Samme som over.spor py	70	0.41	0.17	0.96		4.79	
5,90- 6,15	0,75	2gl.gn.b.p. Samme som over.Spor py, sl		0.77	0.15	1.56		5.89	
6,15- 8,00	2,85	2gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.Enkelte kv striper. Et par flekker hbl. spor gn 0,5-1mm. Sv.spor py	70	0.06	0.04	0.23		4.71	6.15-
			75						7.50
8,00- 9,55	1,55	2gl.gn.alm lys,mlk.Enkelte kv.striper	70						
9,55-10,00	0,45	Tap							
10,00-11,40	1,40	2gl.gn.b.p. lys,mlk.Noen få biot. rike striper.	70						
11,40-12,60	1,20	2gl.gn.b.d Noe mørk,mlk.stedvis spor py.Noen kv.linser							
12,60-14,20	1,60	Pegm hvit,grovk. Et har tynne striper 2gl.gn.b.d							
14,20-14,95	0,75	2gl.gn.b.d Noe mørk,mlk.Endel kv. striper.Sv.impr. py. Spor hbl.Spredte gn.1-2mm	60						

29/6-77
K.M. Hegrum
 K.M. Hegrum

Lokalitet: Kom.ort
Profil 43.400

Borehull: 478

Dato Jun. 77
Koordinater X: 925.428.5 Y: 43.399
Retning : S
Helling/stigning : -65°
Høyde : 314m
Lengde : 28.88

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 1,90	1,90	hbl.gn. Noe mørk mlk Tenderer stedvis mot biot gn m/hbl.Jevnt besatt gn 1-2mm Sv.impr.py	40 ⁰	0.05	0.06	0.10		6.24	
1,90 - 2,50	0,60	hbl.gn. Noe lys,mlk.Striper av 2gl.gn.alm.Endel kv.Godt impr.sl py, gn.	40-45 ⁰	1.51	0.69	6.56		8.50	
2,50 - 2,95	0,45	malm mass. sl-malm		4.12	0.05	18.48		17.57	
2,95 - 5,45	2,50	2gl.gn.alm lys,mlk.Noen striper musk.gn.Impr. sl,py, noen gn	45 ⁰	1.03	0.17	3.80		5.24	2.95-4.00
				0.74	0.21	1.92		5.81	4.00-5.45
5,45 - 6,00	0,55	2gl.gn.alm lys mlk.Tenderer mot musk.gn.Spor py	45	0.14	0.11	0.34		3.83	
6,00 - 7,10	1,10	2gl.gn.b.p. lys mlk.Endel hbl.Godt impr.sl,py.Endel partier særdeles cp-rik		0.28	3.84	3.00		12.33	
7,10 - 7,85	0,75	musk.gn. lys mlk,Spor biot.Spor impr.	40	0.09	0.39	0.35		2.13	
7,85 - 9,85	2,00	kv.pegm.b.a lys mlk-grovk.Består hovedsaklik av kv. og pegm.Spor biot.Flekke hbl.Godt impr.sl, py, ep.		0.25	0.95	5.20		9.64	7.85-9.00
				0.90	2.21	2.09		11.20	9.00-9.85
9,85 -10,25	0,40	kv.pegm.b.a lys,mlk-fl. En mere fk.utg. av b.arten over.		0.47	0.22	0.94		1.28	
10,25 -10,90	0,65	kv.pegm.b.a. samme b.art som over.Impr sl, py, ep.		0.57	0.86	3.28		7.14	
10,90 -11,30	0,40	musk lys,mlk.Spor biot.Sv.impr.	40	0.09	0.73	0.46		6.67	

Lokalitet:

Borehull: 478

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning

Høyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
11,30 -13,45	2,15	2gl.gn.b.d. Noe,mlk.Litt grovk.biot.Noekv.Godt impr.sl,py.		0.82	0.89	2.21		9.31	14.30 - 12.50
				1.23	0.69	3.74		11.02	12.50 - 13.45
13,45 -18,00	4,55	2gl.gn.b.p. lys mlk.Endel kv.og pegmstriper.Spredte yr. 1-2mm16,27-16,34:impr.sl,py,gn.	40- 45	0.03	0.05	0.15		2.64	13.45 - 15.00
18,00 -18,40	0,40	pegm hvit,grovk.							
18,40 -23,55	5,15	2gl.gn.b.p. samme b.art som ovenfor	45- 50						
23,55 -23,85	0,30	pegm hvit, grovk.							
23,85 -24,60	0,75	2gl.gn.b.p. samme b.art som ovenfor	45- 50	0.06	0.04	0.11		0.93	
24,60 -25,70	1,10	pegm hvit,grovk.							
25,70 -25,75	0,05	biot.gn. mørk,grovk.Noehbl.Godt imprsl		1.61	0.31	8.99		9.62	
25,75 -26,20	0,45	2gl.gn.b.p. lys,mlk.		0.02	0.05	0.11		2.17	
26,20 -26,75	0,55	biot.gn. mørk,mlk.Noen striper 2gl.gn.p.Endel hbl.Meget godt impr.sl, py.Noen cp, gn.		1.94	0.25	10.00		13.97	
26,75 -28,90	2,15	2gl.gn.b.p. lys,mlk.Noepegm.Spredte gn1-2 mm	60	0.12	0.03	0.35		2.79	26.75-28.00

8/7-77

K. M. Hegrum

Lokalitet: Kom.ort:
Profil 43.400

Borehull: 477

Dato : Jun. 77
Koordinater X: 925.428,5 Y: 43.399
Retning : S
Helling/stigning: -75°
Høyde : -31,4 m
Lengde : 27.36m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	hbl.gn noe lys,mlk.Jevnt besatt gr 1-2mm. Rel.jevn impr. py	50 ⁰	0.17	0.05	0.52		7.50	
1.00 - 1.50	0.50	2gl.gn.b.d noe lys mlk. Stedvis spor hbl. Sprede gr 1-2mm.Sp, impr,py		0.02	0.12	0.09		7.50	
1.50 - 2.50	1.00	2gl.gn.alm/ musk gn lys,mlk.Stedvis litt biot. Noe kv. jevne impr sl,py,cp,gn	45- 50 ⁰	1.89	0.60	6.04		8.50	
2.50 - 4.65	2.15	2gl.gn.alm lys,mlk.Enkelte partier musk, gn.Noie hbl i flekker.Antydvis på 3.73.Flekkvis impr. sl,py, gn,cp	50	0.68	0.15	1.45		3.33	2.50- 3.50
4.65 - 5.50	0.85	2gl.gn.alm lys,mlk.Spor gr 1-2m		0.02	0.05	0.08		2.67	3.50- 4.65
5.50 - 5.80	0.30	biot gn noe lys,mlk.Endel kv.linder. spor gr 1-2m							
5.80 - 8.15	2.35	2gl.gn.alm lys,mlk.Stedvis flekker hbl. Spor impr. sl,py:7.15-7.25	50	0.13	0.28	0.49		2.03	7.00- 8.15
8.15 - 8.80	0.65	2gl.gn.b.p noe lys,mlk.Spor hbl.Spor gn 1-2m. sv.impr.sl, cp.py		1.28	0.55	0.12		4.00	
8.80 - 9.35	0.35	kvarts/ kalksp. t.a lys,mlk.Spor biot sv.impr.sl, cp, py		0.56	0.31	1.54		1.67	
9.35 - 10.00	0.65	2gl.gn.b.p noe lys,mlk.Noie biot-flekker Spor gr 1-2mm		0.36	0.19	0.08		3.17	
10.00 - 10.80	0.80	2gl.gn.b.p Noe lys,mlk.Endel kv.linser og flekker av biot.Impr.sl,py, spor cp		0.82	0.50	2.27		7.67	

Lokalitet:

Borehull: 477

Dato

Koordinator

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
10.80-13.75	2.90	2gl.gn.b.p. Noe lys,mlk.Enkelte biot.Her spor gr. 1-2m		0.00	0.03	0.07		2.17	10.80-12.00
13.75-14.10	0.35	biot.gn mørk,mlk.Striper av 2gl.gn.b.p Biot.gn tett besatt gr. 1-4m							
14.10-21.65	7.55	2gl.gn.b.p noe lys,mlk.Striper 5-10cm av biot.gn.Spredte gr.1-2mm i 2gl.gn.Tett besatt gr 2-4m i biotgn.Flekke med sl,py,på 19.85	45-50	0.19	0.16	0.57		2.50	20.00-21.65
21.65-22.15	0.50	2.gl.gn.b.p Noe mørk,mlk.Godt impr sl,py. Spor gn		1.46	0.39	5.02		11.83	
22.15-23.45	1.30	2gl.gn.alm lys,fink. Noe tett. sl på 23,15	45-50	0.28	0.10	0.68		3.00	
23.45-25.25	1.80	2gl.gn.b.p noe mørk,mlk.Noen biot.stripes Spor hbl.Godt impr.sl,py, Noe cp,gn } på 23.80		2.73	0.49	8.20		12.67	
25.25-25.45	0.20	2gl.gn.b.p Noe mørk,mlk. Spor impr.		0.82	0.33	3.57		7.83	
25.45-26.65	1.20	pegm hvit, grovk.		0.11	0.05	0.68		0.85	

25/8-77

K.M. Hegrum

Lokalitet: Kom.ort
 Profil 43400

Borehull: 476

Dato : Juni -77
 Koordinater
 Retning : S
 Helling/stigning: -87°
 Høyde :
 Lengde : 29,15

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	hbl.gn Mørk. Har et vist amf. prg. Spredte gr. 1-3mm Sv. ingen py lys, mlk- Sv. ingen py	45	0.23	0.08	0.44		6.81	
0,50 - 0.90	0,40	2 gl.gn.b.p Lys,mlk-Sv.ingen py	45						
0,90 - 1.60	0,70	2 gl.gn.b.p lys,mlk. Tidels sterke innslag av hbl og hv Impr. sl,py,noe cp		1.34	0.60	4.42		8.75	
1,60 - 23,70	22,10	2 gl.gn.b.p. lys,mlk. Noen innslag av 2gl.gn.b.d. Enkelte tynne striper biot.gn Her ofte gn. 1-4mm tynne striper hy-sl. på: 2,60-2,65, 2,95-3,08, 75-8,80, 9,15-9,25, 9,73-9,76	4m:85	0.26	0.19	0.53		2.76	1.60-2.60
			6m:90	0.57	0.46	1.23		5.03	2.60-3.00
			8m:80	0.06	0.03	0.12		2.76	3.00-4.00
			10m:75	0.35	0.11	0.12		3.08	7.50-8.75
			12m	0.45	0.40	1.08		4.70	8.75-9.80
			16m:70	0.00	0.01	0.03		1.62	9.80-11.00
			18m:60						
			20m:60						
			22m:60	0.06	0.20	0.09		2.27	22.50-23.70
23,70 - 24,00	0,30	hbl-biot.-gn mørk mlk-Sl.impr. sl, py		0.24	1.28	0.82		10.37	
24,00 - 24,40	0,40	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk. Ganske mye pegm, biot grovt		0.12	0.13	0.26		2.76	
24,40 - 25,35	0,95	biot. gn Mørk, grovt, spor musk Endel kv. Noe hbl. Impr. sl, py, po, cp		0.42	0.69	0.67		9.99	
25,35 - 29,15		2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk. Noe "tett" stedvis. Spredte gn. 1-3m. Enkelte kv. striper.	65-70	0.01	0.03	0.04		1.62	25.35-26.50

22/6-77
 K.M. Hegrum
K.M. Hegrum

Lokalitet: Linse 2. Stuf 2
Profil 43.640

Borehull: 475

Dato : Mai - juni 1977
Koordinater : X:925.412,5 Y:43.644,3
Retning : E
Helling/stigning: -70°
Høyde : -56,0
Lengde : 13,43

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00-0,40	0,40	2 gl.gn.b.p. lys,mlk. Enkelte striper biot							
0,40-1,15	0,75	TAP							
1,15-6,85	5,70	2 gl.gn.b.p. lys mlk. Noen striper biot. gn. Enkelte pegm striper. Spredte gn 1-3m	45°						
6,85-8,35	1,50	biot gn. mørk,mlk-fk.Noen kv. striper. Spredte gy 2.5mm	45						
8,35-8,65	0,30	2 gl.gr.b.p. lys,mlk.		0,37	0,09	0,47		1,46	
8,65-9,10	0,45	pegm hvit grovk.							
9,10-9,45	0,35	TAP							
9,45-10,40	0,95	2 gl.gn.b.d. Mørk mlk.Tildels sterke innslag av ren biot.Spor hbl.Tegn sl.,py		1,00	0,48	2,49		9,24	
10,40-11,80	1,40	2 gl.gn.b.d. Noe mørk mlk. Ganske mye striping av kv. og biot	40-45	0,22	0,15	0,38		3,73	
11,80-13,60	1,90	2 gl.gn.b.d. Noe lys,mlk. Mere homogen enn b.art. over. Spor gn 1-2m	45						

16/6-77
K.M. Hegrum

Lokalitet: Linse 2, Stuff 2
 Profil 43.640

Borehull: 474

Dato : 18.1.1977
 Koordinator : 925.408,5 Y: 43.643,0
 Retning : S
 Helling/stigning: +60°
 Høyde : 541 m
 Lengde : 15,10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	biot.hbl.gn. Mørk, mlk.		0.00	0.03	0.04		2.08	
0.20 - 0.90	0.70	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. Noen biot-striper							
0.90 - 1.25	0.35	hbl.gn. Mørk, mlk. Noe kv. Impr. sl, py.		1.37	1.65	6.19		11.74	
1.25 - 2.40	1.15	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk. Noe kv. Endel biot.str. Spor hbl. Impr. sl, py.	45	1.19	0.49	4.70		10.90	
2.40 - 3.80	1.40	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. Noen kv-striper. Spredte gr. 1-3 mm.	75-80	0.07	0.07	0.36		1.73	
3.80 - 4.40	0.60	2 gl.gn.alm. Samme 2gl.gn.alm som over. Impr. sl, py.		0.57	0.37	3.61		8.65	
4.40 - 5.10	0.70	2 gl.gn.b.p. Noe mørk, mlk. Impr. sl, py. Spor ep, gn.	65-70	1.26	0.44	3.11		9.87	
5.10 - 6.65	1.55	2 gl.gn.b.p. Mørk, mlk. Spor hbl. Meget godt impr. sl, py.		3.26	0.23	16.79		11.94	
6.65 - 7.35	0.70	2 gl.gn.b.d. Mørk, mlk. Spor hbl. Spor cp, po, py.	60-65	0.17	0.41	0.39		8.48	
7.35 - 14.20	6.85	hbl -biot.gn Mørk, mlk. Noen kv.str. Impr. py.	65-70	0.00	0.06	0.04		6.58	7.35-8.50
14.20-14.60	0.40	amf Mørk, mlk. Noe kv.Rel. tett besatt gn 2-5 mm Enkelte tydelig stichtolitisk							
14.60-14.90	0.30	hbl-biot.gn Samme hbl-biot.gn som over	65-70						

12/5-77
 K.M. Hegrum

Lokalitet: Linse 2, Stuff 2
Profil 43.640

Borehull: 473

Dato : April 1977
Koordinater : X:925.414.6 Y:43.644,1
Retning : N
Helling/stigning: + 60
Høyde : - 53.9 m
Lengde : 19.64 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.35	3.35	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk-fk.Noe "tett".Endel ekstra biot-rike striper. Spredte gr. 1-3 mm.	35-40	0.09	0.02	0.25		2.77	2.50 - 3.35
3.35 - 3.70	0.35	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn.b.p. som over. Har ca. 5 cm med kraftig impr. sl,py, + impr-flekke		2.53	0.40	5.91		5.54	
3.70 - 11.90	8.20	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn.b.p. som over	40-45	0.00	0.02	0.06		1.21	3.70 - 5.00
11.90 - 13.00	1.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. Stedvis tynne biot-striper. Impr. sl, py.	45	0.01	0.02	0.11		1.38	10.50 - 11.90
13.00 - 13.90	0.90	2 gl.gn.b.p. Noe mørk,mlk.Spor hbl.Meget godt impr. sl, py.		0.56	0.19	3.08		9.35	
13.90 - 14.40	0.50	2 gl.gn.b.p. Noe mørk,mlk. Spor hbl. Impr. py.		3.87	0.10	15.08		10.73	
14.40 - 19.50	5.10	biot.hbl.gn. Mørk,mlk. Endel kv.striper. Spredte gr. 1-3 mm.Rel.jevnt impr. py.	40-45	0.34	0.25	0.03		5.54	
				0.06	0.03	0.06		5.19	14.40 - 15.50

12/5 1977
Kaare M. Hegrum
Kaare M. Hegrum

Lokalitet: Linse 2
Profil 43.450

Borehull: 472

Dato : April 1977
Koordinater : X:925.383.3, Y:43.449.2
Retning : N
Helling/stigning: - 75°
Høyde : - 58.6 m
Lengde : 28.98 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.b.p. Noe mørk,mlk.Enkelte pegm.-str. Sv. impr. py.							
0.50 - 0.85	0.35	pegm. hvit, grovk.							
0.85 - 1.50	0.65	2 gl.gn.b.p. Noe mørk,mlk. Noen få kv.str. Sv. impr. py.	70						
1.50 - 1.75	0.25	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn.b.p. som over. Sv. impr. sl, py.							
1.75 - 3.20	1.45	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn.b.p. som over. Stedvis enkelte flekker hbl. Stedvis spor gr.1-2mm.Impr.py.	60-65	0.06	0.13	0.22		7.39	
3.20 - 4.20	1.00	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn.b.p. som over. Impr. sl,py,Noe gn.iforb.pegm.		0.21	0.19	1.85		11.73	
4.20 - 4.60	0.40	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fk.Virker noe "tett" Stedvis flekker sl,py,gn.	60-65	0.55	0.13	2.01		7.71	
4.60 - 4.80	0.20	biot.hbl.gn. Mørk,mlk. Noe kv.iblandet. Godt impr. sl, Noe py, po.		0.42	0.34	7.97		17.20	
4.80 - 18.40	13.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. Endel pegm.str. Noen få ekstra biot.rike str. Stedvis sv.spor gr. 1-2 mm. Flekk sl, py på 7.90-7.95	60-65	0.03	0.03	0.13		1.61	4.80-6.00
				0.00	0.02	0.06		2.09	17.00-18.40
18.40 - 18.95	0.55	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.Noie kv.iblandet Impr. py, sl		1.06	0.33	3.26		7.55	
18.95 - 19.40	0.45	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.Noie "tett" Enkelte pegm.striper.Stedvis litt biot-striper.Spredte gr. 0.5 - 1. mm.	60-65	0.06	0.11	0.41		2.25	

Lokalitet: Linse 2
Profil 43.450

Borehull: 472

2.

Dato: April 1977
Koordinater: X:925.383.3, Y:43.449.2
Retning: N
Helling/stigning: - 75°
Høyde: - 58.6 m
Lengde: 28.98 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19.40 - 19.65	0.25	Biot.gn. Noe mørk, mlk. Spor hbl. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .		1.10	0.39	5.30		10.46	
19.65 - 20.30	0.65	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. Endel pegm.str. Flekke med <u>cp</u> , <u>gn</u> , <u>po</u> , <u>sl</u> .		0.85	0.34	0.39		3.70	
20.30 - 20.65	0.35	biot.gn. Mørk, mlk. Flekker med <u>cp</u> , <u>po</u> .	60-65	0.57	0.59	1.13		10.61	
20.65 - 21.15	0.50	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. Endel striper biot.- gn. Noe kv. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .		0.89	0.21	2.88		6.11	
21.15 - 22.00	0.85	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Noe kv. ibl. Spor hbl. Godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .	60-65	2.32	0.41	4.66		12.54	
22.00 - 22.35	0.35	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. Endel biot-str. Litt impr. <u>py</u> , <u>sl</u> .		0.87	0.41	0.83		5.14	
22.35 - 23.75	1.40	biot.hbl.gn. Litt mørk, mlk. Endel pegm.- striper. Spredte gr. 1-3 mm. Delvis impr. <u>py</u> .	45-50	0.07	0.05	0.19		5.62	
23.75 - 24.00	0.25	pegm. Hvit, grovk.							
24.00 - 29.00	5.00	hbl.gn. Mørk, mlk. Endel amf-striper mot slutten. Noen pegm.str. Jevnt besatt gr. 2-5 mm, noen 10 mm. Impr. <u>py</u> .	60						

12/5 1977
K.M. Hegrum
K.M. Hegrum

Lokalitet: Linse 2
Profil 43.450

Borehull: 471

Dato : April 1977
Koordinator : X:925.383.3, Y: 43.449.2
Retning : N
Helling/stigning: - 70
Høyde : - 58.6
Lengde : 28.96 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Noen pegm.-str. Stedvis sv.spor gr.0.5-1 mm. Sv. impr. <u>py</u> .	45°						
0.60 - 1.00	0.40	pegm. hvit, grovk.							
1.00 - 1.60	0.60	2 gl.gn.b.d. Samme 2 gl.gn.b.d. som over.	45	0.01	0.15	0.20		7.32	
1.60 - 1.80	0.20	2 gl.gn.b.d. Samme 2 gl.gn.b.d. som over. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .		0.62	0.36	2.54		8.37	
1.80 - 3.40	1.60	2 gl.gn.b.d. Samme 2 gl.gn.b.d. som over. Stedvis noe mere gr.Impr. <u>py</u>	60°	0.02	0.15	0.41		7.95	
3.40 - 4.10	0.70	2 gl.gn.b.d. Samme 2 gl.gn.b.d. som over. Noe spredt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .	65-70	0.11	0.24	1.80		11.51	
4.10 - 4.60	0.50	2 gl.gn.alm. Lys, mlk-fk.Tynn(0.25cm)massiv stripe <u>cp</u> , <u>sl</u> på 4.51.	60	0.14	0.26	0.56		4.19	
4.60 - 4.80	0.20	2 gl.gn.b.d. Mørk, mlk.Sterke innslag av hbl. Noe grovk.biot. Impr. <u>sl</u> , <u>cp</u> , <u>po</u>		0.31	0.62	6.08		11.93	
4.80 - 8.15	3.35	2 gl.gn.alm. Lys, mlk-fk.Enkelte tynne str. biot og biot.gn.Spredte gr. 0.5 - 1 mm.	60-65	0.01	0.01	0.18		1.61	4.80-5.50
				0.03	0.02	0.08		1.59	7.50-8.15
8.15 - 8.30	0.15	2 gl.gn.alm. Lys/mørk mlk-grovk. Meget sterke innslag av grovk.biot. Godt impr. <u>sl</u> , Noe <u>py</u> , <u>gn</u> , <u>cp</u> .		2.28	0.35	5.66		8.58	
8.30 - 18.40	10.10	2 gl.gn.alm. Lys, mlk.-fk.Stedvis tynne str. av biot. og biot.gn. Enkelte kv.str. Spredte gr. 1-3 mm, mest markant ved biot-rike partier.	60-65	0.03	0.03	0.30		2.30	8.30-9.00
				0.04	0.01	0.08		1.81	17.00-18.40
18.40 - 18.70	0.30	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk.Noen kv.linser. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .		0.79	0.17	2.75		7.86	

Lokalitet: Linse 2
Profil 43.450

Borehull: 471

Dato : April 1977
Koordinater : X:925.383.3, Y: 43.449.2
Retning : N
Helling/stigning: - 70
Høyde : - 58.6
Lengde : 28.96 m

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
18.70 - 19.50	0.80	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn.alm. som før.	55-60	0,14	0,04	0,15		2,27	
19.50 - 19.65	0.15	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk. Noe kv.iblandet. Impr. sl, py.		0,74	0,18	3,37		8,32	
19.65 - 19.95	0.30	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn.alm. som før.		0,23	0,07	0,71		2,27	
19.95 - 20.35	0.40	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn.alm. som før. To tynne striper sl, py.		0,97	0,19	2,16		4,26	
20.35 - 21.00	0.65	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn.alm. som før.	60°	0,17	0,07	0,41		2,42	
21.00 - 23.10	2.10	2 gl.gn.b.d. Mørk mlk. Enkelte striper kv. og 2 gl.gn.alm.Spor hbl.40-45 Flekkvis impr. sl, py.		0,56	0,26	1,30		6,50	21.00 - 22.00 -
				0,34	0,13	1,48		4,08	22.00 - 23.10 -
23.10 - 25.35	2.25	biot.hbl.gn. Mørk,mlk. Enkelte kv. og pegm.striper.Enkelte partier ren hbl. i forb.med kv. Spredte gr.1-3 mm.Sv.impr.py	40- 45	0,00	0,17	0,11		6,96	23.10 - 24.00 -
25.35 - 25.70	0.35	hbl.gn. Mørk,mlk-grovk.Tett besatt gr. 2-5 mm.Minner noe om amf.							
25.70 - 26.20	0.50	biot.hbl.gn. Mørk,mlk.Noe kv.innblanding. Impr. py.	45						
26.20 - 29.00	2.80	Hbl.gn. Mørk,mlk.Enkelte partier med amf-liknende utseende.Endel pegm.striper.Rel.jevnt besatt gr. 2-5 mm. Noe spredt impr. py.	27 m:45° 28 m:60°						

5/5 1977
K.M. Hegrum

K.M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44 020

Borehull: 470

Dato April 1977
Koordinater X: 925.397,5 Y: 44.015,6
Retning : N
Helling/stigning: + 50°
Høyde : - 66.3 m
Lengde : 25.59 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.00	5.00	2 gl.gn.alm. lys, mlk. Enkelte tynne str. 2 gl.gn.b.d. Noen få kv.-linser. Stedvis spredte gr. 1-5 mm.	60°	0.13	0.05	0.30		2.47	3.50-5.00
5.00 - 8.25	3.25	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk. Endel kv.str. Noen få tynne partier 2 gl.gn.alm. Impr. lys sl, py, Noe gn, cp.	60°	0.85	0.35	2.76		7.69	5.00-6.50
				0.72	0.31	3.89		8.13	6.50-7.50
				1.46	0.11	6.57		9.73	7.50-8.25
8.25 - 8.90	0.65	kv.hbl.b.art. Noe lys,mlk.består omtrent bare av kv. og hbl. Litt biot.Godt impr. mørk sl,cp.		5.42	1.06	8.34		13.50	
8.90 - 10.15	1.25	2 gl.gn.alm. lys,mlk.Noen biot-str. Spor hbl. Impr. lys sl, py.	50-55	1.57	0.22	2.19		5.37	
10.15 - 12.45	2.30	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk. Noen striper 2 gl.gn.alm. og 2 gl.gn.b.d. Stedvis spor hbl.Endel kv. striper. Impr. sl, py.	55-60	0.87	0.35	2.09		5.52	10.15-11.50
				1.39	0.36	5.17		8.85	11.50-12.45
12.45 - 13.15	0.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.Noen biot.striper.	60-65	0.14	0.09	0.41		2.76	
13.15 - 14.25	1.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.Stedvis noen biot.str. Enkelte pegm.striper.Flekkvis impr. sl, py.		0.58	0.18	2.04		6.46	
14.25 - 15.40	1.15	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk. Endel rene biot.striper. Endel hbl. Impr. sl, py.	55-60	1.09	0.39	3.68		10.72	
15.40 - 19.35	3.95	kv.biot.b.art. Lys, fk-mlk. Består alt overveiende av kv. Litt biot. og stedvis spor hbl. Rel godt impr. sl, py, noe cp.	55-60	0.32	0.42	7.07		8.79	13.00-16.50
				0.31	0.39	5.51		9.34	16.50-17.50
				1.62	0.47	7.78		7.97	17.50-18.50
				2.49	0.38	7.81		7.83	18.50-19.35
19.35 - 20.25	0.90	malm Omtrent massiv sl-malm. Noe kv.fragmenter, litt hbl.		4.46	0.70	17.16		12.92	

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44 020

Borehull: 470

Dato April 1977
Koordinater X: 925.397,5 Y: 44.015,6
Retning : N
Helling/stigning: $\pm 50^{\circ}$
Høyde : - 66.3 m
Lengde : 25.59 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
20.25 - 20.70	0.45	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Endel biot. i striper. Sv. impr. sl, py.	40-45	0,91	0,30	2,58		7,83	
20.70 - 21.50	0.80	2 gl.gn.b.p. Noe mørk, mlk. Mye kv. og endel hbl. Rel. godt impr. sl, py. Noe cp.		0,93	0,69	5,94		10,99	
21.50 - 23.20	1.70	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Endel kv.str. Stedvis spor hbl. Spredte gr. 1-2 mm. Sv. impr. py.	45-50	0,01	0,18	0,09		8,38	
23.20 - 25.65	2.45	biot.hbl.gn. Noe mørk, mlk. hbl. Noe ujevnt fordelt. Spredte gr. 1-3 mm Impr. py.	45-50						

22/4 1977
Kaare M. Hegrum
Kaare M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44020

Borehull: 469

Dato: April 1977
Koordinater: X: 925.394,0 Y: 44.013,7
Retning: W
Helling/stigning: + 60°
Høyde: - 66.0 m
Lengde: 19.61 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.55	3.55	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. Noen tynne striper biot. Spredte spor gr.1-3 mm	50-55	0.00	0.02	0.02		1.96	2.00-3.55
3.55 - 3.80	0.25	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn.alm. som over. Impr. sl, py.		0.74	0.34	1.64		4.69	
3.80 - 6.55	2.75	2 gl.gn.b.p. Rel. lys, mlk. Stedvis spor hbl. Enkelte biot-striper. Godt impr. lys sl, py, Noe gn.	55-60	0.50	0.58	3.99		9.51	3.80-5.00
6.55 - 9.10	2.55	2 gl.gn.b.d. Rel. lys, mlk. Rel. høyt kv. innhold. Endel hbl. Godt impr. mørk sl, py, Noe gn.	55-60	0.78	0.44	4.25		10.39	6.55-7.50
9.10 - 10.20	1.10	2 gl.gn.b.d. Rel. lys, mlk. Tildels sterke innslag av kv. og hbl. Impr. mørk sl, py.		1.48	0.67	10.52		10.52	7.50-8.50
10.20 - 11.45	1.25	kv.hbl.b.art. Rel. lys, mlk. Alt overveiende kv. og hbl. Meget godt impr. mørk sl, py, Noe po, gr.		2.45	0.16	19.06		11.28	
11.45 - 12.60	1.15	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. Sterke innslag av kv. Endel hbl. Spredt impr. sl, py.	60°	0.21	0.29	2.49		6.72	
12.60 - 14.60	2.00	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. Enkelte kv.linser Stedvis litt hbl. Stedvis enkelte småflekker sl, py.	60°	0.74	0.34	12.06		9.29	
14.60 - 14.95	0.35	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. Sterke innslag av kv. Endel hbl. Spredt impr. sl, py.	60°	0.06	0.21	0.65		5.81	12.60-13.60
14.95 - 15.75	0.80	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Noen kv.striper Hbl. og skarn i forb. med disse. Sv. impr. py.	45-50	0.01	0.08	0.10		6.24	13.60-14.60
15.75 - 19.90	4.15	hbl.gn. Noe mørk, mlk. Endel kv/pegm.-str. Stedvis gr.1-2mm. Impr. py.	45-50	0.63	0.22	1.85		4.79	

22/4 1977
Kaare M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44020

Borehull: 468

1

Dato : April 1977
Koordinater : X:925.397.3 Y:44.015.9
Retning : N
Helling/stigning: - 45°
Høyde : - 68.1 m
Lengde : 28.98 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.40	1.40	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. Virker noe "tett" Spor gr. 0.5 mm.	45°	0.06	0.03	0.19		1.94	
1.40 - 1.85	0.45	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. Mye kv. iblandet. Noen biot.striper. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>cp</u> , <u>gn</u> .		6.00	1.03	1.54		4.20	
1.85 - 2.75	0.90	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. Virker noe "tett".	45	0.18	0.05	0.09		1.33	
2.75 - 4.60	1.85	2 gl.gn.b.p. Rel. lys,mlk. Endel hbl. Noen kv.linser, og striper av biot. Delvis ganske godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , Noe <u>gn</u> .	45	1.08	0.56	3.97		7.75	2.75 - 3.50
4.60 - 6.00	1.40	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk. Enkelte biot.str. Stedvis spor gr. 0.5 - 1 mm	45°	0.12	0.05	0.25		2.14	
6.00 - 8.20	2.20	hbl-biot.gn. Mørk mlk-grovk. Endel god del kv. iblandet. Også enkelte tynne striper 2 gl.gn.alm. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .	45	0.64	0.30	3.95		12.22	6.00 - 7.00
8.20 - 9.00	0.80	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. Stedvis noe spredt hbl. Sv.impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .		0.92	0.90	4.19		12.22	7.00 - 8.20
9.00 - 10.65	1.65	hbl.-biot.gn. Mørk,mlk-grovk. Endel kv.- linser.Noen få striper 2 gl. gn.alm. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , Noe <u>po</u> , <u>gr</u> .	45-50	0.49	0.29	2.07		8.01	
10.65 - 11.30	0.65	biot.gn. Mørk,grovk.-mlk. En god del kv. isprengt. Stedvis spor av <u>po</u> og <u>py</u> . Enkelte gr. 3-5 mm		0.32	0.67	2.11		15.37	
11.30 - 13.30	2.00	2 gl.gn.alm. Lys, fk-mlk. Virker noe "tett" Enkelte striper biot. Rel. jevnt besatt gr. 1-2 mm.	30°	0.02	0.08	0.20		7.75	
				0.03	0.02	0.05		2.25	11.30 - 12.30

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44020

Borehull: 468

Dato : April 1977
Koordinater : X:925.397.3 Y:44.015.9
Retning : N
Helling/stigning: - 45°
Høyde : - 68.1 m
Lengde : 28.98 m

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.30 - 13.80	0.50	biot.gn. Mørk, grovk. Noe kv.iblandet.							
13.80 - 16.70	2.90	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn.alm. som over. Litt mere biot.	30°	0.02	0.09	0.04		2.02	15.50 - 16.70
16.70 - 17.70	1.00	biot.gn. Mørk, grovk. En god del kv. iblandet. Noen striper 2 gl.gn.alm. Spor hbl. Impr. sl, py, Noe cp, po.	30-35°	0.02	0.45	1.60		15.37	
17.70 - 18.50	0.80	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn.alm. som over	40-45	0.02	0.03	0.10		3.00	
18.50 - 18.85	0.35	biot.gn. Mørk,mlk. Sterke innslag av kv. Endel gr. 2-4 mm.							
18.85 - 19.50	0.65	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk-fk."tett". Noen biot- striper. Spor gr. 1-2 mm.							
19.50 - 19.75	0.25	biot.gn. Mørk,mlk. Sterke innslag av 2 gl.gn.b.p.							
19.75 - 22.60	2.85	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. En god del striper ren biot. Disse har stedvis spor av py. Enkelte kv.linser.Spredte gr.1-3 mm.	30°	0.00	0.07	0.06		3.17	21.50 - 22.60
22.60 - 24.40	1.80	biot.gn. Mørk/lys, grovk-mlk. En god del kv.innblanding. Endel hbl. Noe impr. sl, py, po.		0.60	0.28	0.80		10.27	22.60 - 23.50
				0.30	0.48	3.05		11.15	23.50 - 24.40
24.40 - 24.70	0.30	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk. Endel hbl. og kv. Impr. sl, py, cp, po,gn.	30°	1.17	0.63	6.92		12.55	
24.70 - 25.10	0.40	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. Virker noe "tett". Enkelte striper biot.		0.71	0.19	0.44		3.93	
25.10 - 25.25	0.15	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn.alm. som over. Noe hbl. God impr. sl.		1.60	0.53	7.35		7.48	

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44020

Borehull: 468

Dato : April 1977
Koordinater : X:925.397.3 Y:44.015.9
Retning : N
Helling/stigning: - 45°
Høyde : - 68.1 m
Lengde : 28.90 m

3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
25.25 - 25.60	0.35	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk. Noen biot-striper. Spor gr. 1-3 mm.	35-40	0.05	0.06	0.10		5.70	
25.60 - 26.35	0.75	hbl.gn. Noe lys, mlk. Endel biot. og kv. Spor py.							
26.35 - 28.65	2.30	2 gl.gn.b.d. Noe lys, mlk. Noe hbl. i forb. med kv.striper. Spradiske gr. 1-3 mm.	30-35						
28.65 - 28.95	0.30	hbl.gn. Mørk,mlk. På grensten til amf. Noe hv. og biot. Spredte gr. 1-2 mm.							

22/4 1977
Kaare M. Hegrum
Kaare M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44020

Borehull: 467

1

Dato: Mars 1977
Koordinator: X:925.385.8, Y:44.012.7
Retning: S
Helling/stigning: - 60°
Høyde: - 68.8 m
Lengde: 24.35 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk. Stedvis striper av 2 gl.gn.alm. Enkelte kv.str. Spor gr. 1-3 mm.	45	0.06	0.03	0.32		2.44	
1.60 - 2.10	0.50	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. Stedvis litt biot. i striper. Impr. sl, py.	45	0.79	0.12	1.30		2.44	
2.10 - 2.85	0.75	2 gl.gn.alm. lys, mlk. Stedvis litt biot.		0.06	0.08	0.14		3.56	
2.85 - 4.20	1.35	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. Enkelte biot.-rike partier. Impr. sl, py.	45	0.64	0.27	2.22		6.89	
4.20 - 4.85	0.65	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. Stedvis spor hbl. Impr. sl, py.		1.92	0.14	4.51		6.00	
4.85 - 5.35	0.50	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. Noen kv.linser. Spor sl, gn.		0.65	0.15	0.75		3.11	
5.35 - 5.50	0.15	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. Enkelte biot-striper. Godt impr. sl, py, po.		1.45	0.22	4.39		6.67	
5.50 - 6.70	1.20	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk-fk. Stedvis gr. 1-3 mm.	45-50	0.02	0.03	0.10		1.78	
6.70 - 11.55	4.85	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk. Stedvis tynne partier 2 gl.gn.alm. Enkelte kv.linser.Stedvis spor hbl. Noe ujevnt impr. sl, py. også gn, cp.	45-50	0.55	0.26	1.04		5.11	6.70-8.00
				0.79	0.37	2.25		6.00	8.00-9.00
				0.56	0.38	1.45		5.89	9.00-10.00
				0.71	0.79	1.59		7.06	10.00-11.00
				0.82	0.44	4.30		10.43	11.00-11.55
11.55 - 12.00	0.45	TAP							
12.00 - 13.25	1.25	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn.b.p. som over. Impr. sl, py.	45-50	0.58	0.27	2.16		7.74	
13.25 - 13.55	0.30	TAP							
13.55 - 15.20	1.65	Hbl.-biot.gn. Litt mørk,mlk. Enkelte ekstra biot-rike partier. Ujevnt besatt gr. 1-2 mm. Sv.impr.py	45	0.06	0.13	0.25		6.06	

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44020

Borehull: 467

Dato: Mars 1977
Koordinator: X:925.385.8, Y:44.012.7
Retning: S
Helling/stigning: - 60°
Høyde: - 68.8 m
Lengde: 24.35 m

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
15.20 - 15.55	0.35	2 gl.gn.b.d. Noe lys, mlk. Endel kv. isprengt. Spor hbl. Godt impr. sl, py, gn, cp.		1.21	0.78	3.97		12.95	
15.55 - 16.00	0.45	2 gl.gn.b.d. Litt mørk, mlk. Endel biot-striper. Noe kv.		0.14	0.28	0.55		6.73	
16.00 - 16.30	0.30	2 gl.gn.b.d. Samme 2 gl.gn.b.d. som over. Impr. sl, py.	45	0.26	0.85	1.95		10.43	
16.30 - 17.30	1.00	biot-hbl.gn. Noe mørk mlk. Spor gr. 1-3 mm. Noen kv.striper.		0.05	0.11	0.27		4.04	
17.30 - 17.50	0.20	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. Endel kv. Godt impr. sl, cp, py.		1.24	0.45	4.03		8.07	
17.50 - 17.80	0.30	2 gl.gn.b.p. lys, mlk. Sv. spor gn. 1m	45	0.04	0.02	0.11		2.69	
17.80 - 18.15	0.35	kv.linse. Hvit, grovk.							
18.15 - 18.70	0.55	2 gl.gn.b.p. lys, mlk. Enkelte biot-striper. Sv. spor hbl. Spredte gr. 1-3 mm.							
18.70 - 19.40	0.70	TAP							
19.40 - 24.35	4.95	hbl.gn. Litt mørk, mlk. Stedvis biot-rike striper, samt tynne striper 2 gl.gn.b.p. Enkelte kv.striper. Rel. jevnt besatt gr. 1-3 mm. Sporadisk impr. py.	45						

31/3 1977

Kaare M. Hegrum

Kaare M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
 Profil 44020

Borehull: 466

Dato : mars 1977
 Koordinater : X:925.394.3, Y:44.016.1
 Retning : N
 Helling/stigning: - 70°
 Høyde : - 68.5 m
 Lengde : 24.30 m

1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.40	1.40	2 gl.gn.alm. lys,mlk. Enkelte kv.flekke og biot.striper. Stedvis gn i forb. med kv.	70-75	0.48	0.10	0.54		2.52	
1.40 - 1.65	0.25	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn. som før. Litt mere kv. og biot. Impr. sl, cp, py.		1.50	1.79	4.00		8.28	
1.65 - 2.50	0.85	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn. som før. gn. i forb. med kv.	70-75	0.05	0.06	0.10		1.80	
2.50 - 2.75	0.25	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn. som før. Rel. godt impr. sl, py.		3.11	0.55	5.32		9.90	
2.75 - 3.40	0.65	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn. som før. Impr. sl, py.	75-80	0.81	0.23	1.95		6.48	
3.40 - 6.50	3.10	biot.gn. mørk,grovk-mlk. Endel kv.-linser og striper. Rel.jevnt med hbl. Ujevnt impr. sl, py, po.	60-65	0.02	0.04	0.15		9.72	3.40 - 4.50
				0.03	0.32	1.24		12.42	4.50 - 5.50
				0.22	0.59	2.68		12.96	5.50 - 6.50
6.50 - 8.00	1.50	2 gl.gn.b.d. lys,mlk. består stort sett bare av kv. biot og noe feltsp. Stedvis spor hbl. Noe ujevnt impr. sl, py, po, cp.	65-70	0.42	0.47	1.35		11.70	
8.00 - 8.30	0.30	biot.gn. Mørk, grovk-mlk. Endel kv. isprengt litt hbl. Impr. sl, po, py.		0.10	0.68	2.99		19.62	
8.30 - 9.30	1.00	2 gl.gn.b.p. lys, mlk-fk. Stedvis biot-rike partier. Stedvis spor impr.	35-40	0.15	0.15	0.57		3.60	
9.30 - 9.70	0.40	2 gl.gn.alm. Lys, mlk.	35-30	0.05	0.06	0.10		2.88	

Lokalitet: Forseringsort

Profil 44020

Borehull: 466

Dato mars 1977

Koordinater X:925.394.3, Y:44.016.1

Retning : N

Helling/stigning: - 70°

Høyde : - 68.5 m

Lengde : 24.30 m

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
9.70 - 11.05	1.35	2 gl.gn.b.p. lys,mlk-fk. Noen kv.striper, og biot-striper. Spor hbl. i forb. med biot. Stedvis spor impr.	35	0.12	0.10	0.26		3.06	
11.05 - 13.00	1.95	biot.gn. Mørk/lys, mlk-grovk. Veks-lende striper med kv. Endel hbl. Enkelte tynne partier med 2 gl.gn.b.d. Ujevnt impr. sl, py.	30-35	0.30	0.41	1.43		11.52	11.05-12.00
13.00 - 13.40	0.40	TAP		0.07	0.38	1.12		11.16	12.00-13.00
13.40 - 16.60	3.20	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk-fk. Stedvis kv.striper. Enkelte tynne 2 gl.gn.alm.-striper. Noe ujevnt tildels godt impr. sl, py, po.	30-35	0.87	0.26	1.55		6.48	13.40-14.50
				0.53	0.39	3.41		10.32	14.50-15.50
				0.60	0.61	3.55		9.36	15.50-16.60
16.60 - 17.80	1.20	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk, Noen kv.striper Enkelte flekker med hbl. Spredte gr. 1-3 mm. Stedvis spor sl.	35	0.05	0.09	0.23		6.00	
17.80 - 18.00	0.20	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk. Noe kv. Spor hbl. God impr. sl. cp.		1.84	0.31	8.22		6.00	
18.00 - 20.00	2.00	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. Enkelte str. ren biot. Noen hbl.flekke. Spor gr. 1-3 mm.	35-40	0.02	0.03	0.11		4.32	
20.00 - 20.55	0.55	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. Noen biot.-rike striper. Spredte gr. 1-3 mm	35-40						
20.55 - 24.30	3.75	hbl.gn. Noe mørk,mlk. Enkelte tynne partier med 2 gl.gn.b.d. Rel. jevnt besatt gr. 1-3 mm. Rel. jevnt impr. py.	40.45						

23/3 1977

Kaare M. Hegrum

Kaare M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.280

Borehull: 465

Dato : Mars 1977
Koordinater : X:925.419.6 Y: 44.280.5
Retning : N
Helling/stigning: + 35°
Høyde : - 69.4
Lengde : 22.50

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	kv-biot-gn. Mørk/lys mlk-grovk. Veksling mellom grovk. biot. og kv. Enkelte flekker hbl. Spredte gr. 2-3 mm.	30°						
0.80 - 9.20	8.40	hbl.gn. Noe mørk mlk. Enkelte striper med 2 gl.gn.b.d. Noen kv.-striper. Stedvis spor skarn. Rel. jevnt besatt gr. gr. 1-3 mm. Jevnt impr. <u>py</u> .	2m:30° 3m:30° 4m:15-20° 5m:15-20° 6m:20° 7m:25-30° 8m:30° 9m:10-15°						
9.20 - 10.30	1.10	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk-grovk.Noen striper biot.gn. Stedvis små flekker hbl. Ujevnt besatt gr.2-4 mm. Stedvisi noe <u>py</u> .	25-30°	0.14	0.14	0.26		6.17	
10.30 - 11.05	0.75	2 gl.gn.alm. Lys, mlk-grovk. Stedvis noe biot. og hbl. Rel. godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , noe <u>gn</u> .	40	5.14	0.31	6.96		11.19	
11.05 - 11.75	0.70	2 gl.gn.b.d. Noe lys,mlk. Endel spredte flekker hbl. Spredt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>cp</u> .		0.31	0.45	0.43		7.84	
11.75 - 12.10	0.35	2 gl.gn.b.d. Samme 2 gl.gn. som over. Rel. godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>cp</u> . Noe gn.		2.34	1.13	3.16		10.41	
12.10 - 12.50	0.40	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk. Stedvis noe biot-striper. Spor impr.		0.17	0.26	0.24		4.37	
12.50 - 14.75	2.25	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk. Stedvis flekker av hbl. Noen biot.-rike striper. Tildels godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , Noe <u>gn</u> . <u>cp</u>	30°	4.74	0.28	7.72		6.30	12.50 - 13.50
				2.53	0.44	4.88		6.69	13.50 - 14.75

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.280

Borehull: 465

2

Dato : Mars 1977
Koordinater : X: 925.419.6 Y: 44.280.5
Retning : N
Helling/stigning: + 35°
Høyde : - 69.4
Lengde : 22.50

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
14.75 - 17.00	2.25	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. Stedvis biot- rike partier. Disse har sv. spor impr.	30°	0.34	0.16	0.48		4.11	
17.00 - 18.00	1.00	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn. som over. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>gn</u> .	30°	1.58	0.19	2.68		5.66	
18.00 - 18.50	0.50	2 gl.gn.alm. Lys, fk-mlk. noe tett. Stedvis <u>litt</u> gr. 1-2 mm. Spor impr.		0.46	0.09	0.71		2.57	
18.50 - 20.00	1.50	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. Endel flekker av hbl. Noen kv.striper. Rel. jevnt impr. <u>py</u> , Noe <u>sl</u> .	30°	0.47	0.17	1.14		4.37	
20.00 - 21.00	1.00	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk-grovk. Enkelte flekker med hbl. Noe kv. Jevnt impr. <u>py</u> .	30°	0.07	0.14	0.15		7.33	
21.00 - 22.50	1.50	hbl.gn. Noe mørk, mlk. Noen kv.striper Tenderer stedvis inn mot amf. Rel. jevnt besatt gr. 1-3 mm Jevnt impr. <u>py</u> .	30°						

21/3 1977
Kaare M. Hegrum
Kaare M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.280

Borehull: 464

Dato : Mars 1977
Koordinater : x:925.419.3 y:44.280.3
Retning : N
Helling/stigning: + 60°
Høyde : - 67.5
Lengde : 19.60

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.00	5.00	hbl.gn. Noe mørk, mlk. Stedvis enkelte kv.linser. Ujevnt besatt gr. 1-3 mm. Ujevnt impr. py.	30-35						
5.00 - 5.40	0.40	2 gl.gn.alm. Lys, mlk.	35						
5.40 - 6.00	0.60	hbl.gn. Samme hbl.gn. som over.		0.05	0.03	0.02		7.20	
6.00 - 7.20	1.20	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk. Enkelte biot.rike striper. Stedvis flekker av hbl. Stedvis sv.spor gr. Sv.impr. py.	35-40	0.02	0.06	0.04		4.32	
7.20 - 8.70	1.50	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn.som over. Noe mere hbl. Godt impr.sl, gn.		1.47	0.37	6.39		8.10	
8.70 - 11.70	3.00	hbl.gn. Noe mørk, mlk. Endel kv.striper Ujevnt besatt gr. 1-3 mm. Impr. py.	35-40	0.00	0.03	0.09		7.38	8.70 - 10.50
11.70 - 11.90	0.20	amf. Mørk, mlk. En god del kv.ispr. Tett besatt gr.s-5 mm. De største tydelig stichtolitisk							
11.90 - 13.00	1.10	hbl.gn. Samme hbl.gn. som over	35						
13.00 - 15.60	2.60	biot.gn. Noe mørk, mlk.-fk. Likner mye på hbl.gn. men har kun spr. flekker hbl. Jevnt besatt gr. 1-3 mm. Impr. py.	35-40						
15.60 - 16.00	0.40	amf. Mørk, mlk. Tett. Noe kv.isprengt Tett besatt gr. 3-6 mm. De største tydelig stichtolitisk.							
16.00 - 19.60	3.60	hbl.gn. Noe mørk, mlk. Noen kv.linser. Enkelte biot.gn. partier. Rel. jevnt besatt gr. 1-2 mm. Impr. py.	30						

16/3 1977
Kaare M. Hegrum.

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.280

Borehull: 463

Dato : Febr. 1977
Koordinater : X: 925.419.2 Y: 44.280.2
Retning : N
Helling/stigning: - 30°
Høyde : - 71.2
Lengde : 44.25

1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	hbl.gn.	Lys, mlk. Rel. mye kv. iblandet Ca. 20°	0.21	0.13	0.65		5.76	
0.30 - 1.25	0.95	hbl.gn.	Noe mørk, mlk.-grovk. Endel grovk. kv. isprengt. Noe biot. Stedvis flekker av sl.	0.04	0.12	1.30		7.02	
1.25 - 2.30	0.95	hbl.gn.	Noe mørk, mlk.-fk. Også her isprengt endel kv. og grovk. biot. Impr. py.	0.04	0.21	0.12		9.00	
2.30 - 2.50	0.20	biot.sk.	Mørk, m. grovk. Nesten bare biot, men litt kv. Sv. impr. py.	0.02	0.07	1.19		16.92	
2.50 - 2.70	0.20	malm	Nesten massiv sl-malm. Noe kv. isprengt.	0.02	0.06	19.81		14.40	
2.70 - 4.65	1.95	2 gl.gn.b.p.	Lys, mlk. Enkelte biot-rike striper. Enkelte flekker hbl. Spredte gr. 1-2 mm.	0.02	0.12	0.40		9.90	
4.65 - 7.20	2.55	hbl.gn.	Noe lys, mlk-grovk. Grovk. hbl. i veksling med kv. Noe biot. Rel. jevnt besatt gr. 1-3 mm. Spredt impr. po, py, bortsett fra siste 1.5 cm. Her også sl.						4.65 -
				0.01	0.07	0.08		5.76	6.00
				0.02	0.05	0.13		5.22	6.00 -
7.20 - 7.40	0.20	TAP							7.20
7.40 - 7.50	0.10	Hbl.b.art.	Mørk, mlk. Består bare av hbl. og sl.	0.05	0.06	10.81		10.26	
7.50 - 8.75	1.25	hbl.gn.	Noe mørk, mlk. Endel kv. isprengt. Spredte gr. 1-2 mm	0.00	0.09	0.10		7.74	
8.75 - 9.20	0.45	TAP	Spor py.						

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.280

Borehull: 463

2

Dato : Febr. 1977
Koordinater : X: 925.419.2 Y: 44.280.2
Retning : N
Helling/stigning: - 30°
Høyde : - 71.2
Lengde : 44.25

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
9.20 - 11.30	2.10	hbl.gn. Samme hbl.gn. som over. Også noe po-impr. Enkelte biot-striper.	30						
11.30 - 12.00	0.70	2 gl.gn.alm. Lys, fk. Virker noe tett. Tett besatt gr. 1 mm. Spor po.	30						
12.00 - 14.15	2.15	hbl-biot.gn. Mørk, mlk-grovk. En god del grovk. biot. iblandet. Også noe kv. Spredte gr. 1-3 mm. po, py i forb. med rene biot.striper.	30-35						
14.15 - 14.50	0.35	hbl.biot.gn. Samme b.art som før. Impr. py, po, spor cp.							
14.50 - 15.00	0.50	hbl.gn. Noe mørk, mlk. Enkelte skarnflekker. Rel lite biot. Spor py.							
15.00 - 15.50	0.50	2 gl.gn.b.d. Noe lys, mlk. En del kv. isprengt. Enkelte flekker hbl.		0.04	0.12	0.08		8.64	
15.50 - 16.00	0.50	pegm. Hvit grovk.		0.04	0.05	0.04		3.42	
16.00 - 16.40	0.40	hbl.gn. Noe lys, mlk. Endel biot-striper. Noe kv. Spredt impr. sl, py, po.	30	0.03	0.10	1.98		12.24	
16.40 - 16.70	0.30	hbl.gn. Samme b.art som over. Spredte gr. 1-2 mm.		0.02	0.17	0.11		9.36	
16.70 - 17.65	0.95	biot.gn. Mørk, grovk.-mlk. Noe kv. Enkelte hbl.flekker. Delvis impr. py, po.	25-30	0.03	0.13	0.08		16.20	
17.65 - 18.15	0.50	Pegm. hvit, grovk.							

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.280

Borehull: 463

Dato : Febr. 1977
Koordinater : X: 925.419.2 Y: 44.280.2
Retning : N
Helling/stigning: - 30°
Høyde : - 71.2
Lengde : 44.25

3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
18.15 - 19.00	0.85	biot.b.art. Lys/mørk grovk. Veksling mellom biot.gn. og pegm. Gr. 1-3 mm i biot.							
19.00 - 19.60	0.60	TAP							
19.60 - 19.85	0.25	Pegm. Hvit, grovk. Spor biot.		0.04	0.05	0.05		4.50	
19.85 - 21.00	1.15	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Endel kv. iblandet. Enkelte flekker hbl. Spredte spor sl, py, cp.	30	0.02	0.09	0.41		7.20	
21.00 - 22.20	1.20	Pegm. hvit, grovk.		0.00	0.03	0.04		1.33	
22.20 - 22.60	0.40	TAP							
22.60 - 23.15	0.55	Pegm. hvit, grovk.							
23.15 - 24.80	1.65	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Noe kv. isprengt. Enkelte hbl.-flekke. Spredt impr. sl, py, po, cp.	30°	0.84	0.42	2.49		13.14	
24.80 - 25.95	1.15	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk. Stedvis biot-rike partier. Rel. jevnt besatt gr. 1-3 mm.	25-30°	0.01	0.04	0.19		3.60	
25.95 - 26.70	0.75	2 gl.gn.b.d. Rel. lys, mlk.-grovk. Svært mye grovk. biot. Her impr. py, po, spor sl, cp.		0.00	0.26	0.65		17.46	
26.70 - 28.50	1.80	2 gl.gn.b.p. Rel. lys, mlk. Stedvis striper av grovk. biot. Stedvis spor po, cp.	30-35	0.03	0.12	0.30		5.40	
28.50 - 28.75	0.25	TAP							
28.75 - 29.00	0.25	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn. som over		0.21	0.16	0.88		7.56	
29.00 - 29.50	0.50	2 gl.gn.alm. Lys, fk-mlk. Virker "tett" Spredte gr. 1-3 mm. De største tydelig stichtolitisk	30-35	0.05	0.05	0.41		2.70	

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.280

Borehull: 463

4

Dato: Febr. 1977
Koordinator: X: 925.419.2 Y: 44.280.2
Retning: N
Helling/stigning: - 30°
Høyde: - 71.2
Lengde: 44.25

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29.50 - 31.15	1.65	2 gl.gn.b.d. Mørk, mlk-grovk. Stedvis nesten biot.gn. Stedvis spor hbl. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .		1.00	0.35	2.84		11.52	
31.15 - 31.75	0.60	2 gl.gn.b.d. Noe lys, mlk-fk. Stedvis noe kv. Enkelte flekker hbl. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .	30-35	1.21	0.26	2.77		7.74	
31.75 - 34.20	2.45	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk. Stedvis enkelte kv.-linser. Spredte flekker <u>po</u> , <u>py</u> .	35	0.15	0.20	0.29		5.22	
34.20 - 34.40	0.20	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Spredt impr. <u>py</u> , <u>sl</u>		0.24	0.44	0.60		9.72	
34.40 - 34.80	0.40	TAP							
34.80 - 35.60	0.80	2 gl.gn.b.d. Mørk, mlk.-grovk. Endel kv. Striper ren biot. Partier med nesten bare hbl. Rel. godt impr <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>po</u> .	35	0.23	0.37	4.08		14.04	
35.60 - 36.75	1.15	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk.-fk. Noe tett. Enkelte biot. striper.		0.00	0.10	0.14		3.60	
36.75 - 37.40	0.65	2 gl.gn.b.d. Noe lys, mlk.-grovk. Striper ren biot og kv. Flekker hbl. Spredt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>po</u> , <u>cp</u> .	35	0.13	0.30	0.48		9.36	
37.40 - 40.55	3.15	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk. Enkelte biot-rike part. Stedvis spor hbl. Flekk med <u>sl</u> på 29.62-29.65.	35-40°	0.02	0.09	0.10		2.88	37.40 - 39.00
40.55 - 43.10	2.55	hbl.gn. Noe mørk, mlk. Enkelte kv. str. Stedvis spor skarn.	40						
43.10 - 44.25	1.15	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. Enkelte biot-rike partier. Stedv. spor gr. 1-3mm	40°						

16/3 1977
Kaare M. Hegrum.

Kaare M. Hegrum

Borehull: 462

Dato : Feb. 1977
Koordinater : X: 925.386.9 Y: 44.274.3
Retning : N
Helling/stigning : - 74°
Høyde : - 71.8 m
Lengde : 19.95 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
0.00 - 0.60	0.60	amf.	Mørk, mlk.-fk. Endel kv. isprengt. Rel. tett besatt gr. 2-5 mm. De største tydelig stichtolitisk.	60						
0.60 - 5.00	4.40	hbl.gn.	Noe mørk, mlk-fk. Vekslende biot-innhold. Enkelte partier likner noe på 2 gl.gn.b.d (men med rel. mye hbl). Jevnt besatt gr 1-3 mm. Jevnt impr. py.	80-85 60-65	(2m) 3-4 m (5m)					
5.00 - 6.70	1.70	2 gl.gn.b.d.	Noe mørk mlk. Stedvis nesten biot-gn. Enkelte lysere part. (2 gl.gn.b.p). Stedvis spor hbl. Endel kv. Rel. godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>po</u> , <u>cp</u> .			0.22	0.48	3.11	13.29	3.50 - 5.00 6.00 - 6.00
6.70 - 15.00	8.30	hbl.gn.	Noe mørk, mlk.-fk. Endel kv-striper. Enkelte partier mere biot-rik. Stedvis tynne striper 2 gl.gn.b.p. Spredte gr. 1-2 m. Impr. <u>py</u> .	80-85 65-70 85-90 45 75-80	(8m) aol (10m) (17 m) (13) (15)	0.07	0.24		5.57	6.70 - 8.70
15.00 - 15.50	0.50	2 gl.gn.b.p.	Noe lys, mlk. Endel spredte gr. 2-4 mm.	65°	16-18 m					
15.50 - 19.95	4.45	hbl.gn.	Samme hbl.gn. som over. Noe mere gr. 1-3 mm. Flekk med <u>sl</u> , <u>po</u> , <u>cp</u> på 16.40 - 16.43.	60-65 65-70	(19 m) (20)					
No 24/2 - 77 Haare M. Hegrum										

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44 280

Borehull: 461

1.

Dato: Feb. 1977
Koordinater: X: 925.401.5 Y: 44.272.3
Retning: N
Helling/stigning: - 70°
Høyde: - 71.8 m
Lengde: 25.85 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.75	0.75	2 gl.gn.alm. Lys, mlk.-fk. stedvis litt biot. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .	85-90	0.41	0.15	1.11		6.21	
0.75 - 1.00	0.25	hbl.gn. mørk, mlk. Noen rene biot-striper. Sv.impr. <u>py</u> .	60-65°	0.06	0.10	0.11		7.60	
1.00 - 1.25	0.25	2 gl.gn.b.p. lys, mlk. Noe biot. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .		0.41	0.17	1.70		7.91	
1.25 - 1.95	0.70	hbl.gn. Noe mørk, mlk. En god del biot. iblandet. Enkelte kv.-striper. Sv. impr. <u>py</u> .	60-65	0.01	0.17	0.07		9.16	
1.95 - 5.25	3.30	2 gl.gn.b.p. Rel. lys, mlk.-fk. Flekker av hbl. og biot. Noen kv.-striper. Sporadisk impr. <u>py</u> .	60-65	0.52	0.15	0.04		4.97	1.95-3.00
5.25 - 6.15	0.90	biot.gn. Mørk, mlk. Endel kv. Noe hbl. Noe ujevnt besatt gr. 1-2 mm Flekker av <u>py</u> , <u>po</u> , <u>cp</u> , i forb. med kv.linser.							
6.15 - 8.10	1.95	hbl.gn. Noe mørk, mlk. Endel kv. og biot.gn.striper. Rel. jevnt besatt gr. 1-3 mm. Sv. impr. <u>py</u> , <u>po</u> , i forb. med ren biot.	55-	0.02	0.17	0.07		8.38	7.00-8.10
8.10 - 8.55	0.45	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk. Noen partier ren biot.		0.03	0.20	0.10		6.21	
8.55 - 8.80	0.25	2 gl.gn.b.p. Samme b.art som over. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .		0.53	0.38	2.29		9.44	
8.80 - 11.90	3.10	2 gl.gn.b.d. Noe lys, mlk. En del kv.-isprengt. Stedvis flekker av hbl. Også rene biot-striper Impr. <u>py</u> , <u>po</u> , <u>sl</u> , <u>cp</u> .	45-50	0.02	0.56	0.16		13.93	8.80-10.00
				0.20	0.31	1.84		8.57	10.00-11.00
				0.52	0.41	3.11		12.86	11.00-11.90
11.90 - 12.15	0.25	TAP							

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44 280

Borehull: 461

Dato: Feb. 1977
Koordinater: X: 925.401.5 Y: 44.272.3
Retning: N
Helling/stigning: - 70°
Høyde: - 71.8 m
Lengde: 25.85 m

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
12.15 - 12.40	0.25	2 gl.gn.b.d. Samme b.art som over. Impr. sl, py		0.47	0.21	1.64		8.57	
12.40 - 15.00	2.60	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. Noen hbl.- flekker og kv.striper. Enkelte rene biot.-striper. Flekkvis godt impr. sl, py	60-	0.44	0.20	5.51		5.57	12.40 - 13.00
				0.58	0.37	3.24		9.00	13.00 - 14.00
				0.97	0.35	1.80		6.21	14.00 - 15.00
15.00 - 16.00	1.00	hbl.gn. Noe mørk, mlk. Endel striper ren biot. Jevnt besatt gr. 1-4 mm.		0.02	0.03	0.12		6.86	
16.00 - 16.65	0.65	2 gl.gn.b.d. Noe lys, mlk.-fk. Endel rene biot.-striper. Spor gr. 1-2 mm.		0.00	0.01	0.03		4.29	
16.65 - 17.00	0.35	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk. Pegm.stripe på 10-12 cm. i b.arten. Impr. sl, py.		1.08	0.11	2.46		3.64	
17.00 - 22.35	5.35	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. Noen biot.- striper og kv.linser. Impr. sl, cp, på 17.32 - 17.38	60- 65	0.22	0.19	1.11		4.50	17.00 - 17.40
22.35 - 25.85	5.30	Hbl.gn. Noe mørk, mlk-fk. Noen smale striper 2 gl.gn.b.p. Enkelte biot-rike partier. Enkelte kv.linser. Rel.jevnt besatt gr. 1-3 mm. Impr. py.	60						

24/2. 1977
K.M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.280

Borehull: 460

Dato: Febr. 1977
Koordinater: X:925.410.0 Y:44.279.2
Retning: N
Helling/stigning: - 70°
Høyde: - 71.6
Lengde: 24.30 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.85	2.85	hbl.gn. Noe mørk, mlk-fk. Flekkvis noe biot.rik. (2 gl.gn.b.d.) Spredte gr. 2-4 mm. Enkelte kv.linser. Jevnt impr. py	60-65°						
2.85 - 4.30	1.45	pegm. hvit. grovk.							
4.30 - 4.60	0.30	biot.gn. mørk, grovk. Noe fk. kv. Flekker hbl. Impr. py.							
4.60 - 5.80	1.20	hbl.gn. Noe mørk, mlk-fk. Stedvis flekker ren biot. Spredte gr. 2-4 mm. Jevnt impr. py.	60-65°						
5.80 - 6.10	0.30	biot.gn. mørk, grovk. Noe kv. iblandet. Gr. 2-5 mm. Impr. py							
6.10 - 7.45	1.35	hbl.gn. Samme hbl.gn. som over	60-65°	0.06	0.06	0.15		8.71	
7.45 - 7.70	0.25	biot.gn. Mørk, grovk. Noe kv. Flekker av hbl. Spredte gr. 1-3 mm Impr. py.		0.02	0.10	0.13		8.93	
7.70 - 8.25	0.55	biot.gn. mørk, grovk. Endel kv. Små flekker hbl. Impr. sl, py, cp		0.13	0.45	1.47		13.43	
8.25 - 8.45	0.20	hbl.b.art. Noe lys mlk.-fk. Endel kv. iblandet. Noe biot. Impr. py		0.07	0.17	0.21		6.00	
8.45 - 11.50	3.00	2 gl.gn.b.d. Noe lys, mlk-fk. Stedvis tynne partier 2 gl.gn.b.p. Enkelte steder slirer av ren biot. Spredte flekker av hbl. Impr. sl, py, cp.	50-60°	0.27	0.20	1.07		7.57	8.45-9.50
				0.40	0.35	2.79		12.86	9.50-10.50
				0.42	0.50	2.03		9.71	10.50-11.50
11.50 - 12.15	0.65	2 gl.gn.b.p. Noe lys, fk-mlk. Stedvis flekker hbl. Noen få biot.-slirer. Tildels godt impr. sl, py		0.78	0.17	4.42		6.57	

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.280

Borehull: 460

2

Dato: Febr. 1977
Koordinater: X:925.410.0 Y:44.279.2
Retning: N
Helling/stigning: - 70°
Høyde: - 71.6
Lengde: 24.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
12.15 - 12.85	0.70	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk-grovk. En god del rene biot.slirer. Noe kv.flekke hbl. Rel.godt impr. <u>py</u> , <u>po</u> , Noe <u>sl</u> , <u>cp</u> .		0.12	0.59	2.23		13.86	
12.85 - 13.35	0.50	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk-fk. Noen partier med 2 gl.gn.b.d. Disse sv. impr. <u>sl</u> , <u>py</u>		0.04	0.15	0.51		4.50	
13.35 - 15.80	2.45	pegm. hvit, grovk.		0.03	0.05	0.09		1.30	
15.80 - 16.85	1.05	2 gl.gn.b.d. mørk/lys,mlk-fk. En god del kv. iblandet. Flekker av hbl. Godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , Noe <u>po</u> , <u>cp</u> Tildels rene <u>sl</u> -striper.	60-65°	1.05	0.72	7.79		10.55	
16.85 - 17.25	0.40	pegm. hvit, grovk.		0.04	0.06	0.24		1.06	
17.25 - 17.85	0.60	2 gl.gn.b.d. Samme 2 gl.gn. b.d. som over, rel godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .		0.19	0.35	4.29		10.40	
17.85 - 18.05	0.70	2 gl.gn.b.p. Lys, fk-mlk. Stedvis flekker hbl. Godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u>	40-45°	2.85	0.24	5.99		5.74	
18.05 - 18.25	0.20	malm rel. mass. <u>sl</u> -malm, noe <u>gn</u> . <u>py</u> , <u>po</u> , <u>cp</u>		10.09	0.18	16.42		11.17	
18.25 - 19.10	0.85	2 gl.gn.b.p. Lys, fk-mlk. Noe "tett". Noen få biot-striper.	60-65°	0.18	0.13	0.31		3.06	
19.10 - 19.65	0.55	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn.b.p. som over. Godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , Noe <u>gn</u> .		2.51	0.45	4.78		8.38	
19.65 - 21.05	1.40	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn.b.p. som tidl.		0.07	0.02	0.06		1.99	
21.05 - 21.50	0.45	hbl.gn. Mørk, mlk. Endel flekker gulgrønn skarn. Noen rene biot-striper. Impr. <u>py</u> .							

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.280

Borehull: 460

3

Dato: Febr. 1977
Koordinater: X:925.410.0 Y:44.279.2
Retning: N
Helling/stigning: - 70°
Høyde: - 71.6
Lengde: 24.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
21.50 - 22.40	0.90	2 gl.gn.b.p. lys, mlk-fk. Noe "tett". Enkelte biot-striper. Spor gr. 1-3 mm.	60- 65°						
22.40 - 24.20	1.80	hbl.gn. Mørk, mlk. Enkelte tynne partier 2 gl.gn. b.p. Noen kv.striper. Spredte gr. 1-4 mm. Impr. py.							
24.20 - 24.30	0.10	pegm. hvit., grovk.							

24/2 1977
K.M. Hegrum.

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44280

Dato: Februar 1977
Koordinater: X: 925.414.4 Y: 44.282.5
Retning: E
Helling/stigning: + 60°
Høyde: - 68.6 m
Lengde: 18.40 m

Borehull: 459

1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.65	1.65	Hbl.gn. Noe lys, mlk-fk. Enkelte tynne partier med 2 gl.gn. alm.-b.p. Spredte gr. 2-4 mm. Impr. py.	60°	0.15	0.23	0.53		7.41	
1.65 - 2.00	0.35	Hbl.gn. Samme b.art som over. Impr. sl, py.		1.31	0.28	3.50		7.94	
2.00 - 2.20	0.20	2 gl.gn.alm. Lys, mlk.-fk.	60	0.11	0.05	0.26		2.65	
2.20 - 2.35	0.15	2 gl.gn.b.p. Noe mørk, mlk.-fk. Impr. py, sl.		0.63	0.43	1.28		9.26	
2.35 - 3.05	0.70	malm Rel. mass. sl.malm med noe islag av b.art.		5.04	0.33	14.65		9.53	
3.05 - 3.35	0.30	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk-fk. Spor hbl. Enkelte kv.linser. Impr. sl, py.		1.57	1.03	5.15		9.66	
3.35 - 4.25	0.90	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk.-fk. Små flekker hbl. Jevnt besatt gr. 1-3 mm. Impr. py.	55-60	0.03	0.08	0.11		6.09	
4.25 - 7.55	3.30	hbl.gn. Rel. lys, mlk-fk. Enkelte biot-rike partier. Noen kv.linser. Spredte gr. 1-3 mm. Impr. py.	60°	0.02	0.03	0.08		8.47	4.25-5.50
7.55 - 9.00	1.45	amf. Mørk,mlk. Endel biot. og biot.gn. Spredte gr. 1-3 mm. Sv. impr. py.							
9.00 - 11.80	2.80	2 gl.gn.b.d. noe lys, mlk.-fk. Stedvis flekker av hbl/amf. Endel kv.linser. Spredte gr. 1-3 mm.	60°						

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44280

Borehull: 459

2

Dato : Februar 1977
Koordinater : X: 925.414.4 Y: 44.282.5
Retning : E
Helling/stigning : + 60°
Høyde : - 68.6 m
Lengde : 18.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				‰ Pb	‰ Cu	‰ Zn	‰ S	‰ Fe	
11.80 - 13.10	1.30	amf.	30-35°						
13.10 - 14.10	1.00	2 gl.gn.b.d.							
14.10 - 18.40	4.30	hbl.gn.							

21/2 1977

K.M. Hegrum
K.M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44280

Borehull: 458

1

Dato: Febr. 77
Koordinater: X:925.416,9 Y:44.279.2
Retning: N
Helling/stigning: - 70°
Høyde: - 71.4 m
Lengde: 25.55 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	biot.gn. mørk, grovk. Endel kv. isprengt Flekker hbl. Spor gr. 1-3mm		0.05	0.15	0.21		7.14	
0.50 - 0.70	0.20	biot.gn. Omtrent samme b.art som over M. godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .		2.11	0.51	8.58		17.19	
0.70 - 3.45	2.75	hbl.gn. Noe lys, mlk-fk. Enkelte rene biot-striper. Sporadisk gr. 1-3 mm. Impr. <u>py</u>	35	0.04	0.03	0.14		8.76	0.70 - 2.00
				0.01	0.03	0.03		9.73	2.00 - 3.45
3.45 - 3.90	0.45	kv.sitt Hvit fk-mlk. litt biot + musk. Sv.impr. <u>po</u> .		0.01	0.10	0.05		5.19	
3.90 - 5.10	1.20	biot.-hbl.gn. Mørk, men med hvit kv. inni- mellom. Mlk.-grovk. Rel.mye hbl. Ujevnt med gr. 1-3mm. Impr. <u>py</u> .		0.01	0.03	0.37		6.46	
5.10 - 8.00	2.90	hbl.gn. Rel. lys, mlk-fk. Enkelte steder biot.-rike bånd. Noen kv.linser. Rel.jevnt besatt gr. 2-5 mm.	60	0.06	0.05	0.16		7.14	5.10 - 7.00
				0.00	0.07	0.04		8.59	7.00 - 8.00
8.00 - 8.45	0.45	2 gl.gn.b.p. Rel.lys, mlk. Spor hbl. Jevnt besatt gr. 1-2 mm.		0.01	0.05	0.04		7.95	
8.45 - 9.35	0.90	2 gl.gn.b.p. Rel.lys, mlk. En del striper biot. Noen kv.linser. Impr. <u>po</u> , <u>cp</u> , <u>sl</u> .	60-65	0.07	0.44	0.42		9.89	
9.35 - 10.90	1.55	hbl-biot.gn. Mørk, grovk.-mlk. Noe kv.- isprengt. Mere biot.rik først deretter mere hbl-rik. Rel godt impr. <u>sl</u> , <u>po</u> , <u>py</u> .	60°	0.61	0.79	3.32		20.11	
10.90 - 13.40	2.50	2 gl.gn.b.p. lys, mlk-fk. Noen biot-rike partier. Stedvis småflekker hbl. Sv.impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>po</u> .	60-65	0.46	0.18	1.17		4.70	10.90 - 12.00
				0.30	0.31	1.09		6.32	12.00 13.40

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44280

Borehull: 458

2

Dato: Febr. 77
Koordinater: X:925.416,9 Y:44.279.2
Retning: N
Helling/stigning: - 70°
Høyde: - 71.4 m
Lengde: 25.55 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.40 - 14.70	1.30	hbl-biot-gn. Noe mørk, mlk-fk. Endel kv.-linser. Enkelte partier mere hbl. eller biot-rike enn andre. Godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u>		0.04	0.74	4.00		16.54	
14.70 - 15.65	0.95	2 gl.gn.b.p. lys, mlk.-fk. Noen ekstra biot-rike partier. Sv. impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>po</u>	60	0.15	0.14	0.56		4.38	
15.65 - 18.00	2.35	2 gl.gn.b.p. lys, mlk-fk. Likner mye på foregående b.art, men biot-opptrer mye mere hyppig. Endel kv.linser. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>po</u>	55-60	0.39	0.35	2.47		8.11	15.65- 17.00
				0.44	0.25	1.85		5.84	17.00- 18.00
18.00 - 18.80	0.80	hbl.gn. Noe lys, mlk-fk. Endel biot.stedvis. Noen kv.linser. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>po</u>		0.22	0.36	1.76		8.27	
18.80 - 19.20	0.40	malm Rel. mass. <u>sl</u> -malm. Noe hbl. isprengt. <u>cp</u> -rik.		6.34	0.85	14.32		11.35	
19.20 - 21.60	2.40	hbl.gn. mørk, mlk.-fk. Stedvis noe biot. og kv.linser. Spredte gr. 1-4 mm. Sv. impr. <u>py</u> .	65-70	0.07	0.11	0.21		7.30	19.20- 20.50
21.60 - 22.65	1.05	2 gl.gn.b.p. lys, mlk. Endel islag av 2 gl.gn.b.d. Noen kv.linser Spredte gr. 1-2 mm.	60						
22.65 - 24.00	1.35	Pegm. hvit, grovk.							
24.00 - 24.70	0.70	2 gl.gn.b.p. lys, mlk-fk. Noe tett	60-65						
24.70 - 25.55	0.85	hbl.gn. Mørk, mlk-fk. Noe tett. Rel.tett besatt gr.1-4 mm. De største stichtolitisk.							

18/2

1977

K.M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44110

Borehull: 457

Dato: Febr. 1977
Koordinater: X:925.401 Y:44.110,1
Retning: N
Helling/stigning: - 70°
Høyde: - 69.3
Lengde: 41.00

1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	2 gl.gn.alm. lys,mlk-fk. Enkelte biot-striper. godt impr. <u>sl</u> . Noe <u>py</u> , <u>cp</u> .		0.36	0.86	2.92		16.30	
0.30 - 0.55	0.25	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.-fk. Stedvis spor hbl? Jevnt impr. <u>py</u> .	75-80	0.90	0.67	1.86		8.15	✓
0.55 - 1.00	0.45	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.-fk. Enkelte biot-str- iper.Spor hbl. Godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , noe <u>cp</u> .		0.56	0.40	1.55		5.78	?
1.00 - 2.55	1.55	2 gl.gn.b.p. Rel. lys,mlk-fk. Stedvis spor gr. 1-3 mm. Enkelte kv.linser	75-80	0.38	0.47	3.54		8.83	✓
2.55 - 3.25	0.70	2 gl.gn.b.p. Rel. lys,mlk-fk. Enkelte kv.- linser og ekstra biot-rike partier. Spor hbl. Impr. <u>sl</u> , <u>po</u> , <u>py</u>		0.32	0.11	3.39		5.77	
3.25 - 4.50	1.25	biot.gn. Noe mørk,grovk.-mlk. endel kv. innimellom. Spor hbl. Impr. <u>sl</u> , <u>po</u> , <u>py</u> .	70-75	0.06	0.04	0.07		5.26	✓
4.50 - 5.00	0.50	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk-fk. Enkelte biot- rike striper.Impr. <u>py</u> .		0.04	0.03	0.11		3.91	
5.00 - 6.50	1.50	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk.-fk. Enkelte ekstra biot-rike striper. Stedvis spor hbl. Impr. <u>sl</u> . <u>po</u> , <u>py</u> , <u>cp</u> .	75-80°	0.01	0.02	0.00		4.75	✓
6.50 - 7.00	0.50	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk-fk. Stedvis spor gr. 1-2 mm. Sv. impr. <u>py</u> .		0.02	0.02	0.05		2.21	
7.00 - 7.35	0.35	biot.gn. Mørk,mlk. Noe kv. spor hbl. Godt impr. <u>sl</u> , <u>po</u> , <u>py</u> ,noe <u>cp</u> .		0.00	0.01	0.03		2.21	✓
7.35 - 9.10	1.85	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk-fk. Noe tett. Stedvis biot-striper. Spor gr. 1-3 mm. Stedvis sv. impr. <u>po</u> .		0.00	0.01	0.03		3.91	

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44110

Borehull: 457

2

Dato: Febr. 1977
Koordinater: X:925.401 Y:44.110,1
Retning: N
Helling/stigning: - 70°
Høyde: - 69.3
Lengde: 41.00

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
9.10 - 9.70	0.60	biot.gn. noe mørk, mlk-fk. Noen str. 2 gl.gn.b.p. Spor hbl. Impr. <u>sl, py, po, cp</u>	65-70	0.00	0.01	0.05		3.24	✓
9.70 - 10.45	0.75	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk.-fk. Biot-rike partier. Impr. <u>sl, py, po, cp</u>		0.77	0.20	1.59		5.68	✓
10.45 - 12.90	2.45	hbl.gn. Noe lys, mlk-fk. Flere tynne striper 2 gl.gn.b.p. Endel impr. <u>sl, py, po</u>	60	0.39	0.14	1.03		4.54	
12.90 - 13.15	0.25	2 gl.gn.alm. lys, mlk.		1.27	0.42	3.56		12.16	✓
13.15 - 14.15	1.00	amf. mørk mlk. Noen innslag av biot.gn. Spor skarn. Ujevnt gr. 1-5 mm.	60	0.68	0.25	3.88		13.95	✓
14.15 - 14.70	0.55	2 gl.gn.b.d. Noe mørk mlk. Spor amf.							
14.70 - 15.35	0.65	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. <u>litt</u> biot.	60-65						
15.35 - 16.30	0.95	biot.gn. Mørk mlk.-grovk. Endel hbl. iblandet. Noen kv.linser. Jevnt besatt gr. 1-3 mm.							
16.30 - 17.70	1.40	pegm. hvit, grovk. Enkelte striper biot.							
17.70 - 19.90	2.50	2 gl.gn.b.p. Noe mørk, mlk. Enkelte str. biot.gn. Stedvis spor skarn. Spredte gr. 1-2 mm.	60						
19.90 - 20.40	0.50	pegm. hvit, grovk.							
20.40 - 20.70	0.30	hbl.gn. Noe mørk, mlk. flekker av skarn. Spor gr 1-2 mm.	60-						
20.70 - 21.00	0.30	pegm. hvit, grovk.							

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44110

Borehull: 457

Dato: Febr. 1977
Koordinater: X:925.401 Y:44.110,1
Retning: N
Helling/stigning: - 70°
Høyde: - 69.3
Lengde: 41.00

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
21.00 - 22.00	1.00	2 gl.gn.b.d. mørk, mlk. Enkelte kv.-striper. Spor hbl. Rel. jevnt besatt gr. 1-3 mm	60°						
22.00 - 23.10	1.10	hbl.gn. Noe mørk, mlk-fk. Noen kv.-striper. Spredte gr. 1-4 mm. Impr. py.							
23.10 - 24.15	1.05	2 gl.gn.b.d. mørk, mlk. Noen få partier 2 gl.gn. alm. Spredte gr. 1-4 mm. Impr. py.	60°						
24.15 - 28.10	3.95	hbl.gn. Noe mørk, mlk-fk. Noen tynne partier 2 gl.gn.b.d. Rel. jevnt besatt gr. 1-3 mm. Impr. py.	60°						
28.10 - 30.25	2.15	amf. Mørk, mlk. Delvis noe tett. Endel biot. iblandet. Tett besatt gr. 1-3 mm., Noen 3-5 mm.	60-65						
30.25 - 30.40	0.15	Pegm. hvit, grovk.							
30.40 - 36.10	5.70	amf. Samme amf. som over.	60-65						
36.10 - 37.00	0.90	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Stedvis sterke innslag av amf. Endel kv.striper. Spor gr. 1-3 mm.							
37.00 - 41.00	4.00	2 gl.gn.b.p. Lys, fk-mlk. Virker "tett". Stedvis flekker hbl. Enkelte tynne pegm.striper. Rel. jevnt besatt gr. 1-4 mm. De største delvis stichtolitisk.	60 -						

21/2 1977 K.M. Hegrum

K.M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.250

Borehull: 456

Dato: Febr. 1977
Koordinater: X:925.394.8 Y:44.248.1
Retning: E
Helling/stigning: - 70°
Høyde: - 70.6 m
Lengde: 32.05 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	2 gl.gn.b.p. lys,mlk. Noe kv.striper		0.53	0.21	1.28		5.40	
0.30 - 0.50	0.20	malm Massiv sl-malm,noe py.		3.76	0.16	17.76		6.75	
0.50 - 0.80	0.30	2 gl.gn.alm. lys,mlk. Noen kv.striper. Sv. impr. sl, py	45	0.46	0.30	2.43		5.18	
0.80 - 2.40	1.60	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk-fk.Enkelte ekstra biot-rike striper. Noen kv.striper.	45-50	0.03	0.02	0.00		2.25	
2.40 - 3.00	0.60	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk. En del kv.linser og ekstra biot-rike partier. Sv. impr. py.		0.02	0.05	0.00		5.65	
3.00 - 3.80	0.80	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk. Endel biot- rike partier.	60	0.02	0.14	0.00		4.21	
3.80 - 6.10	2.30	hbl.gn. Noe mørk,mlk.-fk. Enkelte biot-ruke striper.Ujevnt besatt gr. 1-3 mm. Jevnt impr. py.	60	0.00	0.02	0.00		7.38	3.80 - 5.00
6.10 - 6.70	0.60	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk. Tynne striper med biot.gn. Spredte gr. 1-2 mm.m.sv.impr. po, cp.		0.00	0.03	0.04		6.98	5.00 - 6.10
6.70 - 8.55	1.85	biot.gn. lys/mørk mlk.-fk. Veksling mellom biot. og kv. Stedvis noe hbl. sv.impr. py.	60-65	0.00	0.04	0.03		7.65	
8.55 - 9.00	0.45	biot.gn. Samme biot.gn. som over. Litt mere kv.linser. Impr. sl, py.		0.03	0.45	3.06		16.88	
9.00 - 9.45	0.45	TAP							
9.45 - 11.30	1.85	biot.gn. Mørk,mlk-fk. En del kv.linser Flekker av hbl. Godt impr. sl, cp, po, py.		0.30	0.74	3.59		17.10	

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.250

Borehull: 456

2

Dato: Febr. 1977
Koordinater: X:925.394.8 Y:44.248.1
Retning: E
Helling/stigning: - 70°
Høyde: - 70.6 m
Lengde: 32.05 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
11.30 - 11.70	0.40	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk-fk. Flekker av hbl. Spor skarn. Godt impr. sl, cp.		1.48	0.85	6.24		13.05	
11.70 - 12.00	0.30	2 gl.gn.b.p. Noe lys mlk. Flekker av biot. Noe kv.		0.02	0.26	0.48		6.98	
12.00 - 12.20	0.20	biot.gn. Mørk, grovk. Noe kv. spor py.		0.04	0.27	0.57		12.15	
12.20 - 15.10	2.90	hbl.gn. Noe mørk, mlk-fk. Enkelte tynne partier med 2 gl.gn.b.p. Noen kv. og pegm.-striper Rel.jevnt besatt gr. 1-3 mm. Flekk sl,py,på 13.95 - 13.97	65-70	0.03	0.05	0.11		6.53	12.20 - 13.50
				0.08	0.09	0.16		4.75	13.50 - 15.10
15.10 - 15.25	0.15	TAP							
15.25 - 15.60	0.35	hbl.gn. Samme b.art som over.		0.01	0.07	0.05		5.43	
15.60 - 16.15	0.55	hbl.gn. Samme b.art som før. Noe mere kv.linser. Rel. godt impr. sl, py.		0.14	0.54	2.19		6.96	
16.15 - 17.00	0.85	2 gl.gn.b.d. Rel. lys, mlk.-fk. Flekker med ren biot. Stedvis litt hbl. Impr. py, sl, cp		0.53	0.55	1.99		7.30	
17.00 - 20.10	3.10	hbl.gn. Nor mørk, mlk-fk. Endel biot-striper og kv.linser. Rel. jevnt besatt gr. 1-2 mm. Stedvis impr. py.	65-70	0.01	0.03	0.03		6.28	17.00 - 18.50
20.10 - 20.75	0.65	pegm. hvit, grovk.							
20.75 - 23.00	2.25	2 gl.gn.b.p. lys, mlk. Et par flekker 2 gl.gn.b.d. Stedvis gr.1-3mm	65-70						
23.00 - 23.20	0.20	amf. Mørk,mlk. tett besatt gr.1-4mm							

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.250

Borehull: 456

3

Dato: Febr. 1977
Koordinater: X:925.394.8 Y:44.248.1
Retning: E
Helling/stigning: - 70°
Høyde: - 70.6 m
Lengde: 32.05 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
23.20 - 26.90	3.70	hbl.gn. Mørk, mlk.-fk. Enkelte striper 65-2 gl.gn.b.d. Noe ujevnt besatt 70 gr. 1-3 mm. Rel jevnt impr.py.							
26.90 - 28.00	1.10	2 gl.gn.b.p. Rel. lys, mlk-fk. Noen få striper 2 gl.gn.b.d. Disse har litt py. Noen kv.linser Noe gr. 1-5 mm. De største endel stichtolitisk.							
28.00 - 28.50	0.50	TAP							
28.50 - 28.70	0.20	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk. Sv. spor gr.	60						
28.70 - 28.85	0.15	pegm. hvit, grovk.							
28.85 - 32.05	3.20	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Endel biot-rike partier. Flekker hbl. Spor gr. 1-3 mm. Impr. py.	60						

17/2 1977
K.M. Hegrum
K.M. Hegrum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.180

Borehull: 454

Dato Jan. 1977
Koordinater X: 925.389.6 Y: 44.180
Retning : S
Helling/stigning : - 45
Høyde : - 71.3
Lengde : 19.90

1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk.-grovk. Stedvis ganske mye hbl. Endel kv. og kv-linser Rel. godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u>	30-35	1.46	0.40	5.18		11.14	0.00 - 1.25
				0.70	0.32	4.29		6.37	1.25 - 2.50
2.50 - 3.00	0.50	TAP							
3.00 - 5.00	2.00	2 gl.gn.b.d. Samme 2 gl.gn. som over Kanskje med noe mere kv.linser	30 -	0.54	0.29	1.89		7.48	3.00 - 4.00
			30	0.45	0.43	2.86		8.12	4.00 - 5.00
5.00 - 5.50	0.50	2 gl.gn.alm. Lys, mlk-fk. Enkelte biot-rike partier. Stedvis flekker av hbl. Impr. <u>sl</u> .		0.62	0.21	1.30		3.66	
5.50 - 6.05	0.55	2 gl.gn.b.d. Noe lys, mlk-fk. Mye kv. iblandet. Enkelte ekstra biot-rike partier. Impr. <u>sl</u>	30-35	0.02	0.17	0.85		7.48	
6.05 - 6.50	0.45	2 gl.gn.b.p. lys, mlk-fk. Noen flekker biot + hbl. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u>		0.77	0.37	3.66		6.53	
6.50 - 7.30	0.80	2 gl.gn.alm. lys, mlk.-fk. Stedvis sv. impr. <u>py</u> .		0.27	0.19	0.77		3.66	
7.30 - 7.50	0.20	2 gl.gn.alm. Samme b.art som over. Sv. impr. <u>sl</u> .	35-40	1.14	0.27	1.96		3.18	
7.50 - 8.65	1.15	2 gl.gn.alm. Samme b.art som før, Noen kv.linser.	35	0.13	0.07	0.26		1.75	
8.65 - 9.65	1.00	2 gl.gn.alm. Samme b.art som før. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .		0.86	0.16	2.25		3.50	
9.65 - 10.15	0.50	2 gl.gn.alm. Samme b.art som før.		0.36	0.13	0.61		2.23	
10.15 - 10.80	0.65	2 gl.gn.b.p. Noe mørk. Spor hbl. Noen kb-linser. Godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>gn</u> .		1.19	0.46	3.61		9.87	
10.80 - 11.55	0.75	TAP							

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.180

Borehull: 454

2

Dato Jan. 1977
Koordinater X: 925.389.6 Y: 44.180
Retning : S
Helling/stigning : - 45
Høyde : - 71.3
Lengde : 19.90

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
11.55 - 19.90	8.35	hbl.gn. Noe mørk, mlk. Endel biot-rike partier. Noen kv.-linser Rel. jevnt med gr. 1-4 cm.	35-40	0.00	0.02	0.21		5.25	11.55 - 13.00
<i>Ne 24/ 1977</i> <i>Kaare M. Hegrum</i>									

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44180

Borehull: 453

Dato : Jan. 77
Koordinater : X: 925.391 Y: 44.180
Retning : E
Helling/stigning : + 60°
Høyde : ÷ 69.2 m
Lengde : 16.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.40	3.40	2 gl.gn.b.p. Noe mørk mlk.-grovk. Enkelte mere biot-rike partier. Noen kv.linser. Stedvis spor gr. 1-2 mm. Noen få flekker hbl. Impr. <u>py</u> , spor <u>cp</u> .	45°	0.08	0.15	0.23		6.75	0.00 - 1.70
				0.04	0.20	0.11		6.94	1.70 - 3.40
3.40 - 3.60	0.20	amf. Mørk, mlk. Noe biot. Mye gr. 1-3 mm.		0.03	0.03	0.09		5.06	
3.60 - 6.75	3.15	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk.-grovk. Enkelte mere biot-rike partier. Endel hbl.flekke. Flekkvis gr. 1-3 mm. Noe stavrotitt? Impr. <u>py</u> .	45°	0.01	0.03	0.04		6.75	3.60 - 5.00
				0.02	0.04	0.10		8.44	5.00 - 6.75
6.75 - 8.30	1.55	hbl.gn. Noe mørk, mlk. Endel biot. Jevnt fordelte gr. 1-2 mm Impr. <u>py</u> .	40-45	0.00	0.02	0.04		7.88	
8.30 - 8.90	0.60	hbl.gn. Noe lys, mlk. Minner noe om 2 gl.gn.b.p., men for stort hbl.innhold til det. Flekk anhydritt på 8.65. Impr. <u>py</u> .	45						
8.90 - 11.20	2.30	amf. mørk, mlk-fk. Noe tett. Stedvis endel biot. Tett besatt gr 1-3 mm.	30-35						
11.20 - 13.85	2.65	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. En god del flekker av hbl. Enkelte kv.striper. Tett besatt gr. 1-2 mm. Sv. impr. <u>py</u> .	35-40						
13.85 - 14.20	0.35	amf. Mørk, mlk. Endel biot. Gr. 3-7 mm							
14.20 - 16.20	2.00	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk-fk. Tett. Enkelte kv.striper. Spor gr. 1-2 mm.	35-40						

Mo 7/2 1977

Haare M. Heggum

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.180

Borehull: 452

Dato : Jan. 1977
Koordinater : X: 925.389.6 Y: 44179
Retning : N
Helling/stigning : - 70°
Høyde : - 71.3
Lengde : 25.60

1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.75	2.75	2 gl.gn.b.p. rel.lys mlk-fk. Endel kv-linser. Stedvis ganske mye hbl. Kan over korte partier (5-10 cm) minne om hbl.gn. Endel ekstra biot.rike partier. Tildels meget godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>cp</u> .	40-45	0.11	0.46	2.43		9.94	0.00 - 1.00
				0.48	0.35	5.71		10.07	1.00 - 2.00
				0.59	0.26	2.71		7.52	2.00 - 2.75
2.75 - 3.20	0.45	2 gl.gn.b.p. lyse mlk-fk. noe tett. Noen tynne årer relmykt matr. Kalksp.?		0.09	0.03	0.21		2.04	
3.20 - 3.45	0.25	biot.gn. mørk, grovk-mlk. Enkelte kv.linser. Spor hbl. Impr. <u>po</u>		0.02	0.36	0.16		12.63	
3.45 - 4.00	0.55	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn.som over.		0.03	0.03	0.04		3.09	
4.00 - 4.45	0.45	TAP							
4.45 - 4.90	0.45	biot.gn. mørk, grovk.-mlk. Enkelte kv.linser. Spor hbl. Sv. impr. <u>po</u> , <u>cp</u> .	35-40	0.03	0.21	0.22		14.51	
4.90 - 5.55	0.65	2 gl.gn.b.p. Rel.lys mlk.-fk. Noen få ekstra biot.rike partier Stedvis flekker hbl. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>po</u> , <u>cp</u>		1.00	0.84	3.69		12.09	
5.55 - 5.65	0.10	TAP							
5.65 - 6.30	0.65	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn. som over, men sv. impr.	45	0.15	0.33	0.82		6.72	
6.30 - 7.40	1.10	2 gl.gn.b.p. Rel. lys mlk. Noen pegm.bånd Stedvis flekker av hbl. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>po</u> .		0.61	0.30	2.78		6.45	

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.180

Borehull: 452

2

Dato : Jan. 1977
Koordinater : X: 925.389.6 Y: 44179
Retning : N
Helling/stigning : - 70°
Høyde : - 71.3
Lengde : 25.60

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
7.40 - 9.65	2.25	hbl.gn. Noe mørk mlk. Egentlig en hbl.gn. men flere steder gått over til nesten massiv sl-malm, med flekker av hbl. og kv.		0.44	1.25	6.69		15.85	7.40-8.50
				0.12	1.48	8.01		16.93	8.50-9.65
9.65 - 11.00	1.35	2 gl.gn.b.p. Rel. lys grovk.-mlk. Endel ekstra biot-rike bånd. Noe kv. Flekker hbl.	35-40	0.04	0.10	0.30		5.13	
11.00 - 11.30	0.30	2 gl.gn.b.p. Samme b.art som over, men impr. sl, py.		0.44	0.49	3.59		10.63	
11.30 - 11.80	0.50	musk.gn. Lys, mlk. Stedvis småflekker biot. hbl. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u>	45	0.60	0.10	2.72		9.25	
11.80 - 12.00	0.20	TAP							
12.00 - 13.55	1.55	hbl-biot.gn. noe lys, mlk-grovk. Flere ekstra biot-rike partier hbl. jevnt over i b.arten Endel kv.linser. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>cp</u> .	55-60	0.33	0.29	1.35		6.88	
13.55 - 13.90	0.35	2 gl.gn.b.p. Lys mlk-grovk. Spor gn. 1-3mm		0.03	0.04	0.15		2.78	
13.90 - 14.25	0.35	biot.gn. Noe mørk, mlk.-grovk. spor hbl. noe kv. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u>		0.19	0.18	1.64		6.75	
14.25 - 14.85	0.60	2 gl.gn.alm. lys, mlk.-fk. Noen få biot-rike flekker Spor gr. 1-3mm	55-60	0.03	0.03	0.11		1.53	
14.85 - 15.05	0.20	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. Noen kv.linser Kraftig impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>po</u> , noe <u>cp</u>		1.62	0.37	7.12		7.38	
15.05 - 15.20	0.15	TAP							
15.20 - 19.55	4.35	2 gl.gn.alm. lys, mlk. Noen få tynne (3-5cm) partier ekstra biot-rik. Her spor skarn. Enkelte kv.linser. Stedv. spor gr. 1-3mm	65-70	0.03	0.02	0.13		1.43	15.20-16.50
19.55 - 20.00	0.45	Pegm. Hvit grovk.							

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.180

Borehull: 452

3

Dato : Jan 1977
Koordinater : X:925.389.6, Y:44179
Retning : N
Helling/stigning : - 70°
Høyde : - 71.3
Lengde : 25.60

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
20.00 - 24.65	4.65	hbl.biot.gn. Noe lys, mlk. Enkelte ekstra biot. eller hbl.rike partier. Endel kv.linser. Spredte gr. 2-4 mm. Rel. jevnt impr. <u>py</u> , <u>sl</u> i forb. med hbl.rikt bånd på 24.20 - 24.25.	60-65						
24.65 - 25.60	0.95	2 gl.gn.b.d. Noe lys,mlk. Enkelte musk-rike bånd. BBNoen kv.pegm-striper. Rel. jevnt impr. <u>py</u>	40-45						

No 26/-1977
Kaare M. Heym

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44180

Borehull: 451

1

Dato: Jan. 77
Koordinater: X:925.416.7 Y:44.175.5
Retning: E
Helling/stigning: + 50°
Høyde: - 68.8
Lengde: 22.05

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	biot.-hbl.gn. Rel.mørk,mlk. Enkelte kv. linser.Spor gr.1-2 mm. Enkelte partier ren biot. Noe impr. <u>sl</u> , <u>py</u>	40°	0.13	0.49	1.37		11.60	
1.20 - 1.70	0.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. Noen kv.linser Spor impr.		0.31	0.12	0.33		3.36	
1.70 - 2.50	0.80	2 gl.gn.b.p. Noe lys mlk. Endel flekker hbl. Noen kv-linser. Meget godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> . Noe <u>gn</u> .	45°	4.20	0.19	9.84		8.24	
2.50 - 3.80	1.30	2 gl.gn.b.p. Rel.lys mlk. Endel flekker av hbl. Noe kv.Impr. <u>sl</u>		0.19	0.18	0.52		9.92	
3.80 - 4.25	0.45	biot.gn. mørk,mlk-grovk.Noe kv. iblandet.Impr. <u>py</u> spor <u>cp</u>		0.94	0.51	3.36		9.42	
4.25 - 6.15	1.90	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk. Noe kv. impr. <u>py</u>	45°	0.08	0.07	0.14		3.20	
6.15 - 10.45	4.30	hbl.gn. Noe mørk,mlk.-fk. hbl både som rene flekker og isprengt i b.arten. Også partier med vesentlig biot. Noen kv.linser.Jevnt ford. gr. 1-3 mm.Stedvis sv.impr. <u>po</u> , <u>py</u> .	30 - 40°						
				0.08	0.32	0.24		8.41	9.00 - 10.45
10.45 - 11.35	0.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. Rel.lite biot. Tenderer mot musk.gn. Et par små flekker hbl. Sv.impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>gn</u> .		0.39	0.15	0.41		2.19	
11.35 - 11.70	0.35	malm God <u>sl</u> -malm med noe kv., musk og grønn-gul skarn isprengt. Også <u>py</u> , <u>po</u> , <u>gn</u>		6.08	0.20	12.39		8.91	
11.70 - 12.20	0.50	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. spor hbl. Impr. <u>py</u> .		1.17	0.19	0.32		5.72	

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44180

Borehull: 451

2

Dato : Jan. 77
Koordinater : X:925.416.7 Y:44.175.5
Retning : E
Helling/stigning : + 50°
Høyde : - 68.8
Lengde : 22.05

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
12.20 - 12.75	0.55	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. Stedvis litt hbl. Godt impr. <u>sl</u> , noe <u>py</u> , <u>cp</u>	35-40	2.81	0.30	6.15		8.41	
12-75 - 14.15	1.40	2 gl.gn.b.d. Rel. lys, mlk. Endel hbl. isprengt. Tenderer stedvis mot hbl-biot.gn. Impr. <u>py</u> , spor <u>sl</u> .	45	0.25	0.22	0.61		5.72	
15.14 - 15.00	0.85	2 gl.gn.b.d. Samme b.art som over. Rel godt impr. <u>sl</u> noe <u>py</u> .		1.08	0.30	2.51		8.58	
15.00 - 22.05	7.05	hbl.gn. Rel. mørk mlk. Endel partier med vesentlig biot-gn. Jevnt besatt gr. 1-3 mm. Noen få 4-6 mm. Impr. <u>py</u> Noe mere amf.-preg helt mot stoffen.	45	0.08	0.07	0.21		7.57	15.00 - 16.50

No 14/1 1977
Hauke M. Heggen

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.180

Borehull: 450

1

Dato : Jan. 77
Koordinater : X:925.422.5 Y:44.177.6
Retning : N
Helling/stigning : + 60°
Høyde : - 68.3
Lengde : 21.10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk-fk. Stedvis spor gr. 1-3 mm.		0.07	0.04	0.19		2.38	
0.20 - 1.25	1.05	biot.gn. mørk/lys mlk-fk. Veksling mellom mørk biot og lys kv. En god del hbl. isprengt. Impr. po, py.	45-50	0.02	0.10	0.37		8.88	
1.25 - 1.75	0.50	2 gl.gn.b.p. Rel. lys,mlk. Endel flekker hbl. Spor po, py, sl.		0.31	0.31	0.75		7.03	
1.75 - 2.40	0.65	Musk.gr. Lys,mlk. Spor biot. små flekker hbl. sv. impr. py, sl.	45	0.38	0.23	1.22		5.38	
2.40 - 5.55	3.15	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. Enkelte tynne partier musk.gn. Stedvis flekker hbl. sv.impr.py,sl	45	0.20	0.20	0.57		7.60	2.40-4.00
				0.12	0.11	0.22		5.73	4.00-5.55
5.55 - 6.20	0.65	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fk. delvis noe tett.		0.02	0.02	0.06		1.22	
6.20 - 7.00	0.80	kv.sitt hvit, fk. tett, spor po,py, cp, sl,stedvis litt biot.		0.02	0.05	0.06		2.13	
7.00 - 10.80	3.80	2 gl.gn.b.d. Noe mørk mlk.-fk,noe tett Spor hbl. Tett først. Spredte gr. 1-3 mm.	30-40						
10.80 - 14.25	3.45	hbl.gn. Mørk, mlk.-fk. Stedvis ekstra biot-rike tynne striper. Rel.jevnt fordelt gulgrønn skarn. Jevnt besatt gr.2-4mm	30-40°						
14.25 - 16.05	1.80	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.-fk. Stedvis noen kv.linser. Jevnt besatt gr. 1-3 mm. Impr. py,spor sl.							
16.05 - 16.35	0.30	kv.linse hvit							
16.35 - 17.10	0.75	2 gl.gn.b.d. Samme 2 gl.gn. som over							

Lokalitet: Forseringsort
Profil 44.180

Borehull: 450

2

Dato : Jan. 77
Koordinater : X:925.422.5 Y:44.177.6
Retning : N
Helling/stigning : + 60°
Høyde : - 68.3
Lengde : 21.10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
17.10 - 17.60	0.50	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk-fk. Noen kv-linser. Sv. spor <u>py</u> , <u>sl</u> .	45°						
17.60 - 17.65	0.05	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn. som over Rel. godt impr. <u>py</u> , <u>sl</u> .							
17.65 - 21.10	2.34	2 gl.gn.b.p. Rel. lys, mlk-fk. Stedvis enkelte kv.linser. Et par små flekker hbl. Spor gr. 1-3 mm. Stedvis <u>sv</u> . <u>spor</u> <u>py</u> , <u>sl</u> .							
No 25/ - 1977 Kaar M. Hegrum									

Lokalitet: Tv.slag mot N
Profil

Borehull: 449

Dato : Jan. 1977
Koordinater : X 925.421 Y 44.177
Retning : N
Helling/stigning : - 70
Høyde : - 70.7
Lengde : 24.29 m

1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	3.40	hbl.gn. Noe lys,mlk-fk.Endel noe mere biot-rike partier Endel kv. Jevnt besatt gr. 1-3 mm. Sv.impr. py.	30-40						
3.40 - 3.65	0.25	biot.gn. Mørk/lys,mlk-fk. En del kv. som lyse striper i biot. Sv. impr. po,spor cp							
3.65 - 5.15	1.50	2 gl.gn.b.p. rel.lys,mlk-fk.Endel kv.-rike partier med lite biot. Spredte gr. 1-2 mm.		0.01	0.04	0.05		2.97	
5.15 - 6.60	1.45	biot.gn. mørk/lys,mlk.-fk. En hel del kv. som lyse striper i biot. Impr. po, noe cp. Spor sl.		0.03	0.39	0.29		14.37	
6.60 - 8.20	1.60	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn. som over. Flekk med grønn-gul skarn på 7.20 i forb.med kv.	60-70	0.00	0.03	0.04		2.31	
8.20 - 8.80	0.60	biot.gn. Samme biot.gn. som over. Svake spor. impr.		0.05	0.08	0.23		7.60	
8.80 - 10.50	1.70	2 gl.gn.b.p. Rel.lys mlk. Endel kv.linser Spor gn. 1-3 mm. Spor impr. 60°		0.03	0.06	0.08		3.96	
10.50 - 11.10	0.60	hbl.gn. Rel.lys,mlk. Endel biot. og kv.linser. Noe spredt gr. 1-2 mm. Godt impr. sl, py, po.		1.56	0.19	3.78		9.08	
11.10 - 13.05	1.95	hbl-biot.gn. Mørk/lys,mlk. Likner svært på tidl. biot.gn., men med endel hbl. Godt impr. po, cp, noe sl,		0.09	0.96	1.76		18.17	

Lokalitet: Tv.slag mot N
Profil

Borehull: 449

Dato: Jan. 1977
Koordinater: X 925.421 Y, 44.177
Retning: N
Helling/stigning: - 70
Høyde: - 70.7
Lengde: 24.29 m

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.05 - 13.35	0.30	kv.linse Hvit, flekker av biot. Impr. i sprekker <u>po</u> , <u>cp</u>		0.00	0.12	0.07		3.14	
13.35 - 13.70	0.35	hbl.-biot.gn. Samme hbl.-biot.gn. som over, Impr.		0.01	0.18	0.24		9.63	
13.70 - 13.90	0.20	kv.linse hvit.		0.06	0.04	0.24		1.56	
13.90 - 14.30	0.40	hbl.-biot.gn. Samme som tidligere men med noe mindre hbl. Impr.	45-50	0.18	0.52	0.48		12.75	
14.30 - 14.80	0.50	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk-fk. Enkelte ekstra biot-rike partier. Spor impr.		0.01	0.08	0.11		2.55	
14.80 - 18.80	4.00	hbl.biot.gn. Samme hbl.-biot.gn. som før, men med mye kraftigere impr. Spes av <u>sl</u> . Enkelte steder mass.striper malm.	40-45	0.56 2.61 1.27 1.20	0.29 0.65 0.37 0.81	3.22 3.77 3.78 7.25		6.94 10.34 10.06 15.73	14.80-15.80 15.80-16.80 16.80-17.80 17.80-18.80
18.80 - 21.70	2.90	2 gl.gn.b.p. Rel.lys, mlk-fk. Enkelte ste- der ekstra biot-rike partier Enkelte spredte flekker hbl. Noe impr. <u>sl</u> , <u>cp</u>	40-45	0.29 0.62	0.37 0.24	0.50 1.39		6.09 5.95	18.80-20.00 20.00-21.70
21.90 - 22.50	0.80	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk. Enkelte partier ekstra musk.rike. Noen kv.linser		0.20	0.07	0.56		2.13	
22.50 - 24.45	1.95	biot.gn. mørk, mlk. Endel flekker med (hbl.gn.) hbl. Stedvis <u>spor</u> skarn. Noe uregelmessig besatt gn. 1-2 mm. Impr. <u>py</u> .							

Åga, 28.1. 1977

Karsten M. Nyrø

Lokalitet: Linse 3
Profil 43.830

Borehull: 448

Dato Des. 76
Koordinater X: 925.405.4 Y: 43.833
Retning : N
Helling/stigning : + 45°
Høyde : - 80.7
Lengde : 49.80

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.00	5.00	2 gl.gn.b.p. lys,mellomk.-fk. Delvis noe tett. Enkelte tynne (max.5 cm). striper biot.gn. Disse delvis sv. impr. <u>po</u> , <u>py</u> .	55-60°	0.02	0.05	0.08		2.88	3.50 - 5.00
5.00 - 5.45	0.45	biot.gn. mørk,mlk.-grovk. En god del kv. og kv.linser.Stedvis spor hbl. Impr. <u>sl</u> , <u>po</u> , <u>py</u> , <u>cp</u>		0.18	0.30	1.03		8.67	
5.45 - 5.90	0.45	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn. som over Spredte gr. 1-3 mm.	80°	0.00	0.02	0.07		3.12	
5.90 - 6.60	0.70	biot.gn. Samme biot.gn. som over. Sv. impr.		0.05	0.10	0.25		9.50	
6.60 - 8.25	1.65	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn. som tidligere	60-70°	0.00	0.01	0.05		2.40	
8.25 - 13.50	5.25	biot.gn. Samme biot.gn.som tidligere Litt mere hbl. Impr. <u>sl</u> , <u>po</u> , <u>cp</u> .		0.00	0.15	0.16		11.50	8.25-10.00
				0.19	0.16	1.00		9.67	10.00-11.75
				0.06	0.17	0.63		8.00	11.75-13.50
13.50 - 13.90	0.40	gl.kv.sitt. lys,mlk. litt biot og musk.		0.02	0.04	0.17		1.92	
13.90 - 15.50	1.60	biot.gn. Samme biot.gn. som tidligere, men noe mere kv. og kv.sitt Rel. godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>po</u> .	60-70°	0.58	0.66	2.10		9.83	
15.50 - 15.90	0.40	2 gl.gn.alm. lys,mlk. Enkelte flekker hbl. Godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .		0.14	0.21	0.68		5.33	
15.90 - 20.00	4.10	hbl.gn. rel.lys,mlk. Tildels svært mye kalksp. i b.arten. Tildels meget godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>cp</u> , noe <u>gn</u> .		0.49	0.64	1.95		8.45	15.90-18.00
				0.34	1.23	4.44		9.97	18.00-20.00
20.00 - 20.35	0.35	2 gl.gn.alm. Lys mlk. Stedvis spor <u>sl</u> , <u>cp</u> .		0.04	0.06	0.05		2.38	
20.35 - 20.50	0.15	hbl.gn. Samme hbl.gn. som tidligere		0.43	1.22	1.06		9.97	
20.50 - 20.95	0.45	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn.alm. som over		0.04	0.03	0.08		2.30	

Lokalitet: Linse 3
Profil 43.830

Borehull: 448

2

Dato Des. 76
Koordinater X: 925.405.4 Y: 43.833
Retning N
Helling/stigning + 45°
Høyde - 80.7
Lengde 49.80

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
20.95 - 21.65	0.70	2 gl.gn.alm. lys,mlk. Enkelte biot-rike striper. Spor hbl. Meget godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>gn</u> .		2.59	0.36	4.14		6.92	
21.65 - 22.00	0.35	2 gl.gn.b.p. lys, mlk. Stedvis spor gn. 1-2 m. Svake spor impr.	70	0.11	0.06	0.24		3.00	
22.00 - 23.30	1.30	2 gl.gn.alm. lys,mlk. Noen kv-linser. Spor hbl. Impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>gn</u> .		0.93	0.18	2.17		4.57	
23.30 - 26.60	3.30	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk. Noen få kv.linser. Spredte gr. 1-2 mm. Svake spor impr.	75-80	0.04	0.03	0.08		2.15	23.30-25.00
26.60 -26.80	0.20	biot.gn. Mørk/lys mlk-grovk. Svært mye kv.iblandet som slirer spor hbl. Impr. <u>py</u> , litt <u>sl</u>		0.64	0.29	2.67		13.63	25.00-26.60
26.80 - 27.95	1.15	2 gl.gn.b.p. lys,mlk-grovk. Ujevnt ford. gn. 1-3 mm.	30-35	0.06	0.05	0.09		2.43	
27.95 - 28.35	0.40	malm Rel.mass. <u>sl</u> .-malm med <u>py</u> , <u>cp</u> , <u>po</u> , gn. Endel kv. og biot. iblandet.		3.64	1.59	7.68		11.65	
28.35 - 30.70	2.35	2 gl.gn.b.p. lys,mlk-fk. Stedvis noe tett Endel kv-linser.	35-40	0.03	0.02	0.04		2.16	
30.70 - 31.30	0.60	hbl.gn. Rel.lys,mlk. Endel biot., foruten hbl. og kv. Godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>po</u> .		0.23	0.46	3.66		9.13	
31.30 - 32.70	1.40	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk-fk. Noe tett.	30-35	0.02	0.02	0.06		2.04	
32.70 - 32.90	0.20	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk. Enkelte svært biot-rike partier. Impr. <u>sl</u> , <u>sp</u> , <u>py</u> .		0.04	0.15	2.35		5.43	
32.90 - 35.55	2.65	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk.-fk, noe tett. Stedvis spor gr. 1-2 mm.	30-35	0.04	0.02	0.12		2.09	32.90-34.50

Lokalitet: Linse 3
Profil 43.830

Borehull: 448

3

Dato Des. 76
Koordinater X: 925.405.4 Y: 43.833
Retning : N
Helling/stigning : + 45°
Høyde : - 80.7
Lengde : 49.80

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
35.55 - 35.90	0.35	Pegm.	lys, grovk.						
35.90 - 39.90	4.00	2 gl.gn.b.p.	Samme 2 gl.gn.b.p. som tidligere. Enkelte tynne pegm.-årer.						
39.90 - 40.55	0.65	pegm.	lys, grovk.						
40.55 - 49.90	9.35	2 gl.gn.b.p.	rel. lys, mlk-fk, delvis noe tett. Enkelte ekstra biot-rike striper. Spredte gr. 1-3 mm. litt skarn i forb. med kv.linser mot slutten av hullet.						

Kare M. Heggen
Åga, 26.1. 1977

Lokalitet: BILSTOLL
Profil ca. 42.950

Borehull: 443

Dato : 1976
Koordinater : 1540 Ø 190 S
Retning : S
Helling/stigning: - 40°
Høyde : - 45.5 m
Lengde : 89.52 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.85	1.85	hbl.gn. Noe mørk,mlk.rel.gr.rik 1-3 mm. Svak impr. <u>py</u> .	60°						
1.85 - 2.85	1.00	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,med lysere partier mlk. noe kv. spor hbl. med spredte gr. 1-2 mm, svak impr. <u>py</u> .	60- 65						
2.85 - 3.00	0.15	2 gl.gn.b.preg. Lys,mlk.middels impr. <u>sl,py</u>	60°						
3.00 - 4.45	1.45	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. delv.hbl. gr. 1-3 mm.førende svak impr. <u>py</u> .	50°						
4.45 - 5.75	1.30	hbl.gn. mlk.gr.rik 1-4 mm. delv. stichtolitisk.sv.impr. <u>py</u>	40°						
5.75 - 6.00	0.25	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk.spor hbl.diffuse,gr. 1-3 mm. sv.impr. <u>sl,py</u>	50°						
6.00 - 9.60	3.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,grov mlk.m.amf.bord ved 7.65 - 8.70.Sv.spor gr. 1-3 mm. Noen pegm.str. Sv. impr. <u>py</u> .	30° 60°						
9.60 - 12.40	2.80	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. med b.rikere band. noe spredte gr. 1-3 mm.	30°						
12.40 - 13.15	0.75	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. Spredte gr. 1-4 mm.	30°						
13.15 - 23.90	10.75	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk.med b.rikere partier med predt gr. 1-3 mm. Enkelte pegm.striper.	35° 40°						
23.90 - 28.00	4.10	2 gl.gn.alm. lys,mlk.med musk. rikere partier ved 25.55-25.65 grovk. musk.spredte gr. noe kv. 1-2 mm.Spor <u>sl</u> ved 24.35 og 25.30 spor hbl.	30°	0.00	0.01	0.05		2.84	23.50 - 24.35
				0.09	0.06	0.42		2.84	24.35 - 25.30
			50°	0.00	0.02	0.05		1.54	25.30 - 26.30
				0.00	0.01	0.03		1.82	26.30 - 28.00

Lokalitet:

Borehull: 443

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
28.00 - 29.20	1.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,grovk.-mlk. enkelte hbl.str.,noe kv.str. spor gr. Svak impr. <u>sl</u> , spor <u>gn</u> . Impr. <u>py</u> .	40° 50°	0.28	0.23	1.68		5.92	28-29.2
29.20 - 29.65	0.45	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,spor hbl.Noie kv. God impr. <u>sl</u> , <u>py</u> , <u>po</u>	40°	0.28	0.45	1.68		20.84	29.20-29.65
29.65 - 30.65	1.00	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.noie kv. spor hbl. svak impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .	45°	0.45	0.16	0.88		4.74	29.65-30.65
30.65 - 32.00	1.35	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.noie hbl.impr. <u>sl</u> , <u>py</u>	50° 55°	0.21	0.36	1.01		9.27	30.65-32.0
32.00 - 34.80	2.80	hbl.gn. Mørk,med noe lysere parti 2 gl.gn.b.d. m/k. Spredte gr. 1-3 mm. Svak spor <u>py</u> .	65°	0.02	0.11	0.09		5.45	32.0-33.0
34.80 - 38.05	3.25	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk. med spor hbl. skarn, spredte gr. str. fra 35.70 - 35.80 med impr. <u>py</u> spor <u>gn</u> ?	60°						
38.05 - 40.10	2.05	hbl.gn. Mørk,grov-mlk.Vekslende med pegm.str. med gr. 1-3 mm. Impr. <u>py</u> , <u>po</u>	50° 60°						
40.10 - 40.50	0.40	2 gl.gn.b.d. Noe mørk mlk. med gr. 1-3 mm. impr. <u>py</u> .	60°						
40.50 - 40.80	0.30	Peg. Lys,mlk. kv.rik							
40.80 - 41.40	0.60	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk. Peg.str. Spor hbl.spredte gr. 1-2 mm.	60°						
41.40 - 42.70	1.30	hbl.gn. Noe mørk,mlk.med gr. 1-3mm svake impr. <u>py</u> .	60°						
42.70 - 48.40	5.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.-grovk. med små part.musk.d.peg.str.spor hbl gr.1-3mm.fra 46.50-46-60 spor <u>sl</u> ,impr. <u>py</u>	60° 50°						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 443

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
48.40 - 50.10	1.70	hbl.gn. Rel.mørk,mlk.-grovk. delv. amf.preg.gr.rik.parti 1-3mm delvis kv.pegm.Str. impr. <u>py</u>	65°						
50.10 - 50.80	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.spredt hbl. Gr. 0.5-2mm. impr. <u>py</u> .	55°						
50.80 - 52.10	1.30	pegm. lys med mørke part.2 gl.gn.b.d fink.kv.sit.lignende.Spor <u>py</u> , <u>po</u>							
52.10 - 54.20	2.10	hbl.-biot.gn. mørk,mlk. rel.massiv pegm. band dm brede re. gr.rik 0.5-1 mm.Sv.spor <u>py</u>	55°						
54.20 - 54.95	0.75	hbl.gn. mørk,mlk.pegm.str. massiv rel.gr.rik 0.5-5 mm. svak impr. <u>py</u>							
54.95 - 58.90	3.95	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk. dm brede pegm.band spor hbl. gr.impr. <u>py</u> .	60°						
58.90 - 60.20	1.30	hbl.gn. Rel.mørk,mlk.rel.mass. noe gr. 1-3 mm. spor svak <u>py</u> .	60°						
60.20 - 62.50	1.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. rel.mass. Enkelte pegm.band.visse part. med spor hbl. impr. <u>py</u>	60°						
62.50 - 64.60	1.90	hbl.gn. mørk,mlk.med pegm.str. re.gr. rik.1-3 mm. svak impr. <u>py</u>	60°						
64.60 - 79.20	14.60	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,med lysere part. rel. kv.rik.med enkelte pegm.band Spredte gr. svak impr. <u>py</u>	50° 60°						
79.20 - 87.00	7.80	hbl.gn. Rel.mørk mlk-fk.rel mass.spr. pegm.band visse kv.rikere part. tild. gr.rik 1-5 mm sv. spor <u>py</u>	50°						

Lokalitet:

Borehull: 443

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

4.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
87.00 - 89.40	2.40	2 gl.gn.b.d. Rel.lys med mørkere part. mlk.-fk. dm tykke partier med hbl.gn. middels gr., rik 0.5 - 2 mm	50° 60°						
30/1 1978 STELLAN BURMAN									

Lokalitet: Bilstoll
 Profil ca. 42.950

Borehull: 440

Dato : 1976
 Koordinator : 1540 Ø 190 S
 Retning : S
 Helling/stigning: - 60°
 Høyde : - 45 m
 Lengde : 26.89 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.05	2.05	Hbl.gn. Noe lys,mlk.Spredt små gr. 0.5-2 mm,små soner med 2 gl. gn.b.d. rel.massiv,noe kv. striper. svake impr. py.		0.04	0.03	0.05		7.29	1.00-2.05
2.05 - 4.30	2.25	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.Enkelte smale part. musk.rik pegm.str. Rel. rik på hbl. god impr. sl, gn, py.	50	1.57	0.27	2.93		7.71	2.05-3.00
4.30 - 5.75	1.45	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,grov mlk-mlk.Pegm. str. spor hbl. spor gr. 1-2 mm. Sv. impr. sl, gn, py.	40 50	1.89	0.19	1.05		8.36	3.00-4.30
5.75 - 5.80	0.05	Pegm. Rel. grov		0.14	0.16	0.83		7.29	
5.80 - 6.20	0.40	2 gl.gn.b.p. Lys,finmlk. spor gr.0.5-2mm	50						
6.20 - 6.35	0.15	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk.str. biot.rik. God impr. Sl, Gn, Pt		0.57	0.10	1.34		3.43	
6.35 - 10.00	3.65	2 gl.gn.b.p. Lys finmlk. noe kv.pegm.str. biot.rike str. Enkelte musk. gn. soner.		0.03	0.01	0.06		2.36	6.35-7.35
		Kasse 2. 10.- 20 m Savnes							
20.00 - 20.35	0.35	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.med musk.rik str. noe kv. god impr. av sl, gn, py.	60	0.88	0.24	3.45		9.86	
20.35 - 22.20	1.85	2 gl.gn.b.p. Lys,fink.-mlk.Kv.rik pegm. str. biot.rike band.Spor gr. 0.5 - 2 mm.Spor Sl,Py	60 70	0.07	0.06	0.19		2.14	
22.20 - 23.50	1.30	biot.gn. Noe mørk,mlk. enkelte kv. str. spor gr. 1-3 mm. Hbl. str. Svak impr. Sl,Gn. Py.		0.08	0.25	0.71		8.78	
23.50 - 27.35	3.85	hbl.gn. Noe mørk,grovmlk.-mlk. Noe kv.rel.rik.gr.Sv.impr. py	50	0.02	0.03	0.07		7.71	23.50-24.50

Lokalitet: **BILSTOLL**
PROFIL ca. 42.950

Borehull: 439

Dato: **1976**
 Koordinator: **540 Ø 1905**
 Retning: **Lødd**
 Helling/stigning: **÷ 90°**
 Høyde: **÷ 45m**
 Lengde: **51,65**

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	Hbl.biot.gn. Noe mørk,mlk. Rel.jevnt ford. gr. 2-4 mm.Enkelte biot-rike str. Sv.impr. py		0.00	0.05	0.22		6.43	0 - 1.20
1.20 - 1.35	0.15	Hbl.gn. Noe lys,mlk.musk-rik. str. God impr. og str. <u>sl</u> , <u>cp</u> , <u>py</u> , <u>gn</u> .		1.46	0.68	4.60		11.14	1.20 - 1.35
1.35 - 2.05	0.70	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.hbl.rik str. Rel.rik på gr.2-4mm. Spor <u>py</u> .							
2.05 - 2.10	0.05	Pegm. Spor <u>py</u> .		0.07	0.39	0.17		6.64	1.35 - 2.10
2.10 - 2.70	0.60	biot.gn. Noe mørk,mlk.musk.rike part. 30 Spor hbl. Pegm.str. God 60 impr. + str. <u>sl</u> , <u>gn</u> , <u>cp</u> , <u>py</u> Spor gr.		0.87	0.39	1.99		10.60	2.10 - 2.70
2.70 - 2.75	0.05	hbl.gn. Mørk,fink.							
2.75 - 3.10	0.35	2 gl.gn.b.p. Lys mlk med noe musk. Spor <u>sl</u> , <u>gn</u> , <u>py</u> .	75 80	0.19	0.12	0.32		6.00	2.70 - 3.10
3.10 - 3.70	0.60	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.noie musk.rike str. spor gr. fattig impr. <u>sl</u> , <u>gn</u> , <u>cp</u> , <u>py</u> .	80 85	0.09	0.14	0.67		10.29	3.10 - 3.70
3.70 - 3.75	0.05	Pegm. Kv.rik med spor <u>sl</u> , <u>gn</u> .							
3.75 - 4.20	0.45	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. små kornet biot. spor <u>sl</u> .	75	0.09	0.06	0.20		3.64	3.70 - 4.20
4.20 - 4.40	0.20	malm Mørk,mlk-grovk.-mlk. biot.rike striper med str. av <u>sl</u> , impr. <u>cp</u> , <u>py</u> .		0.55	0.41	3.25		8.36	4.20 - 4.40
4.40 - 7.10	2.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. Noe veksling med part. 2 gl.gn.b.p. lmk. Pegm.band med sp.små gr. 1-3 mm.	80 85	0.04	0.03	0.13		0.19	4.40 - 5.40

Lokalitet:

Borehull: 439

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
7.10 - 7.25	0.25	Pegm. Grovk.							
7.35 - 10.20	2.95	2 gl.gn.b.p. Lys, fink-mlk, veksling med små band med musk gn. spor gr.	80 85						
10.20 - 11.00	0.70	2 gl.gn.b.d. Lys, fink.-mlk. Noe kv.str. spor små gr.	80						
11.00 - 11.45	0.45	Musk gn. Lys fink. Noe kv.							
11.45 - 14.05	2.60	2 gl.gn.alm. Lys finmlk-mlk. veksling med 2 gl.gn.b.d. gr.rik 2-4 mm enk. kv.striper.	80 85	0.07	0.04	0.12		2.27	13.00-14.05
14.05 - 14.25	0.20	2 gl.gn.b.d. Mørk mlk.biotstr. spor hbl. god impr. lys sl spor py.		1.14	0.14	4.50		8.14	14.05-14.25
14.25 - 16.50	2.25	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. Noe kv.rik. Noe str. 2 gl.gn.b.d. spor små gr. spor py.		0.07	0.02	0.22		2.14	14.25-15.25
				0.09	0.06	0.23		2.59	15.25-16.50
16.50 - 17.25	0.75	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. med biot.rik band. noe kv. spor gr. spor hbl. god impr. sl, gn, cp, py.		0.56	0.53	1.85		8.36	16.50-17.25
17.25 - 17.95	0.70	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk. spor små gr. svak impr. sl, cp.	85	0.07	0.09	0.23		2.36	17.25-17.95
17.95 - 18.60	0.65	biot.hbl.gn. Noe mørk, mlk. delvis gr.rik 2-4 mm. Svak impr. lys sl, py	85	0.38	0.14	1.54		6.86	17.95-18.60
18.60 - 20.70	2.10	hbl.gn. Noe mørk, mlk. kv.str. delvis rik på gr. 2-4 mm. Svak impr. py.	75 80	0.05	0.03	0.14		6.64	18.60-19.60
20.70 - 26.00	5.30	biot.hbl.gn. Noe mørk, mlk. veksling med hbl.gn.soner. Gr.rik 1-3mm, Enkelte partier med 2 gl.gn. b.p. Spor hbl. spor py.							

Lokalitet:

Borehull: 439

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
26.00 - 32.75	6.75	hbl.gn. Mørk,mlk. noe pegm.str.rike på gr.2-4 31.00 - 32.75 i grov hbl.gn. Noe stichtolitisk med stor gr. 3-10 mm.							
32.75 - 35.55	2.80	2 gl.gn.b.p. Noe mørk,mlk.Kv-str. rel.rik på små gr. 1-3 mm.Noë hbl. svak impr. py.							
35.55 - 39.95	4.40	hbl.gn. Noe mørk,finmlk-mlk. Kv.-striper spor kalkspatt	85						
39.95 - 43.85	3.90	2 gl.gn.b.p. Rel.lys,mlk.pegm.str. sprett gr. 2-4 mm. svak biot.	85-90						
43.85 - 47.25	3.40	hbl.gn. Noe mørk,mlk.med pegm.str. 47.85 kalkspattstr. rik på gr. 2-6 mm.							
47.25 - 48.80	1.55	2 gl.gn.b.d. Lys,fink. noe kv. rik på gr. 1-3 mm.	80						
48.80 - 50.00	1.20	amf. Mørk,mlk. pegm.soner. rik på gr. 2-5 mm.							
Kasse 6 savnes.									
26.1. 1978									
Kjell Stenmark									

DB6 BROWN 62

Lokalitet: Fageråsen

Borehull: 7802

1.

Dato : -78
 Koordinater : X: 925.264,8 Y: 41.053,8
 Retning : - 90°
 Helling/stigning: Lodd
 Høyde : + 62,6
 Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	g/g	% Fe	
0.00 - 2.20	2.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.tildels hbl.-førende. Spr. gr. 0,5-2mm impr. Py.	70° 80°						
2.20 - 4.90	2.70	Hbl.gn. Mørk,mlk.vekslende m/cm-dm-brede 2 gl.gn.b.d.band Spr. gr. 0,5-2 mm. Impr.Py	75°						
4.90 - 11.70	6.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslede m/cm-dm-brede hbl.gn.band. Spr. gr. 0,5-2 mm. Impr.Py	75°						
11.70 - 14.00	2.30	Hbl.gn. Mørk,mlk.stichtolitisk, gr rik. 1-5 mm. Svak impr. Py	30° 70°						
14.00 - 15.30	1.30	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslede m/2 gl.gn.b.d. Spr. gr. 0,5-2 mm Impr. Py.	70° 80°						
15.30 - 16.00	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. Spr. gr. 0,5-2 mm. Impr.Py	60°						
16.00 - 19.95	3.95	" Rel.mørk,mlk. vekslede m/cm-dm-brede lyse musk.d. band. spr. gr. 0,5-2 mm. ved 19.50 spor Sl,Gn,. Impr. Py.	70°						
19.95 - 20.30	0.35	Pegn.							
20.30 - 22.10	1.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslede m/1-3 dm-brede biot.gn.band. tildels m/hbl. impr. Py, Po fortrinnsvis i biot.gn. spor gr.	70°	0.04	0.10	0.28	2.6		
22.10 - 24.40	2.30	" Lys, mlk. impr. Py.	75	0.12	0.09	0.26	2.9		

Lokalitet:

Borehull: 7802

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser				Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	g-Pb/S	
24.40 - 27.90	3.50	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ 1-3 dm.brede biot.d.band. fortrinnsvis m/impr. <u>Sl,Gn</u> Py, tildels spor Po.	75°	0,40	0,24	1,00	11,6	
27.90 - 28.50	0.60	Musk.gn. Lys,mlk.-god impr. Py.	70°	0,07	0,04	0,18	3,6	
28.50 - 43.25	14.75	2 gl.gn.alm. lys,mlk. vekslende m/spr. dm-brede biot.d. band. fortrinnsvis m/enkelte gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py	60°	0,04	0,03	0,13	1,6	21,50-60,50
43.25 - 43.80	0.55	Tap.						
43.80 - 61.50	17.70	2 gl.gn.alm. lys,mlk.vekslende m/spr. dm-brede biot.d.band. fortrinnsvis m/enkelte gr. 0,5-3 mm. Svak impr. Py.	60°					
61.50 - 63.30	1.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/biot.gn(sk) band m/spor hbl. Fra 62.20-62.30 spor sl. Impr. Py.	60°	0,15	0,18	0,64	5,3	
63.30 - 64.50	1.20	Biot.gn.(sk). Mørk,grovk-mlk. spor hbl. (impr. <u>Sl,Cp,Py,Po</u>	60°	0,36	0,32	1,03	12,7	
64.50 - 70.30	5.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende spr. gr. 0,5-3 mm. Impr. Py	60°	0,03	0,02	0,10	1,9	
70.30 - 70.70	0.40	Pegm.						
70.70 - 77.50	6.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende, vekslende m/cm-dm-brede hbl.gn. og pegm.band. spr. gr. 0,5-3 mm. Impr. Py	60°					

Lokalitet:

Borehull: 7802

3.

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
77.50 - 78.10	0.60	Hbl.gn. Mørk,mlk-grovk. spr. gr. 1-5 mm.	60°						
78.10 - 79.10	1.00	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spor gr. rel. massiv.							
79.10 - 81.50	2.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/cm-dm-brede 2 gl.gn.alm hbl.gn. og pegm.band. spr. gr. 1-5 mm.							
81.50 - 82.00	0.50	hbl.gn. Mørk,mlk. gr.rik 1-10 mm.							
26/2 1980 H. Pantdalsli									

Lokalitet: Fageråsen

Dato - 78

Koordinater : Y: 41.058 X: 925.268

Borehull: 7803

Retning : S

Helling/stigning: - 65°

Høyde : 60 m.o.h.

Lengde : 104.10 m

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	Jord							
1.50 - 3.00	1.50	Biot.gn. Mørk, grovk.-mlk, spor hbl. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>	50°						
3.00 - 4.70	1.70	Biot.-hbl.gn. Mørk, grovk.-mlk, spr. gr. 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>	50°						
4.70 - 21.70	17.00	Hbl.gn. Mørk, mlk. vekslende m/ cm-dm brede biot.gn.band. enkelte små pegm.band. Spr. gr. tildels rik 0.5 - 3 mm impr. <u>Py</u>	40° 60°						
21.70 - 23.75	2.05	2 gl.gn.b.d. Rel. mørk, mlk. hbl.førende vekslende m/cm-dm-brede pegm.band. spr. gr. 0,5 - 2 mm. impr. <u>Py</u>	60°						
23.75 - 24.00	0.25	TAP							
24.00 - 24.70	0.70	2 gl.gn.b.d. rel.lys, mlk. vekslende m/band musk gn. spor gr. impr. <u>Py</u>	50°						
24.70 - 27.20	2.50	Musk gn. Lys, mlk. vekslende m/små parti 2 gl.gn.b.d. fortrinnsvis m/hbl. og spr. gr. 0,5-2 mm. Impr. <u>Py</u>	50°						
27.20 - 27.35	0.15	Biot.sk. Mørk, grovk. impr. <u>Py</u>							
27.35 - 29.60	2.25	Musk gn. Lys, mlk-grovk. vekslende m/rel. små b.d. parti. ved 27.50 5 cm kompakt <u>Py</u> band. Impr. <u>Py</u>	60°						

Lokalitet:

Borehull: 7803

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29.60 - 30.90	1.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. spor gr. impr. Py.	55 ⁰					
30.90 - 31.70	0.80	Biot.gn.	Mørk, mlk-grovk, gr.førende 1-3 mm. Impr. Py	55 ⁰					
31.70 - 32.80	1.10	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. svakt ondulerende, spor gr. Impr. Py.	50 ⁰					
32.80 - 33.60	0.80	Musk.gn.	Lys,mlk-grovk. impr. Py.	50 ⁰					
33.60 - 34.40	0.80	Biot.gn.	Mørk,mlk-grovk. impr. Py	50 ⁰					
34.40 - 36.80	2.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk-grovk. spr. dm.brede pegm.band. impr. Py.	50 ⁰					
36.80 - 36.95	0.15	Musk.gn.	Lys, mlk, med spor <u>Gn,Sl,</u> <u>Py</u>	50 ⁰					
36.95 - 37.20	0.25	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. impr. <u>Sl,</u> <u>Gn, Py.</u>	50 ⁰					
37.20 - 37.75	0.55	Musk.gn.	Lys,mlk. vekslende med b.d. striper og band, spor gr., svak impr. Py	80 ⁰					
37.75 - 38.00	0.25	Pegm.	god impr. Py						
38.00 - 38.70	0.70	Musk.gn.	Lys,mlk. vekslende med dm-brede band 2 gl.gn.b.d. Spor gr. impr. Py	60 ⁰ 70 ⁰					
38.70 - 42.00	3.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk,mlk. enkelte spr. gr. 1-3 mm.	60 ⁰					
42.00 - 44.70	2.70	2 gl.gn.alm.	Rel.lys,mlk. spr. gr. 1-4 mm.	60 ⁰					

Lokalitet:

Borehull: 7803

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	9/10 Ag	% Fe	
44.70 - 45.10	0.40	Hbl.gn. Mørk,grovk. spor gr.							
45.10 - 62.20	17.10	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende med cm-dm-brede band 2 gl.gn.b.d. Spr. gr. 1-3 mm.	60°						
62.20 - 64.60	2.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. Spr. gr. 0,5-2mm	60°						
64.60 - 65.20	0.60	Biot.gn. Mørk,grovk-mlk. spor gr.							
65.20 - 66.10	0.90	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spr. gr. 0,5-2 mm	50°						
66.10 - 67.20	1.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende med parti 2 gl.gn.alm. spr. gr. 1-3 mm.	60°						
67.20 - 71.00	3.80	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spr. gr. 0,5-2 mm.	60°						
71.00 - 71.40	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk. vekslende m/ små parti kv. og biot.rike band. spor gr.		0,05	0,06	0,21	2,3		
71.40 - 71.70	0.30	Biot.gn. Mørk,mlk-grovk. spor hbl. gr. Impr. Py, Po	60°				0,9		
71.70 - 71.95	0.25	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. spor gr.		0,01	0,02	0,06	4,09		
71.95 - 75.75	3.80	Biot.gn(sk). Mørk,grovk. vekslende m/spr. pegm.band, hbl.førende tild. rik. God impr. Py,Po,spor Cp	60°	0,01	0,01	0,04	0,1		
				0,01	0,11	0,06	0,8		71.95-73.00
				0,01	0,16	0,08	2,1		73.00-75.75
75.75 - 77.15	1.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk, spr. gr. 0,5-3mm		0,01	0,04	0,07	1,5		
77.15 - 78.15	1.00	" Rel.mørk,mlk. tildels hbl.- førende, spr. gr. 0,5-3 mm impr. Py	60°	0,02	0,05	0,05	1,5		
78.15 - 79.05	0.90	" Rel.mørk,mlk-grovk. veksl. m/biot.rike hbl.førende parti,god impr. Sl,Cp,Py	50° 60°	1,81	0,38	5,40	32,8		

Lokalitet:

Borehull: 7803

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

4.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	g/g Ag	% Fe	
79.05 - 80.00	0.95	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 0,5-3 mm. impr. Py	50°	0.15	0.05	0.05	3.5		
80.00 - 80.75	0.75	hbl.gn. Mørk,mlk. veksl. m/stiper og band pegm. tildels gr. rik 1-3 mm. Svak impr. Py	50°	0.01	0.02	0.02	1.3		
80.75 - 80.90	0.15	Pegm.		0.02	0.02	0.01	1.6		
80.90 - 82.50	1.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. Spr. gr. 1-3 mm. impr. Py	50° 60°	0.00	0.04	0.03	2.8		
82.50 - 82.70	0.20	Pegm.		0.10	0.06	0.61	3.0		
82.70 - 83.10	0.40	Musk.gn. Lys,mlk. vekslende m/dm-brede biot.rike band, fortrinnsvis m/impr. Sl,Cp,Py	60°	0.63	0.23	2.83	17.8		
83.10 - 83.35	0.25	Pegm. Spor Gn		0.24	0.06	0.62	5.2		
83.35 - 84.00	0.65	Musk,gn. Lys,mlk.-grovk. veksl. m/biot.rike perti, svak impr. Sl,Gn,Cp,Py	60°	0.20	0.12	0.61	5.7		
84.00 - 84.50	0.50	Pegm. Spor Gn.		0.21	0.04	0.21	5.5		
84.50 - 84.65	0.15	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl. god impr. Sl,Gn,Cp,Py		1.15	0.10	8.56	28.4		
84.65 - 86.40	1.75	" Rel.mørk,mlk. tildels hbl. førende, spr. gr. 1-3 mm. impr. Py. Fra 85.80-85.90 impr. Sl	60°	0.14	0.07	0.72	5.3		
86.40 - 87.20	0.80	Biot.hbl.gn. Mørk,grovk.ondulerende, spor gr., impr. Sl,Gn,Cp,Py		0.46	0.08	2.02	14.2		
87.20 - 92.00	4.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl-førende, veksl. m/cm-dm-brede band pegm. Spr.gr. 1-3 mm. Impr. Py	60°	0.03	0.03	0.10	12.7		87.20-89.60
				0.06	0.03	0.20	0.5		89.60-92.00

Lokalitet:

Borehull: 7803

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

5.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	g/g Ag	% Fe	
92.00 - 93.15	1.15	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. tildels hbl og skarnførende, veksl. m/biot.sk. og pegm.band. svak impr. og striper <u>Sl</u> , <u>Gn</u> , <u>Cp</u> , <u>Py</u>	50 ^o 60 ^o	0.28	0.06	1.36	3.8		
93.15 - 94.40	1.25	" Rel.mørk,mlk. vekslende m/ små pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>	50 ^o	0.00	0.03	0.06	0.6		
94.40 - 94.70	0.30	Hbl.gn. mørk,mlk. gr.førende 1-3mm		0.00	0.02	0.05	0.0		
94.70 - 102.95	8.25	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk. hbl.førende, veksl. m 1-3 dm brede hbl.gn.band spr. gr. 1-3 mm. Impr. <u>Py</u>	60 ^o	0.00	0.02	0.01	0.0		94.70-96.70
				0.00	0.02	0.02	0.0		96.70-98.70
				0.00	0.02	0.02	0.2		98.70-100.70
				0.00	0.02	0.01	0.0		100.70-102.70
102.95 - 103.65	0.70	Pegm.							
103.65 - 103.75	0.10	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk. spr. gr. 1-3 mm.							
103.75 - 103.85	0.10	Musk.gn. Lys,mlk-grovk.							
103.85 - 104.00	0.15	2 gl.gn.alm. lys,mlk.	60 ^o						
104.00 - 104.10	0.10	2 gl.gn.b.d. Mørk,mlk. spr. gr. 0,5-2 mm							

21/2 1980

H. Pantdalsli

Lokalitet: Fageråsen

Dato : - 78

Koordinater : Y: 40.828 X: 925.250

Borehull: 7804

Retning : Lodd

Helling/stigning:

Høyde : 42 m.o.h.

Lengde : 75,0 m

i.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	$\frac{2}{1}$ S	% Fe	
0.00 - 16.65	16.65	Jord							
16.65 - 23.70	7.05	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/cm-dm-brede biot.d. band. spor gr. impr. Py	40° 60°	0.07 0.06 0.07	0.04 0.02 0.06	0.30 0.22 0.26	2.9 2.5 2.2		16.65-18.70 18.70-20.70 20.70-22.70
23.70 - 24.60	0.90	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. impr. Sl,Cp, Gn,Py,Po.		0.10	0.15	0.34	6.7		22.70-23.70
24.60 - 26.90	2.30	" Rel.mørk,mlk. spor hbl. og gr. knuse-sone fra 26.00-26.20 ved 25.40 spor Sl. Impr. Py	60° 70°	0.09	0.15	0.22	6.0		
26.90 - 28.55	1.65	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. 0,5-3mm Svak impr. Py	60°	0.01	0.02	0.02	0.7		
28.55 - 30.50	1.95	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl-førende. spr. gr. 0,5-2 mm impr. Py.	70°	0.01	0.03	0.04	0.6		
30.50 - 30.65	0.15	Pegm.							
30.65 - 33.70	3.05	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/enkelte små striper og band hbl.gn. Spr. gr. 1-3 mm. Impr. Py	70°						
33.70 - 34.40	0.70	Biot.gn.(sk.) mørk,grøvk. tildels m/spr. gr. 1-3 mm, impr.Py,Po	70°						
34.70 - 42.00	7.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/små striper og bånd hbl. gn. og pegm. spr. gr.1-3mm impr. Py.	70°						
42.00 - 43.50	1.50	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-5 mm.	70°						
43.50 - 45.50	2.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/enkelte små pegm.band. Spr.gr. 0,5-2 mm.	70°						

Lokalitet:

Borehull: 7804

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
45.50 - 45.75	0,25	Hbl.gn. Mørk,mlk.spr. gr. 1-3 mm.							
45.75 - 46.50	0.75	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/ små parti hbl.gn. fortrinns- vis m/gr. 1-3 mm.							
46.50 - 46.75	0.25	Pegm.							
46.75 - 47.30	0.55	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende spor gr. impr. Py	70°						
47.30 - 50.20	2.90	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-3mm	50,60°						
50.20 - 51.35	1.15	Pegm.							
51.35 - 52.40	1.05	Hbl.gn. Mørk,mlk.spr.gr. 1-3 mm.							
52.40 - 53.20	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl.- førende, spr. gr. 0,5-2mm	60°						
53.20 - 54.30	1.10	Pegm.							
54.30 - 54.70	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl, Spr. gr. 0,5 - 2 mm							
54.70 - 61.30	6.60	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/cm-dm- brede 2 gl.gn.b.d. band. Spr. gr. 1-3 mm.	60°						
61.30 - 61.65	0.35	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr.gr. 0,5-2mm							
61.65 - 69.50	7.85	Hbl.gn. Mørk,mlk. veksl. m/cm-dm- brede 2 gl.gn.b.d. band. Spr. gr. tildels rik 0,5-3 mm	60° 70°						
69.50 - 69.80	0.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-fink. spr.gr. 0,5-1 mm.							
69.80 - 75.00	5.20	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr. tildels rik 1-3 mm.	60° 70°						

Lokalitet:

Borehull: 7805

Dato

Koordinater :

Retning : S

Helling/stigning: 55°

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 9.35	9.35	Jord						7.4 Ag.	
9.35 - 30.10	20.75	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.vekslende m/cm-dm-brede biot.d. og pegm.band. Band som er biot.d. fører fortrinnsvis spr. gr. 0,5-2 mm. Svak impr. Py.	50°	0.02	0.01	0.03		1.3	25.00-27.00
			60°	0.05	0.03	0.08		0.3	27.00-28.50
				0.01	0.01	0.01		0.5	28.50-30.10
30.10 - 31.80	1.70	" " Rel.lys,mlk. impr. Py m/ svake spor Sl.	55°	0.09	0.18	0.22		4.5	
31.80 - 32.60	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. impr. Sl,Gn, Py,Po		0.80	0.32	2.86		18.7	
32.60 - 33.90	1.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk. spr. gr.0,5-2 mm. tildels m/cm-dm-brede Py,Po,førende band.	55°	0.05	0.07	0.09		1.5	
33.90 - 34.90	1.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr. gr. 0,5-2mm. tildels m/impr. Py,Po.	55°	0.02	0.03	0.05		1.8	
34.90 - 44.15	9.75	" " Rel.mørk,mlk. hbl.førende, Spr. gr. 1-3 mm. Svak impr. Py.	55°	0.02	0.03	0.05		2.1	34.90-37.00
44.15 - 44.75	0.60	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. tildels rik 1-3 mm.		0.01	0.02	0.04		0.9	
44.75 - 45.10	0.35	Biot.gn.(sk) Mørk,grovk-mlk. hbl.førende impr. Sl,Cp,Py,Po		0.44	0.27	2.70		11.9	
45.10 - 45.20	0.10	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.spor gr. svak impr. Py		0.35	0.02	0.72		3.8	

Lokalitet:

Borehull: 7805

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
45.20 - 45.90	0.70	Hbl.gn. Mørk, mlk, veksl. m/2 gl.gn.bd. spr.gr. tildels rik 1-3 mm.	60°	0.02	0.03	0.12		1.8	
45.90 - 47.10	1.20	Biot.-hbl.gn. Mørk, mlk-grovk. veksl. spr gr. 1-3 mm i hbl.gn. Tildels dm.brede musk.d. band. biot.gn. tildels som sk(råtaen) Ondulerende. Impr. Sl, Cp, Py, Po fortr.vis i biot.rike parti.		0.23	0.15	0.79		6.9	
47.10 - 47.30	0.20	Pegm.		0.02	0.03	0.10		1.7	
47.30 - 54.30	7.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. tildels hbl. førende (hbl.gn.) spr. gr. 1-3 mm. impr. Py Fra 48.20-48.30 spor Sl.		0.09	0.06	0.19		3.1	47.30-48.30
54.30 - 54.70	0.40	Hbl.gn. Mørk, mlk. spr. gr. 1-3mm.							
54.70 - 56.60	1.90	Biot.hbl.gn. Mørk, mlk-grovk. gr.rik 1-3 mm. Impr. Py							
56.60 - 58.10	1.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. spor hbl. Spr. gr. 0,5-2 mm. Impr. Py	55°						
58.10 - 58.50	0.40	Musk.gn. Lys, mlk. svak impr. Py							
58.50 - 58.90	0.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. veksl. m/em-dm-brede musk.gn.brede band, hbl. og gr i 2 gl. gn.b.d. Impr. Py.	55°						
58.90 - 61.65	2.75	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk. Spr.gr. 0,5-2 mm	55° 50°						
61.65 - 61.80	0.15	Hbl.gn. Mørk, mlk. spr. gr. 1-5 mm.							

Lokalitet:

Borehull: 7805

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
61.80 - 62.10	0.30	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spr.gr. 0,5-2 mm.	50°						
62.10 - 62.70	0.60	Hbl.gn. Mørk,mlk.spr.gr. 1-3 mm							
62.70 - 63.10	0.40	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ cm-brede hbl.gn.band. Spr. gr. 0,5-3 mm.							
63.10 - 72.10	9.00	Hbl.gn. Mørk,mlk. vekslende m/spr. dm-brede pegm.band. Spr. gr. 1-3 mm.	45°						
72.10 - 74.10	2.00	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. vekslende m/hbl.førende parti, Svak impr. Py. Spr. gr. 1-3 mm.	50°						
74.10 - 74.40	0.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spr. gr. 0,4- 2 mm. Stichtolitisk.							
74.40 - 80.50	6.10	Hbl.gn. Mørk,mlk. veksl. m/spr. dm-brede pegm.band. Gr.førende 1-3 mm.	50°						
80.50 - 81.70	1.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. vekslende m/ biot.d. striper og band. Spr. gr. 1-3 mm.							
81.70 - 83.00	1.30	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr.gr. 1-5 mm	50°						
83.00 - 83.25	0.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. spor hbl., spr. gr. 0,5-1 mm.Impr.Py							
27/2 1980 Holger Pantdalsli									

Lokalitet:

Borehull: 7806

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

1.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	Jord							
0.50 - 1.40	0.90	2 gl.gn.alm. lys,mlk.-fink. kv.rik svak impr. Py	65°						
1.40 - 4.55	3.15	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl. og gr. (1-3 mm) førende, vekslende m/1-3 dm brede band 2 gl. gn. alm. Svak impr. Py	50° 60°						
4.55 - 8.30	3.75	" " Rel.mørk,mlk. hbl. og gr. (0,5-2 mm) førende Svak impr. Py.	40° 70°						
8.30 - 9.10	0.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-grovk. tildels b.d. Spr. diffuse gr.1-5mm svak impr. Py	70°						
9.10 - 11.70	2.60	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende, tildels hbl.gn. gr.rik 1-3 mm. impr. Py	70°						
11.70 - 13.25	1.55	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk-grovk. veksl. m/cm-dm-brede biot.hbl.gn. band. spr. gr. 1-3 mm. svak impr. Py.	70°						
13.25 - 22.70	9.35	Hbl.gn. Mørk,mlk.spr.gr. tildels rik 1-3 mm. Svak impr. Py	70°						
22.70 - 23.00	0.30	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk. spr. gr.1-4mm							
23.00 - 29.40	6.40	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk. Hbl.- førende tildels hbl.gn., Spr. gr. tildels rik 1-3 mm. Impr. Py.	70°						
29.40 - 30.60	1.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.spr.hbl. Spr. gr.1-3mm, impr. Py	70°						

Lokalitet:

Borehull: 7806

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
30.60 - 30.80	0.20	Pegm.							
30.80 - 35.20	4.40	Hbl.gn. Mørk,mlk.vekslende m/rel. små parti 2 gl.gn.hbl. førende, Spr. gr.1-3 mm tildels rik, svak impr. Py	70° 80°						
35.20 - 38.70	3.50	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk-grovk.veksl. m/ cm-dm-brede band hbl. gn. biot(slk) og pegm. Impr. Py,Po.	70° 80°						
38.70 - 67.90	29.20	2 gl.gn.alm. Rel.lys,mlk.vekslende m/ cm-dm-brede band 2 gl.gn. b.d. m/tildels spor hbl. Spr. gr.0,5-5 mm. fortr. i 2 gl.gn.b.d. Svak impr.Py	60° 80°						
67.90 - 80.00	12.10	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. tildels hbl.førende. spr.gr. 1-3mm Svak impr. Py.	70° 80°						
80.00 - 82.40	2.40	Hbl.gn. Mørk,mlk. spr. gr.1-5 mm	80°						
82.40 - 89.60	7.20	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk. hbl.førende veks. m/dm brede pegm. band. spr. gr. 1-3 mm Impr. Py	70° 80°						
89.60 - 89.85	0.25	Musk.gn. Lys,mlk. svak impr. Py							
89.85 - 91.10	1.25	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk,mlk.tildels hbl. førende, spr.gr. 0,5-2 mm Impr. Py	80°						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 7806

3.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
91.10 - 95.10	4.00	Hbl.gn. Mørk, mlk. spr. gr. 1-3 mm Svak impr. Py	80°						
95.10 - 99.80	4.70	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. hbl.førende vekslende m/cm-dm-brede band hbl.gn. spr. gr. til dels rik 1-3 mm. Svak impr. Py.	70°						
99.80 - 100.60	0.80	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk-fink. veksl. m/cm-brede band 2 gl.gn.bd m/hbl. spr. gr. 0.5-2 mm.							
100.60 - 110.10	9.50	Hbl.gn. Mørk, mlk-fink. gr.førende 0,5-2 mm.	70° 80°						
110.10 - 111.80	1.70	2 gl.gn.alm. Rel.lys, mlk. vekslende m/ cm-dm-brede band 2 gl.gn. b.d. Spr. gr. 0,5-2 mm.	70° 80°						
111.80 - 112.40	0.60	Hbl.gn. Mørk, mlk. vekslende m/cm- dm-brede band 2 gl.gn.alm og pegm. spr.gr. 1-3 mm	70° 80°						
112.40 - 113.20	0.80	2 gl.gn.b.d. Rel.mørk, mlk. hbl.førende, spr. gr. 1-3 mm. impr. Py							
113.20 - 113.70	0.50	Hbl.gn. Mørk, mlk. gr.førende 1-3mm							
21.5. 1980 H. Pantdalsli									

Lokalitet: Fageråsen

Borehull: 7710

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Nov. 77.

X: 925.273 Y: 41.252

: -90°

: -90°

:

: 113.70 m

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	Overdekket.							
1.50 - 2.30	0.80	Musk.gn. Lys,mlk. sv.impr. Py.							
2.30 - 7.70	5.40	2 gl.gn.b.p. Noe mørk,mlk.Rel.hom.Enkelte kv.str.,rik på gr.1-3 mm. Spor amf. rel.jevnt impr.Py		0.30	0.21	0.09		5.85	7.00-7.70
7.70 - 7.80	0.10	Pegm. Kv.rik med god impr. Gn,Cp, Py.		1.06	0.37	0.03		5.40	
7.80 - 9.60	1.80	2 gl.gn.b.p. Noe mørk,mlk.noe kv.partier med stichtolitisk preg. rik på difus gr. 1-4 mm.hom. spor amf. sv. impr. Py		0.25	0.20	0.03		5.63	7.80-8.50
9.60 - 9.87	0.27	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk.kv.rik.Rik på små gr. 1-3 mm.Spor amf. sv. impr. Gn.Py.		1.42	0.14	0.06		4.87	
9.87 - 13.95	4.08	2 gl.gn.b.p. Mørk,mlk-grovk.mlk. Smale soner med hbl.gn. Hbl. rel. jevnt ford. smal kv.rand med spor Gn, Py rik på gr. 1-4 mm.		0.04	0.04	0.03		6.20	9.87-11.00
13.95 - 14.60	0.65	2 gl.gn.b.d. Lys,mlk.Stichtolitisk.Svak spor Py.							
14.60 - 18.70	4.10	hbl.gn. Mlk-grov mlk.No.vekslende med 2 gl.gn.b.d. Rik på gr. 1-3 mm. i øvrigt spredte spor gr. sv. spor Py.							
18.70 - 22.50	3.80	2 gl.gn.alm. Noe mørk,mlk.med biot.rike partier.spor hbl. noe gr.	70						
22.50 - 22.70	0.20	Pegm.							
22.70 - 27.00	4.30	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.Musk-rike partier og biot.d.partier rik på gr. i 1 øvrigt spor gr. sv.spor Py.	70 80						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 7710

side 2.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
27.00 - 50.60	23.60	hbl.gn. Mørk, mlk. til grovmlk. Noe veksling med biot.gn. med hbl. og rel. rik på gr. 1-3 mm. Noe kv. band svak impr. <u>Py</u> spor <u>cl</u>	70 80						
50.60 - 53.90	3.20	2 gl.gn.b.d. Mørk, mlk-grovmlk. band grov musk. Smale pegm.str.rel rik på små diffuse gr. spr. hbl.	80						
53.90 - 54.20	0.30	Pegm. Med smale musk.band.							
54.20 - 54.60	0.40	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. spor <u>cl</u>	85						
54.60 - 55.00	0.40	Pegm. grov med musk.band.							
55.00 - 56.65	1.65	2 gl.gn.alm. Lys, mlk.svak impr. <u>py</u> 56.65 stripe med spor <u>sl</u> , <u>gn</u>	85						
56.65 - 58.00	1.35	2 gl.gn.b.d. Noe mørk mlk.-grov mlk. Musk.rikere partier rik på små gr. 1-3 mm.	35						
58.00 - 59.90	1.90	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. svak impr. <u>py</u>	85						
59.90 - 61.90	2.00	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk.pegm.str. spor hbl. rel. massiv.							
61.90 - 63.30	1.40	2 gl.gn.alm. Lys, mlk.biot.rike striper Svak impr. <u>sl</u> , <u>gn</u> , <u>py</u> .	50 80	0.09	0.20	0.40		5.31	
63.30 - 63.50	0.20	Pegm. rel. grov, spor <u>Py</u> .		0.01	0.05	0.10		1.48	
63.50 - 63.65	0.15	2 gl.gn.alm. Lys, mlk.spor små gr. 1-2 mm svak impr. <u>sl</u> , <u>cp</u> , <u>py</u> .		0.47	0.59	0.16		7.08	
63.65 - 65.45	1.80	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. str. musk. rel. jevnt små gr. 1-2 mm Svak impr. <u>py</u> , <u>po</u> , spor hbl.	50 80	0.07	0.13	0.21		6.79	

Lokalitet:

Borehull: 7710

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
65.45 - 69.40	3.95	2 gl.gn.alm. Lys,fin-mlk-mlk. Noe kv. biot.str. svak impr. sl, gn cp, py, po.		0.09	0.21	0.24		5.46	65.45-67.00
				0.29	0.20	0.50			67.00-69.40
69.40 - 70.70	1.30	2 gl.gn.b.p. Lys,fin-mlk-mlk. biot-rike str. rel. massiv spor skarn svak impr. Py, po.							
70.70 - 70.80	0.10	Amf. Skarn amf. jevnt fordelt skarn. spor gr.	60						
70.80 - 78.35	7.55	2 gl.gn.b.d. Lys,med mørkere band biot-rik mlk. noe kv. rel. små kornig biot.enkelte gr.rik striper 2-5 mm. massiv spor Py, po							
78.35 - 82.30	3.95	2 gl.gn.b.d. Lys,grov-mlk.mlk. noe biot. striper. endel kv. enkelte gr. i biot.str. 1-3 mm. rel. massiv.	70 80						
82.30 - 82.75	0.45	hbl.gn. Noe lys,grovk. kv.rik.Rel jevnt ford. skarn.spor gr. 2-3 mm. spor py.							
82.75 - 83.85	1.05	Pegm. Lys,fink.med biot.rik str. med spor gr. en del oppknust med spor cl.							
83.85 - 85.00	1.15	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk.kv.rik med biot. striper.spredte gr. 2-5 mm Spor skarn. Rel. massiv.							
85.00 - 87.35	2.35	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk.smale peg.str. Rel.jevnt fordelt gr. 2-4 mm. Spor skarn.	80						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 7710

Helling/stigning:

Høyde :

Side 4.

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
87.35 - 90.85	3.50	2 gl.gn.b.d.	Lys,grov-mlk.-mlk. noe kv. biot.stripe,rel.jevnt ford. gr. 2-5 mm. spor hbl.						
90.85 - 91.40	0.55	2 gl.gn.alm.	Lys,mlk.Noë kvarts. Spor gr. rel. massiv.						
91.40 - 92.75	1.35	biot.gn.	Noë mørk,mlk.spor hbl.og cl. D.	80					
92.75 - 95.00	2.25	2 gl.gn.b.d.	Noë mørk,grov-mlk.-mlk. Enkelte biot.str. og smale part. med 2 gl.gn.alm. s st. smale pegm.str. spor hbl. svake spor sl, gn,py	80					
95.00 - 96.30	1.30	hbl.gn.	Noë mørk,grov mlk-mlk. med grovk. biot. noe kv.striper noe små gr. 2-4 mm. svak impr. sl,gn,cp,py,po.	75 80					
96.30 - 97.75	1.45	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk.grovk. biot.str. enkelte striper hbl. spor cl spredte små gr. 1-2 mm. svak impr. Py. 97.60 kalk-spattfylt sprekke.						
97.75 - 99.20	1.45	2 gl.gn.b.d.	Noë mørk,mlk. spor hbl. stripe av pegm.	75 80					
99.20 - 102.50	3.30	hbl.gn.	Noë mørk,mlk. partier rik på gr. 2-4 mm. rel.jevn impr. py.						
102.50 - 105.40	2.90	hbl.biot.gn.	Noë mørk,grov-mlk-mlk.med hbl.gn.band. noe biot.rik stripe.Spredt små gr. rel. massiv.Porøst utseende. Noë peg.str. spor D.						

Lokalitet:

Borehull: 7710

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Side 5.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
105.40 - 106.50	1.10	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, grov-mlk-mlk. pegm.str. god spor hbl. spredt gr. 2-4 mm. Spor D. Svak impr. <u>Py.</u>	70						
106.50 - 107.20	0.70	Pegm. Lys, grovk.med smale gl.band. med spor hbl.							
107.20 - 109.05	1.85	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, grovmlk-mlk.Enkelte striper hbl.rik.Pegm.str. biot.rik band.							
109.05 - 109.10	0.10	hbl.gn. Lys, fink.rik på gr. 2-4 mm. Stichtolitisk.							
109.10 - 112.10	3.00	hbl.gn. Mørk, fink.med enkelte band med amf. pegm.str. rik på gr. 2-4 mm.	75						
112.10 - 113.70	1.60	2 gl.gn.b.d. Lys, fink.rel.massiv.Noegm.striper.							

25/1 1978

Kjell Stenmark.

Lokalitet:

Borehull: 7707

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

1470 Nov 1977
 22° V, 2325 X: 925.390 Y: 41.300 Tatt fra
 Kartet
 S
 -90° -55°
 +63 39 m
 45 m 45 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.90		Overdekke							
4.90 - 15.85	10.95	2 gl.gn.b.d. Lys, til meget lys, fin mlk. til mlk. Enkelte lysere part. rel. massiv. kv. rik, enkelte små biot. str. Pegm. str. 11.35 - 11.50. Rel. jevnt ford. gr. 1-5 mm.	40 50						
15.85 - 18.70	2.85	2 gl.gn.b.d. Lys, fink. rel. homogen med stichtolitisk preg. Jevnt fordelt granat 1-5 mm.							
18.70 - 20.05	1.35	Biot.gn. Lys, med enkelte mørkere part. mlk. enkelte part. kv. rik. Rik på gr. 1-3 mm.	55						
20.05 - 21.45	2.35	2 gl.gn.b.d. Lys, med mørkere partier .mlk. med gl. rik str. en del kv. rel. jevnt ford. gr. 1-3 mm.							
21.45 - 21.85	0.40	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. med rik .str. av biot. med jevnt ford. Skarn. En del gr. 1-3 mm.	65 70						
21.85 - 21.90	0.05	Pegm.							
21.90 - 22.40	0.50	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. biot. str. amf. ved 21.98. Rel. jevnt gr. 1-3 mm.	70						
22.40 - 25.25	2.85	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. med enkelte biot. str. partier rikt på musk. enkelte små gr. 1-2 mm. spor Py, sl		0.04	0.07	0.16		2.14	24.00-25.25
25.25 - 25.30	0.05	malm Rel. komp. Py, sl med hbl.		0.07	0.18	5.56		11.25	
25.30 - 25.55	0.25	Musk.gn. Lys, mlk. en del kv. spor sl, Py.	60	0.08	0.26	1.60		3.38	
25.55 - 26.40	0.85	malm Str. malm. med hbl. biot. kv. sl, gn, Py, Cp.		0.84	0.35	4.82		10.80	

Lokalitet:

Borehull: 7707

Side 2

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
26.40 - 27.10	0.70	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.spor <u>Py, po</u>	45						
27.10 - 27.20	0.10	Pegm. Spor <u>py</u>							
27.20 - 27.55	0.35	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.		0.05	0.13	0.21		3.83	26.40-27.55
27.55 - 28.25	0.70	malm Kompakt <u>sl,cp,py,po</u> grovk. biot. litt hbl.		0.0	0.75	2.34		37.58	
28.25 - 32.10	3.85	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.rik på biot. partier med hbl.gn. i øvrigt spor hbl. rik på gr. svak impr. <u>py</u> .		0.0	0.10	0.11		7.88	28.25-30.00
32.10 - 32.85	0.75	hbl.gn. Noe mørk,mlk.noe kv. spr. små gr. 1-3 biot.rike part. sv. impr. <u>py</u> .	50	0.02	0.03	0.04		7.80	30.00-32.10
32.85 - 33.40	0.55	2 gl.gn.alm. Noe lys,mlk. musk.rike part. med spor hbl. sv.impr. <u>sl,py</u>	50	0.04	0.12	0.05		7.88	
33.40 - 33.55	0.15	Musk.gn. Noe mørk,mlk.med spor hbl. noe kv. god impr. <u>sl,gn,cp,py</u>		0.18	0.12	0.22		6.75	
33.55 - 33.75	0.20	2 gl.gn.alm. Lys,mlk.noe kv.spor hbl. sv. impr. <u>py</u> .	50	2.22	0.48	3.35		8.55	
33.75 - 35.50	1.75	2 gl.gn.alm. Noe mørk,mlk.med biot.rike partier.lysere part. 2 gl. gn.alm. delvis spor hbl. svak impr. <u>sl,gn,cp,py</u>		0.96	0.40	1.12		7.42	33.55-34.50
35.50 - 35.85	0.35	2 gl.gn.b.d. Mlk.Stichtolotisk gr.rik 1-4 mm. en del hbl.		0.10	0.07	0.15			34.50-35.50
35.85 - 36.10	0.25	hbl.gn. Noe mørk,mlk.med en del biot. homogen, spor <u>Py</u>							
36.10 - 37.15	1.05	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.endel hbl. rik på små gr. 1-2 mm.hom.rel. jevn impr. <u>py</u>							

Lokalitet:

Borehull: 7707

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning :
Høyde :
Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
37.15 - 38.15	1.00	hbl.gn.	Noe mørk, mlk. noe kv. spr. små gr. 1-3 mm. svak impr <u>py.</u>						
38.15 - 38.60	0.45	2 gl.gn.b.d.	Mørk, mlk. en del hbl. rik på gr. 1-4 mm						
38.60 - 45.00	6.40	amf.	Mørk, mlk. litt grov, mlk. noe kv. striper og hbl. spor gr. Rel. jevnt ford. skarn.						

23/1 1978

Kjell Stenmark

Lokalitet: Fageråsen
PROFIL 41.300

Borehull: 7706

Dato: OKT. 1977
Koordinater: X: 925.390 Y: 41.300
Retning: :
Helling/stigning: $\pm 90^\circ$
Hoyde: 39 m
Lengde: 26.77 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.30	4.30	Overdekket							
4.20 - 10.35	6.05	2 gl.gn.alm. Lys, fink. med enkelte smale biot.. band. Rel. jevnt ford. gr. 7-3 mm. m m funn Py Stripe ved 8.80 m.	80						
10.35 - 18.50	8.15	2 gl.gn.b.p. mlk. enkelt. part. rikere på biot og gr. Rel. jevnt ford. gr. 1-4 mm. 16.10 - 16.20 kv.	75 80						
18.50 - 18.75	0.25	malm Meget god impr. <u>Sl, Cp, Py</u> i hbl. förande ba.	75	0.05	0.06	0.08		3.06	17.00 - 18.50
18.75 - 19.05	0.50	2 gl.gn.alm. Lys, fink. kv.rik med spor gr. God impr. <u>Py</u> .		1.03	2.27	8.35		20.99	
19.05 - 19.10	0.05	malm Rik impr. i grovk. biot. sk. spor hbl.	85	0.09	0.06	0.11		3.94	
19.10 - 19.90	0.80	biot.gn. mlk. til grovk. kv.rik spor hbl. og gr. 1-3 mm sv. impr. <u>py</u> .	85	0.06	0.87	8.52		18.21	
19.90 - 20.05	0.15	biot.gn. mlk. sterk impr. av <u>Py</u> , <u>Cp</u> , <u>Sl</u> , <u>Gn</u>		0.04	0.24	0.14		7.28	
20.05 - 20.60	0.55	2 gl.gn.b.p. mlk. noe lys, spor hbl. God impr. <u>Sl</u> , <u>Py</u> , <u>Gn</u> .	80	2.76	1.27	6.25		11.78	
20.60 - 21.35	0.75	Malm Kompr. malm med kv. biot. hbl.		1.56	0.57	1.98		7.71	
21.35 - 22.65	1.30	2 gl.gn.alm. mlk. lys med noen part. enk. kv.str. <u>Sl</u> -stripe 21.73 ekstr. spor <u>Sl</u> , <u>Cp</u>		3.83	0.18	25.39		17.14	
				0.37	0.26	1.25		4.33	

Lokalitet:

Borehull: 7706

2.

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
22.65 - 23.75	1.85	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. rel. jevnt ford. gr. 1-3 mm. Spor av hbl. svak impr. av <u>Py</u> Peg. ved 23.75 - 24.20	65	0.05	0.05	0.17		5.46	
23.75 - 24.20	0.45	Pegm.							
24.20 - 25.35	0.85	Biot.gn. mlk. med spor musk. og hbl. Endel gr. 1-4 mm. God impr. <u>Py</u>	75 80						
25.35 - 25.55	0.20	Pegmatitt Svakhetsone. Kalkspatt og hbl. i kjerne ca: 10 cm. Pegm. på begge sider.							
22.55 - 28.00	5.45	Biot.gn. mlk. spor musk. med endel gr. 1-3 mm. Endel hbl. jevnt svak impr. <u>py</u> .	70						
28.00 - 30.00	2.00	amf. mlk. spredte små gr. 1-3 mm rel. jevnt ford. skarn.							

18.1. 1978
Kjell Stenmark

Lokalitet: Mofjellet
Profil 44.410

Borehull: 7604

1.

Dato : Nov. 1976
Koordinater : X:925.482.5 Y:44.398.2
Retning : S
Helling/stigning: - 85
Høyde : 189.7 m
Lengde : 273.45 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.85	0.85	Jordboring							
0.85 - 1.10	0.25	Hbl.gn. Rel.lys,mlk-fk. Noe biot. Sv. impr. <u>py</u> .							
1.10 - 4.60	3.50	2 gl.gn.alm. Lys, mlk. Enkelte tynne biot- rike partier.Noen kv.linser Stedvis spor <u>py</u> , <u>po</u> , <u>sl</u> . 1.60-1.65:Sv. impr. <u>sl</u> , <u>py</u> .	70°						
4.60 - 11.70	7.10	2 gl.gn.b.d./ Noe mørk,mlk-fk. Gradvise biot.gn. overganger mellom 2 gl.gn.b.d. og nesten ren biot.gn. Stedvis flekker av hbl. Enkelte kv.linser. Jevnt impr. <u>py</u> . Stedvis spor gr. 1-2 mm.	70°						
11.70 - 18.30	6.60	hbl.gn. Noe mørk, mlk.-fk. Mye biot. Hbl. også som rel. grove korn. Endel kv.linser.Endel gr.1-3mm Enkelte steder tydelig stichto- litisk. Jevnt impr. <u>py</u> .							
18.30 - 19.00	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel. lys-fk. Tett. Et par striper 2-3 cm. amf. <u>Meget</u> tett besatt gr. 1-3 mm. Sv. impr. <u>py</u> .							
19.00 - 24.00	5.00	hbl.gn. Samme hbl.gn. som over. Stedvis gr. 5-10 mm.	70-80						
24.00 - 60.60	36.60	Hbl.gn. Hbl.gn.som over, men endel mørkere p.g.a. øket biot-innhold.mlk-fk. Kan minne noe om amf. Endel kv.- striper.Gul-grønn skarn,både i forb. med kv, og finford. i b-arten. Noe ujevnt besatt gr.1-3mm.Delvis impr. <u>py</u> Enkelte str.3-5cm.amf på							

Lokalitet: Mofjellet
Profil 44.410

Borehull: 7604

2

Dato : Nov. 1976
Koordinater : X:925.482.5 Y:44.398.2
Retning : S
Helling/stigning: - 85
Høyde : 189.7 m
Lengde : 273.45 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
60.60 - 61.30	0.70	2 gl.gn.b.d. Rel.lys,mlk-fk.Enkelte ekstra biot-rike striper. Sv.impr.py	70°						
61.30 - 62.00	0.70	2 gl.gn.alm. Lys,-mlk. tett. Spredte gr. 1-2 mm.							
62.00 - 64.30	2.30	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk-fk. Enkelte kv-linser.Sv. impr. py.							
64.30 - 87.05	22.75	2 gl.gn.alm. Lys,fk-mlk.tett.Stedvis tynne ekstra biotrike bånd. Enkelte kv.linser							
87.05 - 87.25	0.20	amf. Mørk,fk.,tett.Mye gr.2-4 mm.							
87.25 - 88.40	1.15	2 gl.gn.alm. Samme karakteristikk som over En del ekstra biot-rike str. med gr. 2-4 mm.							
88.40 - 88.70	0.30	amf. Samme amf. som over.	60-70°						
88.70 - 92.00	3.30	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn.som tidligere							
92.00 - 95.65	3.65	2 gl.gn.b.d. Noe lys,mlk-fk. Noe tett. Jevnt ford.gr.2-4 mm.							
95.65 - 97.10	1.45	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn. som tidligere.							
97.10 - 97.40	0.30	biot.gn. Mørk,mlk. Noen få tynne str. 2 gl.gn.alm. Tett besatt gr. 1-3 mm.							
97.40 - 103.90	6.50	2 gl.gn.alm. Samme 2 gl.gn.alm. som tidl. Stedvis ujevnt besatt gr. 1-2 mm.							
103.90 - 104.80	0.90	2 gl.gn.b.p. Rel. lys, mlk. Enkelte kv.-linser Rel.jevnt besatt gr. 1-3 mm.							
104.80 - 104.90	0.10	amf. Mørk, gk-mlk. tett. Tett besatt gr. 2-4 mm.							

Lokalitet: Mofjellet
Profil 44.410

Borehull: 7604

Dato : Nov. 1976
Koordinater : X:925.482.5 Y:44.398.2
Retning : S
Helling/stigning: - 85
Høyde : 189.7 m
Lengde : 273.45 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
104.90 - 105.20	0.30	2 gl.gn.alm.	Lys,fk.-mlk.tett. Noe kv.-linser.Rel. jevnt besatt gr. 1-2 mm.						
105.20 - 105.80	0.60	amf.	Mørk,fk.-mlk. Tett. Meget oppsprukket. Ser nesten ut som om det har vært en indre sprengning, eller trykkavlastn. av oppsprukket b.art under stort trykk. Tett besatt gr. 2-4 mm.						
105.80 - 108.20	2.40	2 gl.gn.b.p.	Noe lys, mlk-fk. Enkelte kv.-linser.Rel.jevnt besatt gr. 1-3 mm.						
108.20 - 108.35	0.15	pegm.							
108.35 - 111.05	2.70	2 gl.gn.b.p.	Rel. lys,mlk-fk. Enkelte ekstra biot-rike partier. Flekk med hbl+skarn på 109.90. Stedvis gr. 1-2 mm.						
111.05 - 112.35	1.30	2 gl.gn.b.d.	Noe mørkere,mlk. Endel kv.-linser. Spredte gr. 1-2 mm.						
112.35 - 112.95	0.60	2 gl.gn.b.p.	Rel. lys mlk-fk.Noel tett. Stedvis spor gr. 1-2 mm.						
112.95 - 113.00	0.05	pegm.	grovk.						
113.00 - 116.35	3.35	2 gl.gn.b.p.	Rel. lys,mlk-fk. Noe tett. Enkelte ekstra biot-rike partier.Stedvis spor gr.1-2mm						
116.35 - 116.60	0.25	Pegm.	grovk.						
116.60 - 130.40	13.80	2 gl.gn.b.p.	Samme 2 gl.gn.b.p. som over. Enkelte smale,10-15 cm partier med 2 gl.gn.b.d.						

Lokalitet: Mofjellet
Profil 44.410

Borehull: 7604

Dato : Nov. 1976
Koordinater : X:925.482.5 Y:44.398.2
Retning : S
Helling/stigning: - 85
Høyde : 189.7 m
Lengde : 273.45 m

4

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
130.40 - 136.65	6.25	amf.	Mørk, fk.-mlk. Noe tett. Virker noe "uren", med en del biot. iblandet. En del kv.linser og "utsvettinger". Tett besatt gr. 2-10 mm.						
136.65 - 140.00	3.35	2 gl.gn.b.p.	Rel. lys, mlk-fk. Endel ekstra biot-rike partier. Enkelte Skarn-flekke i forb. med kv.linser. Rel. jevnt besatt gr. 1-3 mm.						
140.00 - 140.60	0.60	2 gl.gn.b.d.	Noe mørk, fk.-mlk. Noe tett. kvartsrik. Jevnt besatt gr. 1-3 mm.						
140.60 - 143.00	2.40	2 gl.gn.b.p.	Lys, mlk-fk. Tett. Endel kv.-linser. Rel. tett besatt gr. 1-2 mm.						
143.00 - 152.00	9.00	2 gl.gn.b.d.	Rel. lys, fk.-mlk. Tett. Endel partier 15-20 mm som er b.p. Endel kv.linser. Tett besatt gr. 1-3 mm. markant stichtolitisk						
152.00 - 171.00	19.00	2 gl.gn.b.d.	Litt mørkere. Fk.-mlk. tett. Endel kv.-pegm.-linser. Enkelte flekker gul-grønn skarn i med kv. Tett besatt gr. 1-3 mm.						60-70°
171.00 - 172.20	1.20	2 gl.gn.b.d.	Samme b.art som over, men granatene er her markant stichtolitisk.						
172.20 - 174.10	1.90	kv-gr-b.a.	Bergart bestående av omtrent bare kv. og gr. 1-3 mm. Litt biot. fk. tett.						

Lokalitet: Høfjellet
Profil 44.410

Borehull: 7604

Dato : Nov. 1976
Koordinater : X:925.482.5 Y:44.398.2
Retning : S
Helling/stigning: - 85
Høyde : 189.7 m
Lengde : 273.45 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
174.10 - 174.25	0.15	gr.b.a.	B.art bestående av ca. 80% gr Litt kv. og biot.						
174.25 - 174.55	0.30	2 gl.gn.b.d.	Rel.mørk mlk. kv.rik.Enkelte ekstra biot-rike partier. Tett besatt gr. 1-3 mm.						
174.55 - 179.70	5.15	2 gl.gn.b.p.	Rel. lys,fk-mlk. Noe tett. Endel ekstra biot-rike partier. Noen kv.linser, og spor av grønn-gul skarn i forb. med disse. Tett besatt gr. 1-3 mm.						
179.70 - 179.95	0.25	biot.gn.	Mørk,mlk. Meget tett besatt gr. 1-2 mm.						
179.95 - 184.85	4.90	2 gl.gn.b.p.	Rel lys,mlk-fk. Endel partier på 10-15 cm med biot.gn. Stedvis litt kalksp. og spor skarn i forb. med kv.linser Rel. jevnt besatt gr. 1-2 mm.	60-70					
184.85 - 185.35	0.50	amf.	Mørk,fk.No. tett.Spor skarn i forb. med kv.stripe.Jevnt besatt gr. 0.5-1 m.						
185.35 - 185.50	0.15	2 gl.gn.b.p.	Samme 2 gl.gn.b.p. som over.						
185.50 - 186.15	0.65	amf.	Mørk,mlk-fk.Tett spor skarn i forb. med kv-striper.Tett besatt gr. 1-3 mm.Spor po.						
186.15 - 188.05	1.90	Biot/hbl.gn.	Rel.lys mlk. Et par flekker (5-10 cm) amf. Denne er tett besatt gr. 2-4 mm. Markant stichtolitisk. Hbl.gn. spor gr. 1-2 mm. Jevnt impr. py.	60-70					

Lokalitet: Mofjellet
Profil 44.410

Borehull: 7604

Dato : Nov. 1976
Koordinater : X:925.482.5, Y:44.398.2
Retning : S
Helling/stigning: - 85
Høyde : 189.7 m
Lengde : 273.45 m

6

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
188.05 - 188.45	0.45	hbl.gn.	Mørk,mlk.Ekstra hbl.-rikt parti.Noe biot. Endel kv-linser, og gul-grønn skarn i forb. med disse.Ujevnt besatt gr. 1-3 mm.						
188.45 - 189.80	1.35	Biot/hbl.gn.	Samme biot/hbl.gn. som over						
188.90 - 190.40	0.50	2 gl.gn.b.p.	Lys,fk-mlk.Tett. Jevnt besatt gr. 1-2 mm.						
190.40 - 190.90	0.50	amf.	Mørk,mlk-fk. Spor hbl. Jevnt fordelt gulgrønn skarn. Noe biot. Ujevnt fordelt gr. 1-3 mm.						
190.90 - 193.25	2.35	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk-fk. noe tett. Enkelte ekstra biot-rike partier.Stedvis spor skarn i forb.med kv.linser.Jevnt besatt gr. 2-5 mm.						
193.25 - 193.80	0.55	amf.	Mørk mlk.-fk. noe tett. Jevnt ford. gr. 2-4 mm.						
193.80 - 197.80	4.00	2 gl.gn.b.p.	Lys,mlk-fk. noe tett. Stedvis ekstra biot-rike partier. Et par flekker amf. Rel. tett besatt gr. 2-4 mm, delvis stichtolotisk.						
197.80 - 208.50	10.70	2 gl.gn.alm.	Lys, mlk.Endel kv.linser. Av og til kalksp. og skarn i forb. med disse.Stedvis spor gr. 1-3 mm.Stedvis tynne (5 cm) striper biot. gn. og på 204.6-204.7 amf.						

Lokalitet: Mofjellet
Profil 44.410

Borehull: 7604

Dato : Nov. 1976
Koordinater : X:925.482.5, Y:44.398.2
Retning : S
Helling/stigning: - 85
Høyde : 189.7 m
Lengde : 273.45 m

7.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
208.50 - 209.00	0.50	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk-fk.noee tett. rel. jevnt fordelt gul-grønn skarn. Små flekker hbl.					3/4 Ag		
209.00 - 209.45	0.45	2 gl.gn.alm. Lys, fk-mlk noe tett. Stedvis spor gn. 1-3 mm.							
209.45 - 209.90	0.45	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn.b.p. med skarn som over.							
209.90 - 210.15	0.25	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fk.Noee tett. Spor gr. 1-2 mm.							
210.15 - 211.45	1.30	2 gl.gn.b.p. Rel. lys mlk-grovk. Enkelte ekstra biot-rike partier. Noen kv.linser. Delvis meget godt impr. py.							
211.45 - 214.65	3.20	hbl.gn. Noe mørk,mlk. Enkelte flekker grov hbl. Stedvis små skarn-flekker. Rel. mye biot. Tett besatt gr. 0.5-2m Stedvis impr. py.	60°						
214.65 - 215.95	1.30	amf. mørk,fk-mlk. Tett. Jevnt ford. gul-grønn skarn.Endel kv.linser							
215.95 - 219.50	3.55	hbl.gn. Noe mørk mlk-fk. Endel biot. jevnt fordelt gr. 1-3 mm. Jevnt impr. py.							
219.50 - 219.65	0.15	pegm. grovk.							
219.65 - 222.60	2.95	hbl.gn. Samme hbl.gn. som over.		0.02	0.03	0.09	1,2	6.11	221.00 - 222.60
222.60 - 223.70	1.10	2 gl.gn.b.p. Noe mørk,mlk-grovk. Endel små flekker hbl. Noe ujevn ford. gr. 1-3 mm.Jevnt impr. py.		0.00	0.01	0.03	0,8	7.87	

Lokalitet: Mofjellet
Profil 44.410

Borehull: 7604

Dato : Nov. 1976
Koordinater : X:925.482.5, Y:44.398.2
Retning : S
Helling/stigning: - 85
Høyde : 189.7 m
Lengde : 273.45 m

8.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
223.70 - 224.30	0.60	2 gl.gn.alm. Lys,mlk-fk. Noen kv.linser. Impr. py,po,sl, spor gn.		0.30	0.07	0.45	7,2	7.55	
224.30 - 224.80	0.50	2 gl.gn.b.d. Noe mørk,mlk.-grovk. Stedvis ekstra biot-rike partier. Spor gr. 0,5-1 mm. Rel godt impr. sl, noe py.		0.80	0.03	1.58	14,1	6.75	
224.80 - 239.90	15.10	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk-fk.Noie tett. Noen ekstra biot-rike partier. Endel kv.linser.Kalksp. og litt hbl. i forb. med disse. Av og til gr. 1-3 mm.		0.07	0.01	0.22	1,8	2.09	224.80- 239.90
239.90 - 242.00	2.10	2 gl.gn.b.d. Noe lys,mlk. Endel ekstra rike biot-striper.Noie kv.- innblanding. Sv. impr. py.	60-65°						
242.00 - 242.80	0.80	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk.Enkelte biot.flekke. Noen kv.striper.Sv. spor py.	60-65						
242.80 - 245.40	2.60	hbl.gn. Litt mørk,mlk.Enkelte noe større flekker hbl. i forb.m. kv.striper. Her også noe gul- grønn skarn.Sv. spor py.	65	0.01	0.01	0.05	0,9	4.98	244.00- 245.40
245.40 - 246.00	0.60	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk-fk.Noie kv.str. Spredte gr. 1-2 mm.		0.00	0.01	0.03	0,9	3.70	
246.00 - 247.15	1.15	2 gl.gn.b.p. Noe lys,mlk.Enkelte biot-str. Impr. sl, py, gn. cp.	45-50	0.65	0.25	1.52	48,4	8.87	
247.15 - 250.40	3.25	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk.-fk. Virker noe "tett" Enkelte biot-rike partier. Noen kv.linser.Stedvis spor gr. 0.5-1 mm		0.00	0.00	0.03	0,3	2.48	247.15- 249.00
				0.00	0.02	0.03	0,8	2.61	249.00- 250.40

Lokalitet: Mofjellet
Profil 44.410

Borehull: 7604

Dato : Nov. 1976
Koordinater : X:925.482.5, Y:44.398.2
Retning : S
Helling/stigning: - 85
Høyde : 189.7 m
Lengde : 273.45 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
250.40 - 250.70	0.30	2 gl.gn.b.p. Noe Lys,mlk. Litt kv. Noen biot-striper.Impr. <u>sl, py, po, cp</u>		0.54	0.43	2.70	14,-	6.78	
250.70 - 250.95	0.25	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. Spredte gn. 0,5-2 mm		0.00	0.08	0.14	0,8	3.13	
250.95 - 251.25	0.30	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Endel grovk. biot. iblandet.Impr. <u>sl,py</u>		0.06	0.42	1.08	5,2	9.39	
251.25 - 252.30	1.05	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Endel kv. og kv.linser.Spredte gr. 1-2 mm 60-65 Sv. impr. py.		0.00	0.04	0.07	1,4	6.00	
252.30 - 252.70	0.40	biot.sk+kv. Mørk,grovk.Kv-linser iblandet biot. Impr. <u>sl, py,noe po,cp.</u>		0.31	0.29	2.28	10,3	12.00	
252.70 - 253.00	0.30	2 gl.gn.b.d. Noe mørk, mlk. Endel kv.linser Impr. <u>py, cp.</u>		0.04	0.42	0.29	10,6	8.22	
253.00 - 254.25	1.25	biot.sk. mørk,grovk. Endel kv.iblandet60-65 Rel. godt impr. <u>py,sl,po,cp.</u>		0.17	0.37	3.16	15,1	14.47	
254.25 - 254.75	0.50	Malm Rel.mass. <u>Sl-malm.</u> Noe kv. iblandet.Også hbl.		2.89	0.05	13.23	18,1	16.04	
254.75 - 256.20	1.45	biot.sk. Mørk,grovk.Endel kv. iblandet 60-65 Også et par tynne striper 2 gl.gn.b.p. Impr. <u>py,sl,po,cp</u>		0.27	0.53	2.33	16,5	13.95	
256.20 - 256.70	0.50	Hbl.gn. Noe mørk,mlk-fk.Noie kv.Endel gulgrønn skarn.Sv.impr. <u>py.</u>		0.00	0.05	2.25	1,2	2.61	
256.70 - 257.00	0.30	biot.sk. Mørk,grovk.Noie kv. iblandet. 65-70 impr. <u>py,po, Noe cp.</u>		0.31	0.46	0.19	14,3	17.34	
257.00 - 257.40	0.40	hbl.gn. Noe mørk,mlk.Enkelte kv.str. Stedvis spor gr.1-2 mm.Spor <u>py.</u>		0.03	0.09	0.22	2,7	7.69	

Lokalitet: Mofjellet
 Profil 44.410

Borehull: 7604

10.

Dato : Nov. 1976
 Koordinater : X:925.482.5, Y:44.398.2
 Retning : S
 Helling/stigning: - 85
 Høyde : 189.7 m
 Lengde : 273.45 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
257.40 - 257.75	0.35	biot.sk. Mørk, grovk. Endel kv. iblandet Noe hbl. Impr. py, po, sl.	55-60	0.10	0.15	1.70	5,3	13.42	
257.75 - 262.00	4.25	hbl.gn.m/sk. Noe mørk, mlk.-fk. Jevnt besatt gulgrønn skarn. Rel. jevnt besatt gr. 2-4 mm.	60-65	0.00	0.10	0.04	2,3	5.05	257.75 - 259.00
262.00 - 262.50	0.50	2 gl.gn.b.p. Litt mørk, mlk-fk. Endel hbl. iblandet. Noe kv. Sv. spor gr. 0.5 mm. Spor py.		0.00	0.05	0.04	1,7	7.42	
262.50 - 263.10	0.60	biot.sk. Mørk, grovk. Endel kv. iblandet. Spor hbl. Impr. py, po.	60-65	0.00	0.17	0.38	5,4	15.00	
263.10 - 264.85	1.75	hbl.gn. Noe mørk, mlk.-fk. Rel. jevnt besatt gr. 2-3 mm. Sv. impr. py	60-65	0.00	0.02	0.01	1,9	7.90	263.10 - 264.00
		Enkelte pegm.-striper.		0.02	0.04	0.09	2,3	6.47	264.00 - 264.85
264.85 - 265.10	0.25	hbl.gn. Samme hbl.gn. som over. Impr. py, sl.		0.39	0.13	2.43	7,6	9.32	
265.10 - 266.25	1.15	Biot.sk. Mørk, grovk. Endel kv. og kv.-striper. Spor hbl. Impr. py, po, spor sl, cp.		0.00	0.13	0.55	3,5	12.95	
266.25 - 267.00	0.75	hbl.gn. Noe mørk, mlk-fk. Noen striper kv. og flekker ren hbl. spor py.	65-70	0.00	0.04	0.05	2,1	6.79	
267.00 - 267.35	0.35	biot. sk. Mørk, grovk. Noe kv. Endel hbl. Impr. sl, py, po.		0.17	0.15	2.15	3,5	15.79	
267.35 - 268.75	1.40	2 gl.gn.b.p. Noe lys, mlk. Endel kv. og biot-str. Spor hbl. Spredte gr. 1-2 mm. Sv. impr. py, po Noe cp, sl.	65-70	0.00	0.13	0.83	6,0	5.84	
268.75 - 270.80	2.05	2 gl.gn.b.p. Lys, mlk. Enkelte kv. str. Flekker av gulgrønn skarn. Spredte gr. 1-2 mm. Spor hbl.	65-70	0.00	0.01	0.04	<0,1	3.16	268.75 - 270.00

Lokalitet: Mofjellet
Profil 44.410

Borehull: 7604

11.

Dato: Nov. 1976
Koordinater: X: 925.482.5, Y: 44.398.2
Retning: S
Helling/stigning: - 85
Hoyde: 189.7 m
Lengde: 273.45 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
270.80 - 271.30	0.50	2 gl.gn.alm. Lys,mlk. Spor gr. 0.5-1 m	65-70						
271.30 - 273.45	2.15	2 gl.gn.b.p. Lys,mlk. Enkelte biot-rike striper. Noe kv. Spor gr. 0.5 - 1 m.	65-70						

4/2 1977
K.M. Hegrum
K.M. Hegrum

Lokalitet: Mofjellet
 Profil 44.410 Y

Borehull: 7603

Dato : Sept/okt. -76
 Koordinater : 925.482.5 X 44.398.2 Y
 Retning :
 Helling/stigning : - 90°
 Høyde : 189.7 m
 Lengde : 338.10

1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.65	0.65	Jordboring	45° 40-50						
0.65 - 3.05	2.40	2 gl.gn.alm. lys,mlk-fk. Enkelte litt mere biot-rike part.Stedvis sv. impr. py, sl.							
3.05 - 6.10	3.05	2 gl.gn.b.p. rel.lys,mlk. Endel gr.1-3mm flekkvis fordelt.Enkelte mere biot-rike partier.							
6.10 - 6.70	0.60	biot.gn. rel.mørk mlk-fk. Noe kv.og musk.Impr.finfordelt py							
6.70 - 7.75	1.05	2 gl.gn.b.p. rel.lys mlk.-fk.Enkelte striper biot.Jevnt fordelt gr.1-3 mm,enkelte noe stichtolitisk.							
7.75 - 10.95	3.20	2 gl.gn.b.p. rel.lys,fk-mlk.Enkelte mere biot-gn-rike partier.Noen kv.linser med flekker av hbl.Jevnt impr.finford. py							
10.95 - 11.00	0.05	hbl.gn. mørk, grovk.							
11.00 - 11.50	0.50	2 gl.gn.b.d. mørk,mlk.endel kv.linser spor hbl. gr. 0.5-1 mm Impr. py.							
11.50 - 13.00	1.50	hbl. gn. rel.lys, mlk. Endel biot. Endel gr. 1-2 mm. Jevnt impr. py.							
13.00 - 13.70	0.70	hbl. gn. rel. lys mlk.Endel biot. tett besatt gr. 1-4 mm stichtolitisk.Impr. py.							

Lokalitet: Mofjellet
 Profil 44.410 Y

Borehull: 7603

2

Dato : Sept/okt. -76
 Koordinater : 925.482.5 X 44.398.2 Y
 Retning :
 Helling/stigning : - 90°
 Høyde : 139.7 m
 Lengde : 338.10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.70 - 20.50	6.80	hbl.gn.	rel.lys,mlk-fk.Endel biot.-rike partier. Enkelte kv.-linser.Rel.jevnt besatt gr.70-75 2-10 mm. De største tydelig strichtolistiske.Jevnt impr. <u>py</u> .						
20.50 - 22.10	1.60	2 gl.gn.b.p.	rel.lys mlk-fk.Tett besatt gr.1-2 mm.Sv impr. <u>py</u>						
22.10 - 29.50	7.40	hbl.gn.	rel.mørk mlk-fk.Noe biot. og amf.Endel jevnt fordelt skarn.Noen kv.linser plygm.foldet.Jevnt ford.gr.1-3mm Enkelte flekker gr. 3-5 mm.						
29.50 - 32.50	3.00	2 gl.gn.b.d.	rel.mørk,mlk.Stedvis spor hbl.Enkelte flekker skarn Tett besatt gr 1-3 mm.Jevnt svakt impr. <u>py</u> .						
32.50 - 52.60	20.10	hbl.gn.	rel.mørk,mlk.Endel biot. Endel kv.linser Noe amf. Endel gr.1-4 mm.Jevnt ford. 60-70 skarn,med anrikn.ved kv.linser.Jevnt,sv.impr. <u>py</u> til ca. 40.30.						
52.60 - 57.50	4.90	biot.gn.	rel.mørk,mlk-fk.Endel hbl. Stedvis nesten hbl. over tynne partier.Jevnt ford. gr.1-3 mm.Noen større gr. 1-3 mm er tydelig Stichto-listisk. Jevnt, rel svakt impr. <u>py</u> .						

Lokalitet: Mofjellet
 Profil 44.410 Y

Borehull: 7603

3

Dato : Sept/okt. -76
 Koordinater : 925.482.5 X 44.398.2 Y
 Retning :
 Helling/stigning : - 90°
 Høyde : 189.7 m
 Lengde : 338.10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
57.50 - 58.25	0.75	hbl.gn.	Samme karak. som over.						
58.25 - 60.85	2.60	biot.gn/ 2 gl.gn.b.d.	rel.lys,mlk.-fk. musk-innh. veksler.Partier med mye hbl. Gr.1-3 mm.Jevnt fordelt Sv. impr. <u>py</u> .						60°
60.85 - 62.95	2.10	2 gl.gn.b.d.	rel.lys mlk.-fk. Sv. impr. <u>py</u>						
62.95 - 81.50	18.55	2 gl.gn.alm.	rel.lys,fk-mlk.,tett enkelte tynne partier mlk.- grovk. biot-gn. Disse har spor av skarn,og gr.1-3 mm						60-70
81.50 - 81.80	0.30	amf.	mørk,fk-mlk. tett. Tett besatt gr. 2-4 mm skarn-flekke.						
81.80 - 82.30	0.50	2 gl.gn.alm.	Samme b.art som over						
82.30 - 82.40	0.10	amf.	Samme amf. som over.						
82.40 - 83.20	0.80	2 gl.gn.alm.	Samme 2 gl.gn. som over						
83.20 - 106.00	22.80	2 gl.gn.b.p.	Rel.lys,mlk-fk. tett. Enkelte biot.-rike partier Disse har skarnflekke. Jevnt besatt gr. 1-3 mm. Impr. <u>py</u> : 93.60 - 94.00						
106.00 - 106.40	0.40	Pegm.							
106.40 - 109.80	3.40	2 gl.gn.b.p.	Samme b.art som over						
109.80 - 112.50	2.70	Amf.	mørk,mlk. Noen skarnflekke Tett besatt gr. 2-4 mm.						60-70

Lokalitet: Mofjellet
Profil 44.410 Y

Borehull: 7603

4

Dato : Sept/okt. -76
Koordinater : 925.482.5 X 44.398.2 Y
Retning :
Helling/stigning : - 90°
Høyde : 189.7 m
Lengde : 338.10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
112.50 - 118.40	5.90	gr.b.a.	70°						
		Rel.lys.fk. tett. Består av gr.kv,litt biot.og amf. gr. 2-5 mm. Samtlige meget stichtolitisk. B.arten er lysest på midten og noe mørkere mot endene.							
118.40 - 121.55	3.15	2 gl.gn.b.d.							
		Rel.lys,mlk-fk. tett,enkelte kv.linser.Jevnt besatt gr. 1-3 mm.							
121.55 - 122.00	0.45	pegm.							
122.00 - 122.85	0.85	2 gl.gn.b.p.							
		rel.lys,fk. tett. Tett besatt gr. 1-2 mm, strichtolitisk							
122.85 - 123.30	0.45	pegm.							
123.30 - 133.50	10.20	2 gl.gn.b.p.							
		rel.lys,fk.tett. Meget tett besatt gr. 1-3 mm, strichtolitisk.							
133.50 - 155.30	21.80	gr.b.art							
		gr.b.art som består av gr., kv,biot. Enkelte partier er rene kv.linser.Andre er biot. gn-liknende,atter andre har kvartsittisk preg. Det hele er meget tett besatt med gr. 1-6 mm og meget utpreget stichtolitisk.Enkelte flekker av ren hbl. og biot. i forb.m. kv.linser. Endel stikktil kjernens lengde-akse (s=+ 0) på 152.70 - 153.50.							

Lokalitet: Mofjellet
Profil 44.410 Y

Borehull: 7603

Dato : Sept./okt. -76
Koordinater : 925.482.5 X 44.398.2 Y
Retning :
Helling/stigning : - 90°
Høyde : 189.7 m
Lengde : 338.10

5

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
155.30 - 161.60	6.30	2 gl.gn.b.d. rel.lys fk.-mlk tett Jevnt fordelt, tett besatt gr. 1-3 mm. Alle har stichtolitisk preg.	70						
161.60 - 163.90	2.30	amf. mørk fk.-mlk., rel. tett Endel skarn-rike partier Enkelte partier med hbl. gr. noe spredt 1-2 mm.							
163.90 - 165.25	1.35	hbl.gn. rel.lys mlk-fk. Endel biot. stedvis spor skarn. Noe gr. 1-2 mm. Jevnt, sv. impr.py.							
165.25 - 170.30	5.05	amf. mørk, fk-mlk. rel. tett Enkelte biot-rike partier sv. py-impr.her.Rel. jevnt besatt gr. 1-4 mm.							
170.30 - 172.10	1.80	hbl.gn. Rel.lys mlk.-fk. Noe biot. Noen amf.-rike tynne part. Enkelte skarn-flekke. Jevnt besatt gr. 1-4 mm. Sv. impr. py.							
172.10 - 174.25	2.15	2 gl.gn.b.d. Rel. lys, mlk-fk. tett. Noen få skarn-flekke. Jevnt tett besatt gr. 1-3 mm, stichtolitisk.							
174.25 - 180.40	1.45	amf. mørk, mlk.-fk. Endel kv.linser stedvis skarn i forb. med disse. Rel. jevnt besatt gr. 2-5 mm.							

Lokalitet: **Mofjellet**
 Profil 44.410 Y

Borehull: 7603

Dato : Sept./okt. -76
 Koordinater : 925.482.5 X 44.398.2 Y
 Retning :
 Helling/stigning : - 90°
 Høyde : 189.7 m
 Lengde : 338.10

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
180.40 - 182.50	2.10	2 gl.gn.b.p.	60						
		Rel.lys, fk.-mlk., tett. Enkelte kv.linser. Stedvis spor skarn. Jevnt besatt gr. 1-3 mm til 190 m.							
182.50 - 182.70	0.20	Amf.							
182.70 - 201.50	18.80	2 gl.gn.b.p.							
		Samme 2 gl.gn. som over. Enkelte ekstra biot-rike striper. Noen få <u>tynne</u> partier amf. gr. hovedsak- elig i ekstra biot-rike partier. Her også stedvis skarn.							
201.50 - 203.80	2.30	hbl.gn.	70-80						
		Rel.lys, mlk-fk. Jevnt fin- fordelt skarn. Endel biot. Stedvis gr. 1-2 mm.							
203.80 - 207.00	3.20	2 gl.gn.b.p.							
		Rel. lys, mlk-fk. noe tett. Stedvis noe hbl. og skarn Jevnt fordelt gr. 1-3 mm Sv. impr. py.							
207.00 - 208.45	1.45	h-l.gn.	70-80						
		Samme b.art som over. <u>Sv. impr. py.</u>							
208.45 - 209.15	0.70	Amf.							
		mørk, fk.-mlk. tett. Enkelte skarn-lag. Tett besatt gr. 2-5 mm.							
209.15 - 210.00	0.85	2 gl.gn.b.d.							
		Rel.lys, mlk.-fk. Stedvis spor hbl., og flekker av skarn. Jevnt besatt gr. 1-3 mm. Sv. impr. <u>py.</u>							

Lokalitet: Mofjellet
 Profil 44.410 Y

Borehull: 7603

Dato : Sept./okt. -76
 Koordinater : 925.482.5 X 44.398.2 Y
 Retning :
 Helling/stigning : - 90°
 Høyde : 189.7 m
 Lengde : 338.10

7

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
210.00 - 216.30	6.30	hbl.gn. rel.lys,mlk-fk. Vekslede lag med 2 gl.gn.b.d. Endel skarn-flekke.Enkelte kv.-linser. Jevnt fordelt gr. 1-5 mm. De største i de mest hbl.-rike partier. Jevnt impr. <u>py</u>	70-80°						
216.30 - 219.40	3.10	biot.gn. rel. lys mlk-grovk.Vekslede lag med nesten ren musk.gn. Andre partier nesten ren biot. Spredte gn. 1-3 mm Godt impr. <u>py</u>	70-80						
				0.17	0.03	0.11		6.83	218.00 219.40
219.40 - 219.60	0.20	musk.gn. lys,grovk.-mlk. Godt impr. <u>sl</u> , <u>py</u> noe <u>cp</u> spor <u>po</u> .		1.94	0.47	5.07		8.67	
219.60 - 220.35	0.75	musk.gn. lys,grovk.-mlk. rel.lite biot.		0.04	0.03	0.31		2.23	
220.35 - 220.60	0.25	biot.gn. rel.lys,grovk-mlk. Noe kv. og musk. Godt impr. <u>py</u> spor <u>sl</u>		1.82	0.13	1.28		9.85	
220.60 - 236.95	16.35	2 gl.gn. alm/ rel.lys mlk. Veksling mellom biot.rike og musk.rike lag. Endel kv.linser. Stedvis skarn i forb. med disse. Spredte gr. 1-3 mm. hovedsakelig i ekstra biot-rike lag.	80-85	0.00	0.04	0.13		3.55	220.60 222.00
236.95 - 237.30	0.35	biot.gn. rel. mørk mlk. Endel amf. Tett besatt gr. 2-5 mm.							
237.30 - 239.80	2.50	2 gl.gn.alm/ Samme gl.gn. som over 2 gl.gn.b.p.							

Lokalitet: **Hofjellet**
 Profil **44.410 Y**

Borehull: **7603**

8

Dato : **Sept./okt. -76**
 Koordinater : **925.482.5 X 44.398.2 Y**
 Retning :
 Helling/stigning : **- 90°**
 Høyde : **189.7 m**
 Lengde : **338.10**

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
239.80 - 240.70	0.90	biot.gn.	rel.lys,mlk.-fk. Tett besatt gr. 1-3 mm. spor amf.						
240.70 - 249.10	8.40	2 gl.gn.b.p.	rel.lys,mlk-grovk. Endel striper ren biot. Endel kv.linser. Stedvis skarn-flekke. Spredte gr. 1-3 mm, mest i biot-rike partier						
249.10 - 252.45	3.35	biot.gn./biot. b.art.	grovk.biot. i veksling med kv. Noe hbl.enkelte steder Noe gr. 1-3 mm. uregelmessig fordelt. Sv.impr. <u>py,po</u> , Enkelte, smale "mellom-partier" med 2 gl.gn.b.d. fk.-mlk.						
				0.05	0.02	0.08		5.51	251.00 -
									252.45
252.45 - 253.60	1.15	biot.gn./biot. b.art.	Samme grovk.b.art som over rel. godt impr. <u>sl.py</u> .Noe <u>po</u> og <u>Cp</u> .	0.03	0.16	0.94		9.45	
253.60 - 254.35	0.75	2 gl.gn.b.d.	rel. lys, fk.-mlk. tett endel kv. Spredte gr. 1-2mm	0.03	0.01	0.01		2.49	
254.35 - 254.55	0.20	biot.gn/	Samme grovk. biot.b.art som over. Godt impr. <u>sl,py,po</u> , litt cp.	0.11	0.13	2.76		12.60	
254.55 - 280.00	25.45	2 gl.gn.alm./2 gl.gn.b.p.	rel.lys,mlk-fk. tett. Endel kv.linser og ekstra biot.rike partier.Spredte gr. 1-3 mm. Enkelte flekker skarn.	0.01	0.01	0.04		2.76	254.55 256.00
280.00 - 288.20	8.20	hbl.gn.	rel.lys,mlk-fk. Endel biot-gn-striper. Noen kv.linser Jevnt fordelt gr.1-4mm. Impr. <u>py</u>						

Lokalitet: **Hofjellet**
Profil 44.410 Y

Borehull: 7603

Dato : Sept./okt. -76
Koordinater : 925.482.5 X 44.398.2 Y
Retning :
Helling/stigning : - 90°
Høyde : 189.7 m
Lengde : 338.10

9

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
288.20 - 289.35	1.15	hbl.gn. rel.mørk, mlk.-fk. tett. Hbl. av en mørkere og tettere type enn over. Minner noe om amf. Noe kv.linser, og grovk.hbl. i forb.med disse. Tett besatt gr. 2-4 mm, delvis stichtolitisk							
289.35 - 294.60	5.25	hbl.gn. rel.mørk, mlk. Flekker ren hbl. i forb. med kv.linser rel.mye skarn, jevnt ford. Spredte gr. 1-4 mm. Sv. impr. py							
294.60 - 295.60	1.00	pegm.							
295.60 - 303.20	7.60	hbl.gn. Samme hbl.gn. som over							
303.20 - 304.00	0.80	pegm.							
304.00 - 312.80	8.80	2 gl.gn.b.p. lys, mlk-fk.tett. Endel striper (2-10cm) amf. Disse tett besatt gr. 1-5 mm.	60-70						
312.80 - 323.40	10.60	amf. mørk, mlk-fk.rel.tett, noe biot. Enkelte kv.linser, tett besatt gr. 1-3 mm.							
323.40 - 324.70	1.30	2 gl.gn.b.p. rel.lys, mlk-fk. noe tett endel amf.som tynne striper tett besatt gr.resten 1-3mm							
324.70 - 325.60	0.90	amf. Samme amf. som over							
325.60 - 328.00	2.70	2 gl.gn.b.p. Samme 2 gl.gn. som over							
228.00 - 338.10	10.10	amf. Samme amf. som over. Virker kanskje litt tettere.							

Mo, 19/11 1976
Kaare M. Hegrum
Geolog

Lokalitet: Mofjellet

Dato

Sept. 1976

Koordinater

X: 925.566,55 Y: 44.878,30

Borehull: 7602

Retning

Helling/stigning

- 90°

Høyde

+ 175,84

Lengde

334,35

1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	Jordboring							
1.00 - 1.60	0.60	2 gl.gn.b.p.	ca. 70°						
		mellomk., noe musk., m.sv. py-impr.							
1.60 - 2.05	0.45	skarn.b.a.							
		lys, mellomk. en god del skarn? neon anhydritt-flekke? diopsid?							
2.05 - 3.25	0.80	bio.gr.med amtpreg.	60-70°						
		mørk, mellomk. endel hornbl. stedvis gr. 1-6 mm, skarn							
3.25 - 4.00	0.75	bio.gr.m/amt-preg.							
		noe lysere enn over, noe gn, 1 mm, mellomk. D?, m.sv.py-impr.							
4.00 - 5.85	1.85	hornbl.gn.							
		mørk, mellom-fink., gn. 1-3 mm. noe hornbl. epidotsoner							
5.85 - 6.30	0.45	2 gl.gn.b.d.							
		fink. gr. 1-10 mm lys, skarn							
6.30 - 9.40	3.10	hornbl.gn.	60-70°						
		fin-mellomk. epidot-rike partier. bandet, avtar mot slutten.							
9.40 - 12.15	2.75	2 gl.gn., alm.							
		fin-mellomk. homogen, lys litt spredd gn.							
12.15 - 26.00	13.85	" " "							
		fin-mellom. homogen, lys litt gr. 1-2 mm. noen få 5 cm. mørk bio.gn.							
26.00 - 36.65	10.65	2 gl.gn.b.p.							
		mellomk.-fink., gr. 1-10 mm noe skarn.							
36.65 - 40.00	3.35	2 gl.gn.b.d.							
		fink, noe hbl., gr. 1-2 mm skarn							
40.00 - 42.30	2.30	hbl.gn.							
		mørk, mellomk., litt gn, noe spredd 1-3 mm, skarn litt pv i forb. med kv. stripe på 42.25							

Lokalitet: Mofjellet

Dato: Sept. 1976

Koordinater: X: 925.566,55 Y: 44.878,30

Borehull: 7602

Retning: :

Helling/stigning: - 90°

Høyde: + 175,84

Lengde: 334,35

2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
42.30 - 53.05	10.75	Amf.	mørk, fin-mellomk., endel kv.striper som virker plygmatiske foldet, enkelte steder også kalksp.striper						
			42.30-47.00: gr. jevnt fordelt 1-2 mm, 47.00 - 53.05: større veksling i gr.størrelsen, 2-15mm						
			stedvis flekker av hbl. og skarn.						
53.05 - 53.50	0.45	kvarts b.art	endel biotitt, og spredte gn. 1-2 mm. Flekk med amf. som går 1/3 gjennom kjer- nen på 53.35						
53.50 - 69.80	16.30	amf.	samme amf. som over med samme karakteristiske størrelsen på gn. avtar fra ca. 62.50 til 1-3 mm.						
69.80 - 71.25	1.45	2 gl.gn.b.d.	lys, fin-mellomk.homogen tett besatt gr. 1-3 mm						
71.25 - 77.25	6.00	amf.	mørk, fink-mellomk. endel kv.striper, av og til med kalksp. gr.jevnt fordelt 1-3 mm, stedvis flekker av skarn. Enkelte tynne striper med 2 gl.gn.						
77.25 - 80.90	3.65	2 gl.gn.b.d.	rel.lys, tett, fink. enkelte tynne striper amf.til å begynne med. Pepret med gr. 0.5-2 mm.						
80.90 - 81.35	0.45	pegm.	m. grovk.						

Lokalitet: Mofjellet

Dato: Sept. 1976

Koordinater: X: 925.566,55 Y: 44.878,30

Retning: :

Helling/stigning: - 90°

Høyde: + 175,84

Lengde: 334,35

Borehull: 7602

3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
81.35 - 81.55	0.20	2 gl.gn.b.d. tett, fink- gr. 1-2 mm							
81.55 - 81.90	0.35	Pegm.b.art. grovk. Endel biotitt m. sv. spor av po.							
81.90 - 82.95	1.05	2 gl.gn.b.d. lys, fink.tett, gr. jevnt fordelt 1-3 mm.							
82.95 - 83.50	0.55	biot.gn. striper av kv. endel hbl. og skarn i forb.med disse jevnt fordelt gr. 1-2 mm							
83.50 - 84.60	1.10	amf. mørk, fink.litt hbl. i forb med kv.striper jevnt ford. gr. 1-3 mm.	60°						
84.60 - 90.00	5.40	2 gl.gn.b.p. lys, fin-mellomk. jevnt ford. gr.1-3 mm.Enkelte steder skarn.	22°						
90.00 - 100.00	10.00	Ved et uhell er denne kasse blitt veltet og kjernene ramlet ut. De er lagt tilbake igjen, men rekkefølgen er helt omstokket. Bergarten som opptar hele kassen ser ut til å være den samme som over, nemlig en 2 gl.gn.b.p., med jevnt fordelte gr. 1-3 mm.							
100.00 - 110.00	10.00	2 gl.gn.b.p. Samme karakteristikk som over.							
110.00 - 130.00	20.00	Også disse kasser er blitt veltet og kjernene ramlet. Men kjernene er kommet tilbake i riktige kasser, selv om rekkefølgen er stokket helt om. Bergarten ser ut til å være den samme som tidligere, nemlig 2 gl.gn.b.p. med jevnt fordelte gr.1-3 mm, og enkelte flekker skarn. I kassen 120.00-130.00 ser det dog ut til							

Lokalitet: Mofjellet

Borehull: 7602

Dato

Sept. 1976

Koordinater

X: 925.566,55 Y: 44.878,30

Retning

Helling/stigning: - 90°

Høyde

+ 175,84

Lengde

334,35

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
130.00 - 131.60	1.60	2 gl.gn.b.p.	Samme karakteristikk som over.						
131.60 - 133.80	2.20	2 gl.gn.alm.	lys,mellom-fink. Enkelte steder kalksp.og skarn i forb. med kv.striper. gr. sporadisk 1-2 mm. 132.75-132.90 blanding av 2 gl.gn.alm. grovk.biot.gn. og kv.						
133.80 - 136.35	2.55	2 gl.gn.alm.+ biot.gn.	skillet mellom disse b.a. går omtrent langs kjernen. foldet biot.gn. er mørk fin-mellomk. og er jevnt fordelt med gr. 1-3 mm. Har også en god del skarn. 2 gl.gn.er lys fin-mellomk. tett. Fører ikke gr.						
136.35 - 137.70	1.35	2 gl.gn.alm.	lys, fin-mellomk. tett, stedvis gr. 0.5-2 mm.						
137.70 - 137.90	0.20	2 gl.gn.alm.+ biot.gn.	opptreden som tidligere nevnt,med skille langs kjernen.						
137.90 - 147.10	9.20	2 gl.gn.alm.	lys,fin-mellomk. tett sporadisk opptr. av biotgn. flekker helt til å begynne med sporadisk gn.1-3 mm						
147.10 - 147.25	0.15	Pegm.	m. grovk.						
147.25 - 155.75	8.50	2 gl.gn.alm.	Samme karakteristikk som over.						

Lokalitet: Mofjellet

Dato

Sept. 1976

Koordinater

X: 925.566,55 Y: 44.878,30

Borehull: 7602

5

Retning

Helling/stigning: - 90°

Høyde

: + 175,84

Lengde

: 334,35

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
155.75 - 156.65	0.90	biot.gn. mørk, mellomk. svært mye skarn.	60						
156.65 - 160.30	3.65	2 gl.gn.alm. lys, fin-mellomk. tett sporadisk opptr. av gn. 1-2m noen få tynnere (1-2cm) striper mørk biot.gn.							
160.30 - 167.00	6.70	hbl.gn. mørk, mellom-fink. biot. rik partier med nærmest biot.gn. jevnt fordelt tett besatt gr. 1-2 mm, sv. impr. py.							
167.00 - 167.30	0.30	kv.linse endel biot. gr. 1-2 mm litt hbl.							
167.30 - 179.00	11.70	hbl.gn. mørk, med biot.gn.-rike partier. Tett besatt gr. 1-2 mm, enkelte steder opptil 4 mm. impr. py. store gn. (3-15 mm) i området 171.80-173.20.							
179.90 - 182.20	3.20	2 gl.gn.b.p. rel. lys mellomk. Endel hbl.gr. 1-2 mm. impr. py enkelte biot.rike lag.							
182.20 - 185.00	2.80	2 gl.gn.alm. lys, mellomk. Enkelte b.d. lag sv. impr. py. Enkelte gr. 1-2 mm. kj. tap 184.00-184.75							
185.00 - 194.30	9.30	2 gl.gn.b.p. rel. lys fin-mellomk. flekk med hbl., gr. 5-7 mm, skarn og kv. på 185.00-185.05 spredte gr. lmm. rel smale biot.rike partier med gr. 2-5 mm.							

Lokalitet: Mofjellet

Dato: Sept. 1976

Koordinater: X: 925.566,55 Y: 44.878,30

Borehull: 7602

Retning: :

Helling/stigning: - 90°

Høyde: + 175,84

Lengde: 334,35

6

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
194.30 - 206.05	11.75	2 gl.gn.b.d. rel. lys, fin-mellomk. Stedvis tynne hbl.-rike partier tett besatt gr. 1-3 mm sv. impr. py.	60-70°						
206.05 - 208.50	2.45	2 gl.gn.alm. lys-mellomk. tett besatt gr. 1-3 mm. enkelte meget biot-rike striper, som er impr. py.							
208.50 - 227.55	19.05	2 gl.gn.b.d. litt veksling med 2 gl.gn. alm. helt til å begynne med. mellomk. tett besatt gr. 1-3 mm. Jevnt, noe svakt impr. py. sterkere ved biot.-rike partier							
227.55 - 229.55	2.00	Kjernetap	60-70°						
229.55 - 231.30	1.75	2 gl.gn.b.d. Samme b.art. som over, med samme karakteristikk							
231.30 - 233.50	2.20	Kjernetap							
233.50 - 236.60	3.10	2 gl.gn.b.d. Samme b.a. som over, med samme karakteristikk							
236.60 - 240.00	3.40	2 gl.gn.b.gr. re.lys. mellomk. gr.jevnt fordelt 1-3 mm. Enkelte mere biot.rike partier							
240.00 - 248.60	8.60	2 gl.gr.b.d. rel.mørk mellomk. gr.1-5 mm. jevnt fordelt. Stedvis svake spor av py. Enkelte flekker med hbl.							
248.60 - 250.20	1.60	musk.gn. lys, mellomk. hoveds. muskovitt, men enkelte biot.-rike partier. Disse har litt granater 1-1.5 mm.							

Lokalitet: Mofjellet

Dato

Sept. 1976

Koordinater

X:925.566,55 Y:44.878,30

Borehull: 7602

Retning

Helling/stigning: - 90°

Høyde

: + 175,84

Lengde

: 334,35

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
250.20 - 261.60	11.40	2 gl.gn.b.p.	rel. lys, mellom-fink. stedvis partier som er mere biot eller musk.-rikere. Rel. jevnt fordelt gr. 1-3 mm.						
261.60 - 264.50	2.90	2 gl.gn.alm.	lys, mellom-fink. Av og til gr. 1-3 mm.						
264.50 - 268.90	4.40	amf.	mørk, fin-mellomk. En del tynne kv.fylte stikk med S=ca.20°. Enkelte kv.str. litt tykkere med S=ca.80-90°. Stedvis gr.1-3 mm.						
268.90 - 271.60	2.70	2 gl.gn.b.p.	rel. lys, fin-mellomk. stedvis gn. 0.5-1 mm. jevnt impr. py.						
271.60 - 272.55	0.95	hbl.gn.	rel.mørk, fin-mellomk. tett besatt gn.1-2 mm.						
272.55 - 276.00	3.45	2 gl.gn.b.p.	rel. lys, fin-mellomk. Enkelte hbl.-rike partier Jevnt besatt gr.1-3 mm. Jevnt impr. py.						
276.00 - 278.35	2.35	hbl.gn.	rel.mørk, fin-mellomk. Enkelte partier med 2 gl. gn.b.p. Disse er py-impr. Jevnt besatt gn.2-4 mm						
278.35 - 281.25	2.90	hbl.-biot.gn.	rel.mørk, fin-mellomk. En god del skårn, delvis jevnt fordelt. Noe spredte gr. 1-3 mm.						

Lokalitet: Mofjellet

Dato

Sept. 1976

Koordinater

X:925.566,55 Y:44.878,30

Retning

:

Borehull: 7602

8

Helling/stigning: - 90°

Høyde

: + 175,84

Lengde

: 334,35

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
281.25 - 283.10	1.85	2 gl.gn.b.p.	Tett, fin-mellomk. Jevnt fordelt gr. 1-3 mm.						
283.10 - 289.60	6.50	hbl.-biot.gn.	Rel.mørk, fin-mellomk. En god del skarn, delvis i "klumper" Tett besatt gr. 1-3 mm.						
289.60 - 290.00	0.40	2 gl.gn.alm.	rel.lys, mellomk.endel biot.-rike partier.Jevnt besatt gr. 1-3 mm.						
290.00 - 298.05	8.05	hbl.gn.	Rel.mørk, fin-mellomk. Endel partier med biot-gn. Jevnt fordelt skarn. samt også i "klumper" Jevnt tett besatt gr.1-4 mm.						
298.05 - 301.00	2.95	2 gl.gn.alm.	lys, fin-mellomk. tett sporadisk gr. 1-2 mm.						
301.00 - 301.20	0.20	amf.	mørk. fink. Enkelte små-flekker skarn.Tett besatt gr. 2-5 mm.						
301.20 - 304.90	3.70	2 gl.gn.alm.	Samme b.art som over. Enkelte tynne striper hbl.gn. med skarn.						
304.90 - 305.10	0.20	amf.	Samme som over.						
305.10 - 307.80	2.70	2 gl.gn.alm.	Samme b.art som over.						
307.80 - 308.10	0.30	amf.	Samme b.art som over.						

Lokalitet: **Mofjellet**

Dato

Sept. 1976

Koordinater

X:925.566,55 Y:44.878,30

Borehull: 7602

Retning

:

Helling/stigning: - 90°

Høyde

: + 175,84

Lengde

: 334,35

9

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
308.10 - 317.20	9.10	2 gl.gn.b.p.	Lys, mellomk. Likner meget på 2 gl.gn.alm. over, men noe mere biot. Enkelte biot. gn-rike partier. Disse tett besatt gr. 1-3 mm. Ellers bare spredte gr. 1 mm i b.-arten. Mellom 315.20 og 317.20 en del smale (5-10cm) striper amf., som tidligere beskrevet.	70-80°					
317.20 - 322.00	4.80	2 gl.gn.b.d.	rel.lys, fin-mellomk. Endel spredte gr. 1-3 mm. Stedvis småflekker skarn.						
322.00 - 326.05	4.05	amf.	mørk, fink. rel.tett. Tett besatt gr. 2-4 mm.						
326.05 - 328.45	2.40	2 gl.gn.b.d.	Rel.lys, mellom-fink. Enkelte skarnflekker. Tett besatt gr. 2-4 mm.						
328.45 - 330.10	1.65	biot.gn.	mørk, fin-mellomk. Endel amf. Noen kv.linser. Tett besatt gr. 1-2 mm.						
330.10 - 331.20	1.10	2 gl.gn.b.d.	rel.lys, fin-mellomk. Tett besatt gr. 1-3 mm.						
331.20 - 332.20	1.00	hbl.gn.	mørk, fin-mellomk. Endel biot. Noen linser (10cm) kv. Tett besatt gr. 1-2 mm.						
332.20 - 333.00	0.80	2 gl.gn.b.d.	Samme b.art som over						
333.00 - 334.35	1.35	hbl.gn.	mørk, fin-mellomk. Endel biot. Noen kv.linser, og partier med ren hbl. Tett						

Mo 24/10 - 1976
 Haave & Hegrum