



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 3352	Intern Journal nr	Internt arkiv nr Boks nr 15	Rapport lokalisering Nordland	Gradering
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr BNN	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Kjernebeskrivelser.				
Forfatter		Dato 	Bedrift Bergverkselskapet Nord-Norge A/S	
Kommune Rana	Fylke Nordland	Bergdistrikt Nordlandske	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Fagområde	Dokument type	Forekomster		
Råstofftype	Emneord			
Sammendrag				

Lokalitet: Profil 44.120

Dato: Juli -81

→ S. Burman
ref. 1.1.1

Koordinater: X: 925.434,5 Y: 44.120

Retning: N

Helling/stigning: +49°

Høyde: -79.3

Lengde: 94,40 m

Borehull: 781 A

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
							g/t Ag/Au		
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.	45						
0.50 - 7.40	6.90	biot.gn.	45-60	0.04	0.11	0.63	3.8/0.10		0.50/1.50
		Rel.lys mlk.rel.kv.rik.		0.06	0.09	0.64	4.4/0.10		1.50/2.50
		Merk, mlk.vekslende m/cm-		0.27	0.22	0.89	12.7/0.50		2.50-3.50
		tykke 2 gl.gn.band, samt		0.79	0.29	1.56	21.4/0.80		3.50-4.50
		delvis hbl-førende. Enkelte		0.19	0.19	1.71	10.9/0.25		4.50-5.50
		striper, impr. Sl.Cp.Gn.Py.		0.06	0.14	0.27	6.8/0.65		5.50-6.50
		Py.		0.01	0.27	0.34	6.8/0.15		6.50-7.40
7.40 - 15.80	8.40	2 gl.gn.	60-30						
		Lys mlk.rel.kv.rik.spr.							
		gr. 1-3 mm.							
15.80 - 19.50	3.70	2 gl.gn.	40-45	0.25	0.20	0.63	15.5/0.70		15.70-17.00
		Rel.lys mlk.rel.jevnt		0.02	0.05	0.09	2.6/0.10		17.00-18.00
		bandad m/opptil dm tykke		0.57	0.20	1.50	23.6/0.25		18.00-19.50
		skarnførende band m/svak							
		impr. Sl.Cp.Gn.Py.							
19.50 - 35.00	15.50	2 gl.gn.b.d.	20-50						
		Lys mlk.enstaka opp til							
		dm tykke pegm.band.Spr.							
		gr. 1-3 mm.							
35.00 - 35.50	0.50	pegm.							
35.50 - 37.30	1.80	2 gl.gn.b.d.	45						
37.30 - 37.50	0.20	biot.sk.	50						
37.50 - 38.80	1.30	2 gl.gn.	45-50	0.15	0.13	0.75	6.9/0.10		37.50-38.80
		Lys, mlk.musk.rik, impr. Py.							
		spor Sl.							
38.80 - 41.40	2.60	2 gl.gn.b.d.	45						
41.40 - 46.60	5.20	2 gl.gn.b.d.	45						
		Rel.lys mlk.enstaka biot.							
		rikere partier m/impr.							
		Py. spor Sl.							
46.60 - 52.50	5.90	2 gl.gn.b.d.	30-60						
		Rel.lys mlk.spr.gr. 1-3mm							
		2							

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 781 A

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
52.50 - 54.90	2.40	2 gl.gn.b.d.	30-0-30	0.16	0.20	0.92	7.5/0.15		52.50-53.70
		Rel.lys mlk.vekslende m/cm tykke biot.band.Hbl-førende, impr. <u>Py.spor</u> <u>Sl.Gn.Cp.</u> foldet.		1.46	0.42	0.35	27.7/2.05		53.70-54.90
54.90 - 57.40	3.50	Hbl.gn. (biot.før.)		1.01	0.45	0.07	101.0/3.20		54.80-56.00
		Mørk ,mlk.vekslende m/biot.gn.2 gl.gn.band samt enst.skarnband.Svak impr. <u>Py.Gn.Sl.</u> fortrinnsvis i skarn og hbl.gn.Foldet.		0.89	0.53	0.76	54.2/1.80		56.00-57.40
57.40 - 57.80	0.40	skarn		2.75	0.46	5.01	77.6/0.30		
57.80 - 59.80	2.00	biot.hbl.gn.	0-45	0.58	0.34	1.82	18.0/0.10		57.80-58.80
		Mørk mlk.foldet.Impr. <u>Py.</u> Stedvis <u>Sl.Cp.Gn.</u>		0.13	0.15	0.45	5.5/<0.10		58.80-59.80
59.80 - 62.30	2.50	biot.gn. (hbl.før.)	45-50	0.16	0.07	0.54	3.8/<0.10		59.80-61.00
		Mørk mlk.enstaka pegm.band svak impr. <u>Py.Sl.Gn.</u>		0.35	0.31	1.37	9.4/<0.10		61.00-62.30
62.30 - 65.50	3.20	skarn.	45	0.65	0.36	2.70	11.8/0.15		62.30-63.00
		Mørk grovk.vekslende m/hbl-førende biot.gn. god malm.		0.82	0.34	3.60	12.7/0.10		63.00-64.20
				1.25	0.64	8.88	16.7/0.20		64.20-65.50
65.50 - 75.00	9.50	biot.gn.	40-020						
		Mørk mlk-grovk.flagig, tildels ondulerende Spr. gr.1-2 mm.Impr. <u>Py.</u>							
75.00 - 77.70	2.70	biot.gn.	0-20	0.16	0.03	0.52	6.0/<0.10		75.00-76.30
		Se ovenfor. Str.impr. <u>Sl.</u>		0.93	0.38	5.04	18.6/0.15		76.30-77.70
77.70 - 89.40	11.70	biot.gn.	0-20						
		Mørk mlk.svakt hbl-førende enstaka dm tykke hbl.band m/gr.1-3 mm.Svak impr. <u>Py.</u>	20-45						
89.40 - 94.40	5.00	biot.gn.	45-50						
		Se ovenfor. m/impr. <u>Py.</u>							

14.7.1981
Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.130

Dato: Juli -87

Koordinater: X: 925.479,2 Y: 44.134,2

Retning: N

Helling/stigning: -17°

Høyde: -32,2 m.o.h.

Lengde: 20.0 m

Borehull: 1328

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grovmlk.impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py. (Lys Sl.)</u> Foldet.	0-20	0.52	0.15	4.52	g/tAgAu 13.2/0.10	8.1	
0.60 - 1.50	0.90	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk,litt veksl m/grå gn.band,svak impr. <u>Py. spor Sl.</u>	15-20	0.07	0.14	0.29	2.7/<0.10	3.6	
1.50 - 2.25	0.75	biot.gn. Rel.mørk mlk.m/grå gn. skarn,foldet litt brec- ciert rik <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> (klysete)	0-	0.35	1.98	5.52	39.5/1.76	8.1	
2.25 - 6.30	4.05	grå gn. lys mlk.slake folder, sprette gr.1-3 mm.	0-30	0.03	0.06	0.01	4.1/0.49	1.5	2.25-4.25
6.30 - 6.45	0.15	" " lys mlk.slake folder. sprette gr.1-3 mm m/smal langsgående biot.gn.band m/spor <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	10	0.35	0.03	0.02	12.2/0.18	1.3	4.25-6.30
6.45 - 12.20	5.65	grå gn. lys mlk.sprette gr.1-3 mm Ved 8.40-8.60 m pegm, slake folder.	10-45	0.39 0.02 0.02	0.03 0.01 <0.01	0.06 0.02 0.02	12.3/<0.10 0.5/<0.10 0.6/<0.10	1.5 1.5 1.5	6.45-8.40 8.40-10.40 10.40-12.20
12.20 - 13.40	1.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk.gr-rik 1-4 mm	45	0.02	0.01	0.04	0.8/<0.10	4.0	
13.40 - 19.55	6.15	grå gn. lys mlk,sprette gr.	10-35	0.02 0.02	<0.01 <0.01	0.02 0.02	0.2/<0.10 0.1/<0.10	1.6 1.4	13.40-16.40 16.40-19.55

5.7.87

Stellan Burman

Lokalitet: 44.130

Dato: Juni -87

Koordinater: X: 925.470,5 Y: 44.130,5

Retning: S

Helling/stigning: +60°

Høyde: -27.9 m.o.h.

Lengde: 10.0 m

Splittet + Arkivert

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	grå gn. lys mlk.sprette gr.1-3mm	80	0.02	<0.01	0.02	0.5/<0.10	1.4	
1.20 - 1.45	0.25	biot.gn. Mørk mlk m/gr.1-2 mm	80	0.37	0.05	0.02	2.9/<0.10	4.8	
1.45 - 3.15	1.70	hbl.gn. Mørk mlk.växl m/Amf.band delvis gr.rik,svak impr. Py. Fra 1.60-1.80 sprekk- fylling av Cp. runde fol- der ved 2.80 m m/cm smale pegm.band.	60-90 0-10 70-80	1.89	0.87	0.02	169.0/2.48	2.5	
3.15 - 6.75	3.60	biot.gn.D type Mørk mlk.gr-førende 1-2 mm,impr. Py. mot slutten musk.	70-80	0.03 0.01	0.04 0.01	0.03 0.02	2.4/<0.10 1.2/<0.10	5.9 6.4	3.15-5.00 5.00-6.75
6.75 - 10.00	3.25	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm,i starten foldet m/ smale pegm.årer.(svakt bøsatt m/gulaktig skarn?)	0-80	0.02	0.02	0.02	1.2/<0.10	3.6	

26.06.87

Stellan Burman

Lokalitet: 44.130

Borehull: 1326

Dato: Juni -87

Koordinater: X: 925.478,8 Y: 41.132,0

Retning: S

Helling/stigning: +45°

Høyde: -28,5 m.o.h.

Lengde: 10.00 m

Splittet + Arkivert

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	grå gn. Lys mlk.litt veksl m/småle biot.d.band, mot slutten musk.sprette gr.1-2 mm.	40-45	0.03	0.03	0.05	1.6/<0.10	2.5	
1.20 - 2.10	0.90	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grovmlk.enkelte små pegmatitiske band m/hbl.oggr. Impr. <u>Py.</u> Foldet.	50-80	0.82	0.30	0.04	97.0/3.23	5.0	
2.10 - 2.30	0.20	Pegm. m/ <u>Gn.</u> <u>Py.</u>		22.49	0.14	0.03	388.0/4.13	2.7	
2.30 - 3.45	1.15	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grovmlk.impr. <u>Py.</u> 70 gr.1-3 mm.	70	0.60	0.19	0.04	26.9/0.30	6.6	
3.45 - 5.60	2.15	hbl.gn. Mørk mlk.delvis foldet. gr-rik 2-5 mm, stictolittisk.	60-70	0.02	0.01	0.03	1.3/<0.10	2.3	
5.60 - 6.40	0.80	hbl.biot.gn. Mørk mlk. Impr. <u>Py.</u> sprette små gr.1-2 mm.	45-50	0.02	0.01	0.04	2.0/<0.10	6.6	
6.40 - 10.00	3.60	hbl.gn. Mørk mlk.m/småle amfibolittiske og pegmatitiske band, sprette gr.1-2 mm.	60-80	0.02 0.03	0.02 0.02	0.03 0.04	1.7/<0.10 1.1/<0.10	4.8 4.0	6.40-7.20 7.20-10.00

29.06.87

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.120

Borehull: 1325

Dato: Juni -87

Koordinater: X: 925.468,5 Y: 44.134,2

Retning: S

Helling/stigning: -19°

Høyde: -32,3 m.o.h.

Lengde: 10.00 m

Splittet + arkivert

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	grå gn.b.d.	0-5	1.39	0.55	3.06	21.9/ 0.15	6.2	
0.90 - 1.75	0.85	Malm skarn		2.98	0.87	11.08	43.5/0.15	9.0	
1.75 - 6.20	4.45	Biot.gn.	0-10	1.94 0.41	0.36 0.26	2.07 1.09	33.4/0.10 9.7/0.10	4.8 5.0	1.75-3.75 3.75-6.20
6.20 - 6.90	0.70	hbl.gn.	0 0-45	0.03	0.04	0.20	2.6/0.10	3.8	
6.90 - 8.20	1.30	biot.gn.	0-10	0.11	0.08	0.58	4.6/0.10	5.4	
8.20 - 10.00	1.80	grå gn.b.d.	0-20	0.12	0.06	0.27	5.8/0.10	4.1	

02.07.87

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.120

Borehull: 1324

Dato

Juni -87

Koordinater

X: 925.472,5 Y: 44.133,1

Retning

S

Helling/stigning:

-52°

Høyde

-32,7 m.o.h.

Lengde

:

side 1

Splittet + Arkivert

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	biot.gn. Mørk mlk,veksl m/hbl.gn. band amfibolitiske,spor Py.	40-45	0.18	0.06	0.38	g/tAgAu 6.3/0.10	2.8	0.00-1.20
1.20 - 2.20	1.00	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.mot slutten overgang til biot.gn. m/spor hbl.Spor Py.	40	0.03	0.04	0.06	2.3/<0.10	3.5	1.20-2.20
2.20 - 2.60	0.40	Amf. Mørk mlk-fin,smale peg- matitiske årer. Svak impr. Py. Cp.?	40-45	0.03	0.05	0.08	3.2/<0.10	3.2	2.20-2.60
2.60 - 3.90	1.30	grå gn. Rel.lys mlk.veksl m/biot. gn.svak impr. Py. före- trädesvis i de biot.rikere partiener.	45	0.04	0.03	0.22	2.4/<0.10	3.1	2.60-3.90
3.90 - 4.25	0.35	biot.gn. Mørk mlk.rik malm i star- ten siden impr.	45	1.75	0.44	4.72	49.7/0.25	6.1	3.90-4.25
4.25 - 5.00	0.75	hbl.gn. Mørk mlk.variert m/hbl. biot.litt pegm.mot slut- ten amfibolitisk.		0.77	0.33	0.08	26.8/0.35	4.3	4.25-5.00
5.00 - 6.40	1.40	biot.hbl.gn. Mørk mlk.foldet.glide- flater 30° ved 5.50-5.60 m.Svak impr.Py.Cp. Spor Sl.	70-80 0-10	0.16	0.16	0.34	13.1/0.10	5.6	5.00-6.40
6.40 - 6.80	0.40	hbl.gn. Mørk mlk.5 cm pegm.i slutten m/Py.	70-80	1.83	0.54	0.06	119.0/ 2.65	2.9	6.40-6.80
6.80 - 7.30	0.50	biot.gn. Mørk mlk.spor Py.	70	0.04	0.11	0.17	4.1/<0.10	4.0	6.80-7.30
7.30 - 9.20	1.90	skærn Lys grønn veks m/biot. band,sprett Py.Cp.Sl.Gn.	40-60	0.21	0.20	1.14	6.1/<0.10	3.6	7.30-9.20

....2

Lokalitet:

Borehull: 1324

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
9.20 - 14.50	5.30	grå gn. Lys mlk.enkelte smale biot.rikere band ved 13.40-13.50 pegm. Fra 10.00-10.60 foldet,svake spor <u>Py.</u>	45-60	0.01	0.02	0.05	1.1/<0.10	1.6	9.20-12.00
				0.07	0.04	0.17	2.6/<0.10	1.9	12.00-14.50
14.50 - 17.20	2.70	musk.gn. Lys mlk-grovmlk.litt veksl .../grå gn,musk.biot. gn.svak impr.og sprette tynne skikt m/ <u>Sl.Cp.Gn.</u> <u>Py.</u>	55-50	0.69	0.17	1.30	18.9/0.45	3.5	14.50-15.50
				0.35	0.11	0.67	7.3/0.45	2.7	15.50-17.20
17.20 - 19.00	1.80	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.delvis biot. gn.aktig.Spor <u>Py.</u>	45	0.07	0.06	0.17	4.7/<0.10	3.7	17.20-19.00

25.06.87

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.120

Dato: Juni -87

Koordinater: X: 925.474,0 Y: 44.132,7

Retning: S

Helling/stigning: -70°

Høyde: -32,3 m.o.h.

Lengde: 19.50 m

Borehull: 1323

side 1

Splitte + Arkiver

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	biot.gn. Mørk mlk.spor <u>Py</u> . Ved 0.15-0.20 skarn m/svak impr. <u>Py</u> .	55	0.06	0.04	0.18	3.2/<0.10	3.0	
0.50 - 0.75	0.25	skarn Grønn (Diops skarn ?) svak impr. <u>Py</u> .	70	0.01	0.02	0.02	2.1/<0.10	3.2	
0.75 - 3.05	2.30	biot.gn. Mørk mlk-grov-mlk.Litt vaks m/biot.musk.gn. Enstaka smale skarnband. Fra 2.40 foldet brecciert m/innslag av skarn,svak impr. <u>Py</u> . spor <u>Sl</u> .Cp.	0-45	0.16	0.11	1.19	7.2/<0.10	3.9	
3.05 - 5.30	2.25	hbl.biot.gn. Rel.mørk mlk.Veksl m/grå gn.aktige band,biot.gn., biot.hbl.gn, gr.1-3 mm sprett impr. <u>Py</u> .Spor <u>Cp</u> . Foldet.	40-80	0.03	0.07	0.23	3.2/<0.10	4.8	
5.30 - 7.65	2.35	musk.gn. Lys mlk.Foldet.Impr. <u>Py</u> .	50-60	0.40	0.24	0.92	15.9/0.25	4.2	
7.65 - 11.00	3.35	musk.biot.gn. Rel.lys mlk.veksl m/smale biot.musk.band.Impr. <u>Py</u> . Spor <u>Sl</u> . Fra 10.60 overgang til biot.musk.gn. m/rik impr. <u>Sl</u> .Cp.Gn. <u>Py</u> . (lys <u>Sl</u> .)	50-60	0.30 0.36	0.16 0.09	1.21 3.77	14.3/0.10 14.6/<0.10	5.0 8.6	7.65-10.60 10.60-11.00
11.00 - 11.30	0.30	biot.gn. (biot.musk.) Mørk mlk-grov,litt ondu- lerad,Brecciert,impr. <u>Py</u> .Cp. <u>Sl</u> .Gn.	45	0.86	0.26	1.63	51.0/1.00	7.8	
11.30 - 11.40	0.10	skarn Rik Gn. <u>Py</u> .Cp.		6.11	1.09	0.69	282.0/0.95	6.5	
11.40 - 13.40	2.00	grå gn. Lys mlk-grov mlk.veksl. m/biot.skikt,og band. partier m/ <u>Sl</u> .Cp.Gn. <u>Py</u> .	30-45	0.54	0.17	1.15	19.5/0.45	3.5	

.....2

Borehull: 1323

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.40 - 19.50	6.10	grå gn. lys mlk.foldet,enstaka opp til dm tykke pegm. band,sprette spor <u>Sl.Gn.</u>	45	0.48 0.12 0.27	0.36 0.26 0.09	0.89 0.20 0.28	40.6/1.85 12.9/0.45 17.1/0.50	4.7 1.7 1.6	13.40-15.40 15.40-17.40 17.40-19.50
		24.06.87 Stellan Burman							

Lokalitet: 44.130

Borehull: 1322

Dato: Juni -87

Koordinater : X: 925.475,9 Y: 44.131,1

Retning : S

Helling/stigning: -85°

Høyde : - 32,6 m.o.h.

Lengde : 20.00 m

Splittet + Arkivert

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
0.00 - 1.55	1.55	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.litt växl m/ smale biot.gn.band.Fr. 0.00-0.20 Sl.(Lys Sl.) resten svak impr.Py. ens- taka gr.1-2 mm.	45-60	0.87	0.17	1.76	23.8/ 0.15	4.7	0.00-1.55
1.55 - 2.30	0.75	biot.gn.	Mørk mlk-grov-mlk,litt D type-aktig,i starten skarn,impr.Py.spor Sl. Cp.Gn.	45-60	0.54	0.34	1.93	16.2/ 0.10	5.8	1.55-2.30
2.30 - 3.85	1.55	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.växl m/skarn band i halve kjernen. Foldet.	0-60	0.11	0.13	0.67	5.4/ 0.10	2.9	2.30-3.85
3.85 - 4.85	1.00	hbl.gn.	Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm.Rund fold.	60-70 0-5	<0.01	0.02	0.02	1.6/ <0.10	3.2	3.85-4.85
4.85 - 5.65	0.80	biot.gn.	Mørk mlk.foldet.Fr.5.00- 5.10 biot. m/Sl.Cp.Gn.Py.	0-40	0.34	0.31	0.68	10.5/ 0.10	5.0	4.85-5.65
5.65 - 7.05	1.40	skarn	Grønn foldet,ved 6.65 glide yta.Sl.Cp.Gn.Py. ved 7.00-7.05.		0.19	0.08	0.35	5.9/ <0.10	4.1	5.65-7.05
7.05 - 8.60	1.55	grå gn.	Lys mlk.	70-65	<0.01	0.01	0.08	0.2/<0.10	1.7	7.05-8.60
8.60 - 9.50	0.90	biot.gn.	Mørk mlk-grovk.Brecciert delvis pegmatitisk. Py. spor Sl.		0.15	0.15	0.70	6.3/ <0.10	2.9	8.60-9.50
9.50 - 11.20	1.70	grå gn.	Lys mlk.Fr.9.90-10.40 växl/cm/pegm.band,sprette gr.1-3 mm.	70-80	<0.01	0.01	0.02	0.8/ <0.10	1.1	9.50-11.20
11.20 - 12.30	1.10	hbl.gn.	Mørk mlk-grovk.gr.1-3mm Foldet.	40-70	<0.01	<0.01	0.02	1.9/ <0.10	3.0	11.20-12.30

.....2

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1322

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
12.30 - 13.80	1.50	grå gn. Lys mlk i starten skarn m/Py.Cp.Slake folder.	10-35	<0.01	0.02	0.02	0.7/ <0.10	1.6	12.30-13.80
13.80 - 14.40	0.60	Pegm.		0.01	<0.01	0.01	<0.1/ <0.10	0.4	13.80-14.40
14.40 - 17.30	2.90	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov-mlk.foldet sprette gr.1-3 mm.Ved 15.60-15.80 skarn. (innfoldet) 0 ⁰	45-70	<0.01	<0.01	0.02	1.1/<0.10	3.3	14.40-15.80
				<0.01	<0.01	0.02	1.7/<0.10	2.8	15.80-17.30
17.30 - 20.00	2.70	grå gn Lys mlk.i starten smale pegm.band,sprett gr.1-2 mm.	70-80	0.01	0.01	0.04	2.6/<0.10	1.9	17.30-20.00

23.06.87

Stellan Burman

Lokalitet: 44.130

Borchull: 1321

Dato: Juni -87

Koordinater: X: 925.478,0 Y: 44.134,2

Retning: N

Helling/stigning: -85°

Høyde: -32.6 m.o.h.

Lengde: 20.0 m

Splittet + Arkivert

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.45	2.45	Musk.biot.gn. Rel.lys mlk.enkelte skarn førende band, ved 0.60- 0.70 Pegm.band, rik impr. Py.Sl.Cp.Gn. til 1.60 resten impr.Sl.Cp.Gn.Py. (Lys Sl.) Fra 1.20-2.20-2.30 rik malm, åpne folder 0-60°	65 80	1.28	0.21	4.68	34.1/0.30	5.4	0.00-1.60
				0.56	0.40	2.05	17.3/0.30	4.5	1.60-2.45
2.45 - 3.00	0.55	Musk.gn. Rel.lys mlk.biot-førende overgang til grå gn-aktig impr.Py.spor Sl. fore- trådesvis i de biot.rik- ere band, noe foldet i starten.	35-0 75	0.09	0.16	0.57	5.3/<0.10	3.3	2.45-3.00
3.00 - 3.90	0.90	grå gn. Lys mlk.delvis musk.gn- aktig, sprette gr.1-3mm. Fra 3.25 åpne folder m/ Pegm.band.Ved 3.45-3.55 biot.rik m/rik malm impr. Lys Sl. Åpne folder.	75 0-75	0.13	0.08	0.42	2.9/<0.10	2.3	3.00-3.90
3.90 - 4.80	0.90	biot.gn. Rel.mørk mlk.Spor hbl. rik impr. malm.Lys Sl. Åpne folder.		1.24	0.26	2.88	21.8/0.45	6.2	3.90-4.80
4.80 - 5.00	0.20	grå gn. Lys mlk.musk.rik, impr. Sl.Cp.Gn.Py.Siste 2 cm rik lys Sl.	75-80	0.76	0.22	1.45	16.6/0.15	4.2	4.80-5.00
5.00 - 6.00	1.00	grå gn. Lys mlk.rel.musk.rik noe sprett gr.2 mm, spor Py. ved 5.45 2 cm Sl.Cp.Gn. Py. Fra 5.75 smale musk. gn.band m/ Py.	40 60 50-60	0.05	0.05	0.23	1.6/<0.10	1.6	5.00-6.00
		2							

Lokalitet:

Borehull: 1321

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
6.00 - 6.60	0.60	biot.gn. Mørk mlk-grovk. Musk-før-ende spor Sl.Py. i starten 4 cm rik-middels Sl.Cp. Py. Foldet.	0-50	0.21	0.50	2.81	15.1/0.20	4.6	6.00-6.60
6.60 - 9.50	2.90	grå gn. Lys mlk.enkelte biot. rikere partier, noe gr. 1-3 mm.	50-60 40	0.21	0.08	0.06	53.5/2.75	1.4	6.60-9.50
9.50 - 10.05	0.55	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl gl-innhold, gr. 2-4 mm. Fra 9.55-9.70 svak impr. Sl.Py. I starten foldet.	50 35	0.06	0.09	0.15	2.6/<0.10	2.7	9.50-10.05
10.05 - 10.45	0.40	Pegm. Ved 10.35-10.39 m biot.gn. band m/rik Sl.Cp.Gn.Py.	ca.45	0.12	0.04	0.22	2.5/<0.10	0.9	10.05-10.45
10.45 - 10.55	0.10	biot.gn. Som ovenfor.	35-60	0.28	0.26	2.47	12.6/0.10	3.1	10.45-10.55
10.55 - 12.50	1.95	grå gn. Lys mlk.litt etter hvert biot.preget gr. 1-3 mm. Foldet.	0-30	0.04	0.02	0.11	1.5/<0.10	1.7	10.55-12.50
12.50 - 13.00	0.50	grå gn.biot.rik Rel.mørk fin.mlk.gr-aggregater, tildels store 1-10 mm. Foldet.	0-30	0.03	0.01	0.03	0.4/<0.10	2.2	12.50-13.00
13.00 - 15.80	2.80	grå gn.b.p. Lys mlk.enkelte biot. rikere band. 13.30-13.50 innfoldet biot.band, sprete gr. 1-3 mm. sticks 15°. Fra 14.20-14.35 m. Sticks (sticks en liten forkastning) Fra 14.80 åpne folder	50 60-50 0-60	0.03	0.01	0.05	1.7/<0.10	1.6	13.00-15.80
15.80 - 16.55	0.85	biot.hbl.gn. Mørk fin-mlk.foldet spor kis ved 16.20-16.25 rik Py.Po. 16.50-55 rik Sl.Py.	0-80	0.26	0.08	0.70	9.2/0.10	6.3	15.80-16.55

.....3

Lokalitet:

Borehull: 1321

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
16.55 - 20.00	3.45	grå gn. Lys mlk.noe gr.1-3 mm. Ved 18.15 2 cm biot.rik- ere striper Ved 18.55-65 Pegm.Fra 18.15-18.55 fol- det, små runde folder, enstaka musk.rikere band.	60				g/tAgAu		
				0.03	0.01	0.03	1.1/<0.10	1.4	16.55-18.50
				0.03	0.01	0.03	0.4/<0.10	1.2	18.50-20.00
19.06.87									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 41.370

Dato: April -87

Koordinator

Retning: N

Helling/stigning: +17°

Høyde:

Lengde:

Borehull: 1317

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grovk.spor skarn, impr.striper <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u>	45	0,47	0,75	2,45		7,3	
1.20 - 4.80	3.60	kjernetap							
4.80 - 6.00	1.20	biot.gn. Rel.mørk mlk.impr. <u>Py.Sl.</u> <u>Cp.Gn.?</u>	30-40	0,03	0,29	0,19		11,3	
6.00 - 30.70	24.70	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm enkelte dm tykke kv.band slake folder	30 0 30						
30.70 - 31.00	0.30	kv.pegm.							
31.00 - 34.10	3.10	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov-mlk.god malm, tett foldet, brecciert		0,31	0,55	4,00		12,6	31.00-32.50
				0,10	1,31	6,28		19,9	32.50-34.10
34.10 - 38.60	4.50	musk.biot.gn. Rel.lys mlk,delvis skarn-førende, stripet impr. <u>Py.Sl.Cp.Gn.</u>	0-20	0,20	0,14	3,80		16,2	34.10-35.50
				0,36	0,33	1,92		7,9	35.50-37.00
				0,18	0,19	2,07		4,7	
38.60 - 40.60	2.00	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov-mlk.foldet brecciert rik malm.		0,21	0,38	4,56		15,9	
40.60 - 47.20	6.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.litt växl m/musk.biot.gn,delvis svakt <u>Py.impr.</u>	0-20						
47.20 - 48.00	0.80	kjernetap.							
48.00 - 49.20	1.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk.komp.malm stripe ca.1 cm tykk langsgående (i skyveplanet)	0-10						

18.01.87

Stellan Burman

Lokalitet: 41.380 (oppbevart)

Dato : Mars -87

Koordinater

Retning : opp

Helling/stigning: +90°

Høyde :

Lengde : 78,70 m.

Borehull: 1316

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser ^{Ag/Au}					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.90	3.90	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk.veksl.m/grå gn.band,sprette gr.1-3mm litt brecciert,spor <u>Py.</u> Po.Cp. skarn.	70-80						
3.90 - 6.50	2.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.veksl.m/biot gn.skikt,hbl-førende,spor <u>Py.</u> sprette gr.	80-90						
6.50 - 20.50	14.00	biot.gn. Rel.mørk mlk.delvis hbl. førende veks. m/grå gn. band og enstaka hbl.gn. band,sprette gr.1-3 mm enkelte større 3-5 mm. Spor <u>Py.</u> Foldet.	70-80						
20.50 - 30.50	10.00	grå gn.b.d. Rel.lys mlk,sprette biot skikt,enstaka hbl.gn.band sprette gr.1-3 mm,svakt <u>Py.</u> impr.företrädesvis i biot.gn.	60-70 v						
30.50 - 40.70	10.20	biot.gn. Mørk mlk,delvis hbl.førende,foldet,skarnband,svak impr. <u>Py.</u> i skarn band rikere.	ca 60-70	0.03	0.04	0.09	17/<0.1	5.3	30.50-38.00
				0.14	0.09	0.10	94/0.15	5.3	38.00-39.50
				0.08	0.06	0.07	70/0.15	4.8	39.50-40.70
40.70 - 45.90	5.20	biot.musk.gn. Rel.mørk veks. m/skarn-band,spor hbl.Pegm.fra 43.70-43.90,impr. <u>Py.</u> foldet m/runde folder.	60-70 v	0.49	0.19	0.12	38.4/0.80	5.5	40.70-42.00
				0.04	0.05	0.10	4.2/<0.1		42.00-45.90
45.90 - 57.70	11.80	grå gn.b.d. Rel.lys mlk,enkelte opp-til dm tykke pegm.band og hbl.biot.gn.band. mot slutten sprette gr. 1-3 mm,svak impr. <u>Py.</u>	70-90						

Lokalitet:

Borehull: 1316

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser $A_{\text{Ag}}/A_{\text{Au}}$					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
57.70 - 59.00	1.30	kjernetap							
59.00 - 76.90	17.90	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm Py. som sprette spor.							
76.90 - 78.00	1.10	pegm. m/biot. flak og skikt.		0.02	0.01	0.02	2.0 0.1	1.1	
78.00 - 78.70	0.70	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm	60-70						

22.04.87

Stellan Burman

Lokalitet: 41.380

Dato : Feb.-87

Koordinator : X: 925.313,2 Y: 41.374,0

Retning : S

Borehull: 1314

Helling/stigning: -17°

Høyde : -10.1 m.o.h.

Lengde : 53.70 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S g/t AgAu	% Fe	
0.00 - 4.70	4.70	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grovmk.ondulerende impr.Py.Ved 0.90 Sl.	5-10	0.11	0.04	0.19	3.9/0.15	7.6	3.70-4.70
4.70 - 14.40	9.70	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grovmk.ondulerende impr.Py.Ved 0.90 Sl.Stripet impr. Sl.Cp. Gn.Py.	5-10	1.02	0.12	5.32	13.4/0.2	6.9	4.70-6.30
				0.26	0.07	2.48	6.8/0.3	7.1	6.30-8.00
				0.40	0.11	1.33	9.4/0.3	6.8	8.00-9.70
				0.25	0.08	1.03	7.5/0.35	6.5	9.70-11.40
				0.35	0.15	2.60	9.4/0.15	7.4	11.40-13.10
				0.62	0.37	2.05	15.9/0.3	7.5	13.10-14.40
14.40 - 23.30	8.90	biot.gn.(sk) Mørk grovk.foldet delvis brecciert stedvis rik malm	5-10	0.13	0.59	1.27	10.5/0.3	12.0	14.40-16.00
				0.22	0.50	1.41	10.5/0.3	8.7	16.00-17.70
				3.39	0.17	15.12	41.4/0.25	9.3	17.70-19.60
				0.24	0.22	0.92	6.7/0.1	6.9	19.60-21.00
				0.03	0.18	0.25	5.8/0.1	7.3	21.00-23.30
23.30 - 24.70	1.40	biot.hbl.gn. Mørk mlk.delvis musk.gn. band,svak impr.Py.spor Sl.	10-20	0.22	0.19	0.60	10.2/0.1	4.2	
24.70 - 41.70	17.00	hbl.biot.gn. Mørk mlk.litt växl m/hbl. gn.gr-rik,svak impr.Py.i de biot.rikere partiene Ved 29.20 Sl. Slake folder.	10-20 0 10-20	0.16	0.09	0.06	6.4/0.15	5.1	40.70-41.70
41.70 - 44.90	3.20	biot.musk.gn. Mørk mlk-grovk.ondulerad spor hbl.impr.Py.Sl.Cp.Gn.	10-20	0.10	0.12	0.54	9.1/0.1	5.6	41.70-43.20
				0.30	0.06	1.05	11.0/0.1	5.3	43.20-44.90
44.90 - 48.00	3.10	biot.musk.gn. Mørk mlk-grovk.ondulerad spor hbl.impr.Py.Sl.Cp.Gn. m/svak impr. Py.	10-20	2.10	0.04	0.04	2.8/0.1	4.7	44.90-46.50
48.00 - 53.70	5.70	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3mm. litt växl m/smale hbl.biot. gn.band.							
20.02.87 Stellan Burman									

Lokalitet: 41.380

Borehull: 1313

Dato : Feb.-87

Koordinater : X: 925.314,8 Y: 41.374,7

Retning : S

Helling/stigning: +80°

Høyde : -5.5 m.o.h.

Lengde : 101.30 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	Fe	%	
0.00 - 10.70	10.70	grå gn.b.d.	Rel.mørk mlk.skiktad og tildels växl m/biot.gn. delvis pegmatitisk,brecciert enkelte store gr. 35-50 1-6 mm,spor Py,ved 2.30 m: Co.som sprekkfyllinger foldet.					9/6 29/25	
10.70 - 15.70	5.00	biot.gn.	Mørk mlk-grovmk.brecciert pegmatitisk växl m/opp 40-70 til 5 cm tykke grå gn. band,spor hbl.foldet "slirig",enkelte gr.1-3mm Py. og Po. som klyser og sprekkfyllinger på enkelte steder.						
15.70 - 21.00	5.30	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm,mot slutten overgang til biot.gn. 60-70						
21.00 - 31.40	10.40	biot.gn.	Mørk mlk.litt variert m/biot.musk.gn.m/spor hbl. svak impr. Py.Foldet m/små runde folder. 70-80						
31.40 - 60.20	28.80	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band,enkelte hbl-førende,svak impr. Py.företrädesvis i biot.gn.banden spor Sl. ved 47.90 m. Komp. Py. 52.70-52.80 m. 70-80						
60.20 - 70.30	10.10	biot.gn.	Mørk mlk.växl m/biot,biot. hbl.grå gn.band.Foldet. Fr.60.30-60.40 Py. som klyser,klumper. 45-70	0.42	0.24	0.10	9.6	17.4/0.40	60.20-61.40
			2						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1313

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% Ag/Au	% Fe	
70.30 - 77.80	7.50	grå gn.	Rel. lys mlk.sprette gr. 1-3 mm, enkelte biot.gn. band m/spor hbl. Ved 75.30- 75.35 komp. <u>Py.</u>	60-70					
77.80 - 87.10	9.70	biot.gn.	Mørk mlk.växl m/biot.hbl. gn.band m/gr.1-3 mm og <u>Py.</u> Foldet.	50-50					
87.10 - 89.90	2.80	hbl.biot.gn.	Mørk mlk-grov-mlk.delvis brecciert impr. <u>Py.</u> Cp.	80	0.06	0.17	0.06	8.2/0.10	7.1
					0.57	0.59	0.07	80.5/7.35	6.5
89.90 - 95.00	5.10	grå gn.	Rel. lys mlk.sprette gr. 1-3 mm.litt växl m/smale hbl.biot.gn.band m/svak impr. <u>Py.</u>	70-80					
95.00 - 96.90	1.90	biot.sk.	Mørk grovk,slirig <u>Py.</u> Cp?	80					
96.90 - 98.40	1.50	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	70	0.02	0.10	0.10	3.3/0.10	8.6
98.40 - 99.10	0.70	biot.sk.	Mørk mlk-grov.brecciert sprette gr.1-3 mm. <u>Py.</u> Po.	70	0.02	0.15	0.09	5.5/0.10	12.8
99.10 - 101.30	2.20	hbl.biot.gn.	Mørk mlk.sprette gr.1-3mm svak impr. <u>Py.</u>						

17.03.87

Stellan Burman

Lokalitet: 41.490

(Arkivert fr. kasse 3)

Dato

Januar 1987

Koordinater

X: 925,331,2 Y: 41.488,2

Retning

S

Helling/stigning: +75°

Høyde

- 11,5 moh.

Lengde

97,30 m.

Borehull: 1312

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.60	3.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/opp til 5 cm tykke biot.gn. band,sprette gr.1-3 mm. Ved 2.50-2.70 rund fold.	70-80 >				g/tAgAu		
3.60 - 4.90	1.30	biot.gn. Pegmatitisk Mørk grovk.enstaka smale skarnførende band,sprette gr.1-3 mm.Ved 3.80 Po. " 4.80 "	70-80						
4.90 - 8.00	3.10	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	70-80						
8.00 - 16.50	8.50	biot.gn. Mørk mlk.litt variert m/ grå gn.b.d.Sprette gr. 1-3 mm, spor Py.	60 70 60						
16.50 - 19.00	2.50	biot.gn/biot.sk. Mørk mlk,foldet,delvis pegmatitisk,og brecciert. Svak impr.Py.spor Cp.Sl. Sl. fra 18.00-18.30.	60-70	0.07 0.45 0.30	0.09 0.11 0.19	0.25 1.50 0.38	3.6/0.10 10.0/0.2 7.1/0.3	6.6 7.6 5.8	16.50-18.00 18.00-18.30 18.30-19.00
19.00 - 21.60	2.60	biot.gn. Mørk mlk.delvis skiktad. Spor Py.	60						
21.60 - 22.30	0.70	hbl.gn. (hbl.biot.gn) Mørk mlk-fink.Fra 21.75-21.80 m Sl.Cp.Gn.Py.							
22.30 - 24.30	2.00	biot.gn. Mørk mlk-grovk.delvis pegmatitisk og brecciert. Fra 23.30-35 Sl.	60-70						
24.30 - 25.20	0.90	hbl.gn. Mørk mlk-fink.Amfibolitisk,rund fold	60-70 > 60						
25.20 - 26.40	1.20	biot.gn. Mørk mlk.litt pegmatitisk delvis skiktad Spor Py.	50-60						
.....2									

Lokalitet:

Borehull: 1312

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
26.40 - 34.30	7.90	grå gn.b.d.	Lys mlk.växl m/enkelte biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm,spor hbl.Fra 31.00-31.20 småfolder.				g/tAgAu		
34.30 - 38.50	4.20	biot.hbl.gn.	Mørk mlk-grovmlk.impr.Py.						
38.50 - 40.00	1.50	musk.biot.gn.	Lys mlk.övergang til musk.gn.impr.Py. (spor hbl.?)						
40.00 - 42.30	2.30	musk.gn.	Lys mlk-fink.kv-rik.Til-dels kvartsitisk,impr. Py.spor Sl. (Lys Sl.)	0.42 0.28	0.19 0.11	0.23 0.54	31.7/1.15 16.9/0.35	6.1 5.2	40.00-41.00 41.00-42.30
42.30 - 43.90	1.60	kjernetap							
43.90 - 55.40	11.50	grå gn.	Lys mlk.enstaka biot.hbl.ca. 70 gn.band,enkelte små gr. spor Py. delvis foldet ved 53.70 Po.						
55.40 - 60.00	4.60	biot.gn.	Mørk mlk.enkelte grå gn. biot.musk.gn.foldet, sprett impr. Py.						
60.00 - 63.60	3.60	biot.gn. (biot.musk.gn.)	Mørk mlk.meget foldet, enkelte gr.1-3 mm,impr. Py.Cp.Gn. som enstaka klyser.	0.43	0.17	0.11	15.0/0.25	5.9	62.60-63.60
63.60 - 65.20	1.60	biot.gn.	Mørk mlk-grovk.foldet skarn impr.Cp.Pv.Po.	0.40	0.47	0.63	16.6/0.4	9.4	63.60-65.20
65.20 - 67.50	2.30	grå gn.	Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band,sprette gr.1-3mm svak impr. Py. Py. före-trädersvis i biot.gn.						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1312

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
67.50 - 68.00	0.50	kjernetap.					g/t AgAu		
68.00 - 70.20	2.20	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band m/sprette gr.Svak impr. <u>Py.</u> foldet.	60-70 >						
70.20 - 71.20	1.00	kjernetap.							
71.20 - 71.80	0.60	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm spisse folder.	70 70						
71.80 - 72.50	0.70	biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.svak impr. <u>Py.</u>	70						
72.50 - 73.80	1.30	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band m/impr. <u>Py.</u> sprette gr.	60-70						
73.80 - 74.30	0.50	kjernetap.							
74.30 - 83.70	9.40	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.b.d.foldet, ved 79.30 <u>Sl.</u> " 79.50 <u>Sl.</u> " 80.20-80.30 <u>Sl.</u>	ca 70-60 }	0.32	0.36	1.55	7.7/0.15	5.4	79.30-80.30
83.70 - 95.60	11.90	biot.hbl.gn. Mørk mlk.växl m/småle grå gn,hbl.gn.band m/ gr.1-3 mm,svak impr. <u>Py.</u> i de biot.rikere partier.	70-80						
95.60 - 97.30	1.70	biot.gn. Mørk mlk-grovk.impr. <u>Py.</u>	60 50						

16.02.87

Stellan Burman

Lokalitet: 41.580

Borehull: 1311

Dato : Jan.-87
Koordinater : 925.329,4 Y: 41.582,8
Retning : S
Helling/stigning: -65°
Høyde : + 6,8 m o h.
Lengde : - 8,5 m .

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.30	8.30	Biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band dm tykke, samt enkelte cm tykke hbl.biot.band. ca.45 Fra 3.60-3.80 m smale skikt <u>Sl.Py.Cp.</u> Foldet. 16.01.1987 Stellan Burman							

Lokalitet: 41.580

Borehull: 1310

Dato : Jan.-87
Koordinater : X: 925.331,8 Y: 41.582,5
Retning : N
Helling/stigning: +80°
Høyde : + 11.5 m.o.h.
Lengde : 29.40 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	grå gn. Lys mlk.svak impr. <u>Py.</u> Spor <u>Sl.</u>	80	0,41	0,14	1,57		0,3	
1.10 - 4.00	2.90	biot.hbl.gn. Mørk mlk.rik impr. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	70	0,19	0,31	8,10		9,0	
4.00 - 7.00	3.00	grå gn. Lys mlk.sprette biot. skikt små gr. 1-2 mm.	80						
7.00 - 8.50	1.50	" " Lys mlk.sprette biot. skikt små gr. 1-2 mm. Samt <u>Sl.</u>	80-90	0,09	0,24	1,24		3,8	
8.50 - 12.20	3.70	" " Lys mlk.enkelte biot.gn. band hbl.førende,sprette gr.1-3 mm.	70-80						
12.20 - 15.40	3.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk.rik impr. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	80 70	0,03	0,15	0,26		3,4	11,20-12,20
15.40 - 18.50	3.10	grå gn. Lys mlk.litt växl m/dm tykke biot.gn.band,m/ svak impr. <u>Py.</u> spor <u>Sl.Po.</u>	80-90	0,11	0,43	8,0		8,5	
18.50 - 20.30	1.80	biot.gn. Mørk mlk.delvis hbl-før- ende, impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u>	80-80	0,04	0,16	0,47		4,9	12,40-17,00
20.30 - 24.80	4.50	grå gn. Lys mlk.enkelte opp til dm tykke biot.gn.band m/ <u>Py.</u> spor <u>Sl.</u> Ved 22.50 stokk fald	70 45 45	0,14	0,23	0,33		4,9	17,00-18,50
24.80 - 26.20	1.40	biot.gn. Mørk mlk-grovk,brecciert delvis pegmatitisk,spor hbl.skikt <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u>	70-90	0,50	0,42	1,39		11,8	
26.20 - 29.40	3.20	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm	80-90						
23.01.1987 Stellan Burman									

Lokalitet: 41.580

Borehull: 1309

Dato : Jan.-87
 Koordinator : X: 925.329,9 Y: 41.582,7
 Retning : S
 Helling/stigning: +65°
 Høyde : + 11.6 m.o.h.
 Lengde : 38.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	grå gn.	Lys mlk.rel.musk.rik, svak impr. <u>Py.Sl.</u>	60					
1.60 - 10.70	9.10	" "	Rel.lys mlk-grov-mlk. delvis musk.rik m/over- gang til musk.biot.gn. Svak impr. <u>Py.</u> Fra 8.20 slake folder.	60					
10.70 - 22.80	12.10	biot.musk.gn.	Mørk mlk-grov-mlk.S hbl.sprette gr.1-2 mm. impr. <u>Py.</u> Foldet	0-10					
22.80 - 30.70	6.90	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.växl m/biot. gn,biot.hbl.gn.band,enke- lte gr.1-3 mm,företräd- esvis i grå gn. Ved 27.20-30 <u>Sl.Gn.Py.</u>	50-60					
30.70 - 38.40	7.70	hbl.gn.	Mørk mlk.litt växl m/opp til dm tykke hbl.biot. gn.band.gr-førende 1-3 mm,svak impr. <u>Py.</u> företräd- esvis i hbl.biot.gn.	45-60					

27.01.87

Stellan Burman

Lokalitet: 41.580

Borehull: 1308

Dato Des.-86

Koordinater X: 925.329,9 Y: 41.582,7

Retning S

Helling/stigning: + 70°

Høyde : + 11,6 moh.

Lengde : 74,30 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.impr. <u>Py.Sl.</u>	60					
0.70 - 2.00	1.30	kjernetap.							
2.00 - 3.10	1.10	biot.gn.	Mørk mlk-grovk.pegmatisk, delvis brecciert. <u>Py.Po.</u> som sprekkfyllinger, spor <u>Sl.</u>						
3.10 - 10.30	7.20	grå gn.	Lys mlk-grov-mlk.växl m/musk.biot.gn.m/svak impr. <u>Py.</u> enstaka gr.1-2 mm.	60-70					
10.30 - 11.60	1.30	biot.musk.gn	Rel.mørk mlk.mot slutten overgang til biot.gn. Foldet m/både spisse og runde folder, impr. <u>Py.Sl.</u> <u>Cp.Gn.</u>	60-70 60-70	0,18	0,13	0,24	5,2	
11.60 - 20.70	9.10	biot.gn.	Mørk mlk-grov-mlk, tildels musk.rik, (biot.musk.gn.) m/spor hbl.impr. <u>Py.</u> delvis som små klumper, eller boller, delvis runde folder, enstaka gr.1-3 mm.	50-60	0,03	0,06	0,29	7,2	11,60-12,60
20.70 - 21.30	0.60	pegm.							
21.30 - 22.50	1.20	biot.gn.	Mørk mlk-grov-mlk, svak impr. <u>Py.</u> sprette små gr. 1-2 mm, spor <u>Sl.</u>	60	0,12	0,29	0,39	8,1	
22.50 - 29.30	6.80	biot.gn.	Mørk mlk-grov-mlk.m/spor hbl.Meget intenst foldet m/små runde folder (ser ut som vertikalt nedfolding). <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> som sprette klyser, og klumper.		0,34	0,47	1,51		

.....2

Borehull: 1308

a o
 Koordinator :
 Retning :
 Helling/stigning :
 Høyde :
 Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29.30 - 30.50	1.20	musk.biot.gn, Lys mlk-grovk.enstaka små gr.1-2 mm.svak impr. Py.spor Sl.Cp.Gn. ?	60-70	0,01	0,04	0,05		3,5	
30.50 - 41.40	10.90	biot.gn, Mørk mlk.litt växl m/opp til 5 cm tykke grå gn.band sprette gr.1.3 mm i spor hbl.Fra 32.20-34.00 runde folder.Delvis svak impr. Py.	50-70						
41.40 - 46.30	4.90	biot.hbl.gn. Mørk mlk.sprette gr.1-2mm Fra 44.80-44.90 m Py.Sl.	50-70						
46.30 - 48.30	2.00	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grovk.litt växl m/smale grå gn.band Ved 47.10-48.20 m Sl.Py.		0,78	0,38	2,92		6,4	47,10 - 48,20
48.30 - 48.80	0.50	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm. steil fold	10 0 10						
48.80 - 56.10	7.30	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov-mlk.sprette gr.1-3 mm.enstaka opp til 5 cm tykke grå gn.band. Ved 46.20 Sl.Cp.Gn.Py. delvis svak impr. Py.	60-80						
56.10 - 60.00	3.90	grå gn. Lys mlk.växl m/biot.gn. band,spor hbl,sprette gr.1-3 mm.Ved 48.75 Sl.	70-80						
60.00 - 60.70	0.70	biot.gn. Mørk mlk.impr.Py.Cp.Sl. Gn.	70	0,62	0,54	1,38		10,1	
60.70 - 62.80	2.10	grå gn.b.d. Lys mlk.sprette gr.1-3mm3	80						

Lokalitet:

Borehull: 1308

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
62.80 - 75.00	12.20	hbl.gn. Mørk mlk.litt växl m/hbl. biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm,svak impr.Py. företredesvis i hbl.biot. gn-banden. 30.01.87 Stellan Burman	70-80						

Lokalitet: 41.580

Dato

Des.-86

Koordinator

X: 925.329,9 Y: 41.582,7

Retning

S

Helling/stigning:

+ 75°

Høyde

+ 11,6 moh.

Lengde

41,40 m.

Borehull: 1307

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk, impr. <u>Py.</u> spor <u>Sl.</u>	70					
0.60 - 3.00	2.40	biot.gn.	Mørk mlk.växl m/grå gn. band, smale skikt <u>Py.Cp.</u> <u>Gn.Sl.</u> spor hbl.	60 70					
3.00 - 7.20	4.20	musk.biot.gn.	Rel.lys mlk-grov mlk. svak impr. <u>Py.</u> spor <u>Sl.</u>	70-80					
7.20 - 10.20	3.00	biot.gn. (Pegmatitisk)	Rel.mørk mlk-grovk, foldet delvis brecciert, spor <u>Py.Po.</u>	45-70					
10.20 - 15.30	5.10	biot.gn.	Mørk mlk.enkelte musk. skikt, impr. <u>Py.</u>	70					
15.30 - 17.20	1.90	grå gn.	Lys mlk.sprette gr. 1-3mm	70					
17.20 - 20.10	2.90	biot.gn.	Mørk mlk-grov-mlk.delvis pegmatitisk, sprette gr. 1-3 mm, spor hbl.svak impr. <u>Py.</u> delvis brecciert.						
20.10 - 25.70	5.60	" "	Mørk mlk.sprette gr. 1-2mm svak impr. <u>Py.</u> spor <u>Po.</u>	60-70	0,06	0,16	0,26	5,3	24,70-25,70
25.70 - 32.00		" "	Mørk mlk.spor hbl.impr. <u>Py.Cp.Gn.Sl.</u>	60-70	0,29 0,17	0,33 0,22	1,93 0,54	8,0 4,9	25,70-27,00 27,00-32,00
32.00 - 41.00	9.00	biot.hbl.gn.	Mørk mlk.m/enkelte smale grå gn.band.enstaka gr. 1-2 mm, foldet m/slake steilt stående folder, Impr. <u>Py.Cp.Gn.Sl.</u> delvis rik, delvis lys <u>Sl.</u>	60-70 0 60-70 0	0,19 0,47 0,85	0,14 0,40 0,67	0,31 1,72 3,47	4,3 5,1 5,5	32,00-35,00 35,00-38,00 38,00-41,00
41.00 - 41.40	0.40	grå gn.	Lys mlk. Slak fold	10 0					

8.12.86 Stellar Burman

Lokalitet: 41.580

Borehull: 1306

Dato : Des.-86

Koordinater : X: 925.329,9 Y: 41582,7

Retning : S

Helling/stigning: +80°

Høyde : + 11,6 moh.

Lengde : 49,20 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	grå gn. Lys mlk.rel.musk.rik, svak impr. <u>Py.</u>	70				9/1 Au Ag		
1.50 - 2.20	0.70	" " " " " m/småle malm-band.	70	0.18	0.23	7.40	0.1/6.5	5.9	
2.20 - 6.10	3.90	musk.gn. Lys mlk-grov-mlk.litt variert m/musk-biot.gn. Impr. <u>Py.</u> små spisse folder.	60-70						
6.10 - 8.70	1.60	grå gn.b.d. Lys mlk.sprette gr.1-3mm spor <u>Py.</u>	70-80						
8.70 - 13.20	4.50	biot.gn. Rel.mørk mlk,delvis pegmatitisk.Foldet,brecciert svak impr. <u>Py.</u>	50 50						
13.20 - 15.20	4.00	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm Fr.15.60-15.80 hbl.	80-90						
17.20 - 19.90	2.70	biot.gn. Mørk mlk-grov-mlk,spor hbl,svak impr. <u>Py.</u> spisse folder.	70-80						
19.90 - 22.40	2.50	grå gn. Lys mlk,enkelte cm tykke biot.gn.band.	70						
22.40 - 26.40	4.00	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grov-mlk, delvis svakt hbl-førende impr. <u>Py.</u> <u>Sl.</u> <u>Cp.</u> <u>Gn.</u>	45-60	0.01 0.11 0.68	0.07 0.30 0.26	0.14 1.49 2.59	<0.1/2.3 0.1/7.9 0.3/16.2	5.3 9.7 6.2	22.40-24.00 24.00-25.50 25.50-26.40
26.40 - 32.50	6.10	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk,sprette gr. 1-3 mm,foldet m/runde folder spor <u>Py.</u>		0.06	0.12	0.32	<0.1/3.2	4.8	31.50-32.50
32.50 - 35.60	3.10	musk.biot.gn. Rel.lys mlk.enkelte små skarn-band,rik impr. <u>Sl.</u> <u>Cp.</u> <u>Gn.</u> <u>Py.</u> (Lys <u>Sl.</u>)	45-60	1.12 1.14	0.20 0.47	8.20 7.28	0.1/24.4 0.4/24.2	8.6 7.6	32.50-34.00 34.00-35.60

....2

Lokalitet:

Borehull: 1306

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
35.60 - 46.30	10.70	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm slake folder	60-70 0 60-70	0.01	0.04	0.09	<0.1/0.9	2.2	35.60-36.60
46.30 - 47.90	1.60	biot.gn.	Mørk mlk,runde folder, spor <u>Sl.</u> ved 47.80	45 0 45						
47.90 - 49.20	1.30	Pegm.	m/grå gn.band.							
19.12.86										
Stellan Berman										

19.12.86

Stellan Berman

Lokalitet: 41.580

Dato : Des.-86

Koordinater : X: 925.329,9 Y: 41.582,7

Retning : S

Helling/stigning: +85°

Høyde : +11,6 moh.

Lengde : 56,90 m.

Borehull: 1305

Dybde	L	Bergart	S	Analyser						Prove m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% Si	% Fe	% Mn		
0.00 - 0.90	0.90	grå gn.	Lys mlk.musk.rik	50							
0.90 - 1.20	0.30	biot.gn.	Mørk mlk-grovk.m/Sl.Cp. Py. foldet.	45-90	0.04	0.17	3.88	45	0.2	5.9	
1.20 - 1.60	0.40	skarn	grønn impr. Py.								
1.60 - 16.10	14.50	grå gn.	Lys mlk, litt växl m/dm tykke biot.gn.band, spret- te gr.i grå gn.svak impr. Py.i biot.gn.banden. Spor Sl. ved 9.60 m.	70-80							
16.10 - 21.90	5.80	biot.gn.	Rel.mørk växl m/grå gn. band, spor hbl, svak impr. Py.	70-80	0.02	0.09	0.12	2.5	0.1	4.7	20.90-21.90
21.90 - 32.60	10.70	biot.musk.gn.	Rel.lys mlk-grov-mlk.växl m/musk.biot.gn, delvis små spisse folder, samt stedvis brecciert preg. impr.Py.Cp.Gn.Sl. delvis rik (lys Sl) spor skarn.	70-80	0.09	0.20	1.35	5.7	0.3	9.3	21.90-23.50
					0.17	0.16	2.26	8.1	0.6	10.2	23.50-25.00
					0.25	0.11	2.88	8.9	0.2	9.4	25.00-26.50
					1.05	0.30	3.72	28.8	3.7	5.7	26.50-28.00
					1.65	0.17	6.08	34.6	1.7	5.0	28.00-29.50
					0.87	0.15	5.36	16.2	0.6	7.7	29.50-31.00
					1.76	0.17	6.64	28.7	1.3	7.3	31.00-32.60
32.60 - 53.10	20.50	grå gn.	Lys mlk, sprette gr.1-3mm enkelte opp til dm tykke hbl.biot.gn.band m/store gr.3-5 mm, runde folder.	70	0.06	0.14	0.13	1.5	0.1	1.7	32.60-33.60
53.10 - 53.70	0.60	Pegm.									
53.70 - 56.90	3.20	biot.musk.gn.	Rel.mørk mlk-grov-mlk. små spisse folder, impr. Sl.Cp.Gn.Py. (lys Sl.)	70-80	0.64	0.17	2.78	14.0	0.7	7.8	53.70-55.30
								128	0.3		55.30-56.90
12.12.86											
Stellan Burman											

Lokalitet: 41.580

Borehull: 1503

Dato

: 02-86

Koordinater

: 925.330,4 3:41,582,7

Retning

opp

Helling/stigning

: 20°

Høyde

: +11,6 moh

Lengde

: 70,40 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
0.00 - 1.60	1.60	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.skiktad m/ biot.hbl.m/Sl.Cp.Py.Po.	70-80	0,31	0,23	2,59	g/t AgAu	5,5	
1.60 - 9.60	8.00	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	80						
9.60 - 9.90	0.30	Pegm.	m/skarntklump Sl.Cp.Gn.							
9.90 - 11.60	2.00	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm enkelte biot.skikt.	70-80	0,02	0,03	0,11		2,1	10,60-11,60
11.60 - 15.70	4.10	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk,växl m/Pegma- tittiske biot.band m/Sl. Cp.Gn.Po.Py. (malmband)	70-80	0,02	0,25	1,91		4,1	11,60-13,00
					0,02	0,24	1,31		3,7	13,00-14,20
					0,02	0,18	0,38		8,6	14,20-15,70
15.70 - 20.20	4.50	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk,enkelte smale biot.gn.band m/spor hbl.	70-80	0,02	0,07	0,10		4,4	15,70-16,70
					0,26	0,10	0,60		3,3	17,20-20,20
20.20 - 28.00	7.80	biot.gn.	Mørk mlk.växl m/biot.hbl gn.samt biot.musk.gn. hbl-forende,pegmatitisk, brecciert,impr.Sl.Cp.Gn. Py.Po. rik impr.	70-80	0,18	0,39	3,43	0,2/7.8	9,7	20,20-25,00
					0,26	0,35	0,78	0,2/7.1	5,2	25,00-26,50
					0,71	0,60	3,49	0,3/14.5	9,0	26,50-28,00
28.00 - 43.00	15.00	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm foldet ved 29.50-29.90. Spor Sl. ved 31.80 m.	60-70	0,06	0,06	0,26		2,6	28,00-29,00
43.00 - 44.00	1.00	kjernetap								
44.00 - 53.60	9.60	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	70	0,07	0,02	0,16		2,0	52,60-53,60
53.60 - 54.90	1.30	" "	Lys mlk.m/enkelte malm- band.	70-80	0,32	0,06	0,95		2,0	
54.90 - 59.30	4.40	biot.musk.gn.	Rel.mørk mlk-grøvk.spor hbl.stripet impr.Py.Cp. Gn.Sl. små spisse folder.	70-80	0,58	0,26	1,99	0,5/19.3	6,6	54,90-56,50
					0,58	0,24	2,02	0,8/19.3	5,5	56,50-58,00
					0,90	0,24	6,52	<0,1/6.0	11,3	58,00-59,30
59.30 - 63.70	4.40	grå gn.b.d.	Lys mlk.delvis biot.rik svak impr.Py.	70-80	0,06	0,07	0,16	<0,1/1.7	2,9	59,30-60,30

.....2

Lokalitet:

Borehull: 1304

Dato :
 Koordinater :
 Retning :
 Helling/stigning :
 Høyde :
 Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
63.70 - 65.60	1.90	grå gn.b.d. Rel. lys mlk.sprette gr. 1-3 mm, enstaka opp til 5 cm tykke hbl.biot.band skarnførende m/rik Sl.	70-80	0,99	0,57	4,48	0.34/6.1	6,9	
65.60 - 70.40	4.80	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm, mot slutten sticto- litisk.	60-70						

8.12.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.840

Borehull: 1303

Dato : Nov. - 86
 Koordinator : X:925.362 Y:41839
 Retning : Lodd.
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : + 46 moh.
 Lengde : 3,00 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 0,50	0,50	Grå gn. Lys mlk. sprette gr. 1-3 mm	70-80°						
0,50 - 0,70	0,20	Grå gn. Lys mlk. sprette gr. 1-3 mm Svag impr. <u>Sl.</u>	70-80°						
0,70 - 3,70	3,00	Grå gn. bd. Rel. lys mlk. Växl m/ entykke h.bl.gn. band gr. rike.	70-80°						

24/11-86
 Stellan Surman

Lokalitet: 41.840

Borehull: 1302

Dato : nov.-86
 Koordinator : 8:92S, 360 41.839
 Retning : S
 Helling/stigning: +75°
 Høyde : +49 moh.
 Lengde : 14.30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 11.60	11.60	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk,litt växl m/ smale biot,biot.hbl.band sprett gr.1-3 mm.	50-60					
11.60 - 14.30	2.70	hbl.gn.	Mørk mlk.växl m/hbl.biot. gn,rel.gr.rik 1-3 mm. Ved 11.80 Sl. Stictolittisk.Fr.14.10- 14.20 Foldet m/runde folder.	0-90					
			5.12.86 Stellan Burman						

Lokalitet: 41.840

Borehull: 1301

Dato : Nov. - 86
 Koordinater : X: 925.361,5 Y: 41.839
 Retning : S.
 Helling/stigning: - 60°
 Høyde : + 46,5 moh..
 Lengde : 68,30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 1,10	1,10	Pegm. M/klyzor og skikt <u>Sl</u> <u>Py</u> <u>Po</u> <u>Cp</u> .		0,03	0,71	3,27		3,7	
1,10 - 11,40	10,30	Grå gn. Lys mlk. sprette gr. 1-3 mm. Enstaka opp till den tykke kv. pegm. band.	70-80°						
11,40 - 12,40	1,00	Pegm. Brecciert m/ sprekkefyllinger av biot <u>Py</u> <u>Po</u> .							
12,40 - 19,10	6,70	Biot gn. Mørk mlk., delvis grovk. Enkelte partier biot.sk. Samt delvis hbl. förande. Svak impr. <u>Py</u> . Biot sk. foldet. M/spisse folder.	50-60° 70°						
19,10 - 23,00	4,90	Grå gn. bd. Rel. lys mlk. växl m/biot gn. Sprette gr. 1-3 mm. Spor <u>Py</u> .	70°	0,03	0,03	0,05		3,5	22,00-23,00
23,00 - 23,90	0,90	Musk. biot gn. Rel. lys mlk. - grov impr. <u>Py</u> <u>Sl</u> <u>Cp</u> <u>Gn</u> . Små spisse foldere.	70-80°	0,85	0,22	3,34		6,1	
23,90 - 25,40	1,50	Biot gn. Pegmatitisk Mørk grovk. foldet brecciert m/ <u>Py</u> <u>Po</u> <u>Sl</u> som sprekkefylling.		0,04	0,18	0,21		3,6	
25,40 - 26,70	1,30	Grå gn. bd. Rel. lys mlk. v)xl m/ dm tykke pegm. band foldet. Sprette gr. 1-3 mm. <u>Sl</u> som klyzor i Pegm.	70-80°	0,07	0,05	0,38		1,9	

Lokalitet:

Borehull: 1301

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
26,70 - 28,80	2,10	Biot gn. Mørk mlk. växl m/grå gn. impr. <u>Py</u> spor <u>Sl</u> . Foldet gr. i grå gn.	70-80	0,35	0,20	1,46		5,1	26,70 - 28,80
				0,06	0,11	0,09		4,9	28,80 - 29,80
28,80 - 30,00	1,20	Grå gn. bd. Rel. mørk mlk. spor h.bl. svag impr. <u>Py</u> . Sprette gr. 1-3 mm.							
30,00 - 33,30	3,30	Hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov-mlk.m/overgang til hbl.gn,svak impr. <u>Py</u> .	50-60						
33,30 - 42,80	9,50	hbl.gn. Mørk mlk.Amfibolotisk,gr-førende 1-3 mm,delvis svakt <u>Py</u> . Slake folder.	50-60						
42,80 - 48,30	5,50	biot.gn. Mørk mlk,växl m/grå gn.band sprette gr.1-3 mm,svak impr. <u>Py</u> .							
48,30 - 60,70	12,40	grå gn. Lys mlk,litt växling m/musk. gn,impr. <u>Py</u> .	70						
60,70 - 64,80	4,10	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm. växl m/hbl.biot.gn.	70						
64,80 - 69,00	4,20	grå gn. Lys mlk.sprett gr.1-3 mm.	50-60						
27.11.86									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.810

Borehull: 1300

Dato Nov. - 86
 Koordinator x: 925.362,5 y. 41.811,2
 Retning : Lodd.
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : + 47,5 moh.
 Lengde : 32,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 1,00	1,00	Pegm.	M/biotskikt						
1,00 - 16,90	15,90	Grå gn.	Lys mlk. Litt växl biot innehåll. Sprette gr. 1-3 mm. Fr. 8,20 - 8,70 m små spisse foldere.	70-80°					
16,90 - 21,00	4,10	Biot gn.	Mörk mlk. - grov. Pegmatisk delvis brecciert. <u>Py Po</u> som enkelte skikt. Spor <u>Cp Sl</u> . Enstaka store gr. 1-5 mm.	70-80°	0,02	0,12	0,99	7,5	16,90-18,50
					0,01	0,17	0,25	5,9	18,50-20,00
					0,01	0,11	0,15	8,2	20,00-21,00
21,00 - 23,30	2,30	Grå gn. bd.	Rel. lys mlk. Enkelte cm tykke hbl. gn. band, sprette gr. 1-3 mm.	80°	0,03	0,13	0,07	5,3	21,00-23,30
23,30 - 25,80	2,50	Pegm.	Lys m/biot skikt enkelte klysor <u>Sl Py Sl</u> .	-	0,04	0,20	0,11	3,6	23,30-25,80
					0,53	0,27	0,43	3,2	25,80-29,90
25,80 - 26,90	1,10	Grå gn. bd.	Rel. lys mlk. svagt skarnförande. Impr. <u>Py Cp Gn Sl</u> .	70°	0,31	0,20	1,20	2,9	
26,90 - 29,90	3,00	Grå gn. bd.	Rel. lys mlk. växl m/pegmatisk band. Stripet (banda) malm.	70-80°	1,37	0,32	2,89	6,0	
29,90 - 32,30	2,40	Grå gn. bd.	Lys mlk. enkelte biot gn. band Komp. malm. Fr. 30,80 - 30,90. 31,20 - 31,30	70-80°	0,04	0,34	0,69	5,7	29,90-31,00
					0,02	0,22	1,03	4,5	31,00-32,30

25/11-86
 Stellan Burman

Lokalitet: 41.810

Dato: Nov.-86

Koordinater : X: 925.382,5 Y: 41.811,4

Retning : N

Helling/stigning: -75°

Høyde : + 49.5 m.o.h.

Lengde : 88.30 m

Borehull: 1299

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.80	3.80	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-2mm. Sl.ved 2.10-2.15 m.	80					
3.80 - 29.30	25.50	grå gn.b.p.	Lys mlk.växl m/grå gn. hbl-førende,gr-rik 1-3mm enkelte cm tykke hbl.gn. band.	70-80					
29.30 - 29.60	0.30	skarn	grønn m/hbl.biot. rik Sl.Cp.Py.						
29.60 - 31.80	2.20	biot.gn.	Mørk mlk-grov,skiktad m/hbl.og gr.1-4 mm.	70					
31.80 - 34.20	2.40	Pegm.	m/biot.flagor.						
34.20 - 40.30	6.10	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.växl m/biot. skikt/band,svak impr. Py. i biot.gn.banden.	60-70					
40.30 - 45.50	5.20	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm delvis små spisse folder.	70					
45.50 - 51.40	5.90	hbl.biot.gn.	Rel.mørk mlk.gr.rik 1-3 mm,växl m/grå gn.band.	80-90					
51.40 - 73.70	22.30	grå gn.	Lys mlk-fin rel.musk.rik sprette små gr.1-2 mm. enstaka cm tykke hbl. biot.gn.band.	80-90					
				0,04	0,01	0,03		1,3	73,70-73,70
73.70 - 76.40	2.70	" "	Lys mlk.musk.rik m/komp. malm band.Fr.85.20 lys Sl.	80					
				1,20	0,26	5,68		6,3	
76.40 - 87.60	12.20	hbl.gn.	Mørk mlk.litt växl m/hbl biot,Amf.band,gr.1-3 mm.	70-80	0,02	0,02	0,03		2,2 76,40-77,40
87.60 - 88.30	0.70	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	80					
		5.12.86	Stellan Burman						

Lokalitet: Profil: 41.810

Borehull: 1298

Dato : Nov - 86
 Koordinator : x: 925.367,7 y: 41.808,7
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : + 48,0 m.o.h.
 Lengde : 34,00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 1,10	1,10	Pegm. M/bioskikt. <u>Py Cp Sl Gn</u> som klysor.	-	0.03	0.29	1.17		3.1	
1,10 - 4,80	3,70	Grå gn. bd. Mel lys mlk. Enstaka upp til 5 an tykke hbl. biot gn. band. Gr. rike. Spor <u>Py</u>	80°						
4,80 - 7,0	2,20	Hbl. gn. Mörk mlk. delvis gr.-rike 1-3 mm. Mot slutten över- gang till grå gn. bd. hbl- förande. Svag impr <u>Py</u>	70-80°						
7,0 - 18,50	11,50	Grå gn. bd. Rel. lys mlk. sprette gr. 1-3 mm. Spor hbl. Spor <u>Py</u> . Delvis foldet.	80°						
18,50 - 22,20	3,70	Biot gn. Mörk mlk. växl m/grå gn. band. Impr. <u>Py</u> .	70.80°						
22,20 - 25,20	3.00	Grå gn. bd. Rel. lys mlk. växl m/Biotgn. band. Spor hbl. og grønligt skarn. Impr. <u>Py</u> företrades vis i biot gn.	80°						
25,20 - 25,50	0,30	Kvarts.							
25,50 - 26,20	0,70	Grå gn. bd. Rel. lys mlk. Svag impr. <u>Py</u>	70°	0.02	0.3	0.08		5.7	
26,20 - 27,20	1,00	Biot hbl. Mörk mlk- grovt. D type impr. <u>Py</u> spor <u>Sl Cp</u>	70-80°	0.02	0.35	0.98		4.8	
27,20 - 27,85	0,65	Pegm.							

Lokalitet:

Borehull: 1298

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
27,85 - 30,00	2,15	Grå gn. Rel. lys mlk. - grov-mlk. växl m/Musk gn. delvis ikke malmband.	80-85°	1,12	0,50	4,85		6,69	
30,00 - 30,80	0,80	Grå gn. bd. Rel. lys mlk. Svag imp. <u>Py</u>	80°	0,03	0,13	0,15		3,2	
30,80 - 32,00	1,20	Biot gn. Mörk mlk. - grovk. Pegmatit, delvis brecciert <u>Po Py Sl.</u>	-	0,06	0,55	1,92		7,4	
32,00 - 34,00	2,00	Grå gn. Lys mlk. enkelte biot rikare band. m/svag impr. <u>Py</u> Fr. 33,90 - 34,00 <u>Sl</u>	70-80°						

26/11-86
Stellan Burman

Lokalitet: 41.680

Borehull: 1296

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

1986-86

X: 925.347,8 Y: 41.684,9

Lodd

-90°

+53,5 m o h.

2,30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	2.30	biot.sk. Mørk mlk-grov.impr. Sl. Cp.Gn.Py.Po. Brecciert.		0,09	0,87	1,96		11,3	
		28.10.86 Stellan Burman							

Lokalitet: 41.680

Borehull: 1295

Dato : Okt.-86
 Koordinater : X: 925,350,3 Y: 41,685,4
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: -90°
 Høyde : +53,6 m.o.h.
 Lengde : 2.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	Biot.sk. Mørk mlk, skiktad <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	70-80	0,24	0,28	2,46	-	9,4	
1.00 - 2.50	1.50	grå gn. Lys mlk. sprette gr. 1-2mm fold ved 1.60-1.70. 30.10.86 Stellan Burman	60						

Lokalitet: 41.680

Borehull: 1294

Dato : okt.-86
 Koordinater : X: 925.344,0 Y: 41.684,5
 Retning : S
 Helling/stigning: -45°
 Høyde : + 54,6 m.o.h.
 Lengde : 13,70 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.60	2.60	grå gn.b.d.	Rel.mørk mlk.partier m/ biot.gn.Py.impregnert, enstaka gr.1-2 mm. Fr.0.00 - 0.20 Sl.	70-80					
2.60 - 13.70	11.10	grå gn.	Lys mlk.växl m/smale hbl. biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm. Sl.fr.13.50-13.70 slak fold ved 3.50.	70 50-60					
28.10.86									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.680

Borehull: 1293

Dato : okt.-86
 Koordinater : N: 925.345,7 Y: 41.684,1
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: -90
 Høyde : +53,7 moh.
 Lengde : 14,40 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.70	5.70	biot.gn.(sk.) Mørk mlk.växl, delvis biot.sk.brecciert, pegmatitisk, klyser og skikt m/Sl.Cp.Gn.Py.Po,	70-80	0.24	0.75	1.21		5.6	0.00-1.00
				0.29	0.88	3.75		12.9	1.00-4.00
				0.07	0.18	1.25			4.00-5.70
5.70 - 7.70	2.00	biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.sprette gr.1-3 mm, steil fold mellom 6.40-6.80 m. Impr. Py. spor Cp. Sl.?	80 80	0.02	0.03	0.04		4.4	
7.70 - 9.45	1.75	biot.gn. Mørk mlk.delvis biot.sk. Mot slutten overgang til grå gn.b.d.skarnførende Delvis rik impr.Sl.Cp. Gn.Py. Pegmatitisk brecciert.	60-70	0.03	0.33	1.47		6.8	
9.45 - 11.10	1.65	grå gn. Rel.lys mlk.foldet, sprette gr.1-3 mm.	45-70	0.03	0.07	0.27		2.5	
11.10 - 14.40	3.30	grå gn.b.d. Rel.lys mlk,växl m/biot. gn.band, foldet, impr.Py. sprette gr.1-3 mm.Sl. ved 13.20-13.40.	60-70						

28.10.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.680

Borehull: 1292

Dato : okt.-86
 Koordinater : X: 925.369,2 Y: 41.681,9
 Retning : N
 Helling/stigning: -65°
 Høyde : +58,0 moh.
 Lengde : 47,00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.30	6.30	grå gn. Lys mlk.enkelte tynne skikt biot.sprette gr. 1-2 mm.Fr. 0.00-0.20 m <u>Sl.</u>	70-80						
6.30 - 29.60	23.30	grå gn.b.d. Rel.lys mlk,sprette cm tykke biot.hbl.gn.band rel. gr-rike.	80-90						
29.60 - 31.00	1.40	biot.sk. Mørk mlk.imp. <u>Py.</u>	60						
31.00 - 32.20	1.20	kjernetap							
32.20 - 47.00	14.80	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.m/enkelte partier biot.hbl.gn. gr- rike.Fr. 37.20-37.80 runde folder.	60-70 2						
24.10.86									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.680

Borehull: 1291

Dato : okt.-86

Koordinater : X: 925.360,3 Y: 41.682,5

Retning : Lodd

Helling/stigning: -90°

Høyde : +58,0 moh.

Lengde : 42,30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.80	8.80	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	70-80					
8.80 - 11.00	2.20	"hbl-førende grå gn."	Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm.	70					
11.00 - 22.40	11.40	grå gn.	Lys mlk.enstaka hbl.gn. band,sprette gr.1-3 mm.	70	0.01	0.01	0.03	0.6	2140-2240
22.40 - 23.30	0.90	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk,skarnførende rik impr.Py.Cp.Gn.Sl.	70-80	1.66	0.39	7.32	9.0	
23.30 - 26.50	3.20	" "	Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm.Ved 24.15 Sl.Po.Py. ved 25.70.	70-80	0.11	0.30	0.53	3.0	2330-2430
26.50 - 27.40	0.90	biot.gn.	Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.b.d.spor Py.	80					
27.40 - 32.50	5.10	grå gn.	Lys mlk.växl m/musk.gn. partier,enstaka gr.hoved- saklig i grå gn. Svak impr. Py.	70-80					
32.50 - 33.30	0.80	hbl.biot.gn.	Mørk mlk. Rik impr. Sl. Cp.Gn.Py.	80	0.33	0.33	6.60	10.5	
33.30 - 33.90	0.60	Pegm.							
33.90 - 42.30	8.40	grå gn.	Rel.lys mlk.växl m/opp til 5 cm tykke hbl.biot. gn.band,gr-førende.	80°					

17.10.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.680

Borehull: 1290

Dato : sept.-86
 Koordinater : X: 925.359,5 Y: 41.684,9
 Retning : S
 Helling/stigning: +45°
 Höjden : +62,3 moh.
 Längden : 15,50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grov-mlk. delvis foldet m/tette små spisse folder, stripet impr. Py.Cp.Gn.Sl.	45 50	0,42	0,33	1,53		6,9	
1.50 - 2.90	1.40	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band samt cm tykke Amf.band ved 2.50 som slak fold,svak impr. Py.	45)	0,08	0,32	0,46		4,6	
2.90 - 5.00	2.10	" " Mørk mlk.växl m/musk.gn. grå gn.band, delvis svakt skarnförend, stripet impr. Cp.Sl.Gn.Py.	45-50	0,17	0,44	2,15		5,4	2,90-4,00
				1,32	0,46	8,76		6,4	4,00-5,00
5.00 - 6.40	1.40	biot.hbl.gn. Mørk mlk.enstaka små gr. 1-2 mm, impr. Py.Cp.	60-70	0,35	0,50	0,05		6,6	
6.40 - 11.00	4.60	hbl.gn. Mørk mlk.litt växl m/hbl. biot.gn. m/Py. gr.1-3 mm företrädesvis i hbl.gn. Runde folder.	50						
11.00 - 12.20	1.20	hbl.bopt.gn. Mørk mlk-grovk.litt Pegm. klyser, skikt Py. Cp.?	50	0,61	0,62	0,04		5,7	
12.20 - 15.50	3.30	hbl.gn. Mørk mlk.litt varierat m/ overganger til hbl.biot. gn.Py.impregnert, sprette gr.1-3 mm.							
14.10.86									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.680

Borehull: 1289

Dato : okt.-86
 Koordinater : X: 925.360,4 Y: 41.683,1
 Retning : opp
 Helling/stigning: +90°
 Høyde : +62,8 m.o.h.
 Lengde : 14,20 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	musk.gn. lys mlk.delvis skiktad m/biot.impr. <u>Py.</u> spor <u>Sl.</u>	70-80	0,15	0,15	1,21		4,4	
0.80 - 3.20	2.40	musk.biot.gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. og skarn band m/rik <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u> Foldet.	60-90	0,42	0,37	1,80		8,4	0,80-2,00
				0,68	0,54	3,83		9,7	2,00-3,20
3.20 - 4.80	1.60	hbl.gn. Mørk mlk.foldet m/små runde foldet,gr-førende 1-4 mm,svak impr. <u>Py.</u> spor <u>Cp.</u>	~	0,40	0,21	0,05		4,8	
4.80 - 7.60	2.80	grå gn. Lys mlk,växl m/skarn, musk.biot.gn.band m/rik <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> Fr. 6.85-7.30 m komp.malm	70-80	0,09	0,30	0,73		4,3	4,80-6,20
				1,44	0,19	7,44		5,3	6,20-7,60
7.60 - 14.20	6.60	biot.gn. Mørk mlk,växl m/grå gn.. band,impr. <u>Py.</u> spor gr. 1-3 mm.	70-80	0,32	0,19	0,07		6,8	7,60-8,60

20.10.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.680

Borehull: 1288

Dato : sept.-86
 Koordinater : K: 925.360,3 Y: 41.682,5
 Retning : S
 Helling/stigning: -88°
 Høyde : +58,0
 Lengde : 32.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.40 2.40 - 30.10	2.40 27.70	Pegm. grå gn. m/enkelte flagor av biot. Lys mlk.sprette gr.1-3mm Enstaka opp til 5 cm tykke biot.hbl.gn.band gr-rik.	70-90						
30.10 - 30.60	0.50	biot.gn. Mørk mlk,delvis skiktad. Py.Cp.	80	0,27	0,19	0,98		4,7	
30.60 - 31.05	0.45	" " Mørk mlk.stripet Sl.Cp. Gn.Py.	80-90	0,40	1,75	7,56		17,9	
31.05 - 32.40	1.35	grå gn. Lys mlk,kv-rik.Fr.31.95- 32.05 biot.sk. m/Po. 08.10.86 Stellan Burman	80						

Lokalitet: 41.760

Borehull: 1287

Dato : sept.-86
 Koordinator : X: 925.371,3 Y: 41.761,6
 Retning : N
 Helling/stigning: -50°
 Høyde : +51.2 m.o.h.
 Lengde : >0.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.50	7.50	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm Fr.1.20-1.40 Py.Cp.Sl.Gn. Fra 5.10-5.20	50					
7.50 - 41.30	33.80	grå gn.b.d.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm Enstaka opp til 5 cm tykke hbl.biot.gn band, gr-rik.	50-60	0.03	0.06	0.13	2,7	40,30-41,30
41.30 - 42.80	1.50	musk.gn.	Lys mlk-grov.Växl m/skarn, biot.gn.band.Stripet imp. Sl.Cp.Gn.Py.	45-50	1.48	0.29	5.44	8,7	
42.80 - 50.00	7.20	grå gn.	Lys mlk,sprette gr.växl m/Pegm.band samt enkelte biot.hbl.band.	50-60	0.04	0.02	0.11	2,7	42,80-43,80

07.10.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.760

Borehull: 1286

Dato: sept.-86
 Koordinator: X 925.371,5 Y: 41 761,6
 Retning: N
 Helling/stigning: -60°
 Høyde: +51,2 moh.
 Lengde: 7,7 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm Fr. 0.00-0.15 <u>Sl.</u>	60-70						
1.20 - 1.70	0.50	Pegm.							
1.70 - 5.10	3.40	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	70						
5.10 - 7.70	2.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.litt växl m/ biot.hbl.gn.band,gr-rik.	70						
24.10.86									
Stellan Burman									

Lokalitet: 4 1.760

Borehull: 1285

Dato : sept.-86

Koordinatorer : X: 925.371,5 Y: 41.761,6

Retning : N

Helling/stigning: -30°

Høyde : +51.2 m.o.h.

Lengde : 27,80 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.00	4.00	grå gn. lys mlk.sprette gr.1-3mm enstaka smale biot.gn. band.Fr.0.40-0.50 <u>Sl.Cp.</u> <u>Py.Gn.</u> Slak fold.	10-40)						
4.00 - 5.10	1.00	Pegm. m/enkelte <u>Cp.</u> korn.							
5.10 - 7.00	1.90	grå gn. lys mlk-fin.Sprette gr. 1-2 mm.	20						
7.00 - 10.90	3.90	Pegm. m/enslige biot.flagor. Sprette korn <u>Py.</u> enstaka <u>Cp.</u> korn.							
10.90 - 13.50	2.60	grå gn. lys mlk-sprette gr.1-3mm enkelte biot.rikere par- tier,spor <u>Py.</u>	20-30						
13.50 - 22.00	6.50	grå gn.b.d. Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm växl m/cm tykke hbl.gn og Amf.band,gr- rike,stictolittisk m/ <u>Py.</u> spor <u>Cp.</u> slake folder	10-35 }						
22.00 - 23.00	1.00	kjernetap							
23.00 - 27.80	4.80	hbl.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.biot. gn, Amf-band.Delvis svak mpr. <u>Py.</u> sprette gr. 1-3 mm.	20-30						
13.10.86									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.760

Borehull: 1284

Date sept., -86

Koordinater : X: 925.372,6 Y: 41.764,5

Retning : N

Helling/stigning: +75^o

Hoyde : + 55.8 m.o.h.

Lengde : 29,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.10	2.10	grå gn. Lys mlk, musk. rik, impr. <u>Py. Sl. Gn.</u>	60	0.83	0.21	1.75		6.0	0.00 - 1.00
				1.03	0.94	8.60		9.3	1.00 - 2.10
2.10 - 4.30	2.20	" " Rel. lys mlk, skarnförendelvis <u>komp. malm</u>	60-70	0.16	0.17	0.34	} ??	4.9	2.10 - 3.10
				0.59	0.36	4.96		9.7	3.10 - 4.30
4.30 - 5.00	0.70	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm hbl. förendelvis mot slutten.	60	0.04	0.09	0.22		3.9	
5.00 - 19.30	14.30	hbl. gn. Mörk mlk. gr-förendelvis 1-3 mm, enkelte dm tycke hbl. biot. gn. band.	60 70						
19.30 - 20.10	0.80	Pegm.							
20.10 - 20.90	0.80	grå gn. b.d. Rel. lys mlk. svåk impr. <u>Py.</u>	70						
20.90 - 30.00	9.10	hbl. gn. Mörk mlk. växl m/hbl. biot. gn, sprette gr. Imp. <u>Py.</u> företrädesvis i hbl. biot. gn.	70-80						

25.09.86

Stellan Burman

{
 det var en negativ
 förändring i
 20.9.86
 }

Lokalitet: 41.760

Borehull: 1283

Dato sept.-86
 Koordinater X: 925.371,5 Y: 41.761,6
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: -90°
 Høyde : +51,2 m.o.h.
 Lengde : 26,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.50	4.50	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm.Ved 0,25 m spor <u>Sl.</u> <u>Cp.Py.</u>	70-80						
4.50 - 10.00	5.50	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk,sprette gr. 1-3 mm,litt variert med grå gn.mot slutten overgang til hbl.gn. svak impr. <u>Py.</u>	80						
10.00 - 11.30	1.30	kjernetap							
11.30 - 20.80	9.50	grå gn. Lys mlk,sprette gr.Ens- taka opp til 5 cm tykke hbl.biot.gn.band,gr-før-ende.	70-90						
20.80 - 26.30	5.50	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk,litt växl m/grå gn.og biot.gn.band. svak impr. <u>Py.</u> spor <u>Cp.</u> ved 25.20 m.	80-90						

03.10.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.760

Borehull: 1282

Dato : sept.-86

Koordinater : X: 925.358,7 Y: 41.757,0

Retning : S

Helling/stigning: +50°

Høyde : +54,6 moh.

Lengde : 27,30 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.60	2.60	hbl.gn.	Mørk mlk.foldet, gr-rik 1-4 mm, spor Py.Cp.	10-50					
2.60 - 5.10	2.50	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.växl m/biot. hbl.gn, gr-førende.	50-60					
5.10 - 6.00	0.90	grå gn.	Lys mlk.delvis musk.preg- et, biot.som enkelte fla- gor, sprette gr.1-3 mm.	60	0,02	0,01	0,03	1,4	
6.00 - 6.40	0.40	hbl.biot.gn.	Mørk mlk.impr.stripet Sl.Cp.Gn.Py.	60	0,66	0,14	4,01	6,6	
6.40 - 9.00	2.60	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.växl m/dm tykke biot.hbl.gn.band, sprette gr.1-3 mm, litt foldet.	40-70	0,03	0,05	0,03	3,0	6,60 - 7,20
					0,35	0,15	0,06	4,1	7,20 - 9,00
9.00 - 10.20	1.20	skarn	Grønlig mlk, rik impr. Sl.Cp.Gn.Py.		3,02	0,42	11,64	7,5	
10.20 - 11.90	1.70	biot.gn. Pegmatitisk	Mørk mlk-grovk.Brecciert foldet, enkelte klysor, og skikt m/Sl.Cp.Gn.Py.		1,82	0,37	1,32	3,8	
11.90 - 12.70	0.80	kvarts			0,12	0,24	0,06	5,4	
12.70 - 27.40	14.70	hbl.gn.	Mørk mlk.växl m/hbl.biot. gn, biot.hbl.gn, gr-førende delvis gr-rik företrädes- vis i de hbl.rikere par- tiene, svak impr. Py.	50					

08.10.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.760

Borehull: 1281

Dato: sept.-86
 Koordinator: X: 925.362,6 Y: 41.759,7
 Retning: S
 Helling/stigning: -60°
 Høyde: + 50.7 m.o.h
 Lengde: 28,00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk.Stripet <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u> foldet.	45	1.74	0.33	3.72		5.4	
1.20 - 2.00	0.80	Pegm. m/biot.skikt		0.04	0.05	0.15		1.6	
2.00 - 16.00	14.00	grå gn. Lys mlk.enkelte smale biot.hbl.band,sprette gr. 1-2 mm.	70-80						
16.00 - 17.50	1.50	biot.sk. Mørk mlk,pegmatitiska partier. <u>Py.Cp.Sl.</u> som spor.	70-80	0.06	0.17	1.12		8.3	
17.50 - 19.00	1.50	kjernetap							
19.00 - 19.80	0.80	kvarts							
19.80 - 25.10	5.30	grå gn. Lys mlk.enkelte biot. rikere partier,sprette gr.1-3 mm.	70-80						
25.10 - 27.70	2.60	Pegm. grå gn. Lys mlk.växl m/skarn, foldet,impr.striper <u>Sl.</u> <u>Cp.Py.</u>		0.45	0.11	2.34		3.5	2510-2610
				0.41	0.29	1.01		4.5	2610-2770

Lokalitet: Profil 41.880

Borehull: 1280

Dato : okt.-86
 Koordinater : X: 925.368,3 Y: 41.876,3
 Retning : S
 Helling/stigning: -69°
 Høyde : +47,1 m.o.h.
 Lengde : 34.30 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.80	3.80	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band.Hbl-førende,gr- rik 1-3 mm,samt enstaka cm tykke kv.pegm.band. Py.Sl. fr.0.00-0.20 m.	70					
3.80 - 10.10	6.30	grå gn.	Lys mlk.Sprette gr.1-3mm	65-70					
10.10 - 13.00	2.90	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.spor hbl. Sprette gr.1-3 mm.	60					
13.00 - 13.70	0.70	Pegm.	m/biot.skikt og flagor.						
13.70 - 17.30	3.60	biot.gn.	Mørk mlk.spor hbl.impr. Py.	75					
17.30 - 17.90	0.60	kvarts							
17.90 - 19.90	2.00	biot.gn.	Mørk mlk-grovmlk.växl m/ dm tykke biot.sk.band. Svak impr.Py. Foldet.	3					
19.90 - 24.50	4.60	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.växl m/biot. gn,og pegm.band,svak impr. Py.og spor hbl,företräd- esvis i biot.gn.band. Cp.ved 21.50 i pegm.	60-70					
24.50 - 25.80	1.30	Pegm.							
25.80 - 32.70	6.90	hbl.biot.gn.	Mørk mlk.variert m/over- ganger fr.hbl.biot-biot- hbl.gn.svak impr.Py.	70					

14.11.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.760

Borehull: 1279

Dato Aug-86

Koordinater : x:925.362,6 y:41.759,7

Retning : S

Helling/stigning: - 45°

Høyde : + 50,7 moh.

Lengde : 27,10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	biot.gn. Mørk mlk. spar hbl. stripet impr. <u>Sl.Co.</u> <u>Gn.Py.</u> Foldet	45-60°	1,01	0,48	4,24		6,2	
1.00 - 1.80	0.80	Pegm. M/enkelte biot flagor.							
1.80 - 15.10	13.30	grå gn. lys mlk. enkelte upptill den tjocka pegm. band Sprette gr. 1 - 3 mm	45°						
15.10 - 18.60	3.50	Biot.gn. (Pegmatitisk) Mørk mlk. grovk. delvis brecciert. Spor Py enkelte gr. 1 - 2 mm	50-60°						
18.60 - 19.70	1.10	Biot.hbl.gn. Mørk mlk. gr. förande 1 - 2 mm	70-80°						

Borehull: 1279

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning :
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19.70 - 22.00	2.30	Biot.gn. (Pegmatitisk)	Mørk mlk.-grovk. delvis brecciert. Spor hbl. <u>Py</u>	60-70 ⁰					
22.00 - 23.00	1.00	Pegm.	M/biot. skikt, flager spor <u>Po.</u> , <u>Py</u> .	-	0.01	0.09	0.49	2.9	
23.00 - 25.10	2.10	Biot.gn.	Mørk mlk. grovk. delvis Pegmatitisk, skarn stripet impr. <u>Sl.Cp.Gn.</u> <u>Py.Po.</u>	70 ⁰	0.42	0.32	7.69	7.0	
25.10 - 27.10	2.00	Biot.gn.	Mørk mlk. växl m/grå gn. band. <u>Sl</u> vid 25.40, 26.50	60-70 ⁰	0.26	0.32	0.61	6.4	25.10-26.10
					0.01	0.17	0.25	4.0	26.10-27.10
			12.09.86						
			Stellan Burman						

Lokalitet: 41.760

Borehull: 1278

Dato: Sept. -86
 Koordinater: x: 925.362,1 y: 41.759,7
 Retning: opp
 Helling/stigning: + 90°
 Høyde: + 55.5 moh.
 Lengde: 11.70 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.30	7.30	Hbl.gn. Mark mlk. delvis gr. rik 1-5 mm. foldet, enkelte Amfibotitiske band spor Py. Vid 4.50 Cp.	0-70°						
				0.04	0.05	0.08		5.4	630-730
7.30 - 8.30	1.00	Skarn Rik malm.	80°	2.34	0.15	14.28		6.5	
8.30 - 11.70	3.40	Hbl.biot.gn. Mark mlk. sprette små gr. 1-2 mm. Svag impr. Py. Enkelte opptill 5 cm tjocka Amf. band.	80°	0.03	0.24	0.10		6.7	830-930
		16.09.86							
		Stellan Burman							

Borehull: 1277

Dato : Aug.-86
Koordinater : x:925.362,1 y:41.759,7
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : + 50.7 moh.
Lengde : 34.30 m.

[illegible]

Lokalitet:

Borehull: 1277

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Hoyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29,30 - 34,30	5,00	grå gn. rel. lys mlk. växl m/ biot hbl gn. band.	70-80 ^o	0,02	0,09	0,12		2,8	29,30-34,30
		29/8-86 Stellan Burman							

Lokalitet: Profil 41,720

Borehull: 1276

Dato: Juli-86
 Koordinater: X: 925.375,4 Y: 41.723,2
 Retning: Lodd.
 Helling/stigning: -90°
 Høyde: +52,3 moh.
 Lengde: 44.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.60	4.60	grå gn. Lys mlk.sprette gr. spor hbl.	70						
4.60 - 25.00	20.40	" " Rel.lys mlk.växl m/hbl. gn.band, gr-rik 1-3 mm.	"	0.01	0.05	0.05		2.0	24.00 - 25.00
25.00 - 28.90	3.90	grå gn.b.d. m/skarn Rel.mørk rel.komp.malm	70-80	1.49	0.37	6.48		7.67	
28.90 - 34.20	4.30	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.enstake gr. 1-2 mm.	70-80	0.04	0.11	0.10		3.4	28.90 - 30.00
34.20 - 35.30	1.10	biot.gn. Mørk mlk-grovk.tildels pegmatitisk, svak imp. Py.Po.Sl.Cp. Brecciert.		0.01	0.14	0.89		4.0	
35.30 - 44.50	9.20	biot.gn. Rel.mørk växl m/grå gn. band.	70-80						

14.07.86

Stellan Burman

Lokalitet: Profil: 41.720

Borehull: 1275

Dato: Juli-86
 Koordinater: X: 925.377,4 Y: 41.724,5
 Retning: Lodd
 Helling/stigning: -90°
 Høyde: +52,8 moh.
 Lengde: 27.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.20	4.20	grå gn. Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm, spor hbl.	70-80						
4.20 - 7.20	3.00	hbl.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band, rel.gr-rik 1-2 mm.	70-80						
7.20 - 8.90	1.70	kjernetap							
8.90 - 22.20	13.30	grå gn. Rel.lys mlk.enstaka hbl. gn.band.	70-80						
22.20 - 23.20	1.00	kjernetap							
23.20 - 25.80	2.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.enstaka hbl. gn.band.	70-80	0.01	0.02	0.01		1.9	2480-2580
25.80 - 27.30	1.50	<u>malm</u>	70-80	0.64	0.42	3.96		6.1	
14.07.86 Stellan Burman									

Lokalitet: 41.720

Borehull: 1274

Dato: Juni-86

Koordinater: X: 925.372,3 Y: 41.721,5

Retning: Lodd

Helling/stigning: -90°

Høyde: +52,3 moh.

Lengde: 32,30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	skarn Grønn mlk.rik impr. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>							
0.20 - 24.10	23.90	grå gn. Lys mlk.enkelte cm tykke hbl.gn.bånd, gr.rik.	70	0.03	0.01	0.04		1.4	23.10 - 24.10
24.10 - 28.70	4.60	grå gn m/skarn Rel.lys mlk.delvis växl m/biot.gn.band, striper impr. <u>Py.Sl.Cp.Gn.</u>	80	1.21	0.35	7.31		6.74	
28.70 - 30.05	1.35	grå gn. Lys mlk.spor hbl.	70-80	0.09	0.10	0.13		2.4	
30.05 - 31.40	1.35	biot.gn. Pegmatitisk Mørk mlk, brecciert sprekkfyllinger m/ <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>		1.46	0.64	1.79		3.8	
31.40 - 32.30	0.90	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	80	0.04	0.01	0.80		1.7	
17.6.86 Stellan Burman									

Lokalitet: 41.720

Borehull: 1273

Dato : Juni-86
 Koordinator : X: 925.364,3 Y: 41.721,5
 Retning : N.
 Helling/stigning: +80°
 Høyde : +57,1 moh
 Lengde : 8,00 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.80	1.80	biot.gn. Mørk mlk.impr. <u>Py. Sl?</u> Foldet.	70-90	0,34	0,39	1,55	-	6,5	
1.80 - 5.70	3.90	grå gn. Rel.lys mlk.skarn-førende rik impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> Runde folder.	}	0,32	0,27	8,88		7,6	180-300
				1,46	0,70	12,24		8,5	300-450
				0,86	0,47	2,07		6,9	450-570
5.70 - 7.80	2.10	hbl.gn. Mørk mlk.sprette gr.1-3 mm <u>Sl.</u> ved 6.20 m.	70-80	0,41	0,37	1,37		4,9	570-670
7.80 - 8.00	0.20	grå gn. Lys mlk.svak impr. <u>Py.</u>	80						

17.6.86

Stellan Burman

Lokalitet: ca. 41.720

Borehull: 1272

Dato: Juni-86

Koordinater: X: 925.364,3 Y: 41.721,5

Retning: Lodd

Helling/stigning: -90°

Høyde: +52,4 moh.

Lengde: 31,80 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.05	2.05	grå gn. Lys mlk.enstaka cm tykke biot.gn.band.Sprette gr. 1-3 mm.	80-90						
2.05 - 5.40	3.35	kjernetap							
5.40 - 20.10	14.70	grå gn. Lys mlk.enstaka smale hbl.gn.band,sprette gr. 1-3 mm.Fr.9.50-9.70 åpen fold i hbl.gn.gr.rik. Fr.19.20-19.80 åpne folder	70-90 < 70-80						
20.10 - 22.80	2.70	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/biot. hbl.gn.band,gr-rik.	80	0.02	0.01	0.07		2,8	21,80-22,80
22.80 - 24.60	1.80	" " Rel.lys mlk.delvis skarn førende rik impr.Sl.Cp. Gn.Py. Lys Sl.	70-80	0,92	0,07	6,48		7,8	
24.60 - 28.80	4.20	biot.gn. (Pegmatitisk). Rel.mørk mlk-grovk.delvis brecciert,växl m/grå gn. band,skarnførende,striper og band m/Sl.Cp.Gn.Py. spor Po.	70-90	0,94	0,47	6,32		8,2	24,60-26,10
				1,30	0,37	2,00		4,7	26,10-27,60
				0,04	0,14	0,04		4,5	27,60-28,80
28.80 - 30.00	1.20	kjernetap							
30.00 - 30.90	0.90	grå gn.b.d. Lys mlk.sprette gr.1-3mm spor Sl.runde folder.	70-80	0,02	0,03	0,02		2,00	
30.90 - 31.80	0.90	biot.gn. Mørk mlk.växl m/smale grå gn.band,stripet impr. Sl.Cp.Gn.Py.	70	0,09	0,89	2,47		9,5	
16.6.86									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.720

Borehull: 1271

Dato: Mai-86
 Koordinater: X: 925.357,1 Y: 41.721,4
 Retning: Vest
 Helling/stigning: + 70°
 Høyde: + 56,9 moh.
 Lengde: 5,00 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	grå gn. Lys mlk.sprette komp. striper Sl.Cp.Gn.Py.	70	1.96	0.45	4.64		8.1	
0.70 - 3.50	2.80	" " Lys mlk.sprette gr.1-3mm	60-70						
3.50 - 5.00	1.50	hbl.gn. Mørk mlk.växl m/enstaka grå gn.band,gr-førende.	70						

- 03.06.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.720

Borehull: 1270

Dato

Mai-86

Koordinater

X: 925,357,4 Y: 41.721,3

Retning

Lodd

Helling/stigning: -90°

Høyde

+ 52,4 moh.

Lengde

30,00 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.40	2.40	biot.gn. Pegmatitisk.	Rel.mørk mlk-grovk. växl m/grå gn.band,stripet impr. <u>Py.Sl.Cp.Gn.</u>	70-90	0,15	0,44	2,46	5,2	
2.40 - 17.20	14.80	grå gn.b.d.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	70-80	0,03	0,02	0,03	1,7	16,20-17,20
17.20 - 20.50	3.30	biot.gn. Pegmatitisk.	Rel.mørk mlk-grovk. litt växl m/grå gn.band,del- vis brecciert. <u>Sl.Cp.Gn.</u> <u>Py.Po.</u> som striper klyser.	45-90	0,03	0,15	0,60	3,6	
20.50 - 21.10	0.60	Pegm.	Lys grovk. m/biot.skikt, spor <u>Po.</u>		0,03	0,06	0,25	2,3	
21.10 - 22.20	1.10	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	45	0,19	0,13	1,03 ?	3,1	
22.20 - 25.40	3.20	" "	Lys mlk.delvis skarn- førende rik imp. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	80-90	2,53	0,10	8,14	5,8	
25.40 - 27.70	2.30	hbl.gn.	Mørk mlk.Fink.biot.impr. <u>Py.Sl.?</u>	70-80	0,03	0,12	0,16	5,4	
27.70 - 30.00	2.30	musk.biot.gn.	Rel.lys mlk-grovk.foldet delvis ondulerad,stripet imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> <u>Boret gjennom.</u>	45-70	0,26	0,42	3,89	7,7	
03.06.86 Stellan Burman									

Lokalitet: 41.720

Borehull: 1269

Dato : Mai -86

Koordinater : X: 925.352,9 Y: 41.721,3

Retning : S

Helling/stigning: -35°

Høyde : +52,4 moh.

Lengde : 21.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. skarn rik impr. <u>Py.Cp.Gn.</u> Sl. Foldet.	45 > 45	0.40	0.92	7.24		7.5	
1.20 - 1.90	0.70	Pegm. Flager og skikt av biot. Sl.Gn.		0.10	0.30	1.60		2.3	
1.90 - 4.60	2.70	biot.sk. Mørk grovk.växl m/Pegmatitisk biot.gn.Foldet delvis brecciert. Sl.Cp. Gn.Py.som sprickfyllning ar.	45	0.15	0.57	3.79		9.2	1.90-3.20
				0.08	0.31	0.89		7.1	3.20-4.60
4.60 - 8.10	3.50	biot.hbl.gn. Mørk mlk.sprette gr.1-3 mm.Svak impr. <u>Py.</u>	50-60 70	0.01	0.02	0.04		4.1	4.60-5.60
				0.01	0.02	0.04		4.1	5.60-8.10
8.10 - 8.90	0.80	biot.sk. Mørk mlk.Svak impr. <u>Py.Sl.Cp.Gn.</u>	60	0.04	0.15	1.13		5.6	
8.90 - 11.70	2.80	grå gn. m/skarn Rel.lys mlk.rik impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> (Rik malm)	60	1.17	0.56	10.06			
11.70 - 13.10	1.40	Biot.sk. Mørk mlk.Svak impr. <u>Py.</u>	60	0.07	0.14	0.69		8.7	
13.10 - 17.30	4.20	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm enstaka opp til 5 cm tykke biot.hbl.gn.band.	60						
17.30 - 19.30	2.00	Pegm. Lys grovk.m/sprette biot. flager.Litt sprett <u>Po.Py.</u> Fra 18.60-19.30 rik <u>Gn.</u>		0.07	0.14	0.06		1.5	17.30-18.60
				12.74	0.15	1.56		1.3	18.60-19.30
19.30 - 21.00	1.70	grå gn.b.d. Rel.lys mlk,skarnforende rik impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> Foldet. (Boret gjennom)	0-60	1.72	0.68	4.40		5.4	
		09.06.86							
		Stellan Burman							

Lokalitet: 41.720

Borehull: 1268

Dato: Mai-86

Koordinater: X: 925.352,9 Y: 41.719,5

Retning: S

Helling/stigning: -65°

Høyde: +52,4 moh.

Lengde: 19.5 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.70	1.70	biot.hbl.gn. Mørk mlk.rik impr. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	80-90	0,81	0,22	5,88		7,1	
1.70 - 9.90	8.20	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende, växl m/hbl.biot.gn.band. Foldet m/runde folder. Fr. 8.0 m-9.90 m enkelte grovkorniga band m/store gr. 4-6 mm.	70-90 45 0	0,03	0,09	0,15		4,1	1.70-2.70
9.90 - 15.00	5.10	biot.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.biot gn. i starten, til grå gn.b.d. i sluttet m/opp- til 5 cm tykke biot.sk. band, enstaka mm tynne <u>Py.skikt.</u>	70-80						
15.00 - 19.50	4.50	grå gn. Lys mlk.enstaka cm tykke biot.hbl.gn.band.Sprette gr.1-3 mm, spor <u>Py.</u>	80						

04.06.86

Stellan Burman

Lokalitet:

Borehull: 1267

Dato

Mai -86

Koordinater

X: 925.32,1 Y: 41.493,5

Retning

S

Helling/stigning:

- 20°

Høyde

-16,2 moh.

Lengde

32.20

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.00	3.00	biot.gn. Mørk mlk-grovmlk.onduler- ad imp. Sl.Cp.Gn.Py. glide plan ved 0.50.	0-5	0.22	0.25	1.33		6.8	
3.00 - 5.60	2.60	grå gn.m.d. Lys mlk.impr.Py.	20	0.06	0.08	0.11		4.7	3.00-4.00
5.60 - 9.60	4.00	biot.gn. Rel.mørk mlk,litt växl m/enstaka grå gn.band Md. impr. Py.	0-10	0.02	0.31	0.06		5.0	8.60-9.60
9.60 - 18.40	8.80	" Rel.mørk mlk-grovmlk.växl m/grå gn.band,delvis Peg- matitisk,rike malmband. Rik Po. fr.13.85-14.10 m Foldet,delvis brecciert.	0-20	1.11	0.31	0.47		6.8	9.60-11.00
				0.10	0.32	0.12		4.6	11.00-12.50
				0.40	0.61	3.41			12.50-17.00
				0.59	0.57	1.59		5.7	17.00-18.40
18.40 - 22.20	3.80	biot.gn. Mørk mlk-grovmlk.impr.Py. spor Cp. Foldet.	0-10	0.53	0.49	1.51			18.40-19.40
22.20 - 32.20	10.00	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm enstaka smale biot.gn. band m/Py. Slake folder.	20 5 0 0-10						

13.05.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.494.

Borehull: 1266

Dato

Maj -86

Koordinater

X: 925.312,1 Y: 41.493,5

Retning

S

Helling/stigning:

- 12°

Høyde

- 16,2 moh.

Lengde

25,90 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.90	2.90	biot.gn. Mørk mlk, foldet, rik imp. Py. Fr. start Sl.Cp.Gn. Py. (ved 0.50 glideplan)	0-10	0.49	0.26	3.21		7.1	0.00 - 1.50
				0.09	0.19	0.36		5.6	1.50 - 2.90
2.90 - 5.50	2.60	Pegm. Lys mlk-grov, væxl m/biot. gn.band. Sl.Cp.Gn.Py. före- trådesvis i biot.gn.banden Foldet. Brecciert.		0.68	0.78	3.72		4.6	2.90 - 4.20
				0.45	0.23	3.84		5.6	4.20 - 5.50
5.50 - 12.80	7.30	biot.gn. (Pegmatitisk) Mørk mlk-grov. Foldet on- dulerad, væxl m/pegm.band stripet imp. Sl.Cp.Gn.Py.	0-10	0.71	0.29	3.54			5.50 - 11.50
				0.49	0.11	1.91			11.50 - 12.80
12.80 - 14.50	1.70	Pegm.							
14.50 - 17.50	2.00	grå gn.b.d. Lys mlk.gr. førende 1-4mm Foldet.	0-10						
17.50 - 24.30	6.80	grå gn. (m/"biot.stänk") Lys mlk-fink, ligner grå gn.alm. men m/"stänk" av biot. (småle biot.ovaler 10-20 mm lange 1-2 mm brede) Slake folder, spret- te gr. 1-3 mm.	0-5						
24.30 - 25.90	1.60	grå gn. Lys mlk.sprette gr. 1-2mm	5						

13.05.86

Stellan Burman

Lokalitet: Y: 41.494

Borehull: 1265

Dato : Maj -86
 Koordinator : X: 925.312,1 Y: 41.493,7
 Retning : S
 Helling/stigning : -17°
 Höyde : -16,2
 Lengde : 44,30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	Ag	% Fe	
0.00 - 3.80	3.80	Biot.musk. Rel.mørk mlk.småfoldet, i starten spor hbl.m/over- gang til musk.biot.gn. mot slutten,stripet impr. Py.Cp.Gn.Sl.	0-10	0,37	0,35	1,90		6,6	
3.80 - 7.60	3.80	musk.biot.gn. Lys,mlk-grovmlk.ondulerad impr. Py. spor Sl.	0-10	0,08	0,05	0,13		5,9	3,80-4,80
7.60 - 10.70	3.10	biot.gn. Mørk mlk-grovmlk.växl m/ musk.biot.gn.band,svak impr. Py. spor Cp. slake folder.	5-15	0,04	0,22	0,09		4,8	9,70-10,70
10.70 - 32.00	21.30	biot.hbl.gn. Mørk mlk-grov-mlk.växl malm typisk L III W,malm Foldet.Brecciart.	0-10	0,43	0,20	1,22		7,4	10,70-12,00
32.00 - 44.30	12.30	biot.gn. Mørk mlk.delvis växl m/ småle grå gn.band,enkelte spor hbl.ondulerad,Sl. ved 37.50-38.10.	0-10	1,25	0,28	5,23	14,3		12,00-32,00
				0,18	0,21	0,16		5,3	32,00-33,00

13.05.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.495

Dato

April - 86

Koordinater

X: 925.312,1 Y: 41.494,0

Retning

: Sør

Helling/stigning

: -25°

Høyde

: -16,2

Lengde

: 29,10 m.

Borehull: 1264

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.40	5.40	grå gn.m.d. Lys mlk.spor hbl.Rik Py. Sl. 0.00-0.25 1.00-2.00 spor Sl.Cp.	0-30	0.40	0.24	2.59		7.6	0.00-1.00
				0.07	0.24	0.27		6.4	1.00-2.00
5.40 - 7.40	2.00	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk.Rik på gn. 1-6 mm.	40-50						
7.40 - 14.00	6.60	grå gn.m.d. Lys mlk.spor hbl. Rik imp. Py. 8.40-8.70 Py.Sl. 10.70-12.00 rike striper og impr.Py.Fra 10.70- 14.00 Sl.Cp. Pegmatitiske ganger rik på Gl.	15-40	0.12	0.07	0.63		6.9	7.40-8.40
				0.20	0.14	5.12		8.8	8.40-9.40
				0.25	0.23	1.49		7.5	10.70-12.00
				0.62	0.34	0.73		6.7	12.00-13.00
				0.83	0.22	0.56		5.8	13.00-14.00
14.00 - 20.00	6.00	grå gn. Rel.lys mlk.sprett gr. 1.3 mm. i starten rik Py. Po.Sl.Cp.Ved 16.40-17.05 pegmatiske ganger med middels impr.Py.Gl.Sl.Cp. Mot slutten spor hbl.	10-40	0.59	1.01	3.55		6.3	14.00-15.00
				3.21	0.14	0.53		2.8	15.00-16.00
				1.27	0.34	1.37		4.5	16.00-17.05
				0.42	0.27	0.33		4.6	17.05-18.00
20.00 - 22.30	2.30	grå gn. Lys mlk.enkelte smale biot gn.band.foldet,svak imp. Py. företrädesvis i biot. gn.sprett gr.1-3 mm.spor Cp. ved 20.40-20.50 m.	30 0-20						
22.30 - 28.10	5.80	biot.gn. Mørk mlk.foldet(ondulerad) gr.rik mot slutten m/spor hbl.	0-10						
28.10 - 29.10	1.00	hbl.gn. Mørk mlk.,Rund fold ved 28.40.Ved 28.50 avskjer- ing i rund fold av Amfi- bolitisk hbl.gn.	5-10 Fr.28.50 80						

13.05.86 Stellan Burman

Lokalitet: 41.495

Borehull: 1263

Dato: 24.4

Koordinater: X: 925.314,5 Y: 41.493,0

Retning: Ned

Helling/stigning: -90°

Høyde: -16,3

Lengde: 6,70 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	grå gn. Lys mlk. Rik Py. impr.	80						
0.70 - 4.50	3.80	biot.hbl.gn. Mørk mlk.gr.rik 1-9 mm	60-70						
4.50 - 6.70	2.20	grå gn. lys mlk.småle striper m.d.							
Kjell Stenamrk									

Lokalitet: 41.500

Dato

24.4.86

Koordinater

X: 925.314,5 Y: 41.493,0

Retning

Sør

Helling/stigning:

+ 82°

Høyde

- 12,2

Lengde

89,40 m.

Borehull: 1262

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.00	5.00	biot.hbl.gn. Rel.mørk,mlk.städvis gr. rik 5-9 mm.Ved 4.80-4.95 spor skarn.Ved 3.20-3.60 foldet 0-10 ⁰ svak impr. Py.	70-75				g/tAgAu		
5.00 - 6.05	1.05	biot.gn Pegmatitisk Mørk grovk.Rik impr. <u>Po.</u> Py. Tynne striper <u>Sl.</u>	50-60	0.06	0.21	0.40	4.5/0.10	8,7	
6.05 - 13.00	6.95	Grå gn.b.d. Rel.mørk mlk.tynne biot. band med spor hbl.Sprette gr.1-3 mm.	40-80						
13.00 - 13.90	0.90	grå gn. Lys mlk.til fin mlk. tynne <u>Sl.Py.</u> striper.	50-70	0.44	0.12	0.87	17.6/0.20	2,5	
13.90 - 15.90	2.00	biot.gn. Rel.mørk grov mlk-til mlk Spor gr.2-4 mm.Biot.og biot.hbl. soner med <u>Po.</u> Py. <u>Sl.</u> striper.	60	0.42	0.14	1.46	14.4/0.20	5,3	13.90-14.90
				0.09	0.11	0.99	7.0/0.15	4,3	14.90-15.90
15.90 - 17.30	1.40	grå gn.b.d. Rel.mørk mlk.middels imp. <u>Py.</u>	0-50						
17.30 - 23.60	6.30	biot.gn. Pegmatitisk Mørk mlk.til grov mlk. mot slutten i veksling med grå gn.b.d.Rike <u>Py.</u> <u>Po.</u> striper.	60-70						
23.60 - 32.20	8.60	grå gn.m.d. Lys mlk.ved 26.00-26.50 foldet. 0-20 <u>Py.</u> striper.	40-50						
32.20 - 40.20	8.00	grå gn. Lys mlk.i veksling med gr.gn.m.d.Ved 36.70 folde- kne med spor <u>Py.Sl.</u> Rel. rik imp. <u>Py.</u>	10-50						
		2							

Lokalitet:

Borehull: 1262

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
40.20 - 47.40	7.20	biot.hbl.gn.	Rel.mørk mlk.til grov mlk.gr.rik 1-3 mm,en god del foldet.	20-60					
47.40 - 50.20	2.80	grå gn.m.d.	Lys mlk.med smale grå gn.band.	70-80					
50.20 - 51.50	1.30	biot.gn.	Mørk mlk.til grov-mlk. foldet,spor gr.1-3 mm rel.rik imp. Py.	45					
51.50 - 64.00	12.50	grå gn.	Lys mlk.städvis musk.rik. mot slutten spor gr.1-5 mm,en god del foldekne spor hbl.Ved 51.90 spor Sl.	30-50					
64.00 - 70.50	6.50	biot.hbl.gn.	Rel.mørk mlk,sprette gr. 1-3 mm.Rike py.render.	40-60					
70.50 - 73.60	3.10	grå gn.	Lys mlk.spor gr.2-6 mm i veksling med biot.hbl.gn. rik på Py.	60-70					
73.60 - 74.30	0.70	hbl.gn.	Mørk mlk.til grov-mlk. med klyser og striper <u>Py.Po.Sl.</u>	50-70	0,24	0,47	2,18	9.3/0.45	5,6
74.30 - 89.40	15.10	grå gn.	Lys mlk. i veksling med biot.hbl.gn.gr-rik 1-4mm Striper og klyser Py.Po. 80.30-81.00 kjernetap.	50-60 80					
Kjell Stenmark									

Lokalitet: 41.505

Borehull: 1261

Dato: 17.4.86

Koordinater : X: 925.356,0 Y: 41.505,6

Retning : opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : - 7,1

Lengde : 47,40 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 17.00	17.00	grå gn. Lys mlk. Sprette gr. 1-4mm Ved 2.85-2.86 komp. Po. Ved 3.10 spor Cp. 4.20-4.40 peg. 8.20-8.85 musk. gn. Ved 8.50-10.00 foldet.	40-70 Ved 12.40 -12.80 0-20°						
17.00 - 21.10	4.10	grå gn. b.d. Rel. mørk mlk. i veksling med smale band biot. gn. Ved 19.30-19.35 middels rand Py. Sl. Stådv. gr. rik 4-7 mm.	60-70						
21.10 - 25.10	4.00	biot. gn. Pegmatitisk Mørk mlk.-grov mlk. Rel. rik imp. Py. Po. i biot. band, foldet.	40-75						
25.10 - 29.90	4.80	biot. gn. Rel. mørk mlk.-grov mlk. stådv. biot. band, rik på Py. Po. i veksling med grå gn. lys mlk. Ved 26.35- 26.55, 26.80-26.85 rik biot. med spor hbl. og striper Py. Sl.	50-80	0.03	0.04	0.11		2,8	25,0-26,00
				0.03	0.07	1,54		3,2	26,00-27,00
				0.03	0.07	0,13		3,3	27,50-28,00
29.90 - 34.95	5.05	grå gn. Lys mlk. sprett gr. 1-4mm musk. rikere partier ved 31.60 spor Py. Sl. stånd- vis imp. Py.	70-75						
				0.09	0.05	0.20		2,3	34,00-34,95
34.95 - 35.95	1.00	grå gn. b.d. Rel. mørk mlk. enkelte biot. band med skarn og enkelte striper Py. Sl. Ved 35.10- 35.20 biot. hbl. skarn rik Py. Sl. Gl. Cp. Ved 35.90 Sl. striper.	65-75	0.03	0,17	3,41		4,3	

Borehull: 1261

Dato
Koordinator :
Retning :
Helling/stigning:
Høyde :
Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
35.95 - 47.40	11.45	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm med enkelte musk.rikere partier spesielt mot slut- ten.	70-80	0.02	0.01	0.07		1.9	3595-37.00
		Kjell Stenmark							

Lokalitet: 41.505

Dato 9-4

Koordinater : X:925.356,0 Y:41.505,6

Retning : Sør

Helling/stigning: + 82°

Høyde :

Lengde : 50,70 m.

Borehull: 1260

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 17.20	17.20	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm Musk.rikere partier, økende biot.mot slutten. Ved 15.00-15.80 musk.gn. Foldet ved 7.20-7.70 Ved 15.80 spor Sl.Ved 7.15 spor hbl.Komp. Po. ved 2.90-2.95.	70-80 45						
17.20 - 25.10	7.90	biot.gn. Pegmatitisk Mørk, grov medelgr. til grov.Ved 21.95-22.80 striper og klyser Po.Py. Sl.Cp. i øvrigt imp.Py. Po. En god del foldet.	70-80	0,05	0,07	0,13		2,5	21,00-21,75
				0,03	0,11	2,37		3,8	21,75-23,00
				0,03	0,03	0,09			23,00-24,00
25.10 - 26.65	1.55	grå gn. Lys mlk.Rel.gr.rik 1-3mm	40-60						
26.65 - 30.00		biot.gn. Rel.mørk mlk.i veksling med tynne grå gn.band, tynne Sl. striper med spor hbl. i biot.rike band 27.70-28.50.	60-80	0,08	0,20	0,71		6,8	27,70-28,50
30.00 - 33.75	3.75	grå gn. Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm med enkelte biot. band mot slutten svak imp. Py.	60-70						
33.75 - 35.65	1.90	biot.gn. Rel.mørk mlk.til grov mlk.Ved 34.70-34.80 fol- det med skarn, en god del foldet, mm tynne Py.rendr	20-60						
35.65 - 38.80	3.15	grå gn. Lys mlk.stadvis musk.rik Ved 37.10-37.40, 37.60 folder med rik Py.Sl. ved 37.60 Gn.rand.		0,04	0,08	0,10		1,7	36,00-37,00
				0,35	0,26	3,78		4,7	37,00-38,00
				0,02	0,01	0,04		2,0	38,00-38,80

Lokalitet:

Borehull: 1260

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
38.80 - 41.70	2.90	biot.gn. Rel.mørk mlk.til grov mlk.städvis gr.1-3 mm 39.10-39.70 kvarts en god del foldet.Striper og klyser <u>Py.Po.Sl.Gn.</u> Städvis et Pegmatitisk utseende.	75-80	0.02	0.06	0.12		2.7	38.80-39.80
				0.02	0.10	0.88		3.7	39.80-41.00
				0.02	0.32	1.27		4.7	41.00-41.70
				0.01	0.01	0.04		1.6	41.70-43.00
41.70 - 44.00	2.30	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	70-75						
44.00 - 47.25	3.25	biot.gn. Rel.mørk mlk.til grov mlk.sprette gr.2-7 mm i veksling med grå gn.Biot. rike band med <u>Py.Sl.</u>	60-75	0.02	0.09	0.37		2.9	45.00-46.00
				0.03	0.06	0.41		2.5	46.00-47.00
47.25 - 50.70	3.45	grå gn.b.d. Lys mlk.sprette gr.1-5 mm.Städvis spor <u>Py.</u>	70-80						

Kjell Stenmark

Lokalitet: 41.505

Borehull: 1259

Dato

8 - 4

Koordinater

: X: 925.353,9 Y: 41.505,2

Retning

: Sør

Helling/stigning:

+ 72°

Høyde

: - 7,4

Lengde

: 51,60 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.50	6.50	grå gn. Lys mlk.sprette små gr. i veksling med tynne lag grå gn. b.d.	70-85						
6.50 - 10.00	3.50	grå gn.b.d. Rel.mørk mlk.sprette gr. 2-6 mm.	60-75						
10.00 - 16.90	6.90	grå gn. Lys mlk.sprette gr. 3-7mm i veksling med grå gn. b.d.band ved 14.10-14.40 grå gn.b.d.rik imp.Py. Ved 16.40-16.90 grå gn. musk.d.	60-80						
16.90 - 21.55	4.65	grå gn.b.d. Rel.mørk mlk,sprett gr. 3-7 mm,enkelte grå gn. band,stedvis Py.rik.	60-75						
21.55 - 23.70	2.15	biot.gn. Pegmatitisk Mørk mlk-grov,rik imp.Py. i biot.band.Ved 21.90 spor Cp.	50-60						
23.70 - 25.90	2.20	grå gn.b.d. Rel.mørk mlk.städvis grov mlk.Rel.rik på gr.1-3 mm. Ved 23.80 en biot.rand med spor hbl. rik på Py. Sl.		0,02	0,02	0,08		2,1	24,90-25,70
25.90 - 33.60	7.70	grå gn. Rel.lys finmlk-mlk.städvis musk.rik,i veksling med biot.gn.städvis peg. mlk.til grov mlk. med rike render og klyse Py. Sl. til 29.00.Spor hbl.ved 28.50 mot slutten rike Py.render i musk.rike grå gn.Spor Sl.ved 32.45.	60-70	0,02	0,09	0,84		3,8	25,70-27,00
				0,02	0,03	0,06		2,1	27,00-28,00
				0,02	0,06	1,04		4,1	28,00-29,00
				0,02	0,04	0,11		2,8	29,00-30,00

.....2

Lokalitet:

Borehull:

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
33.60 - 40.10	6.50	grå gn. Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm med enkelte tynne biot.band.	60-70	0,02	0,02	0,07		2,1	39,00-40,10
40.10 - 43.75	3.65	grå gn.m.d. Lys mlk.i veksling med biot.gn.band opp til 3-4 cm, städvis Pegmatitiskt utseende. Rike striper og klyser Py.Po.Sl. mest i biot.banden. Rik Gn. ved 40.60. Ved 42.40 foldet.	60-80	0,90	0,34	2,86		3,7	40,10-41,00
				0,07	0,09	0,61		3,7	41,00-42,00
				0,04	0,08	0,53		3,0	42,00-43,00
				0,02	0,08	0,47		3,2	43,00-43,75
43.75 - 45.10	1.35	grå gn. Lys mlk.	60-70	0,02	0,03	0,04		2,0	43,75-45,10
45.10 - 51.60	6.50	grå gn.m.d. Lys mlk.spor gr.1-3 mm i veksling med gr.gn.b.l. og enkelte biot band. Sprette striper og klyser Py.Sl.Cp. Städvis noe foldet.	50-80	0,28	0,20	0,77		3,4	45,10-46,00
				0,43	0,24	2,05		4,3	46,00-47,00
				0,02	0,03	0,07		2,4	47,00-48,00
				0,02	0,02	0,04		2,1	48,00-49,00
				0,02	0,11	0,31		2,5	49,00-50,60

Kjell Stenmark

Lokalitet: 41.500

Borehull: 1258

Dato

Mars-86

Koordinater

X: 925.3539 Y: 41.505,7

Retning

: 5

Helling/stigning: + 62°

Høyde

: - 7,4

Lengde

: 92,30 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.80	5.80	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm enstaka biot.skikt m/Py.	60-70				g/tAuAg		
5.80 - 20.20	14.40	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/dm tykke biot.gn.band,sprette gr.1-3 mm,imp.Py.företrä- desvis i biot.gn.banden. Ved 13.80 komp.Po.2 cm.	60-70						
20.20 - 23.10	2.90	biot.gn. (Pegmatitisk) Rel.mørk mlk-grovk.delvis brecciert,foldet,spor Sl Cp.Gn.Py.	45-70	0.02	0.07	0.09	0.10/2.0	3,7	20,30 - 21,30
				0.01	0.07	0.10	0.10/1.9	4,2	21,30 - 22,30
				0.14	0.02	0.34	0.10/4.1	2,3	22,30 - 23,10
23.10 - 25.20	2.10	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	50	0.02	0.02	0.07	0.10/2.6	1,9	24,20 - 25,20
25.20 - 27.10	1.90	biot.gn. Mørk mlk.delvis brecciert stripet Sl.Cp.Gn.Py.	50	0.94	0.62	2,49	0.80/50.7	6,2	26,20 - 26,20
				0.01	0.18	0.16	0.10/7.0	4,8	26,20 - 27,10
27.10 - 44.70	17.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band og enstaka musk. gn.band,foldet.Fra 40.60- 40.70 Sl.	45-70	0.02	0.04	0.07	0.10/1.5	2,2	27,10 - 28,10
				0.02	0.03	0.03	0.10/0.2	1,5	43,70 - 44,70
44.70 - 45.60	0.90	biot.hbl. Mørk mlk.imp. Sl.Cp.Gn.Py. Po.	60	0.04	0.73	2,69	0.20/17.3	10,7	
45.60 - 47.00	1.40	grå gn. Lys mlk.små folder,spor gr. 1-2 mm.	60-70						
47.00 - 56.20	9.20	biot.gn. Rel.mørk mlk.delvis hbl- førende,växl m/grå gn. band,delvis foldet.	45-70	0.04	0.04	0.21	0.10/0.5	1,9	55,20 - 56,20
56.20 - 57.40	1.20	biot.gn. Mørk mlk.hbl-førende, stripet imp. Sl.Cp.Gn.Py.	60	0.24	0.34	2,39	0.10/8.4	8,6	
		2							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1258

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
57.40 - 62.60	5.20	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm,spor Py. foldet spor Gn ved 59.25.	50-60	0.73	0.25	0.53	2.85/51.9	3.5	61.60-62.60
62.60 - 67.60	5.00	biot.gn. Rel.mørk mlk.litt växl m/ grå gn,spor hbl.stripet impr.Sl.Cp.Gn.Py. Spisse folder.	45-50	0.80 0.97 0.40 0.20 0.47	0.54 0.30 0.23 0.13 0.22	2.79 2.66 3.16 4.88 2.96	0.65/22.0 0.45/29.0 0.20/12.4 0.05/6.5 0.15/11.7	6.3 7.3 7.7 9.8 6.8	62.60-63.60 63.60-64.60 64.60-65.60 65.60-66.60 66.60-67.60
67.60 - 82.10	14.50	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm runde folder.	45-70	0.05 0.10	0.21 0.06	0.09 0.29	<0.10/0.9 <0.10/2.5	1.6 1.6	67.60-68.60 81.10-82.10
82.10 - 89.80	7.70	biot.gn. Mørk mlk.växl m/biot.hbl. gn,grå gn.band,striper imp.Sl.Cp.Gn.Py. (spisse folder)	50-70	0.35 0.48 0.48 0.60 0.02 0.61 0.67 5.24	0.24 0.92 0.67 0.18 0.02 0.21 0.38 0.08	1.55 2.38 3.29 1.50 0.20/12.9 1.80 2.54 0.05	0.20/11.4 0.85/20.0 0.30/14.9 0.20/12.9 0.10/1.1 0.30/12.3 0.70/16.3 0.95/127.0	4.4 9.6 13.3 6.1 2.4 4.8 7.7 2.2	82.10-83.10 83.10-84.10 84.10-85.10 85.10-86.10 86.10-87.10 87.10-88.10 88.10-89.10 89.10-89.80
89.80 - 91.20	1.40	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	60-70	0.10	0.03	0.03	0.15-3.7	1.3	89.80-90.80
91.20 - 92.30	1.10	biot.hbl.gn. Mørk mlk.sprette gr.1-3mm svak imp. Py. Foldet.	50-70						

29.03.86

Stellan Burman

Borehull: 1257

Dato : Mars-86

Koordinater : X: 925.352,6 Y: 41.505,8

Retning : S

Helling/stigning: + 45°

Høyde : -7,6

Lengde : 53,50

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.30	4.30	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.l-3mm	50-70					
4.30 - 26.60	22.30	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.m/växl biot. delvis biot.skiktad, sprette gr.l-3 mm,ved 21.20 små runde folder. Fr.ca 20 m små spor hbl.	45-60					
26.60 - 30.00	3.40	biot.gn.	Rel.mørk mlk.litt växl m/grå gn.band.Spor Py.	50					
30.00 - 45.80	15.80	biot.gn. Pegmatitisk	Mørk mlk-grov växl m/ biot.hbl.gn.band.imp.Py. enkelte spisse folder. Delvis brecciert. Ved 33.10-33.20 Sl Ved 44.00 m " 45.95 Sl.	45-60 0 45					
45.80 - 53.50	7.70	grå gn.	Lys mlk.litt växl m/musk gn.m/skarn imp.Py. Ved 46.70 runde folder " 52.80 " "	50-60					
		19.03.86 Stellan Burman							

Borehull: 1256

Dato : Mars 86

Koordinater : X:925.352,6 Y:41.505,8

Retning : S

Helling/stigning: + 53°

Høyde : -7,6

Lengde : 42,30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.20	4.20	grå gn.	Lys mlk.sprette gr. 1-4mm	45-50					
4.20 - 20.40	16.20	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.i veksling med biot.band,städvis gr. rik 1-4mm.Spor hbl.Ved 15.80-16.10 musk.gn. imp. <u>Py.</u>	45-50					
20.40 - 25.45	5.05	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	50-60					
25.45 - 30.70	5.25	biot.gn. Pegmatitisk	Rel.mørk mlk-grovk.Foll ved 26.75.Rik imp. <u>Py.</u> i biot.band,komp.Po.Ved 29.20-29.22 Ved 30.20 <u>Sl.</u>	50-60					
30.70 - 34.00	3.30	grå gn.	Lys mlk.i veksling med grå gn.b.d.sprette gr. 1-3 mm.	45-55					
34.00 - 39.75	5.75	grå gn.b.d.	Rel. mørk mlk.i veksling med biot.gn.pegmatitisk Stedvis hbl.og skarn, sprett gr.2-6 mm.38.80 fold.Rik imp. <u>Py.</u>	45-65					
39.75 - 42.30	2.55	grå gn.	Rel.lys mlk.med enkelte biot.gn.band.Ved 41.10 <u>Sl.</u> imp. <u>Py.</u>	10-50					
Kjell Stenmark									

Lokalitet: Profil. 41.550

Borehull: 1255

Dato 11.03.86
 Koordinater : X: 925.360,7 Y: 41.556,4
 Retning : S.
 Helling/stigning: + 90°
 Høyde : - 7,9
 Lengde : 34,80 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.25	3.25	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	80					
3.25 - 7.00	3.75	grå gn.b.d.	Rel.mørk,sprette gr.1-3 mm i växl med biot.gn. med biot.band,imp. <u>Py.</u> spor hbl.	60-75					
7.00 - 18.65	11.65	grå gn.	Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm i växl med grå gn. b.d.og gr.rikere 2-5 mm imp. <u>Py.</u>	60-70					
				0.01	0.07	0.14		3.5	18.00-18.65
18.65 - 20.10	1.45	biot.gn.	Mørk mlk.sprette striper og klyser <u>Sl.Py.</u>	0.14	0.25	2.61		7.2	
20.10 - 26.35	6.25	grå gn.b.d.	Rel.mørk mlk.biot.rikere band med rik gr.2-6 mm med middels imp. <u>Py.Po.</u> ved 24.10 <u>Sl.</u>	65-75					
				1.98 ?	0.08	0.20		3.0	25.75-26.35
26.35 - 27.70	1.35	grå gn.	Rel.lys mlk.i växl med skarn hbl.band,rik på <u>Sl. Gn.</u> i øvrigt <u>Py.Sl.</u> som striper og klyser.	60-55					
				0.70	0.28	7.44		6.3	
27.70 - 29.15	1.45	grå gn.b.d.	Rel. lys mlk.enkelte biot. band med <u>Po.Py.Sl.</u> klyser.		0.02	0.17	0.29	3.3	
29.15 - 30.00	0.85	grå gn.	Lys mlk. <u>Sl.</u> striper ved 29.45.	65	0.01	0.12	0.53	2.7	
30.00 - 34.80	4.80	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.med enkelte biot.gn.band.Ved 31.95 skarn og hbl.med <u>Sl.</u> Ved 34.60 biot.band med <u>Sl.</u>						
Kjell Stermark									

Borehull: 1254

Dato : 03.11.85
Koordinater : X: 925.360,8 Y: 41.556,4
Retning : S.
Helling/stigning: + 82°
Høyde : 7,9
Lengde : 35,00 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.70	2.70	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm Ved 1.00 spor Sl.	60-70						
2.70 - 25.90	23.20	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm og växl.med biot.gn.som städvis fører spor hbl. og rel.rik impr.Py. Ved 21.95 Sl.	65-75 50						
25.90 - 33.80	7.90	grå gn.b.d. Rel.mørk,enkelte biot. band og opp til 10 cm striper av biot.hbl.gn. Sl. som striper og klyser framst i biot.gn.banden og rel. komp. Sl. i biot. hbl.gn.mot slutten spor skarn.	60	0.02 0.08 0.17	0.06 0.12 0.38	0.22 1.12 2.29		2.3 6.6	25.00-25.90 25.90-28.00 28.00-33.80
33.80 - 35.00	1.20	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm. Kjell Stenmark	65	0.01	0.04	0.11		2.3	

Lokalitet:

Borehull: 1253

Dato

11.03.86

Koordinater

: X: 925.360,8 Y: 41.556,4

Retning

: S.

Helling/stigning:

+ 72°

Høyde

: - 79

Lengde

: 38,25 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 16.05	16.05	grå gn. Lys mlk.sprett gr.1-3mm litt växl m/cm smale band av biot.gn. <u>Py.</u> imp.i biot. gn.banden.	50-55						
				0.02	0.01	0.07		1.8	16.00 - 16.05
16.05 - 17.00	0.95	biot.gn. Rel.mørk mlk.middels imp. <u>Py.Sl.Cp.</u>	55	0.02	0.18	1.47		6.1	
17.00 - 19.95	2.95	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm smale <u>Py</u> -rike biot.band.	55	0.02	0.03	0.12		2.4	17.00 - 18.00
				0.01	0.01	0.02		1.7	19.00 - 19.95
19.95 - 20.75	0.80	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.skarn og hbl. band delvis <u>komp.malm</u>	50	0.59	0.19	3.91		5.7	
20.75 - 24.30	3.55	grå gn.b.d. Rel.mørk mlk.enkelte cm smale biot.band,sprette imp. og klyser med <u>Py.Sl.</u> <u>Cp.</u>	60-70	0.11	0.11	0.28		3.9	20.75 - 22.00
				0.06	0.10	1.81		4.6	22.00 - 23.00
				0.03	0.11	0.65		4.4	23.00 - 24.00
24.30 - 25.15	0.85	grå gn. Lys mlk-grov mlk.band med skarn og hbl.Komp. band og klyser <u>Py.Sl.Cp.</u>		0.40	0.21	4.04			24.30 - 25.15
25.15 - 34.90	9.75	grå gn. Rel.lys mlk,spor gr.1-3 mm i växl med biot.gn. band med hbl.med rel.komp. <u>Py.Sl.30.00-30.50</u> skarn band. 31.80-34.00 glide- flater. 31.20-31.75 rik imp. <u>Cp.</u>							
				Se analysprotokoll.					
34.90 - 36.10	1.20	biot.gn. Mørk mlk.sprette band og klyser med <u>Py.Sl.Cp.</u>	60	0.02	0.27	1.85		7.5	
36.10 - 38.25	2.15	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm		0.01	0.05	0.33		2.5	36.10 - 37.00

Kjell Stenmark

Lokalitet: 41.550

Borehull: 1252

Dato

Feb.-86

Koordinator

X: 925.360,4 Y: 41.556,4

Retning

: S

Helling/stigning: + 62°

Høyde

: - 80

Lengde

: 32,30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 20.80	20.80	grå gn. lys mlk.sprette gr.1-3mm litt växl m/cm smale band av biot.gn,biot.hbl.gn. imp.Py. i biot.gn.banden.	60-80						
20.80 - 28.20	7.40	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band skiktad m/biot. m/Py.Po. enstaka spor Cp. Ved 21.80 Sl.Gn " 27.20 " .	60-80						
				0,67	0,05	1,93		2,6	2200-2820
28.20 - 29.90	1.70	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.skarn delvis komp.malm Foldet.	45 45	0,55	0,69	10,88		7,3	
29.90 - 30.80	0.90	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.imp. Py.	60-70	0,09	0,16	0,78		3,5	
30.80 - 32.30	1.50	grå gn. Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm.Foldet.	70 70						

28.02.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.550

Borehull: 1251

Dato: Feb.-86

Koordinater: X: 925,360,4 Y: 41.550,4

Retning: S

Helling/stigning: + 53°

Høyde: - 8,0

Lengde: 22,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
0.00 - 5.20 5.20 - 13.60	5.20 8.40	grå gn. " "	Lys mlk.sprette gr.1-3mm Rel.lys mlk.växl m/småle biot.gn.band även hbl. førende uppsprekkt m/ mange stick.	70 70-80						
13.60 - 17.50	3.90	biot.gn. Pegmatitisk	Rel.mørk grovk.delvis brecciert.Py.Cp.Sl.Gn. som sprette klyser og skikt.Spor Po.	45-70	0,04	0,07	0,31		3,6	13,60-15,00
					0,18	0,11	1,14		4,1	15,00-15,50
17.50 - 18.60	1.10	biot.gn.	Mørk mlk.imp. Py.	50	0,05	0,08	0,08		5,2	
18.60 - 21.90	3.30	biot.gn.	Mørk mlk.foldet,spor Sl. ved 18.85 og 20.90.	50-70	0,10	0,13	0,38		4,4	20,90-21,90
21.90 - 24.80	2.90	" "	Rel.mørk mlk.växl grå gn. skarn,stripet impr.Py.Cp. Gn.Sl. Foldet.	40-80	0,05	0,10	0,58		4,1	21,90-22,90
					0,13	0,14	4,40		8,6	22,90-23,90
					0,90	1,53	5,68		10,8	23,90-24,80
24.80 - 27.10 27.10 - 27.30	2.30 0.20	grå gn. hbl.gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm Mørk mlk.sprette gr.1-3mm	60-70 60	0,06	0,03	0,07		1,9	24,80-25,80
24.02.86 Stellan Burman										

24.02.86

Stellan Burman

Lokalitet: 42936

Borehull: 1250

Dato: Jan.-86

Koordinatorer: X: 925.411,0 Y: 42937,0

Retning: N

Helling/stigning: -29°

Høyde: -35,4

Lengde: 57,30m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.imp.Py.	45	0,22	0,23	1,07		7,7	1,50-2,50
2.50 - 5.10	2.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.Litt skarn.Stripet imp. Py.Cp.Gn.Sl.Foldet.	10-45	0,83	0,29	2,18		5,3	
5.10 - 28.40	23.30	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm Fr.10.90-11.05 komp.malm Fr.15.30-15.35 " "	35-45	0,05	0,01	0,03		1,6	5,10-6,10
28.40 - 29.90	1.50	Pegm. Brecciert m/karbonat i- fyllningar,samt viss kloritisering,spor Py. Cp.							
29.90 - 42.20	12.30	grå gn. Rel.lys mlk.litt växl, smale m/biot.band.Sprette gr.1-3 mm.Fr.31.50-33.00 små runde folder.Overgang mot biot.gn.	35-45						
42.20 - 45.80	3.60	biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.svak imp. Py.	45						
45.80 - 47.60	1.90	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm.	45						
47.60 - 50.00	2.40	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl mot biot gn.enstaka gr.1-3 mm.	40						
50.00 - 53.00	3.00	hbl.biot.gn. Mørk mlk.sprette gr.1-4 mm,delvis imp. Py.	40						
53.00 - 56.10	3.10	Amf. Mørk mlk-fink,sprette gr.	50						
56.10 - 57.30	1.20	grå gn. lys mlk-fink.enstaka gr. 1-2 mm.	50						

18.02.86

Stellan Burman

Lokalitet: 42936

Borehull: 1249

Dato: Feb.-86

Koordinator: X: 925,408,5 Y: 42936,5

Retning: N

Helling/stigning: -45°

Høyde: -35,6

Lengde: 43,30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.50	4.50	Biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band,sprette smale <u>Sl</u> . <u>Cp.Py.</u> striper.	45-65	0,19	0,22	0,55		5,1	
4.50 - 24.30	19.80	grå gn. Rel.lys mlk.enkelte cm smale biot.gn.band.Ved 8.40-8.50 hbl,skarn m/ <u>Sl.Pb.Py.</u> samt glideflater	50-60						
24.30 - 24.80	0.50	biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.skarn imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>		0.80	0.35	2,49		4,3	
24.80 - 31.20	6.40	grå gn. lys mlk.sprette gr.1-3 mm.Foldet.	0-20						
31.20 - 32.50	1.30	biot.gn. Mørk mlk.enstaka hbl. band,foldet,spor <u>Po</u> . imp. <u>Py.</u>	0-45						
32.50 - 41.60	9.10	hbl.gn. Mørk mlk.gr.førende 1-3 mm,svak imp. <u>Py.</u>	45						
41.60 - 43.30	1.70	grå gn. lys mlk.sprette gr.1-4mm	60						

19.02.86

Stellan Burman

Lokalitet: Y: 42.936

Borehull: 1248

Dato: Feb.-86

Koordinater: X: 925.408,5 Y: 42.936,5

Retning: N

Helling/stigning: - 82°

Høyde:

Lengde: 38,30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	2.30	biot.gn. Mørk mlk.imp.Py.spor Sl. Cp.Gn.	80-90	0,14	0,23	0,60	-	6,2	
2.30 - 7.60	5.30	grå gn. Lys mlk.sprette gr.	80						
7.60 - 9.80	2.20	Pegm.							
9.80 - 20.50	10.70	grå gn. Lys mlk.enstaka smale pegm,biot.gn.band.Sprette gr. 1-3 mm.	80-90						
20.50 - 23.00	2.50	biot.musk.gn. Rel.mørk växl m/smale grå gn.band,enkelte smale striper Sl.Cp.Gn.Py.Po.	70-80	0,20	0,62	1,81		7,1	
23.00 - 26.40	3.40	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.m/spor hbl,enstaka gr. 2-3 mm.	80						
26.40 - 27.40	1.00	biot.gn. Mørk mlk.svak imp. Py.	80						
27.40 - 38.30	10.90	hbl.gn. Mørk mlk.tildels gr.rik 1-4 mm.Folder fra 37.00- 38.30.							

10.02.86

Stellan Burman

Lokalitet: Vestgruben, stigort og ut i dalen

Borehull: 1247

Dato 17-4-86

Koordinater : X: 925.413,5 Y: 41.551,7

Retning : N

Helling/stigning: +62°

Høyde : + 0,1

Lengde : 34.60 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	grå gn. b.d. Rel.mørk mlk., ved 1.05 spor hbl, en tynn Sl.Py. stripe ved 0.45. Foldet.	0-45						
1.10 - 19.80	18.70	grå gn. Lys mlk.städvis gr.rik 1-3 mm med både musk. og biot.rikere band, enkelte peg.band.	65-75						
19.80 - 21.80	2.00	grå gn.b.d. Rel.mørk mlk.	50-70						
21.80 - 25.70	3.90	musk.gn. Lys mlk, foldet, spor gr. 1-3 mm.	0-65						
25.70 - 27.35	1.65	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk.svak imp.Py.	50						
27.35 - 34.60	7.25	grå gn. Lys mlk.spor gr.2-4 mm i biot.rikere band.	40-50						
Kjell Stenmark									

Lokalitet: 43.050

Borehull: 1246

Dato : Nov.-85
 Koordinater : X: 925.391,8 Y: 43.054,6
 Retning : S35°W
 Helling/stigning: Lodd -90°
 Høyde : -48,0
 Lengde : 5.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2-50	2.50	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band.Spor <u>Sl</u> .ved 2.40- 2.50 imp. <u>Py</u> .	70-80						
2.50 - 5.00	2.50	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	80-90						
		6.1.86 Stellan Burman							

Lokalitet: 43.050.
43.000

Borehull: 1245

Dato: 2.12.85
Koordinater: x: 925.388,8 y: 43.054,6
Retning: S
Helling/stigning: 64°
Høyde: -47,9
Lengde: 73,65 m.

side 1

Side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% Sg	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	grå gn. Musk.d.middels imp. <u>Py.</u> <u>Sl.Gn.Cp.</u>	45	0,62	0,27	3,18	9,8	4,7	
0.70 - 3.50	2.80	grå gn.b.d. Rel.mørk stedvis spor hbl og gr.2-3 mm,smale grå gn.svak imp. <u>Py.Sl.Gn.Cp.</u>		0,27	0,16	0,53	5,7	5,4	0,70-2,70
				0,01	0,06	0,15	1,1	6,0	2,70-3,50
3.50 - 12.40	8.90	grå gn. alm. Enkelte smale biot.rikere band. 4.05-4.20 middels imp. <u>Py.Sl.Cp.Gn.</u> i et foldekne.	40-45	0,14	0,08	1,56	0,7	4,5	3,50-4,50
				<0,01	<0,01	0,02	<0,01	1,2	4,50-5,50
12.40 - 13.40	1.00	grå gn.b.d. Stevis også hbl.musk. rikere mot slutten,små gr. 1-2 mm.	40-45	0,09	0,04	0,17	3,0	2,4	
13.40 - 17.25	3.85	grå gn. musk.d.med band av kv. og biot.Stedvis spor hbl. smale opptil ca. 10 cm. rel.rik <u>Py.Sl.Gn.Cp.</u> Litt foldet.	60-40	0,86	0,24	1,92	18,5	3,8	13,40-14,40
			30-45	0,43	0,35	2,62	9,7	4,8	14,40-17,25
17.25 - 39.45	22.20	biot.hbl.gn. Litt musk.stedvis gr.rik smale Amf.band mot slut- ten.Middels imp. <u>Py.</u>	60-80	0,01	0,02	0,03	0,8	4,7	17,25-18,25
39.45 - 53.50	14.05	grå gn.alm. Enkelte opp til 5 cm peg. band.Noen få tynne amf. band. 48.00-48.30 foldet	50-70						
53.50 - 61.40	7.90	hbl.biot.gn. Stedvis gr.rik med parti- er amf.bolitisk.Skarn. band 56.30-56.55.	60-80						
61.40 - 62.10	0,20	Peg.							
62.10 - 63.10	1.00	gr.gl.gn. b.d.grov medl grov.Store gr. 4-8 mm "Stektolitisk"	70						

.....2

.....2

Lokalitet:

Borehull: 1245

Dato :
 Koordinator :
 Retning :
 Helling/stigning :
 Høyde :
 Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
63.10 - 65.15	3.05	Amf.							
65.15 - 65.80	0.65	Peg,							
65.80 - 69.30	3.50	gr. amf.							
69.30 - 73.85	4.55	grå gn. b.d. stedvis gr.							
06.12.85									
Kjell Stenmark									

Lokalitet: 43,050

Borehull: 1244

Dato : Okt.-85
 Koordinater : X: 925.388,5 Y: 43.054,5
 Retning : S 35°W
 Helling/stigning: - 10°
 Høyde : - 46.9
 Lengde : 135,60 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.80	7.80	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band,biot.musk,spor hbl.spor <u>Py</u> .sprette gr. 1-3 mm.	0-5						
7.80 - 9.50	1.70	biot.gn. Mørk mlk-grovk.delvis brecciert,pegmatitisk, spor hbl. <u>Py</u> . Foldet.		0,57	0,22	0,26		4,1	8,50-9,50
9.50 - 10.20	0.70	" Mørk mlk.skarnførende stripet <u>Sl.Cp.Gn.Py</u> . Foldet.	5-10	2,40	0,28	6,08		6,0	
10.20 - 10.80	0.60	grå gn. Lys mlk.enstaka gr.1-2mm slake folder.	0-5						
10.80 - 11.80	1.00	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk,imp. <u>Py</u> .	0-5 10-15						
11.80 - 12.40	0.60	Pegm.							
12.40 - 12.80	0.40	musk.biot.gn. Rel.mørk mlk-grov,imp. <u>Py</u> .	10-25 25-35						
12.80 - 23.50	10.70	biot.hbl.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.biot. gn.enkelte rene hbl.gn. band gjennomgående slake folder,sprette gr.1-2mm svak imp. <u>Py</u> .	0-15						
23.50 - 33.00	9.50	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/biot. musk,musk.biot.gn.band. slake folder,imp. <u>Py</u> .företrädessvis i musk.rike partier.Spor <u>Sl</u> .ved 22.60, 23.40, 24.50.	0-15						
		2							

Lokalitet:

Borehull: 1244

Dato :

Koordinate :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
33.00 - 99.90	66.90	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm enstaka cm tykke biot.gn. band. Fr. 70.00-80.00 m	0-5 25-35 15						
99.90 - 110.70	11.80	biot.gn. Mørk mlk, litt växl m/hbl. gn.band, delvis foldet (runde folder) imp. <u>Py.</u> spor <u>Po.</u>	25-45						
110.70 - 117.80	7.10	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende til- dels rik 1-3 mm. Slake folder.	0-15						
117.80 - 120.00	2.20	biot.gn. Mørk mlk, växl m/grå gn. musk.biot., gn.band, imp. <u>Py.</u>	25						
120.00 - 121.00	1.00	grå gn. Lys mlk. sprette gr. 1-3mm	20	0,08	0,09	0,25		2,9	
121.00 - 122.50	1.50	grå gn. Lys mlk. musk. rik, slake folder, stripet <u>Po.Py.Sl.</u> <u>Cp.Gn.</u>	0-35	0,19	0,36	0,56		13,0	
122.50 - 124.20	1.70	" Lys mlk. sprette gr.	0-5	0,03	0,08	0,07		1,8	
124.20 - 125.50	1.30	biot.gn. Mørk mlk, litt hbl, skarn imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u> Foldet.	10-25	2,84	0,55	0,92		10,1	
125.50 - 126.40	0.90	grå gn.b.d. Rel.lys mlk, enkelte smale biot, gn, band, slak fold, imp. <u>Py.</u> Spor <u>Sl.</u>	0-20	0,31	0,17	0,33		3,8	
126.40 - 127.30	0.90	biot.gn. Mørk mlk växl m/grå gn. band, smale striper <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.Po.</u>	18	1,15	0,30	0,51		6,4	
		3							

Lokalitet:

Borehull: 1244

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
127.30 - 135.30	8.00	biot.hbl.gn. Mørk mlk.sprette gr.1-3 mm,imp. <u>Py</u> .	15	0.40	0.19	0.08		6.0	127.30 - 127.30
135.30 - 135.60	0.30	Amf. Mørk mlk,gr. 1-3 mm.							
10.1.86									
Stellan Burman									

Lokalitet: Y:43.050

Borehull: 1243

Dato : Nov. - 85

Koordinator : X: 925.388,5 Y: 43.054,5

Retning : S. 35° W.

Helling/stigning: - 14° 33'

Høyde : - 47,2

Lengde : 125.00 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
0.00 - 2.30	2.30	grå gn. b.d.	Lys mlk.spor hbl.	0	0.02	0.02	0.05		3.6	130-230
2.30 - 3.60	1.30	" "	Lys mlk.spor hbl.enstaka cm tykke Sl.Cp.Gn.Py.band	5	0.51	0.30	1.32		4.0	
3.60 - 8.50	4.90	Musk.biot.gn.	Rel.mørk mlk-grovmk.växl m/biot.musk.m/spor hbl. Brecciert rik impr.Sl.Cp. Gn.Py.Po. som sprette klumper.Foldet.	0-5	2.37	0.74	6.00		7.3	
8.50 - 9.20	0.70	Pegm.	Spor Gn.Sl.		0.74	0.19	0.52		1.5	
9.20 - 13.40	4.20	biot.musk.gn.	Mørk mlk.spor hbl.växl m/grå gn.band.Foldet del- vis brecciert,rik impr. Sl.Cp.Gn.Py.	0-10	1.96	1.01	7.35		8.26	920-1320
					0.88	1.00	1.88		5.6	1220-1340
13.40 - 14.70	1.30	biot.hbl.gn.	Mørk mlk.sprette gr.1-3mm svak impr.Py.slake folder	0-5	0.04	0.08	0.05		5.6	
14.70 - 15.70	1.00	hbl.gn.	Mørk mlk.slak fold,sprett gr.1-3 mm.	0-5						
15.70 - 21.80	6.10	biot.musk.gn.	Rel.lys mlk litt växl m/ grå gn.band.Enstaka gr. 1-3 mm.Svak impr.Py. före- trädesvis i de biot.rikere partier.	5-10						
21.80 - 32.80	11.00	grå gn.	Lys mlk.enkelte musk.biot. gn.band ved 21.80.Disk. (avsliten fold) lange slake folder.	0-5 5-7						
32.80 - 34.60	1.80	Pegm.						9/67g		
34.60 - 63.00	28.40	grå gn.	Lys mlk.enstaka opp til cm tykke biot.hbl.gn.band sprette gr.1-3 mm.	7-10						
					0.02	0.01	0.03	1.4	1.3	6200-6300

Borehull: 1243

Koordinatorer :

Retning

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser 9/6.79					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
63.00 - 65.40	2.40	musk.biot.gn. Rel.lys mlk.små foldet impr. <u>Py.Sl.Cp.Gn.Po.</u>	0-15	0,38 0,95	0,16 0,28	0,60 2,04	7,9 22,4	3,6 6,0	63,00-64,20 64,20-65,40
65.40 - 68.30	2.90	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm små slake folder.	0-5	0,18	0,04	0,28	3,9	1,9	65,40-66,40
68.30 - 68.60	0.30	" " Lys mlk,sprette gr.1-3 mm små slake folder m/ <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	25	3,72	0,19	3,28	160,0	2,8	
68.60 - 73.00	4.40	" " Lys mlk.sprette gr.1-3mm	0-5	0,12	0,02	0,04	5,3	1,7	72,00-73,00
73.00 - 76.60	3.60	biot.musk.gn. Mørk mlk.foldet impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u> Delvis brecciert.	0-15	1,96 0,17 0,17	0,76 0,12 0,10	3,68 0,44 0,38	39,5 10,9 7,0	8,4 6,8 6,0	73,00-74,20 74,20-75,40 75,40-76,60
76.60 - 81.90	5.30	grå gn. Lys mlk,litt variert musk enstaka små gr.1-2 mm.	10-15	0,04 0,70	0,04 0,21	0,11 1,72	2,1 32,8	2,5 4,4	76,60-77,60 80,90-81,90
81.90 - 87.70	5.80	biot.musk.gn. Mørk mlk-grovk,mot slutten biot.hbl.gn.Brecciert, ondulerad, impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	0-10	0,36 0,54	0,19 0,74	1,46 3,77	7,7 11,8	7,6 14,6	81,90-84,00 84,00-87,70
87.70 - 91.80	4.10	grå gn.b.d. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	15-20	0,78	0,13	1,49	13,6	3,6	87,70-88,70
91.80 - 92.00	0.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk.striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	35	0,09 1,06	0,02 0,54	0,10 5,00	1,8 16,3	1,6 6,3	90,80-91,80
92.00 - 94.20	2.20	hbl.gn. Mørk mlk,växl m/grå gn. band,gr.1-3 mm företrädesvis i hbl.gn.	35						
94.20 - 96.40	2.20	" " Mørk mlk,gr.rik 1-3 mm.	45	0,01	0,02	0,04	1,2	4,8	95,40-96,40
96.40 - 97.60	1.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk,växl m/biot.musk gn.spor <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	40-45	0,08	0,12	0,23	4,9	5,7	
97.60 - 100.05	2.45	skarn Grønn grovk.växl m/grå gn. bd.svak <u>Gn.Sl.Py.</u>		0,47	0,16	0,47	20,2	3,5	

Lokalitet:

Borehull: 1243

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser 9/679 2-8					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% Fe		
100.05 - 102.00	1.95	hbl.gn. Mørk mlk.fr.start ens- taka grå gn.b.d.band. Sl.Gn. ved 100.50.	40-45	0,39	0,10	0,69	8,3	4,9	100,05-101,00
102.00 - 104.00	2.00	grå gn. Lys mlk, enstaka hbl.gn. band.	40						
104.00 - 104.60	0.60	hbl.biot.gn. Mørk mlk, sprette gr.1-3 mm. imp. Py.	45	0,01	0,02	0,05	1,4	5,3	
104.60 - 105.70	1.10	Pegm. Växl m/biot.musk.gn, imp Py. spor SL?	45-50	0,01	0,05	0,03	2,0	3,0	
105.70 - 106.35	0.65	Kvarts		0,01	0,03	0,01	1,0	0,7	
106.35 - 107.60	1.25	biot.gn. Mørk mlk, imp. Py. Cp.	45-50	0,48	0,15	1,09	17,6	5,5	
107.60 - 108.30	0.70	Pegm. Sl. Cp. Gn.		0,33	0,10	1,53	12,9	3,1	
108.30 - 109.80	1.50	biot.hbl.gn. Mørk mlk. impr. Py.	45	0,15	0,13	0,37	7,4	5,9	
109.80 - 110.20	0.40	biot.musk.m/hbl. Rel.mørk mlk. impr. Py. SL?	30	0,05	0,05	0,06	2,8	1,9	
110.20 - 116.80	6.60	hbl.gn. Mørk mlk.gr.1-3 mm, del- vis Amfibolitisk.	35-40	0,02	0,02	0,03	3,2	4,3	115,80-116,80
116.80 - 119.10	2.30	" " Mørk mlk, växl m/dm tykke biot.gn.kv.skarn band, spor Sl.Cp.Gn.Py.	40	0,05	0,14	0,43	5,7	4,9	116,80-118,00
119.10 - 124.00	4.90	" " Mørk mlk, växl m/biot.gn. band.	35	0,01	0,06	0,05	3,9	6,5	118,00-119,10
124.00 - 125.00	1.00	Amf. Mørk mlk.fink.gr-rik 1- 4 mm, stictolitisk.							119,10-120,00

13.11.85

Stellan Burman

Lokalitet: 43.050

Borehull: 1242

Dato 1/11-85
 Koordinater : X: 925 388,3 Y: 43.054,6
 Retning : S. 35° W.
 Helling/stigning: -23°
 Høyde : -47,1
 Lengde : 89,50 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	g/t Ag % S	g/t Au % Fe	
0.00 - 2.50	2.50	musk.biot.gn. Rel.lys mlk.växl m/grå gn.skarn rik imp. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	0-5	3,66	1,00	7,92			0,00-1,25
				1,22	0,55	5,84			1,25-2,50
2.50 - 3.50	1.00	grå gn.b.d. Lys mlk.spor hbl.spor <u>Py.</u> <u>Sl.</u>	10	0,77	0,26	1,97			
3.50 - 5.90	2.40	biot.hbl.gn. Mørk mlk-grovmk.foldet brecciert, delvis pegmatitisk, stripet, slirig <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>		2,30	0,48	6,04			3,50-4,70
				1,37	0,85	6,08			4,70-5,90
5.90 - 7.40	1.50	grå gn.b.d. Rel.lys mlk, spor hbl.ens- taka gr.1-3 mm, spor <u>Py.</u>	10	0,02	0,01	0,06			
7.40 - 11.00	3.60	biot.gn.musk. Mørk mlk.enstaka cm tykke pegm.band, svak imp. <u>Py.Cp.</u> <u>Gn.Sl.</u>	10-15	0,06	0,12	0,29			7,40-9,80
				0,11	0,16	1,49			9,80-11,00
11.00 - 40.60	29.60	grå gn. Lys mlk, sprette smale biot.hbl.band, sprette gr. 1-3 mm. Fr. 11.50-12.10 m <u>Sl.</u>	5 10-15	0,19	0,11	1,50			11,00-12,10
40.60 - 43.00	2.40	musk.gn. Lys mlk.foldet, imp. <u>Py.Cp.</u>	15	0,21	0,26	1,08	7,6	0,35	
43.00 - 46.70	3.70	grå gn. Lys mlk, enstaka gr.1-3mm slake folder.	0-10						
46.70 - 50.00	3.30	biot.musk.gn. Rel.lys mlk-grovmk.växl m/grå gn.Stripet <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py</u> svakt foldet.	15-20	0,37	0,36	3,16	6,6	0,1	46,70-48,00
				0,99	0,19	2,07	12,4	0,2	48,00-49,00
				0,63	0,28	3,19	8,8	0,1	49,00-50,00
50.00 - 56.60	6.60	musk.biot.gn. Rel.mørk mlk-grovmk.växl m/overganger til biot.gn. imp. <u>Py.Cp.</u> slake folder.	10-20	0,27	0,29	0,80	8,6	0,2	50,00-51,50
				0,22	0,24	0,04	0,4	<0,1	51,50-54,00
				0,05	0,06	0,08	0,9	<0,1	54,50-57,60
56.60 - 58.90	2.30	hbl.biot.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3mm	15-20						
		2							

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1242

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	9/12 Ag % S	9/12 Au % Fe	
58.90 - 59.80	0.90	Pegm.							
59.80 - 70.00	10.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk.växl (bandad)m/ hbl.gn./grå gn.muskrik. m/imp.Py.gr.företträdesvis i hbl.gn.banden.	20 30-40 45						
70.00 - 73.40	3.40	biot.musk.gn. Rel.mørk,växl m/biot.gn. svak imp.Py.Sl.Cp.Gn. foldet.	0-45	0,10	0,13	0,75	6,7	< 0,1	70,00-71,00
				0,25	0,15	2,69	13,1	< 0,1	71,00-72,00
				0,14	0,11	0,46	5,1	< 0,1	72,00-73,00
73.40 - 74.80	1.40	biot.gn. Mørk mlk,spor hbl.imp.Py.	45	0.09	0.06	0.47	4,1	< 0,1	
74.80 - 89.50	14.70	biot.gn. Mørk mlk.delvis hbl.ens- taka gr.1-3 mm,samt enk- elte grå gn.musk.rike dm tykke band,svak imp.Py.	35-40						

1.11.85

Stellan Burman

Lokalitet: 43.050

Borehull: 1241

Dato : Okt.-85
 Koordnater : X: 925.388,3 Y: 43.054,6
 Retning : S
 Helling/stigning: - 20°
 Høyde : - 47,1
 Lengde : 110,00 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	grå gn. Rel.lys mlk.bandad m/cm tykk hbl.biot.band,slak fold,imp.Sl.Cp.Gn.Py.	0-10	0,86	0,20	2,36		4,0	
1.00 - 2.30	1.30	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grov-mlk.slake folder,delvis brecciert.En ca 5 cm tykk malmstripe gjennombores flere ggr.	0-10	2,07	0,76	5,92		8,0	
2.30 - 4.40	2.10	biot.musk.gn. Mørk mlk-grov-mlk.slake folder imp.Sl.Cp.Gn.Py.	0-5	0,57	0,40	2,51		6,2	2,30-3,20
				0,82	0,24	3,03		6,0	3,30-4,40
4.40 - 11.30	6.90	grå gn. Rel.lys mlk,svakt skarnførende,spor hbl.Pegmatitisk,brecciert,rike striper,og imp.Sl.Cp.Gn.Py. Foldet.	5-20	2,63	0,89	7,96			4,40-8,60
				1,28	0,77	2,52			8,60-11,30
11.30 - 13.30	2.00	biot.gn. Mørk mlk.imp.Py.Spor Sl.	0-5	0,05	0,12	0,16		6,2	
13.30 - 14.40	1.10	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm impr. Py.	5	0,03	0,04	0,18		2,7	
14.40 - 17.00	2.60	" " Rel.lys mlk.foldet.Cm tykke biot.gn.band m/Cp.Py.Sl.	0-10	0,07	0,28	0,45		6,7	
17.00 - 42.70	25.70	" " Lys mlk,sprette gr.1-3mm enkelte tynne striper hbl.biot.gn.	0-5	0,03	0,05	0,18		2,6	17,30-18,00
				0,06	0,02	0,06		1,6	41,40-42,70
42.70 - 44.10	1.40	" " Lys mlk.enkelte biot.skikt impr. Sl.Cp.Gn.Py.	10-25	0,60	0,29	3,43		5,7	
44.10 - 51.40	7.30	" " Lys mlk.enkelte små gr. 1-2 mm.Fr.44.10-44.70 kv.m.Py.Cp.Gn.	5-10	0,15	0,18	0,09		2,0	44,0-45,10
							9/16,79	9/16,74	
		2		0,01	0,02	0,03	2,1	<0,1	50,40-51,40

Lokalitet:

Borehull: 1241

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	g/t Ag % S	g/t Au % Fe	
51.40 - 59.00	7.60	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band,musk.rik,skærknøler imp. og rike striper Sl. Cp.Gn.Py.Po. Po. som komp.klumper foldet.	0-35	0,33	0,47	3,11	10,1	0,15	51,40-59,00
				0,19	0,45	1,51	9,25	<0,1	59,00-62,20
59.00 - 62.20	3.20	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk.foldet imp. Py.spor Cp.	25	0,07	0,05	0,17	5,4	<0,1	59,00-60,00
62.20 - 69.00	6.80	grå gn.b.d. Lys mlk.enkelte gr.1-3mm svak imp.Py.slake folder.	10-35						
69.00 - 70.30	1.30	biot.hbl.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.gn. samt smale grå gn.band, svak imp.Py. gr.1-3 mm.	35-40						
70.30 - 85.50	15.20	hbl.biot.gn. Mørk mlk.växl m/biot.hbl. gn.samt smale kv.pegm. band.gr-førende 1-3 mm	35-40	0,02	0,05	0,03	4,4	<0,1	85,50-89,50
85.50 - 89.50	4.00	biot.gn. Mørk grovk.växl m/hbl. biot.gn.imp.Py.Sl.Cp.Gn.	35	0,16	0,09	0,41	8,0	<0,1	
89.50 - 94.60	5.10	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band samt hbl.gn.gr-för- ende 1-3 mm.	40	0,01	0,02	0,04	1,7	<0,1	89,50-94,60
94.60 - 110.00	15.40	hbl.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.biot. gn.svakt Py gr.1-3 mm.	40-45						

30.10.85

Stellan Burman

Lokalitet: 43.050

Dato

OKT-85

Aukemålt.

Koordinater

X: 925.388,4 Y: 43.054,6

Retning

S S. 35° W.

Helling/stigning:

-17°

Høyde

- 47,6

Lengde

138,80 m.

Borehull: 1240

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	9-12g % S	9-12g % Fe	
0.00 - 0.60	0.60	grå gn. lys mlk. flak fold, impr. Sl.Cp.Gn.Py.	0-5	0,58	0,23	2,21	11,2	0,1	
0.60 - 1.90	1.30	" " (Brecciert) Rel.lys mik,biot,slirig klysor,sprekkfyllinger av Cp.Sl.Gn.Py.	0-10	2,09	0,85	4,48	29,4	1,3	
1.90 - 3.00	1.10	grå gn. lys mlk.delvis musk.rik, impr. Sl.Gn.Cp.Py.	5-10	1,12	0,38	3,88	15,5	0,3	
3.00 - 3.50	0.50	musk.gn. Lys mlk.slak fold,svak imp. Py.Sl.Cp.Gn.	u-5	0,29	0,18	0,86	5,7	0,1	
3.50 - 6.70	3.20	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/musk. biot.skikt,rik imp.Sl.Cp. Gn.Py. delvis halve kjer- nen malm og gråberg,slake folder.	0-5	1,11	0,31	4,32	19,3	0,4	3,50-4,50
				0,88	0,47	4,20	14,0	0,2	4,50-5,50
				1,23	0,37	1,31	16,1	0,2	5,50-6,70
6.70 - 12.00	5.30	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk.skarn.føren- de,brecciert,rik malm slake folder.	0-10	2,07	0,41	7,43	29,4	0,4	
12.00 - 13.00	1.00	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk.imp. Py.spor Sl. spor gr.	0-2	0,06	0,14	0,12	2,1	<0,1	
13.00 - 17.40	4.40	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. musk.gn.band,sprette gr. 1-3 mm,svak impr. Py.	0-5	0,04	0,04	0,09	1,2	<0,1	13,00-14,00
				0,03	0,07	0,13	1,0	<0,1	14,40-17,40
17.40 - 19.00	1.60	biot.gn. Rel.mørk mlk.foldet,imp. py. svak imp.Sl.Cp.Gn.	u-10	0,06	0,36	1,87	4,7	<0,1	17,40-18,00
				0,05	0,36	0,73	4,1	0,1	18,00-19,00
19.00 - 54.40	35.40	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm spor Py. slake folder Fra begynnelsen rel.musk. rik,enstaka cm tykke hbl. biot.gn.band.	0-5 Fra 40 m 5-10	0,04	0,07	0,13	1,3	<0,1	19,00-20,00

.....2

Lokalitet:

Borehull: 1240

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
54.40 - 54.90	0.50	biot.gn. Mørk mlk.foldet imp. <u>Py.</u> <u>Po.</u>	0-20	0,21	0,77	1,35	12,7	<0,1	
54.90 - 59.45	4.55	grå gn. Lys mlk.enkelte cm tykke musk.biot.gn.band.svak impr. <u>Py.</u> slake folder.	0-10	0,06	0,08	0,36	1,5	<0,1	58,45-59,45
59.45 - 60.35	0.90	biot.gn. mørk mlk.foldet,breccierte slirig m/ <u>Sl.Cp.Gn.Py,Po.</u>	5-25	0,66	0,48	1,60	14,6	0,4	
60.35 - 61.30	0.95	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm.	35	0,04	0,05	0,20	1,4	<0,1	
61.30 - 70.60	9.30	biot.gn. Mørk mlk.foldet,delvis breccierte,Växl m/dm tykke grå gn.band,samt smale skarnband.Växl m/rike og fattigere malm band.	0-45	0,38	0,15	0,59	8,7	0,1	61,80-63,00
				0,27	0,59	2,26	9,0	0,1	63,00-68,00
				0,39	0,15	2,20	7,2	0,2	68,00-70,60
70.60 - 75.40	4.80	biot.gn. Rel.mørk växl m/grå gn. band,sprette gr.1-3 mm. imp. <u>Py.</u> företrädesvis i biot.gn.Spor hbl.	30-35	0,03	0,02	0,01	0,0	<0,1	70,60-71,60
75.40 - 88.40	13.00	biot.hbl.gn. Mørk mlk.delvis gr-rik 1-3 mm.svak imp. <u>Py.</u> delvis småfoldet.Mot slutten Amf.band.	35-40	0,02	0,04	0,01	1,6	<0,1	87,40-88,40
88.40 - 90.80	2.40	biot.gn. Mørk mlk.växl m/skarn/grå gn.band,stripet impr. <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u> spor hbl.	35-45	1,81	0,19	6,16	35,3	0,7	88,40-89,60
				0,25	0,04	0,77	5,4	0,1	89,60-90,80
90.80 - 91.05	0.25	kvarts.							
91.05 - 92.00	0.95	biot.hbl.gn. Mørk mlk,sprette gr.1-3mm	45	0,03	0,03	0,01	1,4	0,1	
92.00 - 94.00	2.00	biot.gn. Mørk mlk.foldet D-typ. spor hbl.impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	0-35	0,07	0,20	0,37	6,1	0,1	92,00-93,00
				0,56	0,50	1,22	22,0	0,3	93,00-94,00

Lokalitet:

Borehull: 1240

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	97/4 Hg % S	97/4 Hg % Fe	
94.00 - 99.80	5.80	hbl.biot.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.gn. band,gr-førende 1-3 mm. Fr.97.50-97.55 m Sl.	40-45						
99.80 - 102.30	1.50	Pegm.							
102.30 - 112.60	10.30	hbl.gn. Mørk mlk.litt växl m/hbl. biot.gn.gr-førende,delvis Amfibolitisk,ved 107.50 små runde folder,impr.Py.	40-45	0.02	0.02	0.01	1.8	< 0.1	11160-11260
112.60 - 113.00	0.40	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grov.spor hbl.impr. Sl.Cp.Gn.Py.	35	1.60	0.09	4.32	33,2	0.2	
113.00 - 123.80	10.80	biot.hbl.gn. Mørk mlk,sprette gr.1-3 mm,impr.Py.enkeltet hbl. gn.band.	35-45	0.07	0.06	0.17	3,5	< 0.1	11300-11400
123.80 - 128.30	4.50	Amf. Mørk mlk-fink.sprette små gr.1-2 mm.	45						
128.30 - 138.80	10.50	grå gn. Lys mlk.enkelte cm tykke hbl.biot.gn.og Amf.band enstaka gr. 1-3 mm.	30						

29.10.85

Stellan Burman

Lokalitet: 41.890

Borehull: 1239

Dato : Okt.-85
 Koordinater : X: 925.390,0 Y: 41.890,0
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : + 5,8
 Lengde : 32,30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	biot.gn. Mørk mlk-grovk. Pegmatitisk, slirig m/ <u>Sl.Cp.Gn.</u> <u>Py.</u>	60-80	0,02	0,14	2,09		8,0	
0.40 - 1.70 1.70 - 5.20	1.30 3.50	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm hbl.biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/biot. musk.gn.hbl-førende, gr. rik, företrädesvis i de hbl.rike partiene, foldet m/runde folder, delvis svak impr. <u>Py.spor Cp.</u>	60 0-50						
5.20 - 31.80	26.60	grå gn. Lys mlk.delvis musk.rik. spor hbl.Sprette gr.1-3 mm, slak fold fr.8.50-9.20 m. spor <u>Py.</u>	50 60-70						
31.80 - 32.30	0.50	biot.gn. Mørk mlk.rik impr. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u> Gjennomborat.	70	0,96	0,32	4,92		7,1	
24.10.85 Stellan Burman									

Lokalitet: 41.890

Dato : Okt.-85
Koordinatorer : X: 925.393,4 Y: 41.890,5

Borehull: 1238

Retning : N
Helling/stigning: -45°

Høyde : + 5.8

Lengde : 47.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.spor hbl. sprette gr.1-3 mm.	45	0,02	0,02	0,05		2,1	
0.80 - 3.50	2.70	biot.gn. Mørk mlk-grovk.delvis pegmatitisk svak imp.Py. spor Cp.Sl?Po.Sprette gr.1-3 mm.	45	0,03	0,04	0,10		3,2	0,80-2,10
				0,02	0,06	0,10		3,3	2,10-3,50
3.50 - 5.50	2.00	grå gn. Lys mlk.enkelte cm tykke biot.skikt,sprette gr.1-3 mm.	45						
5.50 - 6.70	1.20	biot.gn. Rel.mørk grovk.Pegmatitisk,brecciert,klyser og skikt Po.Gp.spor PySl?	0-45	0,02	0,30	0,10		6,1	
6.70 - 7.70	1.00	spor gr.1-3 mm. Mørk mlk-grov,spor hbl. gr.rik 2-4 mm spor Py.	45-50	0,02	0,01	0,02		2,6	
7.70 - 9.60	1.90	grå gn. Rel.lys mlk,sprette gr.1-3 mm,delvis b.d.	45						
9.60 - 10.05	0.45	biot.hbl.gn. Mørk mlk.gr.rik3-5 mm	45						
10.05 - 40.00	29.95	grå gn. Lys mlk.enkelte små runde folder,sprette gr.1-2 mm enstaka opp til 5 cm, tykke biot.hbl.gn.band m/gr.	45 60						
40.00 - 44.60	4.60	biot.hbl. Mørk mlk.enkelte smale grå gn.band,sprette gr.1-3 mm (kjernene nersmetad med olja)	60-70						
44.60 - 47.20	2.60	hbl.gn. Mørk mlk.litt växl m/hbl. biot.gn.mot slutten overgang til Amf.gr.1-2 mm.	60-70						

Lokalitet: 41.890

Dato : Okt.-85

Koordinater : X:925.393,4 Y:41.890,5

Retning : N

Helling/stigning: -52°

Høyde : + 5,8

Lengde : 44,40 m.

Borehull: 1237

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	hbl.biot.gn. Mørk mlk.sprette gr.1-3 mm.	40						
0.30 - 1.00	0.70	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm	35	0.01	0.01	0.13		1.4	
1.00 - 2.40	1.40	biot.gn. Mørk mlk-grovk.m/pegm.-band, slingig Sl.Cp.Gn.Py.	25-30	0.01	0.14	0.19		4.0	
2.40 - 5.40	3.00	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3 mm	35						
5.40 - 9.80	4.40	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk,växl m/grå gn.band,enkelte Py.striper,gr.1-4 mm delvis foldet,fr.5.40-6.25 svak imp. Sl.Cp.Gn.Py.Po.	35-40	0.01	0.08	0.38		5.3	5.40-6.25
				0.01	0.01	0.04		2.9	6.25-7.25
9.80 - 35.25	25.45	grå gn. lys mlk.enstaka hbl.biot band,opp til 5 cm tykke sprette gr.1-3 mm,delvis småfoldet.	35-40 40-45 50-60 45	0.00	0.01	0.04		1.8	35.25-38.25
35.25 - 38.50	3.25	grå gn. Rel.lys mlk.enkelte biot gn.band m/hbl.delvis musk.rikere grå gn.ens-taka smale band m/Sl.Cp.Gn.Py.	45-50	0.12	0.06	0.33		2.6	35.25-36.25
				0.02	0.03	0.20		2.2	36.25-37.25
				0.13	0.35	1.20		4.4	37.25-38.50
38.50 - 44.40	5.90	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm.Mot slutten Amphibolitisk.	50-60	0.12	0.06	0.34		3.7	38.50-44.40

22.10.85

Stellan Burman

Lokalitet: 41.890

Borehull: 1236

Dato : Okt.-85
 Koordinator : X: 925,390,0 Y: 41.890,5
 Retning : N
 Helling/stigning: -64°
 Høyde : +5,8
 Lengde : 50.00 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	biot.gn. Mørk mlk.imp.Py.Cp.Sl.Gn.	45	0.04	0.16	3.53		7.8	
1.00 - 2.05	1.05	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3 mm	40						
2.05 - 3.80	1.75	hbl.biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band,musk.rik,foldet,gr. 1-3 mm,svak imp.Py.	0-45						
3.80 - 7.20	3.40	biot.gn.musk. Rel.lys mlk.delvis hbl-førende,foldet m/små runde folder,gr.1-3 mm.	0-45						
7.20 - 31.80	24.60	grå gn. Lys mlk.enstaka sprette gr.1-3 mm,dm tykke hbl.gn. band,gr.rik,foldet m/runde folder,fr.21.20-22.30 overveieende pegm.	0-45 Fra 25.0 70-80	0.04	0.04	0.10		1.5	30.80-31.80
31.80 - 33.60	1.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.sprette striper Sl.Cp.Gn.Py.	70-80	1.38	0.18	1.67		3.8	
33.60 - 36.80	3.20	biot.gn. Mørk mlk.hbl-førende,stripet imp.Sl.Cp.Gn.Py. Foldet.	70-80	0.68 1.74 0.54	0.56 0.28 0.14	5.76 4.72 1.78		8.1 6.0 4.3	33.60-34.70 34.70-35.70 35.70-36.80
36.80 - 41.50	4.70	hbl.gn. Mørk mlk,gr-førende i starten stictolittisk.		0.03	0.02	0.08		3.7	36.80-37.80
41.50 - 49.50	8.00	Amf. Mørk mlk.sprette gr.1-3mm	60-70						
49.50 - 50.00	0.50	Pegm.							

21.10.85

Stellan Burman

Lokalitet: 41.890

Borehull: 1235

Dato : Okt.-85
 Koordinator : X: 925.390,0 Y: 41.890,5
 Retning : N
 Helling/stigning: -74°
 Høyde : + 5,8
 Lengde : 44,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	grå gn. Lys mlk.dm tykke kv.band sprette gr.1-3 mm.	35	0,05	0,03	0,31		1,9	
1.20 - 1.80	0.60	biot.gn. Rel.mørk mlk-grov-mlk. Pegmatitisk, cm smale grå gn.band.Brecciert, stripet Sl.Cp.Gn.Py.		0,02	0,17	1,41		6,8	
1.80 - 4.80	3.00	biot.gn. Rel.mørk, växl m/grå gn. band.Biot.gn er hbl-før- ende, sprette gr.1-4 mm spor Py. små runde folder	30-45	0,01	0,01	0,05		2,7	1,80 - 2,80
4.80 - 7.60	2.80	grå gn.b.d. Rel.lys mlk, spor hbl. sprette gr.	40 45						
7.60 - 7.90	0.30	kv.							
7.90 - 32.10	24.20	grå gn. Lys mlk.enstaka cm tykke biot.hbl.gn.band, slak fold ved 13.00-13.80 sprette gr.1-3 mm.	40 80	0,07	0,02	0,09		1,5	31,10 - 32,10
32.10 - 33.00	0,90	" " Lys mlk, enkelte smale skikt Sl.Cp.Gn.Py.	80	0,21	0,12	0,60		2,7	
33.00 - 36.80	3.80	" " b.d. Rel.lys mlk.växl m/biot. hbl.band, samt delvis skarn stripet imp.Py.Cp.Sl.Gn.	60-80	0,58	0,33	4,12		6,18	
36.80 - 39.10	2.30	hbl.gn. Mørk mlk.växl m/biot.hbl. gn Py.imp.sprette gr.1- 3 mm.	70-80	0,02	0,02	0,12		3,0	36,80 - 37,80
39.10 - 44.30	5.20	hbl.gn. Amfibolitisk Mørk mlk.variert Amf.hbl. gn.även hbl.biot.gn., gr.företrädesvis i hbl. gn.	70-80 60						

21.10.85 Stellan Burman

Lokalitet:

Dato

sept.-85

Koordinater : X: 925.352,3 Y: 41.858,4

Retning : N

Helling/stigning: + 70°

Høyde : + 12,2

Lengde : 32,20 m.

Borehull: 1234

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.20	4.20	biot.gn. Mørk mlk.litt Musk, spor hbl.svak imp.Py.Delvis småfoldet.	70-80						
4.20 - 5.00	0.80	hbl.biot.gn. Mørk mlk.imp.Py. ^{gn} S1?	80	1,18	0,24	0,05		6,6	
5.00 - 8.70	3.70	biot.gn. Mørk mlk.svak imp.Py. sprette gr.1-3 mm.	80	0,03	0,04	0,03		2,3	7,70-8,70
8.70 - 11.20	2.50	biot.musk.gn. hbl.førende Rel.mørk mlk.stripet S1. Cp.Gn.Py. Ondulerad,slak fold.	70-80	0,53	0,45	1,67		7,9	8,70-10,00
				1,42	0,19	5,40		7,1	10,00-11,20
11.20 - 14.90	3.70	biot.gn. Mørk mlk,væxl m/grå gn. band m/hbl,sprette gr. 1-3 mm,svak imp.Py.	70-80	0,04	0,14	0,09		4,3	11,20-12,20
14.90 - 21.80	6.90	hbl.gn. Mørk mlk.væxl m/biot. hbl.gn.band.gr.1-3 mm.	70-80	0,02	0,04	0,06		6,1	20,80-21,80
21.80 - 24.00	2.20	Biot.gn. (Pegmatitisk) Rel.mørk grovk.foldet, klyser,skikt biot.Py. som rike klyser S1.7 Brecciert.		0,02	0,08	0,24		6,3	21,80-23,00
				0,02	0,05	0,06		4,2	23,00-24,00
24.00 - 32.20	8.20	grå gn. lys mlk,sprette gr.1-3mm væxl biotinnhold.Fra 28.80-28.90 hbl.gn.	70						

30.09.85

Stellan Burman

Lokalitet: 41.860

Dato: Sept.-85
 Koordinater: X: 925,352,3 Y: 41,858,4
 Retning: N
 Helling/stigning: + 60°
 Høyde: + 12,4
 Lengde: 36,50 m.

Borehull: 1233

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.90	3.90	biot.gn.	Mørk mlk.foldet, svak imp. Py.	70					
3.90 - 5.20	1.30	hbl.gn.	Mørk mlk.væxl m/smale grå gn.band, gr. 1-3 mm.	70					
5.20 - 9.50	4.30	biot.gn.	Mørk mlk, spor hbl.Gn. ved 5.95-6.20 m.	80					
9.50 - 10.70	1.20	biot.gn.	Mørk mlk-grovk.delvis pegmatitisk, brecciert. Sl.Cp.Gn.Py.		0.11	0.08	0.05	2.0	8.50-9.50
10.70 - 11.40	0.70	biot.hbl.gn.	Mørk mlk, rik Sl.Cp.Gn.Py.	80	0.52	0.57	1.51	8.0	
11.40 - 22.30	10.90	biot.hbl.gn.	Mørk mlk, enkelte biot.sk. band, impr. Py.	70-80	3.01	0.81	12.60	10.2	
22.30 - 36.50	14.20	grå gn.	Lys mlk.sprette gr. 1-3mm Sl. fra 36.30-36.50 gjennomboret.	80-90	0.05	0.01	0.22	5.0	11.40-12.40
30.09.85									
Stellan Burman									

Lokalitet: Y:41.860

Dato : sept.-85

Koordinater : X:925.352,5 Y:41.858,0

Retning : N

Helling/stigning: + 50°

Høyde : + 10,8

Lengde : 44,30 m.

Borehull: 1232

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	biot.hbl. Mørk mlk-grovk.Pegm.band Sl.Cp.Gn.Py. Foldet.	45-70	0,65	0,38	6,56		11,9	
0.70 - 1.10	0.40	biot.gn. Mørk mlk.imp.Py.Spor Cp.	50	0,06	0,28	0,37		8,1	
1.10 - 2.90	1.80	Biot.gn. Rel.mørk grovk.Brecciert. Pegmatitisk Py.PO.	50-70	0,05	0,20	0,09		6,8	
2.90 - 3.70	0.80	biot.gn. Mørk mlk.svak imp.Py. spor gr.	45	0,03	0,06	0,06		6,3	
3.70 - 4.40	0.70	hbl.gn. Mørk mlk.gr-rik 1-3 mm. Rund fold.	45 0 45						
4.40 - 7.40	3.00	biot.hbl.gn. Mørk mlk,enkelte Pegm. band,svak imp.Py.	50						
7.40 - 8.90	1.50	biot.gn. Mørk mlk,spor hbl,svak imp.Py.	45-50						
8.90 - 11.00	2.10	Biot.gn. Rel.mørk grovk.Brecciert Pegmatitisk Sl.Cp.Gn.Py.Po. som klyser og slirer.		1,04	0,32	0,23		6,6	
11.00 - 16.00	5.00	biot.gn. Mørk mlk.enstaka cm tykke hbl.gn.band.svak imp.Py.	50-60						
16.00 - 25.80	9.80	biot.gn. Mørk mlk-grov.växl m/pegm grå gn.band,foldet,spor Gn.Cp. ved 16.80-16.90.	60-70						
25.80 - 44.30	18.50	grå gn. Rel.lys mlk.litt växl m/ biot.gn.m/spor hbl.Sprette gr.1-3 mm.	60 70						
		30.09.85							
		Stellan Burman							

Lokalitet: 41.860

Borehull: 1231

Dato

sept.-85

Koordinater

X: 925.352.3 Y: 41.858,0

Retning

N

Helling/stigning:

+ 40°

Høyde

+ 10.8

Lengde

53.10 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grovk.bandad m/grå gn.delvis foldet m/runde folder,stripet <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u>	0-45	0.44	0.72	4.72		13.8	
1.20 - 3.05	1.85	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn.band,delvis hbl-førende imp.Py. spor <u>Po.</u> spor gr. 1-2 mm.	25-40	0.22	0.18	0.27		5.8	1.20-2.20
3.05 - 3.60	0.55	Pegm.	30						
3.60 - 4.40	0.80	Biot.gn. Se ovan.							
4.40 - 4.70	0.30	Pegm.							
4.70 - 5.00	0.30	Biot.gn. Se ovan. Foldet.							
5.00 - 7.30	2.30	Pegm. m/enstaka biot.gn.band sprette <u>Py.</u> klyser.	30-50						
7.30 - 12.20	4.90	hbl.biot.gn. Mørk mlk.växl m/biot.hbl gn.svak imp. <u>Py.</u> sprette gr.1-2 mm,små runde folder ved 9.60-9.70.	45-50						
				0.38	0.35	0.08		6.8	11.20-12.20
12.20 - 13.30	1.10	biot.gn. Mørk mlk-grovk.växl m/pegm.Foldet <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u>	0-45	0.22	0.33	0.87		6.2	
13.30 - 22.30	9.00	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band,sprette gr.1-3mm	45-55	0.29	0.05	0.04		5.0	13.30-14.30
22.30 - 28.05	4.75	biot.gn. Mørk mlk-grovk.Pegmatitisk,delvis biot.sk. sprette <u>Sl.</u> klyser.Foldet <u>Bracciart.</u>	30-70	0.13	0.14	1.33		6.3	
		2							

Lokalitet:

Borehull: 1231

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
28.05 - 30.00	1.05	hbl.gn.	Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm.	45						
30.00 - 53.10	23.10	grå gn.	Rel.lys mlk.sprette cm smale hbl.gn.band,sprette gr.1-3 mm.	ca.45						
			24.09.85							
			Stellan Burman							

Lokalitet: 41.550

Borehull: 1230

Dato: Juli-85

Koordinator: X: 925.431,2 Y: 41.546,0

Retning: S

Helling/stigning: -39°

Hoyde: +10,9

Lengde: 86,30 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	30						
0.90 - 3.80	2.90	biot.gn. Mørk mlk-grov.Pegmatitisk spor hbl.enkelte Sl.striper, imp.Py.Po.Cp.Gn.	30-45	0.02	0.12	1.57		5.8	0.90-2.30
				0.02	0.19	0.51		5.1	2.30-3.80
3.80 - 6.00	2.20	grå gn. Rel.lys mlk.våxl m/biot. gn.skikt, små åpne folder striper PyPo.Sl.Cp.Gn.	0-90	2.03	0.72	1.75		5.1	3.80-5.00
				0.03	0.11	0.12		3.3	5.00-6.00
6.00 - 6.60	0.60	biot.gn. Mørk mlk.pegmatitisk, imp. Py.Po.Sl.	45	0.05	0.25	1.16		8.4	6.00-7.00?
6.60 - 11.00	4.40	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.enstaka biot. hbl.gn.band,åpen fold.	45-60						
11.00 - 16.00	5.00	biot.gn. Mørk mlk.delvis brecciert pegmatitisk,spor hbl. enkelte striper Sl.Cp.Gn.	35-45	0.03	0.18	1.20		6.9	
16.00 - 17.40	1.40	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm.svak imp.Py.	45-50	0.21	0.10	0.06		2.4	
17.40 - 20.50	3.10	Se foregående m/imp.Py.Po. Sl.Cp.Gn.	45	0.02	0.18	0.31		7.5	
20.50 - 39.40	18.90	grå gn Lys mlk.sprette gr.1-3mm, enstaka cm smale hbl.gn. band.	40-45						
39.40 - 41.10	1.70	Pegm.							
41.10 - 54.30	13.20	grå gn. Se ovan.	25-35						
54.30 - 55.00	0.70	Pegm.							
55.00 - 56.30	1.30	biot.gn. Mørk mlk.enstaka gr.1-2mm slak fold. imp SLG	0-20	0.26	0.33	1.73		8.0	55.30-56.30
		2							

Lokantika

Borehole: 1230

```

Date
Koordinator
Retning
Helling/sligning
Hoyde
Lengde

```

7 eps

Dybde		L	Bergart	S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
56.30 - 63.70	7.40	biot.gn.	Rel.mork,mik.væxi m/grå gn.skarv band foldet m/ små åpne folder,deltvis underred,stripet imp. Sl.Cp.Gn.Py.	0-40	0.02	0.08	0.10		4.0	56.30-57.00
					1.02	0.32	3.95			57.00-63.00
					0.28	0.17	1.01			63.00-63.70
63.70 - 70.90	7.20	" "	Mork mik.svake hb1-førende band,enslaka gr.1-3 mm, spor py. Cu.ved 69.40 m.	10-35	0.15	0.16	0.82		4.0	63.70-64.70
					0.09	0.28	0.15		5.1	70.00-70.90
70.90 - 71.50	0.60	musk.biot.gn.	Rel.lys mik-grov.enkelt Sl.Cp.Gn.Py. band.	35	2.25	0.27	3.34		4.2	
71.50 - 74.60	3.10	hb1.biot.gn.	Mork mik.sprette gr.1-3mm	30-35	0.03	0.04	0.08		3.5	73.60-74.60
					1.73	0.34	5.12		5.1	74.60-75.60
					0.32	0.14	0.53		6.1	75.60-76.60
					0.36	0.38	1.87			76.60-77.80
74.60 - 77.80	3.20	biot.gn.	Mork mik.deltvis biot.sk. spor hb1.Sl.Cp.Gn.Py. foldet.	10-45						
77.80 - 82.60	4.80	hb1.biot.gn.	Mork mik.m/hb1.gn.band, gr.1-3 mm svak imp.Py.	60-70						
82.60 - 86.30	3.70	hb1.gn.	Mork mik.svak imp.Py.	50-60						

Lokalitet: 41.550

Borehull: 1229

Dato

Juni -85

Koordinater

X: 925.431,2 Y: 41.546,0

Retning

: S

Helling/stigning:

-32°

Høyde

: +10,9

Lengde

: 95,40 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	grå gn. Lys mlk.små åpne folder.	30						
0.90 - 4.00	3.10	biot.gn. Mørk mlk.delvis pegmatisk, spor hbl. <u>Sl.Cp.Gn. Py.</u>	35-40	0.02	0.28	1.49		8.1	
4.00 - 6.70	2.70	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.delvis musk.rik, små åpne folder, imp. <u>Po.Py.Sl.Cp.Gn.</u>	35	0.92	0.23	0.51		7.1	4.00 - 5.40
				0.04	0.19	0.19		4.9	5.40 - 6.70
6.70 - 8.40	1.70	biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.enstaka gr.1-4 mm, spor <u>Py. Sl.</u>	45-50	0.02	0.05	0.18		4.5	
8.40 - 10.20	1.80	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	45-50						
10.20 - 17.50	7.30	biot.gn. Mørk mlk.delvis pegmatisk, enkelte cm tykke biot.sk.band, sprette spor <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> ved 16.40-16.80 slak fold.	20-50	0.02	0.11	0.37		5.2	10.20 - 13.20
				0.03	0.13	0.26		6.2	13.20 - 16.20
				0.01	0.15	1.70		7.3	16.20 - 17.50
17.50 - 22.70	5.20	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/biot.gn.band, enstaka gr.1-3 mm. <u>Py.Po.</u> som enkelte tynne skikt.	40 50	0.06	0.08	0.06		3.2	17.50 - 18.50
22.70 - 27.10	4.40	grå gn. Lys mlk.fink.sprette gr 1-3 mm.	40 35						
27.10 - 29.80	2.70	pegm							
29.80 - 68.30	38.50	grå gn. Lys mlk-fink.sprette gr. 1-3 mm.	35-25						
68.30 - 70.40	2.10	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/cm tykke biot.gn.band, svak imp. <u>Py.</u> spor <u>Po.</u> Svakt foldet, sprette spor hbl.	30-45						

Lokalitet:

Borehull: 1229

Dato

Koordinator

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
70.40 - 71.00	0.60	biot.sk.	Mørk mk.svak imp.Py.	40					
71.00 - 74.80	3.80	grå gn.b.d.	Rel.lys mk.växl m/musk. biot.gn.band <u>Py.</u> impr.	40	0.06	0.08	0.06	3.2	73.80 - 74.80
74.80 - 76.70	1.90	biot.musk.gn.	Rel.mørk mk-grov mk. enkelte grå gn.band, imp. <u>Py.</u> spor <u>Sl.</u>	40	0.15	0.12	0.76	7.3	74.80 - 75.80
					0.15	0.09	0.21	5.9	75.80 - 76.70
76.70 - 79.90	3.10	grå gn.b.d.	Lys mk.litt växl m/biot musk.gn. <u>Py.</u> impr.ondulerad ved 79.50-60.	35-40	0.02	0.03	0.11	3.7	76.70 - 77.70
79.90 - 82.80	2.90	biot.gn.	Rel.mørk mk,litt växl m/ grå gn.band,spor hbl.	35-40					
82.80 - 85.90	3.10	hbl.biot.gn.	Mørk mk.svak imp. <u>Py.</u> sprett gr.1-3 mm.	40					
85.90 - 95.40	9.50	hbl.gn.	Mørk mk.gr-föreende 1-3 mm.	45-50					

04.07.85

Stellan Burman

Lokalitet: 41.550

Borehull: 1228

Dato : 1981-05

Koordinater : X: 925.331,4 Y: 41.545,2

Retning : S

Helling/stigning: -45°

Høyde : +10.7

Lengde : 59.40 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	grå gn. lys mlk.spor Py.	35-40	0.03	0.08	0.23		4.1	
0.60 - 3.40	2.80	biot.gn. Mørk mlk.tildels pegmatitisk.Brecciert,Sprette Sl.Cp.Gn.Py.		0.01	0.16	1.33		7.2	0.60-2.00
				0.02	0.15	0.60		5.4	2.00-3.40
3.40 - 4.40	1.00	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.enstaka skikt av Po.Py.Sl.Gn.	45	1.25	0.26	0.42		5.6	
4.40 - 7.10	2.70	grå gn. lys mlk.intens foldet m/små runde folder.		0.03	0.05	0.06		3.9	4.40-5.40
7.10 - 8.50	1.40	biot.gn. Mørk mlk.delvis biot.sk.	80	0.01	0.04	0.08		5.2	
8.50 - 10.20	1.70	hbl.gn. Rel.mørk mlk.växl m/hbl. biot.gn.små åpne folder.							
10.20 - 12.10	1.90	biot.gn. Mørk mlk.pegmatitisk,Sl. Cp.Gn.Py.Po.	45-80	0.02	0.15	0.72		5.5	
12.10 - 13.10	1.00	grå gn.b.p. lys mlk.sprette gr.1-3mm Spor hbl.	70-80	0.01	0.01	0.04		1.6	
13.10 - 18.40	5.30	biot.gn. Mørk mlk.tildels pegmatitisk.Sl.Cp.Gn.Py.	60-80	0.02	0.15	0.55		6.4	13.10-17.40
				0.01	0.04	0.07		2.7	17.40-18.40
18.40 - 42.50	24.10	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.enstaka hbl. biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm,mot slutten musk.	40						
			45	0.01	0.12	0.10		1.5	41.50-42.50
42.50 - 44.20	1.70	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grov,impr.Py.spor Sl.Cp.Gn.	40	0.27	0.15	1.27		6.2	
44.20 - 52.40	8.20	biot.hbl. Mørk mlk.växl m/biot.musk grå gn.band delvis rik Sl.Cp.Gn.Py.Po. Småfoldet,ondulerat.	0-90	0.37	0.59	2.28		6.3	44.20-48.20
				0.51	0.34	3.65		6.4	48.20-52.40
				0.15	0.09	0.13		2.9	52.40-53.40
		2							

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Borehull: 1228

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
52.40 - 55.50	3.10	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. hbl.gn.band, sprette gr. 1-3 mm. Sl.Gn. ved 53.20.	45						
55.50 - 59.40	3.90	hbl.biot.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.gn.band, gr-førende, slak fold ved 57.20.	45 55						
20.06.85									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.550

Borehull: 1227

Dato : Juni -85
 Koordinater : X: 925.333,1 Y: 41.545,8
 Retning : opp
 Helling/stigning: +90°
 Høyde : + 15.8
 Lengde : 58.60 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	biot.gn. Rel.mørk mlk.m/grå gn. band i starten, impr.Sl.	80	0,03	0,13	1,24		4,5	
0.40 - 5.50	5.10	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm Åpen fold.	80 40 80						
5.50 - 7.60	2.10	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band, m/gr.1-3 mm, impr. Py.	70-90						
7.60 - 8.00	0.40	skarn Grønn, m/Sl.Cp.Gn.Py.		0,38	0,17	1,54		3,5	
8.00 - 14.40	6.40	grå gn.b.p. Lys mlk.enstaka biot.ski- kt.Fr.12.20-12.30 komp. Sl.	80-90						
				0,41	0,30	1,93		6,4	13,40-14,40
14.40 - 16.10	1.70	biot.gn. Mørk mlk.impr.Sl.Cp.Gn.Py.	70	0,13	0,41	2,83		9,1	
16.10 - 17.60	1.50	grå gn.b.p. Lys mlk.svak impr.Py.	80	0,01	0,04	<0,01		2,2	
17.60 - 20.80	3.20	biot.gn. Mørk mlk-grovmlk.delvis biot.musk.gn.impr.Sl.Cp. Gn.Py.	70-80	0,01	0,04	0,01		4,9	17,60-18,60
				0,17	0,16	1,00		7,0	18,60-19,60
				0,51	0,31	4,81		9,1	19,60-20,80
20.80 - 25.40	4.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/cm tykke biot.gn.band, sprette gr.1-3 mm, Sl.ved 23.50m.	80 60						
				0,02	0,02	0,06		1,9	24,40-25,40
25.40 - 26.30	0.90	biot.gn. Mørk mlk.impr.Py.Sl.Cp. Gn.Spor Po.	60 80	0,32	0,17	1,36		5,7	
26.30 - 27.70	1.40	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	80	0,01	0,01	0,04		1,6	
27.70 - 28.40	0.70	biot.gn. Mørk mlk.impr.Sl.Cp.Gn.Py.	80	0,04	0,10	2,49		4,6	
28.40 - 29.00	0.60	grå gn. Lys mlk.	80	0,01	0,01	0,08		1,6	
29.00 - 29.70	0.70	biot.gn. Mørk mlk.spor Sl.rund fold	80 60 80	0,01	0,15	0,35		5,6	

.....2

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1227

side 2

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29.70 - 54.20	24.50	grå gn. Lys mlk.enstaka opp til dm tykke hbl.gn.band,gr. førende ved 35.40 åpen fold.	70-90	0.01	0.04	0.03		2.1	29.70-30.70
				0.21	0.17	0.86		3.5	53.20-54.20
54.20 - 58.60	4.40	biot.gn. Rel.mørk mlk,var.m/biot. musk.gn.imp.Sl.Cp.Gn.Py. delvis rik.Fr.58.30-58.60 grus.	60-80	0.33	0.20	1.17		9.4	54.20-55.20
				0.71	0.50	4.06		7.29	55.20-58.60
		12/6-85 Stellan Burman							

Lokalitet: 41.550

Dato : Mai -85

Koordinator : X: 925.330,8 Y: 41.446,5

Retning : S

Borehull: 1226

Helling/stigning: 4800

Høyde : + 16.0

Lengde : 50.70 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.30	1.30	biot.gn. Mørk mlk-grov.delvis brecciert, spor hbl. <u>Sl.Cp.Gn.</u> <u>Py.</u>	70-80	0.03	0.27	1.37	g/tAgAu	7.5	
1.30 - 3.00	1.70	biot.gn. Mørk mlk.svagt hbl.førende, spor <u>Cl.Cp.Gn.Py.</u> delvis foldet.	50-70	0.03	0.04	0.10		3.7	
3.00 - 4.30	1.30	biot.gn. (Pegmatitisk) Mørk mlk-grovk.delvis brecciert, spor hbl. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	60-80	0.13	0.33	0.31		5.9	
4.30 - 5.90	1.60	biot.gn. Rel.mørk mlk.svak imp. <u>Py.</u> svake spor <u>Sl.</u>	70-80	0.03	0.12	0.16		4.4	
5.90 - 23.50	17.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.delvis bandad med cm tykke biot.hbl.gn. band. <u>Sl.</u> ved 8.60-8.65. Fra 19.20-19.50 små runde folder.							
23.50 - 25.40	1.90	biot.gn. (Biot.musk.) Mørk mlk.grovk.tildels filtet preg, imp. <u>Py.</u>	50	0.05	0.16	0.25		7.5	23.50-24.50
				0.05	0.15	0.34		5.5	24.50-25.40
25.40 - 34.70	9.30	biot.gn. væxl Mørk mlk.væxl m/grå gn. skarn.komp.malmband, runde folder.	70-70	0.14	0.55	5.60	7.9/0.05	11.8	25.40-26.50
				0.11	0.21	5.76	4.8/0.05	13.0	26.50-28.00
				0.09	0.23	5.24	5.5/0.15	9.8	28.00-29.50
				0.14	0.14	4.56	4.7/0.20	6.5	29.50-31.00
				0.32	0.16	2.71	9.1/0.20	5.4	31.00-32.50
				0.72	0.37	6.68	15.4/0.35	7.6	32.50-33.50
				1.07	0.37	3.67	23.2/0.50	6.4	33.50-34.70
34.70 - 50.70	16.00	grå gn. Lys mlk.enkelte biot.rikere render, sprette gr. l-3 mm. Fra 40.00-45.00 runde folder.	60-70	0.16	0.10	0.53	6.3/0.15	2.1	34.70-35.70

06.06.85 Stellan Burman

Lokalitet: 41.550

Dato : Juni - 85

Koordinater : X: 925.330,8 Y: 41.446,3

Retning : S

Helling/stigning: + 62⁰

Høyde : + 16,0

Lengde : 59,30 m

Borehull: 1225

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	Biot.gn. (Pegmatitisk) Mørk mlk-grovk.Brecciert Sl.Cp.Gn.Py.		0.04	0.89	3.06		11.4	
0.40 - 1.20	0.80	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.overgang til biot.gn.	50	0.03	0.11	0.26		3.0	
1.20 - 2.90	1.70	biot.gn. (Pegmatitisk) Mørk mlk-grovk, enkelte smalegrå gn.band, svak impr.Sl.Cp.Gn.Py.spor Po.	60-70	0.03	0.13	0.22		4.0	
2.90 - 4.60	1.70	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm spor Py.Po.	50-60						
4.60 - 5.60	1.00	biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.rik impr. 50 Sl.Cp.Gn.Py.	50	0.21	0.38	6.04		8.9	
5.60 - 19.50	13.90	grå gn.b.d. Rel.lys mlk, sprett gr. 1-3mm.Svak impr.Py.ens- taka biot.gn.band, spor Sl.fra 18.50-19.50.	45-50	0.09	0.08	1.10		5.6	18.50-19.50
19.50 - 24.40	4.90	biot.gn. Mørk mlk.svak impr.Py.	60	0.04	0.11	0.24		5.4	23.40-24.40
24.40 - 25.40	1.00	" " Mørk mlk.svak impr.Sl.Cp. Gn.Py.	60	0.07	0.25	0.96		6.7	
25.40 - 28.05	3.35	" " m/spor hbl.og gr.1-3 mm.	60-70						
28.05 - 29.80	1.75	" " m/spor hbl.og gr.1-3 mm impr.Py.spor Sl.Cp.Gn.	60-70	0.20	0.27	0.94		7.4	
29.80 - 40.70	10.90	grå gn.b.d. Lys mlk.enkelte dm tykke biot.gn.band, mot slutten m/hbl.Fr.37.60-37.80 rik Sl.enstaka gr.1-4 mm.	60-70						
40.70 - 59.30	18.60	grå gn.b.d. Ditto med m/hbl.gn.band. (Biot.gn.m/grågn)Fr.43.30-43.40 Sl. 6.6.85 Stellan Gunnar	70-80						

Lokalitet: 41.550

Borehull: 1224

Dato : Mai -85
 Koordinater : X: 925.332,7 Y: 41.547,9
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: -90°
 Hoyde : + 10.6
 Lengde : 20.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	grå gn.b.d. Rel. lys mlk.Spor <u>Sl.ved</u> 1.00.	70-80						
1.60 - 3.05	1.45	" " Rel.lys mlk.växl m/biot gn.band,spor <u>Sl.Fr.2.80-3.05 rik.</u>	"	0.03	0.36	2.12		7.2	
3.05 - 5.20	2.15	" " Lys mlk.sprette gr.1-3 mm spor <u>Py.Po.</u>	80						
5.20 - 8.80	3.60	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band.spor hbl.imp, striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u>	70-80	0.03	0.14	0.68		4.8	5.20-6.40
				0.61	0.22	3.76		6.4	6.40-8.80
8.80 - 10.60	1.80	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm.	"						
10.60 - 18.70	8.10	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band m/gr.1-3 mm,enstaka <u>Py.Po. striper .</u>	70-80						
18.70 - 20.00	1.30	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm	80						

11/6-85

Stellan Burman

Lokalitet: 41.550

Borehull: 1223

Dato : Maj -85
 Koordinater : X: 925.330,4 Y: 41.548,3
 Retning : S
 Helling/stigning: -56°
 Höyde : + 10.6
 Längde : 29.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	grå gn. Lys mlk.enkelte biot.skikt foldet.Spor Py.Sl.	45	0.01	0.07	0.27		3,7	
0.50 - 2.00	1.50	biot.gn. Mørk mlk.delvis brecciert Sl.Cp.Gn.Py.	50	<0.01	0.17	1.05		6.5	
2.00 - 2.60	0.60	grå gn. Lys mlk.svak imp.Py.	70-80	0.01	0.07	0.06		3.4	
2.60 - 3.40	0.80	biot.gn. Se ovan.Sl.Cp.Gn.Py.	70-80	0.05	0.74	2.10		12.1	
3.40 - 9.90	6.50	grå gn. Lys mlk.enstaka dm tykke biot.rike partier,Sl.ved 3.90-4.00.Po.ved 6.20. Delvis småfoldet.Fr.6.80 sprette spor hbl.m/gr.	70-80	0.04	0.95	1.19		5.5	340-440
9.90 - 18.50	8.60	biot.gn (pegmatitisk) Mørk mlk-grovk.Litt växl m/grå gn.band.var/Sl.Cp. Py.Po.	45-60	0.02	0.20	0.91		5.84	990-1450
				0.01	0.03	0.06		3.46	
18.50 - 19.10	0.60	hbl.biot.gn. Mørk mlk.gr-för. 1-3 mm.	55-60						
19.10 - 29.50	10.40	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm enkelte band m/spor hbl. gr-föreende.	50 60						

3.6.85

Stellan Burman

Lokalitet: 41.550

Dato : April -85

Koordinater : X: 925.329,0 Y: 41.546,1

Retning : S

Borehull: 1222

Helling/stigning: + 50⁰

Hoyde : + 15.1

Lengde : 50.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	biot.pegm.	Rel.lys grovk.Biot.som klyser,spor <u>Py.Cp.Sl.</u>						
0.50 - 14.00	13.50	grå gn.	Rel.lys mlk.växl m/biot. rike partier,svak imp. <u>Py.</u> i de biot.rikere partier, sprette gr. 1-3 mm.	45					
14.00 - 15.05	1.05	Pegm.							
15.05 - 22.60	7.55	grå gn.	Lys mlk.foldet.	30-40					
22.60 - 23.40	0.80	" "	Lys mlk.imp. <u>Sl.Cp.Py.Po.</u>	35	0.28	0.41	1.35	8.7	
23.40 - 27.90	4.50	" "	Lys mlk.slak fold.	0-40					
27.90 - 28.70	0.80	" "	Lys mlk.imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	30	0.69	0.29	0.80	6.4	
28.70 - 30.30	1.60	grå gn.	Rel.lys mlk.växl m/biot. rikere partier.	30-40					
30.30 - 36.70	6.40	biot.hbl.gn.	Mørk mlk.växl m/enstaka grå gn.band gr.førende 1-3 mm,spor <u>Sl.ved 33.30-33.50</u> foldet.	20-50					
36.70 - 39.50	2.80	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm spor <u>Sl.ved 37.55</u> foldet.	70 70					
39.50 - 40.70	1.20	biot.gn. (Hbl.førende)	Mørk mlk.delvis hbl.førende m/gr.1-3 mm.Foldet.	60 60					
40.70 - 50.00	9.30	grå gn.	Lys mlk.foldet,delvis svak imp. <u>Py.</u>	0-50					
9.5.85									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.550

Dato : Mai -85

Koordinater : X: 925.330,8 Y: 41.546,3

Retning : S

Helling/stigning: + 72°

Høyde : + 16.0

Lengde : 65.40 m

Borehull: 1221

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.10	4.10	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band m/spor hbl.spret- te gr. 1-3 mm.Fr.0.00- 0.20 spor Sl.Py.	70-80	.					
				0.03	0.02	0.16		2.5	3.10-4.10
4.10 - 4.90	0.80	biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.rik imp.Sl.Cp.Gn.Py.	60	0.24	0.37	5.88		10.2	
4.90 - 5.90	1.00	" " Mørk mlk.växl m/grå gn. band,svak imp.Py.Cp.Sl.?	70	0.02	0.25	0.17		6.6	
5.90 - 25.20	19.30	grå gn. Rel.lys mlk.litt växl m/ smale biot.gn.band,delvis hbl.førende,sprett gr.1- 3 mm,spor Py.	70-80						
25.20 - 28.10	2.90	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk.spor hbl. imp.Py.spor Sl.småfoldet.	60-70	0.03 0.04	0.06 0.19	0.14 0.28		6.5 6.8	25.20-26.60 26.60-28.10
28.10 - 29.60	1.50	biot.hbl.gn. Mørk mlk.rike malmstriper	70-80	0.10	0.30	5.16		11.8	
29.60 - 31.00	1.40	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk.Spor hbl.imp. Py.Sl.(D)	50-60	0.08	0.31	2.61		9.2	
31.00 - 35.70	4.70	biot.hbl.gn. Mørk mlk,sprette gr.1-3mm svak imp.Py.	45-60	0.20	0.37	1.03		6.9	31.00-32.00
35.70 - 37.60	1.90	hbl.gn. Mørk mlk.litt växl m/grå gn.b.d.band,gr-førende 1- 3 mm.Slake folder.	0-50						
				0.03	0.05	0.15		5.6	36.60-37.60
37.60 - 41.80	4.20	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk.spor hbl. stripet imp.Sl.Cp.Gn.Py.	50-70	1.11	0.29	3.91			
41.80 - 43.80	2.00	grå gn. Lys mlk.spor hbl.musk. enstaka gr.1-4 mm.Slake folder.	0-40						

.....2

Lokalitet:

Borehull: 1221

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Hoyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
43.80 - 49.60	5.80	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk.svak imp.Py. Sl.Cp.Po.Fr.47.00-48.00 runde folder.		0.42	0.22	1.39		6.23	
49.60 - 56.50	6.90	biot.hbl.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn./ musk.gn.band.Stripet Sl. Cp.Gn.Py.Po.foldt.	60-70	0.98	0.27	3.74		7.12	4260-54.00
				0.43	0.20	1.25		9.28	5400-58.50
56.50 - 58.30	1.80	" " " Mørk mlk.sprette gr.1-3mm svak imp.Py.	50-60	0.08	0.03	0.19		4.3	58.50-57.50
58.30 - 62.00	3.70	grå gn.b.d. Rel.lys mlk,sprett gr. 1-2 mm.	60-70						
62.00 - 65.40	3.40	hbl.biot.gn. Mørk mlk.sprett imp.Py. overganger til hbl.gn.	50-70						

30.5.85

Stellan Burman

Lokalitet: 41.550

Borehull: 1220

Dato : Mai -85
 Koordinator : X: 925.337,0 Y: 41.547,3
 Retning : N
 Helling/stigning: + 59°
 Høyde : + 14.9
 Lengde : 44.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.30	3.30	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.enstaka cm tykke biot.sk.band m/rik Sl.Cp.Gn.Py.	50-70	0.02	0.11	0.57		3.7	
3.30 - 5.60	2.30	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm	60						
5.60 - 12.50	6.90	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.enstaka opptil cm tykke biot.sk.band m/Sl.Cp.Gn.Py.	50-70	0.03	0.10	0.56		3.5	
12.50 - 19.50	7.00	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm.	45-50						
19.50 - 20.70	1.20	" " " " m/smale striper Sl.	"	0.23	0.16	0.29		2.9	
20.70 - 21.30	0.60	biot.hbl.skarn Rik malm.	"	0.07	0.71	12.60		15.8	
21.30 - 22.50	1.20	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.biot.skikt m/Sl.	45-50	0.03	0.09	0.28		2.5	
22.50 - 44.50	22.00	grå gn. Lys mlk.enkelte biot.rikere partier m/spor hbl.sprette gr.1-3 mm.Sl.ved 30.75-30.80 m.	45 55 70						

30.5.85

Stellan Burman

Lokalitet: 41.550

Dato : April -85

Koordinater : X: 925.338,0 Y: 41.547,0

Retning : N

Helling/stigning: + 35°

Høyde : ? 13.4

Lengde : 43.40

Borehull: 1219

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	grå gn.	Lys mlk.enstaka gr.1-3mm	40	.				
0.80 - 9.40	8.60	biot.gn. (Pematitisk)	Rel.lys mlk-grovk.Brecci- ert,enstaka Po.Py.klyser Spor <u>Sl.</u>	45 20					
9.40 - 10.80	1.40	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm.	40-45					
10.80 - 13.70	2.90	biot.gn. (Pegmatitisk)	Se ovan.	20-40					
13.70 - 15.00	1.30	biot.hbl.gn.	Mørk mlk,bandad m/grå gn. <u>Sl.</u> ved 12.40-12.50 14.70-14.80	45-50					
15.00 - 18.30	3.30	grå gn.	Lys mlk.enkelte biot.skikt tildels brecciart.Py.Po. Cp.Gn. <u>Sl.</u> som klyser og sprekkfylling.		0,39	0,21	0,34		3,5
					0,15	0,19	0,52		3,7
					0,02	0,48	0,82		4,4
18.30 - 20.90	2.60	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	30					
20.90 - 25.30	4.40	biot.gn. Pegmatitisk)	Rel.mørk mlk-grovk.Brecc- iert.Striper,klyser <u>Sl.</u> Cp.Gn.Py,Po.	0-45	0,03	0,14	0,31		4,4
					0,08	0,20	0,81		5,3
					0,10	0,88	2,66		9,1
25.30 - 32.30	7.00	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3 mm	35					
32.30 - 32.70	0.40	Pegm							
32.70 - 43.40	11.70	grå gn.	Rel.lys mlk.enkelte biot. rikere partier.Sprette gr.1-3 mm,ved 38.85 <u>Sl.</u> Foldet mot slutten.	30 10 30					
20.4.85									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.550

Borehull: 1218

Dato : April -85
 Koordinator : X: 925.337,4 Y: 41.548,0
 Retning : N
 Helling/stigning: -50°
 Høyde : + 10.6
 Lengde : 43.80

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.90	3.90	biot.gn. Rel.mørk mlk-grovmlk.växl m/grå gn.band,tildels pegmatitisk.Sprette spor Cp. Sl.	65-85	.					
3.90 - 19.30	15.40	grå gn. Lys mlk,enstaka biot.rikere band, fra 9.20-9.30 Sl sprette gr. 1-3 mm,	45-50						
19.30 - 19.80	0.50	hbl.biot.gn. Rel.mørk mlk-grov.Po.Cp. ved 19.45-19.50 gr.1-4mm.	50						
19.80 - 29.20	9.40	grå gn. Rel.mlk.väm/biot.band, enstaka hbl.biot.band m/gr.	50-60						
29.20 - 30.00	0.80	hbl.biot.gn. Mørk mlk.sprett gr.1-3 mm	60	0,03	0,10	0,05		5,2	
30.00 - 32.00	2.00	biot.hbl. Mørk grovk.växl m/grå gn. Brecciert,rike malm band.	50-60	0,28	0,68	8,80		13,8	30,00-31,00
				0,29	0,99	5,32		15,1	31,00-32,00
32.00 - 36.00	4.00	biot.hbl.gn. Mørk mlk.delvis bandad, sprette gr.1-2mm svak imp. Py.	60	0,03	0,17	0,45		4,8	32,00-33,00
36.00 - 41.20	5.20	hbl.gn. Mørk mlk.sprette gr.1-3mm	50-60						
41.20 - 43.80	2.60	grå gn. Rel-lys mlk.smale band hbl.gn.m/gr.	45						
20.4.85									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.610

Borehull: 1217

Dato Nov.-84
 Koordinator X: 925.442,8 Y: 44.605,8
 Retning : S
 Helling/stigning: - 58°
 Høyde : - 99.4
 Lengde : 5.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	grå gn. Lys mlk.delvis musk.rik. spor Sl.	60°	0,08	0,05	0,14			
0.60 - 4.80	4.20	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grovmlk. stripet imp.Sl.	60-40°	0,07	0,14	0,12			0,60 - 1,60
				0,12	0,61	1,71			1,60 - 2,60
				0,22	0,62	3,52			2,60 - 3,60
				0,23	0,38	1,92			3,60 - 4,80
4.80 - 5.30	0.50	grå gn. Lys mlk.sprette gr.	60°	0,11	0,10	0,20			
3/12-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.610

Borehull: 1216

Dato

Nov.-84

Koordinater

X: 925.448,8 Y: 44.606,7

Retning

Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde

-99,4

Lengde

: 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.20	3.20	grå gn. Mlk.sprette gr.1-2 mm, enstaka biot.gn.band. <u>Sl.ved</u> 0.65,foldet.	70-80°						
3.20 - 8.30	5.00	hbl.gn. Mørk mlk.fr.starten hbl. biot.gn.sprette gr.1-3 mm,spor <u>Py</u> .Småfoldet.	70-80°						
3/12-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.610

Borehull: 1215

Dato: Nov.-84
 Koordinater: X: 925.439,7 Y: 44.609,5
 Retning: N
 Helling/stigning: - 81°
 Høyde: - 99.5'
 Lengde: 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	grå gn. Lys mlk.kv.rik	80°	0.06	0.03	0.12			
0.80 - 3.00	2.20	biot.gn. Mørk mlk.skarn-førende. Rik Sl.Cp.Gn.Py.Foldet.	60-80°	0.69	0.33	1.75			0.80-2.00
				0.52	0.63	4.30			2.00-3.00
3.00 - 3.90	0.90	" " Mørk mlk.imp.Py.spor Sl.	80-90°	0.06	0.07	0.16			
3.90 - 7.30	3.40	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm Sl.ved 5.35.	80°	0.05	0.07	0.11			
7.30 - 8.30	1.00	hbl.gn. Mørk mlk,sprette gr.1-3mm	80°						

3/12-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.610

Borehull: 1214

Dato : Nov.-84
 Koordinater : X: 925.435,9 Y: 44.614,0
 Retning : S
 Helling/stigning: - 59°
 Høyde : - 99.3
 Lengde : 11.60 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-2mm.	60-70°	0.07	0.11	0.07			1.50 - 2.50
2.50 - 8.20	5.70	" " Rel. lys mlk.växl m/biot. musk.gn.band m/imp. <u>Sl.Cp.</u> Gn.Py.	60°	0.70	0.74	3.07			2.50 - 4.00
			65°	0.26	0.15	1.09			4.00 - 5.50
				0.12	0.11	0.28			5.50 - 8.20
8.20 - 11.60	.40	biot.hbl.gn. Mørk mlk.overgår mot slutten til hbl.biot.gn.svak imp. <u>Py.</u> sprette gr.1-3 mm.	70°	0.03	0.01	0.02			8.20 - 9.20

3/12-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.640

Borehull: 1213

Dato: Nov.-84
 Koordinater: X: 925.457,4 Y: 44.639,8
 Retning: Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde: - 98,9
 Lengde: 11.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-2mm.	80-90°	0,03	0,01	0,12			
1.00 - 4.90	3.90	" " Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band m/Sl.Cp.Gn.Py.	80-90°	0,86	0,24	5,28			1.00 - 2.00
				0,13	0,05	0,39			2.00 - 4.00
				0,17	0,17	1,32			4.00 - 4.90
4.90 - 8.40	3.50	" " Rel.lys mlk.växl m/ens-taka biot.hbl.gn.band m/Py.	80-90°	0,22	0,20	0,34			4.90 - 5.90
8.40 - 11.40	3.00	biot.hbl.gn. Mørk mlk.litt växl m/grå gn.band, imp.Py. foretrædes vis i biot.hbl.gn.	80-90°						

3/12-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.640

Borehull: 1212

Dato : Nov. -84
 Koordinator : X: 925.454,3 Y: 44.641,0
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Hoyde : - 99.4
 Lengde : 8.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.40	4.40	biot.musk.gn. Rel. lys mlk.skarn.Stripet imp.Py.Cp.Gn.Sl.Foldet.	70-90°	1.06	0.41	5.85			
4.40 - 5.60	1.20	Pegm. Växl m/Pegm/biot.gn.band biot.gn. m/Sl.Cp.Gn.Py.	80°	0.16	0.25	0.46			
5.60 - 8.50	2.90	grå gn. Rel. lys mlk.växl m/biot. gn.band.imp.Py.	70-90°	0.06	0.05	0.15			5.60 - 6.60

3/12-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.640

Borehull: 1211

Dato

Nov.-84

Koordinator

X: 925.450,3 Y: 44.641,5

Retning

Lodd

Helling/stigning:

- 90°

Hoyde

- 99.5

Lengde

11.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.90	1.90	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm. Spor <u>Sl</u> .	80-90°	0.20	0.54	0.84			0.00 - 1.00
				0.03	0.04	0.04			1.00 - 1.90
1.90 - 2.90	1.00	Pegm.							
2.90 - 5.90	3.00	grå gn. Rel.lys växl m/biot.musk. gn.band.stripet imp. <u>Sl</u> . Cp.Gn.Py.	80-90°	1.07	0.76	4.31			
5.90 - 10.40	5.50	" "	80-90°	0.12	0.10	0.02			5.90 - 6.90
10.40 - 11.40	1.00	hbl.biot.gn. Mørk mlk,sprette gr.1-3mm	70-80°						
3/12-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.640

Borehull: 1210

Dato : Nov.-84
 Koordinater : X: 925.447,3 Y: 44.641,6
 Retning : S
 Helling/stigning: - 80°
 Høyde : - 99.5
 Lengde : 11.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	Pegm. m/enkelte biot.gn.band.							
1.60 - 2.60	1.00	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. spor hbl.spor <u>Sl.Cp.Gn.</u> Py.	80-90°	0.04	0.06	0.10			
2.60 - 2.90	0.30	Pegm.							
2.90 - 4.20	1.30	grå gn. Rel.lys mlk.litt växl m/ biot.gn.band,spor <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	80°	0.13	0.10	0.26			
4.20 - 5.40	1.20	biot.gn. Mørk mlk.skarn,stripet tildels rik malm.	70-80°	1.30	0.47	7.32			
5.40 - 11.00	5.60	grå gn. Lys mlk.sprette gr.	70-80°	0.21	0.65	1.79	?		5.40-6.40
11.00 - 11.40	0.40	hbl.gn. Mørk mlk.m/gr.	70°						
3/12-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.560 (Blåstoll stuff)

Dato: Nov.-84
 Koordinator: X: 925.330 Y: 41.560 på stuff
 Retning: v
 Helling/stigning: - 23°
 Høyde: + 10,4
 Lengde: 8.60 m

Borehull: 1209

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	grå gn. Rel.lys mlk.Fr.0.00-0.20 biot.skikt.enstaka gr. 1-2 mm.Småfoldet.	0-15°						
1.20 - 1.50	0.30	komp.malm	35°	1.68	0.40	12.40			
1.50 - 2.30	0.80	grå gn. Rel.lys mlk.sprette biot. skikt m/imp.Py,spor Sl. Cp.Gn.Foldet.	0-30°	0,03	0,11	0,64			
2.30 - 3.50	1.20	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band.imp.Py.Po.	30-35°	0.01	0.08	0,28			
3.50 - 5.20	1.70	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	30°						
5.20 - 8.40	3.20	biot.gn. Pegmatitisk Rel.mørk grovk.striper, klysor Sl.Cp.Gn.Py.Po.	0-40°	0,15	0,31	1.42			5,20 - 6,20
				0,01	0,35	0,62			6,20 - 7,20
				0,16	0,11	1.15			7,20 - 8,40
		12.11.84 Stellan Burman							

Lokalitet: 41560 (Blåstoll stuff)

Borehull: 1208

Dato : Nov.-84
 Koordinater : X: 925.330 Y: 41.560 på stuff
 Retning : V
 Helling/stigning: + 22°
 Høyde : + 11,2
 Lengde : 8.60 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	biot.gn. Mørk mlk.rik imp. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.Po.</u>	25-30°	0,04	0,33	5,96			
0.80 - 1.20	0.40	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band m/ <u>Py.Po.Spor Sl.</u>	25°	0,03	0,08	0,24			
1.20 - 6.90	5.70	" " Lys mlk.sprette gr.1-3mm.	20-25°						
6.90 - 7.60	0.70	" " Rel.lys mlk.skiktad m/biot. musk.skikt.Imp. <u>Py.Sl.Cp.</u> <u>Gn.</u>	15-25°	0,35	0,28	3,85			
7.60 - 8.60	1.00	<u>Malm</u> Rik <u>Sl.Cp.Py.Foldet.</u>	0-30°	2,01	0,92	13,24			
12.11.84 Stellan Burman									

Lokalitet: 41.890

Dato : Nov.-84

Koordinater : X: 925.392,5 Y: 41.889

Retning : opp

Helling/stigning: +90°

Høyde : + 12.0

Lengde : 43,20 m

Borehull: 1206

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.70	1.70	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm						
1.70 - 5.50	3.80	biot.gn. Pegmatitisk	Mørk grovk.delvis brec- ciert.Py.som sprekkfyl- ling.						
5.50 - 8.00	2.50	grå gn.	Lys mlk.växl m/biot.gn. band.						
8.00 - 9.10	1.10	Pegm.							
9.10 - 9.70	0.60	grå gn.	Se ovan.						
9.70 - 12.20	2.50	biot.gn.	Mørk mlk.delvis pegmati- tisk.Py.Sl. fr.11.90-12.10						
12.20 - 35.20	23.00	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm spor hbl.						
35.20 - 38.50	3.30	grå gn.	Lys mlk.musk.rik,litt skarn imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	80-90	0,65	0,58	3,33		35,20-36,20
					0,38	0,53	1,01		36,20-38,20
38.50 - 42.30	3.80	" "	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	80-90					
42.30 - 42.80	0.50	" "	Lys mlk.spor hbl.rik imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	80	0,38	0,48	8,96		
42.80 - 43.20	0.40	Pegm.							
8.11.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1205

Dato: Okt.-84
 Koordinater : X: 925.331.4 Y: 41.564
 Retning : N
 Helling/stigning: - 45°
 Høyde : + 9,3
 Lengde : 8.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.90	5.90	biot.gn. Rel.mørk mlk, delvis brecciert pegmatitisk. Enkelte skikt og striper <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.Po.</u>	30° 40°	0.03	0.18	1.08			0.00 - 1.50
				0.03	0.10	0.23			1.50 - 3.00
				0.01	0.10	1.42			3.00 - 4.50
				0.04	0.26	6.44			4.50 - 6.50
5.90 - 8.00	2.10	" " Se ovan. Spor <u>Sl.</u>	ca. 45°						5.50 - 7.00

6/11-84
 Stellan Burman

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1204

Dato

Okt.-84

Koordinater : X: 925.331.4 Y: 41.564

Retning : N

Helling/stigning: 0° Horisontalt

Høyde : + 11,9

Lengde : 20.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.50	8.50	biot.gn. Mørk mlk.variert m/grå gn.sprette gr.1-3 mm i grå gn.Litt <u>Py.</u> og <u>Po.</u> i biot.gn.	0-5°						
8.50 - 9.90	1.40	" " " " " " m/spor <u>Sl.</u>	0-5°	0.03	0.18	1.00			
9.90 - 14.80	4.90	" " " " Sl. fr. 14.70-14.80.	0-5°						
14.80 - 20.00	5.20	grå gn.bd. Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm,sprette biot.band m/ <u>Py.</u> Spor <u>Sl.</u> ved 15.25-15.30 " " " 17.35 Foldet.	0-5°						
			Fr.18.00 m45-60						

6/11-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1203

Dato: Okt.-84
 Koordinator : X: 925.331.4 Y: 41.564
 Retning : N
 Helling/stigning: + 15°
 Höyde : + 11,5
 Längde : 7.10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	grå gn. Rel.lys mlk.skiktad m/ biot.skikt.Slake folder.	0-5°						
1.20 - 3.20	2.00	biot.gn. Mørk mlk.grå gn.band. Slake folder. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> <u>Po.</u>	0-5°	0,03	0,15	0,17			1,20 - 2,20
				0,07	0,30	6,48			2,20 - 3,20
3.20 - 7.10	3.90	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm Slake folder.(Borrat igenom till Blåstoll)	5-10°	0,03	0,08	0,34			3,20 - 4,20
6/11-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1202

Dato: Okt.-84
Koordinater: X: 925.331.4 Y: 41.564
Retning: N
Helling/stigning: + 40°
Høyde: + 12,9
Lengde: 19.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analysor					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 19.50	19.50	biot.gn. grå gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band, sprette striper <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.Po.</u> Foldet, delvis brecciert.	ca. 45°	Se molnuberegning.					
		6/11-84 Stellan Burman							

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1201

Dato : Okt.-84
 Koordinator : X: 925.333.0 Y: 41.564.0
 Retning : N
 Helling/stigning: $\mp 65^{\circ}$
 Høyde : +14,5
 Lengde : 17.10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	grå gn. Lys mlk.kv.rik.	45°	0,12	0,06	0,38			
1.10 - 3.90	2.80	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band,sprette <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> <u>Po. striper.</u>	50° 60°	0,26	0,22	2,03			
3.90 - 6.35	2.45	grå gn. Lys mlk.enstaka gr.1-3 mm <u>Sl.ved 4.50.</u>	60° 70°						
6.35 - 8.75	2.45	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band.Sprette striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u>	60°	0,67	0,15	3,45			6,35-7,50
				0,10	0,17	0,86			7,50-8,85
8.75 - 12.90	4.15	grå gn. Lys mlk.enkelte smale biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm.	60°						
12.90 - 16.40	3.50	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.bandenkelte striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u>	70°	0,22	0,14	0,61			12,90-14,00
				0,09	0,70	1,72			14,00-15,00
				0,19	0,43	1,53			15,00-16,40
16.40 - 17.10	0.70	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm. 6/11-84 Stellan Burman	80°						

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1200

Dato: Okt.-84
 Koordinater : X: 925.330.8 Y: 41.564.0
 Retning :
 Helling/stigning: opp
 : + 90°
 Høyde : + 14,5
 Lengde : 13.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band. <u>SL</u> .som smale band.	70-90°	0,11	0,15	1,98			
1.60 - å3.40	11.80	grå gn. Lys mlk.enstaka biot.gn. band.sprette gr.1-3 mm. <u>SL</u> .ved 7.50-7.60 m " " 9.05-9.10 m " " 9.60-9.62 m " " 10.80-10.90 m " " 11.40-11.60 m " " 12.80-12.85 m	80-90°						
6/11-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1199

Dato: 1984

Koordinater: X: 925.327.8 Y: 41.563.2

Retning: S

Helling/stigning: + 65°

Høyde: + 14,3

Lengde: 17.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	skarnmalm Rik malm. Anhydrit fr. 0.50-0.65.		0,26	0,48	10,72			
1.60 - 3.90	2.30	biot.gn. Mørk mlk. delvis Pegmatisk, imp. Py.	45°	0.02	0.03	0.11			1.60-2.60
3.90 - 17.20	13.30	musk. biot. gn. Rel. mørk mlk-grov mlk. Imp. Py. Mot slutten overgang mot grå gn.	45° 50° 60°						

6/11-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1198

Dato : Okt.-84
 Koordinater : X: 925.327.8 Y: 41.563.2
 Retning : S
 Helling/stigning: + 40°
 Høyde : + 12,4
 Lengde : 11.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm.	35°						
1.20 - 3.40	2.20	biot.gn. Mørk mlk.litt växl m/grå gn.band, imp. <u>Sl. Cp. Py.</u>	40°	0,93	0,25	2,38			1,20 - 2,30
				0,18	0,11	0,39			2,30 - 3,40
3.40 - 9.20	5.80	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grov. Imp. <u>Py.</u>	30-40°	0,48	0,27	0,21			3,40 - 4,40
9.20 - 11.40	2.20	grå gn. Lys mlk.litt växl m/musk. biot.gn.band.	30°						

6/11-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.570

Borehull: 1197

Dato: Okt.-84
 Koordinator : X: 925.327.8 Y: 41.563.2
 Retning : S
 Helling/stigning: + 16°
 Høyde : + 11,3
 Lengde : 11.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	2.30	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band.Imp.Py.Sl.Cp.Gn. i biot.gn.Ondulerad. (slake små folder)	0-10°	0.03	0.15	0.41			
2.30 - 3.80	1.50	Biot. Mørk grovk.spor hbl.fol- det, imp.Sl.Cp.Gn.Py.Po.	0-10°	0.27	0.32	0.35			
3.80 - 7.50	3.70	biot.gn. Mørk mlk.växl m/halve kjernen grå gn.imp.Py. delvis Sl.	0-5°	0.36	0.19	0.20			
7.50 - 11.40	3.90	grå gn.bd. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band,delvis halve kjer- nen, imp.Sl.Cp.Gn.Py.	0-10°	0.14	0.08	0.30			7.50-8.80
				0.51	0.37	1.09			8.80-10.10
				0.50	0.59	0.45			10.10-11.40
		5/11-84 Stellan Burman							

Lokalitet: 41.560

Borehull. 1196

Dato : 1984
Koordinater : X: 925.327.8 Y: 41.563.2
Retning : S
Helling/stigning: 0° Horizontalt
Høyde : + 10,9
Lengde : 11.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	grå gn. Rel.lys mlk-grov-mlk.svak imp. <u>Py.</u>	15°	0,01	0,02	0,05			
0.70 - 4.90	4.20	biot.gn. Mørk mlk-grovmlk.delvis Pegmatitisk,litt variert m/grå gn.band cm tykke. Foldet m/brecciert preg. Imp. <u>Py.Po.</u> Stedvis <u>Sl.</u>	5-15°	0,02	0,13	0,77			0,70-2,00
				0,02	0,12	0,24			2,00-3,50
				0,02	0,20	0,29			3,50-4,90
4.90 - 5.95	1.05	Pegm. M/enstaka biot.flagor, ^{sch} sikt Spor <u>Py.Po.Cp.</u>		0,05	0,08	0,13			
5.95 - 11.30	5.35	biot.gn. Se ovan,samt delvis halve kjernen grå gn.	0-15°	0,26	0,18	1,05			5,95-9,00
				0,02	0,05	0,05			9,00-11,30
		6/11-84 Stellan Burman							

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1195

Dato : okt.-84
 Koordinater : X: 925.327.8 Y: 41.563.2
 Retning : S
 Helling/stigning: - 45°
 Høyde : + 9,2
 Lengde : 17.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 9.25	9.25	biot.gn. Mørk mlk-grov.växl m/opp til dm tykke grå gn.band sprette Sl.Cp.Py.Po.band företrädesvis i biot.	50-70°	0.02	0.13	0.41			0.00 - 1.50
				0.06	0.18	1.22			1.50 - 7.50
				0.02	0.15	0.84			7.50 - 8.50
				0.05	0.19	5.60			8.50 - 9.25
9.25 0.00 - 10.00	0.75	grå gn. rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm.	60°	0.02	0.03	0.15			
10.00 - 10.45 10.00 - 14.20 45	0.45 3.75	- " - biot.gn. Mørk grovk.Cm tykke biot. pegmatitisk band.Klysor Striper m/Py. Po. Sl?	60 45°						
14.20 - 17.30	3.10	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-4mm.							

6/11-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1194

Dato : Okt.-84
 Koordinater : X: 925.328.5 Y: 41.563.2
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : + 9,2
 Lengde : 11.60 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.60	8.60	Biot.gn. (Pegmatitisk) Mørk mlk-grovk. Foldet. Sprette cm tykke <u>Sl.Gn.</u> <u>Py.Cp.</u> band.	60°	0,03	0,30	1,43			0,00 - 1,50
			90°	0,03	0,14	0,87			1,50 - 4,50
			60°	0,04	0,22	1,39			4,50 - 8,60
8.60 - 11.60	2.00	grå gn. Rel.lys mlk.m/biot.skikt. Enstaka gr.2-5 mm.	70-80°	0,01	0,04	0,08			8,60 - 9,60

5/11-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1193

Dato : okt.-84
 Koordinator : X: 925.330.8 Y: 41.563.2
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : + 9,2
 Lengde : 11.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.70	7.70	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band, gr-førende, sprette malmstriper.	70° 80°	0.02	0,14	0,52			0,00-1,00
				0,74	0,33	6,60			1,00-2,00
				0.06	0,09	0,46			2,00-3,40
				0.07	0,21	2,67			3,40-4,40
7.70 - 11.30	3.60	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/cm tykke biot.gn.band, sprette gr.1-3 mm.	70-80°	0,02	0,13	0,36			4,40-7,00
				0,02	0,19	2,61			7,00-7,70
6/11-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1192

Dato : 9/11-84
 Koordinater : X: 925.333.0 Y: 41.563.2
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : + 9,2
 Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.65	1.65	Biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band m/sprette gr.1-3 mm,spor <u>Sl.Cp.Py.</u>	75°						
1.65 - 4.80	3.15	" " " " " " m/sprette striper <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.Po.</u>	75°	0,30	0,41	3,96			1,65-4,10
				0,02	0,21	1,20			4,10-4,80
4.80 - 8.40	3.60	" " Mørk mlk,spor hbl.gr.1-3 mm,grå gn.band.	60-70°						
8.40 - 10.00	1.60	Tap.							
6/11-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 42.040

Borehull: 1191

Dato : Okt.-84
 Koordinater : X: 925.401.4 Y: 42.047,8
 Retning : S
 Helling/stigning: + 63°
 Høyde : + 16.5
 Lengde : 24.70 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.40	3.40	grå gn. Rel.lys mlk.enkelte biot. skikt.sprette gr.1-3 mm.	60°						
3.40 - 4.20	0.80	biot.gn. Mørk mlk.imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	50-60°						
4.20 - 4.70	0.50	Kjernetap.							
4.70 - 17.40	12.70	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	60-65°						
17.40 - 17.90	0.50	hbl. Mørk grovk.	60°						
17.90 - 21.50	3.60	grå gn. Se ovan.	60°						
21.50 - 22.00	0.50	Pegm.							
22.00 - 24.70	2.70	grå gn. Rel.lys mlk.m/skarn. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	60-70°	0,58	0,59	3,93			
30.10.84 Stellan Burman									

Lokalitet: 42.040

Borehull: 1190

Dato : 1.11.84
 Koordinator : X: 925.402,1 Y: 42.048,0
 Retning : S
 Helling/stigning: + 75°
 Høyde : + 16.5
 Lengde : 28.80 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.00	3.00	grå gn. Lys mlk.delvis biot.rik. sprette gr.1-3 mm.	70°						
3.00 - 4.50	1.50	biot.gn. Mørk mlk-grov.delvis brecciert,Pegmatitisk. Spo hbl.Sl.Cp.Gn.Py.	70°	0,03	0,18	3,09			
4.50 - 11.30	6.80	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm	80°						
11.30 - 12.30	1.00	Pegm.							
12.30 - 20.00	7.70	grå gn. Rel.lys mlk.delvis biot. rik og hbl.førende,spret- te gr.1-3 mm.	70-80°						
20.00 - 23.20	3.20	" " Lys mlk.rel.musk.rik. stripet imp.Sl.Cp.Gn.Py.	70-80°	0,47	0,67	3,46			
23.20 - 27.80	4.50	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-2mm	60-70°						
27.80 - 28.80	1.00	" " Imp.Sl.Py.Cp.Gn.	"	0,08	0,37	1,52			
1/11-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 42.040

Dato : t.-84

Koordinater : X: 925.402,1 Y: 42.048.0

Retning : N

Helling/stigning: + 77°

Hoyde : + 16.5

Lengde : 38.30 m

Borehull: 1189

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 38.30	38.30	grå gn. Rel.lys mlk.enkelte biot. rikere partier, sprette gr.1-3 mm.Fr.25.00-32.00 m spor hbl. 30/10-84 Stellan Burman	70-80°						

Lokalitet: 42.040

Borehull: 1188

Dato : 1.11.-84
 Koordinater : X: 925.402,1 Y: 42.048,0
 Retning : opp
 Helling/stigning: + 90°
 Høyde : + 16.5
 Lengde : 29.80 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.60	3.60	grå gn. Rel.lys mlk.enstaka smale biot.band.sprette gr.1-3mm	80-90°						
3.60 - 4.05	0.45	biot.gn. Mørk mlk.Spor <u>Sl.</u>	"						
4.05 - 17.00	12.95	grå gn. Lys mlk.spor hbl.sprette gr.1-3 mm.	80-90°						
17.00 - 18.70	1.30	Kjernetap.							
18.70 - 20.00	1.30	grå gn. Se ovan.	70-80°						
20.00 - 25.00	5.00	grå gn. skarn Rel.mørk mlk.variert m/ grå gn, skarn, biot. Foldet, sprette små druserum. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>		0,36	0,92	5,12			
25.00 - 25.90	0.90	Kjernetap Formodligen samme som ovan							
25.90 - 28.40	2.50	grå gn. Skarn Se ovan. <u>sl cp gn py</u>		0,32	0,70	5,36			
28.40 - 29.00	0.60	Kjernetap.							
29.00 - 29.80	0.80	grå gn skarn. <u>sl cp gn py.</u>		0,57	1,06	3,50			
1/11-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.660

Borehull: 1187

Dato: Okt.-84
 Koordinater: X: 925.447,5 Y: 44.661
 Retning: S
 Helling/stigning: - 57°
 Høyde: - 99,0
 Lengde: 7,50 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.30	6.30	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. rikere partier. Sl.ved 0.25-0.45 m " " 7.25-7.30	60-70°						
6.30 - 7.15	0.85	Pegm.							
7.15 - 7.50	0.35	grå gn. Sl.ved 7.15-7.20 m.	70°						
10.10.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.660

Borehull: 1186

Dato : 10.10.84

Koordinater : X: 925.454 Y: 44.661

Retning : N

Helling/stigning: - 34°

Høyde : -98.7

Lengde : 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	grå gn. Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm,enstaka spor Sl.	30-40°	0,46	0,18	1,08			
2.00 - 5.40	3.40	" " Lys mlk,musk.rik,rik imp. Sl.Cp.Gn.Py.	ca.45°	1,67	0,25	6,97			
5.40 - 7.70	2.20	Pegm.							
7.70 - 8.30	0.60	grå gn. Rel.lys mlk,biot.rik, sprette gr. 1-3 mm.	25°						
10.10.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.660

Borehull: 1185

Dato : 10.10.84
 Koordinater : X: 925.454 Y: 44.661
 Retning : N
 Helling/stigning: - 58°
 Høyde : - 99.1
 Lengde : 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.40	5.40	grå gn. Rel.lys mlk,växl m/biot. musk.rikere band,delvis rik imp.Sl.Cp.Gn.Py.	ca.60°	0,83	0,43	5,23			
5.40 - 8.30	2.90	" " Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm.	50°						

10.10.84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.700

Borehull: 1184

Dato : Okt.-84
 Koordinator : X: 925.464 Y: 44.700
 Retning : N
 Helling/stigning: 0° (Horisontalt)
 Høyde : - 98,0
 Lengde : 2.60 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	grå gn. Lys mlk, slake folder, imp. <u>Sl.</u>	0-10°	0.64	0.40	2.32			
0.60 - 2.60	2.00	" " Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm 10.10.84 Stellan Burman							

Lokalitet: 44.700

Borehull: 1183

Dato: 10.10.84

Koordinater: X: 925.4575 Y: 44.706

Retning: S

Helling/stigning: - 62°

Høyde: - 98,5

Lengde: 10,90 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.10	2.10	grå gn. Lys mlk, Musk.rik, imp. <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u>	60-70°	1.14	0.26	4.02			0.00-1.00
				0.37	0.38	1.52			1.00-2.10
2.10 - 4.80	2.70	" " Lys mlk, sprette gr.1-3 mm.	70°						
4.80 - 5.30	0.50	" " Musk.rik, imp. <u>Sl.</u>		0.71	0.18	4.30			
5.30 - 5.85	0.55	Pegm							
5.85 - 7.80	1.95	grå gn. Lys mlk. musk.rik, svak imp <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	60-80°	1.08	0.48	2.86			
7.80 - 9.60	1.80	biot.hbl.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn, stripet imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	70-80	0.13	0.12	0.41			
9.60 - 10.90	1.50	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3 mm.	60-70°						

10.10.84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.715

Dato : 1.10.84

Koordinater : X: 925.457,0 Y: 44.716,0

Retning : S

Helling/stigning: + 22°

Høyde : - 98.7

Lengde : 2.30 m

Borehull: 1182

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	2.30	grå gn. Lys mlk, svak imp. <u>Py.</u> <u>Sl.</u> fr. 1.70-1.90. 10.10.84 Stellan Burman	25°						

Lokalitet: 44.715

Borehull: 1181

Dato : 1984
 Koordinator : X: 925.457,0 Y: 44.716,0
 Retning : S
 Helling/stigning: - 28°
 Høyde : - 100,0
 Lengde : 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.00	3.00	grå gn. Rel.lys mlk,växl m/biot. skikt,litt Skarn.Stripet imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	45°	1.31	0.17	3.54			
3.00 - 5.20	2.20	" " Rel.lys mlk,växl m/biot. gn.band,slak fold.	30-45°						
5.20 - 6.20	1.00	" " Musk.rik,svak imp. <u>Sl.</u>	35°	0.62	0.28	1.41			
6.20 - 7.10	0.90	" " Rel.lys mlk.skiktad m/ biot.svak imp. <u>Py.</u>	30°						
7.10 - 7.60	0.50	Pegm							
7.60 - 8.30	0.70	grå gn. " " "	45°						

10.10.84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.715

Borehull: 1180

Dato : Okt.-84
 Koordinater : X: 925.457,0 Y: 44.716,0
 Retning : S
 Helling/stigning: - 46°
 Høyde : - 100.7
 Lengde : 11.0 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.00	4.00	grå gn. Rel.lys mlk,växl m/biot. gn.band,stripet Sl.Cp.Gn. Py.	45°	0.79	0.38	2.42			0.00-3.00
				0.15	0.12	0.42			3.00-4.00
4.00 - 5.80	1.80	biot.gn. Mørk mlk,växl m/grå gn. band m/sprette gr.1-3 mm.	50°						
5.80 - 6.70	0.90	Pegm.							
6.70 - 6.90	0.20	grå gn.							
6.90 - 8.00	1.10	" " Lys mlk,musk.rikSvak imp. Sl.Py.Cp.Gn.	50-60°	0.85	0.44	3.00			
8.00 - 11.00	3.00	" " Lys mlk.sprette gr.1-3mm 10.10.84 Stellan Burman	45-60°						

Lokalitet: 44.715

Borehull: 1179

Dato: Okt.-84
 Koordinater: X: 925.462,5 Y: 44.716,5
 Retning: N
 Helling/stigning: - 8°
 Høyde: - 99,4
 Lengde: 7.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	2.30	biot.gn . Rel.mørk mlk,växl m/grå gn, pegm band, Imp. <u>Sl.Cp.</u> <u>Py.Gn.</u> slake folder.	0-10	0,94	0,58	3,02			0,00 - 1,00
				0,46	0,31	2,09			1,00 - 2,30
2.30 - 7.30	5.00	grå gn. Rel.lys mlk,växl m/biot. gn.band.	5-15						

10.10.84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.675

Borehull: 1178

Dato: Sept.-84

Koordinater : X: 925.456 Y: 44.673

Retning : opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : - 94,6

Lengde : 11.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.30	4.30	grå gn. Rel.lys mlk, bandad m/cm tykke biot.band, svak imp <u>Py.</u>	80-90°						
4.30 - 4.85	0.55	Pegm.							
4.85 - 7.10	2.25	biot.gn. Mørk mlk-grov mlk, delvis pegmatitisk, svak imp. <u>Sl.</u>	80-90°	0,25	0,25	0,76			
7.10 - 11.30	4.20	grå gn. Rel.lys mlk, rel.biot.rik spor hbl.mot slutten. Svak imp. <u>Py.</u>	70-80°						
10.10.84 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.675

Borehull: 1177

Dato : Sept.-84
Koordinater : X: 925.445 Y: 44.673,0
Retning : opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 94.7
Lengde : 5.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.00	5.00	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band, spor hbl.svak imp. <u>Py.</u> 10.10.84 Stellan Burman	80°						

Lokalitet: 44.673

Dato: Sept.-84

Koordinater : X: 925.436 Y: 44.673,0

Retning : opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : - 95.5

Lengde : 9.30 m

Borehull: 1176

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	grå gn. Rel.lys mlk.biot.rik,svak imp. <u>Sl.</u>	80°	0.68	0.39	1.98			
1.00 - 2.95	1.95	" " Lys mlk,sprette gr.1-3mm.	70-80°						
2.95 - 5.70	2.85	" " " " " imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	"	0.76	0.22	2.26			
5.70 - 9.30	3.80	biot.hbl.gn. Mørk mlk,litt växl m/grå gn.band,svak imp. <u>Py.</u>	"						
10.10.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.675

Borehull: 1175

Dato Sept.-84

Koordinater : X: 925.455.5 Y: 44.672,0

Retning : Lodd

Helling/stigning: -90°

Hoyde : -98.8

Lengde : 9.90 m

Dybde	L	Bergart		S	Analyser					Prove m
					% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.10	3.10	grå gn.	Rel.lys mlk,litt växl m/ smale biot.band,imp. <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u>	70-90°	0.58	0.32	2.12			0.00-1.00
					1.49	0.55	3.88			1.00-2.00
					0.90	0.20	1.92			2.00-3.10
3.10 - 4.40	1.30	Skarn	Malm		1.47	0.44	9.08			
4.40 - 5.05	0.65	Kvarts.								
5.05 - 6.90	1.85	Skarn/biot.	Rik imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u>	80-90°	0.91	0.65	5.40			5.05-6.00
					0.75	0.98	1.83			6.00-6.90
6.90 - 7.90	1.00	grå gn.	Rel.lys mlk,sprette gr.1-3 mm.	80-90°	0.04	0.03	0.07			
7.90 - 8.45	0.55	Skarn	Sl.?		0.07	0.17	0.08			
8.45 - 9.90	1.45	grå gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3mm	80-90°	0.03	0.01	0.03			8.45-9.45
18.10.84										
Stellan Burman										

Lokalitet: 44.675

Dato

Sept. -84

Koordinater : X: 925.462,0 Y: 44.675

Retning : opp

Helling/stigning: $+90^\circ$

Høyde : - 94.6

Lengde : 5.30 m

Borehull: 1174

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.80	3.80	grå gn. Rel.lys mlk, enstaka pegm. skarn band m/ <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	80-90°	0.61	0.17	1.97			
3.80 - 4.80	1.00	biot.gn. Mørk mlk, imp. <u>Sl.Py.Cp.Gn.</u>	80-90°	0.52	0.22	1.12			
4.80 - 5.30	0.50	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm	80-90°	0.04	0.02	0.08			
		18.10.84 Stellan Burman							

Lokalitet: 44.675

Borehull: 1173

Dato: sept.-84

Koordinater : X: 925.464,0 Y: 44.675

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : - 98.8

Lengde : 9.90

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm	80-90°	0.06	0.02	0.12			
1.20 - 3.25	2.05	" " Rel.lys mlk.växl m/biot. og skarnband,stripet Sl. Cp.Gn.Py.føretrådesvis i skarnbanden.	70-90°	1.49	0.92	4.58			1.20-2.20
				0.73	0.59	5.68			2.20-3.25
3.25 - 4.60	1.35	" " Lys mlk.växl m/pegm.band spor Sl.	80-90°	0.39	0.17	0.81			
4.60 - 9.90	5.30	" " Lys mlk.enkelte cm tykke biot.band,svak imp.Py. Sl.ved 6.40-6.50.	80-90°	0.03	0.02	0.04			4.60-5.60

18.10.84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.700

Dato Sept.-84

Koordinater : X: 925.464,0 Y: 44.700

Retning : N

Helling/signing: - 43°

Hoyde : - 99.0

Lengde : 8.30 m

Borehull: 1172

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	grå gn. Rel.lys mlk, spor <u>Sl.</u>	40°	0,53	0,22	2,45			
1.10 - 2.90	1.80	" " Rel.lys mlk, växl m/skarn-band, stripet <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	45°	1,60	0,54	6,30			
2.90 - 8.30	5.40	" " Lys mlk-fink.sprette gr. 1-2 mm, <u>Sl.</u> ved 5.00-5.10.	40° 20-30°	0,26	0,09	0,56			2,90-3,90
18.10.84 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.700

Borehull: 1171

Dato : Sept.-84
 Koordinater : X: 925.464,0 Y: 44.700
 Retning : N
 Helling/stigning: - 65°
 Høyde : - 99.5
 Lengde : 5.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.50	4.50	grå gn. Rel.lys mlk,delvis over- ganger til biot.gn.ens- taka dm tykke Pegm. og skarnband,stripet Sl.Cp. Gn.Py.føretrådesvis i skarn.	50-70°	1.24	0.39	4.68			
4.50 - 5.30	0.80	" " Lys mlk.sprett gr.1-3 mm. 18.10.84 Stellan Burman	60-70°						

Borehull: 1170

Dato : Sept.-84
Koordinater : X: 925.462,5 Y: 44.716,5
Retning : N
Helling/stigning : - 45°
Høyde : - 100,7
Lengde : 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.05	5.05	grå gn.b.d. Rel.lys mlk,växl m/skarn band, pegm.band, stripet imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> företräd- esvis i skarn.Foldet.	30-60°	1.44	0.47	3.62			0.00-3.00
				0.73	0.48	2.48			3.00-5.05
5.05 - 8.30	3.25	" " Rel.lys mlk,växl m/dm tyk- ke Pegmband,delvis skiktad m/biot.Foldet.	30-50°	0.05	0.04	0.22			5.05-6.05
18.10.84 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.715

Borehull: 1169

Dato Sept.-84

Koordinater : X: 925.462,7 Y: 44.716,5

Retning : N

Helling/stigning: - 76°

Hoyde : - 100,7

Lengde : 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.70	4.70	grå gn. Rel.lys mlk,växl m/skarn- band,musk.gn.stripet <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u> Foldet.	60-70°	0,83	0,32	5,24			
4.70 - 6.05	1.35	Pegm.							
6.05 - 8.05	2.00	biot.gn. Rel.mørk mlk,växl m/grå gn.band,spor hbl.svak imp. <u>Py.</u>	70°						
8.05 - 8.30	0.25	hbl.gn. Mørk mlk,gr-førende 1-3mm	75°						
		18.10.84 Stellan Burman							

Lokalitet: 44.740

Dato

Sept.-84

Koordinater : X: 925.458,5 Y: 44.741

Retning : N S?

Helling/stigning: - 45°

Høyde : - 101.0

Lengde : 2.10 m

Borehull: 1168

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.10	2.10	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm Foldet. 18.10.84 Stellan Burman	30-45°						

Lokalitet: 44.740

Borehull: 1167

Dato: Sept.-84
Koordinater: X: 925.464 Y: 44.741
Retning: S N?
Helling/stigning: - 53°
Høyde: - 100.8
Lengde: 2.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	grå gn. Rel.lys mlk,växl m/skarn imp.Sl.Cp.Gn.Py.	40°	2,72	0,62	2,88			
0.70 - 2.30	1.60	" " Lys mlk,sprette gr.1-3mm.	40-45°						
18.10.84 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.730

Borehull: 1166

Dato : sept.-84
Koordinater : X: 925.456 Y: 44.770
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 101.1
Lengde : 2.10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.10	2.10	grå gn. lys mlk.växl m/enstaka smale biot.band,sprette gr.1-3 mm.Sl.fr.1.80-1.90.	60-80°						
		18.10.84 Stellan Burman							

Lokalitet: 44.77()

Dato

Sept. -84

Koordinater : x: 925.468 y: 44.770,5

Retning : Lodd

Helling/signing: - 90°

Høyde : - 101.0

Lengde : 5.10 m

Borehull. 1165

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm	70°	0.07	0.04	0.12			
0.60 - 5.10	4.50	" " Lys mlk. tildels musk. rik, stripet imp. <u>Sl. Cp. Gn. Py.</u>	70-80°	1.27	0.18	2.69			0.60 - 2.00
				0.25	0.12	0.62			2.00 - 4.00
				0.77	0.37	2.30			4.00 - 5.10
		18.10.84 Stellan Burman							

Lokalitet: 44.280

Borehull: 1164

Dato: Sept.-84

Koordinater: X: 925.483.5 Y: 44.282.0

Retning: N

Helling/stigning: - 42°

Høyde: - 56.5

Lengde: 148.40 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.50	6.50	grå gn. Lys mlk.enstaka dm tykke biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm.Sl.ved 0.20 m. Foldet.	45-70°						
6.50 - 15.40	8.90	biot.gn. Mørk mlk-grovk.lendad m/ grå gn.band,enstaka gr. 1-2 mm.Py.Po.ved 6.90 m. Slak fold ved 9.10-9.20 m	ca.45°						
15.40 - 25.00	9.60	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm, enstaka smale biot.gn. band m/spor hbl.	ca.45°						
25.00 - 34.40	9.40	biot.hbl.gn. Rel.mørk r.lk.gr-førende 1-3 mm växl m/overganger til grå gn.	45-50°						
34.40 - 46.70	12.30	hbl.biot.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3mm växl m/hbl.gn.	50° 60°						
46.70 - 51.20	4.50	Pegm.							
51.20 - 55.70	4.50	hbl.gn. Mørk mlk.Amfibolitisk sprette gr.1-3 mm.Foldet.	0-45°						
55.70 - 66.50	10.80	grå gn. Lys mlk-fink.sprette gr. 1-3 mm.	45-50°						
66.50 - 67.00	0.50	Amf. Mørk mlk.gr.rik 1-3 mm.	60-70°						
67.00 - 67.70	0.70	grå gn. Se ovan.	60°						
67.70 - 68.30	0.60	Amf. Se ovan.	60-70°						
.....2									

Lokalitet:

Borehull: 1164

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
68.30 - 77.30	9.00	grå gr.	Lys mlk.sprette gr.1-2mm samt enstaka upp til dm tykke Amf.band.	60°					
77.30 - 78.50	1.20	Amf.	Mørk fink.tett sprette gr. 2-4 mm.	50-60°					
78.50 - 101.80	23.30	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	50-60°					
101.80 - 148.40	46.00	Amf.	Mørk mlk-fink.delvis bandad, enkelte hbl.gn. band gr-førende 1-3 mm.	60-70°					
26/10-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.280

Borehull: 1163

Dato : Sept-84.

Koordinater : X: 925.488,5 Y: 44.282.

Arkivert.

Retning : N

Helling/stigning: - 30

Høyde : - 56,5

Lengde : 180,70 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3 mm Spor Sl.i skarnklysa ved 0,10015 m.	45°						
0.70 - 2.90	2.20	biot.gn. Mørk mlk.litt växl m/grå gn.band.spor hbl.Py.	40-45°						
2.90 - 5.25	2.25	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm kv.rik.	"						
5.25 - 7.40	2.15	" " bd. Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm.	"						
7.40 - 10.05	3.65	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band m/gr.1-3 mm,svak imp.Py.	30-40°						
10.05 - 16.70	6.65	" " Mørk mlk.-grovk.foldet, delvis brecciert,sprette gr.1-4 mm.Svak imp.Py.	0-45°						
16.70 - 26.50	9.80	grå gn. Lys mlk.växl m/biot.gn. band,sprette gr.1-3 mm.	40-45°						
26.50 - 29.30	2.80	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk,sprette cm tykke grå gn.band.	45°						
29.30 - 37.90	8.60	hbl.biot.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.gn. partier gr-førende 1-3mm	45° 50°						
37.90 - 40.90	3.00	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm.	50°						
40.90 - 41.50	0.60	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. hbl.band,sprette gr.1-3mm	50°						
41.50 - 43.40	1.90	biot.musk.gn. Mørk mlk-grov mlk,ondule- rad,striper,imp.Sl.Cp.Gn. Py.	45°						
		2							

Kalitet:

Borehull: 1163

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
43.40 - 48.00	4.60	hbl.biot.gn.	Mørk mlk.hbl.gn.band.	35-40°					
48.00 - 51.00	3.00	biot.gn.	Mørk mlk.som overgår til biot.hbl.gn.Imp.Py.	ca.45°					
51.00 - 57.40	6.40	hbl.gn.	Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm,litt växl m/hbl.biot. gn.m/imp.Py.	50°					
57.40 - 66.40	9.00	" "	Mørk mlk.sprette gr.1-2mm delvis cm tykke pegm. striper,svak imp.Py.skarn Foldet.	ca.45°					
66.40 - 78.80	12.40	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3 mm kv.rik.	45-50°					
78.80 - 79.30	0.50	Amf.	Mørk mlk.sprette gr.1-3mm	45°					
79.30 - 81.10	1.80	grå gn.	Se ovan.	"					
81.10 - 81.60	0.50	Amf.	" "	"					
81.60 - 82.20	0.60	grå gn.	" "	"					
82.20 - 82.70	0.50	Amf.	" "	"					
82.70 - 83.00	0.30	grå gn .	" "	"					
83.00 - 83.40	0.40	Amf.	" "	"					
83.40 - 84.80	0.40	grå gn.	" "	"					
83.40 - 94.20	9.40	Amf. grå gn.	Mørk mlk.växl m/grå gn. gr.1-3 mm. Slak fold 89.70- 90.00.	45° 0					
94.20 - 95.00	0.80	kvarts.							
95.00 - 95.60	0.60	hbl.gn.	Mørk mlk.gr-førende 1-4mm.	50°					

.....3

Lokalitet:

Borehull: 1163

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
95.60 - 130.90	34.40	grå gn.	Lys mlk.enstaka hbl.gn./ Amf.band gr. 1-3 mm.	45-50 ^o					
130.90 - 154.70		Amf.	Mørk mlk-fin litt växl m/ hbl.gn.Amf.bånd + sk.	45-50 ^o					
154.70 - 155.20		Pegm.							
155.20 - 160.50		Amf.	Se ovan.						
160.50 - 162.60		Pegm.							
162.60 - 180.70		Amf.	Se ovan.	40 30 ^o					
12/11-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 41.890

Borehull: 1162

Dato : Aug.-84
 Koordinater : X: 925.393,0 Y: 41.890,5
 Retning : N
 Helling/stigning: + 65°
 Høyde : + 10.1
 Lengde : 52.20

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 15.80	15.80	biot.gn. (Pegmatitisk)	Mørk mlk-grov, växl m/grå. gn.band, gr.1-3 mm. Foldet.	45-60°					
15.80 - 45.00	29.20	hbl.biot.gn.	Mørk mlk, sprette gr.1-3 mm, delvis svak imp. <u>Py.</u>	70-75°					
45.00 - 52.20	7.20	grå gn.	Lys mlk, enstaka dm tykke Pegmband. Sl. ved 48.20-48.25 " " 49.10-49.20 " " 49.40-49.42	60-70°					

17/9-84

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 41.890

Dato : Sept.-84

Koordinater : X: 925.389,9 Y: 41.892,0

Retning : S

Helling/stigning: + 65°

Høyde : + 10,1

Lengde : 38.00

Borehull: 1161

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	hbl.biot.gn. Mørk grovk, rik imp. <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u>		0.03	0.84	10.68			
0.40 - 7.00	6.60	Pegm. Biot.skikt og flagor. biot. enstaka spor <u>Cp.Sl.Py.</u> 2.90-3.00.	50-60°						
7.00 - 11.10	4.10	grå gn. Lys mlk, enstaka smale biot.gn.band, sprette gr. 1-3 mm.	60-70°						
11.10 - 12.20	1.10	Pegm.							
12.20 - 16.70	4.50	biot.gn. Mørk mlk-grovk, växl m/ Pegmatitisk hbl.skarn band m/gr.1-3 mm delvis brecciert, <u>Sl.</u> i Skarn.	60-80°	0.01	0.06	0.71			12.20-13.00
				0.73	0.31	3.31			13.00-16.70
16.70 - 18.00	1.30	biot.sk. Mørk mlk.m/grønligt skär, enstaka gr.1-2 mm.	55-60°	0.04	0.04	0.10			
18.00 - 21.20	3.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk.Svak imp. <u>Py.</u>	60-70°						
21.20 - 36.70	15.50	grå gn. Rel.lys mlk.Sprette gr. 1-3 mm, spor hbl.	60-70°						
36.70 - 38.00	1.30	" " Rel.lys mlk, växl m/skarn, biot.gn.band, sprett <u>Sl.</u> <u>Cp.Py.</u>	60°	0.04	0.33	1.87			
		1/10-84 Stellan Burman							

Lokalitet: Profil 41.890 V-gruva

Borehull: 1160

Dato : Aug.-84
 Koordinater : X: 925.389,9 Y: 41.892,0
 Retning : S
 Helling/stigning: + 75°
 Høyde : + 10.1
 Lengde : 38,90 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov, rik imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u>		0,03	0,79	12,60			
0.50 - 3.90	3.40	biot.gn. Rel.mørk grovk.Breccierte (Pegmatitisk) foldet. Sl.ved 2.45-2.55 m " " 3.05-3.15	ca.70°						
3.90 - 6.60	2.70	Pegm. M/biot.flager, spor Py.Po.							
6.60 - 10.30	3.70	grå gn. Rel.lys mlk, enkelte biot. gn.band.sprette gr.1-3mm	70°						
10.30 - 15.70	5.40	biot.gn. Mørk grovk.Breccierte, spor Pegmatitisk Py.Po. Sl. ved 13.05-13.10 " " 13.70							
15.70 - 17.50	1.80	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm	70-80°						
17.50 - 19.20	1.70	biot.gn. Mørk mlk-grov, enstaka (sk.) gr.1-3 mm.	70-80°						
19.20 - 20.90	0.70	hbl.gn. Mørk mlk.gr.1-3 mm. biot.	70°						
20.90 - 35.90	15.00	grå gn. Rel.lys mlk, litt växl m/ hbl.biot.gn.band, sprette gr.1-3 mm.	70-80°	0,45	0,14	0,68			34,90-35,90
35.90 - 38.90	3.00	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grov mlk. litt växl m/Skarn, striper imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	80°	0,36	0,47	3,26			

1/10-84

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 41.890

Dato

Aug.-84

Koordinater

X: 925.389,9 Y: 41.892,0

Retning

: S

Helling/stigning:

+ 81

Høyde

: + 10.1

Lengde

: 56.30 m

Borehull: 1159

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	hbl.gn.m/skarn. Mørk mlk. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	50°	0.04	0.72	10.88			
0.40 - 6.50	6.10	Pegm. Med sprette biot.skikt, samt biot.flagor, <u>Sl.ved</u> 3.00-3.10 m.	60°						
6.50 - 10.00	3.50	grå gn.b.d. Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm.							
10.00 - 12.20	2.20	Pegm. Se ovan.							
12.20 - 14.40	3.30	biot.gn. Mørk grovk.Brecciert,imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	70° ca	0.15	0.14	1.70			12.20-13.30
		Pegmatitisk		0.25	0.34	4.14			13.30-14.40
14.40 - 19.70	5.30	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm	ca.70°						
19.70 - 35.70	16.00	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/hbl. førende grå gn.Sprette gr.1-3 mm även enstaka opp til dm tykke hbl.gn. band.	80°						
35.70 - 37.50	1.80	" " Lys mlk.tildels musk.rik Striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	80°	1.18	0.66	5.76			
37.50 - 42.40	4.90	" " Se ovan. Enstaka <u>Sl.striper.</u>	70-80°	0.29	0.39	0.55			37.50-41.50
				0.04	0.02	0.08			41.50-42.40
42.40 - 45.60	3.20	grå gn.m/skarn. Stripet <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	70-80°	0.83	0.58	3.62			
45.60 - 49.50	3.90	grå gn. Lys mlk,musk.rik,svak imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	80°	0.57	0.24	1.33			
49.50 - 51.60	2.10	Skarn.biot.rik Mørk mlk,växl m/grå gn. band,stripet <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> Foldet.	45-70°	1.61	0.15	8.16			49.50-50.50
				0.95	0.42	2.65			50.50-51.60
51.60 - 52.90	1.30	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm	80°	0.03	0.04	0.05			51.60-52.90
52.90 - 56.30	3.40	hbl.biot.gn. Mørk mlk,sprette gr.1-3mm Imp. <u>Py.</u>	80°						

Lokalitet: 44.890

Dato Aug.-84

Koordinater : X: 925.512,1 Y: 44.897,0

Retning : N

Helling/stigning: + 66°

Høyde : - 69.1

Lengde : 84.70 m

Borehull: 1158

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	biot.musk.gn. Rel.lys mlk, imp. <u>Py</u> .spor <u>Sl</u> .	45°						
1.10 - 20.90	19.80	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm, enstaka opp til dm tykke Pegm.band.	50-70°						
20.90 - 25.10		biot.hbl.gn. Mørk mlk, gr-førende, svak imp. <u>Py</u> .	70°						
25.10 - 25.90	0.80	biot.gn. Mørk grovk, gr-førende 1-3 mm, imp. <u>Py</u> .spor <u>Cp</u> .	60-70°						
25.90 - 27.10		biot.hbl.gn. Se ovan.	60°						
27.10 - 29.80	2.70	biot.gn. Mørk grovk, gr-førende. <u>Py</u> . Pegmatitisk Brecciert. <u>Foldet</u> .	60° 45°						
29.80 - 56.00	26.20	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grovmk, gr-førende 1-3 mm, litt växl m/ biot.hbl.gn, svak imp. <u>Py</u> . även partier m/hbl.gn.	70-80°						
56.00 - 61.50	5.50	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3 mm	70-80°						
61.50 - 83.90	22.40	Amf. Mørk fink.tät m/fink.biot. m/overganger til fink.hbl. førende grå gn, sprette gr. 1-2 mm.	ca.70 60						
83.90 - 84.70	0.80	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3 mm	60°						

14/9-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.890

Borehull: 1157

Dato : Aug.-84
 Koordinater : X: 925.512,1 Y: 44.897,0
 Retning : N
 Helling/stigning: + 40°
 Høyde : - 70.1
 Lengde : 91.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grov, imp. <u>Py.</u> spor <u>Sl.</u> slak fold.	0-30°						
1.10 - 6.50	5.40	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm enstaka dm tykke pegm. band.	35°						
6.50 - 28.20	21.70	grå gn.b.d. Rel.lys mlk, litt växl m/ smale biot.hbl.gn.band.	35-45°						
28.20 - 34.80	6.60	hbl.biot.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm, växl m/hbl.gn.band.	45-50° 60-65°						
34.80 - 37.60	2.80	biot.gn. (Pegmatitisk) Mørk grovk, gr-førende 2-4 mm, striper <u>Py.</u> spor <u>Cp.</u> Brecciart.	45-50°						
37.60 - 92.30	54.70	biot.hbl.gn. Mørk mlk växl m/hbl.biot.gn., sprette gr.1-3 mm. D-typ?enstaka overganger til grå gn. <u>Py.</u> ved 84.20-84.70.	50-60° 45°						

13/9-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.890

Borehull: 1156

Dato : Aug.-84
 Koordinater : X: 925.512,1 Y: 44.897,0
 Retning : N
 Helling/stigning: + 51°
 Høyde : - 69.7
 Lengde : 91.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.40	1.40	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grovmlk, imp. <u>Py.spor Sl.</u>	45°						
1.40 - 24.70	23.30	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3 mm enstaka opp til dm tykke pegm.band.	45-50°						
24.70 - 34.80	10.10	biot.hbl.gn. Mørk mlk-grov mlk, gr-før-ende 1-3 mm, litt växl m/hbl.biot.grå gn.band, sprette <u>Py.spor.</u> (D)band.	50°						
34.80 - 37.50	2.70	biot.gn. Mørk grovk.gr-førende 1-3 mm, imp. <u>Py.spor Cp.</u> brecciert tildels pegmatitisk.	50-60°						
37.80 - 65.60	27.80	biot.hbl.gn. Se ovan.	60°						
65.60 - 91.30	25.70	grå gn.b.d. Lys mlk, sprette gr.1-3mm, enstaka partier biot.gn. delvis svak imp. <u>Py.</u>	45-55°						

13/9-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.890

Borehull: 1155

Dato: Juli-84
 Koordinater : X: 925.512,4 Y: 44.897,3
 Retning : N
 Helling/stigning: + 25°
 Høyde : - 71.4
 Lengde : 13.10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	Musk.gn. Lys mlk-grov mlk.imp. Striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> Foldet.	0-20°	0,37	0,05	1,02			
0.60 - 5.00	4.40	Musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grov mlk, delvis oundulerad, slak fold i starten. 0-10-0°, imp.Py.Spor <u>Sl.</u>	20-30°	0,11	0,08	0,31			
5.00 - 13.10	8.00	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3 mm, enstaka pegm.band. 21/8-84 Stellan Burman	ca.30°						

Borehull: 1154

Dato **Jul-84**
Koordinater : X: 925.509,2 Y: 44.896,9
Retning : opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 69.4
Lengde : 11.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.70	1.70	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm.	80°						
1.70 - 2.30	0.60	biot.hbl.gn. Mørk mlk.	80°						
2.30 - 11.30	9.00	grå gn. Lys mlk,sprette gr,ens-taka opp til 5 cm tykke hbl.gn.band.	80-90°						
		17/8-84							
		Stellan Burman							

Lokalitet: 44.890

Borehull: 1153

Dato : Juli-84
 Koordnater : X: 925.512,1 Y: 44.896,3
 Retning : N
 Helling/stigning: 0° horisontalt
 Høyde : - 72,5
 Lengde : 11.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grov,slake folder imp.Py.Spor Sl.	5-10°	0.28	0.10	0.62			
1.60 - 3.30	1.70	" " " " " " rik imp. Sl.Cp.Gn.Py.	5-10°	1.84	0.73	5.60			
3.30 - 4.30	1.00	grå gn. Rel.lys mlk.	10°	0.07	0.06	0.19			
4.30 - 5.10	0.80	biot.gn. Mørk mlk, imp. Sl.		2.02	0.17	5.06			
5.10 - 11.30	6.20	grå gn. Rel.lys mlk,sprett gr. 1-3 mm.	10-15°						
17/8-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.890

Borehull: 1152

Dato : Juli-84
 Koordinater : X: 925.511,7 Y: 44.896,5
 Retning : N
 Helling/stigning: - 45°
 Høyde : - 73,6
 Lengde : 13.80 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.80	1.80	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	45°						
1.80 - 8.00	7.20	grå gn. Lys mlk,sprett gr.1-3 mm enstaka pegm.band.	40-45°						
8.00 - 10.50	1.50	biot.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.gn. grå gn.band,spor <u>Sl.</u> ved 8.05-8.15 m,sprette gr. 1-3 mm.	40-45°						
10.50 - 13.80	3.30	grå gn. Lys mlk,enkelte smale biot.gn.band.	40°						
20/8-84									
Stellan Burman									

Borehull: 1151

Dato : Juli-84
Koordinater : X: 925.507,4 Y: 44.896,0
Retning : S
Helling/stigning: + 45°
Høyde : - 70,4
Lengde : 13,00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.sprette gr,svak imp. <u>Py.</u>	45°						
2.00 - 2.50	0.50	hbl.biot.gn. Mørk mlk,sprette gr., svak imp. <u>Py.</u>	45°						
2.50 - 7.40	4.90	biot.hbl.gn. Mørk mlk,svak imp. <u>Py.</u> ved 6.00-6.60 slak fold.	45° 0° 40°						
7.40 - 13.00	5.60	hbl.gn. Mørk mlk,gr-førende 1-3 mm,litt växl m/hbl.biot. gn. Svak imp. <u>Py.</u>	40-45°						
		20/8-84 Stellan Burman							

Lokalitet: 44.890

Borehull: 1150

Dato: Juli-84
 Koordinater : X: 925.506,7 Y: 44.896,1
 Retning : S
 Helling/stigning: 0° horisontalt
 Høyde : - 72,6
 Lengde : 7.70 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.60	6.60	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grovk, litt variert m/grå gn. og pegn band, svak imp. <u>Py</u> .	0-10 ⁰						
6.60 - 7.70	1.10	hbl.biot.gn. Mørk mlk, sprette gr.1-3 mm, svak imp. <u>Py</u> .	10-15 ⁰						
20/8-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.890

Borehull: 1149

Dato: Juli-84
 Koordinater: X: 925.507,1 Y: 44.896,1
 Retning: S
 Helling/stigning: - 25°
 Høyde: - 73,1
 Lengde: 14.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.70	6.70	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grovk, oundu- lerad, slake folder, imp. Py.Sl.Cp.Gn.	0-5°	0.70	0.19	1.62			0.00 - 3.50
			10-30°						
			40-0°	0.59	0.11	2.06			3.50 - 6.70
6.70 - 8.00	1.30	hbl.gn. Mørk mlk, gr-førende 1-4mm	0-5°						
8.00 - 13.60	5.60	biot.hbl.gn. Mørk mlk, imp.Py. (D.typ)	5°						
13.60 - 14.30	0.70	hbl.gn. Mørk mlk, gr-førende 1-4mm	5-15°						
20/8-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.890

Borehull: 1148

Dato: Juli-84
 Koordinater: X: 925.509,1 Y: 44.896,3
 Retning: Ned
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde: - 74,1
 Lengde: 11.30

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	biot.gn. Mørk mlk, enkelte striper Sl.Cp.Gn.Py.	70-90°	0,25	0,18	1,90			0,00-1,25
				0,35	0,21	0,82			1,25-2,50
2.50 - 4.00	1.50	" " Rel.mørk mlk, enkelte grå gn.band, imp.Sl.Cp.Gn.Py.	70-80°	0,22	0,07	0,47			
4.00 - 11.30	7.30	grå gn. Rel.lys mlk, enstaka biot. band. Spor Sl.ved 7.30-7.40 " " " 8.40	70-80°						

20/8-84

Stellan Burman

Lokalitet: Mofjellet Gruber 41.590 Y

Dato: Juli 1984

Koordinater: ca. x: 975.339 y: 41.588

(ikke innmalt)

Retning: Syd

Helling/stigning: - 15°

Høyde: - 13,0

Lengde: 26.20

Borehull: 1147

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	grå gn. Sv.impr.	20	0,77	0,24	2,10			0,00-4,50
0.50 - 11.00	10.50	malmstr. og impr. i biot.musk.gn. Grå gn.-aktig. Fra 2.0 - 3.0 m: Fra 3.0 - 3.5 m: Fra 3.5 - 7.0 m: rundt 0	15-20 25 15 0 (0-10)	1,43	0,24	3,39			4,50-9,00
11.00 - 16.10	5.10	Fra 7.0 m økende S Fra 7.5 - 8.0 m Fra 8.5 - 9.5 m Fra 9.5 -11.0 m ditto, men biot.rikere og grovere, delvis noe pegmatittisk. I starten: Fra 11.5 - 12.0 m: Fra 12.0 - 14.0 m: Fra 14.0 m avtagende S. Fra 15.0 m: svake åpne folder.	20 0-15 25 0 25 40 0 (0-25)	0,03	0,20	0,95			13,50-16,10
16.10 - 16.45	0.35	rik malm Noe skarn.	20	0,88	0,21	9,40			
16.45 - 18.10	1.65	malmstr. og impr. i noe pegmatittisk biot. gn.Svake åpne folder.rundt 0 Avtagende malmimpr.	0 (0-30)	0,03	0,14	0,26			
18.10 - 18.60	0.50	hbl.gn. Noe biot.Svake åpne fol- der rundt 0	0	0,03	0,07	0,07			18,10-21,00
18.60 - 19.00	0.40	biot.gn. Py.impr.	ca.0						
19.00 - 22.10	3.10	biot.gn. Lysere, mere fink.og grå gn-aktig.Spor Py.Mot slut- ten mere musk og2	0 10						

Lokalitet:

Borehull: 1147

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
22.10 - 23.20	1.10	biot.gn. Mørkere, Py-impr.	10						
23.20 - 24.90	1.70	grå gn. Noe gr. Rundt	0 (0-10)						
24.90 - 26.20	1.30	biot.gn. En del musk. Litt gr. Py.impr.	15 (10-25)						
11.07.84									
A. Kruse									

Lokalitet: Mofjellet Gruber 41.590 Y

Dato: Juli 1984

Koordinater: X: 925.339 Y: 41.588 (ikke innmålt)

Retning: Syd

Helling/stigning: - 25°

Høyde: - 13.0

Lengde: 30.00 m.

Borehull: 1146

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.00	7.00	Malmstriper	40-0	1.56	0.22	3.62			0.00-3.00
		Avvekslende med biotittførende musk.gn. Lyse Sl, + Py + ga. Fra 2.0 - 3.0 m: og mørke Sl. Også spisse folder: fra 3.0-3.50 så spiss fold, og fra 3.50-4.0: Fra 4.0 - 5.0: Fra 5.0 : og lyse Sl Fra 6.0 - 7.0 m:	15-20 30-40 10	1.36	0.19	3.88			3.00-6.00
7.0 - 11.35	4.35	malmstriper	20-25 20-30 20	0.60	0.21	2.59			6.00-9.00
		Py+mørke Sl. i striper, biot. rik, grovk. biot. gn. Avvekslende med grå gn.-striper. Fra 8.0 - 10.0 m:	30-40	0.09	0.27	2.76			9.00-12.00
11.35 - 11.50	0.15	Kvarts.	40-45						
11.50 - 14.00	2.50	Stripet malm som før, men dårligere. Fra 12.30 - 14.00 åpne folder:	40 v 0-40	0.01	0.08	0.38			12.00-14.00
14.00 - 14.80	0.80	Ditto, men bedre. Søkende fra: til	10 30	0.01	0.08	2.14			
14.80 - 15.50	0.70	grå gn. Litt gr.	30-40						
15.50 - 17.10	1.60	malmstr.+imp.r. Avvekslende med grå gn. Åpne folder.	0-30	0.02	0.20	2.75			
17.10 - 17.80	0.70	sv.malmimpr. i biot.gn. Overherskende Py+Po	20						
17.80 - 19.70	1.90	grå gn.	25	0.01	0.05	0.14			
19.70 - 20.50	0.80	sv.malmimpr. i noe pegm. biot.gn.	25	0.01	0.22	0.20			
		2							

Lokalitet:

Borehull: 1146

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
20.50 - 23.10	2.60	grå gn. Noe gr.	40						
23.10 - 24.80	1.70	malmimpr. og str. i grovk.biot.gn, delvis litt pegmatittisk.	35 30-40	0.01	0.22	1.48			
24.80 - 30.00	5.20	grå gn. Spredt litt gr. Fra 29.10-30.0 litt fold- et.	40 0-30						
9.7.1984									
A. Kruse									

Lokalitet: Jernverkstunnel ca. 41.700

Dato

Koordinater : ca. X: 925.264^{261,5} Y: 41.700^{698,5}

Retning : S

Helling/stigning: - 50°

Høyde : ca. + ~~29.0~~ 29,9

Lengde : 103.30 m

Borehull: 1145

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	grå gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3mm.	70°					
0.70 - 3.00	2.30	hbl.biot.gn.	Mørk mlk.Fr.2.40-2.80 <u>Py.</u> <u>Po.</u>	70° 60° 80°					
3.00 - 36.90	33.90	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk,växl m/biot. gn.band,foldet,sprett gr. 1-2 mm.Biot.gn.banden stedvis hbl.førende.	60-70°					
36.90 - 39.60	2.70	hbl.biot.gn.	Mørk mlk.foldet (bandad)	60° 50°					
39.60 - 44.50	4.90	biot.gn.	Mørk mlk,enstaka hbl.gn. band.	60-70°					
44.50 - 44.90	0.40	Pegm.							
44.90 - 50.60	5.70	hbl.biot.gn.	Mørk mlk.Foldet (bandad).						
50.60 - 51.70	1.10	grå gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3mm.	70°					
51.70 - 78.30	26.60	hbl.gn.	Mørk mlk-grov mlk.gr.før ende,sprette cm tykke hbl.biot.band,spor <u>Sl.</u>	60-70°					
78.30 - 79.10	0.80	biot.gn. (Pegmatitisk)	Mørk grovk,brecciært. <u>Py.</u> <u>Po.spor Sl.</u>	70-90°					
79.10 - 83.80	4.70	grå gn.	Rel.lys mlk.enstaka gr. 1-3 mm.	80°					
83.80 - 86.80	3.00	Amf. (Bandad)	Mørk mlk-fin,bandad m/grå gn.biot.rik band.	80°					
86.80 - 96.80	10.00	grå gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3mm.	80° 70°					
.....2									

Lokalitet:

Borehull: 1145

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
96.80 - 98.40	1.60	hbl.biot.gn. Mørk mlk.gr.førende.	70° 60°						
98.40 - 99.30	0.90	biot.musk.gn. Rel.mørk,mlk-grov.Brecciert foldet,imp. <u>Py.Cp.Gn.</u> <u>Sl.</u>	70°						
99.30 - 102.70	3.40	grå gn. Lys mlk,enkelte biot.gn. band.	60-70°						
102.70 - 103.30	0.50	hbl.gn. Mørk mlk.	50°						
11/9-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 41.700

Borehull: 1144

Dato

Koordinater : X: 925.261,5 Y: 41.698,3

Retning : S

Helling/stigning: - 58

Høyde : + 28,9

Lengde : 98,30

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	grå gn. Rel.mørk mlk,sprette gr. 1-2 mm.	70°						
0.60 - 2.60	2.00	hbl.gn. Mørk mlk,växl m/hbl.biot. band.	60-70°						
2.60 - 4.40	1.80	grå gn. Rel.lys mlk,växl m/biot, biot.hbl.gn.band,svak imp. Py.	60-70°						
4.40 - 7.00	2.60	overgangsbergart Lys grønn hbl.pegmatitisk skarn?Py.Po.som sprickfylling.							
7.00 - 10.30	3.30	biot.gn. Rel.mørk mlk,växlande m/hbl.gn.band.	45-60°						
10.30 - 24.50	14.20	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band,sprette gr.1-3mm. Foldet fra 16.40-16.80.							
24.50 - 34.30	19.80	biot.gn. Mørk mlk.växl m/biot.hbl, hbl.biot.gn.band.Foldet.							
34.30 - 39.30	4.50	overgangsbergart Se foreg. Rel.lys mlk.växl m/grå gn Svak imp.Py.	ca.45°						
39.30 - 52.30	13.00	hbl.gn. Mørk mlk,växl m/hbl.biot. gh.m/svak imp.Py.	50-60°						
52.30 - 55.00	2.70	Amf. Mørk mlk,spor Py.	50-45°						
55.00 - 56.60	1.60	hbl.gn. Se ovan.							
56.60 - 60.80	4.20	Amf. Se ovan.	45° 20°						
60.80 - 71.20	10.40	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grovmlk.växl m/hbl.gn.band,gr.1-3 mm.	45° 15						

Lokalitet:

Borehull: 1144

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
71.20 - 72.20	1.00	hbl.biot. bergart	Mørk grovk.m/ofitisk text.						
72.20 - 72.70	0.50	biot.gn.	Mørk mlk,skiktat <u>Py.Po.</u> spor <u>Sl.</u>	45°					
72.70 - 77.40	4.70	grå gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3 mm	50° 70-80°					
77.40 - 82.20	4.80	hbl.biot.gn.	Mørk mlk,gr.1-3 mm.	80° 60°					
82.20 - 85.70	3.50	grå gn.	Rel.lys mlk.växl m/biot. rikere partier.imp. <u>Py.</u>	60-70°					
85.70 - 87.70	2.00	biot.hbl.gn.	Mørk mlk,gr.1-3mm,	60-70°					
87.70 - 89.70	2.00	biot.musk.gn.	Rel.lys mlk-grov mlk.m/filtet preg,växl musk. biot.imp. <u>Py.</u> spor <u>Sl.ved</u> 87.10. 88.30.						
89.70 - 98.30		biot.hbl.gn.	Mørk mlk-grovmlk,imp. <u>Py.</u> växl m/enstaka hbl.gn. band.	60°					

9/8-84

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.900

Borehull: 1143

Dato : Juni-84
 Koordinater : X: 925.508,3 Y: 44.895,7
 Retning : S
 Helling/stigning: - 48°
 Høyde : - 74,0
 Lengde : 53,00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	biot.gn. Mørk mlk, foldet, imp. <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u>	0-45°	3,00	0,28	6,32			
0.90 - 4.00	3.10	" " Mørk mlk, foldet, spor hbl Svak imp.Py. Spor <u>Sl.</u>	0-45°	0,27	0,22	0,35			0,90-1,90
4.00 - 7.20	3.20	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grov mlk, imp. <u>Sl.</u> Cp.Gn.Py.	20-40°	0,44	0,25	2,32			4,00-6,00
				0,48	0,12	1,16			6,00-7,20
7.20 - 34.40	27.20	grå gn. Lys mlk, delvis musk.rik. enstaka dm tykke biot. gn.band. Spor <u>Sl.</u> ved 8.20- 8.25 " " " 11.80-12.00 " " " 14.80-14.90 " " " 15.90-15.95 " " " 17.60-17.80	40-50° 50-60°						
34.40 - 35.50	1.10	biot.gn. Mørk mlk, imp. <u>Sl.</u> Cp.Gn.Py.	45°	1,11	0,19	2,21			
35.50 - 43.70	8.20	grå gn. Lys mlk, sprett gr.1-3 mm	45-50°						
43.70 - 44.20	0.50	Pegm.							
44.20 - 45.90	1.70	biot.gn. Mørk mlk, litt växl m/grå gn.band.imp. <u>Sl.</u> Cp.Gn.Py. Foldet.	0-50°	0,39	0,27	1,23			
45.90 - 53.00	7.10	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm	50°						
8/8-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.890

Dato

Juni-84

Koordinater : X: 925.507,2 Y: 44.895,4

Retning : S

Helling/stigning: - 44°

Høyde : - 73,9

Lengde : 59,00 m

Borehull: 1142

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.80	2.80	biot.gn. Mørk grovk.foldet striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	0-	1.15	0.55	4.70			
2.80 - 3.70	0.90	" " Mørk mlk,enstaka klyssor <u>Sl. Foldet.</u>	20-45°	0.44	0.28	2.18			
3.70 - 7.50	3.80	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk,imp. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	30-45°	0.44	0.13	0.67			
7.50 - 20.50	13.00	grå gn. Lys mlk,enkelte biot.rike partier. Fr.14.70-16.00 imp.spor Sl.Spor Sl.ved 18.95.	35°						
20.50 - 23.50	3.00	biot.gn. Mørk mlk,imp. <u>Py.Spor Sl.</u> Foldet.	0-45°						
23.50 - 45.00	21.50	grå gn. Lys mlk,enkelte partier biot.gn.sprette gr.1-3mm	35-40°						
45.00 - 46.60	1.60	grå gn.skarn. Rel.lys mlk,rik imp. <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u>	40°	1.94	0.37	4.74			
46.60 - 53.00	6.40	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm	45°						
53.00 - 54.40	1.40	Pegm.							
54.40 - 59.00		grå gn. Se ovan.	45°						

8/8-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.890

Borehull: 1141

Dato : Juni-84
 Koordinater : X: 925.507,2 Y: 44.895,4
 Retning : S
 Helling/stigning: - 39°
 Høyde : - 73,9
 Lengde : 67.70 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.00	4.00	biot.gn. Mørk mlk-grov, småfoldet, imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	0-45°	0,82	0,27	2,99			
4.00 - 8.00	4.00	" " Mørk mlk, hbl.band, svak imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	30° 35°	0,21	0,11	0,55			
8.00 - 61.20	53.20	grå gn. Lys mlk, litt växl m/biot. rike partier, enstaka svake spor <u>Sl.</u> Fra 8.00-15.00 m <u>Po.</u> ved 27.50 m <u>Sl.</u> ved 49.45 m	30-35° 35-40° 45°						
61.20 - 67.70	6.50	biot.hbl.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.biot. gn.m/gr. 1-3 mm, svak imp. <u>Py.</u>	45-50°						

8/8-84

Stellan Burman

Borehull: 1140

Dato: Juni-84
Koordinater : X: 925.339,4 Y: 41.587,2
Retning : S
Helling/stigning: + 60°
Høyde : + 15,2
Lengde : 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.20	5.20	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm.	50°						
5.20 - 5.80	0.60	biot. gn. Mørk mlk-grovk. spor hbl. imp. <u>S1.Cp.Gn.Py.</u>	60°	0.06	0.73	4.26			
5.80 - 8.30	2.50	grå gn. Rel lys mlk. <u>S1.</u> ved 6.80-6.90 " " 8.10-8.20 1/7-84 Stellan Burman	60°						

Lokalitet: 41.590

Dato

Juni

Koordinater : X: 925.339,0 Y: 41.588,2

Retning : S

Helling/stigning: - 45°

Høyde : + 11,6

Lengde : 20,00

Borehull: 1139

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.20	2.20	grå gn. Lys mlk, musk. rik, Fr. 1-30-2.20 enkelte smale striper <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	35°	1,12	0,12	3,50			1,30-2,20
2.20 - 3.30	1.10	grå gn.m/skarn. <u>Malm</u>	30°	2,98	0,78	9,44			
3.30 - 5.60	2.30	biot.gn. (Pegmatitisk) Mørk grovk. Foldet, brecciert. Stripet <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u>		0,03	0,22	2,42			3,30-4,40
				0,44	0,22	4,62			4,40-5,60
5.60 - 8.50	2.90	grå gn. Rel. lys mlk. bandad m/biot. gn.m/ <u>Py.Po.</u> striper, spor <u>Sl.</u>	35-40°	0,03	0,13	0,09			5,60-6,60
8.50 - 10.10	1.60	" "	45°						
10.10 - 20.00	9.90	biot.gn. Rel. mørk mlk, vaxl m/pegm grå gn.band, mot slutten även opp til 5 cm tykke hbl.gn.band. <u>Py.Po.</u> i biot gn. <u>Sl.</u> ved 11.40 m.	45-70°						

25/6-84

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 41.590

Borehull: 1138

Dato : Juni-84
 Koordinater : X: 925.343,6 Y: 41.588,2
 Retning : N
 Helling/stigning: + 40°
 Høyde : + 14,7
 Lengde : 20,40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.90	6.90	grå gn. Rel.lys mlk, bandad m/smalle biot.gn.band, enstaka gr.1-3 mm. Sl. ved 2.60-2.65 " " 3.85 " " 5.50-5.52	45-50°						
6.90 - 7.50	0.60	biot.gn.skarn. Rik malm.		2,55	2,89	10,80			
7.50 - 16.80	9.30	biot.gn. Rel.mørk mlk, växl m/grå gn.band, enstaka cm tykke Py.Po.striper og Sl.	45-50°						
16.80 - 20.40	3.60	grå gn. Lys mlk, enstaka gr.1-3mm Spor Py.	35-45°						

7/8-84

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 41.590

Borehull: 1137

Dato : Juni-84
Koordinater : X: 925.344,0 Y: 41.588,0
Retning : N
Helling/stigning: + 23°
Høyde : + 140
Lengde : 23.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	biot.gn.	Rel.mørk mlk.	80°					
0.20 - 1.70	1.50	hbl.gn.	Mørk mlk,svak imp. <u>Py.</u>	35-40°					
1.70 - 6.30	4.60	biot.gn.	Rel.lys mlk,växl m/grå gn.slirig foldet,enstaka klysor <u>Py.Sl.Cp.</u>	0-30°	0.06	0.06	0.47		5.30-6.30
6.30 - 9.10	2.80	" "	Mørk växl m/hbl.band.Pegm striper <u>Py.Cp.Sl.Gn.</u> Foldet.	0-40°	0.26	0.80	7.00		
9.10 - 10.60	1.50	grå gn.	Lys mlk,slake folder.	0-20°					
10.60 - 14.50	3.90	biot.gn. (Pegmatitisk)	Rel.mørk,växl m/hbl.grå gn.band,enstaka <u>Sl.band</u> Foldet.	35° 0-30° 30-50°					
14.50 - 14.90	0.40	" " med skarn	Rel.mørk grovk.Stripet imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u>		0.52	1.28	7.10		
14.90 - 15.50	0.60	grå gn.	Lys mlk,spor <u>Sl.</u>	25°	0.23	0.15	0.89		
15.50 - 16.40	0.90	Skarn biot.	Mørk grovk.Stripet imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>		0.70	1.06	7.24		
16.40 - 19.30	2.90	biot.gn. (Pegmatitisk)	Rel.mørk mlk-grov.växl m/grå gn.band,foldet,slirig klysar striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u>	0-40°	0.01	0.22	0.89		
19.30 - 23.30		grå gn.	Rel.lys mlk.växl m/biot.hbl.gn.band,spret gr. 1-3 mm.	10-40°					
6/8-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 41.590

Dato

Juni-84

Koordinater

: X: 925.344,0 Y: 41.588,0

Retning

: N

Helling/stigning:

+ 12°

Høyde

: + 13,3

Lengde

: 23.20

Borehull: 1136

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	grå gn. Rel.lys mlk.Slake folder.	0-10°						
1.00 - 4.80	3.80	biot.gn. Rel.mørk mlk-grovk.Delvis pegmatitisk.Foldet lett växl m/grå gn.band,Stripet Sl.Cp.Gn.Py.	0-15°	0,45	0,44	7,32			1,00-2,30
				0,42	0,21	4,15			2,30-3,60
				0,20	0,19	2,26			3,60-4,80
4.80 - 6.00	1.20	grå gn. Rel.lys mlk,slak fold.	0-5°						
6.00 - 8.20	2.20	biot.gn. Mørk mlk-grovk.Slake folder,enkelte striper m/Sl.Cp.Gn.Py.	0-15°	0,17	0,19	3,44			6,00-7,10
				0,05	0,16	1,21			7,10-8,20
8.20 - 9.30	1.10	grå gn. Rel.lys mlk.Slak fold.	0-5°	0,05	0,16	1,05			8,20-10,20
9.30 - 11.20	2.00	biot.gn. Mørk mlk-grovk,Pegmatitisk Stripet Sl.Cp.Gn.Py.	0-20°	0,13	0,20	4,79			10,20-11,20
11.20 - 12.05	0.85	Pegm.							
12.05 - 12.65	0.60	Biot.gn. Imp.Py.Sl.		0,02	0,25	0,76			
12.65 - 13.20	0.55	Pegm.							
13.20 - 14.80	1.60	biot.gn. Mørk mlk,imp.Sl.Cp.Gn.Py.	45°	0,14	0,45	0,92			
14.80 - 15.50	0.70	Omvandlings bergart Mørk gryng,porig m/små druserum.biot.hbl.(skaring) Cp.Py.Sl.?		0,02	0,98	1,22			
15.50 - 23.20	7.70	biot.gn. Rel.mørk mlk-grov-mlk.Foldet,brecciert delvis pegmatitisk,samt litt växl m/grå gn.band,stedvis sprutte gr.1-3 mm,Py.Po.som Sprickfylningar.	0-45°	0,01	0,40	0,40			15,50-16,50

27/6-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.590

Dato Juni-84

Koordinater : X: 925.344,2 Y: 41.588,3

Retning : N

Helling/stigning: - 23°

Høyde : + 11,8

Lengde : 29,30 m

Borehull: 1135

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	grå gn.	Lys mlk.	30°					
0.20 - 2.20	2.00	biot.gn.	Mørk mlk.växl m/grå gn. band.Sprette striper m/ Sl.Cp.Gn.Py.Foldet.	35-40°	1,59	0,19	4,70		0,20 - 1,20
					0,03	0,12	3,18		1,20 - 2,20
2.20 - 4.60	2.40	grå gn.	Rel.lys mlk,litt växl m/ biot.rikere band.	30-40°					
4.60 - 6.40	1.80	musk.biot.gn.	Rel.lys mlk-grovk.Imp.Py. Sl.ved 4.80-5.00.	25-35°					
6.40 - 9.20	2.80	biot.gn.	Rel.mørk mlk.växl m/biot. musk,grå gn.band,delvis imp.Py. Spor Sl.ved 6.50-6.80 " " " 8.40	25-45°					
9.20 - 29.30	20.10	grå gn.	Lys mlk,enkelte biot.gn. partier,sprette gr.1-3mm	35-45°					

1/7-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.590

Borehull: 1134

Dato : Juni-84
 Koordinater : X: 925.340,9 Y: 41.587,8
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : + 11,4
 Lengde : 16.60 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	grå gn. Rel.lys mlk,enstaka biot. hbl.band.Rike <u>malm</u> stri- per.	80°	2,42	0,35	8,08			
1.10 - 1.70	0.60	biot.gn. Mørk mlk,bandad m/grå gn. band. <u>imp</u> <u>sl</u>	80-90°	0,95	0,21	3,66			
1.70 - 2.20	0.50	" " Mørk mlk,rike <u>malm</u> stri- per.	80-90°	2,28	0,90	7,08			
2.20 - 8.70	6.50	" " Mørk mlk,spor hbl.delvis imp. <u>Py.Po</u> ved 6.75,7.70. Foldet.	60-80°						
8.70 - 16.60	7.90	grå gn. Rel.lys mlk,växl m/biot. hbl.gn.band,gr-førende 1-4 mm.Småfoldet.	60-80°						

1/7-84

Stellan Burman

Lokalitet: Jernverkstunnel

Dato : Juni - 84

Koordinater : X: 925, 292 Y: 41 660 *ikke innrisset*

Retning : S 289,5 657,8

Helling/stigning: -53°

Høyde ca: +28,0 + 29,0 m o h.

Borehull: 1133

Lengde : 101,20 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.10	2.10	grå gn. Lys mlk, växl m/biot.gn. band, enkelte små folder. I starten imp.Py.	70-80°						
2.10 - 7.10	5.00	biot.hbl.gn. Mørk mlk, växl m/hbl.gn. partier m/gr.1-3 mm, svak imp.Py. litt foldet.	60-70°						
7.10 - 8.40	1.30	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm.	50-60°						
8.40 - 20.10	11.70	biot.hbl.gn. Mørk mlk, växl m/hbl.gn. band m/gr.1-3 mm, svak imp. Py. Foldet fr. 8.40-19.20.	ca. 45° 50°						
20.10 - 24.90	4.80	hbl.gn. Mørk mlk, sprette gr.1-3mm, litt växl m/biot.gn. band, delvis små foldet.	45-60°						
24.90 - 39.40	14.50	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov mlk, växl. mellan hbl.biot-biot.hbl. gn. som sprette hbl.gn. band gr. føretrådesvis i hbl.gn. 1-3 mm, som enstaka store gr. 10-30 mm, delvis små- foldet.	50-60°						
39.40 - 54.20	15.80	hbl.gn. Mørk mlk, delvis amfiboli- tisk, sprette gr.1-3 mm, samt enstaka biot.hbl.gn. band m/svak imp.Py.	50° 60°						
54.20 - 68.65	14.45	biot.hbl.gn. Mørk mlk-grov mlk, sprette opp til dm tykke hbl.gn. band, sprett gr.1-3 mm, svak imp.Py. føretrådesvis i biot. rikere deler.	ca. 45°						
		2		0,01	0,05	0,08			67,65-68,65

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1133

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
68.65 - 69.80	1.15	grå gn. Lys mlk, musk. rik, imp. <u>Sl.</u> <u>Cp. Gn. Py.</u>	50-60°	0,77	0,23	2,03			
69.80 - 71.25	1,45	" " Lys mlk.	45°	0,01	0,01	0,01			69,80-70,80
71.25 - 71.65	0.40	" " Rel. lys mlk, biot. rik, svak imp. <u>Sl. Cp. Gn. Py.</u>	45°	0,62	0,12	1,56			
71.65 - 72.30	0.65	" " Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm.	45°						
72.30 - 72.80	0.50	hbl. biot. gn. Mørk mlk, sprette gr. 1-4 mm.	45°						
72.80 - 83.30	10.50	grå gn. Lys mlk, kv. rik, enkelte opp til cm tykke biot. gn. skikt sprett gr. -1-3 mm.	50-60°						
83.30 - 87.70	4.40	musk. gn. Lys mlk, litt variert m/ musk. biot. gn. Fr. 84.15- 85.40 smale <u>Sl. Cp. band</u> m/ imp. <u>Py.</u> i øvrigt imp. <u>Py.</u> spor <u>Sl.</u> litt foldet.	ca. 45°	0,05	0,06	0,14			83,30-84,15
				0,30	0,50	2,42			84,15-85,40
				0,18	0,06	0,19			85,40-86,40
				0,04	0,08	0,17			86,40-87,70
87.70 - 101.20	13-50	hbl. biot. gn. Mørk mlk växl m/biot. hbl. gn. samt sprette hbl. gn. band, delvis svak imp. <u>Py.</u>	55-60°						

15/6-84

Stellan Burman

Lokalitet: Jernverkstunnel $\alpha: 4/660$

Dato : Juni -84

Koordinater : X: 925.292 Y: 41.660

ikke innmålt

Retning : S

Helling/stigning: -65°

Høyde : $\alpha + 22,0 + 29,1 \text{ m o.h.}$

Lengde : 89,30 m

Borehull: 1132

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	grå gn.	Rel.lys mlk.biot.rik,imp. Py.fr.starten.	70-80°					
1.50 - 8.40	6.90	hbl.biot.gn.	Mørk mlk,växl m/biot.hbl. gn.,gr.førende 1-3 mm foldet,svak imp. Py.	70-80°					
8.40 - 16.00	7.60	biot.hbl.gn.	Mørk mlk.gr.førende 1-3mm	60-70°					
16.00 - 16.90	0.90	grå gn.	Lys mlk-fin kv.rik.	60°					
16.90 - 17.10	0.20	biot.hbl.gn.	Se ovan.	50-60°					
17.10 - 18.70	1.60	grå gn.	Se ovan.Foldet fr.18.10- 18.70.	60°					
18.70 - 19.10	0.40	biot.hbl.gn.	Se ovan. Foldet.						
19.10 - 20.00	0.90	grå gn.	Se ovan.	50°					
20.00 - 31.00	11.00	biot.hbl.gn.	Mørk mlk.litt växl m/hbl. biot.gn.,gr.førende 1-3 mm variert m/Py.	50-70°					
31.00 - 31.60	0.60	grå gn.	Lys mlk-fin,musk.rik,spor Py.	60°					
31.60 - 32.80	1.20	hbl.gn.	Mørk mlk,foldet gr-førende 1-4 mm.	60°					
32.80 - 33.70	0.90	grå gn.	Se ovan.	70°					
33.70 - 34.90	1.20	biot.gn.	Mørk mlk,sprette gr. svak imp.Py.	60-70°					
34.90 - 40.50	5.60	hbl.gn.	Mørk mlk,gr.førende.	70-80°					
40.50 - 56.60	16.10	hbl.biot.gn.	Mørk mlk-grov,imp.Py.gr. førende 1-3 mm.	80 70 60					
.....2									

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1132

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
56.60 - 62.00	5.40	biot.gn. Mørk mlk-grovk.skiffrig spor hbl.skikt imp. <u>Py.</u> spor <u>Cu.Po.</u>	45-50°						
62.00 - 66.20	4.20	" " (Pegmatitisk) Mørk mlk-grov.växl m/Pegm grå gn.band,foldet,imp. <u>Py.spor Po.Cu.</u> (<u>Sl.spor</u> ved 62.20)	30-45°						
66.20 - 70.60	4.40	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm.	35-45°						
70.60 - 72.00	1.40	Pegm.							
72.00 - 72.50	0.50	grå gn. grå gn.	45°						
72.50 - 72.90	0.40	Pegm.							
72.90 - 82.00	9.10	biot.hbl.gn. Mørk mlk,gr.førende,imp. <u>Py.</u>	60° 70-80°						
82.00 - 89.30	7.30	hbl.biot.gn. Mørk mlk,gr-førende 1-3mm mot slutten växl m/hbl.gn, amf.band.	70-90°						

15/6-84

Stellan Burman

Lokalitet: Y: 41.660 ca. (Jernverkstunnel.)

Dato : Juni -84

Koordinater X: 975.242 Y: 41.660 ikke innmålt

Retning : S 289,9 657,6

Helling/stigning: - 80°

Høyde ca: +12.6 28,9

Lengde : 26,20 m

Borehull: 1131

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.30	5.30	Biot.gn. Rel.mørk mlk,växl m/grå gn.band,svak imp. <u>Py</u> . Foldet.	30-45°						
5.30 - 10.60	5.30	hbl.biot.gn. Mørk mlk,enkelte biot.band gr.førende 1-3 mm,Foldet.	45°						
10.60 - 11.90	1.30	grå gn. Lys,fink,musk.rik.	50°						
11.90 - 19.60	7.70	biot.gn. Mørk mlk,Foldet,enkelte pegm.og grå gn.band.	0-50°						
19.60 - 21.00	1.40	hbl.gn. (Amfibolitisk)	45-50°						
21.00 - 52.90	31.90	biot.hbl.gn. Mørk mlk-grovmlk,växl m/ hbl.biot.gn,hbl.gn.Imp. <u>Py</u> . delvis rik i de biot.rikere partiene.Fr.21.00-22.70 Foldet 0-30°,gr.førende 1-3 mm.	70-80°						
52.90 - 54.20	1.30	biot.sk. Mørk(grønaktig),spor <u>Py</u> . Sl.Fr.54.05-54.10.	80°						
54.20 - 61.40	7.20	biot.gn. (Pegmatitisk) Mørk grovk,växl,delvis brecciert m/grå gn.Delvis imp. <u>Py</u> .Fr.60.00-60.40 rike striper <u>Po.Py</u> .	60-80°						
61.40 - 76.40	15.00	grå gn. Rel.lys mlk,delvis musk.rik enkelte opp til dm tykke biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm,imp. <u>Py</u> .føretradesvis i de biot.rikere partier. Enkelte spisse folder.	70-80°						

.....2

Lokalitet:

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1131

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
76.40 - 77.60	1.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk, växl m/grå gn. band, imp. <u>Py.</u>	70-80°						
77.60 - 86.20	8.60	hbl.biot.gn. Mørk mlk, gr. førende 1-4 mm, svak imp. <u>Py.</u> Fr. 78.10-78.15 <u>Sl. Gn. Cp.</u> Fr. 79.30-79.65 " " "	70°						
25.6.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 43.970

Dato Juni-84

Koordinater : X: 925.489,9 Y: 43.973

Retning : N

Helling/stigning: 34°

Høyde : - 18,3

Lengde : 98,40 m.

Borehull: 1130

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	2.30	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grov.växl fra musk.biot-biot.M.gn.Svak imp.Py.spor Sl.Fr.0.00-0.40. 1.05-1.30.	35-40° 10-15°						
2.30 - 4.00	1.70	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm	15°						
4.00 - 12.90	8.90	biot.gn. Mørk mlk-grov mlk,varierte m/overganger til musk.biot.gn.Ondulerad,svak imp.Py.sprette spor gr .	10° 0-15°						
12.90 - 25.80	12.90	grå gn. Lys mlk,enkelte biot.gn.band.sprette gr.1-3 mm. Ved 25.25 1 cm Sl.	0-5° 5-10°						
25.80 - 30.20	4.40	biot.gn. Mørk mlk-grov mlk,imp.Py.Spor Sl.ved 25.80-25.85. 28.40-28.50.	10-15° 20° 30°						
30.20 - 33.40	3.20	grå gn. Lys mlk.enstaka gr.1-2mm.	30-40°						
33.40 - 34.50	2.10	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band.	40°						
34.50 - 34.80	0.30	hbl.skarn.							
34.80 - 36.20	1.40	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3 mm	10-20°						
36.20 - 37.60	1.40	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band.Foldet.	10-20°						
37.60 - 40.40	2.80	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm.	20°						
40.40 - 41.50	1.10	biot.gn. Mørk mlk,sprette gr.	40°						
41.50 - 55.70	14.20	grå gn. Lys mlk.litt växl m/biot.gn.band,sprett gr.1-3mm. Foldet fr.49.70-55.50, skarnband fr.55.10-55.70 m/store gr.10-30 mm.	40-45°						

Lokalitet:

Borehull: 1130

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
55.70 - 67.90	12.20	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm, Foldet.	45°						
67.90 - 68.20	0.30	Pegm.							
68.20 - 69.30	1.10	biot.gn. Mørk mlk.svak imp.Py.	45-50°						
69.30 - 70.80	1.50	grå gn. Rel.lys mlk.biot.rik,store gr.20-30 mm.Foldet.Py. ved 70.35.							
70.80 - 79.80	9.00	" " Lys mlk.sprette gr.1-3mm. enkelte Pegm.band.	45°						
79.80 - 97.20	17.40	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band.0 partier,sprette gr.1-3 mm.	ca.45°						
97.20 - 98.40		biot.gn. (Pegmatitisk) Rel.mørk grovk.gr-førende 1-4 mm.Foldet.Tildels brecciert preg.	ca.45°						
10/6-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 43.970

Dato

Koordinater :

ikke innmålt

Retning : N

Borehull: 1129

Helling/stigning: + 45°

Høyde :

side 1

Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.20	4.20	biot.gn. Mørk mlk-grovk. Delvis växl m/biot.musk.gn. ondu- lerad, spor gr. 1-3 mm. <u>Py.</u> og spor <u>Sl.</u> ved 1-80-2.00.	30-35°						
4.20 - 5.90	1.70	grå gn. Lys mlk, svak imp. <u>Py.</u> sprette gr. 1-2 mm.	35°						
5.90 - 9.40	3.50	biot.gn. Mørk mlk, svak imp. <u>Py.</u> slak fold ved 9.00.	30 10 35°						
9.40 - 15.10	5.50	hbl.gn. Mørk mlk. litt växl m/opp til dm tykke biot gn. band gr. førende 1-4 mm, stich- tolitisk ved 10.55-10.75, foldet.	35°						
15.10 - 18.10	3.00	grå gn. Rel. lys mlk, enstaka dm tykke hbl.gn. band, svak imp. <u>Py.</u> <u>Sl.</u> ved 16.95.	35° 40°						
18.10 - 44.10	26.00	hbl.gn. Mørk mlk, foldet enstaka biot. rikere partier, svak imp. <u>Py.</u> føretrådesvis i de rikere partier.	30° 0° 30°						
44.10 - 51.30	7.20	grå gn. Rel. lys mlk.	45°						
51.30 - 55.10	3.40	biot.gn. Mørk mlk-grovk, imp. <u>Py.</u> Spor <u>Sl.</u> ved 54.80.	45-50°						
55.10 - 56.80	1.70	grå gn. Rel. lys mlk. Sprette gr. 1-3 mm.	40°	0.03	0.01	0.04			55.80 - 56.80
56.80 - 61.20		musk. biot.gn. Rel. mørk mlk, foldet, stri- pet imp. <u>Sl.</u> <u>Cp.</u> <u>Gn.</u> <u>Py.</u>2	40-50°	1.15	0.21	1.92			

Lokalitet:

Borehull: 1129

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
61.20 - 62.70	1.50	biot.musk.gn. Mørk mlk-grov-mlk.Svak imp.Py.spor Sl.?	40-50°	0.10	0.05	0.26			
62.70 - 65.50	2.80	grå gn. Rel.lys mlk,foldet.	45-50°						
65.50 - 69.00	4.50	biot.gn. Rel.mørk,växl m/dm tykke grå gn.band,imp.Sl.Cp.Gn. Py.føreträdesvis i biot. gn.	50-60°	0.55	0.15	1.23			65.50-67.00
				0.29	0.32	0.75			67.00-68.00
				0.18	0.37	0.92			68.00-69.00
69.00 - 71.00	2.00	grå gn. Lys mlk.Sl.ved 60.50 .	50°						
71.00 - 76.20	5.20	biot.gn. Mørk grovk,enkelte Pegm. band,imp.Py.spor Cp.fold- et spor Po.	ca.45°	0.07	0.14	0.26			
76.20 - 86.30	10.10	hbl.gn. Mørk mlk,delvis Amfiboli- tisk.	40-45°						

28/5-84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.970

Borehull: 1128

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Mo. - 84.

X: 925.489,5 Y: 43.974

: N

+ 60°

: +18,3

: 86,00 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 13.80	13.80	hbl.gn. Mørk mlk, sprette gr. 1-3mm svakt biot. førende. Svak imp. Py.	50-60°						
13.80 - 21.50	7.70	biot.gn. Mørk mlk, D-typ, svakt hbl. førende imp. Py.	50°						
21.50 - 44.50	23.00	hbl.gn. Mørk mlk, gr-førende 1-4 mm, foldet fr. 27.70-29.50 " " 40.00-44.50	40-50°						
44.50 - 58.20	13.70	biot.hbl.gn. Mørk mlk, gr-førende 1-3mm svak imp. Py. enstaka opp til dm tykke hbl.gn. partier, foldet fr. 44.50-49.50.	45°						
58.20 - 62.20	4.00	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm.	45-50°						
62.20 - 63.05	0.85	hbl.biot. Mørk grovk. skiktad.	50-55°						
63.05 - 73.20	10.15	grå gn. Lys mlk, kv. rik. Homogen.	60-70°						
73.20 - 86.00	12.80	hbl.biot.gn. Mørk mlk, växl m/hbl.gn. band, gr-førende, svak imp. Py. Hbl.gn. mot slutten.	"						

7/8-84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.250

Borehull: 1126

Dato : Mai -84

Koordinater : X: 925.357,5 Y: 43.247,5

Retning : S

Helling/stigning: - 55°

Høyde : - 70,5

Lengde : 20.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.10	3.10	grå gn. Lys mlk, sprette biot. rike band, gr. 1-3 mm.	45°						
3.10 - 6.60	3.50	" " Lys mlk, sprette biot. rike band, imp. Py. Cp. Gn. Sl.	40-45°	0,37	0,18	1,26			3,10 - 4,30
6.60 - 7.90	1.30	" " Rel. lys mlk, rik imp. Sl. m/skarn Cp. Py. Gn.	45°	0,19	0,06	0,69			4,30 - 5,50
7.90 - 9.00	1.10	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm.	45°	0,72	0,72	3,68			5,50 - 7,90
9.00 - 13.30	4.30	biot. gn. Mørk mlk-grov mlk, växl m/ musk. biot. grå gn. band, imp. Py. Cp. Sl. Gn.	40-45°	0,24	0,06	0,43			9,00 - 10,00
				0,69	0,31	5,00			10,00 - 11,0
				0,40	0,38	1,81			11,0 - 12,20
				0,20	0,31	0,77			12,20 - 13,30
13.30 - 19.00	5.70	biot. musk. gn. Rel. mørk m/k-grov. Växl m/musk. biot. gn. imp. Py. føretredesvis i de musk. rikere partier.	40-45° 50-60°	0,92	0,41	2,22			
19.00 - 20.00	1.00	grå gn. Lys mlk, musk. rik i starten men overgår til grå gn. sprette gr. 1-2 mm. Svak imp. Py.	60°						

16/5-84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.250

Borehull: 1125

Dato: 16/5-84

Koordinater : X: 925.357,5 Y: 43.247,5

Retning : S

Helling/stigning: - 80°

Høyde : - 70.5

Lengde : 20.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.20	2.20	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-2mm	80°						
2.20 - 5.00	2.80	" " Rel. lys mlk, sprett imp, enstaka klysor Sl.Cp.Gn. Py.	70-80°	0,83	0,21	1,83			2,20-3,60
				0,62	0,23	1,65			3,60-5,00
5.00 - 5.80	0.80	grå gn. Pegm. Lys, delvis halve kjernen Pegm, spor Gn.Po.Sl.		0,86	0,28	0,36			
5.80 - 6.80	1.00	biot.gn. Mørk mlk, foldet spor hbl skarn, imp. Sl.Cp.Gn.Py. (Lys Sl.)	70-80°	0,63	0,43	3,53			
6.80 - 8.00	1.20	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-2mm enkelte biot.rike band, imp. Py.spor Sl.	80°	0,14	0,26	1,14			
8.00 - 10.00	2.00	biot.gn. Rel.mørk, växl m/biot. musk.gn. Imp. Py. Sl.Cp.Gn.	80-90°	0,33	0,32	2,62			8,00-9,00
				0,23	0,23	1,21			9,00-10,00
10.00 - 12.60	2.60	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grov.växl m/grå gn.band, Py.imp. avtagende.	80-90°						
12.60 - 13.80	1.20	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm svag-spor imp. Py.	80-90°						
13.80 - 20.00	6.20	hbl.biot.gn. Mørk mlk, overgang til hbl.gn. Spor gr. 1-3 mm, svak imp. Py.	80-90°						

16/5-84

Stellan Burman

Lokalitet: Jernverkstunnel
 Profil. 41.660

Borehull: 1133

Dato Juni - 84

Koordinater ca: X: 925.289,5 Y: 41.657,8 ikke innmålt

Retning : S

Helling/stigning: -53°

Høyde : + 29.0

Lengde : 101,20 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.10	2.10	grå gn. Lys mlk, växl m/biot.gn. band, enkelte små folder. I starten imp.Py.	70-80°						
2.10 - 7.10	5.00	biot.hbl.gn. Mørk mlk, växl m/hbl.gn. partier m/gr.1-3 mm, svak imp.Py.litt foldet.	60-70°						
7.10 - 8.40	1.30	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm.	50-60°						
8.40 - 20.10	11.70	biot.hbl.gn. Mørk mlk, växl m/hbl.gn. band m/gr.1-3 mm, svak imp. Py.Foldet fr.8.40-19.20.	ca.45° 50°						
20.10 - 24.90	4.80	hbl.gn. Mørk mlk, sprette gr.1-3mm, litt växl m/biot.gn.band, delvis små foldet.	45-60°						
24.90 - 39.40	14.50	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov mlk, växl. mellan hbl.biot-biot.hbl. gn.som sprette hbl.gn.band gr.føretrådesvis i hbl.gn. 1-3 mm, som enstaka store gr.10-30 mm, delvis små- foldet.	50-60°						
39.40 - 54.20	15.80	hbl.gn. Mørk mlk, delvis amfiboli- tisk, sprette gr.1-3 mm, samt enstaka biot.hbl.gn. band m/svak imp.Py.	50° 60°						
54.20 - 68.65	14.45	biot.hbl.gn. Mørk mlk-grov mlk, sprette opp til dm tykke hbl.gn. band, sprett gr.1-3 mm, svak imp.Py.føretrådesvis i biot.rikere deler.	ca.45°						
		2		0,01	0,05	0,08			67,65-68,65

Lokalitet:

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1133

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
68.65 - 69.80	1.15	grå gn. Lys mlk, musk. rik, imp. <u>Sl.</u> <u>Cp. Gn. Py.</u>	50-60°	0,77	0,23	2,03			
69.80 - 71.25		" " Lys mlk.	45°	0,01	0,01	0,01			69,80 - 70,80
71.25 - 71.65	0.40	" " Rel. lys mlk, biot. rik, svak imp. <u>Sl. Cp. Gn. Py.</u>	45°	0,62	0,12	1,56			
71.65 - 72.30	0.65	" " Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm.	45°						
72.30 - 72.80	0.50	hbl. biot. gn. Mørk mlk, sprette gr. 1-4 mm.	45°						
72.80 - 83.30	10.50	grå gn. Lys mlk, kv. rik, enkelte opp til cm tykke biot. gn. skikt sprett gr. 1-3 mm.	50-60°						
83.30 - 87.70	4.40	musk. gn. Lys mlk, litt variert m/ musk. biot. gn. Fr. 84.15- 85.40 smale <u>Sl. Cp.</u> band m/ imp. <u>Py.</u> i øvrigt imp. <u>Py.</u> spor <u>Sl.</u> litt foldet.	ca. 45°	0,05	0,06	0,14			83,30 - 84,15
				0,30	0,50	2,42			84,15 - 85,40
				0,18	0,06	0,19	3,5		85,40 - 86,40
				0,04	0,08	0,17			86,40 - 87,70
87.70 - 101.20	13-50	hbl. biot. gn. Mørk mlk växl m/biot. hbl. gn. samt sprette hbl. gn. band, delvis svak imp. <u>Py.</u>	55-60°						

15/6-84

Stellan Burman

Lokalitet: Jernverkstunnel : 4/ 660

Dato : Juni -84

Koordinater : X: 925.289, Y: 41.657, ~~Z: 1000~~

Retning : S

Helling/stigning: -65°

Høyde : +29,1

Lengde : 89,30 m

Borehull: 1132

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	grå gn. Rel.lys mlk.biot.rik,imp. Py.fr.starten.	70-80°						
1.50 - 8.40	6.90	hbl.biot.gn. Mørk mlk,växl m/biot.hbl. gn.,gr.førende 1-3 mm foldet,svak imp. Py.	70-80°						
8.40 - 16.00	7.60	biot.hbl.gn. Mørk mlk.gr.førende 1-3mm	60-70°						
16.00 - 16.90	0.90	grå gn. Lys mlk-fin kv.rik.	60°						
16.90 - 17.10	0.20	biot.hbl.gn. Se ovan.	50-60°						
17.10 - 18.70	1.60	grå gn. Se ovan.Foldet fr.18.10- 18.70.	60°						
18.70 - 19.10	0.40	biot.hbl.gn. Se ovan. Foldet.							
19.10 - 20.00	0.90	grå gn. Se ovan.	50°						
20.00 - 31.00	11.00	biot.hbl.gn. Mørk mlk.litt växl m/hbl. biot.gn.,gr.førende 1-3 mm variert m/Py.	50-70°						
31.00 - 31.60	0.60	grå gn. Lys mlk-fin,musk.rik,spor Py.	60°						
31.60 - 32.80	1.20	hbl.gn. Mørk mlk,foldet gr-førende 1-4 mm.	60°						
32.80 - 33.70	0.90	grå gn. Se ovan.	70°						
33.70 - 34.90	1.20	biot.gn. Mørk mlk,sprette gr. svak imp.Py.	60-70°						
34.90 - 40.50	5.60	hbl.gn. Mørk mlk,gr.førende.	70-80°						
40.50 - 56.60	16.10	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov,imp.Py.gr. førende 1-3 mm.	80 70 60						
....2									

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1132

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
56.60 - 62.00	5.40	biot.gn. Mørk mlk-grovk.skiffrig spor hbl.skikt imp. <u>Py.</u> spor <u>Cu.Po.</u>	45-50°						
62.00 - 66.20	4.20	" " Mørk mlk-grov.växl m/Pegm (Pegmatitisk) grå gn.band,foldet,imp. <u>Py.</u> spor <u>Po.Cu.</u> (<u>Sl.</u> spor ved 62.20)	30-45°						
66.20 - 70.60	4.40	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm.	35-45°						
70.60 - 72.00	1.40	Pegm.							
72.00 - 72.50	0.50	grå gn. grå gn.	45°						
72.50 - 72.90	0.40	Pegm.							
72.90 - 82.00	9.10	biot.hbl.gn. Mørk mlk,gr.førende,imp. <u>Py.</u>	60° 70-80°						
82.00 - 89.30	7.30	hbl.biot.gn. Mørk mlk,gr-førende 1-3mm mot slutten växl m/hbl.gn, amf.band.	70-90°						

15/6-84

Stellan Burman

Lokalitet: Y: 41.660 (Jernverkstunnel.)

Dato: Juni -84

Koordinater: X: 925, 289,9 Y: 41.653,6

Retning: S

Helling/stigning: - 80°

Høyde: +28,9

Lengde: 86,20 m

Borehull: 1131

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.30	5.30	Biot.gn. Rel.mørk mlk,växl m/grå gn.band,svak imp.Py. Foldet.	30-45°						
5.30 - 10.60	5.30	hbl.biot.gn. Mørk mlk,enkelte biot.band gr.førende 1-3 mm,Foldet.	45°						
10.60 - 11.90	1.30	grå gn. Lys,fink,musk.rik.	50°						
11.90 - 19.60	7.70	biot.gn. Mørk mlk,Foldet,enkelte pegm.og grå gn.band.	0-50°						
19.60 - 21.00	1.40	hbl.gn. (Amfibolitisk) Mørk mlk.	45-50°						
21.00 - 52.90	31.90	biot.hbl.gn. Mørk mlk-grovmlk,växl m/hbl.biot.gn,hbl.gn.Imp.Py. delvis rik i de biot.rikere partiene.Fr.21.00-22.70 Foldet o-30°,gr.førende 1-3 mm.	70-80°						
52.90 - 54.20	1.30	biot.sk. Mørk(grønaktig),spor Py. Sl.Fr.54.05-54.10.	80°						
54.20 - 61.40	7.20	biot.gn. (Pegmatitisk) Mørk grovk,växl,delvis brecciert m/grå gn.Delvis imp.Py.Fr.60.00-60.40 rike striper Po.Py.	60-80°						
61.40 - 76.40	15.00	grå gn. Rel.lys mlk,delvis musk.rik enkelte opp til dm tykke biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm,imp.Py.føretradesvis i de biot.rikere partier. Enkelte spisse folder.	70-80°						

.....2

Lokalitet:

Borehull: 1131

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
76.40 - 77.60	1.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk, växl m/grå gn. band, imp. <u>Py.</u>	70-80 ^o						
77.60 - 86.20	8.60	hbl.biot.gn. Mørk mlk, gr. førende 1-4 mm, svak imp. <u>Py.</u> Fr. 78.10-78.15 <u>Sl. Gn. Cp.</u> Fr. 79.30-79.65 " " "	70 ^o						
25.6.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 43.970

Borehull: 1127

Dato : Mai -84
 Koordinater : X: 925.488,5 Y: 43.974,0
 Retning : N
 Helling/stigning: + 80°
 Høyde : - 16.8.
 Lengde : 71.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 12.50	12.50	hbl.biot.gn. Mørk mlk, växl m/hbl.gn. band, gr-førende 1-3 mm. Svak imp.Py.Spor Sl.fr. 9.70-9.80 m.	70-90°						
12.50 - 29.80	17.30	hbl.gn. Mørk mlk, gr-førende 2-4 mm, tildels amfibolitisk.	70-80°						
29.80 - 37.70	7.90	grå gn. Rel.mørk mlk meget växl m/foldete hbl.gn.band, gr-førende.	70-80°						
37.70 - 71.30	33.60	" " Lys mlk, sprette opp til 5 cm tykke foldete hbl.gn.band.	70-80°						
21.8.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 43.250

Borehull: 1124

Dato: Mai-84
 Koordinator : X: 925.361,9 Y: 43.246,9
 Retning : N
 Helling/stigning: - 78°
 Høyde : - 70.3
 Lengde : 17.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.90	5.90	grå gn. Lys mlk, enstaka gr. 1-2mm Sl. ved 1.30-1.32 1.75-1.80 2.10-2.20	80-90°						
5.90 - 8.90	3.00	" " Rel. lys växl med musk. biot, biot. musk. gn. delvis Pegmatitisk, imp. og cm smale band Sl. Cp. Gn. Py.	70-80°	0.45	0.13	1.13			5.90 - 6.90
				0.52	0.26	2.03			6.90 - 7.90
				0.16	0.49	1.72			7.90 - 8.90
8.90 - 10.30	1.40	musk. biot. gn. Rel. lys grovk. imp. Py.	80-90°	0.10	0.27	0.13			
10.30 - 11.40	1.10	biot. hbl. gn. Mørk mlk-grov mlk. m/ens- taka smale hbl. gn. band m/gr. 1-3 mm, svag imp. Py.	70-80°						
11.40 - 14.00	2.60	hbl. gn. Mørk mlk, gr. førende 1-3mm svag impr. Py.	80-90°						
14.00 - 17.20	3.20	hbl. biot. gn. Mørk mlk, imp. Py. Cu ved 10.50.	70°						

15/5-84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.240

Borehull: 1123

Dato : Mai -84
 Koordinater : X: 925.314 Y: 43.240
 Retning : S
 Helling/stigning: 0°
 Høyde : - 85 Horisontalt
 Lengde : 17.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 12.80	12.80	biot.hbl.gn. Mørk mlk-grov, litt variert m/halva kjernen. Musk. rik grå gn. Rik Sl.Cp.Gn.Py. Slak folding.	0-5°	1.34	0.43	5.92			
12.80 - 14.50	1.70	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. hbl.band, svak imp.Py.	5-10°	0.07	0.08	0.17			12.80-14.00
14.50 - 17.30	2.80	hbl.biot.gn. Mørk mlk, gr-førende 1-3mm	5-10°						

8/11-84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.260

Borehull: 1122

Dato : Mai -84
 Koordinater : X: 925.314 Y: 43.240
 Retning : S
 Helling/stigning: - 22°
 Høyde : - 86.5
 Lengde : 14.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.70	4.70	biot.hbl.gn. Mørk mlk.växl m/cm tykke grå gn.band, enstaka smale band Sl.Cp.Gn.Py.	5-15°	0,45	0,20	0,91			
4.70 - 10.00	5.30	hbl.biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn.band, gr.1-3 mm. Svak imp. Py.føretrådesvis i grå gn.band.	5-15° 15-20°						
10.00 - 14.30	4.30	hbl.gn. Mørk mlk.sprette hbl.biot gn.band. Stichtolitisk ved 11.00-11.20 gr.førende 1-4 mm.	20-30°						

8/11-84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.240

Borehull: 1121

Dato: Mai -84
 Koordinater : X: 925.314 Y: 43.240
 Retning : S
 Helling/stigning: - 55°
 Høyde : - 86.5
 Lengde : 10.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	grå gn. Rel.mørk mlk.biot.rik, Stripet Sl.Cp.Gn.Py.	35°	1.61	0.19	2.65			
0.40 - 1.00	0.60	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-4mm	60-70°						
1.00 - 3.50	2.50	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk.skarnførende stripet imp.Sl.Cp.Gn.Py.	60-70°	2.03	0.37	6.20			1.00-2.25
				0.35	0.34	1.12			2.25-3.50
3.50 - 5.00	1.50	hbl.biot.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3mm	"						
5.00 - 10.00	5.00	hbl.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.biot. gn.band,gr.1-3 mm.	"						
7/11-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 43.260

Borehull: 1120

Dato

Koordinater

Retning : opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde :

Lengde :

ikke innmätt.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.80	3.80	biot.gn. Mørk mlk.m/opp til dm tykke hbl.førende band delvis imp.Py. Ved 2.40-2.60 Sl. " 3.50-3.60 Sl.	70-90°						
3.80 - 8.20	4.40	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm	80-90°						
16/5-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 43.240

Borehull: 1119

Dato : Mai-84
 Koordinater : X: 925.314,5 Y: 43.241,0
 Retning : Syd
 Helling/stigning: 0°
 Høyde : - 84,4
 Lengde : 26.20

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.20	2.20	biot.gn. Mørk mlk-grovk.spor hbl. imp. Sl.Cp.Py.Gn.	20°	0,28	0,13	1,02			0.00-1.00
				0,30	0,61	1,16			1.00-2.20
2.20 - 3.10	0.90	hbl.gn. skarn Mørk grovkbrecciert, rik Sl.Cp.Gn.Py.Po.		0,10	1,17	5,12			
3.10 - 15.50	12.40	biot.gn. Mørk mlk.litt växl m/ biot.musk.gn.grå gn,biot. hbl.gn.imp,striper Sl.Cp. Gn.Py.	0-20°	Se analysprotokoll.					
15.50 - 22.50	7.00	grå gn. Rel.lys mlk,slake folder svak imp.Py.	0-20°						
22.50 - 24.80	2.30	hbl.gn. Mørk mlk-grovk,växl m/ biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm,foldet.(Skyveplan)	0-25°						
24.80 - 26.20	1.40	" " Mørk mlk,gr-rik 1-3 mm.	45°						

24/5-84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.240

Borehull: 1118

Dato: Mai-84

Koordinater : X: 925.314,5 Y: 43.241,0

Retning : S

Helling/stigning: - 20°

Høyde : - 85.5

Lengde : 14.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.10	4.10	hbl.biot.gn. (Pegmatitisk)	Mørk grovk, foldet, brecciert, rik <u>Sl.Co.Gn.Py.</u>	0-40°	1,31	0,71	5,77		
4.10 - 6.80	2.70	biot.hbl.gn.	Mørk mlk-grovk.m/hbl.gn. band, imp. <u>Py.</u>	5-15°					
6.80 - 12.20	5.40	hbl.biot.gn.	Mørk mlk, växlande m/hbl. gn, grå gn.band, gr-førend i hbl.gn, striper og band <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	5-10° 10-20° 30°	1,27	0,28	3,53		
12.20 - 14.20	2.00	Pegm.	med opp til dm tykke hbl. gn.band.	30-40°					

24/5-84

Stellan Burman

Lokalitet: 43.240

Borehull: 1117

Dato April -84
 Koordinater X: 925.315,0 Y: 43.241,0
 Retning S
 Helling/stigning: - 55°
 Høyde - 86,0
 Lengde 11.10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 11.10	11.10	hbl.gn. Mørk mlk.litt växl m/hbl. biot.gn.band samt enstaka grå gn.band, imp. <u>Py</u> . i hbl. biot.gn.bandene. 8/11-84 Stellan Burman	45°						

Borehull: 1116

Koordinator : X: 925.301,9 Y: 43.290,8

Retning 5 S

Helling/stigning: 0° Horisontalt

Høyde : - 87.6

Lengde : 23.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	hbl.biot.gn. Mørk mlk, imp. <u>Py.</u>	10 ⁰						
1.00 - 23.00	-2.00	hbl.gn. Mørk mlk, store gr. 2-6 mm.	0-5 ⁰ 10 ⁰						
		8/11-84							
		Stellan Burman							

Lokalitet: Jernverkstunnel
ca: 41.553

Borehull: 1115

Dato : April -84
Koordinater : X: 925.409,4 Y: 41.554,4
Retning : N
Helling/stigning: - 48°
Høyde : + 26,0
Lengde : 41,30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 14.10	14.10	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm, enstaka dm tykke biot. rikere partier. små foldet. Fra 6.30-6.60 9.60-10.00	45° 50° 60° 45°						
14.10 - 15.10	1.00	biot.gn. Mørk mlk-grovk, sprette gr. 1-3 mm, spor Py.	40°						
15.10 - 15.35	0.25	hbl.skarn. Spor Cp.Gn.							
15.35 - 21.50	6.15	Grå gn. Se ovan.	40-45°						
21.50 - 26.00	4.50	biot.hbl.gn. Mørk mlk, växl m/hbl.gn. band, gr-førende, svak imp. Py.	45-50°						
26.00 - 29.70	3.70	grå gn. Rel.lys mlk, delvis glimmerrik, svak imp. Py. enstaka gr. 1-3 mm, ved 28.50-28.55 Sl.Cp.Gn. ved 29.35-29.45 Sl.Cp.Gn.	50-60° 45-50°						
29.70 - 31.40	1.70	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grovk, svak imp. Py. spor Sl. ved 30.20 m.	45°						
31.40 - 34.40	3.00	hbl.gn. Mørk mlk, gr-førende 1-4 mm, enstaka cm tykke hbl. biot.band m/Py.	45°						
34.40 - 36.30	1.90	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov-mlk, sprette gr. 1-3 mm, imp. Py.	50-60°						
36.30 - 41.30	5.00	hbl.gn. Mørk mlk, sprette gr. 1-3 mm	60-65°						

11/4-84

Stellan Burman

Lokalitet: Jernverkstunnel
ca: 41.553

Borehull: 1114

Dato April -84
Koordinatorer : X: 925,409,1 Y: 41.554,6
Retning : N
Helling/stigning: - 75°
Høyde : + 25,9
Lengde : 38,00 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 26.80	26.80	grå gn. Lys mlk, enstaka biot. rikere partier, sprette gr. 1-3 mm.	75-80°						
26.80 - 28.80	2.00	" " Rel. lys mlk, svagt skarn- førende 36.80-37.80, rik imp. Sl. Cp. Gn. Py.	80°	1,21	0,33	5,05			
28.80 - 29.50	0.70	" " Rel. lys mlk, svak imp. Py. Sl.?	80-85°	0,19	0,09	0,39			
29.50 - 30.10	0.60	" " Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm.	80°						
30.10 - 31.40	1.30	hbl. biot. gn. Mørk mlk, litt växl m/hbl. gn. band, imp. Py. gr. førende i hbl. gn. banden.	75-80°						
31.40 - 38.00	6.60	hbl. gn. Mørk mlk, gr-førende 1-3 mm, enstaka hbl. biot. band.							

12.4.84

Stellan Burman

Lokalitet: Jernverkstunnel

Dato April-84

Koordinater : X: 925.408,0 Y: 41.545,5

Retning : S

Helling/stigning: -53°

Høyde : +25.5

Lengde : 49.50 m

Børehull: 1113

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	grå gn. Rel.lys mlk,biot.rik, sprette gr.1-3 mm.	60°						
0.60 - 1.50	0.90	Tap.							
1.50 - 4.10	2.60	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grov mlk, små foldet,gr.førende 1- 3 mm,svak imp. Py.	45°						
4.10 - 15.10	11.00	grå gn. Lys mlk,sprette skikt og enstaka cm tykke biot. band,sprette gr.1-3 mm. små foldet ved 9.30-9.60	ca45°						
15.10 - 16.00	0.90	Pegm. Lys grovk,grå gn.band.Ved 15.15 Po.Cp.	45°						
16.00 - 16.60	0.60	Biot.pegmatil Mørk grovk,svak imp.Py.Po.							
16.60 - 17.70	1.10	grå gn. Se ovan.Små foldet.	45 45°						
17.70 - 17.90	0.20	granat,skarn Mørk grovk.gr.som matriks. imp.Py.Po.							
17.90 - 35.20	17.30	grå gn. Se ovan. Små foldet fr.19.00-19.50 Fr.28.00-28.20 skarn Py. " 28.20-29.00 Pegm.	45° 40° 35°						
35.20 - 36.65	1.45	biot.gn. Mørk mlk-grov.Pegmatitisk, brecciert,foldet,rik imp. Py.Po.Cp.Sl.		0.23	0.96	2.96			
36.65 - 38.30	1.65	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm, spor Py.	30-35°						
38.30 - 40.10	1.80	biot.gn. Rel.mørk mlk.grå gn.band m/spor Py.	45°						
		2							

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1113

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
40.10 - 41.00	0.90	grå gn. Lys mlk, enkelte biot.gn. band m/imp.Py.Sl.Cp.Gn.	35-40°	0,50	0,39	2,01			
41.00 - 42.50	1.50	malm Rik tildels komp.malm.Sl. Cp.Gn.Py.Brecciert m/hbl. biot.små ovale gn.ballar.		0,18	0,15	15,12			
42.50 - 44.00	1.50	grå gn. Mlk.biot.rike band m/imp. Py.foldet.	40-45° 30°	0,03	0,07	0,15			
44.00 - 48.00	4.00	hbl.biot.gn. Mørk mlk, sprette gr.1-3 mm, imp.Py.	35°						
48.00 - 48.60	0.60	Pegm.							
48.60 - 49.50	0.90	hbl.biot. Se ovan.	40-45°						
16.4.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: Jernverkstunnel
ca 41.545

Borehull: 1112

Dato April -84
Koordinater : X: 925.408,0 Y: 41.545,5
Retning : S
Helling/stigning: - 75°
Høyde : + 25,5
Lengde : 41,50 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 14.10	14.10	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm, enkelte opptil dm tykke biot. rikere partier, ens- taka biot. skikt, spor <u>Cp.</u> <u>Py.</u> ved 4.30 m.	75-80°						
14.10 - 14.45	0.35	Pegm.							
14.45 - 28.10	13.65	grå gn. Se ovan. små foldet 14.50-14.70.	70-75°						
28.10 - 30.70	2.60	biot. gn. Mørk mlk, imp. <u>Py.</u> spor <u>SL.</u> <u>Cp. Gn.</u>	70°	0,23	0,29	1,07			28,10 - 29,40
				0,04	0,09	0,20			29,40 - 30,70
30.70 - 32.70	2.00	" " Mørk mlk, växl. m/hbl. Musk. band, stripet imp. <u>SL. Cp.</u> <u>Gn. Py.</u> tildels rik.	70 60 70-75	0,77	0,44	6,88			
32.70 - 36.50	3.80	biot. hbl. gn. Mørk mlk-grov mlk, växl m/hbl. gn. band, sprette gr. 1-3 mm, imp. <u>Py.</u>		0,16	0,09	0,14			32,70 - 33,70
36.50 - 41.50	5.00	hbl. gn. Mørk mlk, fra början väx- lande m/hbl. biot. band, <u>Py.</u> imp, sprette gr. 1-3 mm	70 55-60 70						
13.4.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.890

Borehull: 1111

Dato

mil - 84

Koordinater : X: 925,390,4 Y: 41.883,5

Retning : N

Helling/stigning: + 75°

Høyde : + 11,8

Lengde : 41,20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.60	5.60	Biot.gn. (Pegmatitisk)	Mørk grovk.brecciert, spor <u>Py</u> .						
5.60 - 8.80	3.20	grå gn.	Rel. lys mlk.växl m/biot. gn.partier, sprette gr. 1-3 mm.						70°
8.80 - 13.10	4.30	biot.gn. (Pegmatitisk)	Mørk mlk-grov.brecciert, spor <u>Py</u> , ved 12.80 <u>Sl</u> . Foldet.						70°
13.10 - 41.20	28.10	grå gn.	Rel. lys mlk, sprette gr. 1-3 mm, delvis bandad m/ opp til dm tykke biot. gn.band m/spor hbl.						70-80°
15/5-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: Jernbanetunnel
~~ca. 41.594~~ Profil 41.590

Borehull: 1110

Dato: April -84
Koordinater: X: 925,370,0 Y: 41,530,0
Retning: N
Helling/stigning: - 30°
Høyde: + 27,0
Lengde: 68,30 m.

[illegible]

Lokalitet: ~~41.590~~ Jernverkstunnel
 Profil 41.590

Borehull: 1109

Dato Mars -84
 Koordinater : X: 925.369,8 Y: 41.590,2
 Retning : N
 Helling/stigning: - 44°
 Høyde : + 27,0
 Lengde : 53,15 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.70	4.70	grå gn. Lys mlk, biot. som fin-mlk, enkelte muskovit rikere partier mlk-grov, sprette gr. 1-3 mm, åpne små folder fra 0.50-0.80, 4.30-4.50.	60-65°						
4.70 - 9.60	4.90	grå gn. b.d. Rel. lys mlk, gr-førende, tildels rik 1-3 mm, enstaka opp til 5 cm tykke hbl. førende band, åpne folder, fra 8.50-9.00 Py. imp. 9.40-9.50.	60-65°						
9.60 - 35.45	25.85	grå gn. Se oven. med litt variert biotinnhold fra 13.00m Fra 11.00-13.00 små åpne folder. Fra 14.30-16.00 små folder. 16.00-17.30 stor fordel. Fra 17.30 åpne små folder, ved 15.10 spor Py. Po. Gr. opptrår mest i de biot. rikere partier. Avtagende folder.	60-65° 50° 0-30° 60° 70°						
35.45 - 35.85	0.40	Malm i en fold. Sl. Cp. Gn. Py. Po.	0-70°	0,26	0,7	3,12			
35.85 - 40.40	4.55	grå gn. Lys fin-mlk. Fra 37.50-39.70 39.70-40.30 åpne små folder.	55-60°						
40.40 - 40.80	0.40	biot. gn. Mørk mlk-grov. Imp. Sl. Cp. Py. Gn.	50°	0,52	0,21	1,33			
40.80 - 43.00	2.20	Grå gn. Lys mlk, delvis musk rik. enstaka smale band m/ Sl. Cp. Py. Gn. samt svak imp.	50°	0,17 0,20	0,29 0,34	0,46 0,85			40,80-42,00 42,00-43,00

Lokalitet:

Borehull: 1109

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
43.00 - 44.60		grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm	50-60°						
44.60 - 45.30	0.70	Biot.gn. Rel.lys, fin-mlk, sprett Sl.Cp.Gn.Py.Po.	60°	0,78	0,32	2,48			
45.30 - 46.20	0.90	" " Rel.mørk mlk, striper imp. Sl.Cp.Gn.Py.	60°	0,47	0,37	3,70			
46.20 - 46.50	0.30	biot.hbl. Rel.mørk m/fink.skarn, noe gr. 1-3 m.	60°	0,03	0,20	0,07			
46.50 - 47.45	0.95	Biot.gn., mot slutten skarn/hbl. Rel.lys, imp. Sl.Cp.Gn.Py.	60°	0,73	0,54	3,24			
47.45 - 49.40	1.95	grå gn, musk. rik. Lys mlk, sprette gr. 1-3m, Fra 48.50-48.60 biot.hbl. gn.	60° 50°						
49.40 - 50.40	1.00	biot.hbl.gn. Rel.mørk, rik Py.imp.	50-60°						
50.40 - 53.15	2.75	hbl.gn. Mørk mlk, gr-førende.	65°						

4.4.84

Stellan Burman

Lokalitet: ca: 41.594 70m vorkesbunnab.
 § Profil 41.590

Borehull: 1108

Dato
 Koordinater : X: 925.360,5 Y: 41.590,5
 Retning : N
 Helling/stigning: - 58°
 Høyde : + 27,0
 Lengde : 47,20 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.50	5.50	grå gn. Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm.	45°						
5.50 - 5.90	0.40	Pegm.							
5.90 - 12.60	6.70	biot.gn. Rel.mørk mlk-grov-mlk,gr. førende, tildels rik 1-3 mm.	45° 50° 45°						
12.60 - 24.00	11.40	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3 mm småfoldet fr.19.00-19.30.	50-55°						
24.00 - 24.50	0.50	biot.gn. Rel.mørk grovk,slirig Pegmatitisk spisse folder,enstaka gr. 1-2 mm,spor <u>Py.Po.</u>	45° 0° 45°						
24.50 - 25.90	1.40	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm.	45°						
25.90 - 26.30	0.40	biot.gn. Rel.mørk grovk,slirig <u>Po.</u> Pegmatitisk <u>Py.</u>	30-50°						
26.30 - 27.40	1.10	grå gn. Lys mlk,enstaka biot.skikt sprette gr. 1-3 mm.	45°						
27.40 - 27.75	0.35	biot.gn. Rel.mørk grovk,slirig <u>Po.</u> Pegmatitisk <u>Py.</u> spor <u>Cp.</u>	40-60°						
27.75 - 35.50		grå gn. Lys mlk,enstaka cm tykke biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm, <u>Py.Po.</u> ved 32.30.	45° 50°						
35.50 - 35.90	0.40	Pegm.							
35.90 - 38.60	2.70	grå gn. Se ovan.	50°						
38.60 - 39.50	0.90	biot.Pegm. Mørk grovk,brecciert preg. rika klysor,skikt <u>Sl.Gn.</u> <u>Py.Po.</u>		0,53	0,71	3,05			

Lokalitet:

Borehull: 1108

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
39.50 - 40.70	1.20	grå gn. Lys mlk, enstaka gr. 1-3mm enkelte smale striper m/Sl.Cp.Gn.Py.	50°	0,14	0,24	0,38			
40.70 - 41.60	0.90	" " Rel.lys mlk, biot. rikere dm tykke band m/rik Sl. Cp.Gn.Py. (lys Sl.)	50-55	1,30	0,85	6,72			
41.60 - 43.20	1.60	hbl.biot.gn. Mørk mlk, imp.py.spor Sl. ved 41.90-42.05 m.	60°	0,12	0,06	0,27			
43.20 - 47.20	4.00	hbl.gn. Mørk mlk, gr-førende 1-4 mm. Slake folder Amfibolitisk mot slutten.	30° 0 30 45						

9.4.84

Stellan Burman

Lokalitet: ~~ca 41.594~~ 7ornverksbanch.
 Profil 41.590

Borehull: 1107

Dato : April - 84.
 Koordinator : X: 925.369,5 Y: 41.590,5
 Retning : N
 Helling/stigning: - 75°
 Høyde : +27,0
 Lengde : 49,30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.80	1.80	grå gn. Rel.lys mlk, sprette gr. 1-3 mm.	80°						
1.80 - 14.80	13.00	biot.gn. Rel.mørk mlk-grov-mlk, växl m/grå gn.band, foldet m/spisse folder, hbl. ved 1.90, 2.90, 3.20 som foldeknä, gr.førende, tildels rik 1-3 mm, Py. ved 7.30-7.40.	70-90°						
14.80 - 30.00	15.20	grå gn. Lys mlk-fin mlk, sprette gr. 1-2 mm, enstaka biot. og musk.band.	70-80°						
30.00 - 31.30	1.30	" " Lys mlk, enkelte biot. rikere band m/imp. <u>Sl.Cp.Gn.</u> Py.	70-80°	0,16	0,24	0,50			
31.30 - 31.90	0.60	Pegm.							
31.90 - 33.30	1.40	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm.	70-80°	0,03	0,01	0,06			
33.30 - 35.60	2.30	biot.gn. Mørk mlk-grov, spor hbl, skarn, delvis rik <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> Foldet.	70-90°	0,62	0,37	6,68			
35.60 - 40.80	5.20	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov mlk, enstaka gr. 1-2 mm, imp. Py.	75-80°						
40.80 - 49.30	8.50	hbl.gn. Mørk mlk, gr-førende 1-3 mm, foldet.	70-90						

10.4.84

Stellan Burman

Lokalitet:

Dato : Mars -84

Koordinator :

Retning : SV

Helling/stigning: + 46°

Høyde :

Lengde : 20.00 m

Borehull: 1106

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	Komp. <u>Py.</u>		0.05	0.01	0.08			
0.50 - 2.80	2.30	grå gn. Lys mlk.Sprett gr.1-3 mm.	0-10°						
2.80 - 20.00	17.20	biot.musk.gn. Rel.lys mlk-grovmlk.växl m/grå gn.band,imp. <u>Py.</u> i varierende mengde,spor <u>Sl.</u> Foldet.	0-25°	0.15	0.22	0.31			
		8/11-84 Stellan Burman							

Lokalitet: 41.890

Borehull: 1105

Dato: 1984-05-24
 Koordinater: X: 925.390,4 Y: 41.883,5
 Retning: N
 Helling/stigning: + 85°
 Høyde: + 11.8
 Lengde: 42.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.40	5.40	Biot.gn. (Pegmatitisk)	Rel.mørk grovk.m/brecciert preg,sprette spor <u>Po.Py.</u> <u>Sl.</u> 70°						
5.40 - 9.50	4.10	Grå gn.	Rel.lys mlk,delvis biot. rik,sprette gr.1-3 mm. 70-80°						
9.50 - 10.05	0.55	Biot.gn. (Pegmatitisk)	Se ovan.						
10.05 - 10.80	0.75	Pegm.							
10.80 - 12.40	1.60	biot.gn.	Mørk mlk-grov,växl m/grå gn.hbl.band, <u>Sl.</u> ved 12.05- 12.10 spor <u>Py.</u> 60°						
12.40 - 35.20	22.80	grå gn.	Rel.lys mlk,spor hbl,gr. førende,tildels rik 1-3 mm,små foldet. Ved 33.40-33.50 <u>Sl.</u> 60-70° 80-90°						
35.20 - 38.50	3.30	grå gn.	Rel.lys mlk,växl m/biot. skarn band m/imp. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u> 80-90°	0.46	0.50	2.62			36.20-37.50
				1.11	0.62	1.49			37.50-38.50
38.50 - 39.50	1.00	Pegm.							
39.50 - 40.50	1.00	Grå gn.	Lys mlk,sprette gr.1-2mm 80°						
40.50 - 42.30	1.80	Pegm.	Spor <u>Gn.</u>						
42.30 - 42.50	0.20	Grå gn.	Se ovan. 80°						
10/5-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.700

Borehull: 1104

Dato : Mars-84
 Koordinater : X: 925.342,2 Y: 41.704,7
 Retning : S
 Helling/stigning: - 80°
 Høyde : + 10,4
 Lengde : 17.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	Musk.gn.	Lys mlk,kvartsitisk.	45°					
0.70 - 1.30	0.60	2 gl.gn.	Lys mlk,musk.rik.	50°					
1.30 - 3.10	1.80	biot.gn.	Mørk mlk-grov,delvis hbl. førende,sprette gr.1-3 mm i de hbl.førende par- tier,imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	50-60°	0,14	0,26	2,59		
3.10 - 4.90	1.80	2 gl.gn.	Rel.lys delvis m/musk. biot.preg,imp. <u>Sl.Cp.Gn.</u> <u>Py.</u>	70° 80°	0,61	0,19	3,08		
4.90 - 9.70	4.80	Biot.gn. (Pegmatitisk)	Mørk grovk.växl m/enstaka 2 gl.gn.band.Slirig til- dels brecciert.Klysor og skikt <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	60-70°	0,05	0,34	1,23		
9.70 - 10.05	0.35	Skarn.	<u>Sl.Cp.Gn.</u>		0,01	0,78	0,07		?
10.05 - 15.00	4.95	Biot.gn. Pegmatitisk	Se foregående.	60-80°	0,02	0,20	0,42		
15.00 - 17.30	2.30	2 gl.gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3mm	60-70°					
2/4-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.700

Borehull: 1103

Dato : Mars -84
 Koordinater : X: 925.343,2 Y: 41.704,7
 Retning : N
 Helling/stigning: - 45°
 Høyde : + 10,4
 Lengde : 17.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.10	4.10	2 gl.gn. Lys mlk, enstaka kv. og Pegm.band.	50°						
4.10 - 5.90	1.80	biot. Mørk grovk.hbl.førende, foldet rik Sl.Cp.Gn.Py.		0,78	0,46	7,66			
5.90 - 14.00	8.10	biot.Pegm.gn. Rel.mørk, grovk.växl.Fol- det, spor Py.Po.Fr.10.00m stripet, klyser, Sl.Py.Cp. Gn.		0,02	0,14	0,12			9,00 - 10,00
				0,03	0,18	1,28			10,00 - 14,00
14.00 - 17.20	3.20	2 gl.gn. Lys mlk, enkelte biot.gn. band m/imp.Py.	45-50°						

29/3-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.700

Dato Mars -84

Koordinater : X: 925.343,2 Y: 41.704,7

Retning : N

Helling/stigning: - 60°

Høyde : + 10,4

Lengde : 17.30 m

Borehull: 1102

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.20	3.20	2 gl.gn. Lys mlk, enkelte musk-skikt Sprette cm tykke Pegm. band.	80°						
3.20 - 4.80	1.60	biot.musk.gn. Rel.mørk, mlk-grov, hbl. skarn førende, rik imp. Sl.Cp.Gn.Py. Foldet.	45-80°	2,15	0,17	8,84			
4.80 - 5.40	0.60	Pegm.	°						
5.40 - 6.80	1.40	biot.gn. Mørk mlk, växl m/2 gl.gn. band m/gr.1-2 mm.	70°						
6.80 - 7.40	0.60	Pegm.							
7.40 - 9.70	2.30	Biot.gn. Se ovan.	45-80°						
9.70 - 12.30	2.60	Biot.gn. Mørk mlk-grov, växl m/Pegm hbl.biot.2 gl.gn.band. Sprette striper m/Sl.Cp. Gn.Py.		0,03	0,16	2,16			9,70-11,00
				0,02	0,14	0,72			11,00-12,30
12.30 - 14.30	2.00	2 gl.gn. Lys mlk, svak imp.Py.Spr- ette gr.1-2 mm.	45-50°						
14.30 - 17.30	3.00	biot.gn. Mørk mlk, växl m/hbl.før- ende 2 gl.gn.band.Spor Sl.ved 17.50 m. Foldet.	45-70°						

29/3-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.700

Borehull: 1101

Dato : Mars -84
 Koordinator : X: 925.343,2 Y: 41.704,7
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : + 10,4
 Lengde : 17.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.00	3.00	2 gl.gn. Lys mlk,Musk.rik.	80°						
3.00 - 8.20	5.20	biot.hbl. Mørk mlk-grov.Växlende m/2 gl.gn,Pegm.band, striper imp. <u>Sl.Cp.</u> <u>Py.Gn.</u>	45-80°	0,39	0,35	3,25			3,00-7,20
				0,10	0,21	2,95			7,20-8,20
8.20 - 9.80	1.60	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm	80-90°						
9.80 - 17.30	7.50	" " Rel.lys mlk,växl m/opp til dm tykke hbl.biot. gn.band m/imp. Py,spor <u>Sl.Po.</u>	70-90°						

1/4-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.660

Borehull: 1100

Dato : Mars -84
 Koordinate : X: 925.339,0 Y: 41.661,2
 Retning : S
 Helling/stigning: + 65°
 Høyde : + 14,5
 Lengde : 11,60 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	biot.hbl. Mørk mlk-grovk,stripet malm.	60°	1,37	0,39	13,12			
0.80 - 5.80	5.00	2 gl.gn. Rel.lys mlk-grov m/biot. Pegmatitis. pegm.,spor hbl.Py.i biot.	60-70°						
5.80 - 11.60	5.80	biot.gn.Pegm. Mørk,grovk,spor hbl.ens-taka Sl.band og imp.	70°	0,26	0,44	3,21			
		1.4.84 Stellan Burman							

Lokalitet: 41.650

Borehull: 1099

Dato : Mars - 84

Koordinater : X: 925.340,3 Y: 41.647,4

Retning : N

Helling/stigning: + 60°

Høyde : + 14,1

Lengde : 13.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 13.40		2 gl.gn. Rel.lys mlk, litt växl m/ hbl-førende partier, spr- ette gr.1-3 mm, Sl.ved 12.60-12.80. 13.40-13.45 1.4.84 Stellan Burman	45°						

Lokalitet: 41.650

Dato Mars -84

Koordinater X: 925.343,5 Y: 41.647,4

Retning : opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : + 14,1

Lengde : 11.70 m

Borehull: 1098

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	hbl.biot.gn.	Mørk mlk,gr-førende.	80°					
0.90 - 4.50	3.60	biot.pegmatit	Rel.mørk,grovk.Växl. fol- det,spor hbl,spor Sl.						
4.50 - 7.30	2.80	biot.hbl.gn.	Mørk mlk,enkelt striper Sl.	80°	0,21	0,26	1,91		
7.30 - 8.40	1.10	2 gl.gn.	Lys mlk,srette gr.1-2mm.	70°					
8.40 - 8.80	0.40	Skarn.	Sl.Gn-Cp.Py.		0,13	0,09	5,92		
8.80 - 9.80	1.00	hbl.biot.gn.	Mørk mlk,imp.Py.Sl.	80°	0,13	0,41	1,11		
9.80 - 11.70	1.90	Pegmatits gn.	Rel.lys,grovk,spor hbl.						
1.4.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 41.650

Dato

Mars 84.

Koordinater

X: 925.343,5 Y: 41.647,2

Retning

: N

Helling/stigning:

- 35°

Høyde

: + 10,1

Lengde

: 32,00 m

Borehull: 1097

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	2 gl.gn. Lys mlk, enstaka smale striper m/Sl.Cp.Gn.Py.	25°	0,18	0,11	1,10			
1.60 - 6.00	4.40	Biot.gn. Mørk mlk, växl m/2 gl.gn. band, litt skarn striper Sl.Cp.Gn.Py.	25°	0,02	0,14	0,88			1.60-2.80
				0,17	0,39	3,28			2.80-6.00
6.00 - 6.50	0.50	Pegm. M/spor Gn.Po.		0,25	0,08	0,06			
6.50 - 7.00	0.50	biot.gn. Mørk mlk, brecciert Cp.Sp. Sl.	10-25°	0,02	0,23	0,84			
7.00 - 10.00	3.00	2 gl.gn. Lys mlk, enkelte skikt biot.	0-25°						
10.00 - 17.70	7.70	biot.gn. Mørk mlk-grov. Brecciert m/2 gl.gn. Pegm. som igenfyllning. (slirig) Sl.Cp. Py.Po.Gn.	ca. 25°	0,04	0,18	0,54			10.00-13.50
				0,34	0,18	0,44			13.50-17.70
17.70 - 32.00	14.30	2 gl.gn.b.d. Rel. lys mlk, skiktad og bandad av biot.gn. spor hbl. Gr. 1-3 mm, imp. Py. føretrådesvis i biotiten, Foldet. Fra 25.00 enstaka dm tykke hbl.gn. band, gr. førende.	5-25° 25-45°						

15.3.84

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 41.650

Borehull: 1096

Dato : Feb.-84
 Koordinator : X: 924.343,5 Y: 41.647,2
 Retning : N
 Helling/stigning: - 53°
 Høyde : + 10,1 m
 Lengde : 38,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm Sl. fra 0.30-0.50.	45°	0,42	0,10	2,84			
1.00 - 2.70	1.70	Biot.hbl.gn. Mørk mlk,imp.stripet Sl. Cp.Gn.Py.	40°	0,05	0,60	3,14			1,00-2,00
				0,22	0,29	2,66			2,00-2,70
2.70 - 6.00	3.30	2 gl.gn. Rel.lys mlk.enstaka biot. gn.band m/Sl.Cp.Gn.Py.	45°	0,73	0,47	4,36			2,70-3,80
				0,04	0,17	1,18			3,80-6,00
6.00 - 10.20	4.20	" " Lys mlk.sprette gr.1-2mm.	40°						
10.20 - 13.50	3.30	biot.gn. Mørk mlk.växl m/2 gl.gn. band,imp.Sl.Cp.Gn.Py. foldet.	10-45°	0,03	0,16	1,09			
13.50 - 28.00	14.50	2 gl.gn. Rel.lys mlk.sprette dm tykke biot.hbl.gn.band, sprette gr.1-3 mm.	40-45°						
28.00 - 29.40	1.40	komp.malm .		0,28	1,28	18,80			
29.40 - 30.00	0.60	Skarn Imp.Sl.Cp.Gn.Py.		0,50	0,98	2,42			
30.00 - 34.50	4.50	hbl.gn.biot.gn. Mørk mlk,imp.Py.	60-70°						
34.50 - 38.30	3.80	hbl.gn.amf. Mørk mlk.							
14.3.1984									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 41.650

Dato : Feb.-84

Koordinater : X: 925.332,0 Y: 41.644,9

Retning : S

Helling/stigning: - 45°

Høyde : + 9,8

Lengde : 31.80 m

Borehull: 1095

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.80	1.80	biot.gn. Rel.mørk växlande m/pegm. 2.gl.gn.band,imp.Py. Sl. ved 0.50-0.52.1.50-1.60 m	45-50°						
1.80 - 5.50	3.70	2 gl.gn. Rel.lys mlk.enkelte biot. rikere band,svak imp.Py.	45-50°						
5.50 - 10.30	" "	Rel.mørk mlk.imp.Py. biot.rik	40-45°						
10.30 - 13.00	2.70	biot.gn. Mørk mlk.växl til biot. sk.band brecciert m/Pegm. imp. Py.Cp.Sl.	45°	0,02	0,18	0,12			10,30 - 11,60
				0,11	0,40	0,16			11,60 - 13,00
13.00 - 13.80	0.80	2 gl.gn. Lys mlk.	45°	0,01	0,03	0,06			
13.80 - 15.70	1.90	biot.gn. Mørk mlk.växl m/Pegm. (brecciert)imp.Py.Sl.Cp. Gn.	40°	0,02	0,19	0,50			13,80 - 14,80
				0,02	0,11	0,20			14,80 - 15,70
15.70 - 20.70	5.00	2 gl.gn.biot.rik.Rel.mørk mlk.imp.Py.	40°						
20.70 - 31.80	10.10	2 gl.gn. Lys mlk.sprette gr.1-2mm. hbl. på siste dm.	40°						

14.3.1984

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 41.650

Borehull: 1094

Dato : Feb.-84
 Koordinater : X: 925.332,4 Y: 41,645,2
 Retning : S
 Helling/stigning: - 60°
 Høyde : + 9,8
 Lengde : 17,40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	2.30	biot.gn. Mørk mlk, spor hbl. Växlande med 2 gl.gn., pegm.band, imp.Py.spor Sl.Cp.Gn.	60-80°	0,05	0,13	0,90			0,00 - 1,10
				0,35	0,14	0,86			1,10 - 2,30
2.30 - 9.40	7.10	2 gl.gn. Rel.lys mlk.delvis biot. rik, imp.Py.spor Cp.	70-80°						
9.40 - 12.90	3.50	biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.delvis stripet imp.Sl.Cp.Gn.Py.	45-70°	0,02	0,24	4,36			9,40 - 10,60
				0,01	0,10	0,48			10,60 - 11,80
				0,01	0,06	0,11			11,80 - 12,90
12.90 - 17.40	4.50	2 gl.gn. Lys mlk.sprette gr.1-2mm Svak imp. Py.	80°						
14.3.1984									
Stellan Burman									

Lokalitet: Profil 41.650

Borehull: 1093

Dato : Feb.-84
 Koordinater : X: 925.332,8 Y: 41.645,4
 Retning : S
 Helling/stigning: - 80°
 Høyde : + 9,8
 Lengde : 17.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	biot.gn. Mørk mlk, spor hbl.växlade med 2 gl.gn. pegm. imp. <u>Py.</u> <u>Sl.Cp.Gn.</u> Foldet.	60-90°	0,07	0,18	1,05			
2.50 - 5.50	3.00	2 gl.gn. Rel.lys mlk.delvis biot. rike band, imp. <u>Py.</u> spor Gr. 1-3 mm.	80°						
5.50 - 11.50	6.00	biot.gn. Mørk mlk, imp. og sprette striper <u>Sl.Gn.Cp.Py.</u>	70-80°	0,10	0,29	1,13			
11.50 - 17.30		2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm, kv.rik. 14.3.1984 Stellan Burman	70°						

Lokalitet: 41.650

Borehull: 1092

Dato

Fes - 89

Koordinater

X: 925.341,2 Y: 41.645,3

Retning

S

Helling/stigning: - 70°

Høyde

+ 9,8

Lengde

17,20

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	biot.gn. Mørk mlk, växl m/2 gl.gn. band, imp. Sl.Cp.Gn.Py.	80°	0,30	0,25	3,04			
2.50 - 5.50	3.00	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm	70-80°						
5.50 - 6.30	0.80	biot.gn. Mørk mlk-grov, Py.Po.Sl.Cp.Gn.	70°	0,19	0,48	2,74			
6.30 - 8.30	2.00	2 gl.gn. Lys mlk.enstaka gr.1-3mm	80°						
8.30 - 9.10	0.80	biot.gn. Mørk mlk-grov, imp. Sl.Cp.Gn.Py.	70-80°	0,23	0,17	1,77			
9.10 - 17.20	8.10	2 gl.gn. Lys mlk, enstaka opp til dm tykke biot.gn.band m/Py.Spor Cp.	60-80°						

19.3.84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.650

Dato : Feb.-84
 Koordinator : X: 925.341,4 Y: 41.645,3
 Retning : N
 Helling/stigning: - 70°
 Høyde : + 98
 Lengde : 34,00

Borehull: 1091

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	biot.gn. Mørk mlk.växl. m/2 gl.gn band,sprette opp til 5 cm tykke band m/ <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	50-60°	0,36	0,21	4,60			
2.50 - 5.20	2.70	2 gl.gn. Lys mlk.fra 3.90 enstaka biot.rike band m/spor <u>Sl.</u>	50-60°	0,43	0,13	0,45			3,90 - 5,20
5.20 - 11.00	5.80	biot.gn. Mørk mlk.slirig,delvis brecciert,enstaka hbl. førende band,imp. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u> føretrådesvis i biot.rikaste delar.	45-60°	0,16	0,16	1,44			5,20 - 8,00
				0,17	0,15	0,38			8,00 - 11,00
11.00 - 13.20	2.20	2 gl.gn.	50°						
13.20 - 16.20	3.00	hbl.biot.gn.	60-70°						
16.20 - 26.40	10.20	2 gl.gn. Lys mlk,svakt hbl.førende gr. 1-4 mm.	70°						
26.40 - 29.50	3.10	Malm Biot.gn.skarn,komp.malm.		0,23	1,20	8,25			
29.50 - 34.00	4.50	hbl.biot.gn. Mørk mlk.gr.1-3 mm.	80°						

18/3-84

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 41.650

Borehull: 1090

Dato : Feb.-84
 Koordinater : X: 925.341,4 Y: 41.645,3
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: 90°
 Høyde : + 9,8
 Lengde : 26.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.10	2.10	biot.gn. Mørk mlk-grov, bandad m/ 2 gl.gn.band, <u>Sl.i</u> biotin.	80-90°	0,42	0,29	3,72			
2.10 - 5.20	3.10	.2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm.	70-80°						
5.20 - 10.60	5.40	biot.gn. Mørk mlk-grov, spor hbl. pegm.2 gl.gn.band, imp. <u>Py.</u> sprette samle <u>Sl.Cp.Gn.</u> band.	60-90°	0,06	0,14	1,19			3,20-8,80
				0,03	0,08	0,17			
10.60 - 16.80	6.20	2 gl.gn. Lys mlk, enstaka hbl.biot. band m/ <u>Py.</u> gr.1-3 mm.	80-90°						
16.80 - 26.00	9.20	" " Lys mlk, gr.1-3 mm.	80-90°						

21.03.84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.080

Borehull: 1089

Dato : Feb.-84
 Koordinator : X: 925.415,7 Y: 44.076,7
 Retning : opp
 Helling/stigning: + 90°
 Høyde : - 63,0
 Lengde : 20.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.50	3.50	2 gl.gn. Lys mlk, spor <u>Sl.Fra</u> 0.00-0.50 sprette gr.1-3 mm.	80-90°						
3.50 - 7.00	3.50	hbl.gn. Mørk mlk, litt vekslende med hbl.biot, 2 gl.gn. band, svak imp. <u>Py</u> .gr.1-3 mm. Foldet.	45-90°						
7.00 - 11.20	4.20	2 gl.gn. Lys mlk, kv.rik, spor <u>Py</u> .gr.1-3 mm.	80-90°						
11.20 - 15.10	3.90	" " Lys mlk, sprette skarn førende band med <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py</u> .	70-80°	2.33	0.21	5.12			11.20-12.00
				0.70	0.14	1.62			12.00-13.00
				0.52	0.11	1.17			13.00-14.00
				0.73	0.34	5.72			14.00-15.10
15.10 - 20.00	4.90	hbl.gn. Mørk mlk, veklende m/hbl. biot.gn. Fra 19.50-20.00 Amfibolitisk, gr. førende 1-3 mm, svak imp. <u>Py</u> .							
28/2 1984									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.080

Borehull: 1088

Dato : Feb.-84
 Koordinator : X: 925.413,5 Y: 44.075,7
 Retning : S
 Helling/stigning: + 60°
 Høyde : - 63,0
 Lengde : 20.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	2 gl.gn.	Rel.lys mlk,svak imp. <u>Py.</u> <u>Sl.</u> ved 1.40-1.50	50°					
1.50 - 2.30	0.80	Pegm.							
2.30 - 3.80	1.50	2 gl.gn.	Rel.lys mlk,litt variert mot Musk.gn,imp. <u>Py.</u> <u>Sl.</u> ved 3.10-3.25.	50-60°					
3.80 - 4.90	1.10	hbl.gn.	Mørk mlk,gr.førende 1-3 mm.	50°					
4.90 - 6.00	1.10	2 gl.gn.m/ skarn.	Rel.lys mlk,vekslende m/ Musk.biot,imp. <u>Py.</u> <u>Sl.</u>	45°					
6.00 - 7.80	1.80	hbl.gn.	Mørk mlk,litt vekslende med hbl.biot.band,gr. førende 1-4 mm,imp. <u>Py.</u> Foldet.	45-70°					
7.80 - 12.00	4.20	2 gl.gn.	Rel.lys mlk,vekslende med biot.Musk,skarn band med stripet <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	60-70°	0,61	0,39	3,67		
12.00 - 13.50	1.50	hbl.gn.	Mørk mlk,smale hbl.biot. band m/ <u>Py.</u>	70-80°					
13.50 - 20.00	6.50	hbl.biot.gn.	Mørk mlk,vekslende mellom hbl.biot,biot.hbl.gn., samt band av 2 gl.gn.Imp. <u>Py.</u> Spor gr. 1-3 mm.	80°					

27.2.1984

Stellan Burman

Lokalitet: 44.080

Borehull: 1087

Dato: Feb.-84
 Koordinator: X: 925.417,4 Y: 44.075,8
 Retning: N
 Helling/stigning: + 60°
 Høyde: - 63.0
 Lengde: 29.00

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.30	5.30	2 gl.gn. Rel.lys mlk, enkelte biot. rike band m/imp. Py.	50-60°						
5.30 - 6.10	0.80	hbl.gn. Mørk mlk, gr. førende 1-4 mm.	70-80°						
6.10 - 6.40	0.30	Pegm.							
6.40 - 7.40	1.00	hbl.gn. Mørk mlk, gr. førende 1-4 mm.	80°						
7.40 - 21.20	13.80	2 gl.gn. Rel.lys mlk, enstaka opp til 5 cm tykke biot.gn. band m/imp. Py. Spor Sl. ved 7.70.9.50.15.20-15.40. 16.25-16.35, 18.80-19.00							
21.20 - 29.00	7.80	hbl.gn. Mørk mlk, en viss overgang med hbl.biot.gn. til hbl.gn.m/Amf.preg. gr. førende 1-3 mm.	70° 50-60°						

24.2.1984

Stellan Burman

Lokalitet: 42.070

Borehull: 1086

Dato : Feb.-84
 Koordinater : X: 925.404,8 Y: 42.069,2
 Retning : S
 Helling/stigning: - 80°
 Høyde : + 10.8
 Lengde : 50.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 43.70	43.70	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm enstaka opp til 5 cm tykke Pegm.band.	70-80°	0.09	0.16	0.30			42.70 - 43.70
43.70 - 48.40	4.70	" " Rel.lys litt vekslende m/musk.biot.gn.Imp.stri- per <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	70-90°	0.30	0.18	1.16			43.70 - 45.00
				0.62	0.44	4.43			45.00 - 48.40
48.40 - 50.00	1.60	" " Lys mlk, enstaka cm tykke hbl.gn.band, m/gr.1-2 mm.	80°	0.04	0.04	0.06			48.40 - 49.40
20/2-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 42.070

Borehull: 1085

Dato : Feb.-84
 Koordinater : X: 925.406,5 Y: 42.068,6
 Retning : N
 Helling/stigning: - 70°
 Høyde : + 11.0
 Lengde : 53.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 44.50	44.50	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm enstaka opp til 5 cm tyk- ke Pegm.band.	45-50° 50-70°						
44.50 - 44.90	0.40	biot.gn. Mørk mlk,foldet,spor <u>Sl.</u> <u>Py.</u>							
44.90 - 47.00	2.10	2 gl.gn. Rel.lys mlk,svak imp. <u>Py.</u> spor <u>Sl.</u>	70°						
47.00 - 53.00	6.00	hbl.gn. Mørk mlk,gr.førende,til- dels rik 1-3 mm,i början litt vekslende m/biot. hbl.gn,mot slutten Amfi- bolitisk.	70-90°						
8/2-84									
Stellan Burman									

Borehull: 1084

Koordinater : X: 925.405,0 Y: 42.069,4

Helling/stigning: -90°

Høyde : + 10.8

Lengde : 53.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 41.20	41.20	2 gl.gn. Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm,enstaka cm tykke hbl.gn. band.	70-90°						
41.20 - 47.70	6.50	biot.gn. Rel.mørk,vekslende med 2 gl.gn.band,Pegm.band, stripet imp.Sl.Cp.Gn.Py.	70-80°	0.57	0.42	2.65			41.20 - 44.70
				0.26	0.16	0.98			
47.70 - 50.00	2.30	2 gl.gn. Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm.,enstaka biot.gn. band.	80-90°						
50.00 - 53.30	3.30	hbl.gn. Mørk mlk,gr.rik,tildels sticktolitisk.	80-90°						
7/2-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 42.080

Dato : Jan.-84

Koordinater : X: 925.405,3 Y: 42.079,8

Retning : S

Helling/stigning: + 70°

Høyde : + 14.9

Lengde : 29.30 m

Borehull: 1083

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.40	6.40	2 gl.gn. Rel.lys mlk,delvis band- ad m/cm smale biot.rike band,sprette gr.1-3 mm.	80°						
0.00 - 8.10	1.70	Pegm.							
8.10 - 21.00	12.90	2 gl.gn. Se oven. Fr. 10.50 sprette hbl.gn. band.	80°						
21.00 - 23.80	2.80	" " Rel.lys mlk,striper/band m/skarn.musk.gn. m.Sl. Cp.Gn.Py.	70-80°	0,42	0,60	2,60			
23.80 - 25.10	1.30	musk.gn. Lys mlk,svak imp.Py.	70-80°	0,35	0,13	0,13			
25.10 - 29.30	4.20	2 gl.gn.skarn. Rel.lys mlk,stripet imp Sl.Cp.Gn.Py.	70-80°	0,69 0,38	0,46 0,43	6,38 1,82			25,0 - 27,00 27,00 - 29,50
2/2-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 42.080

Borehull: 1082

Dato : Jan.-84

Koordinater : X: 925.408,4 Y: 42.080,7

Retning : N

Helling/stigning: + 70°

Høyde : + 14.6

Lengde : 50.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	2 gl.gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3mm	60°					
0.50 - 1.10	0.60	biot.gn.	Mørk mlk-grovt,spor hbl. imp.striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> <u>Po.</u>	60°					
1.10 - 50.00	48.90	2 gl.gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3mm enkelte cm tykke biot. rikere band m/spor hbl. samt imp. <u>Py.</u> (Fr.12.50- 15.00 m hbl.førende og enstaka hbl.gn.band). Fr. 21.00 delvis hbl. førende,ved 42.80 <u>Sl.</u>	60-70°					

26/1-84

Stellan Burman

Borehull: 1081

Dato : Jan.-84
Koordinater : X: 925.406,8 Y: 42.080,3
Retning : opp
Helling/stigning: + 90°
Høyde : + 15.1
Lengde : 42.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 34.10	34.10	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm enkelte cm tykke biot. band. Fr. 27.80-27.90 <u>Sl.</u>	80-90°						
34.10 - 35.10	1.00	2 gl.gn. skarn. God <u>malm.</u>		0,12	1,27	6,88			
35.10 - 35.60	0.50	Musk.gn. Lys mlk, imp. <u>Py.</u> Spor <u>Sl.</u>	80°	0,09	0,31	0,51			
35.60 - 36.10	0.50	skarn. <u>Sl.Cp.Py.Gn.</u>		0,28	3,77	3,58			
36.10 - 37.70	0.60	2 gl.gn. Lys mlk, imp. <u>Py.</u> Spor <u>Sl.</u>	70°	0,09	0,24	0,41			
37.70 - 38.10	0.40	skarn. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>		0,06	1,97	5,16			
38.10 - 42.00	3.90	2 gl.gn. Lys mlk, imp. Py. Musk. rik	80-90						
		26/1-84							
		Stellan Burman							

Lokalitet: 42.080

Borehull: 1080

Dato : Jan.-84
 Koordinater : X: 925.409,1 Y: 42.080,6
 Retning : N
 Helling/stigning : + 10°
 Høyde : + 12.4
 Lengde : 16.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	Komp.Malm		3.01	0.49	15.92			
0.50 - 1.00	0.50	2 gl.gn. Rel.lys mlk,stripet imp. Sl.Cp.Gn.Py.	10°	0.41	0.19	1.91			
1.00 - 16.30	15.30	" " Lys mlk,enkelte musk.biot. band.Fr. 12.50-12.60 <u>Sl.</u>	5-15°						
		2/2-84 Stellan Burman							

Lokalitet: 44.725

Dato Jan.-84
 Koordinator X: 925.494,5 Y: 44.725,9
 Retning S
 Helling/stigning: Horizontal
 Høyde = 67,6
 Lengde = 11,20 m

Borehall: 1079

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 2,00	2,00	musk, biot, gn.	Rel. lys mlk-grø, ondulerad, imp, Sl, Cp, Gn, Py.	0-10 ⁰ 0,39	0,06	2,52			0-100
				0,31	0,13	1,18			100-200
2,00 - 4,00	2,00	biot, musk, gn.	Mørk mlk-grø, enkelte opp til dm tykke pegm, band, foldet imp, Sl, Cp, Gn, Py.	0-15 ⁰ 0,56	0,38	0,98			200-300
				0,36	0,29	1,80			300-400
4,00 - 9,80	5,80	biot, gn.	Rel. mørk mlk, vekslende m/biot, hbl, gn., 2 gl, gn, hbl, førende, sprettede, gr, 1-2 mm, delvis imp, Py, foldet.	5-25 ⁰					
9,80 - 11,20	1,40	hbl, gn.	Mørk mlk, gr, førende 1-4mm						

13.1.84

Stellan Rasmussen

Lokalitet: 44.725

Borehull. 1078

Dato : Jan.-84
Koordinater : X: 925.494,5 Y: 44.725,9
Retning : S
Helling/stigning: -10^0
Høyde : $-68,2$
Lengde : 11.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.00	6.00	biot. gn. Mørk mlk. litt variert m/ musk. biot. gn. Stripet imp. Sl. Gp. Co. Py. Po. Foldet.	0-10 ⁰	0,76	0,40	2,76			
6.00 - 10.00	4.00	2 gl. gn. Lys mlk. Sprøtte gr. 1-3 mm. Svag imp. Py.	10 ⁰						
10.00 - 11.30	1.30	bbt. gn. Mørk mlk. gr. førende 2-4 mm.	0-10 ⁰						
10.1.84 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.725

Borehull. 1077

Dato : Jan.-84

Koordinater : X: 925.494,5 Y: 44.725,9

Retning : S

Helling/stigning: - 25°

Hoyde : - 68,8

Lengde : 12,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 11.60	11.60	biot.gn. Mørk mlk, partier med halve kjerner av 2 gl.gn. slake folder, sprett imp. og striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> <u>Po.</u>	0-5°	0.38	0.24	0.97			0.00-7.00
				1.41	0.27	3.23			7.00-11.60
11.60 - 12.30	0.70	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm. 13.1.84 Stellan Burman	5°						

Lokalitet: 44.725

Borchull: 1076

Dato: Jan.-84
 Koordinator: X: 925.494,7 Y: 44.725,9
 Retning: S
 Helling/stigning: - 50°
 Høyde: - 69,1
 Lengde: - 8,30

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 8,30	8,30	2 g.f. ggr. lys mfk, sprøtt gr. 1-3 mm. 10,1,36 Stoffen Borchull	70°						

Lokalitet: 44.715

Borehull: 1075

Dato: Jan.-84

Koordinator: X: 925.492,3 Y: 44.714,9

Retning: S

Helling/stigning: - 25°

Høyde: - 68,1

Lengde: 8,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	2 gl.gn. Lys mlk, Svak imp. Sl.	25°	0.48	0.19	0.97			
1.00 - 4.10	3.10	biot.gn. Mörk mlk, spor hbl. Imp. Sl.	0-25°	0.67	0.27	1.35			
4.10 - 8.30	4.20	2 gl.gn. Rel. lys mlk. Enkelte biot. rike partier, sprett imp. Py. Sl. Slake folder.	0-25°	0.11	0.09	0.44			4.10 - 8.30
				0.68	0.22	2.40			5.10 - 8.30
		10.1.84 Stellan Burman							

Lokalitet: 44.715

Borchhol: 1074

Date Jan.-84

Koordinater : X: 925.492,3 Y: 44.714,9

Retning : S

Helling/stigning: -50°

Høyde : - 68,4

Lengde : 8,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 8,30	8,30	2 gl. gr. Lyn. mllk, upresle gr. 1-3 mm. 10.1.84 Stellan Barman	50°						

Lokalitet: 44.750

Borchull: 1073

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning: + 25°

Høyde

Lengde

Des.-84

X: 925.496,2 Y: 44.748,0

S

- 67,0

5,20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.50	4.50	2 gl. gn. Rel. lys mlk, biot. rike band m/Po, Py. Spor Sl. ved 3.50.	30-50°						
4.50 - 5.20	0.70	hbl. gn. Mørk mlk, sprette gr. 1-3mm	45°						
		10.1.84							
		Stellan Bursian							

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1072

Dato: Des.-83

Koordinater: X: 925.496,2 Y: 44.747,9

Retning: S

Helling/stigning: Horizontal

Høyde: - 67,7

Lengde: 11,60 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.80	3.80	Biot. gn. Mark mik-grov, foldet, imp. Py, Svak imp. Sl. Cp. Gn.	0-10 ⁰						
3.80 - 4.30	0.50	Pegm.							
4.30 - 11.40	7.10	2 gl. gn. b.d. Rel. lys mik, enkelte biot. rike partier, samt enkelte dm tykke Pegm. band, spredte gr. 1-3 mm, svak imp. Py.	0-10 ⁰						
13.1.86									
Stellan Bureman									

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1071

Dato Des.-83
 Koordinater X: 925.496,2 Y: 44.747,9
 Retning S
 Helling/stigning: - 50°
 Høyde - 69,2
 Lengde 11,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.50	8.50	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk, imp. Py. Sl. Fra 0.00-2.00 rel.rik imp. Sl.	10-15°						
8.50 - 11.30		biot.gn. Mørk mlk, spor hb1. dm tykke Pegm.band, foldet imp. Py.	0-20°						
		ET, 1,85							

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1070

Dato Des.-83
 Koordinator X: 925.496,3 Y: 44.747,4
 Retning S
 Helling/stigning: - 50°
 Høyde: - 69,5
 Lengde: 11.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prova m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.50	4.50	2 gl.gn. lys mlk, foldet, imp. Sl. Cp. Py. Gn.	70-50°						
4.50 - 11.20	6.70	2 gl.gn. lys mlk, sprette gr. 1-3mm	45-60°						
13.1.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1069

Dato

Des.-83

Koordinater

X: 925.497,1 Y: 44.747,9

Retning

S

Helling/stigning:

- 70°

Høyde

- 69,6

Lengde

12,70 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.80	5.80	2 gl. gr., lys mlk, enkelte opp til 5 cm tykke mørk gr. band m/St. Py. Cp. Gn. sprette gr. 1-2 mm.	70°						
5.80 - 12.70	6.90	2 gl. gr., lys mlk, sprette gr. 1-3mm	80-90°						
13.1.84									
St-Elin Borings									

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1068

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning: - 90°

Høyde : - 69,5

Lengde : 12,70 m

Des. -83

X: 925.499,2 Y: 44.747,9

Lodd

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 3,20	3,20	hiet, gn.	Mørk mlk, enkelte 2 gl, gn. 70-80° band, Imp, St, Co, Ch, Py.						
3,20 - 12,70	9,50	2 gl, gn.	Lys mlk, sprette gr. 1-3mm 80-90°						
		13.1.84							
		Stellan Borchsenius							

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1067

Dato : Des.-83
 Koordinater : X: 925.501,3 Y: 44.750,9
 Retning : N
 Helling/stigning: - 70°
 Høyde : - 69,7
 Lengde : 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	hbl.biot.gn. Mørk mlk, imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	45°	1.80	0.36	5.80			
0.50 - 2.50	2.00	2 gl.gn. Rel.lys mlk, delvis bandad m/hbl.biot.gn., foldet imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	45°	0.53	0.30	0.98			0.50 - 1.50
				0.47	0.16	2.23			1.50 - 2.50
2.50 - 8.30	5.80	2 gl.gn. Lys mlk, enkelte hbl.gn. band, sprette gr. 1-3 mm.	45-50°						

4/1-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.750

Dato : Des.-83
 Koordinater : X: 925.503,0 Y: 44.750,9
 Retning : N
 Helling/stigning: + 5°
 Høyde : - 67,4
 Lengde : 8,30 m

Borehull: 1066

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 0,40	0,40	bløt. gn.	Mørk mik-grov, spor hbl.	20 ⁰					
0,40 - 8,30	7,90	2 gl. gn.	Lys mik, sprette gr. 1-3mm enstaka em tykke hbl. gn. band.	5-25 ⁰					
		4,1,84							
		Stellan Burman							

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1065

Dato Des.-83
 Koordinator X: 925.503,0 Y: 44.750,9
 Retning N
 Helling/stigning: + 25°
 Høyde : - 68,0
 Lengde : 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.30	8.30	2 gl. gn. lys mlk, sprette gr. 1-2mm fra 0.50-0.70 <u>lys SL</u> 4.1.84 Stellan Burman	0.10 ⁰						

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1064

Dato: Des.-83
 Koordinator: X: 925.503,1 Y: 44.750,6
 Retning: N
 Helling/stigning: - 25°
 Høyde: - 69,1
 Lengde: 8,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% R	% Fe	
0,00 - 8,30	8,30	2 gl.pn. Rel. lys mlk, enkelte hbl. gn. band, sprøttre: gn. l=3mm 4.1.84 Stellan Burman	0-25°						

Lokalitet: 44.750

Borehull: 1063

Dato Des.-84
 Koordinator X: 925.502,7 Y: 44.750,6
 Retning N
 Helling/stigning: - 50°
 Høyde : - 69,4
 Lengde : 8,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 8,30	8,30	2 gl.gn. lys mlk, enkelte små libl.gn.band, sprette gr. 1-3 mm, sl. ved 1,85-1,90. 4.1.84 Stellan Burman	45°						

Borehull: 1062

Dato : Des. -83
Koordinater : X: 925.385,0 Y: 41.986,5
Retning : Lodd
Helling/stigning: - 90°
Høyde : - 20,3
Lengde : 29.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	2 gl.gn.m/skarn Rel.lys mlk,skiktad m/biot Stripet <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	70-90°	1.26	1.15	6.98			
2.00 - 6.50	4.50	biot.gn. Mørk mlk,stripet imp. <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Po.Py.</u>	70-90°	0.09	0.09	0.29			2.00 - 3.50
				0.32	0.42	3.58			3.50 - 6.50
6.50 - 12.50	6.00	2 gl.gn. Lys mlk,sprette gr.1-3 mm	80°						
12.50 - 13.70	1.20	Pegm.							
13.70 - 21.10		2 gl.gn. Se ovan.	70-80°						
21.10 - 21.40	0.30	Amf. Mørk mlk.	70°						
21.40 - 29.30		2 gl.gn. Se ovan.	70°						

23/1-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.990

Borehull: 1061

Dato : Des.-83
 Koordinater : X: 925.391,9 Y: 41.986,5
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : + 20,5
 Lengde : 32,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.00	7.00	biot.gn. Mørk mlk-grøt-mlk, bandad med 2 gl.gn.band. Fra 0.00 - 1.00 delvis skarn, stripet imp. St. Cp. Gn. Py. Enkelte komp. malm band.	80-90°	0.82	0.48	4.33			
7.00 - 14.80	7.80	2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm enstaka libl. biot.gn. band.	80-90°	0.24	0.04	0.10			Zoo - 8.00
14.80 - 15.60	0.80	libl.gn. Mørk mlk, gr. førende 1-4mm	70-80°						
15.60 - 19.50	3.90	2 gl.gn. Rel. lys mlk, foldet m/libl. gn. band.	45° 45°						
19.50 - 32.30		2 gl.gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm, enstaka libl. biot.gn. band.							
4.1.84									
Stelland Borehull									