

17/8

Sammen med Per Bøe ble området i Jisdalen til denne krysser Kildalen undersøkt.

Dalen er relativt lett tilgjengelig på sydsiden. Herfra ser man tydelig en rustsone i fjellsiden nord for dalen. Innerst i dalen krysser sonen dalbunnen, men den synes utelukkende å bestå av svakt mineralisert og rusten glimmerskifer.

På motsatt side av Kildalen er det likeledes to markerte rustsoner. Samme type glimmerskifer ble funnet i begge disse. Det var hverken tegn til rusthatt eller impregnasjonsmalm.

20/8

Sammen med Bøe og Ringstad ble områdene omkring Jerta, Gatkevuobme og Råggejákka til Čannoai^vvi vuolit undersøkt.

Hyolitus-sonens bergarter med overliggende sparagmit danner flere steder isolerte "øyer" i grunnfjell. Blant annet er dette tilfelle i Jerta-området og på Čannoai^vvi-toppene. Hyolitus-sonens underste lag synes overalt å være overdekket av ur. Grunnfjellet er bare sparsomt blottet, men utgjør ialt vesentlig massiv og lite foliert gneis-granitt. På nordvest-siden av Råggejákka 610 moh. forekommer en mindre rustsone, bestående av finkornet, grafit-førende, grå glimmerskifer. Forøvrig ble ikke spesielt mineraliserte bergarter funnet.