




- g GRÅ GNEIS alminnelig type (lyse, finkornete, ofte homogene gneiser)
- a GRÅ GNEIS biotitt preget type
- m GRÅ GNEIS biotitt dominert type
- g AMFIBOLITT
- a MAFISK BIOTITTGNEIS / biotittrik AMFIBOLITT
- m HORNBLENDEGNEIS D-TYPE: mest mellomkornet og pyritt-impregner
- g HORNBLLENDE-BIOTITTGNEIS
- a BIOTITTGNEIS
- m MUSKOVITT-BIOTITTGNEIS
- g MUSKOVITTGNEIS ± pyritt-impregnasjoner
- a KERATOFYR (ke), "KVARTSITT" (kv)
- m PEGMATITT (P), KVARTSÅR (Q)
- g SKARN / skarnførende, i grønn
- a amfibolitt preg
- m grå gneis preg
- g biotittgneis preg (grå gneis)
- a hornblende-førende / hornblendegneis preg
- m muskovitt- " / muskovittgneis preg
- g disthen- " / omdannet disthengneis (D)
- a staurolitt- "
- m pyritt (py) / pyrrhotitt (po) impregnasjon
- g stictolittisk (med granat)
- a dårlig (impregnasjons-) malm < 2% Zn
- m middels (stripet) malm 2-3% Zn
- g god (stripet) malm 3-4% Zn
- a meget god ("homogen") malm > 4% Zn
- m bånding / foliasjon (2 muligheter)
- g folder
- a åpne folder
- m spisse folder
- g avviksmålt

Dato / Revidert	Konstr. Tegnet	Godkjent / Kfr.	Målestokk
4-1987	A.K.	A. KRUSE	1: 1.000
Arkivnr.	Observer	Kartbladnr.	
19-20 Å	DV 193-5-3		
KVERNBEKKTJERN		BORPROFILER	
PROSPEKTERING A/S		BILAG 8704-3	