




- g { GRÅ GNEIS alminnelig type } (lyse, finkornete,
GRÅ GNEIS biotitt preget type } ofte homogene
GRÅ GNEIS biotitt dominert type } gneiser)
a { AMFIBOLITT
MAFISK BIOTITTGNEIS / biotittrik AMFIBOLITT
HORNBLENDEGNEIS } D-TYPE:
HORNBLENDE-BIOTITTGNEIS } mest mellomkornet
BIOTITTGNEIS } og pyritt-
MUSKOVITT-BIOTITTGNEIS } impregneret
m { MUSKOVITTGNEIS : pyritt-impregnasjoner
KERATOFYR (ke), "KVARTSITT" (kv)
PEGMATITT (P), KVARTSÅR (Q)
SKARN / skarnforende, (grågrønn)
amfibolitt preg
grå gneis preg
biotittgneis preg (grå gneis)
hornblende-førende / hornblendegneis preg
muskovitt- " / muskovittgneis preg
disthen- " / omdannet disthengneis (D)
stauroitt- "
pyritt (py) / pyrrhotitt (po) impregnasjon
stictolittisk (med granat)
dårlig (impregnasjons-) malm < 2% Zn
middels (stripet) malm 2-3% Zn
god (stripet) malm 3-4% Zn
meget god ("homogen") malm > 4% Zn
bånding / foliasjon (2 muligheter)
folder
åpne folder
spisse folder
avviksmålt
masseakse (antatt)

Dato / Revidert	Konstr / Tegnet	Godkjent / Kfr.	Målestokk
3-1987	A.K.	A.KRUSÉ	
Arkivnr.	Observer	Kartbladnr.	1: 1.000
19-17 Å		DU 193-S-2	
MOFJELL VEST		PROFIL	44.200 Y
PROSPEKTERING A/S		BILAG	8703-3

8858