




- To-gl.gn. alminnelig type
 - To-gl.gn. alminnelig-biotit preget type
 - To-gl.gn. biotit preget type
 - To-gl.gn. biotit preget-biotit dominert type
 - To-gl.gn. biotit dominert type
- TO-GLIMMERGNEIS
(lyse, fink. ofte ho-
mogene gneiser)
- AMFIBOLITT
- MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
- HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- HORNBLLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- D: disthen førende, (D): -omdannet disthengneis-
- MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
- *KVARTSIT* (keratophyr)
- PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)
- tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
- SKARN, grågrøn
- A amfibolitt preg
- H hornblendegneis preg / hornblende førende
- B biotitgneis preg (to-gl.gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
- T to-glimmergneis preg
- M muskovitgneis preg / muskovit førende
- pyrit / pyrrhotit impregnasjon
- staurolit
- stictolitisk (m. granat)
- dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
- middels (stripet) malm 2 - 3 % Zn
- god (stripet) malm 3 - 4 % Zn
- meget god (+homogen-) malm > 4 % Zn

- BÅNDET BIOTITGNEIS
- MARMOR
- DOLOMITT
- UREN MARMOR
- KALKSILIKATGNEIS
- ZOISITT-GRAFITT-GLIMMERGNEIS

1807 Å