




- To-gl. gn. alminnelig type
- To-gl. gn. alminnelig-biotit preget type
- To-gl. gn. biotit preget type
- To-gl. gn. biotit preget-biotit dominert type
- To-gl. gn. biotit dominert type
- TO-GLIMMERGNEIS (lyse, fink. ofte homogene gneiser)
- AMFIBOLITT
- MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
- HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- HORNBLLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis
- MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
- *KVARTSIT* (keratophyr)
- PEGMATIT (P), KVARTSAR (Q)
- tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
- SKARN, grågrøn
- amfibolitt preg
- hornblendegneis preg / hornblende førende
- biotitgneis preg (to-gl. gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
- to-glimmergneis preg
- muskovitgneis preg / muskovit førende
- pyrit / pyrrhotit impregnasjon
- staurolit
- stictolitisk (m. granat)
- dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
- middels (stripet) malm 2-3 % Zn
- god (stripet) malm 3-4 % Zn
- meget god (-homogen-) malm > 4 % Zn

MOFJELLET GRUBER		M = 1		TEGN	A. K. K.
500		500		TRAC	24.11.82
PROFIL 44.847 Y		KFR		REV	12.82
KART NR.		ARKIV NR.			