
X 925.440
420
400
380
360
340
-40
-60
-80
-100
432
433
434
444
445
446
447
446 og 447: malmprøver tatt ut til analyse
Kjernene ikke beskrevet
To-gl.gn. alminnelig type
To-gl.gn. alminnelig-biotit preget type
To-gl.gn. biotit preget type
To-gl.gn. biotit preget biotit dominert type
To-gl.gn. biotit dominert type
TO-GLIMMERGNEIS (lyse, fink, ofte homogene gneiser)
AMFIBOLITT
MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
HORNBLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
D-disthen førende, (D): =omdannet disthengneis=
MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
=KVARTSIT= (keratophyr)
PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)
tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
SKARN, grågrøn
amfibolitt preg
hornblendegneis preg / hornblende førende
biotitgneis preg (to-gl.gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
to-glimmergneis preg
muskovitgneis preg / muskovit førende
pyrit / pyrrhotit impregnasjon
staurolitt
sticlolitisk (m. granat)
dårlig (impregnasjons-) malm < 2% Zn
middels (stripet) malm 2-3% Zn
god (stripet) malm 3-4% Zn
meget god (-homogen-) malm > 4% Zn
8998
MOFJELLET GRUBER
43.930 Y
M = 1
200
TEGN.
TRAC.
KFR.
REV.
10-1978
A. Krause
KART NR.
ARKIV NR.