



- To-gl.gn. alminnelig type
 - To-gl.gn. alminnelig-biotit preget type
 - To-gl.gn. biotit preget type
 - To-gl.gn. biotit preget-biotit domineret type
 - To-gl.gn. biotit domineret type
- TO-GLIMMERGNEIS
(lyse, fink. ofte homogene gneiser)
- AMFIBOLITT
 - MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
 - HORNBLENDEGNEIS, mest mik., pyrit impr.
 - HORNBLENDE-BIOTITGNEIS, mest mik., pyrit impr.
 - BIOTITGNEIS, mest mik., pyrit impr.
 - D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis
 - MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mik., pyrit impr.
 - MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
 - *KVARTSIT* (keratophyr)
 - PEGMATIT (P), KVARTSAR (Q)
 - tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
 - SKARN, grågrøn
 - amfibolitt preg
 - hornblendegneis preg / hornblende førende
 - biotitgneis preg (to-gl.gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
 - to-glimmergneis preg
 - muskovitgneis preg / muskovit førende
 - pyrit / pyrrhotit impregnasjon
 - staurolit
 - stictolithisk (m. granat)
- dårlig (impregnasjons-) malm < 2% Zn
 - middeis (stripet) malm 2-3% Zn
 - god (stripet) malm 3-4% Zn
 - meget god (-homogen-) malm > 4% Zn

9000

MOFJELLET GRUBER		M = 1	TEGN	10-1978
			TRAC.	A.Kruse
43.890 Y		200	KFR	
			REV	
KART NR.				
ARKIV NR.				