




- To-gl.gn. alminnelig type
  - To-gl.gn. alminnelig-biotit preget type
  - To-gl.gn. biotit preget type
  - To-gl.gn. biotit preget-biotit dominert type
  - To-gl.gn. biotit dominert type
- TO-GLIMMERGNEIS  
(lyse, fink. ofte homogene gneiser)
- AMFIBOLITT
- MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
- HORNBLÉNDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- HORNBLÉNDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis
- MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
- \*KVARTSIT\* (keratophyr)
- PEGMATIT (P), KVARTSAR (Q)
- tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
- SKARN, grågrøn
- amfibolitt preg
- hornbléndegneis preg / hornblende førende
- biotitgneis preg (to-gl.gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
- to-glimmergneis preg
- muskovitgneis preg / muskovit førende
- pyrit/pyrrhotit impregnasjon
- staurolit
- stictolitisk (m. granat)
- dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
- middels (stripet) malm 2 - 3 % Zn
- god (stripet) malm 3 - 4 % Zn
- meget god (-homogen-) malm > 4 % Zn

avviksmålt: 405

9004

|                     |              |           |         |
|---------------------|--------------|-----------|---------|
| MOFJELLET<br>GRUBER | M = 1<br>200 | TEGN.     | 10-1978 |
|                     |              | TRAC.     |         |
|                     |              | KFR       | A.Kruse |
|                     |              | REV       |         |
| 43.670 Y            |              | KART NR.  |         |
|                     |              | ARKIV NR. |         |