

X 925.480

460

440

420

400

-60

-80

-100

-120

X 925.480

460


440

420

400

To-gl.gn. alminnelig type
To-gl.gn. alminnelig-biotit preget type
To-gl.gn. biotit preget type
To-gl.gn. biotit preget-biotit dominert type
To-gl.gn. biotit dominert type
AMFIBOLITT
MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
HORNBLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis-
MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
KVARTSIT (keratophyr)
PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)
tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
SKARN, grågrøn
amfibolitt preg
hornblendegneis preg / hornblende førende
biotitgneis preg (to-gl.gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
to-glimmergneis preg
muskovitgneis preg / muskovit førende
pyrit / pyrrhotit impregnasjon
staurolit
stictolitisk (m. granat)
dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
middels (stripet) malm 2 - 3 % Zn
god (stripet) malm 3 - 4 % Zn
meget god (-homogen-) malm > 4 % Zn

TO-GLIMMERGNEIS
(lyse, fink. ofte ho-
mogene gneiser)



- 9009

**MOFJELLET
GRUBER**

PROFIL 44.900 Y

**M = 1
200**

KART NR.

ARKIV NR.

TEGN.	
TRAC.	
KFR.	A.K.
REV.	3-81