
X 925.540
520
500
480
460
-60
-80
-100
-120
632
633
634
629
728
729
730
3,4
1,1
7,7
1,2
7,3
9,7
3,2
4,5
0,4
1,5
To-gl.gn. alminnelig type
To-gl.gn. alminnelig-biotit preget type
To-gl.gn. biotit preget type
To-gl.gn. biotit preget-biotit dominert type
To-gl.gn. biotit dominert type
TO-GLIMMERGNEIS (lyse, fink. ofte homogene gneiser)
AMFIBOLITT
MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
HORNBLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
D: disthen førende, (D): »omdannet disthengneis«
MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
MUSKOVITGNEIS, +/÷ pyrit impr.
»KVARTSIT« (keratophyr)
PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)
tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
SKARN, grågrøn
amfibolitt preg
hornblendegneis preg / hornblende førende
biotitgneis preg (to-gl.gn.)/ biotit førende (øvrige bergarter)
to-glimmergneis preg
muskovitgneis preg / muskovit førende
pyrit / pyrrhotit impregnasjon
staurolit
stictolitisk (m. granat)
dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
middels (stripet) malm 2 - 3 % Zn
god (stripet) malm 3 - 4 % Zn
meget god (»homogen«) malm > 4 % Zn
9019
MOFJELLET GRUBER
PROFIL 44.570 Y
M = 1 200
TEGN.
TRAC.
KFR. A.K.
REV. 3-81
KART NR.
ARKIV NR.