

To-gl.gn. alminnelig type
 To-gl.gn. alminnelig-biotitt preget type
 To-gl.gn. biotitt preget type
 To-gl.gn. biotitt preget-biotitt dominert type
 To-gl.gn. biotitt dominert type

TO-GLIMMERGNEIS
 (lyse, fink. ofte ho-
 mogene gneiser)

AMFIBOLITT

MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT

HORNLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.

HORNLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.

BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.

D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis

MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.

MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.

KVARTSIT (keratophyr)

PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)

tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)

SKARN, grågrøn

amfibolitt preg

hornblendegneis preg / hornblende førende

biotitgneis preg (to-gl.gn.) / biotitt førende (øvrige bergarter)

to-glimmergneis preg

muskovitgneis preg / muskovit førende

pyrit / pyrrhotitt impregnasjon

staurolitt





stictolitisk (m. granat)

dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn

middels (stripet) malm 2-3 % Zn

god (stripet) malm 3-4 % Zn

meget god (*homogen*) malm > 4 % Zn



9028

MØFJELLET
 GRUBER

M = 1

TEGN.	
TRAC.	
KFR.	
REV.	
KART NR.	
ARKIV NR.	