




- To-gl.gn. alminnelig type
 - To-gl.gn. alminnelig-biotit preget type
 - To-gl.gn. biotit preget type
 - To-gl.gn. biotit preget-biotit dominert type
 - To-gl.gn. biotit dominert type
- TO-GLIMMERGNEIS
(lyse, fink. ofte homogene gneiser)
- AMFIBOLITT
MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
HORNBLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis
MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
KVARTSIT (keratophyr)
PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)
tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
SKARN, grågrøn
amfibolitt preg
hornblendegneis preg / hornblende førende
biotitgneis preg (to-gl.gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
to-glimmergneis preg
muskovitgneis preg / muskovit førende
pyrit / pyrrhotit impregnasjon
staurolit
stictolitisk (m. granat)
dårlig (impregnasjons-) malm < 2% Zn
middels (stripet) malm 2-3 % Zn
god (stripet) malm 3-4 % Zn
meget god (+homogen-) malm > 4 % Zn

451 står +50° mot E
487 står +78° mot W
E-W avstand mellom
hullbegyn.: 2.1 m

9038

MOFJELLET GRUBER profil Y 44.180	M = 1: 200	1497 54/11/77 A.K. 9-78
BERGVERKSSELSKAPET NORD-NORGE AS		3-8/