
X 925.440
420
400
380
360
-40
-60
-80
-100
551
550
707
706
708
Ingen malm
554
borét til -96 m hbl.gn.
552
553
457
grå gn.
To-gl.gn. alminnelig type
To-gl.gn. alminnelig-biotit preget type
To-gl.gn. biotit preget type
To-gl.gn. biotit preget-biotit dominert type
To-gl.gn. biotit dominert type
TO-GLIMMERGNEIS (lyse, fink. ofte homogene gneiser)
AMFIBOLITT
MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
HORNBLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
D: disthen førende, (D): •omdannet disthengneis•
MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
MUSKOVITGNEIS, +/÷ pyrit impr.
•KVARTSIT• (keratophyr)
PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)
tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
SKARN, grågrøn
amfibolitt preg
hornblendegneis preg / hornblende førende
biotitgneis preg (to-gl.gn.)/ biotit førende (øvrige bergarter)
to-glimmergneis preg
muskovitgneis preg / muskovit førende
pyrit / pyrrhotit impregnasjon
staurolit
stictolitisk (m. granat)
dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
middels (stripet) malm 2 - 3 % Zn
god (stripet) malm 3 - 4 % Zn
meget god (•homogen•) malm > 4 % Zn
9042
MOFJELLET GRUBER
44.115 Y
M = 1
200
TEGN.
TRAC.
KFR.
REV.
1.1979
A. Kruse
3-81
KART NR.
ARKIV NR.