




- To-gl. gn. alminnelig type
To-gl. gn. alminnelig-biotit preget type
To-gl. gn. biotit preget type
To-gl. gn. biotit preget-biotit dominert type
To-gl. gn. biotit dominert type
- TO-GLIMMERGNEIS
(lyse, fink. ofte ho-
mogene gneiser)
- AMFIBOLITT
MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
HORNBLENDEGNEIS, mest mk., pyrit impr.
HORNBLENDE-BIOTITGNEIS, mest mk., pyrit impr.
BIOTITGNEIS, mest mk., pyrit impr.
D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis
MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mk., pyrit impr.
MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
KVARTSIT (keratophyr)
PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)
tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
SKARN, grågrøn
amfibolitt preg
hornblendegneis preg / hornblende førende
biotitgneis preg (to-gl. gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
to-glimmergneis preg
muskovitgneis preg / muskovit førende
pyrit/pyrrhotit impregnasjon
staurolit
stictolitisk (m. granat)
- dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
middels (stripet) malm 2-3 % Zn
god (stripet) malm 3-4 % Zn
meget god (-homogen-) malm > 4 % Zn

9052

MOFJELLET GRUBER		M = 1	TEGN.	10-1978
43.890 Y		200	TRAC.	A. Kruse
			KFR	
			REV.	3-81
			KART NR.	
			ARKIV NR.	