




- To-gl.gn. alminnelig type
To-gl.gn. alminnelig-biotitt preget type
To-gl.gn. biotitt preget type
To-gl.gn. biotitt preget-biotitt dominert type
To-gl.gn. biotitt dominert type
- GRÅ GNEIS**
[TO-GLIMMERGNEIS]
(lyse, fink. ofte homogene gneiser)
- AMFIBOLITT
MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
HORNBLLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis
MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
KVARTSIT (keratophyr)
PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)
tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
SKARN, grågrøn
amfibolitt preg
hornblendegneis preg / hornblende førende
biotitgneis preg (to-gl.gn.) / biotitt førende (øvrige bergarter)
to-glimmergneis preg
muskovitgneis preg / muskovitt førende
pyrit/pyrrhotitt impregnasjon
staurolitt
stictolitisk (m. granat)
- dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
middels (stripet) malm 2-3 % Zn
god (stripet) malm 3-4 % Zn
meget god (-homogen-) malm > 4 % Zn

9055

59

MOFJELLET GRUBER	M = 1 200	TEGN.	
		TRAC.	AK
		KFR	
		REV	6-83
PROFIL 43.790 Y		KART NR.	
		ARKIV NR.	