

X 925.440

420

400

380

360

-40

-40

-60

-60

-80

-80

-100

-100

borhull
GM 1
925.476 X

X 925.440

420

400

380

360

9056

MOFJELLET
GRUBER

43.790 Y

M = 1 200	TEGN.	10-1978
	TRAC.	A. Kause
	KFR.	
	REV.	4-83
KART NR.		
ARKIV NR.		

To-gl.gn. alminnelig type
To-gl.gn. alminnelig-biotit preget type
To-gl.gn. biotit preget type
To-gl.gn. biotit preget-biotit dominert type
To-gl.gn. biotit dominert type
AMFIBOLITT
MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
HORNBLLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis
MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
KVARTSIT (keratophyr)
PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)
tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
SKARN, grågrøn
A amfibolitt preg
H hornblendegneis preg / hornblende førende
B biotitgneis preg (to-gl.gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
T to-glimmergneis preg
H muskovitgneis preg / muskovit førende
pyrit / pyrrhotit impregnasjon
staurolit
stictolitisk (m. granat)
dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
middels (stripet) malm 2-3 % Zn
god (stripet) malm 3-4 % Zn
meget god (-homogen-) malm > 4 % Zn

TO-GLIMMERGNEIS
(lyse, fink. ofte ho-
mogene gneiser)

598

599