



- To-gl.gn. alminnelig type
- To-gl.gn. alminnelig-biotit preget type
- To-gl.gn. biotit preget type
- To-gl.gn. biotit preget-biotit dominert type
- To-gl.gn. biotit dominert type
- TO-GLIMMERGNEIS (lyse, fink. ofte homogene gneiser)
- AMFIBOLITT
- MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
- HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- HORNBLLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis
- MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
- *KVARTSIT* (keratophyr)
- PEGMATIT (P), KVARTSAR (Q)
- tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
- SKARN, grågrøn
- amfibolitt preg
- hornblendegneis preg / hornblende førende
- biotitgneis preg (to-gl.gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
- to-glimmergneis preg
- muskovitgneis preg / muskovit førende
- pyrit / pyrrhotit impregnasjon
- staurolit
- stictolitisk (m. granat)
- dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
- middels (stripet) malm 2-3 % Zn
- god (stripet) malm 3-4 % Zn
- meget god (+homogen-) malm > 4 % Zn

9057

MOFJELLET GRUBER	M = 1 200	TEGN.	
		TRAC.	
		KFR.	AK
		REV.	3-81
PROFIL 43.755 Y		KART NR.	
		ARKIV NR.	