

X 925.300

340

320

300

280

-60

-60

LINSE II

-80

-80

LINSE III

-100

-100

-120

-120

X 925.360

340

320

300

280

forts. til
-38,6 m
(hbl.)

402

404

406

403

405*

avviksmålt: 405

- To-gl.gn. alminnelig type
 To-gl.gn. alminnelig-biotit preget type
 To-gl.gn. biotit preget type
 To-gl.gn. biotit preget-biotit dominert type
 To-gl.gn. biotit dominert type
- GRÅ GNEIS**
 [TO-GLIMMERGNEIS]
 (lyse, fink. ofte ho-
 mogene gneiser)
- AMFIBOLITT**
 MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
 HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
 HORNBLLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
 BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
 D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis
 MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
 MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
 KVARTSIT (keratophyr)
 PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)
 tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
 SKARN, grågrøn
 amfibolitt preg
 hornblendegneis preg / hornblende førende
 biotitgneis preg (to-gl.gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
 to-glimmergneis preg
 muskovitgneis preg / muskovit førende
 pyrit / pyrrhotit impregnasjon
 staurolit
 stictolitisk (m. granat)
- dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
 middels (stripet) malm 2-3 % Zn
 god (stripet) malm 3-4 % Zn
 meget god (homogen-) malm > 4 % Zn

9060

5f

MOFJELLET
GRUBER

43.670 Y

M = 1
200KART NR.
ARKIV NR.

TEGN.	10-1978
TRAC.	A. Kruse
KFR	6-83
REV	