




- To-gl. gn. alminnelig type
 To-gl. gn. alminnelig-biotit preget type
 To-gl. gn. biotit preget type
 To-gl. gn. biotit preget-biotit dominert type
 To-gl. gn. biotit dominert type
- TO-GLIMMERGNEIS
(lyse, fink. ofte homogene gneiser)
- AMFIBOLITT
 MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
 HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
 HORNBLLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
 BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
 D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis
 MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
 MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
 KVARTSIT (keratophyr)
 PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)
 tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
 SKARN, grågrøn
 amfibolitt preg
 hornblendegneis preg / hornblende førende
 biotitgneis preg (to-gl. gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
 to-glimmergneis preg
 muskovitgneis preg / muskovit førende
 pyrit/pyrrhotit impregnasjon
 staurolit
 stictolitisk (m. granat)
- dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
 middels (stripet) malm 2-3 % Zn
 god (stripet) malm 3-4 % Zn
 meget god («homogen») malm > 4 % Zn

9061

43.6504 -100

MOFJELLET GRUBE R	M = 1	TEGN.	
		TRAC.	
		KFR.	
		REV.	
KART NR.			
ARKIV NR.			

400