




- To-gl. gn. alminnelig type
To-gl. gn. alminnelig-biotit preget type
To-gl. gn. biotit preget type
To-gl. gn. biotit preget-biotit dominert type
To-gl. gn. biotit dominert type
- TO-GLIMMERGNEIS
(lyse, fink. ofte ho-
mogene gneiser)
- AMFIBOLITT
MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
HORNBLANDGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
HORNBLAND - BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
D: disten førende, (D): omdannet disthengneis
MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
KVARTSIT (keratophyr)
PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)
tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
SKARN, grågrøn
amfibolitt preg
hornblendegneis preg / hornblende førende
biotitgneis preg (to-gl. gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
to-glimmergneis preg
muskovitgneis preg / muskovit førende
pyrit / pyrrhotit impregnasjon
staurolitt
stictolitisk (m. granat)
dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
middels (stripet) malm 2 - 3 % Zn
god (stripet) malm 3 - 4 % Zn
meget god (-homogen-) malm > 4 % Zn

MOFJELLET GRUBER	M = 1 200	TEGN.	12-19 78
		TRAC.	A. Kruse
		KFR	3-8/
		REV	
43.590 Y		KART NR.	
		ARKIV NR.	