

X 925.300

360

340

320

300

-40

-60

-80

-100

X 925.380

360


340

320

300

- To-gl. gn. alminnelig type
To-gl. gn. alminnelig-biotit preget type
To-gl. gn. biotit preget type
To-gl. gn. biotit preget-biotit dominert type
To-gl. gn. biotit dominert type
AMFIBOLITT
MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
HORNBLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis
MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
KVARTSIT (keratophyr)
PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)
tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
SKARN, grågrøn
amfibolitt preg
hornblendegneis preg / hornblende førende
biotitgneis preg (to-gl. gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
to-glimmergneis preg
muskovitgneis preg / muskovit førende
pyrit / pyrrhotit impregnasjon
staurolit
stictolitisk (m. granat)
dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
middels (stripet) malm 2 - 3 % Zn
god (stripet) malm 3 - 4 % Zn
meget god (homogen-) malm > 4 % Zn

F → F forskyvning med relativ
bevegelsesretning,



5c

MOFJELLET GRUBER		M = 1	
PROFIL 43.375 Y		TEGN.	4-1983
		TRAC.	A. KRUSE
		KFR	
		REV	6-1983
KART NR.			
ARKIV NR.			

9071

-60

-80

-100