
130
150 S
170 S
190 S
210 S
X 925.400
-40
-60
-80
-100
d396
d395
d397
d 398
gr.biot.gn.
litt py
10,1
6,6
10,0
3,1
2,8
2,9
3,0
3,9
2,6
1,7
6,3
1,5
1,4
biot.rik gl.sk/gn
litt py
gl.gn.
gr.gl.gn.
gl.rik
gl.gn.
litt py
Cu-rik
ka.gl.gn.
gl.gn. litt py
BILSTOLL
dårlig (impregnasjons-) malm
middels (stripet) malm
god (stripet) malm
meget god ("homogen") malm
glimmergneis (± granat), udifferensiert
kalk-glimmergneis + kalksilikatgneis/fels
hornblende-glimmergneis (±granat)
amfibolitt (±granat)
(uren) marmor
pegmatoid (p), kvartsår (kv)
muskovittgneis
biotittgneis
i borhull.
% Zn i borhull er angitt
borhull
9072
ca 43.365 y
43.365
MOFJELLET GRUBER
profil 1950-1960 ø
M = 1:
200
tegn.
19.3.74
trac.
A. Krewse
kfr.
rev.
BERGVERKSELSKAPET
NORD-NORGE A/S
kart nr.
arkiv nr.
17-18 Å