

X 925.440

420

400

380

360

-20

-40

-60

-80

X 925.440

420

400

380

360

-40

-60

-80

bilstoll

560

557

558

- To-gl. gn. alminnelig type
To-gl. gn. alminnelig-biotit preget type
To-gl. gn. biotit preget type
To-gl. gn. biotit preget-biotit dominert type
To-gl. gn. biotit dominert type
AMFIBOLITT
MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
HORNBLLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis
MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
KVARTSIT (keratophyr)
PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)
tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
SKARN, grågrøn
amfibolitt preg
hornblendegneis preg / hornblende førende
biotitgneis preg (to-gl.gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
to-glimmergneis preg
muskovitgneis preg / muskovit førende
pyrit/pyrrhotit impregnasjon
staurolit
stictolitisk (m. granat)
dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
middels (stripet) malm 2-3 % Zn
god (stripet) malm 3-4 % Zn
meget god (-homogen-) malm > 4 % Zn

9079

MOFJELLET
GRUBER

PROFIL 42.706 Y

M = 1

200

KART NR.

ARKIV NR.

TEGN.	
TRAC.	
KFR.	A.K.
REV.	3-81