




- To-gl. gn. alminnelig type
 - To-gl. gn. alminnelig-biotitt preget type
 - To-gl. gn. biotitt preget type
 - To-gl. gn. biotitt preget-biotitt dominert type
 - To-gl. gn. biotitt dominert type
- TO-GLIMMERGNEIS
(lyse, fink. ofte ho-
mogene gneiser)
- AMFIBOLITT
MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
HORNBLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis-
MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
KVARTSIT (keratophyr)
PEGMATIT (P), KVARTSAR (Q)
tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
SKARN, grågrøn
amfibolitt preg
hornblendegneis preg / hornblende førende
biotitgneis preg (to-gl. gn.) / biotitt førende (ovrigt bergarter)
to-glimmergneis preg
muskovitgneis preg / muskovit førende
pyrit / pyrrhotitt impregnasjon
staurolitt
stictolitisk (m. granat)
dårlig (impregnasjons-) malm < 2% Zn
middels (stripet) malm 2-3% Zn
god (stripet) malm 3-4% Zn
meget god (-homogen-) malm > 4% Zn

9132

MOFJELLET
GRUBER

43830 Y

M = 1

200

KART NR.

ARKIV NR.

TEGN

TRAC.

KFR

REV

10-1978

A. Kruse