




- To-gl. gn. alminnelig type
 - To-gl. gn. alminnelig-biotit preget type
 - To-gl. gn. biotit preget type
 - To-gl. gn. biotit preget-biotit dominert type
 - To-gl. gn. biotit dominert type
- TO-GLIMMERGNEIS
(lyse, fink, ofte ho-
mogene gneiser)
- AMFIBOLITT
- MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
- HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- HORNBLLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- D: disthen førende, (D): -omdannet disthengneis-
- MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
- *KVARTSIT* (keratophyr)
- PEGMATIT (P), KVARTSAR (Q)
- tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
- SKARN, grågrøn
- A amfibolitt preg
- H hornblendegneis preg / hornblende førende
- B biotitgneis preg (to-gl. gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
- T to-glimmergneis preg
- M muskovitgneis preg / muskovit førende
- pyrit / pyrrhotit impregnasjon
- staurolit
- stictolitisk (m. granat)
- dårlig (impregnasjons-) malm < 2% Zn
- middels (stripet) malm 2-3% Zn
- god (stripet) malm 3-4% Zn
- meget god (-homogen-) malm > 4% Zn

9134

MOFJELLET GRUBER	M = 1 200	TEGN	
		TRAC	AK
	KFR		
	REV.	2-1980	
	PROFIL 43.790 Y		KART NR.
		ARKIV NR.	