




- To-gl.gn. alminnelig type
- To-gl.gn. alminnelig-biotit preget type
- To-gl.gn. biotit preget type
- To-gl.gn. biotit preget-biotit dominert type
- To-gl.gn. biotit dominert type
- AMFIBOLITT
- MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
- HORNBLÉNDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- HORNBLÉNDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis
- MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
- MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
- *KVARTSIT* (keratophyr)
- PEGMATIT (P), KVARTSAR (Q)
- tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
- SKARN, grågrøn
- amfibolitt preg
- hornbléndegneis preg / hornblende førende
- biotitgneis preg (to-gl.gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
- to-glimmergneis preg
- muskovitgneis preg / muskovit førende
- pyrit / pyrrhotit impregnasjon
- staurolit
- stictolitisk (m. granat)
- dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
- middels (stripet) malm 2 - 3 % Zn
- god (stripet) malm 3 - 4 % Zn
- meget god (-homogen-) malm > 4 % Zn

avviksmålt: 405

9136

MOFJELLET
GRUBER

43.670 Y

M = 1

200

KART NR.

ARKIV NR.

TEGN.

TRAC

KFR

REV

10-1978

A. Kruse