

X 925.000

100

200

300

400

+300

+200

+100

0

+200

+100

0

X 925.000

100

200

300

400

To-gl.gn. alminnelig type	TO-GLIMMERGNEIS (lyse, fink. ofte ho- mogene gneiser)
To-gl.gn. alminnelig-biotit preget type	
To-gl.gn. biotit preget type	
To-gl.gn. biotit preget-biotit dominert type	
To-gl.gn. biotit dominert type	
AMFIBOLITT	
MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT	
HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.	
HORNBLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.	
BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.	
D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis	
MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.	
MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.	
KVARTSIT (keratophyr)	
PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)	
tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)	
SKARN, grågrøn	
amfibolitt preg	
hornblendegneis preg / hornblende førende	
biotitgneis preg (to-gl.gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)	
to-glimmergneis preg	
muskovitgneis preg / muskovit førende	
pyrit/pyrrhotit impregnasjon	
staurolit	
stictolitisk (m. granat)	
dårlig (impregnasjons-) malm	< 2 % Zn
middels (stripet) malm	2 - 3 % Zn
god (stripet) malm	3 - 4 % Zn
meget god (-homogen-) malm	> 4 % Zn

8151

8152

malmformation

9160

**MOFJELLET
GRUBER**
KJEMPHEIA
PROFIL 48.960 Y

M = 1
1.000

KART NR.
ARKIV NR.

TEGN.	A. Kruse
TRAC.	A. Kruse
KFR.	A. Kruse
REV.	3. 82.