

X 925.000

100

200

300

400

+300

+200

+100

0

+200

+100

0

X 925.000

100

200

300

400

- To-gl.gn. alminnelig type
To-gl.gn. alminnelig-biotit preget type
To-gl.gn. biotit preget type
To-gl.gn. biotit preget-biotit dominert type
To-gl.gn. biotit dominert type
- TO-GLIMMERGNEIS
(lyse, fink. ofte ho-
mogene gneiser)
- AMFIBOLITT
MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
HORNBLÉNDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
HORNBLÉNDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis
MUSKOVITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
KVARTSIT (keratophyr)
PEGMATIT (P), KVARTSAR (Q)
tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
SKARN, grågrøn
amfibolitt preg
hornblendegneis preg / hornblende førende
biotitgneis preg (to-gl.gn.) / biotit førende (avrige bergarter)
to-glimmergneis preg
muskovitgneis preg / muskovit førende
pyrit/pyrrhotit impregnasjon
staurolitt
stictolitisk (m. granat)
dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
middels (stripet) malm 2-3 % Zn
god (stripet) malm 3-4 % Zn
meget god (-homogen-) malm > 4 % Zn

8151

8152

malmformasjon

- 9164

**MOFJELLET
GRUBER**
KJEMPHEIA
PROFIL 48.960 Y

M = 1
1.000

TEGN.	A. Kruse
TRAC.	A. Kruse
KFR.	A. Kruse
REV.	M. Marker
KART NR.	3.82
ARKIV NR.	