

To-gl.gn. alminnelig type
To-gl.gn. alminnelig-biotitt preget type
To-gl.gn. biotitt preget type
To-gl.gn. biotitt preget-biotitt dominert type
To-gl.gn. biotitt dominert type

AMFIBOLITT

MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT

HORNLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.

HORNLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.

BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.

D-disthen f rend , (D): -ondannet disthengneis-

MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.

MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.

-KVARTSIT- (keratophyr)

PEGMATIT (P), KVARTS R (Q)

tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)

SKARN, gr gr n

amfibolitt preget

hornblendegneis preget / hornblende f rend 

biotittgneis preget (to-gl.gn.) / biotitt f rend  ( vrige bergarter)

to-glimmergneis preget

muskovitgneis preget / muskovitt f rend 

pyrit / pyrrhotitt impregnasjon

staurolitt

stictolitisk (m. granat)

d rlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn

middels (stripet) malm 2-3 % Zn

god (stripet) malm 3-4 % Zn

meget god (-homogen-) malm > 4 % Zn

+200

+100

0

-100

-200

925.500

400

300

200

400

300

925.200


+200

+100

0

-100

-200



9177

MOFJELLET GRUBER	M = 1 1.000	TEGN.	A. Kruse
		TRAC.	A. Kruse
		KFR.	REV.
		REV.	3.8.2.
PROFIL 44.350 Y		KART NR.	
		ARKIV NR.	