




- To-gl. gn. alminnelig type  
To-gl. gn. alminnelig-biotit preget type  
To-gl. gn. biotit preget type  
To-gl. gn. biotit preget-biotit dominert type  
To-gl. gn. biotit dominert type  
AMFIBOLITT  
MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT  
HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.  
HORNBLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.  
BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.  
D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis  
MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.  
MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.  
\*KVARTSIT\* (keratophyr)  
PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)  
tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)  
SKARN, grågrøn, KARBONAT (c)  
amfibolitt preg  
hornblendegneis preg / hornblende førende  
biotitgneis preg (to-gl. gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)  
to-glimmergneis preg  
muskovitgneis preg / muskovit førende  
pyrit / pyrrhotit impregnasjon  
staurolit  
stictolitisk (m. granat)  
dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn  
middels (stripet) malm 2-3 % Zn  
god (stripet) malm 3-4 % Zn  
meget god (=homogen-) malm > 4 % Zn

N.B. HULLENE 69-30, 69-31, GM 1 OG 2 HAR GAMMEL BERGARTS-  
INDELING

9181

MOFJELLET  
GRUBER

PROFIL 43.790 Y

M = 1  
1.000

TEGN. A. Kruse  
TRAC. A. Kruse  
KFR.  
REV. 3.82.

KART NR.  
ARKIV NR.