

X 925.700

600

500

400

300

+200

+200

+100

+100

0

0

-100

-100

X 925.700


600

500

400

300

To-gl.gn. alminnelig type
 To-gl.gn. alminnelig-biotit preget type
 To-gl.gn. biotit preget type
 To-gl.gn. biotit preget-biotit dominert type
 To-gl.gn. biotit dominert type
 AMFIBOLITT
 MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
 HORNBLANDGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
 HORNBLAND-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
 BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
 D: disthen førende, (D): omdannet disthengneis-
 MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
 MUSKOVITGNEIS, +/- pyrit impr.
 KVARTSIT (keratophyr)
 PEGMATIT (P), KVARTSAR (Q)
 tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
 SKARN, grågrøn
 amfibolitt preg
 hornblendegneis preg / hornblende førende
 biotitgneis preg (to-gl.gn.) / biotit førende (øvrige bergarter)
 to-glimmergneis preg
 muskovitgneis preg / muskovit førende
 pyrit / pyrrhotit impregnasjon
 staurolit
 stictolitisk (m. granat)
 dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
 middels (stripet) malm 2-3 % Zn
 god (stripet) malm 3-4 % Zn
 meget god (-homogen-) malm > 4 % Zn



9183

• avviksmålt

MOFJELLET
GRUBER

43.590 Y

M = 1
1.000

KART NR.

DOKUMENT NR.

TEGN	
TRAC	
KFR	A. Knudsen
REV	A. Knudsen
KART NR.	
DOKUMENT NR.	1340