
X 925.440
420
400
380
360
-40
-60
-80
-100
551
550
552
553
554
457
borET til
-96 m
hbl.gn.
1,8m
0,99
3m
1,0%Zn
3,9m
3,9%Zn
4,8m
3,8%Zn
6,9m
2,7%Zn
4,8m
2,9%Zn
2,3m
2,4%Zn
SK. (brekSje)
SK.
?
To-gl.gn. alminnelig type
To-gl.gn. alminnelig-biotit preget type
To-gl.gn. biotit preget type
To-gl.gn. biotit preget-biotit dominert type
To-gl.gn. biotit dominert type
TO-GLIMMERGNEIS
(lyse, fink, ofte homogene gneiser)
AMFIBOLITT
MAFISK BIOTITGNEIS / biotitrik AMFIBOLITT
HORNBLENDEGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
HORNBLENDE-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
D: disthen førende, (D): »omdannet disthengneis«
MUSKOVIT-BIOTITGNEIS, mest mlk., pyrit impr.
MUSKOVITGNEIS, +/÷ pyrit impr.
»KVARTSIT« (keratophyr)
PEGMATIT (P), KVARTSÅR (Q)
tynn AMFIBOLITT (A), tynn MAFISK BIOTITGNEIS (AB)
SKARN, grågrøn
amfibolitt preg
hornblendegneis preg / hornblende førende
biotitgneis preg (to-gl.gn.)/ biotit førende (øvrige bergarter)
to-glimmergneis preg
muskovitgneis preg / muskovit førende
pyrit / pyrrhotit impregnasjon
staurolit
stictolitisk (m. granat)
dårlig (impregnasjons-) malm < 2 % Zn
middels (stripet) malm 2-3 % Zn
god (stripet) malm 3-4 % Zn
meget god (»homogen«) malm > 4 % Zn
9211
MOFJELLET
GRUBER
44.115 Y
M = 1
200
TEGN.
TRAC
KFR
REV
1.1979
A. Kruse
11-78
KART NR.
ARKIV NR