



Bergvesenet

Postboks 3021, 7002 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr BV 3351	Intern Journal nr	Internt arkiv nr Boks nr 15	Rapport lokalisering Nordland	Gradering
Kommer fra ..arkiv	Ekstern rapport nr BNN	Oversendt fra	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Kjernebeskrivelser. Originaler. Mofjellet Gruber				
Forfatter		Dato 19	Bedrift Bergverkselskapet Nord-Norge A/S	
Kommune Rana	Fylke Nordland	Bergdistrikt Nordlandske	1: 50 000 kartblad	1: 250 000 kartblad
Fagområde	Dokument type	Forekomster		
Råstofftype	Emneord			
Sammendrag				

Lokalitet: 44.130

Borehull: 1321

Dato : Juni -87
 Koordinator : X: 925.478,0 Y: 44.134,2
 Retning : N
 Helling/stigning: -85°
 Høyde : -32.6 m.o.h.
 Lengde : 20.0 m

Splittet + Arkivert

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
0.00 - 2.45	2.45	Musk.biot.gn.	Rel.lys mlk.enkelte skarn førende band, ved 0.60- 0.70 Pegm.band, rik impr. Py.Sl.Cp.Gn. til 1.60 resten impr.Sl.Cp.Gn.Py. (Lys Sl.) Fra 1.20-2.20 rik malm, åpne folder 0-60°	65 80	1.28 0.56	0.21 0.40	4.68 2.05	34.1/0.30 17.3/0.30	5.4 4.5	0.00-1.60 1.60-2.45
2.45 - 3.00	0.55	Musk.gn.	Rel.lys mlk.biot-førende overgang til grå gn.aktig impr.Py.spor Sl. føre- trådesvis i de biot.rik- ere band, noe foldet i starten.	35-0 75	0.09	0.16	0.57	5.3/0.10	3.3	2.45-3.00
3.00 - 3.90	0.90	grå gn.	Lys mlk.delvis musk.gn- aktig, sprette gr.1-3mm. Fra 3.25 åpne folder m/ Pegm.band.Ved 3.45-3.55 biot.rik m/rik malm impr. Lys Sl. Åpne folder.	75 0-75	0.13	0.08	0.42	2.9/0.10	2.3	3.00-3.90
3.90 - 4.80	0.90	biot.gn.	Rel.mørk mlk.Spor hbl. rik impr. malm.Lys Sl. Åpne folder.		1.24	0.26	2.88	21.8/0.45	6.2	3.90-4.80
4.80 - 5.00	0.20	grå gn.	Lys mlk.musk.rik, impr. Sl.Cp.Gn.Py.Siste 2 cm rik lys Sl.	75-80	0.76	0.22	1.45	16.6/0.15	4.2	4.80-5.00
5.00 - 6.00	1.00	grå gn.	Lys mlk.rel.musk.rik noe sprett gr.2 mm, spor Py. ved 5.45 2 cm Sl.Cp.Gn. Py. Fra 5.75 smale musk. gn.band m/ Py.	40 60 50-60	0.05	0.05	0.23	1.6/0.10	1.6	5.00-6.00
.....2										

.....2

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1321

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
6.00 - 6.60	0.60	biot.gn.	Mørk mlk-grovk.Musk-før-ende spor <u>Sl.Py.</u> i starten 4 cm rik-middels <u>Sl.Cp.</u> <u>Py.</u> Foldet.	0-50	0.21	0.50	2.81	15.1/0.20	4.6	6.00-6.60
6.60 - 9.50	2.90	grå gn.	Lys mlk.enkelte biot. rikere partier, noe gr. 1-3 mm.	50-60	0.21	0.08	0.06	53.5/2.75	1.4	6.60-9.50
9.50 - 10.05	0.55	biot.gn.	Rel.mørk mlk.växl gl-innhold, gr.2-4 mm.Fra 9.55-9.70 svak impr. <u>Sl.Py.</u> I starten foldet.	40 50 35	0.06	0.09	0.15	2.6/<0.10	2.7	9.50-10.05
10.05 - 10.45	0.40	Pegm.	Ved 10.35-10.39 m biot.gn. band m/rik <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	ca.45	0.12	0.04	0.22	2.5/<0.10	0.9	10.05-10.45
10.45 - 10.55	0.10	biot.gn.	Som ovenfor.	35-60	0.28	0.26	2.47	12.6/0.10	3.1	10.45-10.55
10.55 - 12.50	1.95	grå gn.	Lys mlk.litt etter hvert biot.preget gr.1-3 mm. Foldet.	0-30	0.04	0.02	0.11	1.5/<0.10	1.7	10.55-12.50
12.50 - 13.00	0.50	grå gn.biot.rik	Rel.mørk fin.mlk.gr-aggregater, tildels store 1-10 mm.Foldet.	0-30	0.03	0.01	0.03	0.4/<0.10	2.2	12.50-13.00
13.00 - 15.80	2.80	grå gn.b.p.	Lys mlk.enkelte biot. rikere band.13.30-13.50 innfoldet biot.band, sprette gr.1-3 mm.sticks 15°. Fra 14.20-14.35 m. Sticks (sticks en liten forkastning)Fra 14.80 åpne folder	50 60-50 0-60	0.03	0.01	0.05	1.7/<0.10	1.6	13.00-15.80
15.80 - 16.55	0.85	biot.hbl.gn.	Mørk fin-mlk.foldet spor kis ved 16.20-16.25 rik <u>Py.Po.</u> 16.50-55 rik <u>Sl.Py.</u>	0-80	0.26	0.08	0.70	9.2/0.10	6.3	15.80-16.55

Lokalitet:

Borehull: 1321

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
16.55 - 20.00	3.45	grå gn. Lys mlk.noie gr.1-3 mm. Ved 18.15 2 cm biot.rik- ere striper Ved 18.55-65 Pegm.Fra 18.15-18.55 fol- det, små runde folder, enstaka musk.rikere band.	60	0.03	0.01	0.03	g/tAgAu 1.1/<0.10	1.4	16.55-18.50
				0.03	0.01	0.03	0.4/<0.10	1.2	18.50-20.00
19.06.87									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.130

Borehull: 1322

Dato : Juni -87

Koordinator : X: 925.475,9 Y: 44.131,1

Retning : S

Helling/stigning: -85°

Høyde : - 32,6 m.o.h.

Lengde : 20.00 m

Splittet + Arkivert

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
0.00 - 1.55	1.55	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.litt växl m/ smale biot.gn.band.Fr. 0.00-0.20 Sl.(Lys Sl.) resten svak impr.Py. ens- taka gr.1-2 mm.	45-60	0.87	0.17	1.76	23.8/ 0.15	4.7	0.00-1.55
1.55 - 2.30	0.75	biot.gn.	Mørk mlk-grov-mlk,litt D type-aktig,i starten skarn,impr.Py.spor Sl. Cp.Gn.	45-60	0.54	0.34	1.93	16.2/ 0.10	5.8	1.55-2.30
2.30 - 3.85	1.55	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.växl m/skarn band i halve kjernen. Foldet.	0-60	0.11	0.13	0.67	5.4/ 0.10	2.9	2.30-3.85
3.85 - 4.85	1.00	hbl.gn.	Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm.Rund fold.	60-70 0-5	<0.01	0.02	0.02	1.6/ <0.10	3.2	3.85-4.85
4.85 - 5.65	0.80	biot.gn.	Mørk mlk.foldet.Fr.5.00- 5.10 biot. m/Sl.Cp.Gn.Py.	0-40	0.34	0.31	0.68	10.5/ 0.10	5.0	4.85-5.65
5.65 - 7.05	1.40	skarn	Grønn foldet,ved 6.65 glide yta.Sl.Cp.Gn.Py. ved 7.00-7.05.		0.19	0.08	0.35	5.9/ <0.10	4.1	5.65-7.05
7.05 - 8.60	1.55	grå gn.	Lys mlk.	70-65	<0.01	0.01	0.08	0.2/<0.10	1.7	7.05-8.60
8.60 - 9.50	0.90	biot.gn.	Mørk mlk-grovk.Brecciart delvis pegmatitisk. Py. spor Sl.		0.15	0.15	0.70	6.3/ <0.10	2.9	8.60-9.50
9.50 - 11.20	1.70	grå gn.	Lys mlk.Fr.9.90-10.40 växl/cm/pegm.band,sprette gr.1-3 mm.	70-80	<0.01	0.01	0.02	0.8/ <0.10	1.1	9.50-11.20
11.20 - 12.30	1.10	hbl.gn.	Mørk mlk-grovk.gr.1-3mm Foldet.	40-70	<0.01	<0.01	0.02	1.9/ <0.10	3.0	11.20-12.30
....2										

....2

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1322

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
12.30 - 13.80	1.50	grå gn. Lys mlk i starten skarn m/Py.Cp.Slake folder.	10-35	<0.01	0.02	0.02	0.7/ <0.10	1.6	12.30-13.80
13.80 - 14.40	0.60	Pegm.		0.01	<0.01	0.01	<0.1/ <0.10	0.4	13.80-14.40
14.40 - 17.30	2.90	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov-mlk.foldet sprette gr.1-3 mm.Ved 15.60-15.80 skarn. (innfoldet) 0 ⁰	45-70	<0.01	<0.01	0.02	1.1/<0.10	3.3	14.40-15.80
				<0.01	<0.01	0.02	1.7/<0.10	2.8	15.80-17.30
17.30 - 20.00	2.70	grå gn Lys mlk.i starten smale pegm.band,sprett gr.1-2 mm.	70-80	0.01	0.01	0.04	2.6/<0.10	1.9	17.30-20.00

23.06.87

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.120

Borehull: 1323

Dato : Juni -87

Koordinator : X: 925.474,0 Y: 44.132,7

Retning : S

Helling/stigning: -70°

Høyde : -32,3 m.o.h.

Lengde : 19.50 m

side 1

Splittet + Arkiveret

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	biot.gn. Mørk mlk.spor Py.Ved 0.15-0.20 skarn m/svak impr. Py.	55	0.06	0.04	0.18	g/tAgAu 3.2/<0.10	3.0	
0.50 - 0.75	0.25	skarn Grønn (Diops skarn ?) svak impr. Py.	70	0.01	0.02	0.02	2.1/<0.10	3.2	
0.75 - 3.05	2.30	biot.gn. Mørk mlk-grov-mlk.Litt vaks m/biot.musk.gn. Enstaka smale skarnband. Fra 2.40 foldet brecciert m/innslag av skarn,svak impr. Py. spor Sl.Cp.	0-45	0.16	0.11	1.19	7.2/<0.10	3.9	
3.05 - 5.30	2.25	hbl.biot.gn. Rel.mørk mlk.Veksl m/grå gn.aktige band,biot.gn., biot.hbl.gn, gr.1-3 mm sprett impr.Py.Spor Cp. Foldet.	40-80	0.03	0.07	0.23	3.2/<0.10	4.8	
5.30 - 7.65	2.35	musk.gn. Lys mlk.Foldet.Impr.Py.	50-60	0.40	0.24	0.92	15.9/0.25	4.2	
7.65 - 11.00	3.35	musk.biot.gn. Rel.lys mlk.veksl m/smale biot.musk.band.Impr.Py. Spor Sl. Fra 10.60 overgang til biot.musk.gn. m/rik impr.Sl.Cp.Gn.Py. (lys Sl.)	50-60	0.30 0.36	0.16 0.09	1.21 3.77	14.3/0.10 14.6/<0.10	5.0 8.6	7.65-10.60 10.60-11.00
11.00 - 11.30	0.30	biot.gn. (biot.musk.) Mørk mlk-grov,litt ondu- lerad,Brecciert,impr. Py.Cp.Sl.Gn.	45	0.86	0.26	1.63	51.0/1.00	7.8	
11.30 - 11.40	0.10	skarn Rik Gn.Py.Cp.		6.11	1.09	0.69	282.0/0.95	6.5	
11.40 - 13.40	2.00	grå gn. Lys mlk-grov mlk.veksl. m/biot.skikt,og band. partier m/Sl.Cp.Gn.Py.	30-45	0.54	0.17	1.15	19.5/0.45	3.5	

.....2

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1323

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
13.40 - 19.50	6.10	grå gn. lys mlk. foldet, enstaka opp til dm tykke pegm. band, sprette spor <u>Sl.Gn.</u>	45	0.48 0.12 0.27	0.36 0.26 0.09	0.89 0.20 0.28	40.6/1.85 12.9/0.45 17.1/0.50	4.7 1.7 1.6	13.40-15.40 15.40-17.40 17.40-19.50
		24.06.87 Stellan Burman							

Lokalitet: Profil 44.120

Borehull: 1324

Dato : Juni -87
 Koordinator : X: 925.472,5 Y: 44.133,1
 Retning : S
 Helling/stigning: -52°
 Høyde : -32,7 m.o.h.
 Lengde :

side 1

Splittet + Arkivert

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	biot.gn. Mørk mlk, veksl m/hbl.gn. band amfibolitiske, spor Py.	40-45	0.18	0.06	0.38	6.3/0.10	2.8	0.00-1.20
1.20 - 2.20	1.00	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.mot slutten overgang til biot.gn. m/spor hbl.Spor Py.	40	0.03	0.04	0.06	2.3/<0.10	3.5	1.20-2.20
2.20 - 2.60	0.40	Amf. Mørk mlk-fin, smale peg- matitiske årer. Svak impr. Py. Cp.?	40-45	0.03	0.05	0.08	3.2/<0.10	3.2	2.20-2.60
2.60 - 3.90	1.30	grå gn. Rel.lys mlk.veksl m/biot. gn.svak impr. Py. före- trädesvis i de biot.rikere partiene.	45	0.04	0.03	0.22	2.4/<0.10	3.1	2.60-3.90
3.90 - 4.25	0.35	biot.gn. Mørk mlk.rik malm i star- ten siden impr.	45	1.75	0.44	4.72	49.7/0.25	6.1	3.90-4.25
4.25 - 5.00	0.75	hbl.gn. Mørk mlk.variert m/hbl. biot.litt pegm.mot slut- ten amfibolitisk.		0.77	0.33	0.08	26.8/0.35	4.3	4.25-5.00
5.00 - 6.40	1.40	biot.hbl.gn. Mørk mlk.foldet.glide- flater 30° ved 5.50-5.60 m.Svak impr.Py.Cp. Spor Sl.	70-80 0-10	0.16	0.16	0.34	13.1/0.10	5.6	5.00-6.40
6.40 - 6.80	0.40	hbl.gn. Mørk mlk.5 cm pegm.i slutten m/Py.	70-80	1.83	0.54	0.06	119.0/ 2.65	2.9	6.40-6.80
6.80 - 7.30	0.50	biot.gn. Mørk mlk.spor Py.	70	0.04	0.11	0.17	4.1/<0.10	4.0	6.80-7.30
7.30 - 9.20	1.90	skarn Lys grønn veksl m/biot. band, sprett Py.Cp.Sl.Gn.	40-60	0.21	0.20	1.14	6.1/<0.10	3.6	7.30-9.20
....2									

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1324

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
9.20 - 14.50	5.30	grå gn. lys mlk.enkelte smale biot.rikere band ved 13.40-13.50 pegm. fra 10.00-10.60 foldet,svake spor <u>Py.</u>	45-60	0.01 0.07	0.02 0.04	0.05 0.17	1.1/<0.10 2.6/<0.10	1.6 1.9	9.20-12.00 12.00-14.50
14.50 - 17.20	2.70	musk.gn. lys mlk-grovmlk.litt veksl m/grå gn,musk.biot. gn.svak impr.og sprette tynne skikt m/ <u>Sl.Cp.Gn.</u> <u>Py.</u>	55-50	0.69 0.35	0.17 0.11	1.30 0.67	18.9/0.45 7.3/0.45	3.5 2.7	14.50-15.50 15.50-17.20
17.20 - 19.00	1.80	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.delvis biot. gn.aktig.Spor <u>Py.</u>	45	0.07	0.06	0.17	4.7/<0.10	3.7	17.20-19.00

25.06.87

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.120

Dato : Juni -87

Koordinater : X: 925.468,5 Y: 44.134,2

Retning : S

Helling/stigning: -19°

Høyde : -32,3 m.o.h.

Lengde : 10.00 m

Splittet + arkivert

Borehull: 1325

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
0.00 - 0.90	0.90	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.delvis halve kjernen biot.gn.m/skarn +rik <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	0-5	1.39	0.55	3.06	21.9/ 0.15	6.2	
0.90 - 1.75	0.85	<u>Malm skarn</u>	Rik <u>malm</u>		2.98	0.87	11.08	43.5/0.15	9.0	
1.75 - 6.20	4.45	Biot.gn.	Rel.mørk mlk.veksl.m/grå gn,hbl.gn.band slake folder,impr. og smale band <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	0-10	1.94 0.41	0.36 0.26	2.07 1.09	33.4/0.10 9.7/<0.10	4.8 5.0	1.75-3.75 3.75-6.20
6.20 - 6.90	0.70	hbl.gn.	Mørk mlk.m/smale biot. skikt,spor <u>Py.</u> foldet	0 0-45	0.03	0.04	0.20	2.6/<0.10	3.8	
6.90 - 8.20	1.30	biot.gn.	Mørk mlk.foldet,svak impr. <u>Py.</u>	0-10	0.11	0.08	0.58	4.6/<0.10	5.4	
8.20 - 10.00	1.80	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.veksl m/biot. musk.gn.mot slutten over- gang til biot.gn.aktig m/ svak impr. <u>Py.</u>	0-20	0.12	0.06	0.27	5.8/<0.10	4.1	
02.07.87										
Stellan Burman										

02.07.87

Stellan Burman

Lokalitet: 44.130

Borehull: 1326

Dato : Juni -87

Koordinater : X: 925.478,8 Y: 41.132,0

Retning : S

Helling/stigning: +45°

Høyde : -28,5 m.o.h.

Lengde : 10.00 m

Splittet + Arkivert

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	grå gn. Lys mlk.litt veksl m/smale biot.d.band,mot slutten musk.sprette gr.1-2 mm	40-45	0.03	0.03	0.05	1.6/<0.10	2.5	
1.20 - 2.10	0.90	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grovmlk.enkelte smale pegmatitiske band m/hbl.oggr. Impr. Py. Foldet.	50-80	0.82	0.30	0.04	97.0/3.23	5.0	
2.10 - 2.30	0.20	Pegm. m/Gn.Py.		22.49	0.14	0.03	888.0/4.13	2.7	
2.30 - 3.45	1.15	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grovmlk.impr. Py. gr.1-3 mm.	70	0.60	0.19	0.04	26.9/0.30	6.6	
3.45 - 5.60	2.15	hbl.gn. Mørk mlk.delvis foldet. gr-rik 2-5 mm,stictolitisk.	60-70	0.02	0.01	0.03	1.3/<0.10	2.3	
5.60 - 6.40	0.80	hbl.biot.gn. Mørk mlk.impr.Py.sprette små gr.1-2 mm.	45-50	0.02	0.01	0.04	2.0/<0.10	6.6	
6.40 - 10.00	3.60	hbl.gn. Mørk mlk.m/smale amfibolitiske og pegmatitiske band,sprette gr.1-2 mm.	60-80	0.02 0.03	0.02	0.03 0.04	1.7/<0.10 1.1/<0.10	4.8 4.0	6.40-7.20 7.20-10.00

29.06.87

Stellan Burman

Lokalitet: 44.130

Dato : Juni -87

Koordinater : X: 925.470,5 Y: 44.130,5

Retning : S

Helling/stigning: +60°

Høyde : -27.9 m.o.h.

Lengde : 10.0 m

Borehull: 1327

Splittet + Arkivert

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	80	0.02	<0.01	0.02	0.5/<0.10	1.4
1.20 - 1.45	0.25	biot.gn.	Mørk mlk m/gr.1-2 mm	80	0.37	0.05	0.02	2.9/<0.10	4.8
1.45 - 3.15	1.70	hbl.gn.	Mørk mlk.växl m/Amf.band delvis gr.rik,svak impr. Py. Fra 1.60-1.80 sprekk- fylling av Cp. runde fol- der ved 2.80 m m/cm smale pegm.band.	60-90 0-10 70-80	1.89	0.87	0.02	169.0/2.48	2.5
3.15 - 6.75	3.60	biot.gn.D type	Mørk mlk.gr-førende 1-2 mm,impr. Py. mot slutten musk.	70-80	0.03 0.01	0.04 0.01	0.03 0.02	2.4/<0.10 1.2/<0.10	5.9 6.4
6.75 - 10.00	3.25	hbl.gn.	Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm,i starten foldet m/ smale pegm.årer.(svakt besatt m/gulaktig skarn?)	0-80	0.02	0.02	0.02	1.2/<0.10	3.6

26.06.87

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 44.130

Dato: Juli -87

Koordinator: X: 925.479,2 Y: 44.134,2

Retning: N

Helling/stigning: -17°

Høyde: -32,2 m.o.h.

Lengde: 20.0 m

Borehull: 1328

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grovmk.impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> (lys Sl.) Foldet.	0-20	0.52	0.15	4.52	g/tAgAu 13.2/0.10	8.1	
0.60 - 1.50	0.90	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk, litt veksl m/grå gn.band, svak impr. <u>Py.</u> spor <u>Sl.</u>	15-20	0.07	0.14	0.29	2.7/<0.10	3.6	
1.50 - 2.25	0.75	biot.gn. Rel.mørk mlk.m/grå gn. skarn, foldet litt brec- ciert rik <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> (klysete)	0-	0.35	1.98	5.52	39.5/1.76	8.1	
2.25 - 6.30	4.05	grå gn. Lys mlk.slake folder, sprette gr.1-3 mm.	0-30	0.03	0.06	0.01	4.1/0.49	1.5	2.25-4.25
6.30 - 6.45	0.15	" "	10	0.03	0.02	0.02	1.1/<0.10	1.3	4.25-6.30
6.45 - 12.20	5.65	grå gn. Lys mlk.slake folder. sprette gr.1-3 mm m/smal langsgående biot.gn.band m/spor <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	10	0.35	0.03	0.02	12.2/0.18	1.3	
12.20 - 13.40	1.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk.gr-rik 1-4 mm	45	0.39	0.03	0.06	12.3/<0.10	1.5	6.45-8.40
13.40 - 19.55	6.15	grå gn. Lys mlk,sprette gr.	10-45	0.02	0.01	0.02	0.5/<0.10	1.5	8.40-10.40
				0.02	<0.01	0.02	0.6/<0.10	1.5	10.40-12.20
				0.02	0.01	0.04	0.8/<0.10	4.0	
				0.02	<0.01	0.02	0.2/<0.10	1.6	13.40-16.40
				0.02	<0.01	0.02	0.1/<0.10	1.4	16.40-19.55

5.7.87

Stellan Burman

Lokalitet: Profil 41.370

(Boret fra Nr: 8.)

Dato April -87

(Boret fra Nr: 8)

Koordinater

Retning N

Helling/stigning: +17°

Høyde

Lengde

Borehull: 1317

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grovk.spor skarn, impr.striper <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u>	45	0,47	0,75	2,45		7,3	
1.20 - 4.80	3.60	kjernetap							
4.80 - 6.00	1.20	biot.gn. Rel.mørk mlk.impr. <u>Py.Sl.</u> <u>Cp.Gn. ?</u>	30-40	0,03	0,29	0,19		11,3	
6.00 - 30.70	24.70	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm enkelte dm tykke kv.band slake folder	30 0 30						
30.70 - 31.00	0.30	kv.pegm.							
31.00 - 34.10	3.10	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov-mlk.god malm, tett foldet, brecciert		0,31	0,55	4,00		12,6	31.00-32.50
				0,10	1,31	6,28		19,9	32.50-34.10
34.10 - 38.60	4.50	musk.biot.gn. Rel.lys mlk, delvis skarn førende, stripet impr. <u>Py.Sl.Cp.Gn.</u>	0-20	0,20	0,14	3,80		16,2	34.10-35.50
				0,36	0,33	1,92		7,9	35.50-37.00
				0,18	0,19	2,07		4,7	
38.60 - 40.60	2.00	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov-mlk.foldet brecciert rik malm.		0,21	0,38	4,56		15,9	
40.60 - 47.20	6.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.litt växl m/ musk.biot.gn, delvis svakt <u>Py.impr.</u>	0-20						
47.20 - 48.00	0.80	kjernetap.							
48.00 - 49.20	1.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk.komp.malm stripe ca.1 cm tykk langsgående (i skyveplanet)	0-10						
18.02.87									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.380 (oppbevart)

Dato : Mars -87

Koordinater :

Retning : opp

Helling/stigning: +90°

Høyde :

Lengde : 78,30 m.

Borehull: 1316

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser Ag/Au					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.90	3.90	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk.veksl.m/grå gn.band,sprette gr.1-3mm litt brecciert,spor <u>Py.</u> <u>Po.Cp.</u> skarn.	70-80						
3.90 - 6.50	2.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.veksl.m/biot. gn.skikt,hbl-førende,spor <u>Py.</u> sprette gr.	80-90						
6.50 - 20.50	14.00	biot.gn. Rel.mørk mlk.delvis hbl. førende veksl.m/grå gn. band og enstaka hbl.gn. band,sprette gr.1-3 mm enkelte større 3-5 mm. Spor <u>Py.</u> Foldet.	70-80						
20.50 - 30.50	10.00	grå gn.b.d. Rel.lys mlk,sprette biot. skikt,enstaka hbl.gn.band sprette gr.1-3 mm,svakt <u>Py.</u> impr.företrädesvis i biot.gn.	60-70 v						
30.50 - 40.70	10.20	biot.gn. Mørk mlk,delvis hbl.førende,foldet,skarnband, svak impr. <u>Py.</u> i skarn band rikere.	ca 60-70	0.03	0.04	0.09	17/<0.1	5.3	30.50-38.00
				0.14	0.09	0.10	9.4/0.15	5.3	38.00-39.50
				0.08	0.06	0.07	7.0/0.15	4.8	39.50-40.70
40.70 - 45.90	5.20	biot.musk.gn. Rel.mørk veksl.m/skarn-band,spor hbl.Pegm.fra 43.70-43.90,impr. <u>Py.</u> foldet m/runde folder.	60-70 v	0.49	0.19	0.12	38.4/0.80	5.5	40.70-42.00
				0.04	0.05	0.10	4.2/<0.1		42.00-45.90
45.90 - 57.70	11.80	grå gn.b.d. Rel.lys mlk,enkelte opp-til dm tykke pegm.band og hbl.biot.gn.band. mot slutten sprette gr. 1-3 mm,svak impr. <u>Py.</u>	70-90						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1316

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser As / As					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
57.70 - 59.00	1.30	kjernetap							
59.00 - 76.90	17.90	grå gn. lys mlk, sprette gr. 1-3 mm Py. som sprette spor.							
76.90 - 78.00	1.10	pegm. m/biot. flak og skikt.		0.02	0.01	0.02	2.0% < 0.1	1.1	
78.00 - 78.70	0.70	grå gn. lys mlk, sprette gr. 1-3 mm	60-70						
22.04.87									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.380

Borehull: 1315

Dato : Mars -87 Arkivert
 Koordinator : X: 925.314,8 Y: 41.374,7
 Retning : S
 Helling/stigning: +85°
 Høyde : -5.5 m.o.h
 Lengde : 89,20 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.00	2.00	kjernetap							
2.00 - 3.80	1.80	biot.hbl.gn.	Mørk mlk.skiktad litt växl m/grå gn.gr-førende 1-3 mm.Py.Po.Cp. som sprette skikt.	70-80					
3.80 - 7.00	3.20	grå gn.	Rel.lys mlk.litt växl m/ biot.hbl.gn.band m/spor Py.Po. sprette gr.1-3 mm gr-førende i biot.hbl.gn band.	70-80					
7.00 - 8.30	1.30	biot.gn.	Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band,sprette gr.1-3mm spor hbl.spor Py.	70-80					
8.30 - 9.00	0.70	kv.pegm.	m/biot.skikt,Po.Py.Cp. som enkelte sprekkefylling- er.						
9.00 - 9.40	0.40	biot.gn.	Mørk mlk.skiktad,enstaka gr.Spor Py.	60-70					
9.40 - 10.00	0.60	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.hbl-førende? sprette gr.	70					
10.00 - 20.90	10.90	biot.gn.	Rel.mørk mlk.delvis hbl. førende,växl m/grå gn. band og enstaka hbl.gn. band,sprette gr.1-3 mm enkelte større.Py.som svake spor.Foldet i star- ten.	70-80					
20.90 - 28.30	7.40	" "	Mørk mlk,enkelte pegma- tiske partier foldet m/små runde folder,spor hbl.spor Py.enstaka gr. 1-3 mm.	45-45					

Lokalitet:

Borehull: 1315

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	Ag/Au	% Fe	
28.30 - 29.30	1.00	musk.gn.	Lys mlk.foldet, litt flitet preg.	50					
29.30 - 29.95	0.65	skarn	Grønn mlk-grovk.svak impr. Py.	50					
29.95 - 45.30	15.35	biot.gn.	Mørk mlk.litt växl m/enkel- te partier biot.musk.gn. spor hbl.samt enkelte sma- le skarnband,svakt impr. Py. Delvis foldet.	70 60-70					
				0.06	0.07	0.20	59/0.15	6.5	42.50-44.00
				0.06	0.06	0.23	48/0.10	5.3	44.00-45.50
45.30 - 53.00	7.70	musk.biot.gn.	Rel.lys mlk.växl m/biot. musk.grå gn,enstaka smale skarnband,impr. Py. spor Sl.Cp.Gn.	80					
				0.30	0.11	0.57	468/2.40	5.9	45.50-47.00
				0.16	0.18	0.63	8.4/0.35	5.5	47.00-48.50
				0.19	0.10	0.52	8.5/0.25	8.9	48.50-52.00
				0.25	0.09	0.82	8.8/0.45	6.7	52.00-53.00
53.00 - 54.00	1.00	biot.gn.	Mørk mlk.spor hbl.enkelte gr.1-3 mm,svak impr. Py.	60					
54.00 - 56.00	2.00	kjernetap							
56.00 - 61.10	5.10	biot.hbl.gn.	Mørk mlk.sprette gr.1-3mm svak impr.Py.	50-60					
61.10 - 62.00	0.90	hbl.biot.gn.	Mørk mlk,foldet,brecciert Py.Cp.Sl.		0.15	1.16	2.51	19.2/0.30	11.8
62.00 - 62.50	0.50	biot.hbl.gn.	Mørk mlk,sprette gr.1-3mm svak impr. Py.	70					
62.50 - 63.00	0.50	hbl.biot.gn.	Mørk mlk.foldet,brecciert Py.Cp.Sl.Gn.		0.85	0.60	2.19	24.6/0.65	6.5
63.00 - 66.60	3.60	biot.gn.	Mørk mlk.spor hbl.enkelte gr.1-3 mm,svak impr.Py. Foldet.	45-50 0-10					

Lokalitet:

Borehull: 1315

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	Ag/Au	% Fe	
66.60 - 73.00	6.40	grå gn. lys mlk-fink, foldet (svakt hbl. føre. de?) Ved 68.60 spor Sl. " 70.60 " " " 72.00 " "	0						
73.00 - 75.70	2.70	grå gn.b.d. lys mlk.växl m/biot.hbl. rikere partier, enkelte gr.1-3 mm spor Py. ved 74.20 Sl. Ved 74.20	45-50	0.01	0.02	0.07	1.4/0.10	2.7	73.00-74.00
			0	0.03	0.06	0.34	1.8/0.10	1.9	74.00-75.70
75.70 - 81.80	6.10	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grovk. delvis rik impr. Sl.Cp.Gn.Py. Mellom 78.40-79.70 Pegm. band.	60-70	0.86	0.33	3.27	15.3/0.36		
81.80 - 89.20	7.40	" " Mørk mlk-sprette gr.1-3mm Svak impr. Py. 31.03.87 Stellan Burman	70-80	0.26	0.28	0.86	6.5/0.25	5.5	81.80-82.80
				0.18	0.16	0.47	4.3/0.15	7.10	82.80-84.70
				0.10	0.14	0.16	3.5/0.10	5.8	84.70-86.00
				0.11	0.35	0.33	12.0/0.55	5.0	86.00-87.20
				0.02	0.07	0.04	1.2/0.10	3.7	87.20-89.10

Lokalitet: 41.380

Dato: Feb.-87

Koordinatorer: X: 925.313,2 Y: 41.374,0

Retning: S

Helling/stigning: -17°

Høyde: -10.1 m.o.h.

Lengde: 53.70 m

Borehull: 1314

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.70	4.70	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grovmlk.ondulerende impr. <u>Py.Ved 0.90 Sl.</u>	5-10	0.11	0.04	0.19	3.9/0.15	7.6	3.70-4.70
4.70 - 14.40	9.70	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grovmlk.ondulerende impr. <u>Py.Ved 0.90 Sl.Stripet impr. Sl.Cp. Gn.Py.</u>	5-10	1.02	0.12	5.32	13.4/0.2	6.9	4.70-6.30
				0.26	0.07	2.48	6.8/0.3	7.1	6.30-8.00
				0.40	0.11	1.33	9.4/0.3	6.8	8.00-9.70
				0.25	0.08	1.03	7.5/0.35	6.5	9.70-11.40
				0.35	0.15	2.60	9.4/0.15	7.4	11.40-13.10
				0.62	0.37	2.05	15.9/0.3	7.5	13.10-14.40
14.40 - 23.30	8.90	biot.gn.(sk) Mørk grovk.foldet delvis brecciert stedvis rik <u>malm</u>	5-10	0.13	0.59	1.27	10.5/0.3	12.0	14.40-16.00
				0.22	0.50	1.41	10.5/0.3	8.7	16.00-17.70
				3.39	0.17	15.12	41.4/0.25	9.3	17.70-19.60
				0.24	0.22	0.92	6.7/0.1	6.9	19.60-21.00
				0.03	0.18	0.25	5.8/0.1	7.3	21.00-23.30
23.30 - 24.70	1.40	biot.hbl.gn. Mørk mlk.delvis musk.gn. band,svak impr. <u>Py.spor Sl.</u>	10-20	0.22	0.19	0.60	10.2/0.1	4.2	
24.70 - 41.70	17.00	hbl.biot.gn. Mørk mlk.litt växl m/hbl. gn.gr-rik,svak impr. <u>Py.i de biot.rikere partiene Ved 29.20 Sl. Slake folder.</u>	10-20 0 10-20	0.16	0.09	0.06	6.4/0.15	5.1	40.70-41.70
41.70 - 44.90	3.20	biot.musk.gn. Mørk mlk-grovk.ondulerad spor hbl.impr. <u>Py.Sl.Cp.Gn.</u>	10-20	0.10	0.12	0.54	9.1/0.1	5.6	41.70-43.20
				0.30	0.06	1.05	11.0/0.1	5.3	43.20-44.90
44.90 - 48.00	3.10	biot.musk.gn. Mørk mlk-grovk.ondulerad spor hbl.impr. <u>Py.Sl.Cp.Gn. m/svak impr. Py.</u>	10-20	2.10	0.04	0.04	2.8/0.1	4.7	44.90-46.50
48.00 - 53.70	5.70	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3mm, litt växl m/småle hbl.biot. gn.band.							

20.02.87 Stellan Burman

Lokalitet: 41.380

Dato Feb.-87

Koordinater : X: 925.314,8 Y: 41.374,7

Retning : S

Helling/stigning: +80°

Høyde : -5.5 m.o.h.

Lengde : 101.30 m

Borehull: 1313

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	Fe	%	
0.00 - 10.70	10.70	grå gn.b.d.	Rel.mørk mlk.skiktad og tildels växl m/biot.gn. delvis pegmatitisk, brecciert enkelte store gr. 1-6 mm, spor Py, ved 2.30 m: <u>Cp.</u> som sprekkefyllinger foldet.						9/12/87
10.70 - 15.70	5.00	biot.gn.	Mørk mlk-grovmlk.brecciert pegmatitisk växl m/opp til 5 cm tykke grå gn. band, spor hbl.foldet "slirig", enkelte gr. 1-3mm <u>Py.</u> og <u>Po.</u> som klyser og sprekkefyllinger på enkelte steder.						
15.70 - 21.00	5.30	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm, mot slutten overgang til biot.gn.						
21.00 - 31.40	10.40	biot.gn.	Mørk mlk.litt variert m/biot.musk.gn.m/spor hbl.svak impr. <u>Py.</u> foldet m/små runde folder.						
31.40 - 60.20	28.80	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.växl m/biot.gn.band, enkelte hbl-førende, svak impr. <u>Py.</u> föredrödesvis i biot.gn.banden spor <u>Sl.</u> ved 47.90 m. Komp. <u>Py.</u> 52.70-52.80 m.						
60.20 - 70.30	10.10	biot.gn.	Mørk mlk.växl m/biot, biot. hbl.grå gn.band. Foldet. Fr. 60.30-60.40 <u>Py.</u> som klyser, klumper.	0.42	0.24	0.10	9.6	17.4/0.40	60.20-61.40
			2						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1313

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	06/47/11	% Fe	
70.30 - 77.80	7.50	grå gn. Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm, enkelte biot.gn. band m/spor hbl.Ved 75.30- 75.35 komp. <u>Py.</u>	60-70						
77.80 - 87.10	9.70	biot.gn. Mørk mlk.växl m/biot.hbl. gn.band m/gr.1-3 mm og <u>Py.</u> foldet.	50-50						
87.10 - 89.90	2.80	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov-mlk.delvis brecciert impr. <u>Py.Cp.</u>	80	0.06	0.17	0.06	89.2/0.40	7.1	87.10-88.20
				0.57	0.59	0.07	80.4/7.35	6.5	88.20-89.90
89.90 - 95.00	5.10	grå gn. Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm.litt växl m/smale hbl.biot.gn.band m/svak impr. <u>Py.</u>	70-80						
95.00 - 96.90	1.90	biot.sk. Mørk grovk,slirig <u>Py.Cp?</u>	80						
96.90 - 98.40	1.50	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	70	0.02	0.10	0.10	3.3/0.10	8.6	
98.40 - 99.10	0.70	biot.sk. Mørk mlk-grov.brecciert sprette gr.1-3 mm. <u>Py.Po.</u>	70	0.02	0.15	0.09	3.5/0.10	12.8	
99.10 - 101.30	2.20	hbl.biot.gn. Mørk mlk.sprette gr.1-3mm svak impr. <u>Py.</u>							

17.03.87

Stellan Burman

Lokalitet: 41.490

(Arkivert fr. kasse 3)

Dato : Januar 1987

Koordinater : X: 925,331,2 Y: 41.488,2

Retning : S

Helling/stigning: +75°

Høyde : ~ 11,5 m o h.

Lengde : 97,30 m.

Borehull: 1312

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.60	3.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/opp til 5 cm tykke biot.gn. band,sprette gr.1-3 mm. Ved 2.50-2.70 rund fold.	70-80 >				g/t AgAu		
3.60 - 4.90	1.30	biot.gn. Pegmatitisk Mørk grovk.enstaka smale skarnførende band,sprette gr.1-3 mm.Ved 3.80 Po. " 4.80 "	70-80						
4.90 - 8.00	3.10	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	70-80						
8.00 - 16.50	8.50	biot.gn. Mørk mlk.litt variert m/ grå gn.b.d.Sprette gr. 1-3 mm, spor Py.	60 70 60						
16.50 - 19.00	2.50	biot.gn/biot.sk. Mørk mlk,foldet,delvis pegmatitisk,og brecciert. Svak impr.Py.spor Cp.Sl. Sl. fra 18.00-18.30.	60-70	0.07 0.45 0.30	0.09 0.11 0.19	0.25 1.50 0.38	3.6/0.10 10.0/0.2 7.1/0.3	6.6 7.6 5.8	16.50-18.00 18.00-18.30 18.30-19.00
19.00 - 21.60	2.60	biot.gn. Mørk mlk.delvis skiktad. Spør Py.	60						
21.60 - 22.30	0.70	hbl.gn. (hbl.biot.gn) Mørk mlk-fink.Fra 21.75- 21.80 m Sl.Cp.Gn.Py.							
22.30 - 24.30	2.00	biot.gn. Mørk mlk-grovk.delvis peg- matitisk og brecciert. Fra 23.30-35 Sl.	60-70						
24.30 - 25.20	0.90	hbl.gn. Mørk mlk-fink.Amfibolit- tisk,rund fold	60-70 > 60						
25.20 - 26.40	1.20	biot.gn. Mørk mlk.litt pegmatitisk delvis skiktad Spør Py.	50-60						
.....2									

Lokalitet:

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1312

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
26.40 - 34.30	7.90	grå gn.b.d.	Lys mlk.växl m/enkelte biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm,spor hbl.Fra 31.00-31.20 småfolder.				g/tAgAu		
34.30 - 38.50	4.20	biot.hbl.gn.	Mørk mlk-grovmlk.impr.Py.						
38.50 - 40.00	1.50	musk.biot.gn.	Lys mlk.overgang til musk.gn.impr.Py. (spor hbl.?)						
40.00 - 42.30	2.30	musk.gn.	Lys mlk-fink.kv-rik.Til- dels kvartsitisk,impr. Py.spor Sl. (Lys Sl.)	0.42 0.28	0.19 0.11	0.23 0.54	31.7/1.15 16.9/0.35	6.1 5.2	40.00-41.00 41.00-42.30
42.00 - 43.90	1.00	kjernetap							
43.90 - 55.40	11.50	grå gn.	Lys mlk.enstaka biot.hbl.ca. 70 gn.band,enkelte små gr. spor Py. delvis foldet ved 53.70 Po.						
55.40 - 60.00	4.60	biot.gn.	Mørk mlk.enkelte grå gn. biot.musk.gn.foldet, sprett impr. Py.						
60.00 - 63.60	3.60	biot.gn. (biot.musk.gn.)	Mørk mlk.meget foldet, enkelte gr.1-3 mm,impr. Py.Cp.Gn. som enstaka klyser.	0.43	0.17	0.11	15.0/0.25	5.9	62.60-63.60
63.60 - 65.20	1.60	biot.gn.	Mørk mlk-grovk.foldet skarn impr.Cp.Py.Po.	0.40	0.47	0.63	16.6/0.4	9.4	63.60-65.20
65.20 - 67.50	2.30	grå gn.	Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band,sprette gr.1-3mm svak impr. Py. Py. före- trädarsvis i biot.gn.						
....3									

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1312

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
67.50 - 68.00	0.50	kjernetap.					g/t AgAu		
68.00 - 70.20	2.20	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band m/sprette gr.Svak impr. <u>Py.</u> foldet.	60-70 >						
70.20 - 71.20	1.00	kjernetap.							
71.20 - 71.80	0.60	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm spisse folder.	70 70						
71.80 - 72.50	0.70	biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.svak impr. <u>Py.</u>	70						
72.50 - 73.80	1.30	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band m/impr. <u>Py.</u> sprette gr.	60-70						
73.80 - 74.30	0.50	kjernetap.							
74.30 - 83.70	9.40	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.b.d.foldet, ved 79.30 <u>Sl.</u> " 79.50 <u>Sl.</u> " 80.20-80.30 <u>Sl.</u>	ca 70-60 }	0.32	0.36	1.55	7.7/0.15	5.4	79.30-80.30
83.70 - 95.60	11.90	biot.hbl.gn. Mørk mlk.växl m/småle grå gn,hbl.gn.band m/ gr.1-3 mm,svak impr. <u>Py.</u> i de biot.rikere partier.	70-80						
95.60 - 97.30	1.70	biot.gn. Mørk mlk-grovk.impr. <u>Py.</u>	60 50						

16.02.87

Stellan Burman

Lokalitet: 41.580

Borehull: 1311

Dato: Jan.-87

Koordinater: X: 925.329,4 Y: 41.582,8

Retning: S

Helling/stigning: -65°

Høyde: + 6,8 m o h.

Lengde: - 8,5 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.30	8.30	Biot.gn. Mørk mik.växl m/grå gn. band dm tykke, samt enkelte cm tykke hbl.biot.band. ca.45 Fra 3.60-3.80 m smale skikt <u>Sl.Py.Cp.</u> foldet. 16.01.1987 Stellan Burman							

Lokalitet: 41.580

Dato: Jan.-87

Koordinatorer : X: 925.331,8 Y: 41.582,5

Retning : N

Helling/stigning: +80°

Høyde : + 11.5 m.o.h.

Lengde : 29.40 m

Borehull: 1310

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	grå gn. Lys mlk.svak impr. <u>Py.</u> Spor <u>Sl.</u>	80	0,41	0,14	1,57		0,3	
1.10 - 4.00	2.90	biot.hbl.gn. Mørk mlk.rik impr. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	70	0,19	0,31	8,10		9,0	
4.00 - 7.00	3.00	grå gn. Lys mlk.sprette biot. skikt små gr. 1-2 mm.	80						
7.00 - 8.50	1.50	" " Lys mlk.sprette biot. skikt små gr. 1-2 mm. Samt <u>Sl.</u>	80-90	0,09	0,24	1,24		3,8	
8.50 - 12.20	3.70	" " Lys mlk.enkelte biot.gn. band hbl.førende,sprette gr.1-3 mm.	70-80	0,03	0,15	0,26		3,4	11,20-12,20
12.20 - 15.40	3.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk.rik impr. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	80 70	0,11	0,43	8,0		8,5	
15.40 - 18.50	3.10	grå gn. Lys mlk.litt växl m/dm tykke biot.gn.band,m/ svak impr. <u>Py.</u> spor <u>Sl.Po.</u>	80-90	0,04	0,16	0,47		4,9	15,40-18,00
18.50 - 20.30	1.80	biot.gn. Mørk mlk.delvis hbl-før- ende,impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u>	0-80	0,50	0,42	1,39		11,8	
20.30 - 24.80	4.50	grå gn. Lys mlk,enkelte opp til dm tykke biot.gn.band m/ <u>Py.</u> spor <u>Sl.</u> Ved 22.50 stokk <u>fold</u>	70 45 45						
24.80 - 26.20	1.40	biot.gn. Mørk mlk-grovk,brecciørt delvis pegmatitisk,spor hbl.skikt <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u>	70-90	0,10	0,27	2,28		6,2	
26.20 - 29.40	3.20	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm	80-90						
23.01.1987 Stellan Burman									

Lokalitet: 41.580

Borehull: 1309

Dato : Jan.-87
 Koordinator : X: 925.329,9 Y: 41.582,7
 Retning : S
 Helling/stigning: +65°
 Høyde : + 11.6 m.o.h.
 Lengde : 38.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	grå gn.	Lys mlk.rel.musk.rik, svak impr. <u>Py.Sl.</u>	60					
1.60 - 10.70	9.10	" "	Rel.lys mlk-grov-mlk. delvis musk.rik m/over- gang til musk.biot.gn. Svak impr. <u>Py.</u> Fra 8.20 slake folder.	60					
10.70 - 22.80	12.10	biot.musk.gn.	Mørk mlk-grov-mlk.Spor hbl.sprette gr.1-2 mm. impr. <u>Py.</u> Foldet	0-10					
22.80 - 30.70	6.90	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.växl m/biot. gn,biot.hbl.gn.band,enk- elte gr.1-3 mm,företräd- esvis i grå gn. Ved 27.20-30 <u>Sl.Gn.Py.</u>	50-60					
30.70 - 38.40	7.70	hbl.gn.	Mørk mlk.litt växl m/opp til dm tykke hbl.biot. gn.band.gr-førende 1-3 mm,svak impr. <u>Py.</u> företräd- esvis i hbl.biot.gn.	45-60					

27.01.87

Stellan Burman

Lokalitet: 41.580

Dato : Des.-86

Koordinater : X: 925.329,9 Y: 41.582,7

Retning : S

Helling/stigning: + 70°

Høyde : + 11,6 moh.

Lengde : 74,30 m.

Borehull: 1308

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.impr. <u>Py.Sl.</u>	60					
0.70 - 2.00	1.30	kjernetap.							
2.00 - 3.10	1.10	biot.gn.	Mørk mlk-grovk.pegmatisk, delvis brecciert. <u>Py.Po.</u> som sprekkfyllinger, spor <u>Sl.</u>						
3.10 - 10.30	7.20	grå gn.	Lys mlk-grov-mlk.växl m/musk.biot.gn.m/svak impr. <u>Py.</u> enstaka gr.1-2 mm.						
10.30 - 11.60	1.30	biot.musk.gn	Rel.mørk mlk.mot slutten overgang til biot.gn. Foldet m/både spisse og runde folder, impr. <u>Py.Sl.</u> <u>Cp.Gn.</u>	60-70 60-70	0,18	0,13	0,24		5,2
11.60 - 20.70	9.10	biot.gn.	Mørk mlk-grov-mlk, tildels musk.rik, (biot.musk.gn.) m/spor hbl.impr. <u>Py.</u> delvis som små klumper, eller boller, delvis runde folder, enstaka gr.1-3 mm.	50-60	0,03	0,06	0,29		7,2 11,60-12,40
20.70 - 21.30	0.60	pegm.							
21.30 - 22.50	1.20	biot.gn.	Mørk mlk-grov-mlk, svak impr. <u>Py.</u> sprette små gr. 1-2 mm, spor <u>Sl.</u>	60	0,12	0,29	0,39		8,1
22.50 - 29.30	6.80	biot.gn.	Mørk mlk-grov-mlk.m/spor hbl.Meget intenst foldet m/små runde folder (ser ut som vertikalt nedfolding). <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> som sprette klyser, og klumper.		0,34	0,47	1,51		

.....2

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1308

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29.30 - 30.50	1.20	musk.biot.gn, Lys mlk-grovk.enstaka små gr.1-2 mm.svak impr. Py.spor Sl.Cp.Gn. ?	60-70	0,01	0,04	0,05		3,5	
30.50 - 41.40	10.90	biot.gn, Mørk mlk.litt växl m/opp til dm tykke grå gn.band sprette gr.1.3 mm i spor hbl.Fra 32.20-34.00 runde folder.Delvis svak impr. Py.	50-70						
41.40 - 46.30	4.90	biot.hbl.gn. Mørk mlk.sprette gr.1-2mm Fra 44.80-44.90 m Py.Sl.	50-70						
46.30 - 48.30	2.00	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grovk.litt växl m/smale grå gn.band Ved 47.10-48.20 m Sl.Py.		0,78	0,38	2,92		6,4	47,10-48,20
48.30 - 48.80	0.50	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm. steil fold	10 0 10						
48.80 - 56.10	7.30	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov-mlk.sprette gr.1-3 mm.enstaka opp til 5 cm tykke grå gn.band. Ved 46.20 Sl.Cp.Gn.Py. delvis svak impr. Py.	60-80						
56.10 - 60.00	3.90	grå gn. Lys mlk.växl m/biot.gn. band,spor hbl,sprette gr.1-3 mm.Ved 48.75 Sl.	70-80						
60.00 - 60.70	0.70	biot.gn. Mørk mlk.impr.Py.Cp.Sl. Gn.	70	0,62	0,54	1,38		10,1	
60.70 - 62.80	2.10	grå gn.b.d. Lys mlk.sprette gr.1-3mm3	80						

Lokalitet:

Borehull: 1308

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
62.80 - 75.00	12.20	hbl.gn. Mørk mlk.litt växl m/hbl. biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm,svak impr.Py. företträdesvis i hbl.biot. gn-banden.	70-80						
		30.01.87 Stellan Burman							

Lokalitet: 41.580

Dato

Des.-86

Koordinator

x: 925.329,9 y: 41.582,7

Retning

S

Helling/stigning

+ 75°

Høyde

+ 11,6 moh.

Lengde

41,40 m.

Borehull: 1307

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk, impr. <u>Py.</u> spor <u>Sl.</u>	70					
0.60 - 3.00	2.40	biot.gn.	Mørk mlk.växl m/grå gn. band, smale skikt <u>Py.Cp.</u> <u>Gn.Sl.</u> spor hbl.	60 70					
3.00 - 7.20	4.20	musk.biot.gn.	Rel.lys mlk-grov mlk. svak impr. <u>Py.</u> spor <u>Sl.</u>	70-80					
7.20 - 10.20	3.00	biot.gn. (Pegmatitisk)	Rel.mørk mlk-grovk, foldet delvis brecciert, spor <u>Py.Po.</u>	45-70					
10.20 - 15.30	5.10	biot.gn.	Mørk mlk.enkelte musk. skikt, impr. <u>Py.</u>	70					
15.30 - 17.20	1.90	grå gn.	Lys mlk.sprette gr. 1-3mm	70					
17.20 - 20.10	2.90	biot.gn.	Mørk mlk-grov-mlk.delvis pegmatitisk, sprette gr. 1-3 mm, spor hbl.svak impr. <u>Py.</u> delvis brecciert.						
20.10 - 25.70	5.60	" "	Mørk mlk.sprette gr. 1-2mm svak impr. <u>Py.</u> spor <u>Py.</u>	60-70	0,06	0,16	0,26	5,3	24,70-25,70
25.70 - 32.00		" "	Mørk mlk.spor hbl.impr. <u>Py.Cp.Gn.Sl.</u>	60-70	0,29	0,33	1,93	8,0	25,70-27,00
					0,17	0,22	0,54	4,9	27,00-32,00
32.00 - 41.00	9.00	biot.hbl.gn.	Mørk mlk.m/enkelte smale grå gn.band.enstaka gr. 1-2 mm, foldet m/slake steilt stående folder, Impr. <u>Py.Cp.Gn.Sl.</u> delvis rik, delvis lys <u>Sl.</u>	60-70 0 60-70 0	0,19	0,14	0,31	4,3	32,00-35,00
					0,47	0,40	1,72	5,1	35,00-38,00
					0,85	0,67	3,47	5,5	38,00-41,00
41.00 - 41.40	0.40	grå gn.	Lys mlk. Slak fold	10 0					

8.12.86 Stellar, Burman

Lokalitet: 41.580

Borehull: 1306

Dato : Des.-86

Koordinater : X: 925.329,9 Y: 41582,7

Retning : S

Helling/stigning: +80°

Høyde : + 11,6 moh.

Lengde : 49,20 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	grå gn.	Lys mlk.rel.musk.rik, svak impr. <u>Py.</u>				9/1 AuAg.		
1.50 - 2.20	0.70	" "	" " " m/småle <u>malm</u> -band.	0.18	0.23	7.40	0.1/6.5	5.9	
2.20 - 6.10	3.90	musk.gn.	Lys mlk-grov-mlk.litt varierte m/musk-biot.gn. Impr. <u>Py.</u> små spisse folder.						
6.10 - 8.70	1.60	grå gn.b.d.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm spor <u>Py.</u>						
8.70 - 13.20	4.50	biot.gn.	Rel.mørk mlk,delvis peg- matitisk.Foldet,brecciert svak impr. <u>Py.</u>						
13.20 - 17.20	4.00	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm Fr.15.60-15.80 hbl.						
17.20 - 19.90	2.70	biot.gn.	Mørk mlk-grov-mlk,spor hbl,svak impr. <u>Py.</u> spisse folder.						
19.90 - 22.40	2.50	grå gn.	Lys mlk,enkelte cm tykke biot.gn.band.						
22.40 - 26.40	4.00	biot.musk.gn.	Rel.mørk mlk-grov-mlk, delvis svakt hbl-forende impr. <u>Py.</u> <u>Sl.</u> <u>Cp.</u> <u>Gn.</u>	0.01 0.11 0.68	0.07 0.30 0.26	0.14 1.49 2.59	<0.1/2.3 0.1/7.9 0.3/16.2	5.3 9.7 6.2	22.40-24.00 24.00-25.50 25.50-26.40
26.40 - 32.50	6.10	biot.hbl.gn.	Rel.mørk mlk,sprette gr. 1-3 mm,foldet m/runde folder spor <u>Py.</u>	0.06	0.12	0.32	<0.1/3.2	4.8	31.50-32.50
32.50 - 35.60	3.10	musk.biot.gn.	Rel.lys mlk,enkelte små skarn-band,rik impr. <u>Sl.</u> <u>Cp.</u> <u>Gn.</u> <u>Py.</u> (Lys <u>Sl.</u>)	1.12 1.14	0.20 0.47	8.20 7.28	0.1/24.4 0.4/24.2	8.6 7.6	32.50-34.00 34.00-35.60

Lokalitet:

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1306

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
35.60 - 46.30	10.70	grå gn. lys mlk.sprette gr.1-3mm slake folder	60-70 0 60-70	0.01	0.04	0.09	<0.1/0.9	2.2	35.60-36.60
46.30 - 47.90	1.60	biot.gn. Mørk mlk, runde folder, spor <u>Sl.</u> ved 47.80	45 0 45						
47.90 - 49.20	1.30	Pegm. m/grå gn.band.							

19.12.86

Geologisk kart

Borehull: 1305

Dato Des.-86
Koordinater : X: 925.329,9 Y: 41.582,7
Retning : S
Helling/stigning: +85°
Høyde : +11,6 moh.
Lengde : 56,90 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% Al	% Fe		
0.00 - 0.90	0.90	grå gn.	Lys mlk.musk.rik	50						
0.90 - 1.20	0.30	biot.gn.	Mørk mlk-grovk.m/Sl.Cp. Py. foldet.	45-90						
1.20 - 1.60	0.40	skarn	grønn impr. Py.		0.04	0.17	3.88	45	0.2	5.9
1.60 - 16.10	14.50	grå gn.	Lys mlk,litt växl m/dm tykke biot.gn.band,spret- te gr.i grå gn.svak impr. Py.i biot.gn.banden. Spor Sl. ved 9.60 m.	70-80						
16.10 - 21.90	5.80	biot.gn.	Rel.mørk växl m/grå gn. band,spor hbl,svak impr. Py.	70-80						
21.90 - 32.60	10.70	biot.musk.gn.	Rel.lys mlk-grov-mlk.växl m/musk.biot.gn,delvis små spisse folder,samt stedvis brecciert preg. impr.Py.Cp.Gn.Sl. delvis rik (lys Sl) spor skarn.	70-80	0.02	0.09	0.12	2.5	0.1	4.7
					0.09	0.20	1.35	5.7	0.3	9.3
					0.17	0.16	2.26	8.1	0.6	10.2
					0.25	0.11	2.88	8.9	0.2	9.4
					1.05	0.30	3.72	28.8	3.7	5.7
					1.65	0.17	6.08	32.5	1.7	5.0
					0.87	0.15	5.36	16.2	0.6	7.7
					1.76	0.17	6.64	28.7	1.3	7.3
32.60 - 53.10	20.50	grå gn.	Lys mlk,sprette gr.1-3mm enkelte opp til dm tykke hbl.biot.gn.band m/store gr.3-5 mm,runde folder.	70	0.06	0.14	0.13	1.5	<0.1	1.7
53.10 - 53.70	0.60	Pegm.								
53.70 - 56.90	3.20	biot.musk.gn.	Rel.mørk mlk-grov-mlk. små spisse folder,impr. Sl.Cp.Gn.Py. (lys Sl.)	70-80	0.64	0.17	2.78	140	0.7	7.8
								28	0.3	
			12.12.86							
			Stellan Burman							

Lokalitet: 41.580

Borchull: 1304

Dato : 02-86

Koordinator : 425.330,4 3:41,582,7

Retning : opp

Helling/stigning : +90°

Høyde : +11,6 moh

Lengde : 70,40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.skiktad m/ biot.hbl.m/Sl.Cp.Py.Po.	70-80	0,31	0,23	2,59	g/tAgAu	5,5	
1.60 - 9.60	8.00	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	80						
9.60 - 9.90	0.30	Pegm. m/skarneklump Sl.Cp.Gn.							
9.90 - 11.60	2.00	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm enkelte biot.skikt.	70-80	0,02	0,03	0,11		2,1	10,60-11,60
11.60 - 15.70	4.10	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/Pegmatitiske biot.band m/Sl.Cp.Gn.Po.Py. (malmband)	70-80	0,02	0,25	1,91		4,1	11,60-13,00
				0,02	0,24	1,31		3,7	13,00-14,20
				0,02	0,18	0,38		8,6	14,20-15,70
15.70 - 20.20	4.50	grå gn.b.d. Rel.lys mlk, enkelte smale biot.gn.band m/spor hbl.	70-80	0,02	0,07	0,10		4,4	15,70-16,70
				0,26	0,10	0,60		3,3	19,20-20,20
20.20 - 28.00	7.80	biot.gn. Mørk mlk.växl m/biot.hbl. gn.samt biot.musk.gn. hbl-forende.pegmatitisk. brecciert, impr. Sl.Cp.Gn. Py.Po. rik impr.	70-80	0,18	0,39	3,43	0,2/7,8	9,7	20,20-25,00
				0,26	0,35	0,78	0,2/7,1	5,2	25,00-26,00
				0,71	0,60	3,49	0,3/14,5	9,0	26,00-28,00
28.00 - 43.00	15.00	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm foldet ved 29.50-29.90. Spor Sl. ved 31.80 m.	60-70	0,06	0,06	0,26		2,6	28,00-29,00
43.00 - 44.00	1.00	kjernetap							
44.00 - 53.60	9.60	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	70	0,07	0,02	0,16		2,0	52,00-53,60
53.60 - 54.90	1.30	" " Lys mlk.m/enkelte malmband.	70-80	0,32	0,06	0,95		2,0	
54.90 - 59.30	4.40	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grovk.spor hbl.stripet impr.Py.Cp. Gn.Sl. små spisse folder.	70-80	0,58	0,26	1,99	0,5/19,3	6,6	54,90-56,50
				0,58	0,24	2,02	0,8/19,3	5,5	56,50-58,00
				0,50	0,24	6,52	<0,1/6,0	11,3	58,00-59,30
59.30 - 63.70	4.40	grå gn.b.d. Lys mlk.delvis biot.rik svak impr.Py.	70-80	0,06	0,07	0,16	<0,1/1,7	2,9	59,30-60,30

Lokalitet:

Borehull: 1304

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
63.70 - 65.60	1.90	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm,enstaka opp til 5 cm tykke hbl.biot.band skarnførende m/rik Sl.	70-80	0,99	0,57	4,48	0,34/6.1	6,9	
65.60 - 70.40	4.80	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm,mot slutten sticto- litisk. 8.12.86 Stellan Burman	60-70						

Lokalitet: 41.840

Borehull: 1303

Dato : Nov. - 86
 Koordinator : X:925.362 Y:41839
 Retning : Lodd.
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : + 46 moh.
 Lengde : 3,00 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 0,50	0,50	Grå gn. Lys mlk. sprette gr. 1-3 mm	70-80°						
0,50 - 0,70	0,20	Grå gn. Lys mlk. sprette gr. 1-3 mm Svag impr. Sl.	70-80°						
0,70 - 3,70	3,00	Grå gn. bd. Rel. lys mlk. Växl m/ entykke h.bl.gn. band gr. rike.	70-80°						

24/11-86
 Stellan Burman

Lokalitet: 41.840

Dato: Nov.-86

Koordinater: X: 925.360 Y: 41.839

Retning: S

Helling/stigning: +75°

Høyde: +49 moh.

Lengde: 14.30 m.

Borehull: 1302

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 11.60	11.60	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.litt växl m/ smale biot,biot.hbl.band sprett gr.1-3 mm.	50-60					
11.60 - 14.30	2.70	hbl.gn.	Mørk mlk.växl m/hbl.biot. gn,rel.gr.rik 1-3 mm. Ved 11.80 Sl. Stictolittisk.fr.14.10- 14.20 Foldet m/runde folder.	0-90					
5.12.86									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.840

Borehull: 1301

Dato

Nov. - 86

Koordinater

X: 925.361,5 Y: 41.839

Retning

S.

Helling/stigning:

- 60°

Høyde

+ 46,5 moh.

Lengde

68,30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 1,10	1,10	Pegm. M/klysor og skikt <u>Sl</u> <u>Py</u> <u>Po</u> <u>Cp</u> .		0,03	0,71	3,27		3,7	
1,10 - 11,40	10,30	Grå gn. Lys mlk. sprette gr. 1-3 mm. Enstaka opp till den tykke kv. pegm. band.	70-80°						
11,40 - 12,40	1,00	Pegm. Brecciert m/ sprekkefyllinger av biot <u>Py</u> <u>Po</u> .							
12,40 - 19,10	6,70	Biot gn. Mörk mlk., delvis grovk. Enkelte partier biot.sk. Samt delvis hbl. förande. Svag impr. <u>Py</u> . Biot sk. foldet. M/spisse folder.	50-60° M 70°						
19,10 - 23,00	4,90	Grå gn. bd. Rel. lys mlk. växl m/biot gn. Sprette gr. 1-3 mm. Spor <u>Py</u> .	70°	0,03	0,03	0,05		3,5	22,00-23,00
23,00 - 23,90	0,90	Musk. biot gn. Rel. lys mlk. - grov impr. <u>Py</u> <u>Sl</u> <u>Cp</u> <u>Gn</u> . Små spisse foldere.	70-80° M	0,85	0,22	3,34		6,1	
23,90 - 25,40	1,50	Biot gn. Pegmatitisk Mörk grovk. foldet brecciert m/ <u>Py</u> <u>Po</u> <u>Sl</u> som sprekkefylling.		0,04	0,18	0,21		3,6	
25,40 - 26,70	1,30	Grå gn. bd. Rel. lys mlk. v)xl m/ dm tykke pegm. band foldet. Sprette gr. 1-3 mm. <u>Sl</u> som klysor i Pegm.	70-80°	0,07	0,05	0,38		1,9	

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1301

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
26,70 - 28,80	2,10	Biot gn. Mørk mlk. växl m/grå gn. impr. <u>Py</u> spor <u>Sl</u> . foldet gr. i grå gn.	70-80 ⁰	0,35	0,20	1,46		5,1	26,70 - 28,80
				0,06	0,11	0,09		4,9	28,80 - 29,80
28,80 - 30,00	1,20	Grå gn. bd. Rel. mørk mlk. spor h.bl. svak impr. <u>Py</u> . Sprette gr. 1-3 mm.							
30,00 - 33,30	3,30	Hbl.biot.gn. Mørk mlk-grov-mlk.m/overgang til hbl.gn,svak impr. <u>Py</u> .	50-60						
33,30 - 42,80	9,50	hbl.gn. Mørk mlk.Amfibolotisk,gr-førende 1-3 mm,delvis svakt <u>Py</u> . Slake folder.	50-60						
42,80 - 48,30	5,50	biot.gn. Mørk mlk,växl m/grå gn.band sprette gr.1-3 mm,svak impr. <u>Py</u> .							
48,30 - 60,70	12,40	grå gn. Lys mlk,litt växling m/musk. gn.impr. <u>Py</u> .	70						
60,70 - 64,80	4,10	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm. växl m/hbl.biot.gn.	70						
64,80 - 69,00	4,20	grå gn. Lys mlk.sprett gr.1-3 mm.	50-60						
27.11.86									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.810

Borehull: 1300

Dato Nov. - 86
 Koordinater x: 925.362,5 y. 41.811,2
 Retning : Lodd.
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : + 47,5 moh.
 Lengde : 32,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 1,00	1,00	Pegm.	M/biotiskikt						
1,00 - 16,90	15,90	Grå gn.	Lys mlk. Litt växl biot innehåll. Sprette gr. 1-3 mm. Fr. 8,20 - 8,70 m små spisse foldere.	70-80°					
16,90 - 21,00	4,10	Biot gn.	Mörk mlk. - grov. Pegmatisk delvis breceiert. Py Po som enkelte skikt. Spor Cp Sl. Enstaka store gr. 1-5 mm.	70-80°	0,02	0,12	0,99	7,5	16,90-18,50
					0,01	0,17	0,25	5,9	18,50-20,00
					0,01	0,11	0,15	8,2	20,00-21,00
21,00 - 23,30	2,30	Grå gn. bd.	Rel. lys mlk. Enkelte cm tykke hbl. gn. band, sprette gr. 1-3 mm.	80°	0,03	0,13	0,07	5,3	22,30-23,30
23,30 - 25,80	2,50	Pegm.	Lys m/biot skikt enkelte klyssor Sl Py Sl.	-	0,04	0,20	0,11	3,6	23,30-24,00
					0,53	0,27	0,43	3,2	24,00-25,80
25,80 - 26,90	1,10	Grå gn. bd.	Rel. lys mlk. svagt skarnförande. Impr. Py Cp Gn Sl.	70°	0,31	0,20	1,20	2,9	
26,90 - 29,90	3,00	Grå gn. bd.	Rel. lys mlk. växl m/pegmatiska band. Stripet (banda) malm.	70-80°	1,37	0,32	2,89	6,0	
29,90 - 32,30	2,40	Grå gn. bd.	Lys mlk. enkelte biot gn. band Komp. malm. Fr. 30,80 - 30,90. 31,20 - 31,30	70-80°	0,04	0,34	0,69	5,7	29,90-31,00
					0,02	0,22	1,03	4,5	31,00-32,30

25/11-86
 Stellan Burman

C 41.810

Borehull: 1299

Dato : Nov.-86
 Koordinator : X: 925.382,5 Y: 41.811,4
 Retning : N
 Helling/stigning: -75°
 Høyde : + 49.5 m.o.h.
 Lengde : 88.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.80	3.80	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-2mm Sl.ved 2.10-2.15 m.	80					
3.80 - 29.30	25.50	grå gn.b.p.	Lys mlk.växl m/grå gn. hbl-førende,gr-rik 1-3mm enkelte cm tykke hbl.gn. band.	70-80					
29.30 - 29.60	0.30	skarn	grønn m/hbl.biot. rik Sl.Cp.Py.						
29.60 - 31.80	2.20	biot.gn.	Mørk mlk-grov,skiktad m/hbl.og gr.1-4 mm.	70					
31.80 - 34.20	2.40	Pegm.	m/biot.flagor.						
34.20 - 40.30	6.10	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.växl m/biot. skik./band,svak impr. Py. i biot.gn.banden.	60-70					
40.30 - 45.50	5.20	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm delvis små spisse folder.	70					
45.50 - 51.40	5.90	hbl.biot.gn.	Rel.mørk mlk.gr.rik 1-3 mm,växl m/grå gn.band.	80-90					
51.40 - 73.70	22.30	grå gn.	Lys mlk-fin rel.musk.rik sprette små gr.1-2 mm. enstaka cm tykke hbl. biot.gn.band.	80-90					
				0,04	0,01	0,03		1,3	73,70-73,70
73.70 - 76.40	2.70	" "	Lys mlk.musk.rik m/komp. malm band.Fr.85.20 lys Sl.	80					
				1,20	0,26	5,68		6,3	
76.40 - 87.60	12.20	hbl.gn.	Mørk mlk.litt växl m/hbl. biot,Amf.band,gr.1-3 mm.	70-80	0,02	0,02	0,03		74,60-77,40
87.60 - 88.30	0.70	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	80					
		5.12.86	Stellan Burman						

Lokalitet: Profil: 41.810

Borehull: 1298

Dato : Nov - 86
 Koordinater : x: 925.367,7 y: 41.808,7
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : + 48,0 m.o.h.
 Lengde : 34,00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0,00 - 1,10	1,10	Pegm. M/bioskikt. <u>Py Cp Sl Gn</u> som klysor.	-	0,03	0,29	1,17		3,1	
1,10 - 4,80	3,70	Grå gn. bd. Mel lys mlk. Enstaka opp til 5 an tykke hbl. biot gn. band. Gr. rike. Spor <u>Py</u>	80°						
4,80 - 7,0	2,20	Hbl. gn. Mørk mlk. delvis gr.-rike 1-3 mm. Mot slutten över- gang till grå gn. bd. hbl- förande. Svag impr <u>Py</u>	70-80°						
7,0 - 18,50	11,50	Grå gn. bd. Rel. lys mlk. sprette gr. 1-3 mm. Spor hbl. Spor <u>Py</u> . Delvis foldet.	80°						
18,50 - 22,20	3,70	Biot gn. Mørk mlk. växl m/grå gn. band. Impr. <u>Py</u> .	70-80°						
22,20 - 25,20	3,00	Grå gn. bd. Rel. lys mlk. växl m/Biotgn. band. Spor hbl. og grønligt skarn. Impr. <u>Py</u> företrades- vis i biot gn.	80°						
25,20 - 25,50	0,30	Kvarts.							
25,50 - 26,20	0,70	Grå gn. bd. Rel. lys mlk. Svag impr. <u>Py</u> .	70°	0,02	0,3	0,08		5,7	
26,20 - 27,20	1,00	Biot hbl. Mørk mlk- grovt. D type impr. <u>Py</u> spor <u>Sl Cp</u>	70-80°	0,02	0,35	0,98		4,8	
27,20 - 27,85	0,65	Pegm.							

Lokalitet:

Borehull: 1298

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
27,85 - 30,00	2,15	Grå gn. Rel. lys mlk. - grov-mlk. växl m/Musk gn. delvis rike malmband.	80-85°	1,12	0,50	4,85		6,69	
30,00 - 30,80	0,80	Grå gn. bd. Rel. lys mlk. Svag imp. <u>Py</u>	80°	0,03	0,13	0,15		3,2	
30,80 - 32,00	1,20	Biot gn. Mörk mlk. - grovk. Pegmatit delvis brecciert. <u>Po Py Sl.</u>	-	0,06	0,55	1,92		7,4	
32,00 - 34,00	2,00	Grå gn. Lys mlk. enkelte biot rikare band. m/svag impr. <u>Py</u> Fr. 33,90 - 34,00 <u>Sl</u>	70-80°						

26/11-86
Stellan Burman

Lokalitet: 41.680

Borehull: 1296

Dato

Koordinater : X:925.347,8 Y:41.684.9

Retning : Lodd

Helling/stigning: -90°

Høyde : +53,5 moh.

Lengde : 2,30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	2.30	biot.sk. Mørk mlk-grov.impr. Sl. Cp.Gn.Py.Po. Brecciert.		0,09	0,87	1,96		11,3	
		28.10.86 Stellan Burman							

Lokalitet: 41.680

Borehull: 1295

Dato

0kt.-86

Koordinater

X: 925,350,3 Y: 41.685,4

Retning

Lodd

Helling/stigning:

-90°

Høyde

+53,6 m.o.h.

Lengde

2.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	Biot.sk. Mørk mlk, skiktad <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	70-80	0,24	0,28	2,46		9,4	
1.00 - 2.50	1.50	grå gn. lys mlk.sprette gr.1-2mm fold ved 1.60-1.70. 30.10.86 Stellan Burman	60						

Lokalitet: 41.680

Dato: okt.-86

Koordinater: X: 925.344,0 Y: 41.684,5

Retning: S

Helling/stigning: -45°

Høyde: + 54,6 m.o.h.

Lengde: 13,70 m.

Borehull: 1294

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.60	2.60	grå gn.b.d. Rel.mørk mlk.partier m/ biot.gn.Py.impregnert, enstaka gr.1-2 mm. Fr.0.00 - 0.20 Sl.	70-80						
2.60 - 13.70	11.10	grå gn. Lys mlk.växl m/smale hbl. biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm. Sl.fr.13.50-13.70 slak föld ved 3.50.	70 50-60						
		28.10.86 Stellan Burman							

Lokalitet: 41.680

Dato : okt.-86

Koordinater : X: 925.345,7 Y: 41.684,1

Retning : Lodd

Helling/stigning: -90

Høyde : + 53,7 moh.

Lengde : 14,40 m.

Borehull: 1293

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.70	5.70	biot.gn.(sk.) Mørk mlk.växl.delvis biot.sk.brecciert, pegma- titisk, klyser og skikt m/Sl.Cp.Gn.Py.Po,	70-80	0,24	0,75	1,21		5,6	0,00-1,00
				0,29	0,88	3,75		12,9	1,00-4,00
				0,07	0,18	1,25			4,00-5,70
5.70 - 7.70	2.00	biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.sprette gr.1-3 mm, steil fold mel- lom 6.40-6.80 m. Impr. Py. spor Cp. Sl.?	80 80	0,02	0,03	0,04		4,4	
7.70 - 9.45	1.75	biot.gn. Mørk mlk.delvis biot.sk. Mot slutten overgang til grå gn.b.d.skarnførende Delvis rik impr.Sl.Cp. Gn.Py. Pegmatitisk brecciert.	60-70	0,03	0,33	1,47		6,8	
9.45 - 11.10	1.65	grå gn. Rel.lys mlk.foldet, spret- te gr.1-3 mm.	45-70	0,03	0,07	0,27		2,5	
11.10 - 14.40	3.30	grå gn.b.d. Rel.lys mlk,växl m/biot. gn.band, foldet, impr.Py. Sprette gr.1-3 mm.Sl. ved 13.20-13.40.	60-70						

28.10.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.680

Borehull: 1292

Dato : okt.-86
 Koordinater : X: 925.369,2 Y: 41 681,9
 Retning : N
 Helling/stigning: -65°
 Høyde : +58,0 moh.
 Lengde : 47,00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.30	6.30	grå gn. Lys mlk.enkelte tynne skikt biot.sprette gr. 1-2 mm,Fr. 0.00-0.20 m <u>S1.</u>	70-80						
6.30 - 29.60	23.30	grå gn.b.d. Rel.lys mlk,sprette cm tykke biot,hbl.gn.band rel. gr-rike.	80-90						
29.60 - 31.00	1.40	biot.sk. Mørk mlk.imp. <u>Py.</u>	60						
31.00 - 32.20	1.20	kjernetap							
32.20 - 47.00	14.80	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.m/enkelte partier biot,hbl.gn. gr- rike,Fr. 37.20-37.80 runde folder.	60-70 2						
24.10.86									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.680

Dato: 04.10.-86

Koordinator : X: 925.360,3 Y: 41.682,5

Retning : Lodd

Helling/stigning: -90°

Høyde : +58,0 moh.

Lengde : 42,30 m.

Borehull: 1291

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.80	8.80	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	70-80					
8.80 - 11.00	2.20	"hbl-førende grå gn."	Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm.	70					
11.00 - 22.40	11.40	grå gn.	Lys mlk.enstaka hbl.gn. band,sprette gr.1-3 mm.	70	0.01	0.01	0.03	0.6	21.40-22.40
22.40 - 23.30	0.90	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk,skarnførende rik impr.Py.Cp.Gn.Sl.	70-80	1.66	0.39	7.32	9.0	
23.30 - 26.50	3.20	" "	Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm.Ved 24.15 Sl.Po.Py. ved 25.70.	70-80	0.11	0.30	0.53	3.0	23.30-24.30
26.50 - 27.40	0.90	biot.gn.	Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.b.d.spor Py.	80					
27.40 - 32.50	5.10	grå gn.	Lys mlk.växl m/musk.gn. partier,enstaka gr.hoved- saklig i grå gn. Svak impr. Py.	70-80					
32.50 - 33.30	0.80	hbl.biot.gn.	Mørk mlk. Rik impr. Sl. Cp.Gn.Py.	80	0.33	0.33	6.60	10.5	
33.30 - 33.90	0.60	Pegm.							
33.90 - 42.30	8.40	grå gn.	Rel.lys mlk.växl m/opp til 5 cm tykke hbl.biot. gn.band,gr-førende.	80°					

17.10.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.680

Borehull: 1290

Dato: sept.-86

Koordinater: X: 925.359,5 Y: 41.684,9

Retning: S

Helling/stigning: +45°

Høyde: +62,3 moh.

Lengde: 15,50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grov-mlk. delvis foldet m/tette små spisse folder, stripet impr. <u>Py.Cp.Gn.Sl.</u>	45-50	0,42	0,33	1,53		6,9	
1.50 - 2.90	1.40	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band samt cm tykke Amf.band ved 2.50 som slak fold, svak impr. <u>Py.</u>	45	0,08	0,32	0,46		4,6	
2.90 - 5.00	2.10	" " Mørk mlk.växl m/musk.gn. grå gn.band, delvis svakt skarnførende, stripet impr. <u>Cp.Sl.Gn.Py.</u>	45-50	0,17	0,44	2,15		5,4	3,90-4,00
				1,32	0,46	8,76		6,4	4,00-5,00
5.00 - 6.40	1.40	biot.hbl.gn. Mørk mlk.enstaka små gr. 1-2 mm, impr. <u>Py.Cp.</u>	60-70	0,35	0,50	0,05		6,6	
6.40 - 11.00	4.60	hbl.gn. Mørk mlk.litt växl m/hbl. biot.gn. m/ <u>Py.</u> gr. 1-3 mm företrädesvis i hbl.gn. Runde folder.	50						
11.00 - 12.20	1.20	hbl.bopt.gn. Mørk mlk-grovk.litt Pegm. klyser, skikt <u>Py. Cp.?</u>	50	0,61	0,62	0,04		5,7	
12.20 - 15.50	3.30	hbl.gn. Mørk mlk.litt variert m/overganger til hbl.biot.gn. <u>Py.</u> impregnert, sprette gr. 1-3 mm.							

14.10.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.680

Dato : okt.-86

Koordinater : X: 925.360,4 Y: 41.683,1

Retning : opp

Helling/stigning: +90°

Høyde : +62,8 m.o.h.

Lengde : 14.20 m.

Borehull: 1289

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	musk.gn. lys mlk.delvis skiktad m/biot.impr. <u>Py.</u> spor <u>Sl.</u>	70-80	0,15	0,15	1,21		4,4	
0.80 - 3.20	2.40	musk.biot.gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. og skarn band m/rik <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u> Foldet.	60-90	0,42	0,37	1,80		8,4	0,80-2,00
				0,68	0,54	3,83		9,7	2,00-3,20
3.20 - 4.80	1.60	hbl.gn. Mørk mlk.foldet m/små runde foldet,gr-førende 1-4 mm,svak impr. <u>Py.</u> spor <u>Cp.</u>	~	0,40	0,21	0,05		4,8	
4.80 - 7.60	2.80	grå gn. Lys mlk,växl m/skarn, musk.biot.gn.band m/rik <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> Fr. 6.85-7.30 m komp.malm	70-80	0,09	0,30	0,73		4,3	4,80-6,20
				1,44	0,19	7,44		5,3	6,20-7,60
7.60 - 14.20	6.60	biot.gn. Mørk mlk,växl m/grå gn.. band,impr. <u>Py.</u> spor gr. 1-3 mm.	70-80	0,32	0,19	0,07		6,8	7,60-8,60

20.10.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.680

Borehull: 1288

Dato : sept.-86
 Koordinater : X: 925.360,3 Y: 41.682,5
 Retning : S
 Helling/stigning: -88°
 Høyde : +58,0
 Lengde : 32.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.40	2.40	Pegm.	m/enkelte flagor av biot.						
2.40 - 30.10	27.70	grå gn.	lys mlk. sprette gr. 1-3mm Enstaka opp til 5 cm tykke biot.hbl.gn.band gr-rik.	70-90					
30.10 - 30.60	0.50	biot.gn.	Mørk mlk, delvis skiktad. <u>Py.Cp.</u>	80	0,27	0,19	0,98	4,7	
30.60 - 31.05	0.45	" "	Mørk mlk. stripet <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	80-90	0,40	1,75	7,56	17,9	
31.05 - 32.40	1.35	grå gn.	lys mlk, kv-rik. Fr. 31.95- 32.05 biot.sk. m/ <u>Po.</u>	80					
08.10.86									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.760

Borehull: 1286

Dato : sept.-86
 Koordinator : X925.371,5 Y: 41761,6
 Retning : N
 Helling/stigning: -60°
 Høyde : +51,2 moh.
 Lengde : 7,7 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	grå gn. lys mlk, sprette gr. 1-3mm Fr. 0.00-0.15 Sl.	60-70						
1.20 - 1.70	0.50	Pegm.							
1.70 - 5.10	3.40	grå gn. lys mlk, sprette gr. 1-3mm	70						
5.10 - 7.70	2.60	grå gn.b.d. Rel. lys mlk. litt växl m/ biot.hbl.gn.band, gr-rik.	70						
24.10.86									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.760

Dato : sept.-86
 Koordinator : X: 925.371,3 Y: 41.761,6
 Retning : N
 Helling/stigning: -50°
 Høyde : +51.2 m.o.h.
 Lengde : >0,00 m

Borehull: 1287

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.50	7.50	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm Fr.1.20-1.40 Py.Cp.Sl.Gn. Fra 5.10-5.20	50						
7.50 - 41.30	33.80	grå gn.b.d. Lys mlk.sprette gr.1-3mm Enstaka opp til 5 cm tykke hbl.biot.gn band, gr-rik.	50-60	0.03	0.06	0.13		2,7	40,30-41,30
41.30 - 42.80	1.50	musk.gn. Lys mlk-grov.Växl m/skarn, biot.gn.band.Stripet imp Sl.Cp.Gn.Py.	45-50	1.48	0.29	5.44		8,7	
42.80 - 50.00	7.20	grå gn. Lys mlk.sprette gr.växl m/Pegm.band samt enkelte biot.hbl.band.	50-60	0.04	0.02	0.11		2,7	42,80-43,80

07.10.86

Stellan Burman

Lokalitet: 4 1.760

Borehull: 1285

Dato : sept.-86
 Koordinator : X: 925.371,5 Y: 41.761,6
 Retning : N
 Helling/stigning: -30°
 Høyde : +51.2 m.o.h.
 Lengde : 27,80 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.00	4.00	grå gn. lys mlk.sprette gr.1-3mm enstaka smale biot.gn. band.Fr.0.40-0.50 <u>Sl.Cp.</u> <u>Py.Gn.</u> Slak fold.	10-40)						
4.00 - 5.10	1.00	Pegm. m/enkelte <u>Cp.korn.</u>							
5.10 - 7.00	1.90	grå gn. lys mlk-fin.Sprette gr. 1-2 mm.	20						
7.00 - 10.90	3.90	Pegm. m/enslige biot.flagor. Sprette korn <u>Py.</u> enstaka <u>Cp.korn.</u>							
10.90 - 13.50	2.60	grå gn. lys mlk-sprette gr.1-3mm enkelte biot.rikere par- tier,spor <u>Py.</u>	20-30						
13.50 - 22.00	6.50	grå gn.b.d. Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm växl m/cm tykke hbl.gn og Amf.band,gr- rike,stictolittisk m/ <u>Py.</u> spor <u>Cp.</u> slake folder	10-35 }						
22.00 - 23.00	1.00	kjernetap							
23.00 - 27.80	4.80	hbl.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.biot. gn, Amf-band.Delvis svak ampr. <u>Py.</u> sprette gr. 1-3 mm.	20-30						

13.10.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.760

Dato : sept.-86

Koordinater : X: 925.372,6 Y: 41.764,5

Retning : N

Helling/stigning: +75°

Høyde : + 55.8 m.o.h.

Lengde : 29,30 m

Borehull: 1284

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.10	2.10	grå gn. Lys mlk, musk. rik, impr. Py. Sl. Gn.	60	0.83	0.21	1.75		6.0	0.00 - 1.00
				1.03	0.94	8.60		9.3	1.00 - 2.10
2.10 - 4.30	2.20	" " Rel. lys mlk, skarnførende delvis komp. malm	60-70	0.16	0.17	0.34	} ?	4.9	2.10 - 3.10
				0.59	0.36	4.96		9.7	3.10 - 4.30
4.30 - 5.00	0.70	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm hbl. førende mot slutten.	60	0.04	0.09	0.22		3.9	
5.00 - 19.30	14.30	hbl. gn. Mørk mlk. gr-førende 1-3 mm, enkelte dm tykke hbl. biot. gn. band.	60 70						
19.30 - 20.10	0.80	Pegm.							
20.10 - 20.90	0.80	grå gn. b.d. Rel. lys mlk. svak impr. Py.	70						
20.90 - 30.00	9.10	hbl. gn. Mørk mlk. växl m/hbl. biot. gn, sprette gr. Imp. Py. företrädesvis i hbl. biot. gn.	70-80						
25.09.86 Stellan Burman Det kan det være en del av hvelvet med malm 2.10 - 3.10 ?									

Lokalitet: 41.760

Borehull: 1283

Dato : sept.-86
 Koordinater : X: 925.371,5 Y: 41.761,6
 Retning : lodd
 Helling/stigning: -90°
 Høyde : +51,2 m.o.h.
 Lengde : 26,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.50	4.50	grå gn. lys mlk.sprette gr.1-3 mm.Ved 0,25 m spor <u>Sl.</u> <u>Cp.Py.</u>	70-80						
4.50 - 10.00	5.50	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk,sprette gr.1-3 mm,litt variert med grå gn,mot slutten overgang til hbl.gn. svak impr. <u>Py.</u>	80						
10.00 - 11.30	1.30	kjernetap							
11.30 - 20.80	9.50	grå gn. lys mlk,sprette gr.Ens-taka opp til 5 cm tykke hbl.biot.gn.band,gr-før-ende.	70-90						
20.80 - 26.30	5.50	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk,litt växl m/grå gn.og biot.gn.band.svak impr. <u>Py.</u> spor Cp. ved 25.20 m.	80-90						
03.10.86									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.760

Borehull: 1282

Dato : sept.-86

Koordinater : X:925.358,7 Y:41.757,0

Retning : S

Helling/stigning: +50°

Høyde : +54,6 moh.

Lengde : 27,30 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.60	2.60	hbl.gn. Mørk mlk. foldet, gr-rik 1-4 mm, spor <u>Py.Cp.</u>	10-50						
2.60 - 5.10	2.50	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/biot. hbl.gn, gr-førende.	50-60						
5.10 - 6.00	0.90	grå gn. lys mlk.delvis musk.preg- et, biot.som enkelte fla- gor, sprette gr.1-3 mm.	60	0,02	0,01	0,03		1,4	
6.00 - 6.40	0.40	hbl.biot.gn. Mørk mlk.impr.stripet <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	60	0,66	0,14	4,01		6,6	
6.40 - 9.00	2.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/dm tykke biot.hbl.gn.band, sprette gr.1-3 mm, litt foldet.	40-70	0,03	0,05	0,03		3,0	640-720
				0,35	0,15	0,06		4,1	720-900
9.00 - 10.20	1.20	skarn Grønlig mlk, rik impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>		3,02	0,42	11,64		7,5	
10.20 - 11.90	1.70	biot.gn. Pegmatitisk Mørk mlk-grovk.Brecciert foldet, enkelte klysor, og skikt m/ <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>		1,82	0,37	1,32		3,8	
11.90 - 12.70	0.80	kvarts		0,12	0,24	0,06		5,4	
12.70 - 27.40	14.70	hbl.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.biot. gn, biot hbl.gn, gr-førende delvis gr-rik företrädes- vis i de hbl.rikere par- tiene, svak impr. <u>Py.</u>	50						

08.10.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.760

Borehull: 1281

Dato : sept.-86
 Koordinator : X: 925.362,6 Y: 41.759,7
 Retning : S
 Helling/stigning: -60°
 Høyde : + 50.7 m.o.h
 Lengde : 28,00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk.Stripet <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u> foldet.	45	1.74	0.33	3.72		5.4	
1.20 - 2.00	0.80	Pegm. m/biot.skikt		0.04	0.05	0.15		1.6	
2.00 - 16.00	14.00	grå gn. Lys mlk.enkelte smale biot.hbl.band,sprette gr. 1-2 mm.	70-80						
16.00 - 17.50	1.50	biot.sk. Mørk mlk,pegmatitiska partier. <u>Py.Cp.Sl.</u> som spor.	70-80	0.06	0.17	1.12		8.3	
17.50 - 19.00	1.50	kjernetap	70-80						
19.00 - 19.80	0.80	kvarts							
19.80 - 25.10	5.30	grå gn. Lys mlk.enkelte biot. rikere partier,sprette gr.1-3 mm.							
25.10 - 27.70	2.60	Pegm. grå gn. Lys mlk.växl m/skarn, foldet, impr.striper <u>Sl.</u> <u>Cp.Py.</u>		0.45	0.11	2.34		3.5	2510-2610
				0.41	0.29	1.01		4.5	2610-2770
		26.09.86 Stellan Burman							

Lokalitet: Profil 41.880

Dato : okt.-86

Koordinater : X: 925.368,3 Y: 41.876,3

Retning : S

Helling/stigning: -69°

Høyde : +47,1 m.o.h.

Lengde : 34.30 m

Borehull: 1280

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.80	3.80	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band.Hbl-førende, gr- rik 1-3 mm, samt enstaka cm tykke kv.pegm.band. Py.Sl. fr.0.00-0.20 m.	70						
3.80 - 10.10	6.30	grå gn. Lys mlk.Sprette gr.1-3mm	65-70						
10.10 - 13.00	2.90	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.spor hbl. Sprette gr.1-3 mm.	60						
13.00 - 13.70	0.70	Pegm. m/biot.skikt og flagor.							
13.70 - 17.30	3.60	biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.impr. Py.	75						
17.30 - 17.90	0.60	kvarts							
17.90 - 19.90	2.00	biot.gn. Mørk mlk-grovmlk.växl m/ dm tykke biot.sk.band. Svak impr.Py. Foldet.	70						
19.90 - 24.50	4.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn, og pegm.band, svak impr. Py. og spor hbl, företrä- desvis i biot.gn.band. Cp. ved 21.50 i pegm.	60-70						
24.50 - 25.80	1.30	Pegm.							
25.80 - 32.70	6.90	hbl.biot.gn. Mørk mlk.variert m/over- ganger fr.hbl.biot-biot- hbl.gn.svak impr.Py.	70						

14.11.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.760

Borehull: 1279

Dato: Aug-86
 Koordinater: x:925.362,6 y:41.759,7
 Retning: S
 Helling/stigning: - 45°
 Høyde: + 50,7 moh.
 Lengde: 27,10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	biot.gn. Mørk mlk. spar hbl. stripet impr. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u> Foldet	45-60°	1.01	0.48	4.24		6.2	
1.00 - 1.80	0.80	Pegm. M/enkelte biot flagor.							
1.80 - 15.10	13.30	grå gn. Lys mlk. enkelte upptill den tjocka pegm. band Sprette gr. 1 - 3 mm	45°						
15.10 - 18.60	3.50	Biot.gn. (Pegmatitisk) Mørk mlk. grovk. delvis brecciert. Spor <u>Py</u> enkelte gr. 1 - 2 mm	50-60°						
18.60 - 19.70	1.10	Biot.hbl.gn. Mørk mlk. gr. förande 1 - 2 mm	70-80°						

Borehull: 1279

Dato :
Koordinater :
Retning :
Helling/stigning :
Høyde :
Lengde :

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
19.70 - 22.00	2.30	Biot.gn. (Pegmatitisk)	Mørk mlk.-grovk. delvis brecciert. Spor hbl. <u>Py</u>	60-70 ⁰					
22.00 - 23.00	1.00	Pegm.	M/biot. skikt, flager spor <u>Po.</u> , <u>Py.</u>	-	0.01	0.09	0.49	2.9	
23.00 - 25.10	2.10	Biot.gn.	Mørk mlk. grovk. delvis Pegmatitisk, skarn stripet impr. <u>Sl.Cp.Gn.</u> <u>Py.Po.</u>	70 ⁰	0.42	0.32	7.69	7.0	
25.10 - 27.10	2.00	Biot.gn.	Mørk mlk. växl m/grå gn. band. <u>Sl</u> vid 25.40, 26.50	60-70 ⁰	0.26	0.32	0.61	6.4	25.10-26.10
					0.01	0.17	0.25	4.0	26.10-27.10
		12.09.86							
		Stellan Burman							

Lokalitet: 41.760

Borehull: 1278

Dato : Sept.-86

Koordinater : x:925.362,1 y:41.759,7

Retning : opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : + 55.5 moh.

Lengde : 11.70 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.30	7.30	hbl.gn. Mørk mlk. delvis gr. rik 1-5 mm. foldet, enkelte Amfibotitiske band spor <u>Py.</u> Vid 4.50 Cp.	0-70°						
				0.04	0.05	0.08		5.4	630-730
7.30 - 8.30	1.00	Skarn Rik <u>malm.</u>	80°	2.34	0.15	14.28		6.5	
8.30 - 11.70	3.40	Hbl.biot.gn. Mørk mlk. sprette små gr. 1-2 mm. Svag impr. <u>Py.</u> Enkelte upptill 5 cm tjocka Amf. band.	80°	0.03	0.24	0.10		6.7	830-930
		16.09.86							
		Stellan Burman							

Lokalitet: 41.760

Borehull: 1277

Dato: Aug.-86
 Koordinater: x:925.362,1 y:41.759,7
 Retning: Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde: + 50.7 moh.
 Lengde: 34.30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.50	1.50	Biot.hbl.gn. Mørk mlk. foldet impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	20-45°	1,12	0,56	5,40		6,7	
1.50 - 2.00	0.50	Pegm. M/biot. flagor.							
2.00 - 19.80	17.80	Grå gn. Rel. lys mlk. m/ enkelte dm. tjocka biot. rikere band. Hbl. förande sprette gr. 1-3 mm.	50° 55°						
19.80 - 22.20	2.40	Biot.gn. Mørk mlk. delvis hbl. förande sprette gr. 1-2 mm. Spor <u>Py.</u>	60° 70°						
22.20 - 24.40	2.20	Pegm. Med biot. skikt							
24.40 - 25.50	1.10	Biot.gn. Mørk grovk. Pegmatitisk.	45°	0,08	0,04	0,14		3,1	
25.50 - 29.30	3.80	Biot. Musk Rel. mørk mlk. skarn förande striper imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	70-80°	0,90	0,90	5,82		7,71	

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1277

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29,30 - 34,30	5,00	grå gn. rel. lys mlk. växl m/ biot hbl gn. band.	70-80 ^o	0,02	0,09	0,12		2,8	29,30-30,30
		29/8-86 Stellan Burman							

Lokalitet: Profil 41,720

Borehull: 1276

Dato: Juli-86

Koordinater : X: 925.375,4 Y: 41.723,2

Retning : lodd.

Helling/stigning: -90°

Hoyde : +52,3 moh.

Lengde : 44.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.60	4.60	grå gn. lys mlk.sprette gr. spor hbl.	70						
4.60 - 25.00	20.40	" " Rel.lys mlk.växl m/hbl. gn.band, gr-rik 1-3 mm.	"	0.01	0.05	0.05		2.0	24.00 - 25.00
25.00 - 28.90	3.90	grå gn.b.d. m/skarn Rel.mørk rel.komp.malm	70-80	1.49	0.37	6.48		7.67	
28.90 - 34.20	4.30	grå gn.b.d. Rel.lys mlk:enstaka gr. 1-2 mm.	70-80	0.04	0.11	0.10		3.4	28.90-34.00
34.20 - 35.30	1.10	biot.gn. Mørk mlk-grovk.tildels pegmatitisk,svak imp. Py.Po.Sl.Cp. Brecciert.		0.01	0.14	0.89		4.0	
35.30 - 44.50	9.20	biot.gn. Rel.mørk växl m/grå gn. band.	70-80						

14.07.86

Stellan Burman

Lokalitet: Profil: 41.720

Borehull. 1275

Date July-86

Koordinater : X: 925,377,4 Y: 41.724,5

Retning : Lodd

Helling/signing: -90°

Hoyde : +52,3 mol.

Lengde : 27.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.20	4.20	grå gn. Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm, spor hbl.	70-80						
4.20 - 7.20	3.00	hbl.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band,rel.gr-rik 1-2 mm.	70-80						
7.20 - 8.90	1.70	kjernetap							
8.90 - 22.20	13.30	grå gn. Rel.lys mlk.enstaka hbl. gn.band.	70-80						
22.20 - 23.20	1.00	kjernetap							
23.20 - 25.80	2.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.enstaka hbl. gn.band.	70-80	0.01	0.02	0.01		1.9	2480-25,80
25.80 - 27.30	1.50	<u>malm</u>	70-80	0.64	0.42	3.96		6.1	
		14.07.86 Stellan Burman							

Lokalitet: 41.720

Borehull: 1274

Dato: Juni-86

Koordinater: X: 925.372,3 Y: 41.721,5

Retning: Lodd

Helling/stigning: -90°

Høyde: +52,3 moh.

Lengde: 32,30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.20	0.20	skarn Grønn mlk.rik impr. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>							
0.20 - 24.10	23.90	grå gn. Lys mlk.enkelte cm tykke hbl.gn.bånd,gr.rik.	70	0.03	0.01	0.04		1.4	23.10 - 24.10
24.10 - 28.70	4.60	grå gn m/skarn Rel.lys mlk.delvis växl m/biot.gn.band,striper impr. <u>Py.Sl.Cp.Gn.</u>	80	1.21	0.35	7.31		6.74	
28.70 - 30.05	1.35	grå gn. Lys mlk.spor hbl.	70-80	0.09	0.10	0.13		2.4	
30.05 - 31.40	1.35	biot.gn. Pegmatitisk Mørk mlk,brecciert sprekkfyllinger m/ <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>		1.46	0.64	1.79		3.8	
31.40 - 32.30	0.90	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	80	0.04	0.01	0.80		1.7	
17.6.86 Stellan Burman									

Lokalitet: 41.720

Borehall, 1273

Dato Juni-86

Koordinator

Retraining;

Helling/signing: +80⁰

Hoyde

Lengde

June-86

X: 925.364,3 Y: 41.721,5

N.

400

 $+ 57,1 \text{ mol}$

8.00 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.80	1.80	biot.gn. Mørk mlk.impr. <u>Py. Sl?</u> Foldet.	70-90	0.34	0.39	1.55	..	6.5	
1.80 - 5.70	3.90	grå gn. Rel.lys mlk.skarn-førende rik impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> Runde folder.	}	0.32	0.27	8.88		7.6	180 - 3.00
				1.46	0.70	12.24		8.5	3.00 - 4.50
				0.86	0.47	2.07		6.9	4.50 - 5.70
5.70 - 7.80	2.10	hbl.gn. Mørk mlk.sprette gr.1-3 mm <u>Sl.</u> ved 6.20 m.	70-80	0.41	0.37	1.37		4.9	5.70 - 6.70
7.80 - 8.00	0.20	grå gn. Lys mlk.svak impr. <u>Py.</u>	80						

17.6.86
Stellan Burman

Lokalitet: ca. 41.720

Borehull: 1272

Dato : Juni-86

Koordinater : X: 925.364,3 Y: 41.721,5

Retning : Lødd

Helling/stigning: -90°

Høyde : +52,4 moh.

Lengde : 31,80 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.05	2.05	grå gn. Lys mlk.enstaka cm tykke biot.gn.band.Sprette gr. 1-3 mm.	80-90						
2.05 - 5.40	3.35	kjernetap							
5.40 - 20.10	14.70	grå gn. Lys mlk.enstaka smale hbl.gn.band,sprette gr. 1-3 mm.Fr.9.50-9.70 åpen fold i hbl.gn.gr.rik. Fr.19.20-19.80 åpne folder	70-90 < 70-80						
20.10 - 22.80	2.70	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/biot. hbl.gn.band,gr-rik.	80	0.02	0.01	0.07		2.8	21.80-22.80
22.80 - 24.60	1.80	" " Rel.lys mlk.delvis skarn førende rik impr.Sl.Cp. Gn.Py. Lys Sl.	70-80	0.92	0.07	6.48		7.8	
24.60 - 28.80	4.20	biot.gn. (Pegmatitisk). Rel.mørk mlk-grovk.delvis brecciert,växl m/grå gn. band,skarnførende,striper og band m/Sl.Cp.Gn.Py. spor Po.	70-90	0.94	0.47	6.32		8.2	24.60-26.10
				1.30	0.87	2.00		4.7	26.10-27.60
				0.04	0.14	0.04		4.5	27.60-28.80
28.80 - 30.00	1.20	kjernetap							
30.00 - 30.90	0.90	grå gn.b.d. Lys mlk.sprette gr.1-3mm spor Sl.runde folder.	70-80	0.02	0.03	0.02		2.00	
30.90 - 31.80	0.90	biot.gn. Mørk mlk.växl m/smale grå gn.band,stripet impr. Sl.Cp.Gn.Py.	70	0.09	0.89	2.47		9.5	
16.6.86									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.720

Borehull: 1271

Dato : Mai-86
 Koordinator : X: 925.357,1 Y: 41.721,4
 Retning : Vest
 Helling/stigning: + 70°
 Høyde : + 56,9 moh.
 Lengde : 5,00 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	grå gn. Lys mlk.sprette komp. striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	70	1.96	0.45	4.64		8.1	
0.70 - 3.50	2.80	" "	60-70						
3.50 - 5.00	1.50	hbl.gn. Mørk mlk.växl m/enstaka grå gn.band,gr-førende.	70						

03.06.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.720

Dato: Mai-86

Koordinater: X: 925,357,4 Y: 41.721,3

Retning: Lodd

Helling/stigning: -90

Høyde: + 52,4 moh.

Lengde: 30,00 m.

Borehull: 1270

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
0.00 - 2.40	2.40	biot.gn. Pegmatitisk.	Rel.mørk mlk-grovk. växl m/grå gn.band,stripet impr. <u>Py.Sl.Cp.Gn.</u>	70-90	0,15	0,44	2,46		5,2	
2.40 - 17.20	14.80	grå gn.b.d.	Lys mlk.sprette gr.l-3mm	70-80	0,03	0,02	0,08		1,7	16,20-17,20
17.20 - 20.50	3.30	biot.gn. Pegmatitisk.	Rel.mørk mlk-grovk. litt växl m/grå gn.band,dell- vis brecciert. <u>Sl.Cp.Gn.</u> <u>Py.Po.</u> som striper klyser.	45-90	0,03	0,15	0,60		3,6	
20.50 - 21.10	0.60	Pegm.	Lys grovk. m/biot.skikt, spor <u>Po.</u>		0,03	0,06	0,25		2,3	
21.10 - 22.20	1.10	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.l-3mm	45	0,19	0,13	1,03 ?		3,1	
22.20 - 25.40	3.20	" "	Lys mlk.delvis skarn- førende rik imp. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	80-90	2,53	0,10	8,14		5,8	
25.40 - 27.70	2.30	hbl.gn.	Mørk mlk.Fink.biot.impr. <u>Py.Sl.?</u>	70-80	0,03	0,12	0,16		5,4	
27.70 - 30.00	2.30	musk.biot.gn.	Rel.lys mlk-grovk.foldet delvis ondulerad,stripet imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> <u>Boret gjennom.</u>	45-70	0,26	0,42	3,89		7,7	
03.06.86 Stellan Burman										

Lokalitet: 41.720

Dato : Mai -86

Koordinater : X: 925.352,9 Y: 41.721,3

Retning : S

Helling/stigning : -35°

Høyde : +52,4 moh.

Lengde : 21.00 m

Borehull: 1269

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. skarn rik impr. <u>Py.Cp.Gn.</u> <u>Sl. Foldet.</u>	45 > 45	0.40	0.92	7.24		7.5	
1.20 - 1.90	0.70	Pegm. Flager og skikt av biot. <u>Sl.Gn.</u>		0.10	0.30	1.60		2.3	
1.90 - 4.60	2.70	biot.sk. Mørk grovk.växl m/Pegma- titisk biot.gn.Foldet delvis brecciert. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.som sprickfyllning-</u> <u>ar.</u>	45	0.15	0.57	2.79		9.2	1.90-3.20
				0.08	0.31	0.89		7.1	3.20-4.60
4.60 - 8.10	3.50	biot.hbl.gn. Mørk mlk.sprette gr.1-3 mm.Svak impr. <u>Py.</u>	50-60	0.01	0.02	0.04		4.1	4.60-5.60
			70	0.01	0.02	0.04		4.1	5.60-8.10
8.10 - 8.90	0.80	biot.sk. Mørk mlk. <u>Svak impr.Py.Sl.</u> <u>Cp.Gn.</u>	60	0.04	0.15	1.13		5.6	
8.90 - 11.70	2.80	grå gn. m/skarn Rel.lys mlk.rik impr. <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u> (Rik malm)	60	1.17	0.56	10.06			
11.70 - 13.10	1.40	Biot.sk. Mørk mlk.Svak impr. <u>Py.</u>	60	0.07	0.14	0.69		8.7	
13.10 - 17.30	4.20	grå gn. lys mlk.sprette gr.1-3 mm enstaka opp til 5 cm tykke biot.hbl.gn.band.	60						
17.30 - 19.30	2.00	Pegm. Lys grovk.m/sprette biot. flager.Litt sprett <u>Po.Py.</u> Fra 18.60-19.30 rik <u>Gn.</u>		0.07	0.14	0.06		1.5	17.30-18.60
				12.74	0.15	1.56		1.3	18.60-19.30
19.30 - 21.00	1.70	grå gn.b.d. Rel.lys mlk,skarnførende rik impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> Foldet. (Boret gjennom)	0-60	1.72	0.68	4.40		5.4	
		09.06.86							
		Stellan Burman							

Lokalitet: 41.720

Borehull: 1268

Dato : Mai-86

Koordinater : X: 925.352,9 Y: 41.719,5

Retning : S

Helling/stigning: -65°

Høyde : +52,4 moh.

Lengde : 19.5 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.70	1.70	biot.hbl.gn. Mørk mlk.rik impr. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	80-90	0,81	0,22	5,88		7,1	
1.70 - 9.90	8.20	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende,växl m/hbl.biot.gn.band. Foldet m/runde folder. Fr. 8.0 m-9.90 m enkelte grovkorniga band m/store gr. 4-6 mm.	70-90 45 0	0,03	0,09	0,15		4,1	1,70-2,70
9.90 - 15.00	5.10	biot.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.biot gn. i starten, til grå gn.b.d. i sluttet m/opp- til 5 cm tykke biot.sk. band,enstaka mm tynne <u>Py.skikt.</u>	70-80						
15.00 - 19.50	4.50	grå gn. Lys mlk.enstaka cm tykke biot.hbl.gn.band.Sprette gr.1-3 mm, spor <u>Py.</u>	80						

04.06.86

Stellan Burman

Lokalitet:

Dato

Mai -86

Koordinater

X: 925.32,1 Y: 41.493,5

Retning

: S

Helling/stigning: - 20°

Høyde

: -16,2 moh.

Lengde

: 32.20

Borehull: 1267

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.00	3.00	biot.gn. Mørk mlk-grovmlk.onduler- ad imp. Sl.Cp.Gn.Py. glide plan ved 0.50.	0-5	0,22	0,25	1,33		6,8	
3.00 - 5.60	2.60	grå gn.m.d. Lys mlk.impr.Py.	20	0,06	0,08	0,11		4,7	3,00-4,00
5.60 - 9.60	4.00	biot.gn. Rel.mørk mlk,litt växl m/enstaka grå gn.band Md. impr. Py.	0-10	0,02	0,31	0,06		5,0	8,60-9,60
9.60 - 18.40	8.80	" Rel.mørk mlk-grovmlk.växl m/grå gn.band,delvis Peg- matitisk,rike malmband. Rik Po. fr.13.85-14.10 m Foldet,delvis brecciert.	0-20	1,11	0,31	0,47		6,8	9,60-11,00
				0,10	0,32	0,12		4,6	11,00-12,50
				0,40	0,61	3,41			12,50-17,00
				0,59	0,57	1,59		5,7	17,00-18,40
18.40 - 22.20	3.80	biot.gn. Mørk mlk-grovmlk.imp.Py. spor Cp. Foldet.	0-10	0,53	0,49	1,51			18,40-19,40
22.20 - 32.20	10.00	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm enstaka smale biot.gn. band m/Py. Slake folder.	20 5 0 0-10						
13.05.86									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.494.

Borehull: 1266

Dato

Mai -86

Koordinater

X: 925.312,1 Y: 41.493,5

Retning

S

Helling/stigning:

- 12°

Høyde

- 16,2 moh.

Lengde

25,90 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.90	2.90	biot.gn. Mørk mlk, foldet, rik imp. Py. Fr. start Sl.Cp.Gn. Py. (ved 0.50 glideplan)	0-10	0.49	0.26	3.21		7.1	0.00 - 1.50
				0.09	0.19	0.36		5.6	1.50 - 2.90
2.90 - 5.50	2.60	Pegm. Lys mlk-grov, væxl m/biot. gn.band.Sl.Cp.Gn.Py. före- trådesvis i biot.gn.banden Foldet.Brecciert.		0.68	0.78	3.72		4.6	2.90 - 4.20
				0.45	0.23	3.84		5.6	4.20 - 5.50
5.50 - 12.80	7.30	biot.gn. (Pegmatitisk) Mørk mlk-grov.Foldet on- dulerad, væxl m/pegm.band stripet imp.Sl.Cp.Gn.Py.	0-10	0.71	0.29	3.54			5.50 - 11.50
				0.49	0.11	1.91			11.50 - 12.80
12.80 - 14.50	1.70	Pegm.							
14.50 - 17.50	2.00	grå gn.b.d. Lys mlk.gr.førende 1-4mm Foldet.	0-10						
17.50 - 24.30	6.80	grå gn. (m/"biot.stänk") Lys mlk-fink, ligner grå gn.alm. men m/"stänk" av biot.(småle biot.ovaler 10-20 mm lange 1-2 mm brede)Slake folder, spret- te gr.1-3 mm.	0-5						
24.30 - 25.90	1.60	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-2mm	5						

13.05.86

Stellan Burman

Lokalitet: Y: 41.494

Dato : Mai -86

Koordinator : X: 925.312,1 Y: 41.493,7

Retning : S

Helling/stigning: -17°

Høyde : -16,2

Lengde : 44,30 m.

Borehull: 1265

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% Ag	% Fe	
0.00 - 3.80	3.80	Biot.musk. Rel.mørk mlk.småfoldet, i starten spor hbl.m/over- gang til musk.biot.gn. mot slutten,stripet impr. Py.Cp.Gn.Sl.	0-10	0,37	0,35	1,90		6,6	
3.80 - 7.60	3.80	musk.biot.gn. lys,mlk-grovmlk.ondulerad impr. Py. spor Sl.	0-10	0,08	0,05	0,13		5,9	3,80-4,80
7.60 - 10.70	3.10	biot.gn. Mørk mlk-grovmlk.växl m/ musk.biot.gn.band,svak impr. Py. spor Cp. slake folder.	5-15	0,04	0,22	0,09		4,8	9,70-10,70
10.70 - 32.00	21.30	biot.hbl.gn. Mørk mlk-grov-mlk.växl malm typisk L III W,malm Foldet.Brecciert.	0-10	0,43	0,20	1,22		7,4	10,70-12,00
32.00 - 44.30	12.30	biot.gn. Mørk mlk.delvis växl m/ smale grå gn.band,enkelte spor hbl.ondulerad,Sl. ved 37.50-38.10.	0-10	1,25	0,28	5,23	14,3		12,00-32,00
				0,18	0,21	0,16		5,3	32,00-33,00

13.05.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.495

Dato

April - 86

Koordinater

X: 925.312,1 Y: 41.494,0

Retning

Sør

Helling/stigning

-25°

Høyde

-16,2

Lengde

29,10 m.

Borehull: 1264

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.40	5.40	grå gn.m.d. Lys mlk.spor hbl.Rik Py. Sl. 0.00-0.25 1.00-2.00 spor Sl.Cp.	0-30	0.40	0.24	2.59		7.6	0.00-1.00
				0.07	0.24	0.27		6.4	1.00-2.00
5.40 - 7.40	2.00	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk.Rik på gn. 1-6 mm.	40-50						
7.40 - 14.00	6.60	grå gn.m.d. Lys mlk.spor hbl. Rik imp. Py. 8.40-8.70 Py.Sl. 10.70-12.00 rike striper og impr.Py.Fra 10.70- 14.00 Sl.Cp. Pegmatitiske ganger rik på Gl.	15-40	0.12	0.07	0.63		6.9	7.40-8.40
				0.20	0.14	5.12		8.8	8.40-9.40
				0.25	0.23	1.49		7.5	10.70-12.00
				0.62	0.34	0.73		6.7	12.00-13.00
				0.88	0.22	0.56		5.8	13.00-14.00
14.00 - 20.00	6.00	grå gn. Rel.lys mlk.sprett gr. 1.3 mm. i starten rik Py. Po.Sl.Cp.Ved 16.40-17.05 pegmatiske ganger med middels impr.Py.Gl.Sl.Cp. Mot slutten spor hbl.	10-40	0.59	1.01	3.55		6.3	14.00-15.00
				3.21	0.14	0.53		2.8	15.00-16.00
				1.27	0.34	1.37		4.5	16.00-17.05
				0.42	0.27	0.33		4.6	17.05-18.00
20.00 - 22.30	2.30	grå gn. Lys mlk.enkelte smale biot gn.band, foldet, svak imp. Py. företrädesvis i biot. gn.sprett gr.1-3 mm.spor Cp. ved 20.40-20.50 m.	30 0-20						
22.30 - 28.10	5.80	biot.gn. Mørk mlk.foldet (ondulerad) gr.rik mot slutten m/spor hbl.	0-10						
28.10 - 29.10	1.00	hbl.gn. Mørk mlk..Rund fold ved 28.40.Ved 28.50 avskjær- ing i rund fold av Amfi- bolitisk hbl.gn.	5-10 Fr.28.50 80						

13.05.86 Stellan Burman

Lokalitet: 41.495

Borehull: 1263

Dato : 24.4
 Koordnater : X: 925.314,5 Y: 41.493,0
 Retning : Ned
 Helling/stigning : -90°
 Høyde : -16,3
 Lengde : 6,70 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	grå gn. Lys mlk. Rik <u>Py.</u> impr.	80						
0.70 - 4.50	3.80	biot.hbl.gn. Mørk mlk.gr.rik 1-9 mm	60-70						
4.50 - 6.70	2.20	grå gn. Lys mlk.smale striper m.d.							
Kjell Stenamrk									

Lokalitet: 41.500

Dato 24.4.86

Koordinatorer : X: 925.314,5 Y: 41.493,0

Retning : Sør

Helling/stigning: + 82°

Høyde : - 12,2

Lengde : 89,40 m.

Borehull: 1262

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.00	5.00	biot.hbl.gn. Rel.mørk,mlk.städvis gr. rik 5-9 mm.Ved 4.80-4.95 spor skarn.Ved 3.20-3.60 foldet 0-10 ⁰ svak impr. Py.	70-75				g/tAgAu		
5.00 - 6.05	1.05	biot.gn Pegmatitisk Mørk grovk.Rik impr.Po. Py. Tynne striper Sl.	50-60	0.06	0.21	0.40	4.5/0.10	8,7	
6.05 - 13.00	6.95	Grå gn.b.d. Rel.mørk mlk.tynne biot. band med spor hbl.Sprette gr.1-3 mm.	40-80						
13.00 - 13.90	0.90	grå gn. Lys mlk.til fin mlk. tynne Sl.Py. striper.	50-70	0.44	0.12	0.87	17.6/0.20	2,5	
13.90 - 15.90	2.00	biot.gn. Rel.mørk grov mlk-til mlk Spor gr.2-4 mm.Biot.og biot.hbl. soner med Po. Py.Sl.striper.	60	0.42	0.14	1.46	14.4/0.20	5,3	13,90-14,90
				0.09	0.11	0.99	7.0/0.15	4,8	14,90-15,90
15.90 - 17.30	1.40	grå gn.b.d. Rel.mørk mlk.middels imp. Py.	0-50						
17.30 - 23.60	6.30	biot.gn. Pegmatitisk Mørk mlk.til grov mlk. mot slutten i veksling med grå gn.b.d.Rike Py. Po. striper.	60-70						
23.60 - 32.20	8.60	grå gn.m.d. Lys mlk.ved 26.00-26.50 foldet. 0-20 Py.striper.	40-50						
32.20 - 40.20	8.00	grå gn. Lys mlk.i veksling med gr.gn.m.d.Ved 36.70 folde- kne med spor Py.Sl. Rel. rik imp. Py.	10-50						
.....2									

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1262

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
40.20 - 47.40	7.20	biot.hbl.gn.	Rel.mørk mlk.til grov mlk.gr.rik 1-3 mm,en god del foldet.				8/t Ag/Au		
47.40 - 50.20	2.80	grå gn.m.d.	Lys mlk.med smale grå gn band.						
50.20 - 51.50	1.30	biot.gn.	Mørk mlk.til grov-mlk. foldet,spor gr.1-3 mm rel.rik imp. Py.						
51.50 - 64.00	12.50	grå gn.	Lys mlk.städvis musk.rik mot slutten spor gr.1-5 mm,en god del foldekne spor hbl.Ved 51.90 spor Sl.						
64.00 - 70.50	6.50	biot.hbl.gn.	Rel.mørk mlk,sprette gr. 1-3 mm.Rike py.render.						
70.50 - 73.60	3.10	grå gn.	Lys mlk.spor gr.2-6 mm i veksling med biot.hbl.gn. rik på Py.						
73.60 - 74.30	0.70	hbl.gn.	Mørk mlk.til grov-mlk. med klyser og striper Py.Po.Sl.	0,24	0,47	2,18	9.3/0.45	5,6	
74.30 - 89.40	15.10	grå gn.	Lys mlk. i veksling med biot.hbl.gn.gr-rik 1-4mm Striper og klyser Py.Po. 80.30-81.00 kjernetap.						
Kjell Stenmark									

Lokalitet: 41.505

Borehull: 1261

Dato 17.4.86
Koordinater X: 925.356, Y: 41.505,6
Retning 0°
Helling/stigning: + 90°
Høyde : - 7,1
Lengde : 47,40 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 17.00	17.00	grå gn.	Lys mlk. Sprette gr. 1-4mm Ved 2.85-2.86 komp. Po. Ved 3.10 spor Cp. 4.20-4.40 peg. 8.20-8.85 musk. gn. Ved 8.50-10.00 foldet.	40-70	60-70	40-75			
17.00 - 21.10	4.10	grå gn.b.d.	Rel.mørk mlk. i vekslng med smale band biot. gn. Ved 19.30-19.35 middels rand Py.Sl. Stådvls gr. rik 4-7 mm.						
21.10 - 25.10	4.00	biot.gn. Pegmatitisk	Mørk mlk.-grov mlk.Rel. rik imp. Py.Po. i biot. band, foldet.						
25.10 - 29.90	4.80	biot.gn.	Rel.mørk mlk-grov mlk. stådvls biot.band, rik på Py.Po. i vekslng med grå gn.lys mlk.Ved 26.35- 26.55, 26.80-26.85 rik biot.med spor hbl. og striper Py.Sl.	50-80					
29.90 - 34.95	5.05	grå gn.	Lys mlk.spret gr. 1-4mm musk.rikere partier ved 31.60 spor Py.Sl. stød- vis imp. Py.						
34.95 - 35.95	1.00	grå gn.b.d.	Rel.mørk mlk.enkelt biot. band med skarn og enkelte striper Py.Sl. Ved 35.10 35.20 biot.hbl.skarn rik Py.Sl.Cp. Ved 35.90 Sl. striper.						

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1261

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
35.95 - 47.40	11.45	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm med enkelte musk.rikere partier spesielt mot slut- ten. Kjell Stenmark	70-80	0.02	0.01	0.07		1.9	35.95-37.00

Lokalitet: 41.505

Dato 9-4

Koordinater : X: 925.356,6 Y: 41.505,6

Retning : Sør

Helling/stigning: + 82°

Høyde :

Lengde : 50,70 m.

Borehull: 1260

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 17.20	17.20	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm Musk.rikere partier, økende biot.mot slutten. Ved 15.00-15.80 musk.gn. Foldet ved 7.20-7.70 Ved 15.80 spor Sl.Ved 7.15 spor hbl.Komp. Po. ved 2.90-2.95.	70-80 45						
17.20 - 25.10	7.90	biot.gn. Pegmatitisk Mørk, grov medelgr. til grov. Ved 21.95-22.80 striper og klyser Po.Py. Sl.Cp. i øvrigt imp.Py. Po. En god del foldet.	70-80	0,05	0,07	0,13		2,5	21,00-21,95
				0,03	0,11	2,37		3,8	21,95-23,00
				0,03	0,03	0,09			23,00-24,00
25.10 - 26.65	1.55	grå gn. Lys mlk.Rel.gr.rik 1-3mm	40-60						
26.65 - 30.00		biot.gn. Rel.mørk mlk.i veksling med tynne grå gn.band, tynne Sl. striper med spor hbl. i biot.rike band 27.70-28.50.	60-80	0,08	0,20	0,71		6,8	27,70-28,50
30.00 - 33.75	3.75	grå gn. Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm med enkelte biot. band mot slutten svak imp. Py.	60-70						
33.75 - 35.65	1.90	biot.gn. Rel.mørk mlk.til grov mlk.Ved 34.70-34.80 fol- det med skarn, en god del foldet, mm tynne Py.rendet	20-60						
35.65 - 38.80	3.15	grå gn. Lys mlk.städvis musk.rik Ved 37.10-37.40, 37.60 folder med rik Py.Sl. ved 37.60 Gn.rand.		0,04	0,08	0,10		1,7	36,00-37,00
				0,35	0,26	3,78		4,7	37,00-38,00
				0,02	0,01	0,04		2,0	38,00-38,80

Lokalitet:

Borehull: 1260

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
38.80 - 41.70	2.90	biot.gn. Rel.mørk mlk.til grov mlk.städvis gr.1-3 mm 39.10-39.70 kvarts en god del foldet.Striper og klyser Py.Po.Sl.Gn. Städvis et Pegmatitisk utseende.	75-80	0,02	0,06	0,12		2,7	38,80-39,80
				0,02	0,10	0,88		3,7	39,80-41,00
				0,02	0,32	1,27		4,7	41,00-41,70
				0,01	0,01	0,04		1,6	41,70-43,00
41.70 - 44.00	2.30	grå gn. lys mlk.sprette gr.1-3mm	70-75						
44.00 - 47.25	3.25	biot.gn. Rel.mørk mlk.til grov mlk.sprette gr.2-7 mm i veksling med grå gn.Biot. rike band med Py.Sl.	60-75	0,02	0,09	0,37		2,9	45,00-46,00
				0,03	0,06	0,41		2,5	46,00-47,00
47.25 - 50.70	3.45	grå gn.b.d. lys mlk.sprette gr.1-5 mm.Städvis spor Py.	70-80						

Kjell Stenmark

Lokalitet: 41.505

Dato 8 - 4

Koordinater : X: 925.353,9 Y: 41.505,7

Retning : Sør

Helling/stigning: + 72°

Høyde : - 7,4

Lengde : 51,60 m.

Borehull: 1259

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 6.50	6.50	grå gn.	Lys mlk.sprette små gr. i veksling med tynne lag grå gn. b.d.	70-85					
6.50 - 10.00	3.50	grå gn.b.d.	Rel.mørk mlk.sprette gr. 2-6 mm.	60-75					
10.00 - 16.90	6.90	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.3-7mm i veksling med grå gn. b.d.band ved 14.10-14.40 grå gn.b.d.rik imp.Py. Ved 16.40-16.90 grå gn. musk.d.	60-80					
16.90 - 21.55	4.65	grå gn.b.d.	Rel.mørk mlk,sprett gr. 3-7 mm,enkelte grå gn. band,stedvis Py.rik.	60-75					
21.55 - 23.70	2.15	biot.gn. Pegmatitisk	Mørk mlk-grov,rik imp.Py i biot.band.Ved 21.90 spor Cp.	50-60					
23.70 - 25.90	2.20	grå gn.b.d.	Rel.mørk mlk.städvis grov mlk.Rel.rik på gr.1-3 mm. Ved 23.80 en biot.rand med spor hbl. rik på Py. Sl.		0,02	0,02	0,08	2,1	24,90-25,70
25.90 - 33.60	7.70	grå gn.	Rel.lys finmlk-mlk.städ- vis musk.rik,i veksling med biot.gn.städvis peg. mlk.til grov mlk. med rike render og klyse Py. Sl. til 29.00.Spor hbl.ved 28.50 mot slutten rike Py.render i musk.rike grå gn.Spor Sl.ved 32.45.2	60-70	0,02	0,09	0,84	3,8	25,70-27,00
					0,02	0,03	0,06	2,1	27,00-28,00
					0,02	0,06	1,04	4,1	28,00-29,00
					0,02	0,04	0,11	2,8	29,00-30,00

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Borehull:

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
33.60 - 40.10	6.50	grå gn. Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm med enkelte tynne biot.band.	60-70						
				0,02	0,02	0,07		2,1	39,00-40,10
40.10 - 43.75	3.65	grå gn.m.d. Lys mlk.i veksling med biot.gn.band opp til 3-4 cm, städvis Pegmatitisk utseende. Rike striper og klyser Py.Po.Sl. mest i biot.banden. Rik Gn. ved 40.60. Ved 42.40 foldet.	60-80	0,90	0,34	2,86		3,7	40,10-41,00
				0,07	0,09	0,61		3,7	41,00-42,00
				0,04	0,08	0,53		3,0	42,00-43,00
				0,02	0,08	0,47		3,2	43,00-43,75
43.75 - 45.10	1.35	grå gn. Lys mlk.	60-70	0,02	0,03	0,04		2,0	43,75-45,10
45.10 - 51.60	6.50	grå gn.m.d. Lys mlk.spor gr.1-3 mm i veksling med gr.gn.b.l. og enkelte biot band. Sprette striper og klyser Py.Sl.Cp. Städvis noe foldet.	50-80	0,28	0,20	0,77		3,4	45,10-46,00
				0,43	0,24	2,05		4,3	46,00-47,00
				0,02	0,03	0,07		2,4	47,00-48,00
				0,02	0,02	0,04		2,1	48,00-49,00
				0,02	0,11	0,31		2,5	49,00-50,60

Kjell Stenmark

Lokalitet: 41.500

Dato Mars-86

Koordinator : X: 925.353,9 Y: 41.505,7

Retning : S

Helling/stigning: + 62°

Høyde : - 7,4

Lengde : 92,30 m.

Borehull: 1258

side 1

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
0.00 - 5.80	5.80	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm enstaka biot.skikt m/Py.	60-70				g/tAuAg		
5.80 - 20.20	14.40	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.växl m/dm tykke biot.gn.band,sprette gr.1-3 mm,imp.Py.företrä- desvis i biot.gn.banden. Ved 13.80 komp.Po.2 cm.	60-70						
20.20 - 23.10	2.90	biot.gn. (Pegmatitisk)	Rel.mørk mlk-grovk.delvis brecciert,foldet,spor <u>Sl</u> <u>Cp.Gn.Py.</u>	45-70	0.02	0.07	0.09	<0.10/2.0	3,7	20,30 - 21,30
					0.01	0.07	0.10	<0.10/1.9	4,2	21,30 - 22,30
					0.14	0.02	0.34	0.10/4.1	2,3	22,30 - 23,10
23.10 - 25.20	2.10	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	50	0.02	0.02	0.07	<0.10/2.6	1,9	24,20 - 25,20
25.20 - 27.10	1.90	biot.gn.	Mørk mlk.delvis brecciert stripet <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	50	0.04	0.62	2,49	0.80/50.7	6,2	26,20 - 27,20
					0.01	0.18	0.16	0.10/7.0	4,8	28,20 - 29,10
27.10 - 44.70	17.60	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band og enstaka musk. gn.band,foldet.Fra 40.60- 40.70 <u>Sl.</u>	45-70	0.02	0.04	0.07	<0.10/1.5	2,2	29,10 - 28,10
					0.02	0.03	0.03	<0.10/0.2	1,5	43,70 - 44,70
44.70 - 45.60	0.90	biot.hbl.	Mørk mlk.imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> <u>Po.</u>	60	0.04	0.73	2,69	0.20/17.3	10,7	
45.60 - 47.00	1.40	grå gn.	Lys mlk.små folder,spor gr. 1-2 mm.	60-70						
47.00 - 56.20	9.20	biot.gn.	Rel.mørk mlk.delvis hbl- førende,växl m/grå gn. band,delvis foldet.	45-70	0.04	0.04	0.21	<0.10/0.5	1,9	55,20 - 56,20
56.20 - 57.40	1.20	biot.gn.	Mørk mlk.hbl-førende, stripet imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	60	0.24	0.34	2,39	0.10/8.4	8,6	
			2							

Lokalitet:

Dato

Koordinatorer

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1258

side 2

Sida 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m						
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe							
57.40 - 62.60	5.20	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm,spor <u>Py.</u> foldet spor Gn ved 59.25.	50-60	0.73	0.25	0.53	2.85/51.9	3.5	61.60-62.60					
62.60 - 67.60	5.00	biot.gn.	Rel.mørk mlk.litt växl m/ grå gn,spor hbl.stripet impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> Spisse folder.	45-50	0.80	0.54	2.79	0.65/22.0	6.3	62.60-63.60					
					0.97	0.30	2.66	0.45/29.0	7.3	63.60-64.60					
					0.40	0.23	3.16	0.20/12.4	7.7	64.60-65.60					
					0.20	0.13	4.88	0.05/6.5	9.8	65.60-66.60					
					0.47	0.22	2.96	0.15/11.7	6.8	66.60-67.60					
67.60 - 82.10	14.50	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm runde folder.	45-70	0.05	0.21	0.09	<0.10/0.9	1.6	67.60-68.60					
82.10 - 89.80	7.70	biot.gn.	Mørk mlk.växl m/biot.hbl. gn,grå gn.band,striper imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> (spisse folder)	50-70	0.35	0.24	1.55	0.20/11.4	4.4	82.10-83.10					
					0.48	0.92	2.38	0.85/20.0	9.6	83.10-84.10					
					0.48	0.67	3.29	0.30/14.9	13.3	84.10-85.10					
					0.60	0.18	1.50	0.20/12.9	6.1	85.10-86.10					
					0.02	0.02	0.04	<0.10/1.1	2.4	86.10-87.10					
					0.61	0.21	1.80	0.30/12.3	4.8	87.10-88.10					
					0.67	0.38	2.54	0.70/16.3	7.7	88.10-89.10					
					5.24	0.08	0.05	0.95/127.0	2.2	89.10-89.80					
					89.80 - 91.20	1.40	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	60-70	0.10	0.03	0.03	0.15-3.7	1.3	89.80-90.80
					91.20 - 92.30	1.10	biot.hbl.gn.	Mørk mlk.sprette gr.1-3mm svak imp. <u>Py.</u> Foldet.	50-70						
29.03.86															
Stellan Burman															

Lokalitet: 41.505

Dato Mars-86

Koordinator : X: 925.352,6 Y: 41.505,8

Retning : S

Helling/stigning: + 45°

Høyde : -7,6

Lengde : 53,50

Borehull: 1257

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.30	4.30	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	50-70					
4.30 - 26.60	22.30	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.m/växl biot. delvis biot.skiktad, sprette gr.1-3 mm,ved 21.20 små runde folder. Fr.ca 20 m små spor hbl.	45-60					
26.60 - 30.00	3.40	biot.gn.	Rel.mørk mlk.litt växl m/grå gn.band.Spor <u>Py.</u>	50					
30.00 - 45.80	15.80	biot.gn. Pegmatitisk	Mørk mlk-grov växl m/ biot.hbl.gn.band.imp. <u>Py.</u> enkelte spisse folder. Delvis brecciert. Ved 33.10-33.20 <u>Sl</u> Ved 44.00 m " 45.95 <u>Sl.</u>	45-60					
45.80 - 53.50	7.70	grå gn.	Lys mlk.litt växl m/musk gn.m/skarn imp. <u>Py.</u> Ved 46.70 runde folder " 52.80 " "	50-60					

19.03.86

Stellan Burman

Lokalitet: 41.505

Dato : Mars 86
 Koordinater : X: 925.352,6 Y: 41.505,8
 Retning : S
 Helling/stigning: + 53°
 Høyde : - 7,6
 Lengde : 42,30 m.

Borehull: 1256

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.20	4.20	grå gn.	Lys mlk.sprette gr. 1-4mm	45-50					
4.20 - 20.40	16.20	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.i veksling med biot.band, städvis gr. rik 1-4mm. Spor hbl.Ved 15.80-16.10 musk.gn. imp. <u>Py.</u>	45-50					
20.40 - 25.45	5.05	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	50-60					
25.45 - 30.70	5.25	biot.gn. Pegmatitisk	Rel.mørk mlk-grovk.Foll ved 26.75.Rik imp. <u>Py.</u> i biot.band,komp. <u>Po.</u> Ved 29.20-29.22 Ved 30.20 <u>Sl.</u>	50-60					
30.70 - 34.00	3.30	grå gn.	Lys mlk.i veksling med grå gn.b.d.sprette gr. 1-3 mm.	45-55					
34.00 - 39.75	5.75	grå gn.b.d.	Rel. mørk mlk.i veksling med biot.gn.pegmatitisk Stedvis hbl.og skarn, sprett gr.2-6 mm.38.80 fold.Rik imp. <u>Py.</u>	45-65					
39.75 - 42.30	2.55	grå gn.	Rel.lys mlk.med enkelte biot.gn.band.Ved 41.10 <u>Sl.</u> imp. <u>Py.</u>	10-50					
Kjell Stenmark									

Lokalitet: Profil. 41.550

Dato 11.03.86

Koordinater : X: 925.360,7 Y: 41.556,4

Retning : S.

Helling/stigning: + 90°

Høyde : - 7,9

Lengde : 34,80 m.

Borehull: 1255

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.25	3.25	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	80					
3.25 - 7.00	3.75	grå gn.b.d.	Rel.mørk,sprette gr.1-3 mm i växl med biot.gn. med biot.band,imp. <u>Py.</u> spor hbl.	60-75					
7.00 - 18.65	11.65	grå gn.	Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm i växl med grå gn. b.d.og gr.rikere 2-5 mm imp. <u>Py.</u>	60-70					
				0,01	0,07	0,14		3,5	18,00 - 18,65
18.65 - 20.10	1.45	biot.gn.	Mørk mlk.sprette striper og klyser <u>Sl.Py.</u>	0,14	0,25	2,61		7,2	
20.10 - 26.35	6.25	grå gn.b.d.	Rel.mørk mlk.biot.rikere band med rik gr.2-6 mm med middels imp. <u>Py.Po.</u> ved 24.10 <u>Sl.</u>	65-75					
				1,98 ?	0,08	0,20		3,0	25,5 - 26,5
26.35 - 27.70	1.35	grå gn.	Rel.lys mlk.i växl med skarn hbl.band,rik på <u>Sl.</u> <u>Gn.</u> i øvrigt <u>Py.Sl.</u> som striper og klyser.	60-55					
				0,70	0,28	7,44		6,3	
27.70 - 29.15	1.45	grå gn.b.d.	Rel. lys mlk.enkelte biot. band med <u>Po.Py.Sl.</u> klyser.		0,02	0,17	0,29	3,3	
29.15 - 30.00	0.85	grå gn.	Lys mlk. <u>Sl.</u> striper ved 29.45.	65	0,01	0,12	0,53	2,7	
30.00 - 34.80	4.80	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.med enkelte biot.gn.band.Ved 31.95 skarn og hbl.med <u>Sl.</u> Ved 34.60 biot.band med <u>Sl.</u>						
Kjell Stermark									

Lokalitet: *Profil 41.550*Dato: *03.11.85*Koordinater: *X: 925.360,8 Y: 41.556,4*Retning: *S.*Helling/stigning: *+ 82°*Høyde: *7,9*Lengde: *35,00 m.*

Borehull: 1254

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.70	2.70	grå gn. lys mlk.sprette gr.1-3mm Ved 1.00 spor Sl.	60-70						
2.70 - 25.90	23.20	grå gn. lys mlk.sprette gr.1-3mm og växl.med biot.gn.som städvis fører spor hbl. og rel.rik impr.Py. Ved 21.95 Sl.	65-75 50						
25.90 - 33.80	7.90	grå gn.b.d. Rel.mørk, enkelte biot. band og opp til 10 cm striper av biot.hbl.gn. Sl. som striper og klyser framst i biot.gn.banden og rel. komp. Sl. i biot. hbl.gn.mot slutten spor skarn.	60	0.02 0.08	0.06 0.12	0.22 1.12		2,3	25,00-25,90 25,90-28,00
33.80 - 35.00	1.20	grå gn. lys mlk.sprette gr.1-3mm.	65	0.01	0.04	0.11		2,3	

Kjell Stenmark

Lokalitet:

Dato

11.03.86

Koordinater

X: 925.360,8 Y: 41.556,4

Retning

S.

Helling/stigning:

+ 72°

Høyde

- 7.9

Lengde

38,25 m.

Borehull: 1253

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 16.05	16.05	grå gn. Lys mlk.sprett gr.1-3mm litt växl m/cm smale band av biot.gn.Py.imp.i biot. gn.banden.	50-55						
				0.02	0.01	0.07		1.8	15.00 - 16.05
16.05 - 17.00	0.95	biot.gn. Rel.mørk mlk.middels imp. Py.Sl.Cp.	55	0.02	0.18	1.47		6.1	
17.00 - 19.95	2.95	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm smale Py-rike biot.band.	55	0.02	0.03	0.12		2.4	17.00 - 18.00
				0.01	0.01	0.02		1.7	19.00 - 19.95
19.95 - 20.75	0.80	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.skarn og hbl. band delvis komp.malm	50	0.59	0.19	3.91		5.7	
20.75 - 24.30	3.55	grå gn.b.d. Rel.mørk mlk.enkelte cm smale biot.band,sprette imp. og klyser med Py.Sl. Cp.	60-70	0.11	0.11	0.28		3.9	20.75 - 22.00
				0.06	0.10	1.81		4.6	22.00 - 23.00
				0.03	0.11	0.65		4.4	23.00 - 24.00
24.30 - 25.15	0.85	grå gn. Lys mlk-grov mlk.band med skarn og hbl.Komp. band og klyser Py.Sl.Cp.		0.40	0.21	4.04			24.30 - 25.15
25.15 - 34.90	9.75	grå gn. Rel.lys mlk,spor gr.1-3 mm i växl med biot.gn. band med hbl.med rel.komp. Py.Sl.30.00-30.50 skarn band. 31.80-34.00 glide- flater. 31.20-31.75 rik imp. Cp.							
				Se analysprotokoll.					
34.90 - 36.10	1.20	biot.gn. Mørk mlk.sprette band og klyser med Py.Sl.Cp.	60	0.02	0.27	1.85		7.5	
36.10 - 38.25	2.15	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm		0.01	0.05	0.33		2.5	36.10 - 37.00
		Kjell Stenmark							

Lokalitet: 41.550

Borehull: 1252

Dato

Feb.-86

Koordinator

X: 925.360,4 Y: 41.556,4

Retning

S

Helling/stigning: + 62°

Høyde

- 8.0

Lengde

32,30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 20.80	20.80	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm litt växl m/cm smale band av biot.gn,biot.hbl.gn. imp.Py. i biot.gn.banden.	60-80					
20.80 - 28.20	7.40	biot.gn.	Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band skiktad m/biot. m/Py.Po. enstaka spor Cp. Ved 21.80 Sl.Gn " 27.20 " *	60-80					
				0.67	0.05	1.93		2.6	27.00-28.20
28.20 - 29.90	1.70	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.skarn delvis komp.malm foldet.	45 45	0.55	0.69	10.88	7.3	
29.90 - 30.80	0.90	biot.gn.	Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.imp. Py.	60-70	0.09	0.16	0.78	3.5	
30.80 - 32.30	1.50	grå gn.	Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm.Foldet.	70 70					
28.02.86									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.550

Borehull: 1251

Dato Feb.-86
Koordinater : X:925,360,4 Y:41.58,4
Retning : S
Helling/stigning: + 53°
Høyde : - 8,0
Lengde : 23,30mm

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.20	5.20	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	70					
5.20 - 13.60	8.40	" "	Rel.lys mlk.væxl m/smale biot.gn.band även hb1. förende uppspreket m/ mange stück.	70-80					
13.60 - 17.50	3.90	biot.gn. Pegmatitisk	Rel.mørk grovk.delvis brecciert.Py.Cp.Sl.Gn. som sprette klyser og skikt.Spor Po.	45-70	0.04	0.02	0.31	3.6	13.60-15.00
17.50 - 18.60	1.10	biot.gn.	Mørk mlk.imp. Py.	50	0.05	0.08	0.08	5.2	15.00-15.50
18.60 - 21.90	3.30	biot.gn.	Mørk mlk.foldet,spor Sl. ved 18.85 og 20.90.	50-70	0.10	0.13	0.38	4.4	18.60-21.90
21.90 - 24.80	2.90	" "	Rel.mørk mlk.væxl grå gn. skarn,støpet impr.Py.Cp. Gn.Sl. foldet.	40-80	0.05	0.10	0.58	4.1	21.90-22.90
24.80 - 27.10	2.30	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	60-70	0.90	1.53	5.68	10.8	22.90-23.90
27.10 - 27.30	0.20	hb1.gn.	Mørk mlk.sprette gr.1-3mm	60	0.06	0.03	0.02	1.9	24.80-25.80
Stellan Burman 24.02.86									

Lokalitet: 42 936

Borehull: 1250

Dato : Jan.-86

Koordinator : X: 925.411,0 Y: 42 937,0

Retning : N

Helling/stigning: -29°

Høyde : -35,4

Lengde : 57,30 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.imp.Py.	45	0,22	0,23	1,07		7,7	1.50-2.50
2.50 - 5.10	2.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.litt skarn.Stripet imp. Py.Cp.Gn.Sl.Foldet.	10-45	0,83	0,29	2,18		5,3	
5.10 - 28.40	23.30	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm Fr.10.90-11.05 komp.malm Fr.15.30-15.35 " "	35-45	0,05	0,01	0,03		1,6	5.10-6.10
28.40 - 29.90	1.50	Pegm. Brecciert m/karbonat i-fyllningar,samt viss kloritisering,spor Py. Cp.							
29.90 - 42.20	12.30	grå gn. Rel.lys mlk.litt växl, smale m/biot.band.Sprette gr.1-3 mm.Fr.31.50-33.00 små runde folder.Overgang mot biot.gn.	35-45						
42.20 - 45.80	3.60	biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.svak imp. Py.	45						
45.80 - 47.60	1.90	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm.	45						
47.60 - 50.00	2.40	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl mot biot gn.enstaka gr.1-3 mm.	40						
50.00 - 53.00	3.00	hbl.biot.gn. Mørk mlk.sprette gr.1-4 mm,delvis imp. Py.	40						
53.00 - 56.10	3.10	Amf. Mørk mlk-fink,sprette gr.	50						
56.10 - 57.30	1.20	grå gn. Lys mlk-fink.enstaka gr. 1-2 mm.	50						

18.02.86

Stellan Burman

Lokalitet: 42936

Borehull: 1249

Dato: Feb.-86

Koordinater: X: 925,408,5 Y: 42936,5

Retning: N

Helling/stigning: -45°

Høyde: -35,6

Lengde: 43,30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.50	4.50	Biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band, sprette smale <u>Sl.</u> <u>Cp.Py.</u> striper.	45-65	0,19	0,22	0,55		5,1	
4.50 - 24.30	19.80	grå gn. Rel.lys mlk.enkelte cm smale biot.gn.band.Ved 8.40-8.50 hbl, skarn m/ <u>Sl.Pb.Py.</u> samt glideflater	50-60						
24.30 - 24.80	0.50	biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.skarn imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>		0,80	0,35	2,49		4,3	
24.80 - 31.20	6.40	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm.Foldet.	0-20						
31.20 - 32.50	1.30	biot.gn. Mørk mlk.enstaka hbl. band, foldet, spor <u>Po.</u> imp. <u>Py.</u>	0-45						
32.50 - 41.60	9.10	hbl.gn. Mørk mlk.gr.førende 1-3 mm, svak imp. <u>Py.</u>	45						
41.60 - 43.30	1.70	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-4mm	60						

19.02.86

Stellan Burman

Lokalitet: Y: 42.936

Dato : Feb.-86

Koordinater : X: 925.408,5 Y: 42.936,5

Retning : N

Helling/stigning: - 82°

Høyde :

Lengde : 38,30 m.

Borehull: 1248

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	2.30	biot.gn. Mørk mlk.imp.Py.spor Sl. Cp.Gn.	80-90	0,14	0,23	0,60		6,2	
2.30 - 7.60	5.30	grå gn. Lys mlk.sprette gr.	80						
7.60 - 9.80	2.20	Pegm.							
9.80 - 20.50	10.70	grå gn. Lys mlk.enstaka smale pegm,biot.gn.band.Sprette gr. 1-3 mm.	80-90						
20.50 - 23.00	2.50	biot.musk.gn. Rel.mørk växl m/smale grå gn.band,enkelte smale striper Sl.Cp.Gn.Py.Po.	70-80	0,20	0,62	1,81		7,1	
23.00 - 26.40	3.40	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.m/spor hbl,enstaka gr. 2-3 mm.	80						
26.40 - 27.40	1.00	biot.gn. Mørk mlk.svak imp. Py.	80						
27.40 - 38.30	10.90	hbl.gn. Mørk mlk.tildels gr.rik 1-4 mm.Folder fra 37.00- 38.30.							

10.02.86

Stellan Burman

Lokalitet: Vestgruben, stigort og ut i dalen

Dato : 17-4-86

Koordinater : X: 925.413,5 Y: 41.551,7

Retning : N

Helling/stigning: +62°

Høyde : + 0,1

Lengde : 34,60 m

Borehull: 1247

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	grå gn. b.d. Rel.mørk mlk., ved 1.05 spor hbl, en tynn Sl.Py. stripe ved 0.45. Foldet.	0-45						
1.10 - 19.80	18.70	grå gn. lys mlk. städvis gr. rik 1-3 mm med både musk. og biot. rikere band, enkelte peg. band.	65-75						
19.80 - 21.80	2.00	grå gn. b.d. Rel.mørk mlk.	50-70						
21.80 - 25.70	3.90	musk. gn. lys mlk, foldet, spor gr. 1-3 mm.	0-65						
25.70 - 27.35	1.65	biot. hbl. gn. Rel.mørk mlk. svak imp. Py.	50						
27.35 - 34.60	7.25	grå gn. lys mlk. spor gr. 2-4 mm i biot. rikere band.	40-50						
Kjell Stenmark									

Lokalitet: 43.050

Dato

Nov.-85

Koordinater

X: 925.391,8 Y: 43.054,6

Retning

S35°W

Helling/stigning:

Lodd -90°

Høyde

-480

Lengde

5.00 m

Borehull: 124 6

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2-50	2.50	biot.gn.	Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band.Spor <u>Sl</u> .ved 2.40- 2.50 imp. <u>Py</u> .	70-80					
2.50 - 5.00	2.50	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	80-90					
			6.1.86						
			Stellan Burman						

Lokalitet: 43.050.
43.000

Dato: 2.12.85
Koordinater: X: 925.388,8 Y: 43.054,6
Retning: S
Helling/stigning: 64°
Høyde: -47,9
Lengde: 73,65 m.

Borehull: 1245

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	grå gn. Musk.d.middels imp.Py. Sl.Gn.Cp.	45	0,62	0,27	3,18	9,8	4,7	
0.70 - 3.50	2.80	grå gn.b.d. Rel.mørk stedvis spor hbl og gr.2-3 mm,smale grå gn.svak imp.Py.Sl.Gn.Cp.		0,27	0,16	0,53	5,7	5,4	9,0-2,70
				0,01	0,06	0,15	1,1	6,0	2,70-3,50
3.50 - 12.40	8.90	grå gn. alm. Enkelte smale biot.rikere band. 4.05-4.20 middels imp.Py.Sl.Cp.Gn. i et foldekne.	40-45	0,14	0,08	1,56	0,7	4,5	3,50-4,50
				<0,01	<0,01	0,02	<0,01	1,2	4,50-5,50
12.40 - 13.40	1.00	grå gn.b.d. Stedvis også hbl.musk. rikere mot slutten,små gr. 1-2 mm.	40-45	0,09	0,04	0,17	3,0	2,4	
13.40 - 17.25	3.85	grå gn. musk.d.med band av kv. og biot.Stedvis spor hbl, smale opptil ca. 10 cm. rel.rik Py.Sl.Gn.Cp. Litt foldet.	60-40	0,86	0,24	1,92	18,5	3,8	13,40-14,40
			30-45	0,43	0,35	2,62	9,7	4,8	14,40-17,25
17.25 - 39.45	22.20	biot.hbl.gn. Litt musk.stedvis gr.rik smale Amf.band mot slut- ten.Middels imp.Py.	60-80	0,01	0,02	0,03	0,8	4,7	17,25-18,25
39.45 - 53.50	14.05	grå gn.alm. Enkelte opp til 5 cm peg. band.Noen få tynne amf. band. 48.00-48.30 foldet	50-70						
53.50 - 61.40	7.90	hbl.biot.gn. Stedvis gr.rik med parti- er amf.bolitisk.Skarn. band 56.30-56.55.	60-80						
61.40 - 62.10	0,20	Peg.							
62.10 - 63.10	1.00	gr.gl.gn. b.d.grov medl grov.Store gr. 4-8 mm "Stektolitisk"	70						

.....2

Lokalitet:

Borehull: 1245

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
63.10 - 65.15	3.05	Amf.							
65.15 - 65.80	0.65	Peg,							
65.80 - 69.30	3.50	gr. amf.							
69.30 - 73.85	4.55	grå gn. b.d. stedvis gr.							
		06.12.85							
		Kjell Stenmark							

Lokalitet: 43,050

Borehull: 1244

Dato : Okt.-85
 Koordinator : X: 925.388,5 Y: 43.054,5
 Retning : S 35° W
 Helling/stigning: - 10°
 Høyde : - 46.9
 Lengde : 135,60 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.80	7.80	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band,biot.musk,spor hbl.spor <u>Py.sprette</u> gr. 1-3 mm.	0-5					
7.80 - 9.50	1.70	biot.gn.	Mørk mlk-grovk.delvis brecciert,pegmatitisk, spor hbl. <u>Py.</u> Foldet.						
				0,57	0,22	0,26		4,1	8,50-9,50
9.50 - 10.20	0.70	"	Mørk mlk.skarnførende stripet <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> Foldet.	5-10					
				2,40	0,28	6,08		5,0	
10.20 - 10.80	0.60	grå gn.	lys mlk.enstaka gr.1-2mm slake folder.	0-5					
10.80 - 11.80	1.00	biot.musk.gn.	Rel.mørk mlk,imp. <u>Py.</u>	0-5 10-15					
11.80 - 12.40	0.60	Pegm.							
12.40 - 12.80	0.40	musk.biot.gn.	Rel.mørk mlk-grov,imp. <u>Py.</u>	10-25 25-35					
12.80 - 23.50	10.70	biot.hbl.gn.	Mørk mlk.växl m/hbl.biot. gn.enkelte rene hbl.gn. band gjennomgående slake folder,sprette gr.1-2mm svak imp. <u>Py.</u>	0-15					
23.50 - 33.00	9.50	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.växl m/biot. musk,musk.biot.gn.band. slake folder,imp. <u>Py.före-</u> <u>trädesvis</u> i musk. <u>rike</u> partier.Spor <u>Sl.ved</u> 22.60, 23.40, 24.50.	0-15					
			2						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1244

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
33.00 - 99.90	66.90	grå gn. lys mlk, sprette gr. 1-3mm enstaka cm tykke biot. gn. band. fr. 70.00-80.00 m	0-5 25-35 15						
99.90 - 110.70	11.80	biot. gn. Mørk mlk, litt växl m/hbl. gn. band, delvis foldet (runde folder) imp. <u>Py.</u> spor <u>Po.</u>	25-45						
110.70 - 117.80	7.10	hbl. gn. Mørk mlk. gr-førende til- dels rik 1-3 mm. Slake folder.	0-15						
117.80 - 120.00	2.20	biot. gn. Mørk mlk, växl m/grå gn. musk. biot., .gn. band, imp. <u>Py.</u>	25						
120.00 - 121.00	1.00	grå gn. lys mlk. sprette gr. 1-3mm	20	0,08	0,09	0,25		2,9	
121.00 - 122.50	1.50	grå gn. lys mlk. musk. rik, slake folder, stripet <u>Po. Py. Sl.</u> <u>Cp. Gn.</u>	0-35	0,19	0,36	0,56		13,0	
122.50 - 124.20	1.70	" lys mlk. sprette gr.	0-5	0,03	0,08	0,07		1,8	
124.20 - 125.50	1.30	biot. gn. Mørk mlk, litt hbl, skarn imp. <u>Sl. Cp. Gn. Py. Po.</u> Foldet.	10-25	2,84	0,55	0,92		10,1	
125.50 - 126.40	0.90	grå gn. b.d. Rel. lys mlk, enkelte smale biot. gn. band, slak fold, imp. <u>Py.</u> Spor <u>Sl.</u>	0-20	0,31	0,17	0,33		3,8	
126.40 - 127.30	0.90	biot. gn. Mørk mlk växl m/grå gn. band, smale striper <u>Sl. Cp.</u> <u>Gn. Py. Po.</u>	18	1,15	0,30	0,51		6,4	
		3							

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1244

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
127.30 - 135.30	8.00	biot.hbl.gn. Mørk mlk.sprette gr.1-3 mm, imp. <u>Py.</u>	15	0.40	0.19	0.08		6.0	127.30 - 135.30
135.30 - 135.60	0.30	Amf. Mørk mik,gr. 1-3 mm.							
10.1.86									
Stellan Burman									

Lokalitet: Y: 43.050

Dato: Nov. - 85

Koordinater: X: 925.388,5 Y: 43.054,5

Retning: S. 35° W.

Helling/stigning: - 14°

Høyde: - 47,2

Lengde: 125.00 m.

Borehull: 1243

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
0.00 - 2.30	2.30	grå gn. b.d.	Lys mlk.spor hbl.	0	0.02	0.02	0.05		3.6	130-230
2.30 - 3.60	1.30	" "	Lys mlk.spor hbl.enstaka cm tykke Sl.Cp.Gn.Py.band	5	0.51	0.30	1.32		4.0	
3.60 - 8.50	4.90	Musk.biot.gn.	Rel.mørk mlk-grovmk.växl m/biot.musk.m/spor hbl. Brecciert rik impr.Sl.Cp. Gn.Py.Po. 3mm sprette klumper.Foldet.	0-5	2.37	0.74	6.00		7.3	
8.50 - 9.20	0.70	Pegm.	Spor Gn.Sl.		0.74	0.19	0.52		1.5	
9.20 - 13.40	4.20	biot.musk.gn.	Mørk mlk.spor hbl.växl m/grå gn.band.Foldet del- vis brecciert,rik impr. Sl.Cp.Gn.Py.	0-10	1.96	1.01	7.35		8.26	920-1320
					0.88	1.00	1.88		5.6	1220-1340
13.40 - 14.70	1.30	biot.hbl.gn.	Mørk mlk.sprette gr.1-3mm svak impr.Py.slake folder	0-5	0.04	0.08	0.05		5.6	
14.70 - 15.70	1.00	hbl.gn.	Mørk mlk.slak fold,sprett gr.1-3 mm.	0-5						
15.70 - 21.80	6.10	biot.musk.gn.	Rel.lys mlk litt växl m/ grå gn.band.Enstaka gr. 1-3 mm.Svak impr.Py. före- trädesvis i de biot.rikere partier.	5-10						
21.80 - 32.80	11.00	grå gn.	Lys mlk.enkelte musk.biot. gn.band ved 21.80.Disk. (avsliten fold) lange slake folder.	0-5 5-7						
32.80 - 34.60	1.80	Pegm.						9/62g		
34.60 - 63.00	28.40	grå gn.	Lys mlk.enstaka opp til cm tykke biot.hbl.gn.band sprette gr.1-3 mm.	7-10	0.02	0.01	0.03	1.4	1.3	6200-6300

Lokalitet:

Dato

Koordinator

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1243

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser 9/6 Ag					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
63.00 - 65.40	2.40	musk.biot.gn. Rel.lys mlk.små foldet impr. <u>Py.Sl.Cp.Gn.Po.</u>	0-15	0.38	0.16	0.60	7.9	3.6	63.00-64.20
				0.95	0.28	2.04	22.4	6.0	64.20-65.40
65.40 - 68.30	2.90	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm små slake folder.	0-5	0.18	0.04	0.28	3.9	1.9	65.40-66.40
68.30 - 68.60	0.30	" " Lys mlk,sprette gr.1-3 mm små slake folder m/ <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	25	3.72	0.19	3.28	160.0	2.8	
68.60 - 73.00	4.40	" " Lys mlk.sprette gr.1-3mm	0-5	0.12	0.02	0.04	5.3	1.7	72.00-73.00
73.00 - 76.60	3.60	biot.musk.gn. Mørk mlk.foldet impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u> Delvis brecciert.	0-15	1.96	0.76	3.68	39.5	8.4	73.00-74.20
				0.17	0.12	0.44	10.9	6.8	74.20-75.40
				0.17	0.10	0.38	7.0	6.0	75.40-76.60
76.60 - 81.90	5.30	grå gn. Lys mlk,litt variert musk enstaka små gr.1-2 mm.	10-15	0.04	0.04	0.11	2.1	2.5	76.60-77.60
				0.70	0.21	1.72	32.8	4.4	80.90-81.90
81.90 - 87.70	5.80	biot.musk.gn. Mørk mlk-grovk,mot slutten biot.hbl.gn.Brecciert, ondulerad,impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	0-10	0.36	0.19	1.46	7.7	7.6	81.90-84.00
				0.54	0.74	3.77	11.8	14.6	84.00-87.70
87.70 - 91.80	4.10	grå gn.b.d. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	15-20	0.78	0.13	1.49	13.6	3.6	87.70-88.70
91.80 - 92.00	0.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk.striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	35	0.09	0.02	0.10	1.8	1.6	92.00-92.80
				1.06	0.54	5.00	16.3	6.3	
92.00 - 94.20	2.20	hbl.gn. Mørk mlk,växl m/grå gn. band,gr.1-3 mm företrädesvis i hbl.gn.	35						
94.20 - 96.40	2.20	" " Mørk mlk,gr.rik 1-3 mm.	45	0.01	0.02	0.04	1.2	4.8	95.40-96.40
96.40 - 97.60	1.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk.växl m/biot.musk.gn.spor <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	40-45	0.08	0.12	0.23	4.9	5.7	
97.60 - 100.05	2.45	skarn Grønn grovk.växl m/grå gn. bd.svak <u>Gn.Sl.Py.</u>		0.47	0.16	0.47	20.2	3.5	

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1243

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser ^{9/6.79}					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
100.05 - 102.00	1.95	hbl.gn. Mørk mlk.fr.start enstaka grå gn.b.d.band. Sl.Gn. ved 100.50.	40-45	0.39	0.10	0.69	8.3	4.9	100.05-101.00
102.00 - 104.00	2.00	grå gn. Lys mlk, enstaka hbl.gn. band.	40						
104.00 - 104.60	0.60	hbl.biot.gn. Mørk mlk, sprette gr.1-3 mm.imp.Py.	45	0.01	0.02	0.05	1.4	5.3	
104.60 - 105.70	1.10	Pegm. Växl m/biot.musk.gn, imp Py. spor SL?	45-50	0.01	0.05	0.03	2.0	3.0	
105.70 - 106.35	0.65	Kvarts		0.01	0.03	0.01	1.0	0.7	
106.35 - 107.60	1.25	biot.gn. Mørk mlk, imp.Py.Cp.	45-50	0.48	0.15	1.09	17.6	5.5	
107.60 - 108.30	0.70	Pegm. Sl.Cp.Gn.		0.33	0.10	1.53	12.9	3.1	
108.30 - 109.80	1.50	biot.hbl.gn. Mørk mlk.impr. Py.	45	0.15	0.13	0.37	7.4	5.9	
109.80 - 110.20	0.40	biot.musk.m/hbl. Rel.mørk mlk.impr. Py.Sl	30	0.05	0.05	0.06	2.8	1.9	
110.20 - 116.80	6.60	hbl.gn. Mørk mlk.gr.1-3 mm, delvis Amfibolitisk.	25-40	0.02	0.02	0.03	3.2	4.3	115.80-116.80
116.80 - 119.10	2.30	" " Mørk mlk, växl m/dm tykke biot.gn.kv.skarn band, spor Sl.Cp.Gn.Py.	40	0.05	0.14	0.43	5.7	4.9	116.80-118.00
				0.76	0.62	2.91	34.9	5.5	118.00-119.10
119.10 - 124.00	4.90	" " Mørk mlk, växl m/biot.gn. band.	35	0.01	0.06	0.05	3.9	6.5	119.10-120.00
124.00 - 125.00	1.00	Amf. Mørk mlk.fink.gr-rik 1-4 mm, stictolitisk.							

13.11.85

Stellan Burman

Lokalitet: 43.050

Dato

1/11-85

Koordinator

X: 925.388,3 Y: 43.054,6

Retning

S. 35° W.

Helling/stigning:

-23°

Høyde

-47,1

Lengde

89,50 m.

Borehull: 1242

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	musk.biot.gn. Rel.lys mlk.växl m/grå gn.skarn rik imp.Sl.Cp.Gn.Py.	0-5	3,66	1,00	7,92			0,00-1,25
				1,22	0,55	5,84			1,25-2,50
2.50 - 3.50	1.00	grå gn.b.d. Lys mlk.spor hbl.spor Py. Sl.	10	0,77	0,26	1,97			
3.50 - 5.90	2.40	biot.hbl.gn. Mørk mlk-grovmlk.foldet brecciert, delvis pegmatitisk, stripet, slirig Sl.Cp.Gn.Py.		2,30	0,48	6,04			3,50-4,70
				1,37	0,85	6,08			4,70-5,90
5.90 - 7.40	1.50	grå gn.b.d. Rel.lys mlk, spor hbl.ens-taka gr.1-3 mm, spor Py.	10	0,02	0,01	0,06			
7.40 - 11.00	3.60	biot.gn.musk. Mørk mlk.enstaka cm tykke pegm.band, svak imp.Py.Cp.Gn.Sl.	10-15	0,06	0,12	0,29			7,40-9,80
				0,11	0,16	1,49			9,80-11,00
11.00 - 40.60	29.60	grå gn. Lys mlk, sprette smale biot.hbl.band, sprette gr.1-3 mm, fr.11.50-12.10 m Sl.	5 10-15	0,19	0,11	1,50			11,00-12,10
40.60 - 43.00	2.40	musk.gn. Lys mlk.foldet, imp.Py.Cp?	15	0,21	0,26	1,08	7,6	0,35	
43.00 - 46.70	3.70	grå gn. Lys mlk, enstaka gr.1-3mm slake folder.	0-10						
46.70 - 50.00	3.30	biot.musk.gn. Rel.lys mlk-grovmlk.växl m/grå gn.Stripet Sl.Cp.Gn.Py. svakt foldet.	15-20	0,37	0,38	3,16	6,6	0,1	46,70-48,00
				0,99	0,19	2,07	12,4	0,2	48,00-49,00
				0,63	0,28	3,19	8,8	0,1	49,00-50,00
50.00 - 56.60	6.60	musk.biot.gn. Rel.mørk mlk-grovmlk.växl m/overganger til biot.gn. imp.Py.Cp.slake folder.	10-20	0,27	0,29	0,30	8,6	0,2	50,00-51,50
				0,22	0,24	0,04	0,4	<0,1	51,50-54,50
				0,05	0,06	0,08	0,9	<0,1	54,50-57,60
56.60 - 58.90	2.30	hbl.biot.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3mm	15-20						
			2						

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1242

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser <i>9/87g</i> <i>9/8 Au</i>					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
58.90 - 59.80	0.90	Pegm.							
59.80 - 70.00	10.20	biot.hbl.gn. Mørk mlk.växl (bandad)m/ hbl.gn./grå gn.muskrik. m/imp. <u>Py</u> .gr.företträdesvis i hbl.gn.banden.	20 30-40 45						
70.00 - 73.40	3.40	biot.musk.gn. Rel.mørk,växl m/biot.gn. svak imp. <u>Py</u> .Sl.Cp.Gn. foldet.	0-45	0,10	0,13	0,75	6,7	<0,1	70,00-71,00
				0,25	0,15	2,69	13,1	<0,1	71,00-72,00
				0,14	0,11	0,46	5,1	<0,1	72,00-73,00
73.40 - 74.80	1.40	biot.gn. Mørk mlk,spor hbl.imp. <u>Py</u> .	45	0,09	0,06	0,47	4,1	<0,1	
74.80 - 89.50	14.70	biot.gn. Mørk mlk.delvis hbl.ens- taka gr.1-3 mm,samt enk- elte grå gn.musk.rike dm tykke band,svak imp. <u>Py</u> .	35-40						

1.11.85

Stellan Burman

Lokalitet: 43.050

Borehull: 1241

Dato: Okt.-85

Koordinatorer: X: 925.888,2 Y: 43.054,6

Retning: S

Helling/stigning: - 20°

Høyde: - 47,1

Lengde: 110,00 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	grå gn. Rel.lys mlk.bandad m/cm tykk hbl.biot.band,slak fold,imp.Sl.Cp.Gn.Py.	0-10	0,86	0,20	2,36		4,0	
1.00 - 2.30	1.30	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grov-mlk. slake folder,delvis brecc- ciert.En ca 5 cm tykk malmstripe gjennombores flere ggr.	0-10	2,07	0,76	5,92		8,0	
2.30 - 4.40	2.10	biot.musk.gn. Mørk mlk-grov-mlk.slake folder imp.Sl.Cp.Gn.Py.	0-5	0,57 0,82	0,40 0,24	2,51 3,03		6,2 6,0	2,20-2,30 3,30-4,40
4.40 - 11.30	6.90	grå gn. Rel.lys mlk,svakt skarn- førende,spor hbl.Pegma- titisk,brecciert,rike striper,og imp.Sl.Cp.Gn. Py. Foldet.	5-20	2,63 1,28	0,89 0,77	7,96 2,52			4,40-8,60 8,60-11,30
11.30 - 13.30	2.00	biot.gn. Mørk mlk.imp.Py.Spor Sl.	0-5	0,05	0,12	0,16		6,2	
13.30 - 14.40	1.10	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3mm impr. Py.	5	0,03	0,04	0,18		2,7	
14.40 - 17.00	2.60	" " Rel.lys mlk.foldet.Cm tykke biot.gn.band m/Cp. Py.Sl.	0-10	0,07	0,28	0,45		6,7	
17.00 - 42.70	25.70	" " Lys mlk,sprette gr.1-3mm enkelte tynne striper hbl.biot.gn.	0-5	0,03 0,06	0,05 0,02	0,18 0,06		2,6 1,6	17,00-18,00 41,40-42,70
42.70 - 44.10	1.40	" " Lys mlk.enkelte biot.skikt impr. Sl.Cp.Gn.Py.	10-25	0,60	0,29	3,43		5,7	
44.10 - 51.40	7.30	" " Lys mlk.enkelte små gr. 1-2 mm.Fr.44.10-44.70 kv. m.Py.Cp.Gn.	5-10	0,15	0,18	0,09		2,0	44,0-45,10
							3/6 7,9	3/6 7,4	
				0,01	0,02	0,03	2,1	<0,1	50,40-51,40

.....2

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

Borehull: 1241

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
51.40 - 59.00	7.60	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band,musk.rik,skarnknøler imp. og rike striper Sl. Cp.Gn.Py.Po. Po. som komp.klumper foldet.	0-35	0.33	0.47	3.11	10.1	0.15	51.40-55.60
				0.19	0.45	1.51	9.25	<0.1	55.60-59.00
59.00 - 62.20	3.20	biot.musk.gn.	25	0.07	0.05	0.17	5.4	<0.1	59.00-62.20
62.20 - 69.00	6.80	grå gn.b.d.	10-35						
69.00 - 70.30	1.30	biot.hbl.gn.	35-40						
70.30 - 85.50	15.20	hbl.biot.gn.	35-40						
		gn.samt smale kv.pegm. band.gr-førende 1-3 mm		0.02	0.05	0.03	4.4	<0.1	81.50-85.50
85.50 - 89.50	4.00	biot.gn.	35	0.16	0.09	0.41	8.0	<0.1	
89.50 - 94.60	5.10	biot.gn.	40	0.01	0.02	0.02	1.7	<0.1	89.50-94.60
94.60 - 110.00	15.40	hbl.gn.	40-45						
		Mørk mlk.växl m/hbl.biot. gn.svakt Py. gr.1-3 mm.							

30.10.85

Stellan Burman

Lokalitet: 43.050

Borehull: 1240

Dato : 047-85

Koordinater : X: 925.388,4 Y: 43.054,6

Retning : S

Helling/stigning: -17°

Høyde : - 47,6

Lengde : 138,80 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	grå gn. Lys mlk.flak fold, impr. Sl.Cp.Gn.Py.	0-5	0,58	0,23	2,21	11,2	0,1	
0.60 - 1.90	1.30	" " (Brecciert) Rel.lys mlk,biot,slirig klysor,sprekkfyllinger av Cp.Sl.Gn.Py.	0-10	2,09	0,85	4,48	29,4	1,3	
1.90 - 3.00	1.10	grå gn. Lys mlk.delvis musk.rik, impr. Sl.Gn.Cp.Py.	5-10	1,12	0,38	3,88	15,5	0,3	
3.00 - 3.50	0.50	musk.gn. Lys mlk.slak fold,svak imp. Py.Sl.Cp.Gn.	0-5	0,29	0,18	0,86	5,7	0,1	
3.50 - 6.70	3.20	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/musk. biot.skikt,rik imp.Sl.Cp. Gn.Py. delvis halve kjer- nen malm og gråberg,slake folder.	0-5	1,11	0,31	4,32	19,3	0,4	3,50-4,50
				0,88	0,47	4,20	14,0	0,2	4,50-5,50
				1,23	0,37	1,31	16,1	0,2	5,50-6,70
6.70 - 12.00	5.30	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk.skarn.føren- de,brecciert,rik malm slake folder.	0-10	2,07	0,41	7,43	29,4	0,4	
12.00 - 13.00	1.00	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk.imp. Py.spor Sl. spor gr.	0-2	0,06	0,14	0,12	2,1	<0,1	
13.00 - 17.40	4.40	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. musk.gn.band,sprette gr. 1-3 mm,svak impr. Py.	0-5	0,04	0,04	0,09	1,2	<0,1	13,00-14,00
				0,03	0,07	0,13	1,0	<0,1	14,00-17,40
17.40 - 19.00	1.60	biot.gn. Rel.mørk mlk.foldet,imp. py. svak imp.Sl.Cp.Gn.	0-10	0,06	0,36	1,87	4,7	<0,1	17,40-18,00
				0,05	0,36	0,73	4,1	0,1	18,00-19,00
19.00 - 54.40	35.40	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm spor Py. slake folder Fra begynnelsen rel.musk. rik,enstaka cm tykke hbl. biot.gn.band.	0-5	0,04	0,07	0,13	1,3	<0,1	19,00-20,00

.....2

Lokalitet:

Borehull: 1240

Dato

Koordinater

Retning

Helling/stigning:

Høyde

Lengde

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
54.40 - 54.90	0.50	biot.gn. Mørk mlk.foldet imp. <u>Py.</u> <u>Po.</u>	0-20	0.21	0.77	1.35	12.7	<0.1	
54.90 - 59.45	4.55	grå gn. Lys mlk.enkelte cm tykke musk.biot.gn.band.svak impr. <u>Py.</u> slake folder.	0-10	0.06	0.08	0.36	1.5	<0.1	58.45-59.65
59.45 - 60.35	0.90	biot.gn. mørk mlk.foldet,brecciært slirig m/ <u>Sl.Cp.Gn.Py,Po.</u>	5-25	0.66	0.48	1.60	14.6	0.4	
60.35 - 61.30	0.95	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm.	35	0.04	0.05	0.20	1.4	<0.1	
61.30 - 70.60	9.30	biot.gn. Mørk mlk.foldet,delvis brecciært,Växl m/dm tykke grå gn.band,sant smale skarnband.Växl m/rike og fattigere <u>malm</u> band.	0-45	0.38	0.15	0.59	8.7	0.1	61.30-63.00
				0.27	0.59	2.26	9.0	0.1	63.00-68.00
				0.39	0.15	2.20	7.2	0.2	68.00-70.60
70.60 - 75.40	4.80	biot.gn. Rel.mørk växl m/grå gn. band,sprette gr.1-3 mm. imp. <u>Py.</u> företrädesvis i biot.gn.Spor hbl.	30-35	0.03	0.02	0.01	0.0	<0.1	70.60-71.60
75.40 - 88.40	13.00	biot.hbl.gn. Mørk mlk.delvis gr-rik 1-3 mm.svak imp. <u>Py.</u> delvis småfoldet.Mot slutten Amf.band.	35-40	0.02	0.04	0.01	1.6	<0.1	87.40-88.40
88.40 - 90.80	2.40	biot.gn. Mørk mlk.växl m/skarn/grå gn.band,stripet impr. <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u> spor hbl.	35-45	1.81	0.19	6.16	35.3	0.7	88.40-89.60
				0.25	0.04	0.77	5.4	0.1	89.60-90.80
90.80 - 91.05	0.25	kvarts.							
91.05 - 92.00	0.95	biot.hbl.gn. Mørk mlk,sprette gr.1-3mm	45	0.03	0.03	0.01	1.4	0.1	
92.00 - 94.00	2.00	biot.gn. Mørk mlk.foldet D-typ. spor hbl.impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	0-35	0.07	0.20	0.37	6.1	0.1	92.00-93.00
				0.56	0.50	1.22	22.0	0.3	93.00-94.00

Lokalitet:

Dato

Koordinater

Retning :

Borehull: 1240

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 3

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	90/6/89 % S	90/6/89 % Fe	
94.00 - 99.80	5.80	hbl.biot.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.gn. band,gr-førende 1-3 mm. Fr.97.50-97.55 m <u>Sl.</u>	40-45						
99.80 - 102.30	1.50	Pegm.							
102.30 - 112.60	10.30	hbl.gn. Mørk mlk.litt växl m/hbl. biot.gn.gr-førende,delvis Amfibolitisk,ved 107.50 små runde folder,impr. <u>Py.</u>	40-45	0,02	0,02	0,01	1,8	<0,1	111,60-112,60
112.60 - 113.00	0.40	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grov.spor hbl.impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	35	1,60	0,09	4,32	33,2	0,2	
113.00 - 123.80	10.80	biot.hbl.gn. Mørk mlk,sprette gr.1-3 mm,impr. <u>Py.</u> enkeltet hbl. gn.band.	35-45	0,07	0,06	0,17	3,5	<0,1	113,00-114,00
123.80 - 128.30	4.50	Amf. Mørk mlk-fink.sprette små gr.1-2 mm.	45						
128.30 - 138.80	10.50	grå gn. Lys mlk.enkelte cm tykke hbl.biot.gn.og Amf.band enstaka gr. 1-3 mm.	30						

29.10.85

Stellan Burman

Lokalitet: 41.890

Borehull: 1239

Dato : Okt.-85
 Koordinater : X: 925.390,0 Y: 41.890,0
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : + 5,8
 Lengde : 32,30 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	biot.gn. Mørk mlk-grovk. Pegmatisk, slirig m/Sl.Cp.Gn. Py.	60-80	0,02	0,14	2,09		8,0	
0.40 - 1.70 1.70 - 5.20	1.30 3.50	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm hbl.biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/biot. musk.gn.hbl-førende, gr. rik, företrädesvis i de hbl.rike partiene, foldet m/runde folder, delvis svak impr. Py.spor Cp.	60 0-50						
5.20 - 31.80	26.60	grå gn. Lys mlk.delvis musk.rik. spor hbl.Sprette gr.1-3 mm, svak fold fr.8.50-9.20 m. spor Py.	50 60-70						
31.80 - 32.30	0.50	biot.gn. Mørk mlk.rik impr.Sl.Cp. Gn.Py. Gjennomborat.	70	0,96	0,32	4,92		7,1	
24.10.85 Stellan Burman									

Lokalitet: 41.890

Dato: Okt.-85
 Koordinator: X:925.393,4 Y: 41.890,5
 Retning: N
 Helling/stigning: -45°
 Høyde: + 5.8
 Lengde: 47.20 m

Borehull: 1238

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.spor hbl. sprette gr.1-3 mm.	45	0,02	0,02	0,05		2,1	
0.80 - 3.50	2.70	biot.gn. Mørk mlk-grovk.delvis pegmatitisk svak imp.Py. spor Cp.Sl?Po.Sprette gr.1-3 mm.	45	0,03	0,04	0,10		3,2	0,80-2,10
				0,02	0,06	0,10		3,3	2,10-3,50
3.50 - 5.50	2.00	grå gn. Lys mlk.enkelte cm tykke biot.skikt,sprette gr.1-3 mm.	45						
5.50 - 6.70	1.20	biot.gn. Rel.mørk grovk.Pegmatitisk,brecciert,klyser og skikt Po.Cp.spor PySl?	0-45	0,02	0,30	0,10		6,1	
6.70 - 7.70	1.00	spor gr.1-3 mm. Mørk mlk-grov,spor hbl. gr.rik 2-4 mm spor Py.	45-50	0,02	0,01	0,02		2,6	
7.70 - 9.60	1.90	grå gn. Rel.lys mlk,sprette gr.1-3 mm,delvis b.d.	45						
9.60 - 10.05	0.45	biot.hbl.gn. Mørk mlk.gr.rik3-5 mm	45						
10.05 - 40.00	29.95	grå gn. Lys mlk.enkelte små runde folder,sprette gr.1-2 mm enstaka opp til 5 cm, tykke biot.hbl.gn.band m/gr.	45 60						
40.00 - 44.60	4.60	biot.hbl. Mørk mlk.enkelte smale grå gn.band,sprette gr.1-3 mm (kjernene nersmetad med olja)	60-70						
44.60 - 47.20	2.60	hbl.gn. Mørk mlk.litt växl m/hbl. biot.gn.mot slutten overgang til Amf.gr.1-2 mm.	60-70						

16.10.85 Stellan Burman

Lokalitet: 41.890

Dato: Okt.-85

Koordinater: X: 925.393,4 Y: 41.890,5

Retning: N

Helling/stigning: -52°

Høyde: + 5,8

Lengde: 44,40 m.

Borehull: 1237

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.30	0.30	hbl.biot.gn. Mørk mlk.sprette gr.1-3 mm.	40						
0.30 - 1.00	0.70	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm	35	0.01	0.01	0.13		1.4	
1.00 - 2.40	1.40	biot.gn. Mørk mlk-grovk.m/pegm.-band,slingig Sl.Cp.Gn.Py.	25-30	0.01	0.14	0.19		4.0	
2.40 - 5.40	3.00	grå gn. Lys mlk,sprette gr.1-3 mm	35						
5.40 - 9.80	4.40	Rel.mørk mlk,växl m/grå gn.band,enkelte Py.striper,gr.1-4 mm delvis foldet,fr.5.40-6.25 svak imp. Sl.Cp.Gn.Py.Po.	35-40	0.01	0.08	0.38		5.3	5.40-6.25
				0.01	0.01	0.04		2.9	6.25-7.25
9.80 - 35.25	25.45	grå gn. Lys mlk.enstaka hbl.biot band,opp til 5 cm tykke sprette gr.1-3 mm,delvis småfoldet.	35-40 40-45 50-60 45	0.00	0.06	0.04		1.8	35.25-37.25
				0.12	0.06	0.33		2.6	35.25-36.25
35.25 - 38.50	3.25	Rel.lys mlk.enkelte biot gn.band m/hbl.delvis musk.rikere grå gn.ens-taka smale band m/Sl.Cp. Gn.Py.	45-50	0.02	0.03	0.20		2.2	36.25-37.25
				0.13	0.35	1.20		4.4	37.25-38.50
38.50 - 44.40	5.90	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm.Mot slutten Amfibolitisk.	50-60	0.12	0.06	0.34		3.7	38.50-39.50

22.10.85

Stellan Burman

Lokalitet: 41.890

Dato

Okt.-85

Koordinator

X: 925,390,0 Y: 41.890,5

Retning

N

Helling/stigning:

-64°

Høyde

+ 5,8

Lengde

50.00 m.

Borehull: 1236

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	biot.gn. Mørk mlk. imp. Py. Cp. Sl. Gn.	45	0.04	0.16	3.53		7.8	
1.00 - 2.05	1.05	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3 mm	40						
2.05 - 3.80	1.75	hbl.biot.gn. Mørk mlk. växl m/grå gn. band, musk. rik, foldet, gr. 1-3 mm, svak imp. Py.	0-45						
3.80 - 7.20	3.40	biot.gn.musk. Rel. lys mlk. delvis hbl-førende, foldet m/små runde folder, gr. 1-3 mm.	0-45						
7.20 - 31.80	24.60	grå gn. Lys mlk. enstaka sprette gr. 1-3 mm, dm tykke hbl.gn. band, gr. rik, foldet m/runde folder, fr. 21.20-22.30 overveiende pegm.	0-45 Fra 25.0 70-80	0.04	0.04	0.10		1.5	30.80-31.80
31.80 - 33.60	1.60	grå gn.b.d. Rel. lys mlk. sprette striper Sl.Cp.Gn.Py.	70-80	1.38	0.18	1.67		3.8	
33.60 - 36.80	3.20	biot.gn. Mørk mlk. hbl-førende, stripet imp. Sl.Cp.Gn.Py. Foldet.	70-80	0.68	0.56	5.76		8.1	33.60-34.70
				1.74	0.28	4.72		6.0	34.70-35.70
				0.54	0.14	1.78		4.3	35.70-36.80
36.80 - 41.50	4.70	hbl.gn. Mørk mlk, gr-førende i starten stictolittisk.		0.03	0.02	0.08		3.7	36.80-37.80
41.50 - 49.50	8.00	Amf. Mørk mlk. sprette gr. 1-3 mm	60-70						
49.50 - 50.00	0.50	Pegm.							

21.10.85

Stellan Burman

Lokalitet: 41.890

Borehull: 1235

Dato : Okt.-85

Koordinater : X: 925.390,0 Y: 41.890,5

Retning : N

Helling/stigning: -74°

Høyde : +5,8

Lengde : 44,30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	grå gn. Lys mlk.dm tykke kv.band sprette gr.1-3 mm.	35	0,05	0,03	0,31		1,9	
1.20 - 1.80	0.60	biot.gn. Rel.mørk mlk-grov-mlk. Pegmatitisk, cm smale grå gn.band.Brecciert, stripet Sl.Cp.Gn.Py.		0,02	0,17	1,41		6,8	
1.80 - 4.80	3.00	biot.gn. Rel.mørk, växl m/grå gn. band.Biot.gn er hbl-før- ende, sprette gr.1-4 mm spor Py. små runde folder	30-45	0,01	0,01	0,05		2,7	1,80 - 2,80
4.80 - 7.60	2.80	grå gn.b.d. Rel.lys mlk, spor hbl. sprette gr.	40 45						
7.60 - 7.90	0.30	kv.							
7.90 - 32.10	24.20	grå gn. Lys mlk.enstaka cm tykke biot.hbl.gn.band, slak fold ved 13.00-13.80 sprette gr.1-3 mm.	40 80	0,07	0,02	0,09		1,5	31,10 - 32,10
32.10 - 33.00	0,90	" " Lys mlk, enkelte smale skikt Sl.Cp.Gn.Py.	80	0,21	0,12	0,60		2,7	
33.00 - 36.80	3.80	" " b.d. Rel.lys mlk.växl m/biot. hbl.band, samt delvis skarn stripet imp.Py.Cp.Sl.Gn.	60-80	0,58	0,33	4,12		6,18	
36.80 - 39.10	2.30	hbl.gn. Mørk mlk.växl m/biot.hbl. gn.Py.imp.sprette gr.1- 3 mm.	70-80	0,02	0,02	0,12		3,0	36,80 - 39,10
39.10 - 44.30	5.20	hbl.gn. Amfibolitisk Mørk mlk.variert Amf.hbl. gn.även hbl.biot.gn., gr.företrädesvis i hbl. gn.	70-80 60						
21.10.85 Stellan Burman									

Lokalitet:

Dato

sept.-85

Koordinater

X: 925.352,3 Y: 41.858,4

Retning

N

Helling/stigning:

+ 70°

Høyde

+ 12,2

Lengde

32,20 m.

Borehull: 1234

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.20	4.20	biot.gn. Mørk mlk. litt Musk, spor hbl.svak imp.Py. Delvis småfoldet.	70-80						
4.20 - 5.00	0.80	hbl.biot.gn. Mørk mlk. imp.Py. ^{Ca} Sl?	80	1,18	0,24	0,05		6,6	
5.00 - 8.70	3.70	biot.gn. Mørk mlk.svak imp.Py. sprette gr. 1-3 mm.	80	0,03	0,04	0,03		2,3	7,70-8,70
8.70 - 11.20	2.50	biot.musk.gn. hbl.førende Rel.mørk mlk.stripet Sl. Cp.Gn.Py. Ondulerad, slak fold.	70-80	0,53	0,45	1,67		7,9	8,70-10,00
11.20 - 14.90	3.70	biot.gn. Mørk mlk, vëxl m/grå gn. band m/hbl, sprette gr. 1-3 mm, svak imp.Py.	70-80	1,42	0,19	5,40		7,1	10,00-11,20
14.90 - 21.80	6.90	hbl.gn. Mørk mlk. vëxl m/biot. hbl.gn.band.gr. 1-3 mm.	70-80	0,04	0,14	0,09		4,3	11,20-12,20
21.80 - 24.00	2.20	Biot.gn. (Pegmatitisk) Rel.mørk grovk. foldet, klyser, skikt biot.Py. som rike klyser ^{Sl?} Brecciert.		0,02	0,04	0,06		6,1	20,80-21,80
				0,02	0,08	0,24		6,3	21,80-23,00
				0,02	0,05	0,06		4,2	23,00-24,00
24.00 - 32.20	8.20	grå gn. Lys mlk, sprette gr. 1-3mm vëxl biot innhold. Fra 28.80-28.90 hbl.gn.	70						

30.09.85

Stellan Burman

Lokalitet: 41.860

Borehull: 1233

Dato : Sept.-85
 Koordinator : X: 925,352,3 Y: 41,858,4
 Retning : N
 Helling/stigning: + 60°
 Høyde : + 12,4
 Lengde : 36,50 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.90	3.90	Biot.gn.	Mørk mlk.foldet, svak imp. Py.	70					
3.90 - 5.20	1.30	hbl.gn.	Mørk mlk.växl m/smale grå gn.band, gr.1-3 mm.	70					
5.20 - 9.50	4.30	biot.gn.	Mørk mlk, spor hbl.Gn.ved 5.95-6.20 m.	80	0.11	0.08	0.05	2.0	8.50-9.50
9.50 - 10.70	1.20	biot.gn.	Mørk mlk-grovk.delvis pegmatitisk, brecciert. Sl.Cp.Gn.Py.		0.52	0.57	1.51	8.0	
10.70 - 11.40	0.70	biot.hbl.gn.	Mørk mlk, rik Sl.Cp.Gn.Py.	80	3.01	0.81	12.60	10.2	
11.40 - 22.30	10.90	biot.hbl.gn.	Mørk mlk, enkelte biot.sk. band, impr. Py.	70-80	0.05	0.01	0.22	5.0	11.40-12.40
22.30 - 36.50	14.20	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm Sl.fra 36.30-36.50 gjennomboret.	80-90					

30.09.85

Stellan Burman

Lokalitet: Y:41.860

Borehull: 1232

Dato : sept.-85

Koordinater : 925.352,3 Y:41.858,0

Retning : N

Helling/stigning: + 50°

Høyde : + 10,8

Lengde : 44,30 m.

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	biot.hbl. Mørk mlk-grovk.Pegm.band Sl.Cp.Gn.Py. Foldet.	45-70	0,65	0,38	6,56		11,9	
0.70 - 1.10	0.40	biot.gn. Mørk mlk.imp.Py.Spor Cp.	50	0,06	0,28	0,37		8,1	
1.10 - 2.90	1.80	Biot.gn. Rel.mørk grovk.Brecciært. Pegmatitisk Py.PO.	50-70	0,05	0,20	0,09		6,8	
2.90 - 3.70	0.80	biot.gn. Mørk mlk.svak imp.Py. spor gr.	45	0,03	0,06	0,06		6,3	
3.70 - 4.40	0.70	hbl.gn. Mørk mlk.gr-rik 1-3 mm. Rund fold.	45 0 45						
4.40 - 7.40	3.00	biot.hbl.gn. Mørk mlk,enkelte Pegm. band,svak imp.Py.	50						
7.40 - 8.90	1.50	biot.gn. Mørk mlk,spor hbl,svak imp.Py.	45-50						
8.90 - 11.00	2.10	Biot.gn. Rel.mørk grovk.Brecciært. Pegmatitisk Sl.Cp.Gn.Py.Po. som klyser og slirer.		1,04	0,32	0,23		6,6	
11.00 - 16.00	5.00	biot.gn. Mørk mlk.enstaka cm tykke hbl.gn.band.svak imp.Py.	50-60						
16.00 - 25.80	9.80	biot.gn. Mørk mlk-grov.växl m/pegm grå gn.band,foldet,spor Gn.Cp. ved 16.80-16.90.	60-70						
25.80 - 44.30	18.50	grå gn. Rel.lys mlk.litt växl m/ biot.gn.m/spor hbl.Sprette gr.1-3 mm.	60 70						
		30.09.85							
		Stellan Burman							

Lokalitet: 41.860

Borehull: 1231

Dato : sept.-85
 Koordinater : X: 925.352.3 Y: 41.858,0
 Retning : N
 Helling/stigning: + 40⁰
 Høyde : + 10.8
 Lengde : 53.10 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	hbl.biot.gn. Mørk mlk-grovk.banda d m/ grå gn,delvis foldet m/ runde folder,stripet Sl. Cp.Gn.Py.	0-45	0,44	0,72	4,72		13,8	
1.20 - 3.05	1.85	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band,delvis hbl-førende imp.Py. spor Po. spor gr. 1-2 mm.	25-40	0,22	0,18	0,27		5,8	120-2,20
3.05 - 3.60	0.55	Pegm.	30 30-50						
3.60 - 4.40	0.80	Biot.gn. Se ovan.							
4.40 - 4.70	0.30	Pegm.							
4.70 - 5.00	0.30	Biot.gn. Se ovan. Foldet.							
5.00 - 7.30	2.30	Pegm. m/enstaka biot.gn.band sprette Py. klyser.							
7.30 - 12.20	4.90	hbl.biot.gn. Mørk mlk.växl m/biot.hbl gn.svak imp.Py. sprette gr.1-2 mm,små runde fol- der ved 9.60-9.70.	45-50	0,38	0,35	0,08		6,8	11,20-12,20
12.20 - 13.30	1.10	biot.gn. Mørk mlk-grovk.växl m/ pegm.Foldet Sl.Cp.Gn.Py.	0-45	0,22	0,33	0,87		6,2	
13.30 - 22.30	9.00	biot.hbl.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band,sprette gr.1-3mm	45-55	0,29	0,05	0,04		5,0	1330-1430
22.30 - 28.05	4.75	biot.gn. Mørk mlk-grovk.Pegmati- tisk,delvis biot.sk. sprette Sl. klyser.Foldet Bracciart.	30-70	0,13	0,14	1,33		6,3	
		2							

Lokalitet:

Borehull: 1231

Dato :

Koordinator :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
28.05 - 30.00	1.05	hbl.gn. Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm.	45						
30.00 - 53.10	23.10	grå gn. Rel.lys mlk.sprette cm ca.45 smale hbl.gn.band, sprette gr.1-3 mm.							
		24.09.85							
		Stellan Burman							

Lokalitet: 41.550

Dato : Juli-85

Koordinater : X: 025.431,2 Y: 41.546,0

Retning : S

Helling/stigning: -39°

Høyde : +10,9

Lengde : 86,30 m

Borehull: 1230

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	30					
0.90 - 3.80	2.90	biot.gn.	Mørk mlk-grov.Pegmatitisk spor hbl.enkelte Sl.striper, imp.Py.Po.Cp.Gn.	30-45	0.02	0.12	1.57	5,8	0,90-2,30
					0.02	0.19	0.51	5,1	2,30-3,80
3.80 - 6.00	2.20	grå gn.	Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.skikt, små åpne folder striper PyPo.Sl.Cp.Gn.	0-90	2.03	0.72	1.75	5,1	3,80-5,00
					0.03	0.11	0.12	3,3	5,00-6,00
6.00 - 6.60	0.60	biot.gn.	Mørk mlk.pegmatitisk, imp. Py.Po.Sl.	45	0.05	0.25	1.16	8,4	6,00-7,00
6.60 - 11.00	4.40	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.enstaka biot. hbl.gn.band, åpen fold.	45-60					
11.00 - 16.00	5.00	biot.gn.	Mørk mlk.delvis brecciert pegmatitisk, spor hbl, enkelte striper Sl.Cp.Gn.	35-45	0.03	0.18	1.20	6,9	
16.00 - 17.40	1.40	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm, svak imp.Py.	45-50	0.21	0.10	0.06	2,4	
17.40 - 20.50	3.10	biot.gn.	Se foregående m/imp.Py.Po. Sl.Cp.Gn.	45	0.02	0.18	0.31	7,5	
20.50 - 39.40	18.90	grå gn	Lys mlk.sprette gr.1-3mm, enstaka cm smale hbl.gn. band.	40-45					
39.40 - 41.10	1.70	Pegm.							
41.10 - 54.30	13.20	grå gn.	Se ovan.	25-35					
54.30 - 55.00	0.70	Pegm.							
55.00 - 56.30	1.30	biot.gn.	Mørk mlk.enstaka gr.1-2mm slak fold. impr Sl.B2	0-20	0.26	0.33	1.73	8.0	55,30-56,30

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1230

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
56.30 - 63.70	7.40	biot.gn. Rel.mørk,mlk,växl m/grå gn,skarn band foldet m/ små åpne folder,delvis ondulerad,stripet imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	0-40	0.02	0.08	0.10		4.0	56,30-57,00
				1.02	0.32	3.95			57,00-63,00
				0.28	0.17	1.01			63,00-63,70
63.70 - 70.90	7.20	" "	10-35	0.15	0.16	0.82		4.0	63,70-64,70
				0.09	0.28	0.15		5.1	70,00-70,90
70.90 - 71.50	0.60	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grov.enkelte <u>Sl.Cp.GN.Py.</u> band.	35	2.25	0.27	3.34		4.2	
71.50 - 74.60	3.10	hbl.biot.gn. Mørk mlk,sprette gr.1-3mm	30-35	0.03	0.04	0.08		3.5	73,60-74,60
74.60 - 77.80	3.20	biot.gn. Mørk mlk,delvis biot.sk. spor hbl. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> foldet.	10-45	1.73	0.34	5.12		5.1	74,60-75,60
				0.32	0.14	0.53		6.1	75,60-76,60
				0.36	0.38	1.87			76,60-77,80
77.80 - 82.60	4.80	hbl.biot.gn. Mørk mlk.m/hbl.gn.band, gr.1-3 mm svak imp. <u>Py.</u>	60-70						
82.60 - 86.30	3.70	hbl.gn. Mørk mlk.svak imp. <u>Py.</u>	50-60						

28.06.85

Stellan Burman

Lokalitet: 41.550

Dato: Juni -85

Koordinater : X: 925.431,2 Y: 41.546,0

Retning : S

Helling/stigning: -32°

Høyde : +10,9

Lengde : 95,40 m.

Borehull: 1229

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.90	0.90	grå gn. lys mlk. små åpne folder.	30						
0.90 - 4.00	3.10	biot.gn. Mørk mlk. delvis pegmatitisk, spor hbl. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	35-40	0.02	0.28	1.49		8.1	
4.00 - 6.70	2.70	grå gn.b.d. Rel. lys mlk. delvis musk. rik, små åpne folder, imp. <u>Po.Py.Sl.Cp.Gn.</u>	35	0.92	0.23	0.51		7.1	4.00 - 5.40
				0.04	0.19	0.19		4.9	5.40 - 6.70
6.70 - 8.40	1.70	biot.gn. Mørk mlk. spor hbl. enstaka gr. 1-4 mm, spor <u>Py.Sl.</u>	45-50	0.02	0.05	0.18		4.5	
8.40 - 10.20	1.80	grå gn. lys mlk. sprette gr. 1-3 mm	45-50						
10.20 - 17.50	7.30	biot.gn. Mørk mlk. delvis pegmatitisk, enkelte cm tykke biot. sk. band, sprette spor <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> ved 16.40-16.80 slak fold.	20-50	0.02	0.11	0.37		5.2	10.20 - 13.20
				0.03	0.13	0.26		6.2	13.20 - 16.20
				0.01	0.15	1.70		7.3	16.20 - 17.50
17.50 - 22.70	5.20	grå gn.b.d. Rel. lys mlk. växl m/biot. gn. band, enstaka gr. 1-3 mm. <u>Py.Po.</u> som enkelte tynne skikt.	40 50	0.06	0.08	0.06		3.2	17.50 - 18.50
22.70 - 27.10	4.40	grå gn. lys mlk. fink. sprette gr. 1-3 mm.	40 35						
27.10 - 29.80	2.70	pegm							
29.80 - 68.30	38.50	grå gn. lys mlk-fink. sprette gr. 1-3 mm.	35-25						
68.30 - 70.40	2.10	grå gn.b.d. Rel. lys mlk. växl m/cm tykke biot. gn. band, svak imp. <u>Py.</u> spor <u>Po.</u> Svakt foldet. sprette spor hbl.	30-45						

Lokalitet:

Dato

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1229

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
70.40 - 71.00	0.60	biot.sk.	Mørk mlk.svak imp.Py.	40					
71.00 - 74.80	3.80	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.växl m/musk. biot.gn.band Py. impr.	40	0.06	0.08	0.06	3.2	7380-7480
74.80 - 76.70	1.90	biot.musk.gn.	Rel.mørk mlk-grov mlk. enkelte grå gn.band, imp. Py. spor Sl.	40	0.15	0.12	0.76	7.3	7480-7580
					0.15	0.09	0.21	5.9	7580-7670
76.70 - 79.90	3.10	grå gn.b.d.	Lys mlk.litt växl m/biot musk.gn.Py. impr.ondulerad ved 79.50-60.	35-40	0.02	0.03	0.11	3.7	7670-7770
79.90 - 82.80	2.90	biot.gn.	Rel.mørk mlk,litt växl m/ grå gn.band,spor hbl.	35-40					
82.80 - 85.90	3.10	hbl.biot.gn.	Mørk mlk.svak imp.Py. sprett gr.1-3 mm.	40					
85.90 - 95.40	9.50	hbl.gn.	Mørk mlk.gr-førende 1-3 mm.	45-50					

04.07.85

Stellan Burman

Lokalitet: 41.550

Borehull: 1228

Dato : Juni-85

Koordinater : X: 925.331,4 Y: 41.545,2

Retning : S

Helling/stigning: -45°

Høyde : +10.7

Lengde : 59.40 m

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	grå gn. Lys mlk.spor Py.	35-40	0.03	0.08	0.23		4.1	
0.60 - 3.40	2.80	biot.gn. Mørk mlk,tildels pegmatitisk.Brecciert,Sprette Sl.Cp.Gn.Py.		0.01	0.16	1.33		7.2	0.60-2.00
				0.02	0.15	0.60		5.4	2.00-3.40
3.40 - 4.40	1.00	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.enstaka skikt av Po.Py.Sl.Gn.	45	1.25	0.26	0.42		5.6	
4.40 - 7.10	2.70	grå gn. Lys mlk.intens foldet m/små runde folder.		0.03	0.05	0.06		3.9	4.40-5.40
7.10 - 8.50	1.40	biot.gn. Mørk mlk.delvis biot.sk.	80	0.01	0.04	0.08		5.2	
8.50 - 10.20	1.70	hbl.gn. Rel.mørk mlk.växl m/hbl. biot.gn.små åpne folder.							
10.20 - 12.10	1.90	biot.gn. Mørk mlk.pegmatitisk,Sl. Cp.Gn.Py.Po.	45-80	0.02	0.15	0.72		5.5	
12.10 - 13.10	1.00	grå gn.b.p. Lys mlk,sprette gr.1-3mm Spor hbl.	70-80	0.01	0.01	0.04		1.6	
13.10 - 18.40	5.30	biot.gn. Mørk mlk.tildels pegmatitisk.Sl.Cp.Gn.Py.	60-80	0.02	0.15	0.55		6.4	13.10-17.40
				0.01	0.04	0.07		2.7	17.40-18.40
18.40 - 42.50	24.10	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.enstaka hbl. biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm,mot slutten musk.	40						
			45	0.01	0.12	0.10		1.5	41.50-42.50
42.50 - 44.20	1.70	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grov,impr.Py.spor Sl.Cp.Gn.	40	0.27	0.15	1.27		6.2	
44.20 - 52.40	8.20	biot.hbl. Mørk mlk.växl m/biot.musk grå gn.band delvis rik Sl.Cp.Gn.Py.Po. Små foldet,ondulerat.	0-90	0.37	0.59	2.28		6.3	44.20-48.20
				0.51	0.34	3.65		6.4	48.20-52.40
				0.15	0.09	0.13		2.9	52.40-53.40
			2						

Lokalitet:

Borehull: 1228

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
52.40 - 55.50	3.10	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. hbl.gn.band, sprette gr. 1-3 mm. <u>Sl.Gn.</u> ved 53.20.	45						
55.50 - 59.40	3.90	hbl.biot.gn. Mørk mlk.växl m/hbl.gn.band, gr-førende, slak fold ved 57.20.	45 55						
20.06.85									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.550

Dato : Juni -85

Koordinater : X: 925.333,1 Y: 41.545,8

Retning : opp

Helling/stigning: +90°

Høyde : + 15.8

Lengde : 58.60 m

Borehull: 1227

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	biot.gn. Rel.mørk mlk.m/grå gn. band i starten, impr.Sl.	80	0,03	0,13	1,24		4,5	
0.40 - 5.50	5.10	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm Åpen fold.	80 40 80						
5.50 - 7.60	2.10	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band,m/gr.1-3 mm, impr. Py.	70-90						
7.60 - 8.00	0.40	skarn Grønn,m/Sl.Cp.Gn.Py.		0,38	0,17	1,54		3,5	
8.00 - 14.40	6.40	grå gn.b.p. Lys mlk.enstaka biot.ski- kt.Fr.12.20-12.30 komp. Sl.	80-90	0,41	0,30	1,93		6,4	13,40-14,40
14.40 - 16.10	1.70	biot.gn. Mørk mlk.impr.Sl.Cp.Gn.Py.	70	0,13	0,41	2,83		9,1	
16.10 - 17.60	1.50	grå gn.b.p. Lys mlk.svak impr.Py.	80	0,01	0,04	<0,01		2,2	
17.60 - 20.80	3.20	biot.gn. Mørk mlk-grovmlk.delvis biot.musk.gn.impr.Sl.Cp. Gn.Py.	70-80	0,01	0,04	0,01		4,9	17,60-18,60
				0,17	0,16	1,00		7,0	18,60-19,60
				0,51	0,31	4,81		9,1	19,60-20,80
20.80 - 25.40	4.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.växl m/cm tykke biot.gn.band,sprette gr.1-3 mm,Sl.ved 23.50m.	80 60	0,02	0,02	0,06		1,9	24,40-25,40
25.40 - 26.30	0.90	biot.gn. Mørk mlk.impr.Py.Sl.Cp. Gn.Spor Po.	60 80	0,32	0,17	1,36		5,7	
26.30 - 27.70	1.40	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	80	0,01	0,01	0,04		1,6	
27.70 - 28.40	0.70	biot.gn. Mørk mlk.impr.Sl.Cp.Gn.Py.	80	0,04	0,10	2,49		4,6	
28.40 - 29.00	0.60	grå gn. Lys mlk.	80	0,01	0,01	0,08		1,6	
29.00 - 29.70	0.70	biot.gn. Mørk mlk.spor Sl.rund fold	80 60 80	0,01	0,15	0,35		5,6	

.....2

Lokalitet:

Borehull: 1227

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

side 2

Side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
29.70 - 54.20	24.50	grå gn. Lys mlk.enstaka opp til dm tykke hbl.gn.band,gr. førende ved 35.40 åpen fold.	70-90	0.01	0.04	0.03		2.1	29.70-30.70
				0.21	0.17	0.86		3.5	53.20-54.20
54.20 - 58.60	4.40	biot.gn. Rel.mørk mlk,var.m/biot. musk.gn.imp.Sl.Cp.Gn.Py. delvis rik.Fr.58.30-58.60 grus.	60-80	0.33	0.20	1.17		9.4	54.20-55.20
				0.71	0.50	4.06		7.29	55.20-58.60
		12/6-85 Stellan Burman							

Lokalitet: 41.550

Dato : Mai -85

Koordinater : X: 925.550,8 Y: 41,446,3

Retning : 5

Helling/stigning: +80°

Høyde : + 16,0

Lengde : 50.70 m

Borehull: 1226

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.30	1.30	biot.gn. Mørk mlk-grov.delvis brecciert, spor hbl.Sl.Cp.Gn.Py.	70-80	0,03	0,27	1,37	g/tAgAu	7,5	
1.30 - 3.00	1.70	biot.gn. Mørk mlk.svagt hbl.førende, spor Cl.Cp.Gn.Py.delvis foldet.	50-70	0,03	0,04	0,10		3,7	
3.00 - 4.30	1.30	biot.gn. (Pegmatitisk) Mørk mlk-grovk.delvis brecciert, spor hbl.Sl.Cp.Gn.Py.	60-80	0,13	0,33	0,31		5,9	
4.30 - 5.90	1.60	biot.gn. Rel.mørk mlk.svak imp.Py. svake spor Sl.	70-80	0,03	0,12	0,16		4,4	
5.90 - 23.50	17.60	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.delvis bandad med en tykke biot.hbl.gn. band.Sl.ved 8.60-8.65. Fra 19.20-19.50 små runde folder.							
23.50 - 25.40	1.90	biot.gn. (Biot.musk.) Mørk mlk.grovk.tildels fittet preg,imp.Py.	50	0,05	0,16	0,25		7,5	23.50-24.50
				0,05	0,15	0,34		5,5	24.50-25.40
25.40 - 34.70	9.30	biot.gn. væxl Mørk mlk.væxl m/grå gn. skarn.komp.malmband, runde folder.	70-70	0.14	0.55	5.60	7.9/0.05	11.8	25.40-26.50
				0.11	0.21	5.76	4.8/0.05	13.0	26.50-28.00
				0.09	0.23	5.24	5.5/0.15	9.8	28.00-29.50
				0.14	0.14	4.56	4.7/0.20	6.5	29.50-31.00
				0.32	0.16	2.71	9.1/0.20	5.4	31.00-32.50
				0.72	0.37	6.68	15.4/0.35	7.6	32.50-33.50
				1.07	0.37	3.67	23.2/0.50	6.4	33.50-34.70
34.70 - 50.70	16.00	grå gn. Lys mlk.enkelte biot.rikere render, sprette gr.1-3 mm.Fra 40.00-45.00 runde folder.	60-70	0.16	0.10	0.53	6.3/0.15	2.1	34.70-35.70

06.06.85 Stellan Burman

Lokalitet: 41.550

Dato : Juni - 85

Koordinater : X: 925.330,8 Y: 41.446,3

Retning : S

Helling/stigning: + 62°

Høyde : + 16.0

Lengde : 59,30 m

Borehull: 1225

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.40	0.40	Biot.gn. (Pegmatitisk)	Mørk mlk-grovk.Brecciert <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	0.04	0.89	3.06		11.4	
0.40 - 1.20	0.80	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk.overgang til biot.gn.	0.03	0.11	0.26		3.0	
1.20 - 2.90	1.70	biot.gn. (Pegmatitisk)	Mørk mlk-grovk, enkelte smalegrå gn.band, svak impr. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> spor <u>Po.</u>	0.03	0.13	0.22		4.0	
2.90 - 4.60	1.70	grå gn.	Lys mlk, sprette gr.1-3mm spor <u>Py.Po.</u>						
4.60 - 5.60	1.00	biot.gn.	Mørk mlk.spor hbl.rik imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	0.21	0.38	6.04		8.9	
5.60 - 19.50	13.90	grå gn.b.d.	Rel.lys mlk, sprett gr. 1-3mm.Svak impr. <u>Py.</u> ens- taka biot.gn.band, spor <u>Sl.fra 18.50-19.50.</u>	0.09	0.08	1.10		5.6	18.50-19.50
19.50 - 24.40	4.90	biot.gn.	Mørk mlk.svak impr. <u>Py.</u>	0.04	0.11	0.24		5.4	23.40-24.40
24.40 - 25.40	1.00	" "	Mørk mlk.svak impr. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	0.07	0.25	0.96		6.7	
25.40 - 28.05	3.35	" "	m/spor hbl.og gr.1-3 mm.						
28.05 - 29.80	1.75	" "	m/spor hbl.og gr.1-3 mm imp. <u>Py.</u> spor <u>Sl.Cp.Gn.</u>	0.20	0.27	0.94		7.4	
29.80 - 40.70	10.90	grå gn.b.d.	Lys mlk.enkelte dm tykke biot.gn.band, mot slutten m/hbl.Fr.37.60-37.80 rik <u>Sl.enstaka gr.1-4 mm.</u>						
40.70 - 59.30	18.60	grå gn.b.d. (Biot.gn.m/grågn)	Ditto med m/hbl.gn.band. Fr.43.30-43.40 <u>Sl.</u> 6.6.85 Stellan Burman						

Lokalitet: 41.550

Dato : Mai -85

Koordinater : X: 925.332,7 Y: 41.547,9

Retning : Lodd

Helling/stigning: -90°

Høyde : + 10.6

Lengde : 20.00 m

Borehull: 1224

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	grå gn.b.d.	Rel. lys mlk.Spor <u>Sl</u> .ved 1.00.	70-80					
1.60 - 3.05	1.45	" "	Rel.lys mlk.växl m/biot gn.band,spor <u>Sl</u> .Fr.2.80-3.05 rik.	"	0.03	0.36	2.12	7.2	
3.05 - 5.20	2.15	" "	Lys mlk.sprette gr.1-3 mm spor <u>Py</u> .Po.	80					
5.20 - 8.80	3.60	biot.gn.	Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band.spor hbl.imp, striper <u>Sl</u> .Cp.Gn.Py.Po.	70-80	0.03	0.14	0.68	4.8	5.20-6.40
					0.61	0.22	3.76	6.4	6.40-8.80
8.80 - 10.60	1.80	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm.	"					
10.60 - 18.70	8.10	biot.hbl.gn.	Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band m/gr.1-3 mm,enstaka <u>Py</u> .Po. striper .	70-80					
18.70 - 20.00	1.30	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3 mm	80					

11/6-85

Stellan Burman

Lokalitet: 41.550

Borehull: 1223

Dato : Maj -85
 Koordinater : X: 925.330,4 Y: 41.548,3
 Retning : S
 Helling/stigning: -56°
 Høyde : + 10.6
 Lengde : 29.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	grå gn. Lys mlk.enkelte biot.skikt foldet.Spor Py.Sl.	45	0.01	0.07	0.27		3.7	
0.50 - 2.00	1.50	biot.gn. Mørk mlk.delvis brecciert Sl.Cp.Gn.Py.	50	<0.01	0.17	1.05		6.5	
2.00 - 2.60	0.60	grå gn. Lys mlk.svak imp.Py.	70-80	0.01	0.07	0.06		3.4	
2.60 - 3.40	0.80	biot.gn. Se oven.Sl.Cp.Gn.Py.	70-80	0.05	0.74	2.10		12.1	
3.40 - 9.90	6.50	grå gn. Lys mlk.enstaka dm tykke biot.rike partier,Sl.ved 3.90-4.00.Po.ved 6.20. Delvis småfoldet.Fr.6.80 sprette spor hbl.m/gr.	70-80	0.04	0.95	1.19		5.5	3.40-4.40
9.90 - 18.50	8.60	biot.gn (pegmatitisk) Mørk mlk-grovk.Litt växl m/grå gn.band.var/Sl.Cp. Py.Po.	45-60	0.02	0.20	0.91		5.84	9.90-14.50
18.50 - 19.10	0.60	hbl.biot.gn. Mørk mlk.gr-før. 1-3 mm.	55-60						
19.10 - 29.50	10.40	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm enkelte band m/spor hbl. gr-førende.	50 60						

3.6.85

Stellan Burman

Lokalitet: 41.550

Dato : April -85

Koordinater : X: 925.329,0 Y: 41.546,1

Retning : S

Borehull: 1222

Helling/stigning: + 50⁰

Høyde : + 15.1

Lengde : 50.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.50	0.50	biot.pegm.	Rel.lys grovk.Biot.som klyser,spor <u>Py.Cp.Sl.</u>						
0.50 - 14.00	13.50	grå gn.	Rel.lys mlk.växl m/biot. rike partier,svak imp. <u>Py.</u> i de biot.rikere partier, sprette gr. 1-3 mm.	45					
14.00 - 15.05	1.05	Pegm.							
15.05 - 22.60	7.55	grå gn.	Lys mlk.foldet.	30-40					
22.60 - 23.40	0.80	" "	Lys mlk.imp. <u>Sl.Cp.Py.Po.</u>	35	0.28	0.41	1.35	8.7	
23.40 - 27.90	4.50	" "	Lys mlk.slak fold.	0-40					
27.90 - 28.70	0.80	" "	Lys mlk.imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	30	0.69	0.29	0.80	6.4	
28.70 - 30.30	1.60	grå gn.	Rel.lys mlk.växl m/biot. rikere partier.	30-40					
30.30 - 36.70	6.40	biot.hbl.gn.	Mørk mlk.växl m/enstaka grå gn.band gr.førende 1-3 mm,spor <u>Sl.</u> ved 33.30-33.50 foldet.	20-50					
36.70 - 39.50	2.80	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm spor <u>Sl.</u> ved 37.55 foldet.	70 70					
39.50 - 40.70	1.20	biot.gn. (Hbl.førende)	Mørk mlk.delvis hbl.førende m/gr.1-3 mm.Foldet.	60 60					
40.70 - 50.00	9.30	grå gn.	Lys mlk.foldet,delvis svak imp. <u>Py.</u>	0-50					
9.5.85									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.550

Dato : Mai -85

Koordinater : X: 925.330,8 Y: 41.546,3

Retning : S

Helling/stigning: + 72°

Høyde : + 16.0

Lengde : 65.40 m

Borehull: 1221

side 1

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.10	4.10	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band m/spor hbl.spret- te gr. 1-3 mm.Fr.0.00- 0.20 spor Sl.Py.	70-80	0.03	0.02	0.16		2.5	3.10-4.10
4.10 - 4.90	0.80	biot.gn. Mørk mlk.spor hbl.rik imp.Sl.Cp.Gn.Py.	60	0.24	0.37	5.88		10.2	
4.90 - 5.90	1.00	" " Mørk mlk.växl m/grå gn. band,svak imp.Py.Cp.Sl.?	70	0.02	0.25	0.17		6.6	
5.90 - 25.20	19.30	grå gn. Rel.lys mlk.litt växl m/ smale biot.gn.band,delvis hbl.førende,sprett gr.1- 3 mm,spor Py.	70-80						
25.20 - 28.10	2.90	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk.spor hbl. imp.Py.spor Sl.småfoldet.	60-70	0.03 0.04	0.06 0.19	0.14 0.28		6.5 6.8	25.20-26.60 26.60-28.10
28.10 - 29.60	1.50	biot.hbl.gn. Mørk mlk.rike malmstriper	70-80	0.10	0.30	5.16		11.8	
29.60 - 31.00	1.40	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk.Spor hbl.imp. Py.Sl.(D)	50-60	0.08	0.31	2.61		9.2	
31.00 - 35.70	4.70	biot.hbl.gn. Mørk mlk.sprette gr.1-3mm svak imp.Py.	45-60	0.20	0.37	1.03		6.9	31.00-32.00
35.70 - 37.60	1.90	hbl.gn. Mørk mlk.litt växl m/grå gn.b.d.band,gr-førende 1- 3 mm.Slake folder.	0-50	0.03	0.05	0.15		5.6	36.60-37.60
37.60 - 41.80	4.20	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk.spor hbl. stripet imp.Sl.Cp.Gn.Py.	50-70	1.11	0.29	3.91			
41.80 - 43.80	2.00	grå gn. Lys mlk.spor hbl.musk. enstaka gr.1-4 mm.Slake folder.2	0-40						

Lokalitet:

Dato :

Koordinater :

Retning :

Helling/stigning:

Høyde :

Lengde :

Borehull: 1221

side 2

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
43.80 - 49.60	5.80	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk.svak imp.Py. Sl.Cp.Po.Fr.47.00-48.00 runde folder.		0.42	0.22	1.39		6.23	
49.60 - 56.50	6.90	biot.hbl.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn./ musk.gn.band.Stripet Sl. Cp.Gn.Py.Po.foldt.	60-70	0.98	0.27	3.74		7.12	49.60-54.00
				0.43	0.20	1.25		9.28	54.00-58.50
56.50 - 58.30	1.80	" " " Mørk mlk.sprette gr.1-3mm svak imp.Py.	50-60	0.08	0.03	0.19		4.3	58.50-59.50
58.30 - 62.00	3.70	grå gn.b.d. Rel.lys mlk,sprett gr. 1-2 mm.	60-70						
62.00 - 65.40	3.40	hbl.biot.gn. Mørk mlk.sprett imp.Py. overganger til hbl.gn.	50-70						

30.5.85

Stellan Burman

Lokaliitet: 41.550

Borehull: 1220

Dato : Mai -85
 Koordinator : X: 925.337,8 Y: 41.547,3
 Retning : N
 Helling/stigning: + 59°
 Høyde : + 14.9
 Lengde : 44.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.30	3.30	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.enstaka cm tykke biot.sk.band m/rik Sl.Cp.Gn.Py.	50-70	0.02	0.11	0.57		3.7	
3.30 - 5.60	2.30	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm	60						
5.60 - 12.50	6.90	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.enstaka opptil cm tykke biot.sk.band m/ Sl.Cp.Gn.Py.	50-70	0.03	0.10	0.56		3.5	
12.50 - 19.50	7.00	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm.	45-50						
19.50 - 20.70	1.20	" " " " m/småle striper Sl.	"	0.23	0.16	0.29		2.9	
20.70 - 21.30	0.60	biot.hbl.skarn Rik malm.	"	0.07	0.71	12.60		15.8	
21.30 - 22.50	1.20	grå gn.b.d. Rel.lys mlk.biot.skikt m/ Sl.	45-50	0.03	0.09	0.28		2.5	
22.50 - 44.50	22.00	grå gn. Lys mlk.enkelte biot.rikere partier m/spor hbl.sprette gr.1-3 mm.Sl.ved 30.75-30.80 m.	45-55-70						

30.5.85

Stellan Burman

Lokalitet: 41.550

Dato : April -85

Koordinater : X: 925.338,0 Y: 41.547,0

Retning : N

Helling/stigning: + 35°

Høyde : ? 13.4

Lengde : 43.40

Borehull: 1219

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m	
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe		
0.00 - 0.80	0.80	grå gn.	Lys mlk.enstaka gr.1-3mm	40						
0.80 - 9.40	8.60	biot.gn. (Pematitisk)	Rel.lys mlk-grovk.Brecci- ert,enstaka Po.Py.klyser Spor Sl.	45 20						
9.40 - 10.80	1.40	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm.	40-45						
10.80 - 13.70	2.90	biot.gn. (Pegmatitisk)	Se ovan.	20-40						
13.70 - 15.00	1.30	biot.hbl.gn.	Mørk mlk,bandad m/grå gn. Sl. ved 12.40-12.50 14.70-14.80	45-50						
15.00 - 18.30	3.30	grå gn.	Lys mlk.enkelte biot.skikt tildels brecciert.Py.Po. Cp.Gn.Sl. som klyser og sprekkfylling.		0,39	0,21	0,34		3,5	15,00 - 16,10
					0,15	0,19	0,52		3,7	16,10 - 17,20
					0,02	0,48	0,82		4,4	17,20 - 18,30
18.30 - 20.90	2.60	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	30						
20.90 - 25.30	4.40	biot.gn. Pegmatitisk)	Rel.mørk mlk-grovk.Brecc- iert.Striper,klyser Sl. Cp.Gn.Py,Po.	0-45	0,03	0,14	0,31		4,4	20,90 - 22,00
					0,08	0,20	0,81		5,3	22,00 - 24,20
					0,10	0,88	2,66		9,1	24,20 - 25,30
25.30 - 32.30	7.00	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3 mm	35						
32.30 - 32.70	0.40	Pegm								
32.70 - 43.40	11.70	grå gn.	Rel.lys mlk.enkelte biot. rikere partier.Sprette gr.1-3 mm,ved 38.85 Sl. Foldet mot slutten.	30						
				10						
				30						
20.4.85										
Stellan Burman										

Lokalitet: 41.550

Dato : April -85

Koordinater : X: 925.337,4 Y: 41.548,0

Retning : N

Helling/stigning: -50°

Høyde : + 10.6

Lengde : 43.80

Borehull: 1218

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.90	3.90	biot.gn. Rel.mørk mlk-grovmlk.växl m/grå gn.band,tildels pegmatitisk.Sprette spor Cp. <u>Sl.</u>	65-85						
3.90 - 19.30	15.40	grå gn. Lys mlk,enstaka biot.rikere band, fra 9.20-9.30 <u>Sl.</u> sprette gr. 1-3 mm,	45-50						
19.30 - 19.80	0.50	hbl.biot.gn. Rel.mørk mlk-grov.Po.Cp. ved 19.45-19.50 gr.1-4mm.	50						
19.80 - 29.20	9.40	grå gn. Rel.mlk.väm/biot.band, enstaka hbl.biot.band m/gr.	50-60						
29.20 - 30.00	0.80	hbl.biot.gn. Mørk mlk.sprett gr.1-3 mm	60	0,03	0,10	0,05		5,2	
30.00 - 32.00	2.00	biot.hbl. Mørk grovk.växl m/grå gn. Brecciert,rike malm band.	50-60	0,28	0,68	8,80		18,8	30,00-31,00
				0,29	0,99	5,32		15,1	31,00-32,00
32.00 - 36.00	4.00	biot.hbl.gn. Mørk mlk.delvis bandad, sprette gr.1-2mm svak imp. <u>Py.</u>	60	0,03	0,17	0,45		4,8	32,00-33,00
36.00 - 41.20	5.20	hbl.gn. Mørk mlk.sprette gr.1-3mm	50-60						
41.20 - 43.80	2.60	grå gn. Rel-lys mlk.smale band hbl.gn.m/gr.	45						

20.4.85

Stellan Burman

Lokalitet: 44.610

Borehull: 1217

Dato: Nov.-84

Koordinator : X: 925.442,8 Y: 44.605,8

Retning : S

Helling/stigning: - 58°

Høyde : - 99.4

Lengde : 5.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.60	0.60	grå gn. Lys mlk.delvis musk.rik. spor Sl.	60°	0,08	0,05	0,14			
0.60 - 4.80	4.20	musk.biot.gn. Rel.lys mlk-grovmlk. stripet imp.Sl.	60-40°	0,07	0,14	0,12			0,60 - 1,60
				0,17	0,61	1,71			1,60 - 2,60
				0,77	0,67	3,57			2,60 - 3,60
				0,73	0,38	1,92			3,60 - 4,80
4.80 - 5.30	0.50	grå gn. Lys mlk.sprette gr.	60°	0,11	0,10	0,20			
3/12-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.610

Borehull: 1216

Dato : Nov.-84
 Koordinater : X: 925.448,8 Y: 44.606,7
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : -99.4
 Lengde : 8.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.20	3.20	grå gn. Mlk.sprette gr.1-2 mm, enstaka biot.gn.band. <u>Sl</u> .ved 0.65,foldet.	70-80°						
3.20 - 8.30	5.00	hbl.gn. Mørk mlk.fr.starten hbl. biot.gn.sprette gr.1-3 mm,spor <u>Py</u> .Småfoldet.	70-80°						
3/12-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 44.610

Dato: Nov.-84

Koordinater : X: 925.439,7 Y: 44.609,5

Retning : N

Helling/stigning: - 81°

Høyde : - 99.5

Lengde : 8.30 m

Borehull: 1215

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	grå gn. Lys mlk.kv.rik	80°	0.06	0.03	0.12			
0.80 - 3.00	2.20	biot.gn. Mørk mlk.skarn-førende. Rik Sl.Cp.Gn.Py.Foldet.	60-80°	0.69	0.33	1.25			0.80-2.00
				0.52	0.63	4.30			2.00-3.00
3.00 - 3.90	0.90	" " Mørk mlk.imp.Py.spor Sl.	80-90°	0.06	0.07	0.16			
3.90 - 7.30	3.40	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3 mm Sl.ved 5.35.	80°	0.05	0.07	0.11			
7.30 - 8.30	1.00	hbl.gn. Mørk mlk,sprette gr.1-3mm	80°						

3/12-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.610

Borehull: 1214

Dato : Nov.-84
 Koordinater : X: 925.435,9 Y: 44.614,0
 Retning : S
 Helling/stigning: - 59°
 Høyde : - 99.3
 Lengde : 11.60 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.50	2.50	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-2mm.	60-70°	0.07	0.11	0.07			1.50 - 2.50
2.50 - 8.20	5.70	" " Rel. lys mlk.växl m/biot. musk.gn.band m/imp. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	60°	0.70	0.74	3.07			2.50 - 4.00
			65°	0.26	0.15	1.09			4.00 - 5.50
				0.12	0.11	0.28			5.50 - 8.20
8.20 - 11.60	.40	biot.hbl.gn. Mørk mlk.overgår mot slutten til hbl.biot.gn.svak imp. <u>Py.</u> sprette gr.1-3 mm.	70°	0.03	0.01	0.02			8.20 - 9.20

3/12-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.640

Borehull: 1213

Dato : Nov.-84

Koordinater : X: 925.457,4 Y: 44.639,7

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : - 98,9

Lengde : 11.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.00	1.00	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-2mm.	80-90°	0.03	0.01	0.12			
1.00 - 4.90	3.90	" " Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band m/ <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	80-90°	0.86	0.24	5.28			1.00-2.00
				0.13	0.05	0.39			2.00-4.00
				0.17	0.17	1.32			4.00-7.90
4.90 - 8.40	3.50	" " Rel.lys mlk.växl m/ens- taka biot.hbl.gn.band m/ <u>Py.</u>	80-90°	0.22	0.20	0.34			4.90-5.90
8.40 - 11.40	3.00	biot.hbl.gn. Mørk mlk.litt växl m/grå gn.band, imp.Py. føretrædes vis i biot.hbl.gn.	80-90°						

3/12-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.640

Borehull: 1212

Dato : Nov.-84

Koordinater : X: 925.454,3 Y: 44.641,0

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : - 99.4

Lengde : 8.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 4.40	4.40	biot.musk.gn. Rel.lys mlk.skarn.Stripet imp.Py.Cp.Gn.Sl.Foldet.	70-90°	1.06	0.41	5.85			
4.40 - 5.60	1.20	Pegm. Växlm/Pegm/biot.gn.band biot.gn. m/Sl.Cp.Gn.Py.	80°	0.16	0.25	0.46			
5.60 - 8.50	2.90	grå gn. Rel.lys mlk.växlm/biot. gn.band.imp.Py.	70-90°	0.06	0.05	0.15			5.60 - 6.60
3/12-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 44.640

Dato

Nov.-84

Koordinater : X: 925.450,3 Y: 44.641,5

Retning : Lodd

Helling/stigning: - 90°

Høyde : - 99.5

Lengde : 11.40 m

Borehull: 1211

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.90	1.90	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm. Spor <u>Sl.</u>	80-90°	0.20	0.54	0.84			0.00 - 1.00
				0.03	0.04	0.04			1.00 - 1.90
1.90 - 2.90	1.00	Pegm.							
2.90 - 5.90	3.00	grå gn. Rel.lys växl m/biot.musk. gn.band.stripet imp. <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.</u>	80-90°	1.07	0.76	4.31			
5.90 - 10.40	5.50	" "	80-90°	0.12	0.10	0.02			5.90 - 6.90
10.40 - 11.40	1.00	hbl.biot.gn. Mørk mlk,sprette gr.1-3mm	70-80°						

3/12-84

Stellan Burman

Lokalitet: 44.640

Borehull: 1210

Dato : Nov.-84

Koordinater : X: 925.447,3 Y: 44.641,6

Retning : S

Helling/stigning: - 80°

Høyde : - 99.5

Lengde : 11.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	Pegm. m/enkelte biot.gn.band.							
1.60 - 2.60	1.00	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. spor hbl.spor <u>Sl.Cp.Gn.</u> <u>Py.</u>	80-90°	0,04	0,06	0,10			
2.60 - 2.90	0.30	Pegm.							
2.90 - 4.20	1.30	grå gn. Rel.lys mlk.litt växl m/ biot.gn.band,spor <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.</u>	80°	0,13	0,10	0,26			
4.20 - 5.40	1.20	biot.gn. Mørk mlk.skarn,stripet tildels rik <u>malm.</u>	70-80°	1,30	0,47	7,32			
5.40 - 11.00	5.60	grå gn. Lys mlk.sprette gr.	70-80°	0,21	0,65	1,79	?		5,40-6,40
11.00 - 11.40	0.40	hbl.gn. Mørk mlk.m/gr.	70°						

3/12-84

Stellan Burman

Lokalitet: (Blåstoll stuff)

Dato: Nov.-84

Koordinater : X: 925.330 Y: 41.560 på stuff

Retning : v

Helling/stigning: - 23°

Høyde : + 10,7

Lengde : 8.60 m

Borehull: 1209

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	grå gn. Rel.lys mlk.Fr.0.00-0.20 biot.skikt.enstaka gr. 1-2 mm.Småfoldet.	0-15°						
1.20 - 1.50	0.30	komp.malm	35°	1.68	0.40	12.40			
1.50 - 2.30	0.80	grå gn. Rel.lys mlk.sprette biot. skikt m/imp.Py,spor <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Foldet.</u>	0-30°	0.03	0.11	0.64			
2.30 - 3.50	1.20	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band.imp. <u>Py.Po.</u>	30-35°	0.01	0.08	0.28			
3.50 - 5.20	1.70	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	30°						
5.20 - 8.40	3.20	biot.gn. Pegmatitisk Rel.mørk grovk.striper, klysor <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u>	0-40°	0.15	0.31	1.42			5.20 - 6.20
				0.01	0.35	0.62			6.20 - 7.20
				0.16	0.11	1.15			7.20 - 8.40
		12.11.84 Stellan Burman							

Lokalitet: (Blåstoll stuff)

Dato : Nov.-84
 Koordinater : X: 925.330 Y: 41.560 på stuff
 Retning : V
 Helling/stigning: + 22°
 Høyde : + 11,2
 Lengde : 8.60 m

Borehull: 1208

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.80	0.80	biot.gn. Mørk mlk.rik imp. <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.Po.</u>	25-30°	0,04	0,33	5,96			
0.80 - 1.20	0.40	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band m/ <u>Py.Po.Spor Sl.</u>	25°	0,03	0,08	0,24			
1.20 - 6.90	5.70	" " Lys mlk.sprette gr.1-3mm	20-25°						
6.90 - 7.60	0.70	" " Rel.lys mlk.skiktad m/biot. musk.skikt.Imp. <u>Py.Sl.Cp.</u> <u>Gn.</u>	15-25°	0,35	0,28	3,85			
7.60 - 8.60	1.00	<u>Malm</u> Rik <u>Sl.Cp.Py.Foldet.</u>	0-30°	2,01	0,92	13,24			
12.11.84 Stellan Burman									

Lokalitet: 41.890

Dato : Nov.-84

Koordinater : X: 925.392,5 Y: 41.889

Retning : opp

Helling/stigning: +90°

Høyde : + 12.0

Lengde : 43,20 m

Borehull: 1206

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.70	1.70	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	80-90					
1.70 - 5.50	3.80	biot.gn. Pegmatitisk	Mørk grovk.delvis brecciert.Py.som sprekkfylling.						
5.50 - 8.00	2.50	grå gn.	Lys mlk.växl m/biot.gn.band.	80-90					
8.00 - 9.10	1.10	Pegm.							
9.10 - 9.70	0.60	grå gn.	Se ovan.	80					
9.70 - 12.20	2.50	biot.gn.	Mørk mlk.delvis pegmatitisk.Py.Sl. fr.11.90-12.10	80-90					
12.20 - 35.20	23.00	grå gn.	Lys mlk.sprette gr.1-3mm spor hbl.	80-90					
35.20 - 38.50	3.30	grå gn.	Lys mlk.musk.rik,litt skarn imp.Sl.Cp.Gn.Py.	80-90	0.65	0.58	3.33		35.20-36.20
					0.38	0.53	1.01		36.80-38.50
38.50 - 42.30	3.80	" "	Lys mlk.sprette gr.1-3mm	80-90					
42.30 - 42.80	0.50	" "	Lys mlk.spor hbl.rik imp. Sl.Cp.Gn.Py.	80	0.38	0.48	8.96		
42.80 - 43.20	0.40	Pegm.							
8.11.84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1205

Dato : Okt.-84

Koordinater : X: 925.331.4 Y: 41.564

Retning : N

Helling/stigning: - 45°

Høyde : + 9,3

Lengde : 8.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 5.90	5.90	biot.gn. Rel.mørk mlk,delvis brecciert pegmatitisk.Enkelte skikt og striper <u>Sl.Cp.</u> <u>Gn.Py.Po.</u>	30° 40°	0,03	0,18	1,08			0,00-1,50
				0,03	0,10	0,23			1,50-3,00
				0,01	0,10	1,42			3,00-4,50
				0,04	0,26	6,44			4,50-6,90
5.90 - 8.00	2.10	" " Se ovan. Spor <u>Sl.</u>	ca.45°						5,90-7,00

6/11-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1204

Dato : Okt.-84
 Koordnater : X: 925.331.4 Y: 41.564
 Retning : N
 Helling/stigning: 0° Horisontalt
 Høyde : + 11,9
 Lengde : 20.00 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.50	8.50	biot.gn. Mørk mlk.variert m/grå gn.sprette gr.1-3 mm i grå gn.Litt <u>Py.</u> og <u>Po.</u> i biot.gn.	0-5°						
8.50 - 9.90	1.40	" " " " " " m/spor <u>Sl.</u>	0-5°	0.03	0.18	1.00			
9.90 - 14.80	4.90	" " " " Sl. fr. 14.70-14.80.	0-5°						
14.80 - 20.00	5.20	grå gn.bd. Rel.lys mlk,sprette gr. 1-3 mm,sprette biot.band m/ <u>Py.</u> Spør <u>Sl.</u> ved 15.25-15.30 " " " 17.35 Foldet.	0-5° Fr.18.00 m45-60						

6/11-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1203

Dato: Okt.-84

Koordinater : X: 925.331.4 Y: 41.564

Retning : N

Helling/stigning: + 15°

Høyde : + 11,5

Lengde : 7.10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	grå gn. Rel.lys mlk.skiktad m/ biot.skikt.Slake folder.	0-5°						
1.20 - 3.20	2.00	biot.gn. Mørk mlk.grå gn.band. Slake folder. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> <u>Po.</u>	0-5°	0,03	0,15	0,17			1,20-2,20
				0,07	0,30	6,48			2,20-3,20
3.20 - 7.10	3.90	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm Slake folder.(Borrat igenom till Blåstoll)	5-10°	0,03	0,08	0,34			3,20-4,20

6/11-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1202

Dato : Okt.-84
Koordinater : X: 925.331.4 Y: 41.564
Retning : N
Helling/stigning: + 40°
Høyde : + 12,8
Lengde : 19.50 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 19.50	19.50	biot.gn. grå gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band,sprette striper <u>Sl.</u> <u>Cp.Gn.Py.Po.</u> Foldet,delvis brecciert. 6/11-84 Stellan Burman	ca. 45°	Se molnuberegning.					

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1201

Dato : Okt.-84
 Koordinator : X: 925.333.0 Y: 41.564.0
 Retning : N
 Helling/stigning: +65°
 Høyde : +14,5
 Lengde : 17.10 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.10	1.10	grå gn. Lys mlk.kv.rik.	45°	0,12	0,06	0,38			
1.10 - 3.90	2.80	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band,sprette <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u> Po. striper.	50° 60°	0,26	0,22	2,03			
3.90 - 6.35	2.45	grå gn. Lys mlk.enstaka gr.1-3 mm <u>Sl.ved 4.50.</u>	60° 70°						
6.35 - 8.75	2.45	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band.Sprette striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u>	60°	0,67	0,15	3,45			6,35-7,50
				0,10	0,17	0,86			7,50-8,85
8.75 - 12.90	4.15	grå gn. Lys mlk.enkelte smale biot.gn.band,sprette gr. 1-3 mm.	60°						
12.90 - 16.40	3.50	biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.bandenkelte striper <u>Sl.Cp.Gn.Py.Po.</u>	70°	0,22	0,14	0,61			12,90-14,00
				0,09	0,20	1,72			14,00-15,00
				0,19	0,43	1,53			15,00-16,40
16.40 - 17.10	0.70	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm.	80°						
6/11-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1200

Dato : Okt.-84
 Koordinater : X: 925.330.8 Y: 41.564.0
 Retning :
 Helling/stigning: opp
 : + 90°
 Høyde : + 14,5
 Lengde : 13.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band.Sl.som smale band.	70-90°	0,11	0,15	1,98			
1.60 - 13.40	11.80	grå gn. Lys mlk.enstaka biot.gn. band.sprette gr.1-3 mm. Sl.ved 7.50-7.60 m " " 9.05-9.10 m " " 9.60-9.62 m " " 10.80-10.90 m " " 11.40-11.60 m " " 12.80-12.85 m	80-90°						
6/11-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 41.560

Borehuil: 1199

Dato : Okt.-84
 Koordinator : X: 925.327.8 Y: 41.563.2
 Retning : S
 Helling/stigning: + 65°
 Høyde : + 14,3
 Lengde : 17.20 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.60	1.60	skarnmalm	Rik <u>malm</u> .Anhydrit fr.0.50-0.65.	0,26	0,48	10,72			
1.60 - 3.90	2.30	biot.gn.	Mørk mlk.delvis Pegmatitisk,imp. <u>Py</u> .	0,02	0,03	0,11			1,60-2,60
3.90 - 17.20	13.30	musk.biot.gn.	Rel.mørk mlk-grovmlk.Imp. <u>Py</u> . Mot slutten overgang mot grå gn.						
			45° 50° 60°						
			6/11-84						
			Stellan Burman						

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1198

Dato : Okt.-84
 Koordinator : X: 925.327.8 Y: 41.563.2
 Retning : S
 Helling/stigning: + 40°
 Høyde : + 12,4
 Lengde : 11.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.20	1.20	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm.	35°						
1.20 - 3.40	2.20	biot.gn. Mørk mlk.litt växl m/grå gn.band,imp. <u>Sl.Cp.Py.</u>	40°	0,93	0,25	2,38			1,20 - 2,30
				0,18	0,11	0,39			2,30 - 3,40
3.40 - 9.20	5.80	biot.musk.gn. Rel.mørk mlk-grov.Imp. <u>Py.</u>	30-40°	0,48	0,27	0,21			3,40 - 4,40
9.20 - 11.40	2.20	grå gn. Lys mlk.litt växl m/musk. biot.gn.band.	30°						

6/11-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.570

Borehull: 1197

Dato Okt.-84

Koordinater : X: 925.327.8 Y: 41.563.2

Retning : S

Helling/stigning: + 16°

Høyde : + 11,5

Lengde : 11.40 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 2.30	2.30	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band.Imp.Py.Sl.Cp.Gn. i biot.gn.Ondulerad. (slake små folder)	0-10°	0,03	0,15	0,41			
2.30 - 3.80	1.50	Biot. Mørk grovk.spor hbl.fol- det,imp.Sl.Cp.Gn.Py.Po.	0-10°	0,27	0,32	0,35			
3.80 - 7.50	3.70	biot.gn. Mørk mlk.växl m/halve kjernen grå gn.imp.Py. delvis Sl.	0-5°	0,36	0,19	0,20			
7.50 - 11.40	3.90	grå gn.bd. Rel.lys mlk.växl m/biot. gn.band,delvis halve kjer- nen,imp.Sl.Cp.Gn.Py.	0-10°	0,14	0,08	0,30			7,50-8,80
				0,51	0,37	1,09			8,80-10,10
				0,50	0,59	0,45			10,10-11,40
		5/11-84 Stellan Burman							

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1196

Dato : Okt.-84
 Koordinater : X: 925.327.8 Y: 41.563.2
 Retning : S
 Helling/stigning: 0° Horisontalt
 Høyde : + 10,9
 Lengde : 11.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 0.70	0.70	grå gn. Rel.lys mlk-grov-mlk.svak imp. <u>Py.</u>	15°	0,01	0,02	0,05			
0.70 - 4.90	4.20	biot.gn. Mørk mlk-grovmlk.delvis Pegmatitisk,litt variert m/grå gn.band cm tykke. Foldet m/brecciert preg. Imp. <u>Py.Po.</u> Stedvis <u>Sl.</u>	5-15°	0,02	0,13	0,77			0,70-2,00
				0,02	0,12	0,24			2,00-3,50
				0,02	0,20	0,29			3,50-4,50
4.90 - 5.95	1.05	Pegm. M/enstaka biot.flagor, ^{ach} sikt Spor <u>Py.Po.Cp.</u>		0,05	0,08	0,13			
5.95 - 11.30	5.35	biot.gn. Se ovan,samt delvis halve kjernen grå gn.	0-15°	0,26	0,18	1,05			5,5-9,00
				0,02	0,05	0,05			9,00-11,30
		6/11-84 Stellan Burman							

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1195

Dato

Okt.-84

Koordinater

X: 925.327.8 Y: 41.563.2

Retning

S

Helling/stigning:

- 45°

Høyde

+ 9,2

Lengde

17.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 9.25	9.25	biot.gn. Mørk mlk-grov.växl m/opp til dm tykke grå gn.band sprette <u>Sl.Cp.Py.Po.</u> band företrädesvis i biot.	50-70°	0.02	0.13	0.41			0.00-1.50
				0.06	0.18	1.22			1.50-7.50
				0.02	0.15	0.84			7.50-8.50
				0.05	0.19	5.60			8.50-9.25
9.25 0.00 - 10.00	0.75	grå gn. rel.lys mlk.sprette gr. 1-3 mm.	60°	0.02	0.03	0.15			
10.00 - 10.45 10.45 - 14.20 45	0.45 3.25	- " - biot.gn. Mørk grovk.Cm tykke biot. pegmatitisk band.Klysor Striper m/ <u>Py.</u> <u>Po. Sl?</u>							
14.20 - 17.30	3.10	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-4mm.	60 45°						

6/11-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1194

Dato

Okt.-84

Koordinater

X: 925.328.5 Y: 41.563.2

Retning

Lodd

Helling/stigning:

- 90°

Høyde

+ 9,2

Lengde

11.60 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 8.60	8.60	Biot.gn. (Pegmatitisk) Mørk mlk-grovk.Foldet. Sprette cm tykke <u>Sl.Gn.</u> <u>Py.Cp.</u> band.	60°	0.03	0.30	1.43			0.00 - 1.50
			90°	0.03	0.14	0.87			1.50 - 4.50
			60°	0.04	0.22	1.89			4.50 - 8.60
8.60 - 11.60	2.00	grå gn. Rel.lys mlk.m/biot.skikt. Enstaka gr.2-5 mm.	70-80°	0.01	0.04	0.08			8.60 - 9.60

5/11-84

Stellan Burman

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1193

Dato : Okt.-84
 Koordinater : X: 925.330.8 Y: 41.563.2
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : + 9.2
 Lengde : 11.30 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 7.70	7.70	biot.gn. Mørk mlk.växl m/grå gn. band,gr-førende,sprette malmstriper.	70° 80°	0,02	0,14	0,52			0,00-4,00
				0,74	0,33	6,60			1,00-2,00
				0,06	0,09	0,46			2,00-3,40
				0,07	0,21	2,67			3,40-4,40
7.70 - 11.30	3.60	grå gn. Rel.lys mlk.växl m/cm tykke biot.gn.band,sprette gr.1-3 mm.	70-80°	0,02	0,13	0,36			4,40-7,00
				0,02	0,19	2,61			7,00-7,70
6/11-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 41.560

Borehull: 1192

Dato : Okt.-84
 Koordinater : X: 925.333.0 Y: 41.563.2
 Retning : Lodd
 Helling/stigning: - 90°
 Høyde : + 9,2
 Lengde : 10.00 m.

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 1.65	1.65	Biot.gn. Rel.mørk mlk.växl m/grå gn.band m/sprette gr.1-3 mm,spor <u>Sl.Cp.Py.</u>	75°						
1.65 - 4.80	3.15	" " " " m/sprette striper <u>Sl.Cp. Gn.Py.Po.</u>	75°	0,30	0,41	3,96			1,65-4,10
				0,02	0,21	1,20			4,10-4,80
4.80 - 8.40	3.60	" " Mørk mlk,spor hbl.gr.1-3 mm,grå gn.band.	60-70°						
8.40 - 10.00	1.60	Tap.							
6/11-84									
Stellan Burman									

Lokalitet: 42.040

Borehull: 1191

Dato : Okt.-84
 Koordinater : X: 925.401.4 Y: 42.047,8
 Retning : S
 Helling/stigning: + 63°
 Høyde : + 16.5
 Lengde : 24.70 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prøve m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.40	3.40	grå gn. Rel.lys mlk.enkelte biot. skikt.sprette gr.1-3 mm.	60°						
3.40 - 4.20	0.80	biot.gn. Mørk mlk.imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py</u>	50-60°						
4.20 - 4.70	0.50	Kjernetap.							
4.70 - 17.40	12.70	grå gn. Lys mlk.sprette gr.1-3mm	60-65°						
17.40 - 17.90	0.50	hbl. Mørk grovk.	60°						
17.90 - 21.50	3.60	grå gn. Se ovan.	60°						
21.50 - 22.00	0.50	Pegm.							
22.00 - 24.70	2.70	grå gn. Rel.lys mlk.m/skarn. <u>Sl.Cp.Gn.Py</u> .	60-70°	0,58	0,59	3,93			
		30.10.84 Stellan Burman							

Lokalitet: 42.040

Borehull: 1190

Dato : Okt.-84
 Koordinator : X: 925.402,1 Y: 42.048,0
 Retning : S
 Helling/stigning: + 75°
 Høyde : + 16.5
 Lengde : 28.80 m

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.00	3.00	grå gn. Lys mlk, delvis biot. rik. sprette gr.1-3 mm.	70°						
3.00 - 4.50	1.50	biot.gn. Mørk mlk-grov, delvis brecciert, Pegmatitisk. Spo hbl. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	70°	0,03	0,18	3,09			
4.50 - 11.30	6.80	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-3mm	80°						
11.30 - 12.30	1.00	Pegm.							
12.30 - 20.00	7.70	grå gn. Rel. lys mlk, delvis biot. rik og hbl. førende, sprette gr.1-3 mm.	70-80°						
20.00 - 23.20	3.20	" " Lys mlk, rel. musk. rik. stripet imp. <u>Sl.Cp.Gn.Py.</u>	70-80°	0,47	0,67	3,46			
23.20 - 27.80	4.50	grå gn. Lys mlk, sprette gr.1-2mm	60-70°						
27.80 - 28.80	1.00	" " Imp. <u>Sl.Py.Cp.Gn.</u>	"	0,08	0,37	1,52			
1/11-84 Stellan Burman									

Lokalitet: 42.040

Dato Okt.-84

Koordinater : X: 925.402,1 Y: 42.048.0

Retning : N

Helling/stigning: + 77°

Høyde : + 16.5

Lengde : 38.30 m

Borehull: 1189

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 38.30	38.30	grå gn. Rel.lys mlk.enkelte biot rikere partier,sprette gr.1-3 mm.Fr.25.00-32.00 m spor hbl. 30/10-84 Stellan Burman	70-80°						

Lokalitet: 42.040

Dato: Okt.-84

Koordinater : X:925.402,1 Y: 42.048,0

Retning : opp

Helling/stigning: + 90°

Høyde : + 16.5

Lengde : 29.80 m

Borehull: 1188

Dybde	L	Bergart	S	Analyser					Prove m
				% Pb	% Cu	% Zn	% S	% Fe	
0.00 - 3.60	3.60	grå gn. Rel.lys mlk.enstaka smale biot.band.sprette gr.1-3mm	80-90°						
3.60 - 4.05	0.45	biot.gn. Mørk mlk.Spor Sl.	"						
4.05 - 17.00	12.95	grå gn. Lys mlk.spor hbl.sprette gr.1-3 mm.	80-90°						
17.00 - 18.70	1.30	Kjernetap.							
18.70 - 20.00	1.30	grå gn. Se ovan.	70-80°						
20.00 - 25.00	5.00	grå gn. skarn Rel.mørk mlk.variert m/ grå gn,skarn,biot.Foldet, sprette små druserum. Sl.Cp.Gn.Py.		0,36	0,92	5,12			
25.00 - 25.90	0.90	Kjernetap Formodligen samme som ovan							
25.90 - 28.40	2.50	grå gn. Skarn Se ovan. <u>sl Cp Gn Py</u>		0,32	0,70	5,36			
28.40 - 29.00	0.60	Kjernetap.							
29.00 - 29.80	0.80	grå gn skarn. <u>sl Cp Gn Py.</u>		0,57	1,06	3,50			
		1/11-84 Stellan Burman							