



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Bergvesenet rapport nr 6949	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Løkken	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Per Sandvik	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:

Tittel

Kisforekomster i Sverige i nærheten av Grongfeltet

Forfatter

Okkenhaug, A.

Dato

År

10.12 1936

Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)

Orkla-Grubeaktebolag

Kommune

Frostviken

Fylke

Sverige

Bergdistrikt

1: 50 000 kartblad

19242 19243 19241

1: 250 000 kartblad

Grong

Fagområde

Forekomstbeskrivelse

Dokument type

Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt)

Ankarvattnet

Jormlien

Blåsjøen kisforekomst

Bjørkvattnet

Råstoffgruppe

Malm/metall

Råstofftype

Cu, Py, Au, Ag

Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse

Beskrivelse på 1 side

Ankarvattnet den beste Brutt under 1. v.krig og tatt ut et par tusen tonn som ble kjørt til Gåddede. Prøve derfra ga:

38,5%S, 0,76%Cu, 8,82 %Zn, 0,3g/t Au og 45 g/t Ag

Blåsjøen kisforekomst kalles også Stormyra.

Kisforekomster i Sverige i nærheten av Grongfeltet.

Oplysninger samlet på reise til Gäddede nov. 1936.

Ankervattnet kisforekomster.

Beliggenhet 1 a 2 mil øst for Joma grube. Det er en finkornig svovelkis med zinkblende og ubetydelig kobberkis. Gangart kvarts.

Ingeniör Sjölander mener å vite at det er flere mindre ganger av 0,5 a 0,75 m's mektighet. Han opplyser at kisen skal holde betydelig mengder (opptil 6 a 7 gr./t.) gull.

Under krigen blev det brutt og kjørt frem et par tusen tonn kis til Gäddede. Halvparten av dette ligger der ennå mens resten er brukt til veifyll!

En prøve jeg tok av kisdungen i Gäddede hold:
38,50 % S, 0,76 % Cu., 8,82 % Zn., 0,3 gr/t. Au., 45 gr/t. Ag.
J. Wassdahl oppgir at forekomsten skal ligge 2 a 300 m. rett nord for Lars Daniels gård på nordsiden av Ankervattnet. Han har dog ikke vært der selv. Forekomsten, mener han, kan påvises av Bengt Jordal, Jormvattnet p.å.

Efter Du Rietz's kart ligger en forekomst ca. 5 km. rett vest for Ankervattnet og to forekomster 3,5 km. NNO for Ankervattnet. Hvem som nu har muting på forekomsten vites ikke.

Jormlien kisforekomst.

Efter dr. Du Rietz's kart ligger forekomsten ca. 2 km. nordost for gården Jormlien ved nordenden av Jormvattnet.

Blåsjöen kisforekomst.

J. Wassdahl opplyser at det skal ligge en kisforekomst ved Stormyra vest for St. Blåsjö. Den kan påvises av Bengt Jordal, Jormvattnet.

Løkke: Verk, den 10. desember 1936.